







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
170200, Vol. 1










Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1702/D Vol. 1





Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1702/D Vol. 1







C/66  
ie

1701  
L D/2 vol 1

(D'alembert)

C/8/5

7/12

pt 1 only



77013 (1)

# HISTORIA GENERALIS

PLANTARVM,

In libros XVIII. per certas classes artificiose digesta;

*Id est, plusquam mille imaginibus plantarum locupletior superioribus, omnes propemodum quæ ab antiquis scriptoribus, Grecis, Latinis, Arabibus, nominantur: necnon eas quæ in Orientis atque Occidentis partibus, ante seculum nostrum incognitis, reperta fuerunt, tibi exhibet.*

**Habes etiam earundem plantarum peculiaria diuersis nationibus nomina:**

habes amplas descriptiones, è quibus singularum genus, formam,  
vbi crescant & quo tempore vigeant, natium tempera-  
mentum, vires denique in medicina  
proprias cognosces.

*Adiecti sunt Indices, non solum Greci & Latini, sed aliarum quoque linguarum, locupletissimi.*

*Pars  
Prima*




**LUGDUNI.**

APVD GVLIELMVM ROVILLIVM.

M. D. LXXXVII.

**Cum Priuilegio Pont. Max. Cæs. & Maieft. & Christian. Galliarum Regis.**









ILLVSTRISSIMO  
AC POTENTISSIMO  
PRINCIPI CAROLO  
EMANVELI DVCI  
SABAVDIAE.



*H*ANC Plantarum historiam, quæ nunc tandem, si non perfecta, at certè perfectæ proxima in publicum est proditura, non abs re Celsitudini tuæ dicendam existimaui. Quum enim ut paternis vestigiis in aliis quibusque præclaris rebus insistis, ita etiam eius exemplo, cognitionis omnium quæ vniuersa naturæ historia complectitur, desiderio accendaris, hæc autem quæ plantas describit, vel primum ( præsertim si, quantam rei medicæ utilitatem asserit, spectemus ) locum inter illa teneat : fieri non potest quin gratissimum tibi sit irens istud volumen, quo ditissimus ille & pretiosissimus thesaurus cõtinetur, præsertim quum non, ut aliis antea editis eadem de re libris, magna tantum eius portio, sed aut totus, aut penè totus eo includatur : adeò ut de isto volumine id quoddam nullo hætenus, prædicari possit, tam multarum stirpium tam accuratam & exactam descriptionem continere, ut ( sicut paulò antè dixi ) si non ad perfectionem peruenisse, saltem ad illam proximè accessisse dici queat. Quod à me tacereur tamen, nisi ex collatione cum aliis manifestum fore, & quos celsitudo tua seum habet medicina & nominatim rei herbariæ peritissimos viros, id ei testatuos scirem. Habebunt autem quicumque hoc fruentur libro, etiam quod potentissimo illi & modis omnibus maximo Regi Philippo, socero tuo, gratias agant. Ex remotissimis enim terris, nondum ante seculum nostrum cognitis, & quas partim ipse, partim inuictissimus Imperator, Carolus quintus, eius pater, subiugant, allata non pauca stirpes fuerunt, quarum haud magis quàm illarum terrarum notitiam quisquam habuerat : quum tamen ex nonnullis earum ( de stirpibus loquor ) presentissima peti remedia videamus. Nec verò plantæ tantum sed alia etiam multa inde prodierunt, antea prorsus incognita, quamuis inter natra diuitias, ut magis secretas, ita etiam insigniores numeranda essent. Huiusmodi autem opulentia natura quis inter omnes Christianos Principes



patre tuo studiosior, quis eius cognitione instructior extitit?

Verum ut ad eam historia naturæ partem, quam tibi nunc offero, reuertar, sicut eam alia nulla esse inferiorem patri tuo persuasum erat, ita quin idem tibi persuaseris, minimè dubito: ac profectò, quemadmodum herba quæ Gentiana vocatur, Gentij Illyrici principis nomen immortalitate donauit, ita vel hanc plantarum historiam nomen tuum immortale reddituram credibile est. Quoties enim à posteris mentio eius fiet, tui, cui dicata est, memoria renouabitur: quin etiam erunt fortassis qui eam hac ipsa dicatione à ceteris omnibus superioribus distinguant: etiamsi alia multa habeant, quibus insigne discrimen possint inter hanc & illas ponere. Nec verò Adrianus Imperator non & ipse huius libri editionem, sibi nuncupatam, valde hilari vultu excepisset, summòque fauore prosequutus fuisset, quantum coniecere ex eo licet, quod de illo literis Athenæus prodidit, magna seq̃ digna liberalitate eum esse remuneratum à quo herba lotus oblata fuerat, quæ florem inusitatum, id est pro candido rubrum (qualis rosa est) progenuerat: necnon illum qui hanc nouitatem versibus celebrarat. Quominus mirari quenquam decebit, me Celsitudini tuæ dicare librum hunc ausum fuisse: quum vel ea quæ de hereditario illius in literas amore, easque nominatim quæ illa opum naturæ arcana nobis pandunt, per multas regiones sparsa est fama, ad hoc me incitare debuerit: simulque ad precandum Deum Optim. Max. (sicut & precor) ut illum diutissimè incolumem seruet, & nouis in dies munificentia benignitatisque suæ donis locupletet. Lugduni, Cal. Iulij: anno Domini millesimo quingentesimo octuagesimo sexto.

Tuæ Celsitudini deditissimus,  
GVLIELMVS ROVILLIVS.





GULIELMVS ROVILLIVS

LECTORI SALVTEM.



IGESIMVS annus est, benigne Lector, & eo quidem amplius, cum ingressus musæum Iacobi Dalechampij, insignis ætate nostra Medici, grande volumen cum præ manibus habentem reperi, quamplurimis stirpium figuris conspicuum. Raras illas, exquisitas, & nōdum vulgatas contuitus, additis descriptionibus explicatas, & apto, vt argumētum poscebat, ordine dispositas, ingenio geniōque meo inuitatus (semper enim fui, ac etiamnum sum, ita publicæ vtilitatis appetens, vt in iis obeundis quibus omnium commoda procurentur, nec labori parcam, nec sumptui) arbitratus sum operis magni tanquam infantiam ac principium id esse: statimque alia atque alia mecum reputaui, sed hoc præcipuè, nihil iucundius esse ac optabilius, quàm naturæ & facultatis plantarū cognitionem: seu voluptatem nobis ipsi proponamus, seu illorum quæ nostris malis subueniunt, præsentem supellectilem. Quid enim magis nos exhilaret, quàm aspectus pulcherrimorum (vt ita dicam) aulæorum, & tapetiorum, quæ natura, omnium architecta & parens, ubiq; strauit in suis latifundiis, vt admiranda forma, & speciosa varietate colorum, radicis, caulis, ramorum, foliorum, floris, fructuum, nostros oculos pasceret, ac reficeret, spectaculo quidem ornatissimo, & instructissimo, quod vel etiam maximè squalidos, rusticos & incultos homines alliciat, & delectet? Necessariam porro esse hanc scientiam ad tuendam vitam, & morborum infestorum nobis curationem, multis disceptandum non est. Satis id docent vel mutæ ac rationis expertes animantes, quæ instinctu naturæ medentur sibi, remediāque profutura discernunt ac deligunt. Hæc igitur cum animo diu ac multum volutassem, constans quædam incessit voluntas tantum opus aggrediendi, nouum ferè illo tempore, cum eius fundamenta Fuchsius, Dodonæus, Tragus, Lonicerus, & aliquot alij iecissent, sed exiguo plantarum numero contracto, & rudiori imaginum forma, nullāque totius operis artificiosa partitione, quæ diuisam materiam in suas differentias & classes distingueret. Cum ergo decreuissem omni cura id quod meditabar perficere, & magnam mearum fortunarum partem in eam rem impedere, ad promouendum eum conatū, multis opus fore prouidi: ac primū quidem,



# A D L E C T O R E M.

industria hominis docti, qui huic negotio præfectus omnia ritè administraret. Propitia fortuna, hoc animo versanti mihi occurrit Ioannes Molineus, dum vixit, famosus medicus, Guilielmique Rondeletij, medici præstantissimi, & in examinandis plantis exercitatissimi, alumnus, discipulus, & per annos multos conuictor, homo laboris indefessi, & cuius ob tersam puritatem oratio mirificè omnibus arrideret. In hoc totus probus ac eruditus ille vir incubuit, singulari fide ac sedulitate, plurimum adiutus subsidiario consilio Dalechampij, qui vltro de singulis eius commentationis partibus ecquid sentiret, exposuit, ac liberaliter commodauit quidquid iam imaginum, & historiarum collegerat. Insuperata hæc opportunitas virgula diuina cum obtigisset, pensitans mecum, id opus augeri in infinitum posse, aggestis plantis, quas alio solo & cælo quàm nostro genitas nobis iis explorandis dediti homines suppeditarèt, (non enim, vt inquit Poëta, terræ ferre omnes omnia possunt) amicos meos, quos equidem non paucos habeo, rogavi, Aphricanos, Hispanos, Italos, & qui in orbis remotissima loca ferè quotidie nauigant, vt ex regionibus illis quas adeunt, aut in quibus degunt, ignotas adhuc nostris gentibus plantas, ita vultas vt non discerptæ & lacere sed quàm maximè fieri posset integræ & illasque essent, ad me mitterent. Quod (nisi me plus satis amo) prosperè successit, acceptis illorum beneficio plantis certè quamplurimis, spectatu dignissimis, nec passim obuiis.

Prospecta hæc cum iam essent, & nihil aliud superesset, quàm, quod aiunt, operi manum admouere, eos qui plantarum simulachra delinearent, ac sculperent, & hic, & vbicunq; habitare rumor erat, peritissimos, gnauiissimos, ingeniosissimos, nulla prorsus mercedis habita ratione, quantumcūque modum excederet, aut acciui, aut absentes operam in id nauare iussi, hoc tantum imperans, vt illorum minimè esset fallax imitatio, & quæ repræsentarent, imaginis veritate ac venustate cernentium oculis approbarètur. Iis qui huius rei scientes & gnari sunt, haud difficile æstimare fuerit, in tantum numerum tabularum, quæ pictæ & incisæ sunt, quantam pecuniæ vim profundi oportuerit, & quantum molestiæ patienter deuorari, vt continuaretur is labor, & ad finem perduceretur ingens libri moles: cuius editione cum incredibili dolore, & graui damno meo, in longum tempus distuli, tribus diuturnis morbis, periculosis, minacibus, vexatus, & quadam velut remora impeditus: è quibus, Deo iuuante, & felici medicorum auxilio, tandem euasi, sed ita lassus & fractus, vt tardius quàm cupiebam, alligare me huic pistrino valuerim.

Interim autem dum inuitus moror, & procrastino, è multis officinis prodierunt eiusdem argumenti libri, eiusdemque apparatus, ab egregiis doctrina viris emissi, vtilitati publicæ addictis oppido, & alioqui perspicacibus, ac minime pigris: quidam, breues, instar tumultuariæ cuiusdam scriptionis festinati: quidam non exiguum earum numerum habentes. Primum autem inter illos omnes locum primamque laudem Andreæ Matthiolum obtinere fatendum est: **verum** ne illius quidè opus me ab eo quod



quod destinaueram, deterruit ac depulit. Id verò fuit, generatim & in vniuersum omnium plantarū quæ innotuerunt memoria nostra, à medicisque & herbariis memoratæ ac celebratæ fuerunt, historiā ad posteros transmittere, velut thesaurum omnium quæ ad æuum vsque nostrum traditæ sunt, & quum cæteri omnes indigestos quosdam earū cumulos nobis proposuissent (siquidem nec Matthiolo alium quàm ipse Dioscorides ordinem tenere licebat) eas contrā in certas classes artificiosè distribuere. Quæ res certè multum huius cognitionis cupidos, & candidatos leuabit: quos in tanta multitudine librorum & tam confusa quærere tædet quæ vestigant. Nec verò est quod quisquam requirat plantarum imaginibus prorsus iconicis expressarum descriptiones fusiores & accuratiores nostris quas singulis figuris apposuiimus. Sunt enim eiusmodi nostræ, vt ex iis cogniturus sit Lector vniuscuiusque genus, formam, vbi crescant, quo tempore vigeant, natium temperamentū, quinetiam proprias in medicina vires. Adde quòd in singularū propemodū historia, authorum de illis loci citantur ac expenduntur, quinetiam alij aliorum collatione explicantur: aut, si pugnare inter se videri possint, cōciliantur. Sed & quæ corrupta sunt restituuntur, & variæ lectiones aut cum iudicio excutuntur, aut obiter saltē indicantur. Non mirū est autē tot hac de re libros antea prodisse, quum emergeret in dies quod auctariū esset: eorum præclara laude scilicet, & existimatione qui de suo symbolā conferebāt. In horum studiorum æmulatione dum eiusdem cōsilij rationibus plures insistant, sunt qui vel lucri spe capti, vel honoris leuiusculi ambitione ducti, quod ex aliis mutuati sunt, furtimue surripuerunt, sibi vendicent. Hoc profectò vitium nunquam non mihi turpe fuit, ac odiosum, vt qui nec inuidus sim, nec gloriosus, ac ne quæstus quidem auiditate ardeam. Gratissima sanè hucusq; vel iam à puero, mihi fuit modesta simplicitas, quæ publicæ vtilitati ac omnium desiderio potius inferuiat, quàm priuatīs commodis, neminēque fraudet ac spoliet illa quam virtus eius meretur, gloria. Itaque plagij crimen istud perosus, vel (vt loquar mollius) nimiam versutæ mētis istam calliditatem, nihil alienum mihi arrogauimò, si quæ plantæ figura elaborata iam, præsto fuit, quam ostenderit alius postea, vtramque, meam nempe, & illius, apparere volui, ne quæ inuidia glisceret, nec locus esset conquestioni, ac denique maledictis quisquam ne mecum certaret, ac impotenter veluti digladiaretur: simul etiam, vt intelligerent excellētes illi viri, quorum scriptis fruimur, postquam hoc primum institui, quāta cum vigilantia & sollicitudine in hoc negotio me gessi, prius quàm eò cogitationes suas intēdissent, aut quidquam designassent. Adicio & his nonnullos, dum iter hac facerent, conspecta magna parte imaginum ad vsum iam absolutarum, & expressarum, animaduersoque illarum ordine, positu, & collocatione, ac quibus Theophrasti, Dioscoridis, Cratenæ, Plinij, Apulei, nomenclaturis earum appellationes conuenirent, de hoc quod maximè cōtrouersum est, velut arbitros pronuntiasse, illis tacitis à quibus didicerūt: bello quidem astu,



A D L E C T O R E M.

ut est temporum nostrorum mos, aut, quod verius est, licentia, & prauitas, quam tamen auersatur purus & sincerus animus, si Plinio credimus, ingenuum esse profiteri per quos profecimus.

Erit autem fortassis, qui miretur, vel etiam reprehendat, quod post vltimum librorum, earum stirpium adnexa sit appendix, quarum in aliis historiae segmentis congruens sedes fuisset. Atqui nec inusitatum hoc est, nec inauditum: sed multorum exemplis hoc excusare licet. Ac sane optima voluntas & perpetua mea, communicandi cum omnibus quidquid penes me fuerit, declarari non potuit manifestius. Continet enim appendix illa plantarum effigies aliquot, aduectarum è Syria, & Libano monti conterminis locis, quas suppressere & occultare, atque in alteram editionem polliceri potui, ut habendi legendique desiderium lectori vehemens excitaretur: sed non mihi visum est eum sic inescare, vanisque lactare promissis. Irritat famem qui panem frustulatim præbet. Satius ergo putavi, assuto hoc veluti panniculo, satisfacere lectori, nec eum suspensum tam inani & longa specula cruciare. Hoc enim qui faciunt, ineptè (ut reor) ac stultè illudunt aliis.

Quinetiam, postquam in lucem hoc opus nostrum prodierit, ita studiis illorum qui cognitionis plantarum sunt cupidi, consulere statui, ut iam nunc omnibus, in hac doctrina prouectis, & alioqui bene erga hominum genus animatis, denuntiem, quæcunq; obstinato labore suo & improbo fuerint consecuti, ea si mihi committere, ut excudantur, velint, id me alacriter suscepturum, & sanctissima fide, promptissimæque diligentia præstiturum: ac ne illa quidem in aliam editionem reseruaturum, sed in secundam appendicem (quæ seorsum vendi possit iis qui iam volumen istud emerint) coniecturum.

Ceterum dissimulare nolo, futurum fortasse ut errata compluscula in his libris deprehendantur: alia quidem haud ita magni faciunda, maioris alia momenti, quæ à comi & minime aspero lectore peto, vel clementer ignosci, vel mitius damnari. Homines sumus, ad errandum proni, ac sæpe in his quæ agimus, cæci, vel hebetes: & non ignorant quibus aliquando res fuit cum prælo typographorum, etiam obseruantissimis & cautissimis vix delicta hæc posse vitari. Tales cum simus, quod nostræ conditionis ac fortis est, lenius carpere & fastidire vnusquisque debet. Totis ego viribus & omni ope, operæque sum adnexus, ut admitterentur quàm paucissima, quibus esset danda venia, & selecta, quæ peccata sunt, ut offendi, sic indicaui: si quid me tamen effugit, humanitate atque

benignitate præditum lectorem obtestor, & obsecro, ut  
(quod facile ab eo impetratum iri confido) rem tam  
nihili prætereatur, condonet, nec summo iure,  
quod summa iniuria est, omnia  
persequatur, & exigat.

Vale.

IN HANC



IN HANC GENERALEM STIRPIVM  
HISTORIAM EPIGRAMMA  
docti cuiusdam viri.

*Stirpifera historias natura vidit ut orbis,  
Telluris stupuit omniparentis opes.  
Historia magis attonitus reddetur ab ista:  
Nam cumulis cumulos addidit ista novos.  
Quanto imperfectis perfecta excellere constat,  
Gratia tanto isti debita maior erit.*

## A L I V D.

*Quid primum hic, Lector, vel quid mirabere summum?  
An quòd opum tam sit natura benigna suarum?  
An quòd terra eius tam promptè iussa capeßat?  
Anue imitatricem natura suspicis artem,  
Quæ pictrice manu nostros deducit in orbem,  
Totum oculos, secreta illis & cuncta reuelat?  
Anue obfirmatos potius mirere labores,  
Circa opus exhaustos tantum, ferè tempore tanto  
Quanto Mars Priami vexauit Pergama Graius?  
Immo aliud longè est miratu dignius istis:  
Terra salutiferas quòd quum tot germinet herbas,  
Tot morbi nequeant ullam reperire salutem.*

## Α Λ Λ Ο.

Παντοίοις κόσμησι φυτῶν διαδάλμασι γαίην  
Πότνα φύσις, κρείοντι Θεῷ ἐπήρα φέρουσα.  
Ἀλλ' ἀγνώστος ἔην τῶν δὴ ἔργων διαδαλούντων  
Πλείστη μοῖρα βροτοῖς, καὶ μας ἀγέλῃ περ ἑμῶν.  
Νυνὶ δ' καὶ ἀγνώστοις ἀπαροίθεν ἐκδύγετο γαίης,  
Ἡ δ' τοῖς βίβλος φυτὰ πάγχυλα ὅμμασι δείξει.  
Ὅφ' ἐπολεῖς πολύμοχοι ἅπαν λυκάβαντες ἔτρεξαν  
Τόχος, ἐν ᾧ φύσιος νιν τοσάδε γάμματα δέρεται.  
Ὅς χάριν οὖν φύσιος τοσούτοις γάμμασιν ἔξει,  
Θάμνασθ' ἔχεται καὶ τῷδε πονήματι τόχοις.





INDEX LIBRORVM HISTORIAE  
GENERALIS PLANTARVM.

669

tomus 1<sup>us</sup>.

Lib. I.	De arboribus spontè in Syluis nascentibus.	fol. 1
Lib. II.	De fructicibus in Dumetis & Frutetis sponte nascētibus.	119
Lib. III.	De arboribus quæ in Viridariis & Pomariis coluntur.	285
	De segetibus & leguminibus, ac quæ cum iis in Agris nascuntur.	371
Lib. IIII.		371
Lib. V.	De òleribus & herbis in Hortis nascentibus.	517
Lib. VI.	De plantis Umbelliferis.	688
Lib. VII.	De plantis flore placentibus.	791
Lib. VIII.	De plantis odoratis.	877
Lib. IX.	De plantis in Palustribus prouenientibus.	983

tom. 2<sup>us</sup>.

Lib. X.	De plantis in Asperis, Saxosis, Sabulosis & Apricis nascentibus.	1097
Lib. XI.	De plantis in Umbrosis, Vdis, Vliginosis & Pinguibus locis prouenientibus.	1208
Lib. XII.	De plantis ad Mare, & in ipso Mari nascentibus.	1359
Lib. XIII.	De plantis aliis innixis scandentibus.	1401
Lib. XIIII.	De Carduis & aliis spinosis aculeatisque plantis.	1435
Lib. XV.	De plantis Bulbosis, Carnosis radicibus, & geniculatis.	1491
Lib. XVI.	De plantis Catharticis.	1626
Lib. XVII.	De plantis Venenatis.	1707
Lib. XVIII.	De plantis Peregrinis.	1749





# SVMMA PRIVILEGII

SIXTI PAPAE V.

**A**D FVTVRAM REI MEMORIAM. Cum, sicut dilectus filius Gulielmus Rouillius bibliopola Lugdunensis nobis exponi fecit, ille ad communem bonarum artium studiosorum, & aliorum cōmodum quoddam opus suum, *Historia generalis Plantarum in libros octodecim distributa*, nuncupatum maxima sua impensa, multorumque hominum peritorum industria, & longo labore compositum à Magistro sacri Palatii examinatum, & approbatum imprimere, & imprimi facere intendat, dubitēque ne similiter ab aliis illud idem opus postea sine eius licentia imprimatur, quod in maximum ipsius Gulielmi praiudicium tenderet. Nos propterea eius indemnitati consulere volentes, ipsūque à quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium duntaxat consequendum harum serie absoluentes, & absolutum fore censentes, eius supplicationibus inclinati, eidem Gulielmo ne prædictum opus per annos decem ab anno primæ dicti operis impressionis, à quoquam sine eiusdem Gulielmi, vel eius hæredis, seu ipsius ab eis aliter habentis licentia imprimi, aut ab aliis vendi, seu in eorum apothecis, aut alias venale, præterquam ab illo cui dictus Gulielmus, vel ut supra opus huiusmodi imprimendum commiserit, & licentiam dederit, teneri, aut haberi possit, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus & indulgemus inhibentes omnibus, & singulis Christi fidelibus præsertim bibliopolis, & librorum impressoribus in terris sanctæ Romanæ Ecclesiæ mediātē, vel immediātē subiectis, sub excommunicationis latæ sententiæ, ac etiam trecentorum ducatorum auri de camera pro vna camera Apostolicæ, pro alia accusatori, ac pro tertia partibus prædicto Gulielmo, vel hæredi eius irremissibiliter applicandorum, & amissionis librorum pœnis toties ipso facto, & absque alia declaratione incurrendis quoties contrauentum fuerit, ne intra dictum tempus decem annorum, ut supra, dictum opus sine eiusdem Gulielmi, vel hæredis prædicti licentia imprimere aut alias tenere audeant. Mandantes propterea vniuersis venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, Episcopis, eorūque Vicariis in spiritualibus generalibus, & in statu Romanæ ecclesiæ Legatis, Vicelegatis, & Gubernatoribus, ut quoties pro dicti Gulielmi, vel hæredis parte fuerint requisiti, vel eorum aliquis fuerit requisitus, eidem Gulielmo vel hæredi suo prædicto efficacis defensionis præsidio assistantes præmissa ad omnem illius vel hæredis sui requisitionem contra inobedientes & rebelles per censuras Ecclesiasticas, ac alia iuris remedia auctoritate Apostolica exequantur: inuocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis: & insuper quia difficile foret præsentem ad quælibet loca deferri. Volumus & eadem auctoritate decernimus illarum transumptis vel exemplis in ipso opere impressis, plenam & à data præsentium eandem prorsus fidem vbique in iudicio, & extra adhiberi, quæ præsentem originali adhiberetur. Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris, die septima Maij. M. D. LXXXVI. Pontificatus nostri, Anno secundo.

THO. THOM. GVALTERVTIVS.



*Summa Priuilegij Imperatorij.*

**M**AXIMILIANI II. Romanorum Imperatoris semper Augusti publico edicto cautum est Gulielmo Rouillio cui & typographo Lugdunensi, & sancitum, ne quis cuiuscunque status, gradus, ordinis & conditionis, siue sit chalcographus, vel bibliopola, siue alius quilibet, quacunque sacri Romani Imperij & ditionis eius fines patent, hanc *Historiam generalem Plantarum, in libros octodecim digestam*, nisi ipsius Gulielmi Rouillij aut heredum eius permissu, intra decennium eadem, aut alia minori forma excudat, aut excudenda curet, vendat ipse, aut cuiquam diuendenda mandet, aut denique excusa ab aliis intra eiusdem Maximiliani & Imperij fines vendenda importet, seu quouis modo distrahat manifestè vel occultè, vel quouis alio prætèxtu: alioqui sibi multam decem marcharum auri puri irrogatam sciat, quarum dimidia fisco Imperiali fraudis vindici, residua verò pars ipsi Gulielmo Rouillio, aut eius heredibus, aut ab illis mandatum habentibus, cedet, præter librorum amissionem, quos per se idem Rouillius, vel per suos, ubicunq; locorum nactus fuerit, adiumento magistratus loci, vel citra, propria auctoritate sibi vindicare, inque suam potestatem redigere poterit. In cuius rei fidem ipsi edicto manu subscripsit, & sigillum apponi iussit Cæsarea Maiestas, vt latius patet in ipso diplomate dato Pragæ decimaquarta die mensis Iunij, anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimoquinto.

Subsign.

MAXIMILIANVS.

Ad mandatum sacræ Cæs. M. proprium.

A. Estenberger.

*Extrait du priuilege du Roy de France  
& de Pologne.*

**P**Ar grace & priuilege du Roy est permis à Guillaume Rouille marchand libraire de Lyon, d'imprimer ou faire imprimer, une fois ou plusieurs ces présents Liures intitulés, *Historia generalis Plantarum, in libros octodecim digesta*: lesquels liures il a recouuré avec grâds frais, mises & despeses, tant sur les pourtraicts & tailles des figures, que pour le recouurement d'icelles: & pource est faite defenſe de par ledict Seigneur à tous autres Marchands, Libraires, Imprimeurs & personnes quelconques, de non imprimer, vendre ni distribuer en ses pays, terres & seigneuries lesdits liures, si ce n'est par le consentement dudit Rouille; & ce iusques au temps & terme de dix ans, à compter du iour & date que sera paracheuée la premiere impression: sur peine d'amende arbitraire, & de confiscation des liures qu'ils auroient imprimé. Et à fin qu'aucun ne puisse pretendre cause d'ignorance du present priuilege, ledict Seigneur veut & entend, que l'extrait d'iceluy estant mis au commencement dudit liure serue pour toute notification. Car tel est son plaisir, nonobstant oppositions & appellations quelconques, comme plus à plain est contenu & declairé par lesdictes lettres de priuilege: sur ce donnees à Lyon le vingt vniemesme Iannier, mil cinq cens septante cinq, & de son Regne le premier.

Par le Roy, à vostre relation,

Signé, MORE.

Et sceelé du grand seau en sire iaune à simple queue.





# HISTORIAE

## OMNIVM PLANTARVM

### LIBER PRIMVS,



*Quo describuntur, atque pictæ ostenduntur, arbores sponte  
in Syluis nascentes.*

#### QUERCUS CAP. I.



RISCI GRÆCI omne genus arboris *ἄλυος* Nomina  
appellatione intellexerunt, à verbo *ἀλύνω*, quod est,  
erumpo, ac pullulo. Latini glandis nomine, omnem  
fructum complexi sunt, vt Iabolenus ait, exemplo  
Græci sermonis *τῆς ἄλυος*, apud quos omnes arborū  
species, *ἀκρόδρυα*, appellantur, vt *παρὰ τῆς ἄλυος* fiat  
dictio *ἀκρόδρυα*, quo verbo Caius omnem fructum  
significari dixit. Quæ etiā glandis appellatione apud  
scriptores intelliguntur, à Græcis *βαλάνη* vocantur.

Græcos, *ἄλυος* vocabulo omne lignum significare scribit Hermol. vnde Geran-  
dryon pro vetere & ambuga quaque arbore accipitur, quasi vetus ramale, vt loqui-  
tur Perlius. Sed tam latè patentes significationes in angustius sunt adductæ, vt *ἄλυος*  
arborem omnem glandiferam tantum significet, & præsertim quercum. Glādem  
verò, vt ait Plinius, quæ propriè intelligitur, ferunt Robur, Quercus, Esculus,  
Cerrus, Ilex, Suber. *Ἀκρόδρυα* propriè quæ in ambitu lignosum putamen habent.  
Verum glandiferas arbores Plin. vna voce comprehendi posse negat Latino ser-  
mone, quemadmodum Græco potest *τῆς ἄλυος*, & antiqua voce Saronos, à quo  
Saroniacus sinus, & Saro in Arcadia nemus trans Ladonem fluuium, & sinus Sa-  
ronicus, olim querno robore redimitus, vnde nomen, ita Græcia antiqua appel-  
lante quercum, quanquam Pausanias à Sarone qui post Altipum regnavit, sinum  
eum dici velit. Quibusdam, vt Theodoro Gazæ, Roboris appellatione contineri  
posse omnia genera videntur, non sine errore, cum Robur vna species sit dunta-  
taxat ex multis, quæ *ἄλυος* generi subiectæ sunt. Matthiolus etiam Dioscoridem  
*ἄλυος* nomine vniuersè quidem omnes glandiferas arbores comprehendisse exi-  
stimauit, quia in significatione id nomen hîc à nobis vsurpatur. Latine verò Quer-  
cus, modò pro genere, modò pro vnica eius specie, sic dicta, quòd id genus arboris  
græue sit, ac durum, tum etiam in ingentem euadat amplitudinem. Querquerum  
enim quidam græue ac magnum dici volunt. Ac primùm glandiferarum arborum,  
maximè Quercuum genera, & historiam tum veteres, tum neoterici variè distin-  
xerunt, atque descripserunt. Nam vt Theophr. ait, *τῆς ἄλυος* genera constituunt  
Idæi, Hemeida, Ægilopa, Platyphyllon, Phagum, Haliphlæon, siue Eutyphlæon:

In Coroll.  
c. de Quer.  
li. 1. Diosc.

Lib. 16.  
ca. 6.

Plin. lib. 4.  
cap. 5.

In cap. de  
Quer. lib.  
1. Diosc.

Genera.

Li. 3. Hist.  
cap. 9.



## HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,

2  
 Ibid. ca. 10. Macedones, Etymodryn, Platyphyllon, Phagon, Asprin, Haliphlœon. Genera  
 Lib. 16. c. 5. glandium multa, inquit Plinius. Distant fructu, situ, sexu, sapore: Et, glan-  
 Ibid. ca. 6. dem, quæ propriè intelligitur, ferunt Robur, Quercus, Esculus, Cerrus, Ilex,  
 Loco cita- Suber. Hermol. roboris genera diuidit quadripartitò, in Quercum, Robur,  
 to. Esculum, Cerrum, quæ Græcis illis respondent, Hemeridi, Ægilopi, Haliph-  
 phlœo, Platyphylo. Vt sit Quercus hemeris: platyphyllus esculus: ægilops  
 cerrus. Sed nunquid Haliphlœos, Robur significet, nondum, ait, compertum  
 habeo. Alij aliter ista digesserunt, atque explicauerunt. Qua de re quamuis tan-  
 ta sit inter doctos homines dissensio, vt de ea decidere difficile sit, tamen ex iu-  
 dicio & sententiâ Iacobi Dalechâpij Medici literatissimi, & in simplicium medica-  
 mentorû cognitione exercitatissimi, atque vsu peritissimi, primû de Quercus ge-  
 neribus, deinde de cæteris glandiferis arboribus dilucidè atque enucleatè dicam.

PLATYPHYLLOS Mas.

PLATYPHYLLOS femina.



Li. 16. c. 6.  
 Nomina  
 Forma.

Quinque igitur sunt Quercus genera. Platyphyllus, Hemeris, Phagus, Ægilops, Haliphlœos, quæ & Cerrus fœmina dicitur, & Farnia Italis. Differunt hæc folio, caudice, materia siue ligno, totâque ferè specie, præterea fructus sapore, magnitudine, figura, colore. Platyphyllus Idæorum & Macedonum, quâ latifoliam, verbû verbo exprimens Plin. interpretatur, Latinorum est Quercus, quæ pro specie sumitur. Gallorû *Chesne*, Itolorû *Quercia*, Germanorû *Eichbaum*, Arbor est maximè omniû procera, si Ægilopè excipias, recto caudice, cortice inferna parte rimoso, scabroq; superiore læui cui subest albuurnû, quod cû animalis pingui cõparari potest, plurimis in orbem brachiata ramis, magnâ innoxiamq; vmbra loco inducētibus: folio grâdi, Cerri & Haliphlœi folio latiore, carnoso, laterû anfractibus sinuosissimo in arbore vetusta, minus in ea quæ cæsa nouâ frondem mittit, sed tû maximè lato, & spisso, summa parte obtuso, cû cadit nigrescete potius quâ flauescete: glande mediocri, suis grata, ob eam causam iis saginandis apta, cû à Phagi & Hemeridis glâde discesseris, dulci, non omnino quidem, sed si cû haliphlœi & ægilopis glande



GLANDES | GLANDES  
PLATYPHYLLI | PLATYPHYLLI  
perfecta. | imperfecta.



glande conferas. Minus enim acerba & amara gustui est, calyce nullis aculeis horrido, sed pustulata tantum scabritia asperato. In summo ramorum cacumine ferè glans nascitur, breuior, extrema parte veluti depressa, ac retusa, aculeo, qui in summo fastigio glandis eminet, breuiore, & minus pungente: sæpè ternæ glandes simul coherant, aut binæ, rarò vnica prodit: pediculus eas sustinens, crassus & brevis, inde nascitur vbi ramo foliū adhæret. In vnus furculi capite plerunque videas hinc tres cōiunctas glandes, illinc duas, ac in proximo vnam solū, prout succus, earum alimentum, huc illuc sese magis spargit: radice longè latèque euagante: materia ad ædificia, dempta Haliphlæo, pessima, ad cremandum quoque & carbonem faciendum inutiles, sicut & Haliphlæi, ac post illam teredinibus carieique maximè obnoxia, vt scribit Theophr. Et paulo post. Materia Platyphylli improba: & dolata quidem omninò inutilis: rumpitur enim & labat: non dolata verò melior, & ob id rudi duntaxat vtuntur. Improba etiam ad cremandum, & carbonem faciendum: nam omninò inutilis est eius carbo: exilit enim, & scintillat,

Li. 3. Hist.  
c. 9. & 10.

ærariorum tantum officinis compendio, quoniam desinente flatu protinus emoriens parum absuitur. Verum hunc Theophrasti locum aliter quàm in excusis Græcis Latinisque codicibus & legimus, & interpretati sumus, quia deprauatum illic esse existimamus. Scribit enim Ægilopis glandem ἑσχαλον καὶ πικρότατον esse, id est, omnium pessimam, & amarissimam: ac paulò post Asprini fructum ferre adeo insuauem, vt eo nullum animal vescatur, demptæque, nec ea quidem, nisi alterius pabuli inopia: ex quibus efficitur eandem planè esse Idæorum Ægilopem, & Macedonum Asprini: sed quæ de Aspri sequuntur maximè repugnant: μεχθηρὰ ὅτι καὶ τὰ ξύλα, &c. Id est, materia autem improba, & dolata quidem, & cætera, quæ suprà retulimus. Quæ enim Aspris tam improba materia, & ad cremandum, & ad carbonem faciendum tam inutiles esse possit, quæ rectissima, excelsissima, leuissima, & materiæ per longitudinem robustissima sit? eodem Theophrasti auctore. Quare proculdubio legendum, μεχθηρὰ ὅτι τῆς πλατυφύλλης καὶ τὰ ξύλα. Id est, materies Platyphylli improba, sicut iam conuertimus, id quod tum ipsiusmet Theophrasti, tum Plinij autoritate comprobamus. Nam Theophr. hic ea repetit, quæ superiore capite de Platyphylli materia dixerat. Materia ad ædificia, dempta Haliphlæo, pessima, ad cremandum quoque, & carbonem faciendum inutiles, &c. Plin. verò quæ de Aspri hoc Theophr. loco perperam legebantur, ad Platyphyllon omnia refert. Ab hac proxima latifolia proceritas, sed minus utilis ædificiis, carbone dotata, vitiis obnoxia est: quam obrem solida vtuntur carbonarij, ærariorum tantum officinis compendio, quoniam desinente flatu protinus emoriens, sæpius recoquitur, cæterò plurimis scintillis. Idem è nouellis melior: id quod in Querno nostro carbone quotidie experimur. Nam qui ex trunci, aut crassiorum ramorum taleis fit (Gallis *harbon de quarnier* dicitur) in igne crepitat, subsilit, non nisi continuo flatu acceditur, quo cessante, vel si non lignis facile flagrantibus assidue foueatur, conceptus ignis statim extinguitur.

Lib. 3. Hist.  
cap. 10.

Lib. 3. Hist.  
cap. 9.

Li. 16. c. 6.



guitur : qui verò ex gracilioribus ramis fit (Galli *charbon de branche* nominant) vel ignem facilè concipit, vel exiguo raròque flatu accensum constantissimè alit, quousque in cinerem redigatur. Sed hic obiter ex vtriusque authoris supra positis locis delendæ, quæ diu inhæserunt maculæ. Nam in Theophrast. pro

Cap. 10.

οἱ δὲ περὶ μακεδονίαν τέτραρα γένη ποιῶσι, lege πέντε γένη ποιῶσι, vt quinque sint, vt Idæis, ita & Macedonibus Quercuum genera: totidem enim mox enumerat, Etymodryn, Esculum, Platyphyllon, Asprin, Haliphlæon. In Plinio, pro, sed minùs utilis ædificiis, atque carbone dotata vitis obnoxia, reponet, sed minùs utilis ædificiis atque carboni. Dolata vitis obnoxia est. Sic enim Theophrast. ex quo hæc Plinius conuertit, *πελεκηθέντα μὲν ὅλως ἀχρεῖα*. Verùm ad Platyphylli historiam redeamus.

Platy-  
phyllon  
fœmina.

Periti quidam herbarij Platyphyllon quam descripsimus, marem esse aiunt, fœminam verò genus alterum in saxosis & asperis locis ferè nascens, mare humilius, cortice in tenellis furculis rubescente, non vt in illo, albescente: folio minore, breuiore, angustiore, antrorsum magis acuminato, tam densis laciniis sinuoso lateribus, vt eminus crispum videatur, lætiùs & nitidiùs virente, glande pusilla, & strigosa. Talem profectò gignunt aprici lapidosique colles Allobrogum, aspectu nonnihil variam ob loci squallidi ariditatem. Cæterùm & in aliis quercetis fœmina quoque prouenit, folio quàm maris breuiore, antrorsum latiore, & magis obtuso, inferne pallido, cortice ramorum nigriore: glandibus minimis, in ramorum & furculorum vertice prodeuntibus, interdum senis, aut quinis, sæpè ternis, aut quaternis, rarò binis; rarissimè singularibus, quasi digito retusis, aculeo minimo, parùm è calyce prodeuntibus, sed ei firmiter adnexis. Platyphyllorum generi adscribenda etiam Quercus virens perpetuò, qualis in Thurino agro, vbi Sybaris olim fuit, ex vrbe prospiciebatur, nunquam folia dimittens, nec ante mediam æstatem germinans. In Apennino, & Andium Gallicæ gentis agro tales quædam visuntur, vt quod Plinio mirum sit, iam nos mirari desinamus. Id verò admiratione multò dignius, quod scribit

Theophr.  
lib. 1. Hist.  
cap. 15.

Li. 16. c. 21.  
Lib. 16. c. 6.

& Andium Gallicæ gentis agro tales quædam visuntur, vt quod Plinio mirum sit, iam nos mirari desinamus. Id verò admiratione multò dignius, quod scribit

## HEMERIS

Etymodris.

Lib. 3. Hist.  
cap. 9.

Locus.

Quercus  
genus 2.

Nomina



Plinius, probari Latifoliæ glandem, cuius in balano vtrinque ex longitudine extrema lapidescit duritia: meliorem cui in cortice quàm cui in corpore, vtrumque non nisi mari. Nam cum locum Theophrasti exprimere voluisse videatur, ab eius sensu alienissimus est. Neque enim id melioris glandis signum esse vult Theophrastus, neque id de Platyphyllon scribit, sed de Phago & Haliphlæo. Locus Theophrasti est huiusmodi: peculiare Phago & Haliphlæo, quod ambarum in maribus tantum, glandes parte extrema vtrinque lapides gignunt, aliàs in cortice, aliàs in corpore. Ideo detractis lapillis, cavitates perinde atque in animalibus relinquuntur. Platyphyllon in syluis nostris vasta gignitur. Alterum Quercus genus est Hemeris Idæorum, Macedonum Etymodrys, Latinorum Robur, Italicorum *Roure*, Allobrogum quorundam *Roure*. Robur, inquit Festus, in carcere locus is, quo præcipitatur maleficorum genus, quod ante robusteis arcis includebatur. Hunc locum etiam robustum carcerem Plautus vocat. Robur apud Lucretium



cretium legitur, pro Fuste ac ligno, quo fontes tundeantur, fustuario. Placidam interpretatur Gaza, Hemerin, audaciùs, more suo. Plinius Græco nomine, utitur. Arbor est non læui, sed aspero rimosoque cortice, humilis, non excelsa, non recta, sed contorta, aliisque ramorum crebrò cauata: materia firma duraq; sed minus, quàm Phagi: glande post Phagum dulcissima, sed longiore maioreque, imò omnium maxima, è suo calyce breuiore, ac depresso faciliè decidua, tenui, longoque pediculo, affixa, modò vnica, modò gemina dependente, quod illi ex omnibus Querc<sup>9</sup> generibus peculiare est. Allobroges Rhodano vicini seruatis, Græcæ vocis vestigiis, Chermillat appellant, quasi Quercû Hemeridem: Sabaudi Drylie, nomine, ἀπὸ τῆς δρυὸς deriuato. Gignitur in arenoso, lapidoso, steriliq; & tenui solo. Tertium Quercus genus Phagus erit Græci ἀπὸ τῆς φαγῆς φαγὸν appellât, Latini ab esca Esculum. De hac priusquam aliquid dicam, intelligant, velim, Lectores τὴν φαγὸν Theophrasti, nostram Fagû non esse, etsi id plurimi, atque etiâ Plinius dictionû similitudine deceptus crediderint:

Forma.

Locus.

Quercus

genus 3.

Phagus  
Theophr.  
diuersa à  
phago nostra.

P H A G V S

Esculus mas.



P H A G V S

Esculus femina.



Nostram verò Fagum Theophrasti Ochyan esse. Est enim Phagus Theoph. Hemeridis modo brevis, in orbem comosa, non erecta. At Fagus nostra procera est, rectaque attollitur, abiectione magnitudine non cedens. Præterea Theophrastus Phagum suam, glandem ferre perspicuè docet, cùm scribit in putamine glandium Phagi & Haliphœi, nonnunquam & in carne lapides gigni, quibus detractis cauitas relinquatur, quemadmodû in animalibus, quòd in vera glande licet intelligere, in nostræ Fagi fructu nequaquam, quæ non fert glandes, sed in echinis nucleos longiusculos, triangulos, acuminatos. Adde quod Macedones Phago suâ, glandem rotundam assignant, quæ nostræ Fagi fructui prorsus non conuenit, siue calycem hispidum consideres, siue fructus inuolucrum, siue nucleum triangularem. Ad hæc Theoph. Oxia nomine, ut dixi, Fagû nostram tam graphice depinxit, ut nullus sit, nisi planè vecors, qui id diffiteri

Lib. 3. Hist.  
cap. 10.

Nomina



possit. Quare Phagus Idæorum ac Macedonū ἀπὸ τοῦ φαγέειν, dicta, quod fructus eius sit dulcis, ideoq; palato gratus, ac edulis, ceu castanea, cum cæterarū quercuum fructus suis tantū sapiat. Brevis est arbor, in orbē comosa hemeridis modo, non erecta, minū tamē quā hemeris cōtorta, caudice crassissimo: folio quā Hemeris, angustiore, & breuiore, obscuriū virēte, inferne cādicante, glāde dulcissima, terete, longa, quā Etymodryos breuiore, è breui crassoque pediculo subrecta, calici, multū eius cōplectēti, tenacius hārēte, in ramorum furculis, ad exortum singulorum propemodum foliorum vnica, rarò gemina, graciliorē quā in latifolia, & magis acuminata, aculeo suo magis pungente. Reperitur & in hoc genere arbor, quæ glandem fert superiori omnino figura similem, sed crassiorē, altiorē, pleniorē, ob molis suæ pondus, è calyce facile deciduam. Lignatores huius speciei marē esse volūt, alterum fœminā. Hac glande, vel sub prunis cocta, vel in aqua elixa: cū vescuntur rustici, grauitate capitis tentantur, & veluti inebriantur, non aliter quā qui lolium pani commixtum ederint. Præterea phagus materia est robustissima, & putredini minimè obnoxia, id quod de quercu dixit Plinius. Fortius lignum, inquit, Quercus habet, & incorruptius, cum id de phago peculiariter scripserit Theoph. Si Virgilio credimus, inquit Plin. quantum corpore eminet, tantum radice descendit. Hanc Esculum Latini vocant, ab esu, Seruio auctore, vel ab esca, Hetrusci Ischia, voce ab Esculo deprauata, Romani etiā nunc rustici Esculo, Hispani arborem quidē Enzinam, glandes verò *Vellotas*, quas ob suauitatem sub cineribus tostas secundis mensis apponunt. Vt non vbique in Italia prouenit, sic nec in Gallia. Frequentem tamen in Apulia esse declarat Horatius his versibus,

Lib. 6. c. 6.

Lib. 3. Hist. cap. 9.

Lib. 16. c. 31.

Nomina

Locus.

*Quale portentum neque militaris**Daunia in latis alit Esculetis, &c.*

In eo Allobrogum tractu quem Rhodanus alluit, ad pagum Amblerieu nominatum, & lapicidinarum, quæ illic sunt, antra, gignitur Esculus, parua quercus ab incolis appellata, nimirum ex collatione cum Etymodry, siue Robore,

## C E R R U S.

Quercus

gen. 4.

Nomina

Forma.



Lib. 3. Hist.

cap. 10.

Lib. 6. ca. 6.

cuius illic copia est, & Quercus magna dicitur, cum cæteri Allobroges seruatis Latinæ appellationis vestigiis *Roure* nominent. Quantum genus *Ægilops* Idæorū, *Aspris* Macedonum, Latinorum *Cerrus*, Italarum *Cerro*, Gallis ignota arbor, cui eam ob causam nullum ab eis nomen positum est, ac ne Italiæ quidē magna ex parte nota, vt ait Plinius. In summam altitudinē crescit, in Græciæ ac Hetruriæ syluis, incultis amica, rectissima, leuissima, & materia per longitudinem robustissima, ad sustinenda suspendendaq; ædificia firmissima. Folio est crasso, amplis incisuris laciniato. Sterilis non est, vt quidam putauerunt, sed est glande tristi, horrida, rotunda, ac velut obtusa, amarissima, adeoq; insuauis, vt præter sues, nullum attingat animal, ac ne ea quidem, si aliud pabulum habeant. Ea caput mendentium dolore afficit, auctore Theophr. quod tamen de Haliphloei glande perperam scripsit Plin. Calyx glandis eam fere totam complexus, rigidis, latis, in cinereo candicantibus aculeis echinatus, valla



## GLANS CERRI



vallatúsque est, non, vt Plin, ait, ceu Castaneæ : sunt enim hi crassiores & rigidiores multò Glandes cerreas calycibus suis contextas ex Cypro, Chio, aliisque Cerrorū fertilibus locis, negotiatores interdum conuehunt, Gallones alij vocant, alij Vallonia. Vfus earum est ad inficiendos atro colore pannos, gallarum vice. Sed ex illis tinctura dilutior, fugacior, viliorq; est. Quintū genus est Haliphloeos

Ibidem.

Quercus

gen. s.

Nomina

Idæorum, & Macedonum, Cerrus scemina quorundam, Italorum Farnia, Gallis incognita. Latino nomine caret. quare Plinius Græcum semper vsurpauit, quem imitari debuerat Gaza potius, quam inepte Sallicorticis nomen finxisse, perinde quasi, ἐκ τῆς ἀλδός, καὶ τῆς φλοιῆς compositum sit nomen : quin potius ἐξ ἑλὸς καὶ τῆς φλοιῆς dicta est hæc quercus species, ob corticis crassitudinem, Plinio teste. Pessima, inquit, & carboni & materiæ Haliphloeos dicta, cui crassissimus cortex, atque caudex, & plerūq; cauus, fungosusque : quæ cum proculdubio ex Theophr. sint expressa, apertè ostendunt locum hunc in Theophr. exemplaribus mancum esse, atque sic corrigendum.

Ibidem.

Lib. 3. Hist. cap. 9.

ἢ ἡ ἐλὶ φλοιῶς παχύτατον μὲν ἔχει τὸν φλοιὸν καὶ τὸ στέλεχος, χαλκῶνον δὲ καὶ κοῖλον, cum in excusis legatur, ἢ ἡ ἐλὶ φλοιῶς παχύ μὲν ἔχει τὸ στέλεχος, χαλκῶνον δὲ καὶ κοῖλον. Quare multò magis mihi hæc probanda videtur etymologia, quàm illa quæ secutus Gaza Sallicorticæ dixit, quasi verò falsus sit Haliphloeæ cortex. Nascitur in Hetruriæ syluis, præsertim maritimis, inter Cerros, & Phellodryas, materia & ædificiis & carboni pessima, quoniā cū cauo fungosoq; sit caudice, breui putrescit. In causa est arboris horrida, subrectisq; foliis, eamq; ob causam imbrem excipientis natura, qui guttatim in laxum fungosumq; caudicem stillans, illū viuat, & putrefacit. Sunt qui & corde hanc solam carere volunt : quin & fulmine sapissimè icitur, quamvis altitudine non excellat : ideo ligno eius nec ad sacrificia vti apud Æolum quosdam fas habebatur : ad axes similiaque tantum vtile

Locus.

## HALIPHLOEOS

Cerrus scemina.



illud erat. Caudice assurgit procero, & recto, cortice sub cæruleo, ramosa quidē, sed ramis latius non porrectis, nec extentis, vt quercus, imò breuib; nec ita in multos furculos diuisis, vt tota arbor aspectu tonsæ ac putatæ similis sit. Folia habet Cerro similia, longiora, angustiora, & multò nigriora, per latera incisuris minus latis sinuosa, interuallo quod iacet inter margines laciniarum minus patente, infernè superneq; subaspera, tactu duriora, hyeme decidua. Glandes profert aliis glandiferis minores, excepta ilice, non longas ac teretes, sed orbiculatas, & aliquantum cōpressas, Cerri maris modo, ex calycibus suis parum exertas, qui spinis longis, flauis, gracilibus, densis hispidi sunt, castanearum instar, non tamen ita rigidis, erectisq; sed nec crassioribus spinarū mucronib; armati, vt in Cerro. Caliculi hi qui bus continentur glandes, bini plerūque ad singulos exortus, breuissimo pediculo ramis & furculis adherent. Radicibus nititur validis, non recta deorsum actis, sed vndique per trāuersum terrā in obliquū comprehendentibus.

Quercus

gen. s.

Forma.



- Cortex** ligno propior cū in ramis, tūm in caudice & radice vehemēter astringit: folia remissiūs. Glandium calyces facultate cortici respondent. Glandes vehementiūs astringunt, & amaræ sunt: quare etiam à porcis negliguntur, nisi aliud desit pabulum. Materia arbori robusta & dura. Nascitur in montibus, loco frequentius pingui, quàm macilento & arenoso, subtus tamen saxoso, locis liberis, & vento perflatis. Copiosissima in Apennino, in planis rara. Bauhino Quercus alia, quæ Haliphlēos Sequanorū dici possit, nascitur in sylua parua, qua itur Dola Vefontium, prope pagum sancti Viti, folio Hemeridi simili, virente, non admodum sinuoso, vel crebris incisuris diuiso, glandibus amplis, tribus, quatuorue ferè simul iunctis, quæ sine pediculo furculis hærent, calyce valde hispido, Haliphlēo siue farniæ simili. Quercus genera sic distribuit Dalechampius ex ipsarum arborum natura, inspectione, Theophrastiq; Historia (nam de marinis Quercubus Lusitanis fabulatur Porphyrius Græca fide, quarū glandibus saginentur thynni, inquit Scaliger) distinctiūs quàm cæteri, atque adeo quàm Plinius ipse, quem cū de his multa ab eodem Theophrasto mutuatum esse constet, tamen alia negligentiūs tractasse, alia confudisse, qui hunc cum illo diligenter conferet, facile iudicabit. Posset tamen his addi, vel ad aliquod superiorū generū referri, Quercus peregrina, siue Mauritanica. Est enim sub Mauritanix fluius qui sese exonerat in Atlanticum. In ea terra Quercus grandissimam ferunt glandem, oblongam, sapore longè dulciore, atque delicatiore quàm castanea. Robur, quæ Theophr. agriadrys dicitur, ea Plinio esse videtur, quam Gallicum nunc vulgus *Chefne* vocat, inquit Ruellius, non sine errore, si hæc *Chefne* quercus sit: nam à robore Plinius glandis magnitudine fcernit, quàm in Quercu grandissimam esse ait, in robore parua. Quanquam Plinius, vt diximus, parum diligenter glandiferarum arborum discrimina obseruauit. Multi Esculum, Græcorum esse Platyphyllon existimāt. In qua est opinione Bellonius. In Thraconitide, inquit, prouenit Esculus, qui à Græcis antiquis vocabatur Platyphyllus, nunc Velaguida. Fert glandem magnitudine oui columbini, qua possent victitare homines tempore famis: ad gustum enim castaneæ accedit. At Plinius Esculi & Platyphylli tanquam diuersarum arborum eodem loco meminit. Præterea Esculus, vt inquit Horatius, rigida, nec excelsa est arbor. Platyphyllus, dempta ægilope, rectissima est, & excelsissima, atque ædificiis inutilis. His accedit glādis discrimen, quam in Esculo dulcissimā esse etymologia indicat, cum ab esu, vt diximus, nominetur. Platyphylli glandem non nisi tertium bonitatis locum tenere ex Theoph. diximus. Qui Ægilopa, id est, Cerrū, Gallorū extracta priore litera, aut in aspirationem conuersa, herrum aut hedrum esse putant, vehemēter errant. Anguillara glandiferarum arborum species omnes quas recēset Theoph. Italiæ notas esse ostendens, Haliphloeon Itolorum *Rouere* esse scribit. Quod cum consentiente nominis affinitate omnes Latinorum Robur esse affirmēt, falli Anguillaram certum est. Robur enim Plinius ab Haliphlēo perspicuè distinguit. Robori, inquit, glans parua, qua fungosa fit caro. Haliphlēo rarò, & cum tulit, amara, quā præter sues nullum attingit animal, ac ne ea quidem, si aliud pabulum habeant. Pessima & carboni, & materiæ Haliphlēos, cui crassissim⁹ cortex atque caudex, & plerūque cauus fungosusque. Nec alia putrescit ex hoc genere, etiam cum viuit. Robur firma duraque materia est. Quercū Plutarchus inter arbores syluestres, fructu pulcherrimam, atque fertilissimam esse ait: eo enim & feræ & alites pascūtur. Et M. Cato inter ea quæ ad bonum agrum spectant, syluam glandariā annumerat. Sed præter glandem plurima alia gignunt Quercus, auctore Theophrasto. Gallam duplicem, alteram candidam & exigua, alterā nigram: interdum

ita

**Locus.**In lib. 2.  
Caus. Pl.  
Theoph.  
cap. 8.Scaliger  
Exercit.  
181. 26.Lib. 1. cap.  
86.

Lib. 16. c. 6.

Lib. 2. Obs.  
cap. 90.

Lib. 16. c. 6.

Lib. 16. c. 6.  
*Quercus*  
*quæ ferāt*  
*præter glā*  
*dis.*Lib. 3. Hist.  
cap. 6. & 8.1. *Galla*  
*candida.*2. *Galla*  
*nigra.*



QVÆ IN SYLVIS REPER. LIB. I.  
EXCREMENTA QUERCIVVM.

9



ita crescentem, ut mali compleat magnitudinem, *πιτῳδης*, id est succo resinoso pinguem, quamquam alij *πιτῳετῳδης* legant, id est atro colore picem æmulantem. Verum prior lectio, quam Gaza etiam secutus est, magis arridet, ut galla hæc Theophrasto & *πιτῳδης*, & *μέλανα* sit. Nam pilulæ lana farctæ modo (de qua mox dicitur) hanc in lucernis bene flagrare scribit, quod non nisi pinguis, resinosaque substantiæ beneficio efficeret. Ferunt & quædam veluti mora, sed dura, & fractu contumacia, idq; raro: quiddam etiam initio pudendi virilis effigie cum perficitur durum, Tauri caput imitans, cui fructus inest, nucleo oliuæ similis. Hæc duo postrema haud distincta in vulgaribus Plinij codicibus mendose leguntur. Quare sic emendato. Namque fert & gallæ utrumque genus, & quædam veluti mora, ni distarent arida duritie, & quædam plerumque Tauri caput imitantia, &c. Nascuntur & in Quercubus pilulæ duro putamine contextæ, intus habentes floccos molles, lucernarum luminibus aptos. Etenim probe flagrant, sicuti galla nigra: & sine oleo addit Plinius, id quod Theophrastus non habet. Absurdum sanè videtur, quicquam sine oleo, aut pingui aliquo in lucernis ardere. Item pilulæ quædam cum capillo, inutiles, verno tamen tempore mellei succi. Aliæ præterea interius ad alarum pronos recessus, sine pediculo, intus caux, versicolore, eminentibus umbilicis candicantibus, aliquando maculosi, interdum nigri: media cocci colore splendent: apertis nigra & putris inanitas est. Qua oratione nos locum Theophrasti ex quo hæc expressimus, & correxisse, & illustrasse arbitramur. Habet enim nostra exemplaria, *φύει δ' ἐντε εἰῶνος τῶν ῥοπῶν μασχάλιδας ἕτερον σφαίριον ἄμισχον, καὶ κοιλόμισχον, &c.* Nos verò legimus, *φύει δ' ἐδδοθεν τῆς ῥοπῆς μασχάλων, ἕτερον σφαίριον ἄμισχον, καὶ κοιλόμισχον.* Gaza verò: *φύει δ' ἐν κλάδων μασχάλοις, &c.* Sic enim conuertit. Inque ramorum alis pilulā aliam gignit, sine pediculo, καὶ κοιλόμισχον concauōque sessilem, non sine repugnantia, quoniam si pilulæ istæ pediculo carent, & ut ait Plinius corpore non pediculo, adherent, qui concauo pediculo sessiles esse possunt? Deinde: *Τὸς μὲν δ' ἐπα- νετηκώτας ὀμφαλὸς, ἐπιδιδύκας, ἢ ἐπετηγμένους ἔχει μέλανας.* Gaza interpretatur. Nam

3. Moria.

4. Veretrum.

5. Pilula lanata.

6. Pilula capillata.

7. Pillula sessiles.

Li. 16. c. 7.

eminent



- eminentes quosdam umbilicos candicantes, vel passim variantes nigris maculis habent. Nos particulam disjunctiuam addidimus, ἢ ἐπεσγμένως ἔχει, ἢ μελάνας. Quam coloris umbilicorum varietatem ne Plinius quidem ipse satis expressisse videtur. Candicantes umbilicos, ait, cætera nigra varietate dispersa. Nec illud postremum: ἀνοργόμυρον δὲ ἐστὶ μέλαν, καὶ ἐπὶ ὄστρον. Apertis amara inanitas est, pro, apertis nigra & putris inanitas est, vt conuertimus. Gignunt & Quercus, quanquam rarò, pumiceos lapillos, non autem puniceos, vt in excusis Latinis Theophrasti codicibus legitur: his rariùs è foliis conuolutas pilulas compactas, atque oblongas. Ad hæc in foliorum tergo, non, vt Plinius scribit, in folio rubente, pilulas, non, vt idem ait, nucleos, candicantes, translucidas, aquosas, quamdiu molles sunt, in quibus & culices nascuntur. Maturescentes in modum paruæ & læuis gallæ durefcunt. Ferunt Quercus & Cachryn. Est autem Cachrys globosus foliorum conceptus, inter præcedentem exortum siue articulum, & nouellam germinationem medius. Sunt enim hæc verba Theoph. ἐστὶ δὲ ὡς περ κύνισις φυλλικῇ μεταξὺ κύωνος τῆς ἐξ ὀχρῆς ἐπιφύσεως, ὡς περ τῆς φυλλικῆς βλαστῆσεως ἐξ ὠδικίας: ad verbum: Est autem veluti foliorum conceptus, sese proferens, in medio adnascens eminentisq; tuberculi, foliorum germine tanquam parturiente. Gaza tamen legit ἐπιθῆσις, & sic interpretatur. Fit veluti foliorum conceptus inter antecedentem obstrusionē, & sequentem exortū medius, vt sit, ἢ ἐξ ἀρχῆς ἐπιδύσις, antecedens obstrusio, vt loquitur, siue prior articulus colligans. ἢ ἐξ ἀρχῆς ἐπιδύσις, præcedens exortus, siue articulus. Significat & Cachrys libanotidis frugifera semē acre, quod in mandendo linguam exurit, de quo vide Dioscor. Qua homonymia Lib. 3. c. 72. Lib. 16. c. 8. deceptus Plinius Cachryn Quercuum, & Cachryn libanotidis, res valde diuersas, pro eadem re vsurpat. Ferunt, inquit, robora & Cachryn: ita vocatur pilula, in medicina vrendi vim habens. Verū tamen apud plerisque non Cachrys, sed Candichrys pro libanotidis semine scriptum reperitur. Quod verò eodem Plinij loco continenter legitur, valdè deprauatum est, & mancum, quo Cachryj tribuuntur, quæ de iulo auellanæ nucis Theophrastus, à quo hæc mutuatus est Plinius, apertè scripsit. Ex quo sic locus restitui potest. Gignitur Cachrys & in Abiete, Larice, Picea, Tilia, Nuce, Platano, postquam folia cecidē, hyeme durans. Nuci auellanæ postquam fructus decidit, iulus emergit, nuci pinæ nouellæ similis: is crescit hyeme, aperitur vere callus totus. Cadit cum folia cœperint crescere. E glâdiferis sola quæ vocatur Ægilops, inquit Plin. fert panos arentes, muscoso villos canos, non in cortice modò, verū & è ramis dependētes (è cortice, non è furculo ait Theophr.) cubitali magnitudine, odoratos, vt diximus inter vnguenta. Quæ cū ex Theophr. sumpta sint, nos admonent, vt hunc ipsius locum maculis aliquot aspersum purgemus. ὃ δὲ καλεῖσιν τινες φάσκον, ὁμοίως τοῖς βράγχιαις, ἢ ἀγίλοψ μόνῃ φέρει πάλιον, καὶ βράγχιον & c. Gaza sic. Quod autem quidā penē appellant brachiis simile Cerrus sola producit, canū, mucosumq; At non φάσκον, sed σφάγγον lego, auctore Plin. Sphagnos infra eos situs in Cyrenaica prouincia maximè probatur. Alij Bryō vocāt. Secundū locū obtinet Cyprius, tertiu Phœnicus. Fertur & in Ægypto nasci: quin & in Gallia, nec dubitauerim. Sunt enim hoc nomine cani arborum villi, quales in Quercu maximè videmus, sed odore præstātes, & c. Et alibi Sphagnos, siue Spacos, siue Bryon, & in Gallia, vt indicauimus, nascitur, & c. Sūt qui Splachnō, & Hypnon appellāt, Arabes, *Usneam*, quanquā Phauorimus φάσκον, ὃ ἐπὶ τῶν δρυῶν γινόμενον, exponit. Pro βράγχιαις repono βρύοις, id est musco ex Plinio, pro πάλιον & βράγχιον, πάλιον ἐν βρύοις, id est, canū, & muscosum, siue βρυώδες, id est, lacero pāno simile. Mox enim muscū hunc villosū longo lintei frusto cōparat. Tam multifera sunt & tot res præter glandem pariunt Quercus: sed & boletos, qui è radicibus, & circa radices gignuntur. Ferunt & viscum, & mella, apēsque, vt auctor est Hesiodus: constat



Constâtque rores melleos, è cælo cadentes, non aliis magis insidere frondibus. Quin & ex cremata quercu nitrum fieri aiunt, vt Theophrastus scribit, Lib. 16. c. 8. quod Plinius aliter, eúmque secutus Gaza, exposuerunt. Cremati quoque roboris, inquit, cinerem nitrosum esse certum est. Nascitur etiam in Quercuum caudicibus Polypodium, item Agaricum. Sed horum quædam Quercuum propria sunt, quædam illis cum aliis communia. Ac de galla quidem, visco, fungis, melle, bryo, agarico, polypodio quercinis, idoneis locis dicitur. Per insitionem Quercus bona pira ferre visa est, ait Ruellius. Nascitur quoque in Lib. 1. c. 22. Ciliciæ Quercubus coccum cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, inquit Dioscorides. Quem locum corruptum esse Lib. 4. c. 43 putat Marcellus, & pro τῶς τρυφῆς, id est, ore, aliter legi potuisse, pertinereque ad tempus quo coccus legendus sit. (Sic Marcellus.) Quidam legunt τῶς τρυφῆς, quod illius regionis mulieres distortum Cuel, distortquentes legunt. De Dryino qui in Quercuum radicibus viuit, vnde illi nomen, tam malefica bestiola, vt eius qui supergreditur imprudens, cutis à pedibus excorietur, tota crura admodum intumescant, vide Nicandrum in Theriacis, Dioscoridem & Galenum. Li. 6. c. 49. Vermes etiam qui Rauca vocantur, in radice Quercus viuunt. In esculo vermiculi nascentes, priuatim Galbæ nominantur. Quercus diutissimè viuit, & longa, crassâque est radice, etiam si scribat Theophrastus, τῶν μακρορρίζων καὶ παχυρρίζων nullam longioris esse vitæ. Plus æquo, & odiose sanè, inquit Scalig. Li. de The. ad Pifo. Pl. lib. 17. cap. 18. Rue. lib. 1. cap. 76. Li. 2. Cauf. cap. 16. InComm. ca. eiusdè. Lib. 16. ca. 44. Cæteri enim auctores in iis numerant arboribus, quarum immensa penè vita est. Iuxta urbem Ilium Quercus in Ili tumulo tunc satæ dicuntur, cùm cœpit Ilium vocari. In Ponto circa Heracleam aræ sunt Iouis Stragij cognomine, ibiq; Quercus duæ ab Hercule satæ, ait Plinius: Vetusta penes Cephesum prospiciebatur Quercus, quam Alexandri Quercum vocarunt, quod ibi castra posuisse credebatur Plutarchus: Nonne & vetustissimæ Quercus Dodonæ, à quibus oracula petebat stulta, & superstitiosa antiquitas? Nec solùm æternæ propè vitæ sunt Quercus, sed & ex earum (quæ pauca sunt) lectissima in natura classe, quæ vtrumque beneficium sunt consecutæ, & sibi viuendi, & posteritati, vt & vitam suam robore, & speciem propagent generatione. Quare tanto admirabilior est natura, quod in senectâ sunt fecundiores. Sunt Quercus miræ magnitudinis, & amplitudinis in Septentrionali plaga Hercyniæ syluæ, roborum vastitas intacta æuis & congenita mundo, propè immortali forte miracula excedit, inquit, Plinius. Sunt in Petrocoriis nemora Quercuum proceritate visenda: non enim Lib. 6. ca. 1. superantur icu Scorpionis. Est in sylua *Tromfac* nuncupata, prope Bituriges incredibili ferè proceritate, ac crassitudine Quercus, quam admiratus inuidissimus, & doctissimus Gallorum Rex Franciscus, aggere pedamentis munito cingi voluit, vt post venationes sub ea oblectaretur. De Quercu quæ est Basileæ in D. Petri nemore, cuius truncum trini viri diductis manibus vix amplectuntur, vide Cardanum. Fuit Quercubus maximus apud antiquos honor. Hinc ciuicæ coronæ, militum virtutis insigne clarissimum, cùm antiquitus nulla nisi Deo daretur. Hæ Ioui sacræ erant. Ex his deorum simulachra fiebant. His sacrificabât. Ab his oracula petebant. In Armoricis, siue in minore Britannia erant porticum vice ante nobilium ædes, in ordinem dispositæ Quercus, quæ annosæ, non solùm præclari generis vetustatem, sed & sanctitatem significabant. Quod si quis turpe aliquod facinus perpetrasset, non solùm supplicio afficiebatur, sed etiam, quæ summa infamia erat, domesticæ Quercus amputabantur. Plura alia de Quercu adscribi possent, quibus pleni sunt veterum auctorum libri. Sed ad huius operis institutum nihil pertinent. Passim in syluis, aliisque locis nascitur Quercus, arenosis, macilentis, ac siccis gaudet. Hemeris in sterili tenuique solo.

*Locus.*  
Fuch. c. 84.  
Dodo. lib. 6. cap. 68.



Libro de  
morb. mul.  
Lib. de aff.  
Cor. Emb.  
118. libr. 1.  
Dioscori.  
Corn. ibi.

In cap. 121.  
li. I. Dioſc.

Lib.3.c.70.



bet efficaciter, neque non Gonorrhœam. Datur & sanguinem excreantibus, & iis qui à venenatis animantibus, aut serpentibus morfi vel icti fuerint. Qui venenum hauserint, vel cantharidas, ita ut sanguinem meiant, quod ipsi aliquando vidimus, glandes in pulverem redactas bibant, ac sentient opem. Quidam glandes aridas aduersus calculum exhibent. Folia Quercus tenera & rubicunda in vino decocta, collutu & gargarissatu, dentium dolorem sedant, qui à frigidis fluxionibus ortus fuit, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum erit.

D O D O N. Cortex Quercus in pulverem tritus utilis est puerulis aduersus vermes. Calyculi glandium cum cortice Quercus utiliter miscentur vnguētis, oleis, emplastris, quæ ad sanguinis, aliorumque humorum fluxum inhibendum valent. Democritus apud Apfyrum serpentes emori iniecta fronde Querna dicebat. Radix minutatim contrita, contra Hydri morsum prodest: eiusdem decoctum cum vaccino lacte potum, contra toxica valet, ac serpentium plagis illinitur. Carbunculum (quo morbo olim vno anno duo viri Consulares obierunt, ut scribit Plinius, Iulius Rufus, & Qu. Lecanius, Bassus) Querneus tritus carbo cum melle sanat, adeo in rebus quoque damnis (ut pulchrè ait Plinius) ac iam nullis, ut in hoc carbone, aliqua sunt remedia. Galenus ad ventriculi dolorem, carbonem Quercus in lacte extinguit, & ægroto dat potui. Mures rusticos, si Querneis cinere aditus eorum obtures, tactu frequenti scabies occupat, & perimit. Quercus & Olea tam pertinaci odio dissident, ut altera in alterius scrobe depacta moriatur. Quercus verò & iuxta nucem iuglandem. Glandibus quondam homines victitasse, frumenti usu nondum reperto, plurimis tum Poëtarum, tum Historicorum testimoniis satis constat, quæ hinc adscribere superuacaneum foret. Eum cibum Pelasgius primus Arcadas docuit, quo ita sunt delectati, etiam cum iam cerealibus fructibus reliqui Græci vescerentur, ut à Pythiæ oraculo, Lacedæmonios ne eos bello lacefferent monente, Βαλανοφάγοι auctore Plutarcho, sint appellati. Hinc Quercus Ioui sacra erat (quanquam Poëta aliam eius rei causam reddiderint) & Iouis arbor dicebatur, quod glandibus mortales primum Iupiter aluerit, inopemque eorum vitam his sustentarit. Vnde adagium, πολλῶν πανηγύρεων Διὸς βαλάνους ἐφαγεν, id est, multorum festorum Iouis, glandes comedit, de sene, & longo plurimarum rerum usu perito. Et illud, ἔλκισ δρυὸς, satis Quercus, de iis qui deterioribus relictis meliora persequuntur, quemadmodum illi qui glandes post inuentas fruges neglexerunt, cum satis diu cibum se petiisse à Quercubus dicerent. Vsurpatum à Cicerone. Dignitatis ἔλκισ, tanquam δρυὸς. Dignitati satis, consului, nunc saluti consule. Idem significabat mos ille qui Athenis erat, ut in nuptiis puer quispiam vndique spinæ frondibus, & Quernis glandibus opertus coronatusque cunas panibus plenas gestaret, & ingrediens hæc profert, ἐφρυγὶ καὶ δρυὶ, ἄρον ἀμύνον. id est, euasi mala, meliora sum nactus, quæ sponso sponseque bene ominabantur, tanquam meliore fortuna vsuris: mala enim erant spinæ steriles, & glandes quibus victitabant antiqui, panes verò bona. Sed nec post inuentas segetes, glandibus uti omnes desierunt. Nam M. Varro referente A. Gellio in Satyra περὶ ἐδωσμάτων, inter exquisitos multarum gentium fructus glandem Ibericam posuit. Plinius scribit glandes opes fuisse sua quoque tempestate multarum gentium etiam pace gaudentium. Nunc & in inopia frugum, ait, glans arefacta molitur in farinam, spissaturque in panis usum: quin & hodie per Hispanias secundis mensis glans inseritur. Dulcior eadem in cinere tosta. Lusitani, ut scribit Strabo, qui in montibus habitant, duabus anni partibus Querna victitant glande, quam

Li. 6. c. 68.

Li. 26. c. 1.

Li. 36. c. 27.  
Lib. de Pat.  
rat. facil.Rue. lib. 2.  
cap. 45.  
Plin. li. 24.  
cap. 1.Paula. in  
Arcad.  
Gal. lib. 2.  
Alim.  
Plutarch.Lib. 2. ad  
Att.M. Varro.  
Lib. 16. c. 5.



Clemens. Li. 2. Alim. cū deficcauerint molunt, & in panis vsum recondunt. Allobij ex Sarmatis populi, auctore in Stromatis Clemente, glandibus, & arborum baccis vescuntur. In frugum penuria, glandibus Pergamenos suos vfos fuisse, testatur Galenus, variè ipsas ad esum comparantes. Interdum enim in aqua elixabant, & post calidis cineribus contegentes mediocriter assabant: nonnunquam comminuentes, pularium ex ipsis conficiebant; aliàs aqua sola conspergentes, sed condimentum aliquod immittentes, aliàs mel effundentes aut lacti incoquentes. Ex autem copiosum corpori suppeditant nutrimentum, & æquè nutriunt ac frumentaceorum eduliorum pleràque, sed tardè permeant, crassique sunt succi, ex quibus efficitur, vt concoctu sint difficiles. Idem omnino Ætius commemorat. Symeon Sethi, Glandes difficilis esse coctionis, tradit, valdè nutrire, tardè descendere, crudosque humores generare. Propterea illarum vsum vitari medici præcipiunt. Galenus inter cætera quæ in capitis dolore non solum ventriculi consensu orto, sed in omnibus capitis affectibus vitanda esse præcipit, etiam à Quercinis glandibus abstinere iubet. Idem etiam Pythagoras præcipiebat, auctore Æliano. Nunc verò Glans animalium tantum est esca, præsertim Suum. Hoc enim pecus diffusum & grauissimum facit, vt Varro scribit. Nam ea multæ in Gallia, & alibi gentes, magnos ac innumeros porcorum greges per sylvas glandarias saginant. Idem Caro post sementem legi præcipit, & in aquam cõici, vt inde Semodius, patrata sementi, verno modius bobus singulis detur. Glandes hyeme bobus Columella exhibet in pabulum, Quercus folia Ætare, & Autumno. Denique multas alias & magnas vtilitates Quercus affert. Vsum corticum coriarij, aliisque opifices norunt, quanquam hodie Græci, & qui in Asia sunt, vt scribit Bellon. coria adornant calycibus glandium Esculi, vt in Gallia corticibus Quercus. Ligni verò vsum & vtilitatem, ait Tragus, nemo facilè explicabit. Siquidem inter alia omnia, lignum nullum perennius, nullum etiam ad plura, hoc est ædificia, vtenilia, & instrumenta, tam ea quæ in terra, quàm quæ in aquis vsui esse possunt, adhibetur Querno. Hæc Tragus, quæ non de cuiusvis Quercus materia intelligenda sunt, vt ex Theophrasto supra declarauimus, & Plinio, qui Robur ex iis esse tradit quæ tardissimè cariem vetustatè que sentiunt: vere casum teredinem sentire: siccissimam loton esse, deinde Robur exalburnatum, cuius nigricat color: Robori tantam duritiam esse, vt terebrari nisi madefactum non possit, & ne sic quidem adactus auelli clauus: quædam in aliis diuturniora vsibus esse quàm alia: Vlmum in perflatu firmam, Robur defossum, & in aquis Quercum obrutam: Robur marina aqua corrumpi, Esculum humoris impatientem: Robur & Oleam incuruari, cederè que ponderi: arida latius quàm viridia ferris cedere, præter Robur, & Buxum, quæ pertinacius resistunt, ferrarumque dentes replent æqualitate inertis: qua de causa altera inclinatione egerunt scobem. Ex maturis glandibus, delibratis, modicè deficcatis, tuisq; oleum exprimitur lucernis aptum.

\* \*

GALLA



## GALLA. CAP. II.

**Q**UANTUM quæ glandem ferunt, omnes & gallam Plinio auctore, tamen cum hæc Quercubus magis sit peculiaris, adeo ut Dioscor. Gallam Quercus fructum appeller, Quercuum historia explicata, de Galla ordine dicendum videtur. *κνίς* ea Græcè dicitur, Latine & Italicè *Galla*, Arabicè *Hafs*, aut *Hafus*, Germanicè *Galloepffel*, & *Eychoeppfel*, Hispanicè *Abogalla*, Gallicè *Noix de Galle*. Vna est Omphacitis nominata, parua quidem, articulorum manus modo rugosa (sic enim *κονδυλώδης* Matthiolus interpretatur, vt hac voce Gallæ Omphacitidis figura desig-

Lib. 16. c. 6

Li. 1. c. 123.

Nomina

Genera.

## GALLA.



netur, magnitudine prius expressa) solida, nullo foramine peruia: altera plana, levis, perforata. Eadem planè genera fecerunt Galenus, Paul. Ætius, nempe Gallam Omphacitidem, & alteram flauam, magnam, laxam, quæ superioribus cum de fructu *πολυκάρπια* ex Theophrast. differeremus, minimè repugnant. Nam Galla alba, parua, solida, eadem, ut & magna, perforata, nigra. Plinius. Pauciora Gallæ genera nos non facimus, cum esse dicimus solidam, perforatam, item albam, nigram: maiorem, minorem, quæ cum ita esse grauissimorum auctorum testimoniis satis sit probatum, Quercus rem hanc quotannis ostentant. Nam in Italia, præter glandes, duo Gallarum genera ferunt, inquit Matthiolus minores, quæ rugosa sunt cute, fullonibus & coriariis expetita, & quæ Græcis Omphacitides dicuntur: maiores, quæ leuiiores sunt: tamen Cornarius Gallam Omphacitidem Dioscoridis & Galeni nihil aliud esse contendit, quàm calycem illi cui glandes inhaerent, qui vulgo cuppula glandium nominatur, vnico ad id credendum Pauli Ægin.

Lib. 7. sim.

lib. 7. lib. 1.

Theophr.

Forma.

Li. 24. c. 4.

Li. 1. Diosc.

cap. 123.

Li. 1. 6. c. 6p.

p. &amp; Emb.

120. lib. 1.

Dioscori.

Lib. 3. c. 42.

loco inductus, qui est huiusmodi: *ὀμφακίς κεκομμένης. ἢ ὅτι καὶ κοίλον ἐξ ἑκπέφυκεν ἢ τῆς ἀπὸς βάλανος, ὡπερ οἱ βυρσῆς χροῖν*. Id est, Omphacidis vstæ. Est autem cauum illud, ex quo glans Quercina enascitur, quo coriarij vtuntur: quo loco non *ὀμφακίς*, sed *ὀμφακίς* putat legendum, à qua opinione se nunquam decessurum ait, nisi quis corruptum hunc Pauli locum docuerit, aut *ὀμφακίς* substantiue, à Paulo pro calyce glandis dici ostendat. At Cornarium reprehendit Matthi. & iure quidem. Nam si Paul. inquit, non putasset *ὀμφακίς* vocabulum, quod rarum esset, permultis fore obscurum, quemadmodum & Cornario fuisse videtur, ei certè opus non fuisset descriptione illud explicare. Quod præterea Paulus pro Omphacitide Galla glandium calycem non acceperit, hinc intelligere licet, quod alio in loco de Gallis, non de glandibus differens, duo Gallarum genera constituit, alteram Omphacitidem appellans, alteram, flauam, magnam, viribus inferiorem, Diosc. & Galen. auctores secutus, qui non aliter diuisere, nec vsquam Omphacitidem Gallam pro glandis calyce vsurpauere, utpote qui glandes & earum calyces à Gallis planè diuersas esse scirent. Præterea Dioscor. Galen. Paul. nusquam nomine *ὀμφακίς* pro Galla vsi sunt, nisi ut adiectiuo iuncto cum substantiuo suo *κνίς*. Quare in Paulo legendum arbitror *ὀμφακίς*, non *ὀμφακίτι*.

Ibidem.

Lib. 17.

Genera.



- Cornar. & Andernac. *σλος*, ut contendit Cornarius, glandiumq; calycem *ὀμφακίδα* à Græcis appellari, et si Cornarius, atque Andernacus, qui *ὀμφακίδα* vnam acerbam interpretatur, Græcæ linguæ peritissimi non ita senserint. Verùm Omphacitis immatura intelligi non potest, inquit Cornarius, quum vtrique suo tempore immatura sit. At cùm Diosc. & Galen. Omphacitim Gallam dicunt, hac voce immaturam non intelligunt, et si multi apud eosdem ita sint interpretati, sed quod *σφυρὸν ἰκανὸς ἐστὶ φάρμακον*, inquit
- Lib. 7. f. Galen. id est, quod admodum acerbum sit medicamentum, cùm altera Galla minùs acerbæ qualitatē sit particeps, quam à rusticis suis *δινονκίδα* appellari scripsit Galen. id est vinogallam, quod cùm vehementiore adstrictione sit opus, vino incoquenda sit austeriusculo. Sunt tamen qui *δινονκίδα* magnam illam Gallam à Galen. appellatam velint, id est asininam Gallam. Quidam vinosam dictam putāt, quoniam minus adstringens ad austeri vini lenitatem propius accedit. Galla Omphacitis Gale. sententia, ordine tertio desiccatur, secundo refrigeratur. Altera desiccatur quidem, sed tanto minùs, quanto minùs acerbæ qualitatē est particeps. Galla
- Ibidem. Avicennæ est frigida in primo gradu, sicca in secundo, Dodonæo frigida & sicca, ad tertium vsque gradum, & valde adstringens.
- Li. 2. c. 375. Lib. 6. c. 68. DIOSCORIDES. Galla Omphacitis eligi debet, quæ efficacior est. Vtriusque vis, vehementer adstringere. Trita excrecentia in carne, fluxiones gingivarum & vuarum, atque oris exulcerationem prohibent. Nucleus dentium cauernis inditus dolorem sedat. Cremata carbonibus, donec igne flagrent, & vino, aut aceto, aut acida muria extincta sanguinem supprimunt. Decoctum in sese efficax est, contra vulvarum prolapsus, & fluxiones. Capillos denigrant aceto, aut aqua macerata: dysentericis, coeliacisq; cum vino, aut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bibuntur: obsoniis addi debent, aut integræ in aqua præcoqui, in qua nonnihil excoquendum est, quod his affectibus conferat. In summa his vtendum ad adstringenda, aut sistenda, aut siccanda quæ opus sunt. Hanc Ruellius versionem vno loco castigat And. Lacuna. Nucleus dentium cauernis inditus, dolorem sedat. Græcè legitur, inquit, *τὸ μέσον αὐτῶν*. hoc est, quod in medio ipsarum consistit. Quo loco Dioscorides Gallarum corculum, centrum, ac meditullium significat, non nucleum quo Gallæ omnes sunt destitutæ, quum per omnia vnam eandemque continuam substantiam sortiantur. Sed Ruellius, Plinium auctorem habet, qui de Gallis scribens, Nucleus, inquit, commanducatus dētium dolorem sedat. Et quid mirum nucleum Gallarum à Plinio dici, qui nucleum ferri pro chalybe dixerit.
- Lib. 24. c. 4. Li. 34. c. 14. Galla Omphacitis Galeno desiccatur, & repellit fluxiones: ad hæc constringit, contrahitque partes laxas, ac languidas, omnibusque fluxionum affectibus strenuè resistit. Altera autem Galla desiccatur minùs. Cocta itaque per se, ac deinde trita, cataplasma est non instrenuum sedis phlegmonarum, ac proidentiarum. Porro coquenda est, si modica opus sit adstrictione, in aqua; si vehementiore, in vino, ac si augere insuper adstrictionem sit opus, vino vtendum austeriusculo. Denique Gallæ combustæ sanguinem reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem & acrimoniam ex vstione assumunt, suntque iis quæ ignem expertæ non fuerint, tum subtiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate. Cæterum cùm ad sanguinis suppressionem præparare eas voles, carbonibus impositas, dum vndeque que candeant, aceto, aut vino extinguere oportebit.
- In lib. 1. Dioscori. cap. 123. Fit ex Omphacitide Galla, inquit Matthiolus, chalcantho, gummi, & vino atramentum scriptorium optimū hoc modo. Sumito Gallarum crassiusculæ conularum vncias quinque, chalcanthi Romani vncias tres, gummi Arabici vncias duas,



duas, salis drachmam vnam: coniiciantur hæc omnia in fictile vitro circumli-  
tum: superfundito vini albi, potentis, feruentisque libras quinque, & vncias  
quatuor: occluso vasis ore, quindecim dies insolato, vel post vaporarij fornacem  
hyeme reponito, miscetorque quotidie rudicula. Illud peculiare sibi maiores Gal-  
læ vindicauere, vt quotannis aut annonæ fertilitatem, aut sterilitatem, aut pe-  
stilentem auram prænuntient. Nam si rumpantur integræ, quæ perforatæ non  
sunt, aut musca, aut araneus, aut vermiculus exit. Si musca euolat, futuri belli,  
si repat vermiculus, annonæ penuriæ, si currit araneus, pestilentium morborum  
prælagium est. Neque cuiquam mirum videatur, quod ex omnibus Gallis ista  
exoriantur animalcula. Etenim ego, inquit Matthiolus, huius rei sæpius pericu-  
lum feci, nullamque vnquam sum consecutus, prius non perforatam, quæ ex tri-  
bus animalibus vnum intra se non contineret: foramine aperto, facile iudicari  
potest iam animal exiisse. Dicamus igitur licet, Quercum, & fructum, & animal  
gignere, cuius rei haud ignari veteres illi, non sine causa dixerunt Quercum  
Ioui summo esse dicatam. Gallam si in Quercu permanferit, putrescere Albertus  
magnus ait, atque in ea vermem procreari, qui si in Gallæ medio situs sit, futu-  
ram hyemem asperiores prænuntiat, mitem verò si circa margines.

VISCVM.

CAP. III.



ISCVM multis adnascitur arboribus, tamen quia optimum, sed  
rarum in Quercubus prouenit, iis illud subiungere absurdum non  
fuerit. *ὁ Ἰξος*, Viscum dicitur Aristoteli, vnde fluxit Latinis Viscum,  
*Ἰξία* Theophrast. quod nomen ait esse commune, *Hyphear* verò Ar-  
cadibus, *Stelis* Euboicis, Arabibus *Debach*, & *Dabach*, & *Hele*, Gallis *Guy*, Italis  
*Vischio*, Hispanis *Liga mordago*, Germanis *Mistel*, & *Eichenmistel*, & *Vogeltem*.

*Nomina*  
Li. 1. de Ge-  
nerat. ca. 1.  
Lib. 3. Hist.  
ca. 9. & 16.  
& lib. 2.  
caus.

VISCVM.



Ixiam vocant, &c. Ad hæc Ixias à Dioscor. in venenatis radicibus recensetur,  
quam Ixiam cum Plinius ab Ixo, id est, Visco nominatam videret, inquit Cor-  
narius, vbique pro Ixia venenata radice Viscum reddidit, quod tamen cum ho-  
monymos de Visco arboreo, & de glutino ad aucupia dicatur, vitio non caret,  
id quod etiam Leoniceus obseruauit. Visci tria genera, Plinio: In Abiete ac  
Larice Stelin dicit Eubœa nasci, Hyphear Arcadia, Viscum autem in Quercu,  
Robore, &c. Theophrasto Ilex fert à Septentrione Viscum, à Meridie Hyphear,  
sed vna omnium natura, diuersæ habitudines, quia oriuntur in diuersis. Multò  
igitur plura constituenda essent genera, quia in multis aliis arboribus Viscum

Ion Poëta sudorem Quercus  
vocauit. Ex huius fructu  
quod fit glutinum, Latine  
idem cum planta nomen ha-  
bet, quemadmodum Græcè  
vtrumque *Ἰξος* nominatur.  
Præterea ne homonymia nos  
in errorem inducat, scire li-  
cet: Chamæleonem album  
Ixiam aliquibus dici, quod  
nihil delendum. *Ἰξος*, id est,  
Viscum circa radices eius in-  
ueniatur, vt ait Dioscorides,  
Plinio verò, Chamæleonis  
duo genera. Candidior, quem

Lib. 3. ca. 8.  
Li. 22. c. 18.  
Li. 6. ca. 21.

*Genera*

*Ixia.*

Emb. 9. li.  
3. Diosc.

*Genera.*

Li. 16. c. 44  
Theophr.  
Lib. 2. caus.  
cap. 23.  
Lib. 3. Hist.  
Cap. 16.



nascitur. Adiiiciunt quidam & hoc discrimen, in iis quæ amittunt folia Viscum decidere, contrà inhærere semper, natum in æterna fronde: ab his enim alimentum perpetuò suppeditari, in illis Viscum quoque sentireimenti dispendium.

In Comm.  
cap. 23. lib.  
2. caus.

Ibidem.

Forma.  
Cap. 123.

Li. 16. c. 44.

Li. 1. c. 140.  
cap. 123.

Locus.

Plin. li. 16.  
cap. 44.  
Theophr.  
lib. 2. caus.  
cap. 13.  
Ibidem.  
Scalig. ibi.  
Dod. lib. 6.  
cap. 69.  
Lib. 3. c. 87.  
Li. 2. Obs.  
cap. 83.

Tempus.

Téperam.

Lib. Tem-  
peram.  
Gal. lib. 6.  
simp. lib. 2.  
cap. 728.  
Dod. lib. 6.  
cap. 69.  
Ures.  
Dios. lib. 3.  
cap. 87.

Lib. 6. sim.

In cap. 87.  
lib. 3. Dios.

At nos, inquit Scaliger, in nostris malis hyemis sæuitia spoliatis videmus, Viscum ne vnum quidem amittere folium. Ratio est, tenacitas ipsius succi, quæ suo lentore sibi ipsa sufficit, quemadmodum animalibus, quæ sine cibo latent hyeme. Sic etiam ipsis in arboribus perpetuifoliis intelligendum. Præterea Plinio mas est fertilis, fœmina sterilis. Viscum planta est fruticosa, surculis geniculatis, lentis, transuersis, sese implicantibus: intus porracei coloris, extra subflauis, inquit Fuchsius: (Idem Dioscorides, sed referre id videtur, ad glutinum, quod ex hac planta fit, non ad plantæ ipsius colorem, coloris semper viridis esse Plinius scribit:) grauis odoris: folio penè buxi, minore, longiore, crassiusculo, pingui, ex viridi nigricante. Altitudo eius vix excedit cubitum: sine flore esse scribunt Ruelius & Fuchsius, flores tamen profert exiguos, luteos, ex quibus baccæ parua, rotundæ, pallidæ, viscido humore plenæ, quarum singulis inest nigrum semē. Viscum in iis est quæ in terra gigni non possunt, sed in arboribus nascuntur, & cum sedem suam non habeant, in aliena viuunt, auctoribus Plinio, & Theophrasto, quod mirum certè videri debet, citra vllas radices passim in arborū caudicibus totum annum, adeoque brumali tempore, Viscum fronde virere noua, quod non sua seminat arbor, ut canit Maro. In Abiete ac Larice stelin dicit Eubœa nasci, Hyphear Arcadia, Viscum autem in Quercu, Robore, Illice, Pruno syluestri, Terebintho, nec aliis arboribus adnasci plerique. Copiosissimum in Quercu, quod Ἀπύδος Hyphear vocant. Nascitur & in Castanea, Malo, Pyro, Sorbo, Salice, Tilia, Betula, & aliis. Quin etiam, ut scripsit Dioscorides, inuenitur in quorundam fruticum radicibus. In Palestina Bellonius tradit esse oleas, quæ rubentibus baccis Viscum ferunt, eam ob causam sterilescentes. Floret fine mēsis Maij. Fructus maturus est Autumni initio, siue fine Septembris, totam hyemem durans. Calefacit cum acrimonia, ut Paulus scribit. Ex plurima aërea & aquea, paucissima terrena substantia constat. Nam acrimonia in eo amaritudinem excellit. Auicennæ calidum est, & siccum: in tertio gradu. Folia fructusque calefaciunt & siccant, satisque tenuium sunt partium. Viscum emollit, discutit, extrahit: parotidas, tubercula, cæterasque collectiones ad maturitatem perducit. Cum resina, & cera pari, epinyctidas in splenio sanat: vetera vlcera, abscessusque, quos Cacoëthes vocant, ex thure mollit: lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum & impositum absumit: cum Sandaracha, aut auripigmento illitū vngues extrahit: mistum cum calce, & vini facie, suam vim intendit, vel, ut alij legunt, ipsorum vim intendit.

Viscum Galeno, valenter humores ex alto extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosque diffundit, ac digerit. Est autem ex eorum genere, quæ non protinus admota calefaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut Thapsia.

Visci Querni lignum in tenuissimum puluerem quidam redigunt ait Matthiolum, & comitialibus hauriendum præbent, quo tantum medicamento multos sanatos pro certo affirmant. Atqui operæ pretium est, ut eo vtantur comitiales quotidie, & in quadragesimum vsque diem, caueantque ne lignum ab arbore rescissum terram contingat. Idem collo aut brachio pro amuleto suspensum cum suo cortice, grauidarum conceptum adiuuat: sed noui ego plures morbi & medicamenti prorsus ignaros, qui ligni loco Viscum ipsum in catapota deuorandum dederint. Viscum quod in Pyro syluestri nascitur, contractione membrorum laborantibus maximo esse auxilio scimus. Contunditur id vnà cum foliis, & ramis, & cum pinguedine capî recentis. Defricantur li-

chenes



chenes pumice, vt flos Visci cum calce subactus illinatur.

Omnia Visci genera Trago dum viridia adhuc, & recentia sunt, tusa, succo extracto, auribusque indito, discutiunt collectiones earum, & emolliunt eas intra paucos dies, dolorumque leniunt. Superstitio etiamnum hodie Christianorum quorundam mentes usque adeo occupauit, vt sint qui credant Viscum Quercinum aduersus veneficia, & ludibria Satanæ efficax esse: quam ob causam ex collo puerorum suspendunt. Quidam empirici existimant Viscum quod in Quercu, Corylo, Pyro nascitur, si terram non tetigerit in puluerem redactum, ac è vino potum comitialibus mederi. Itaque ex eo orbiculos precatorios conficiunt, quos aduersus eundem morbum valere credunt. Alij argento includunt

Pli. lib. 25.  
cap. 4.  
Lib. 3. c. 3.

ad περιπλά. Gentilis Fulginas, & Iacobinus de partibus tam præstantes huius vires esse arbitrati sunt, vt lignum sanctæ crucis appellarint, sibi que persuaserint aduersus epilepsiam, apoplexiam, paralysem quàm maximè prodesse, tum intus sumptum, tum collo appensum. Lignum Visci in Aronia Mespilo nati arquatos sanare affirmat Curtius. Viscum confit, vt prodit Plinius, ex acinis qui colliguntur mesium tempore, immaturi. Nam si accessere imbres, amplitudine quidem augentur, Visco verò marcescunt. Siccantur deinde, & aridi tunduntur, ac conditi in aqua putrescunt, duodenis ferè diebus: vnum hoc rerum putrescendo inuenit gratiam: inde in profluente rursus malleo tusi, amissis corticibus, interiore carne lentescunt. Hoc est Viscum, pennis auium ligandis, iuglandis oleo subactum, cum libeat insidias moliri. Viscum scribit Matth. variis modis

Gentilis &  
Iacob.

Li. 26. c. 23.  
Li. 16. c. 44.

fieri: verum omnium præstantissimum esse quod è granis in Quercu nascentibus conficitur. Visci, præter id quod inualidum in pyris, malisque nascitur, ingens in Hetruria prouentus. Siquidem ibi non modò in Quercu probatissimum prouenit, sed etiam in Cerro, Illice, Castanea, in nostris præsertim maritimis Senensibus, vbi vastissimæ assurgunt syluæ, quæ non paruo pretio locantur iis qui Viscum conficiunt. Grana quæ legerunt in aqua decoquunt, donec disrumpantur: deinde contundunt, & tamdiu lauant in aqua, donec furfuracea excrementa eximant. Fit præterea Viscum in Syria ex Myxis, quo vtuntur Insulares in suis aucupiis, quoniam arboreo Visco carent. Ex Venetiis illud deferitur, quo primum ex Damasco Syriæ aduehitur, vnde Damascenum vocant: sed id Quercino bonitate cedit. Fit quoque Viscum ex Agrifolij, & Viburni radicibus ipsarum corticibus in scrobe inter suarum arborum frondes humido solo sepultis, ibique tamdiu dimissis, quoad computrescant: Tum enim eximuntur, & tamdiu in pila contunduntur, donec lentorem concipiant: post aqua calida lauantur, & manibus commiscuntur. Hac etiam ratione quibusdam in locis Viscum fit ex

Ibidem.

Ibisci radicibus. Serapio quoque ex corticibus ramorum arboris Tarabellæ Viscum bonum confici tradit. Viscum Quercinum maximo Hetruscis vsui est. Nam præterquam quod in aucupiis eo vtuntur, etiam vites eodem muniunt, atque illinunt, ne prima germinatione ab erucis, & vermiculis, quibus omnia scatent, gemmæ deuorentur. Visci fructu vescuntur Turdi, præcipuè magni, quos nostri vulgo Turdellas appellant, quorum stercore semine Visci pleno inficiuntur, & feruntur arbores, in quibus pernoctant, & victitant: Ex eo semine nascitur planta, quæ Viscum creat, vnde scitè à Plauto dictum est, Turdus exitium sibi cacat. Eadem est de Visci ortu Plinij sententia. Omnino factum, inquit, nullo modo nascitur, nec nisi per aluum auium redditum, maxime Palumbis, ac Turdi. Hæc est natura, vt nisi maturatum in ventre proueniat, quod, & scribit, & admiratur Theophrastus, præsertim cum Viscum & fructum ferat, & semen è quo generari possit. At id negat Scaliger, & ex arborum vitali excremento, quasi è semine, proportionem quadam, oriri Viscum probat, sicut,

Cap. 167.

Li. 16. c. 44.

Lib. 2. c. 40.  
cap. 24.  
In comm.  
ca. suprad.  
& ex eructat. 168.



Ibidem.

Li. 16. c. 44  
de bel. Ga.Lib. 2. cau.  
cap. 22.

Li. 17. c. 4.

Li. 13. c. 22.

Li. 16. c. 44.

& Gallam, non è semine deiecto ab auiculis, quasi verò, inquit in palumbis, & Turdi ventriculo nequeat granum concoqui, cum tamen labruscarum gigarta longè duriora, & grandiora conficiantur, id quod experti sumus, datis Turdo vuis labruscæ, deinde Visci baccis, nullaque horum specie in auis excrementis reperta. Adhæc extremo Autumno comedunt aues acinos. Summis ramis etiam surrectis quibusdam Viscum oritur. Quomodo totas hyemes perdurat, neque tantis tempestatibus proluitur? Non enim statim nasci est verisimile. Quare caloris interni fotu informata Visci principia in succo sibi connaturali, ab externo calore adiuta, atque euocata concrefcunt, & in plantam adolefcunt, quemadmodum cornua ex osibus animalium educuntur. Non omittenda est hac in re, & Galliarum admiratio. Nihil habent Druidæ (ita suos appellant Magos) Visco, & arbore in qua gignitur (si modò sit robur) sacratius. De quorum vana superstitione, & populi hac imbuti stoliditate, lege plura apud Plinium, & Iulium Cæsarem. Druidæ, inquit Cæsar, certo anni tempore in finibus Carnutum (quæ regio totius Galliæ media habetur) confidebant in loco consecrato. Ea Galliæ pars hodie *la comté de Dreux* nominatur. Arboribus exitio est Viscum, auctoribus Theophrasto & Plinio, qui id etiam nec igni, nec aqua posse corrumpi tradidit. Hyphear ad saginanda pecora vtilius est. Vitia modo purgat primo, deinde pinguefacit quæ suffecere purgationi. Quibus sit aliqua tabes intus, negat durare. Ea medendi ratio adhibetur æstatis quadragenis diebus.

## I L E X. CAP. II II.

Nomina  
Lib. 16. ob.  
cap. 44.In lib. 1.  
Dioscori.  
cap. 121.  
Lib. 6. ca. 3.Forma.  
Forma Ma  
theo. lib. 1.  
Diosc. 121Plin. li. 16.  
c. 6. Matth.  
Th. ib. d.  
Pl. lib. 16.  
cap. 25.

L E X Græcè πῖνος nuncupatur, quia ferra propter duritiem sit secanda, Arabicè *Barbes*, siue *Carmas*, Gallicè *Ieuise*, & *Eouise*: Bello-nio *Chesne verd*, quo nomine Quercum perpetuò virentem, cuius capite de Quercu meminimus, minimè intelligit, Italicè, *Elice*, Hispanicè *Anzina*, & *Auzinheira*, & *Coscoia*, Germanicè *Stecheychen*, *Eingattung*

## I L E X.



Duùm Ilex est generum, alterum folio spinoso, sine aculeis alterum: hoc vbique ferè scatet Hetruria, illo verò Hispania. Meminit vtriusque Columella. Possunt, inquit, & ficulnea folia bubus probè dari, si sit eorum copia. Querneæ tamen frons melior est vel Iligneæ, sed eius generis quæ spinas non habet. Nam altera quoque, vt Iuniperus, respuitur à pecore. Quare non rectè sentiunt, qui Plinij tantum & Theophr. testimonio freti, Ilicem non spinosam legitimam esse negant. Ilex foliis laurinis ac perpetuis constat, parte aduersa candicantibus, scabris, auersa virescentibus, ac læuibus, toto ambitu ferratis, rigidis suis crenis pungentibus in vno genere, in altero minimè, Breui pediculo: glande parua, Querneæ simili, breuiore, graciliore, pertinaciter hæretè, quam Homerus Achylon vocauit, eoque nomine à glande Querna distinxit. Viscum atque hyphear fert. Nullo flore exhilaratur. Tota arbor procera est, & Robur magnitudine æquat, vbi solum nacta fuerit idoneum: cortice in rufum nigricante



nigricante, materia densa, spissa, robusta, ex nigro rufa: radice multiplici, profunda *ἐπιεχὺς*, id est mediocriter, Theodorus admodum conuertit. Theophrastus certè alibi scripsit, omnium syluestrium profundissimas radices Ilicem habere, materiam densam, robustamque admodum, quare, & decorticationem hyeme diutius tolerat, in atrum rubescentem, vnde apud Aristophanem *ῥαφύων* homines, id est Iligni pro durissimis ponuntur: eam tamen frangi ac dissilere sponte sua scripsit Hermolaus, ob idq; Periclem dixisse, Bæotios Ilicibus esse similes, vt est apud Aristotelem, quod ipsi se conficerent intestinis discordiis. Ilicis à Matthiolo pictæ folium oblongius, & angustius, ad id fortassè genus referendum, quod Plinius in Italia nasci tradit, folio non multum ab Olea distante. Quæ in Gallia Narbonensi, & Prouincia notissima est, etiam mulierculis, & pueris, folia habet Suberis primi foliis minora, & magis orbiculata, in adultis arboribus plerumque sine aculeis, præter nouella, & nunc primum enata, quæ aliquantulum incisa, & aculeata sunt: Nam in tenellis arboribus antequam glandem ferre incipiant omnia folia aculeata sunt, teste etiam Clusiodoro. Admirandam Ilicem describit Plinius his verbis. Vicina luco est Ilex, & ipsa nobilis, 35. pedum ambitu caudicis, decem arbores mittens, singulas magnitudinis visendæ, syluamque sola facit. Idem inter vetustissimas etiam arbores Ilicem recenset. Vetustior vrbe inquit, in Vaticano Ilex, in qua titulus æreis literis Hetruscis religione arborem iam tunc dignam fuisse significat. Tiburtes quoque originem multò ante urbem Romam habent. Apud eos extant Ilices tres etiam Tiburto eorum conditore vetustiores, apud quas inauratus traditur. Ciuica corona Iligna primò fuit, postea magis placuit ex Esculo Ioui sacra. Ilex in iis est arboribus quæ montibus propriæ, nasci in planis nequeunt. Inter syluestres perpetuò viret. In prouincia Narbonensi, præfertim agro Monspelienfi frequens nascitur. In Italia notissima est arbor. In Ida monte Cretæ, hodie Psiloriti nuncupato copiosè proueniunt Ilices, & in monte qui Athos dicitur: item in montibus circa Hierosolyma, & locis circa Amanum montem. Ilex Vere germinat teste Theophrasto. Earum, inquit, quæ ferius fructificant, quas nonnulli anni spatio fructum perficere volunt, vt Iuniperi; & Ilicis, germinationes Vere proueniunt. Fructus, eodem auctore, serò maturefcit, vt annotinum nouus occupet, eamque ob causam bifera hæc arbor à nonnullis existimata est. Omnium tardissimè Ilicem fructum suum perficere idem alibi scripsit. Sic enim Gaza legit, πάντων δὲ ὀψίστατά, &c. codex autem Basiliensis, πάντων δὲ αὐστέρην, id est, omnium copiosissimè, &c. Eodem loco, Quercus, & Castanea serius fructus perficiunt, nempe circa Vergiliarum occasum: eodem modo, & Philyrea, & Ilex.

Iligneæ Glandes viribus Quernas antecellunt, ait Dioscor. Iligneæ radices cortex cum aqua coctus, dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos.

Valentius astringunt Phagus & Ilex, inquit Galenus, seu quis eas species esse Quercus velit, seu toto genere diuersas. Harum folia dum tenera sunt, imposita, non instrenuè siccant, minus autem Quercus, quanto minus etiam adstrictio- nis sortita sunt. Dioscor. de omnium foliis æqualiter pronuntiat, contusa, & trita tumoribus prodesse, & imbecilles membrorum partes roborare. Radix Ilicis tusa, & ictui dryini \*imposita plurimum prodest. Galen. alio loco scripsit, Ilicis Glandes quas Græci ἀκύλας vocant, fugiendas esse, quoniam acerbæ, & duræ sunt, eoque insuaues: etiam si quis elixas sumat, concoctu difficiles, & succi crassi. Scribit Corn. Ilicis Glandem Galeno acylon appellari, & Querna Glande ad omnia deteriore

Lib. 3. Hist. cap. 7. Theophr. Li. 4. Hist. cap. 15.

In lib. 1. Diosc.

Li. 16. c. 44

Plin. li. 16. cap. 4.

Locus.

Theophr. lib. 3. Hist.

cap. 4.

Plin. lib. 16.

cap. 18.

Bell. lib. 1.

ob. cap. 18.

& 44.

Bell. lib. 2.

ob. cap. 81.

& 107.

Tempus.

Lib. 3. Hist.

cap. 6.

Cap. 16.

Lib. 3. ca. 6.

Li. 1. c. 121.

Vires.

Lib. 6. sim.

Curt. li. 21.

cap. 17.

\* Drynus fer-

pens genus,

Dioscor. lib. 6.

Lib. de huius-

no. & mal.

sue.

Emb. 169.

li. 1. Diosc.

Lib. 2. de

Alim.

existi



existimari, sicut hanc castaneis, quæ omnium glandium sunt optimæ, quo tamen loco vulgaria exemplaria Græca Latinæque Memecylon habent.

Libr. 2. de  
diæta.  
Li. 1. de vlc.  
Ibidem.  
Erasmi in  
Chiliad.  
Pli. lib. 16.  
cap. 6.

Acyli, Quercus, Fagique Glandes Hippocrati crudæ, tostæq; aluum sistunt: elixæ minùs. Ad idem ambusta Ilicis radices teneras in vino dulci coquere iubet ad lentum ignem, donec satis crassum fiat medicamentum. Similiter in aqua coqui possunt. Hæc cum ita se habeant, inquit Cornarius, mihi sanè videtur pro-  
uerbium, quod ἀκόλῳ τὰ χεῖλη, ἔσχατ' ὀφείλει βῆσαι, iubet, non legendum esse ἀκόλῳ apud Suidam, sed ἀκούῳ, quum ipse ad salubrem, & fortem rerum vsum id admo-  
nere nos dicat. Ego hîc nihil contendo, nec admodum refert. Iligna Glâs Suem angustam, nitidam, strigosam, ponderosam facit, Horatius.

*Umbæ, & iligna nutritus glande, rotundas*

*Curuet aper lances carnem vitantis inertem.*

Matt. ibid. Ilignus carbo Hetruscis in pretio est, non modò quòd ignem diutius foueat, sed etiam quod (vt aiunt) vapore caput minimè tentet. Iligna materia vt querna, ad multa est utilis. Ilici honos ad axes inquit Theophr. & ad currus vnico iugo tractiles, & ad iuga lyrarum. Secatur in laminas prætenues & Ilex, auctore Plinio, colore quoque non ingrata, sed maxime fida iis quæ teruntur, vt rotarum axibus. Proditum terebris vaginas ex Buxo, ac Illice utilissimas fieri. Hyginus manubria rusticis carpinea aut Iligna fieri iubet. Oribasius ex Heliodoro scribit machinas ex robustiori materia conficiendas esse, scilicet Iligna vel fraxinea.

Lib. de ma-  
chin.

## S V B E R.

## CAP. V.

## Nomina

Lib. 1. c. 88.

## Genera.

In cap. 121.

Li. 1. Diofc.



SUBER Græcis φελλὸς dicitur, Gallis *Liege*, à leuitate, vt putat Ruellius, quod innatet aquis, nec obruatur: qua ratione etiam ἱψος dicitur, quòd semper altum petat: Italis *Sugaro*, Germanis *Pan-  
tsoffelholz*, Hispanicè *Alcornoque*. Suberis duo sunt genera, fo-  
liorum figura diuersa: alterum folio prolixiore, acuminatioreque: alterum

*SUBER folio breuiore,  
& latiore.*

*SUBER folio longiore,  
& angustiore.*



breuio



breuiore, rotundiorēque, & ferrato. Suber arbor est folio Ilicis, vel Oleæ, crassiore, longiorēque, vt scribit Theophr. perpetua coma virens: quod tamen negat idem Theophr. nisi codex mendosus sit, cui refragatur Plinius, & iure quidem, numerās inter syluestres arbores, quibus folia non decidūt, Suberem. Apud Theophrastum legendum quidam censent, τὸ δὲ φύλλον ὅμοιον τῆς ἐλαίας, παχύ, πορρώκετερον, & κυλλοειδές, ἀλλ' ἀειφύλλον: Folium Oleæ simile, crassum, longius, non deciduum, sed sempiternum. Ilici magnitudine cedit, vt testari possunt, qui Bacano Romam proficiscuntur, quo in itinere, innumera Suberum plantæ visuntur. Est enim, δεινὴς ἐπιτεκνῶς, καὶ δεικνύς, inquit Theophr. id est mediocriter procera, & augefcens, non admodum procera, auctuq; insignis, vt conuertit Gaza. Quin & à Plinio dicitur minima esse arbor. Caudice est crasso: paucos producit ramos: Glans Ilici similis pessima, rara: cortex tantum in fructu, præcrassus, ac renascens, atque etiam in denos pedes vndique explanatus. Materia eius distumpitur facili, quemadmodum Piceæ, verum fragmentis maioribus, sicuti scribit Theophr. & est, vt alibi tradit, δεινὸς καὶ μαλακός, id est tractatu facilis, mollisque, verum ὀφθαλμῶν, id est, fragilis, vel fissilis, non rigida, vt Gaza interpretatur. Ex ea quondam simulachra Diis factitata, verum in eius locum successit palma. Suberi detrahitur totus cortex, alioqui deterior fieret arbor, qui triennio post subnascatur, haud ignara natura quod cortice spolianda sit, inquit Matthi. materiam duplici cortice muniente. Cortice in orbem detracto necantur arbores inquit Plin. excepto Subere, quod sic etiā iuuatur. Crassescens enim præstringit, & strangulat. Alterum Suberis genus folio est prolixiore, & acuminatiore, alterum breuiore, rotundiorēque, per ambitū ferrato, acuminatis quibusdam in locis, incisuris. Scribit Theophr. Suberem peculiariter in τρυφηνία nasci, in quibus verbis Victorius mendum esse suspicatur, legique debere τρυφηνία. Copiosa namque hæc arbor est in maritima regione Hetruriæ, quam olim incoluere Thyrrheni, vt & syluæ etiam ingentes Suberis sint prope Populonium, & oppidum quoque inde appellatū Sughereto. Corrupta enim Latina voce Suber, patrio sermone Sughierō vocatur. Qui folio est rotundiore, in Romano, qui prolixiore, in Pisano agro prouenit. Spectantur Suberes in ora maritima Liguriæ, vt Plinio fides non sit adhibenda, qui nec in Italia tota nasci, nec in Gallia omninò tradidit. Sunt, & in Hispania humiles, parumque ramosi, inquit Ruell. at forsitan in Pyreneis montibus prociores. Tardissimè arbor germinat Suber, præsertim ex vinorum cadis, combustum, cinerem reddit siccando valentissimum, qui medicinis ad dysenterias inscriptis admiscetur. In immodico sanguinis ex vtero profluuiō Paulus Suberis ex Italico vase combusti cinerem propinat in posca. Mirificè auxiliatur, Suberis ex Italico vase vsti cinis cum aceto, vel posca, in vterum inditus. Suberis cortex tritus ex aqua calida potusque sanguinem ex vtralibet parte fluentem sistit. Eiusdem cinis ex vino calido, sanguinem excreantibus magnoperè laudatur, auctore Plinio, id quod etiam testatur Senenus his versibus.

*Sed quacunq; fluit vis immoderata cruoris*

*Subereus cortex calidis potatur in vndis,*

*Ante minutatim studio vincente terendus.*

Senenus.

Vfus Suberis, auctore Plinio, ancoralibus maximè nauium, piscantiumq; tragulis, & cadorū obturamentis, præterea in hyberno fœminarū calceatu. Quamobrem nō infacetè Græci corticis arborē appellāt, (sic enim legendū, nō vt in aliis exēplaribus, mulieres cortices arborū &c. dixerūt autem Græci δὲ ἐν δρόφῳ, id est arborē corticis, vel corticosam.) Sunt & qui fœminam Ilicem vocēt, atque vbi non nascatur Ilex, pro ea Subere vrantur, in carpētariis præcipuè fabricis, vt circa Elim, & Lacedæmonem. Suber inter eas recēsetur arbores, quæ tardissimè carie vetustatēque sentiunt

Lib. 3. Hist. cap. 16.

Li. 16. c. 11.

Matt. in c. 121. lib. 1. Diosc.

Ibidem.

Lib. 16. c. 8.

Forma.

Pli. lib. 16.

cap. 8.

Lib. 3. Hist.

cap. 16.

Theophr.

Ibidem.

Theophr.

Ibidem.

Ibidem.

Li. 17. c. 24.

Genera.

Locus.

Lib. 3. Hist.

cap. 16.

Lib. 3. Var.

Lect. c. 17.

Lib. 16. c. 8.

Li. 1. c. 89.

Vires.

Plin. li. 16.

cap. 25.

Paul. lib. 7.

Lib. 3. c. 62.

Li. 24. c. 4.

Vfus.

Li. 16. c. 8.

Li. 16. c. 43.

Lib. 16. c. 8.



fentiunt. Eiusdem Glande fungosa caro fit. Huius corticis vsus sutoribus, veteramentariis, atque piscatoribus notus: his, verriculorum alis, ne sidant aut in profundum trahantur, appendentibus: illis, solcas aduersum frigora munientibus.

## SMILAX.

## CAP. VI.

## Nomina

Li. 16. c. 6.

**S**MILACIS ancipites, & multiplices significationes errorem sæpè crearunt in re herbaria, atque etiam creare possunt, nisi bene distinguantur. Smilaces primum dicuntur læuis & aspera, herbæ repentes: deinde quædam arbores. Ilcis duo genera teste Plinio. Ex iis in Italia folio non multum ab Oleis distant Smilaces à quibusdam dictæ, in prouinciis Aquifoliæ. Præterea, quæ Taxus Latinis, Smilax Græcis nuncupatur.

SMILAX AR-  
cadum Glandifera.

## Genera.

Li. 3. Hist.  
cap. 16.

## Forma.

Ibidem.

## Nomina

Ibidem.  
In li. 1. Dio-  
scor. ca. 121.

## Ibidem.

## Locus.

## Vires.

Lib. 6. cap.  
part. cap. 3.

Lib. 6.

Postremò Glandifera quædam aliæ arbores hoc nomine appellantur, de quibus nunc agitur. Harum duo obseruauimus esse genera. Vnū Smilacem Arcadum Theophrasto dictum, alterum humilior, vix in arborem excrescens. Smilax Arcadū arbor est Ilci similis, inquit Theophrast. mediocriter procera, cortice cinereo, in summis ramis cano, & lanuginoso: folio lauri, nec serrato, nec, Iligni modo, in ambitu spinoso, superiore parte viridi, inferiore candicante, lanuginèque obducta, quæ mollis tangentibus sentitur: flore Oleæ Roboriue simili, luteo, in longis paniculis denso, quo Ilex caret: glande admodum parua. Græci vocant Milaci, & Acilaci vocibus corruptis à *σμιλακος*, & *ἀκίλλης* nominibus. Gallis nullum proprium nomen huius arboris est. Materia est non, vt Ilex, solida, densaque, sed molli, vt tradit Theophrast. qua ratione Matth. eorum improbat sententiā, qui Smilacem Arcadum, Illicem non spinosam esse autumant. Alterum Smilacis glandiferae genus humile est, fruticosum, in arborem sese non

attollens: folio Oleæ, candido, neque insecto, neque spinoso: fructu, floreque superiori simili, à quo folio tantum angustiore discrepat. Rectè ergo Theophr. scribit, Smilacis glandiferae folium non esse aculeatum, siue spinosum, cum Smilacis asperæ reptatricis, & scanilis, folium mucrone lateribusque pungat: item rectius esse quam Ilcis (*βυθύτερον* enim, non vt Gaza *βαθύτερον*, id est profundius, legendum puto) quoniam, neque sinuosum, neque in ambitu incisum: molle, quia vna parte lanuginosum: differentiisque pluribus varium. Smilacis glandiferae primum genus frequens in agro Monspeliensi prouenit, vbi non rectè ab herbariis Robur appellatur: alterum in collibus Rhodanum respicientibus, totòque eo tractu, qui à Vienna Allobrogū ad Arelatem vsque porrigitur. Astringendi vires Smilax habet auctore Gale. qui enumeratis iis quæ columellæ mediocres phlegmonas modicè reprimunt, subiungit. His validiora sunt Myrti, & baccarum eius decoctum, & Cydoniorum malorum acerborum, item virgultorum tenerorū Ilcis, Arbuti, Smilacis, Phagi. Quo loco hæc Cornarius. Smilacem arborē Taxum Latinis vocari, & Dioscorides & Plinius tradunt, in potuque acceptū venenatum pharmacum esse, & repentinam mortem inducere. Idem Dioscorides prodidit, imò non solū in potu acceptum lethalem esse, sed vmbra etiam illius sub ea sedentibus aut dormientibus



tibus noxiâ, vt pleriq; inde moriantur, quod alio loco Diosc. & Plin. tradunt, vt mirum videri queat eius arboris ramulorū decoctū hoc loco à Galeno ad columellam inflammatā probari, maximè cum etiâ ipse Gal. scribat *σμύλαξ*, ἢ *τάξος*, *αἰένδρον ἐστὶ δηλητηρία δύναμις*. Pro *τάξος* nō rectè, vt equidē arbitror, *καλός* legitur, velut etiâ apud Paulum. Non esse aut de alia Smilace accipiendum, testimonio est id, quod asperâ, & lenē, non Smilacem, sed Milacē appellare solet, velut alibi ostēdi, & quod hoc loco inter Ilicē, Arbutū, ac Phagū recensetur, quibus aspectu similem Taxū Plin. dixit, & Dioscor. tum foliis, tū magnitudine, Abieti similem scripsit. Arbitror itaque Gale. reuera Taxi arboris ex genere Abietino, & Ilicino ramulos hoc loco probare, vt quorū decoctū vehementi adstrictoria vi præditum sit. Non esse aut eam ubiq; letalem, & venenosam ex eo patet, quod Diosc. præcipue de Italica, & in Narbonēsi Gallia, Hispaniæ cōtermina nascēti tradat, pro qua apud Pliniū in Arcadia, corruptè, vt opinor, habetur. Hęc paucis refellit Matth. Si Cornarius, inquit, Theoph. sibi alioqui familiarē cōsulūisset, qui Smilacem quandā (vt Paulo ante ostendimus) arborē Ilici similem facit, rectius, meo quidem iudicio, & paucioribus rem hanc explicasset. At Cornarius, ne cōsulto quidem, opinor, Matth. in Emblematis, Theophr. locū se legisse demonstrat, quo Smilacem Arcadium describit, & hanc Smilacē non esse Taxum ait. Smilacē verò Dioscor. & Plinij agnoscit, quod vel ex eo patet, inquit, quod alibi eodē libro Theophr. de Taxo agit, ipsamq; *μύλον* vocat. Veruntamen ne sic quidē à pristina sententia dimoueri potest. Nam Paulo post superiorē Gal. locum cum posuisset, sic scribit. Quo loco ego non de alia Smilace in cōmentariis Medicis accipien dū cēsui, & adhuc sentio, quā de ea quæ Taxus appellatur. Nam Smilax altera Theophr. apud Arcadas solū id nomen habet, & peculiaris illorum arbor est.

Libr. 4.  
Li. 16. c. 10.

Lib. 8. sim.

In libr. 1.  
Diosc. c. 12.

Emb. 68. li.  
4. Dioico.

Lib. 6. cap.  
part. 2. 3.

## PHELLODRYOS

## CAP. VII.

PHELLOD.

SMILAX

alba angustifol.

humilis angustifo.

Folio serrato.

Folio non serrato.



Vum de Ilice, & Smilace dixisset Theo. subiūgit: Quod verò Phellodryn Arcades nūcupāt, natura est inter Ilicem, &

Lib. 3. Hist.  
cap. 16.

Nomina



Quercū media, atque adeo Ilicem fœminam quidā esse putauerunt. Hęc ille. Si tamē nomen ex Subere & quercu factū spectes, Phellodryn, idest Suberi quercum naturæ Suberis, & Quercus participem potius dixeris. Sed Suber Ilici arbori adeo similis est, vt nihil intersit, an ex Ilicis, an ex Suberis & Quercus confusis principiis hanc dicas fuisse à Theophr. nominatam. Quinque Phellodryos genera obseruauimus: duo candicantibus foliis: tria, obscurè virentibus. Vna igitur est foliis altera parte albicantibus, angustis, longiusculis, crebris admodum & non profundis incisuris crenatis, leuiter asperis potius, quàm spinosis: cortice cinereo: glāde, cum matura est, ex fusco flauescēte. Hęc videt esse Matth. Phellodrys picta, sed nō descripta. Alteri, folia altera parte cādicantia, latiora sunt, raris laciniis, sinuosa, molliter aculeata: cortice, maturāq; Glāde, ex atro rufescēte.

Genera.

Forma.

Alia Phellodrys est, cui folia sunt mediocris amplitudinis, nigricātia, siue obscura viriditatis, non adeo multis, neq; profundis laciniis sinuata, mitius pungentia: calyce Glandis laui: Glande ipsa ex fusco flauescēte: cortice cinereo.



PHELLODRYS Matthioli.

PHELLODR. alba, Latifolia.



PHELLO. nigra | PHELLODR.  
mediocrib. folius. | nigra latifolia.

PHELLODR. Folia muricatis,  
Calyce glandis echinato.



Lib. 3. Hist.  
cap. 16.

Alia foliis est latissimis, similiter nigricatibus, crassis, frequentioribus incisuris, valde spinosis, glandis calice læui, cui maturæ, & cortici idem qui & superiori color est. Harum omniū Glans strigosa est, & tenuis: calyx non spinosus, sed ut in Quercu tuberculis verrucosus. Hanc & Illicis glandem olim ἄκυλον vocabant, auctore Theoph. cuius vocis vestigia hodie quoque Græci retinent, vniuersum hoc glandium genus Acylacas nominantes. Postremum Phellodryos genus folia superiore minora habet, pallida, multum laciniata, valde muricata, Aquifolij modo: calicem glandis echinatum: glādē ceteris similem, corticē cinereū.

Locus. Hęc genera in collib<sup>9</sup> Rhodano vicinis, aut nō procul ab eo disitis proueniūt.

I L E X



ILEX AQUIFOLIA CAP. VIII.

**I**LEx aquifolia Plinio, siue Ilex parua aquifolia, hæc arbor nominatur, Phellodrys coccifera quibusdam, Theophr. communi nomine πρίνος, à Diosc. κόκκος βαρύνει, Gallice, *Labre de la graine d'escarlate*. Illicis duo genera Plinius tradidit: vnā in Italia nascentē, folio non multum distantē ab oleis, cuius, obiter supra meminimus: alterā in prouinciis, aquifoliam dictam. Est autem Ilex aquifolia, arbor parua, furculosa, cortice ex

ILEX AQUIFOLIA.



rubro candicante, Glande rotunda, calyce aculeis rigente, totāque ferē vt in Cerro, complectente: foliis paruis, & veluti in Agria, siue Aquifolio laciniatis, ac in ambitu sæuissimē pungetibus, breui pediculo adnexis. In ima parte qua petiolo hærent, & ea supina, nonnūquam verò, sed rariùs, in furculorum nodis, granum quoddam innascitur, rotundum, paruum foris ē cinereo rubens, intus verò sanguineo cruore lucido plenum, vesiculis vlmorum foliis insidentibus simile, tanquam huiusce arbusculæ purgamentum quoddam ac excrementum, à natura in folia protrusum, non autem bacca. Hoc Theophr. κόκκον ποινυειν vocat, Diosc. etiam κόκκον, Plinius granum, coccum, quisquiliū: quanquam Gelenius cusculium legat. Est enim, inquit Hispanum vocabulum, non Romanum, & cusculiatum videtur olim dictum, quod nunc deprauatē scarlatum. Hermolaus verò, quisquiliū Plinio Vermiculum, idest, ipsum cocci granum dici putat. Nam quisquiliæ, vt ait

Nomina

Li. 16. ca. 6.

Lib. 3. Hist.

cap. 16.

Li. 4. ca. 43.

Genera.

Forma.

Plin. lib.

16. cap. 24.

Lib. 3. Hist.

cap. 16.

Ibidem.

Lib. 16. c. 8.

Festus.

Festus, sunt, quicquid ex arboribus minutis furculorum, foliorūque decidit, vnde nomen venit: ob id Cecilius quisquiliās volantes venti folia dixit: vnde natum, vt vestis coccina literis per imperitiā interceptis, Squarлата vulgo nominetur hodie, pro quisquiliata. Sed Plinij locum præstat adscribere, vt contaminatum, ideoque obscurum purgemus, ac illustremus si possumus. Omnes has roboris dotes Ilex solo prouocat cocco. Granum hoc, primoque ceu scapus fruticis parue aquifoliæ Illicis, cusculium vocant. Sic Gelenius. At Hermol. Marc. Ruellius, Granum hoc rubens est, primūque ceu spectes frutices, paruæ aquifoliæ Illicis: Quisquiliū vocant. Quidam, primoque ceu scrupus, vel ceu spurcities: Alij, primoque ceu bacca, &c. absurdē: coccus enim non est Illicis fructus, vt ostendemus. Sic verò legit Dalechampius: Granum hoc, primoque ceu scapo, &c. vt scapum Plin. intelligat petiolum. Coccus enim ex eo profus loco existit, quo petioli scapus folio cohæret, vt diximus. Turnebus in veteribus libris exaratum inuenisse scripsit, primoque ceu scaptes fruticis parue aquifoliæ Illicis: vnde, inquit, temere scapus fabricatus, & edolatus est ab emendatoribus, nos scabies legendum esse affirmamus. Coccum Arabes, *Charmen*, *Kermes*, seu *Quermes*, appellant, Officinæ, Grana tinctorum, Galli, *Vermillon*, & *Graine d'escarlate*, Itali *Grana de tintori*, Germani *Scarlachber*, Hispani, *Grana para tegrir*, & *Grana en grano*. Serapio cum de chermes tractat, eandem eius quam Dioscorides, cocci infectoriij historiam describit: ex quo intelligere licet, idem esse Chermes Arabum, & coccum infectorium Græcorum. Quare, idem ne sit Chermes siue coccus infectorius, & Illicis nostræ granum infectorium

Lib. 16. c. 8.

In li. 1. Dio.

c. de Coc.

Li. 3. ca. 98.

Th. 1. ad li.

4. cap. 16.

Nomina



seplasiariis, & infectoribus notissimum, quo illi ad medicatas cordique amicas  
alkermes præsertim confectiones hi in laneis vestibus inficiendis vtuntur, du-  
bitant quidam sine ratione. Matthiolus nescire se dicit, an eius arbuscula in  
Lib. 4. Dio. cap. 43.

## COC CI INFE-

Etorij Arbuscula.



Lib. 24. c. 4.

Ibidem.

Marcel.  
Virgi.Emb. 39. li.  
4. Diosc.

Italia proveniat, vniufque picturam exhibet, quæ ex Byzantio est allata: At frequentissimam hæc minimam Ilicem tum plerisque Italiæ locis, tum præsertim in Hetrusco, Romano, & Senensi finitimo agro, locis montosis, glareosis, sterilibus, inter varias Ilices, smilaces asperas, terebinthos, lentiscos nasci Pena affirmat, tametsi paucas, & parum nec quotannis, tamen nonnullas coccum ferentes: sed quia minus, & paucum citòque evanescentem partim ignorari, partim negligi. Porro ex eo quòd granum infectoriū vulgare, rotūda, vt ait, inanisq; bacca nullam lentis speciem refert, vt scribit Dioscor. coniicit Coccum diuerforum esse generū, nostrūmq; illud esse, quod Plinius in Attica, & Africa provenire tradit, Scolecion ideo vocatum, quoniam ex eius medulla tenues exoriuntur vermiculi: argumento quod hoc inane intus deprehēditur. Verū ea coccifera quam depinxit arbor, est planè parua Ilex aquifolia. Et quod ait Diosc. hæere Coccum fruticibus suis *ὡς ποταλ*, id est, ceulentes, non ad formam grani, sed hærendi modum referendum esse annotavit Marcel. Virgil. Quantum verò ad vermiculos attinet, scire licet Cocci omnis, ni tempestiuè legatur, aut tēpestiuè collecti, ni feruentissimo soli exponatur, aut in calentem furnum immitatur, aut vino albo irroretur vt fit ab infectoribus qui magnam eius vim emunt succum in vermiculos commutari, ita vt prorsus inanis supersit folliculus, sic evanescente eius humore, sicque in puluerem rubellum redactum feruant. Quade causa vt scoleciō antiqui, id est vermiculosum, ita nostri *Vermillon*, à vernibus nominauerunt. Cornarius incertos nos esse tradit de Cocci tinctorij ortu, etiā si res ipsa nota sit, in maximòque vsu ac pretio habeatur, ad tingendos pannos tum sericos omnis generis, tum alios quoque. At si Ilices aquifolias Coccum ferentes in Gallia provincia, Hispania, alibi, contemplatus fuisset, proculdubio vt rem ipsam atque eius vsum, ita & ortum cognouisset. Ceterū id quòd ab amico quodam peregrinationis admodum studioso, de grano tinctorio audiuit, adscribit. Nascitur, inquit in Sarmatiæ ad Russiam spectante Podolia appellata regione, herba similis plantagini. Ad huius radicem granum vnum adnascitur, vulgo, illic *Ishirbitz* voce ex Chermes, vt puta corrupta, appellatum, quoad finē Maij, & Iunij principium per quatuor hebdomadas collecto, antequam in vermem alas postea aquirentem abeat, serici, & alij panni inficiuntur eo colore quem nostri *Schalach*, & *Chermesin*, vocant Vbi colligitur hoc granum, quinta par talenti, quod nos centenarium dicimus, quinque aut sex aureis Rhenanis vānit. Verū inter ex siccandum ac præparandum dum in puluillū redigitur, tantum ipsi decedit, vt ad nos Francfordiam allatum libræ vnius pōdus triginta aut quadraginta plus minus aureis valeat. Et addidit grana singula singulis radicibus adnascencia lentis magnitudinem non excedere. Quæ si vera sunt, inquit Cornarius, sicut vera esse illi affirmanti credidi, veteres illi longe



lōge sua opinione falsi sunt. Imo fallitur ipse Cornarius, ut pote q̄ Charmes siue Coccum, à Cramésino, quod appellant, adhærente radicibus pimpinellæ, aut cuiusdā herbæ in Germania Arnoglossō similis, non distinguat. Veteres autē & si Coccū à frutice siue arbūscula, quam nos parvā Illicem aquifoliā esse arbitramur, produci senserint, non tamen alibi quoque nasci ignorauerunt. Dioscor. enim nasci in Cilicia prodidit ē Quercubus, cochleariū exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & Coccum vocitant. Quē locū rectē, ut mihi quidem videtur, Cornarius ipse emendavit, ut quod in Dioscor. exēplis reperiitur, γυναικες τῶν τρυφῶν ἀναλέγουσι, hoc est mulieres ore colligunt, legat ἐν τῶν θέρων, pro τῶν τρυφῶν, ut mulieres æstate Coccū colligere accipiamus. Id quod ante Cornariū Marc. animaduertit, ut ante anotauim⁹. Quidā legūt, τῶν τρυφῶν, ut sensus sit, legere mulieres intorquēdo auellentes. Diosc. historiæ cōsentanea tradit Matth. copiosum in Bohemia Coccū in Quercubus provenire, eūque quod ab incolis non agnoscat, quotannis deperire, atq; etiam in Polonia, vbi diligenter legitur. Quare si grana infectoria nunc ad radices herbæ cuiusdā reperiuntur, non propterea veteres Cocci sui natales, & originem, nascendique modum nesciuerunt. Monachi qui in Mesues Antidota commentarios ediderunt, in expositione Electarij ex granis tinctoriis, quod vulgo confectio Alchermes dicitur, duo præcipuē constituunt granorum genera, quibus tinctores vtuntur: vnum quod absolute granum tinctorum, Coccus baphica, à Serapione Chermes dicitur: alterum granum non absolute, sed granum Chermes, quo solo vtuntur tinctores ad tingendum sericum, quod à Chermes Chermesinum nominatur. Id reperiitur ad radices quarundam herbarum, sed copiosius ad radices Pimpinellæ. Horum itaque sententia chermes à Cocco differt, estque Chermes Chermesinum, quo sericæ vestes hodie inficiuntur. At idem omnino esse Charmes Arabum, & Græcorum Coccum baphicā ex Serapione iam demonstraui. Chermesinum verò nostrum à Chermes Arabum, siue Cocco Græcorum diuersum est, vel tinctorum iudicio, qui Coccum, Granam vocāt, *Graine*, Chermesinū verò quod ex herbæ radicibus colligitur, *Cramoisi*. Sed Monachos atq; alios multos Chermesini, siue ut nos loquimur Cramesini vox fefellit, à Chermes Arabum deducta, quod ei Cramesinum nostrum simile sit, non tamen idem, ut modò diximus. Idem Monachi (sic error errorem parit) in antidoto ex granis tinctoriis, atque aliis quæ sericum tinctum admittunt, sericum Cramésino infectum accipiendum esse arbitrantur, quod, inquit Pharmacopœi medicamenta huiusmodi componentes, à tinctoribus possunt emere. Hoc falsum absurdūque esse notius est, quàm ut refelli oporteat. Sericum enim candidum vel fuluum, crudūque tingendum intelligitur succo ex Coccis baphicis recentissimis pressu excepto, à pharmacopœis, solo, sincerōque, citra alumen, atque alia quæ tinctoris permiscuntur: qui succus liquorue, si grana aliquandiu feruentur, in vermiculos, ut diximus, mutatur, sed tempestiuē exsiccatus, & præparatus, à mercatoribus, ut ostendimus, in puluisculum abit, quo tinctores vtuntur. Nostræ, de Cocco baphica, opinioni suffragatur Bellon. qui scripsit Coccum baphicam colligi ex frutice Illici Glandem ferenti simili, cui folia veluti Aquifolio sunt, aculeata, esseque grana rotunda, parui pisi magnitudine, qua parte furculis adhærent, perforata. Gignitur granum infectorium. inquit Plinius, in Galatia, Africa, Pisidia, Cilicia, pessimum in Sardinia. Coccum Gallatiæ rubens granum, aut circa Emeritam Lusitaniæ in maxima, laude est. Est præterea genus Cocci in Attica ferē, & Asia nascens, celerrimē in vermiculū se mutans, quod ideo Scolecion vocant, improbantq̄. Optimū inquit Diosc. Coccum gignitur in Gallatia, & Armenia, deinde Asia, & Cilicia.

Dioscor.

Monachi.

Matth. lib.

Matth. lib.  
4. Diosc. c.  
de Cocco.Lib. 1. Obs.  
cap. 17.Locus.  
Lib. 16 c. 8.  
Lib. 9. ca. 41

Lib. 24. c. 4.

Lib. 4. c. 43.



- Ibidem. Vltimum ex omnibus Hispanicum. In Creta quoq; prouenit, teste Bellon. In via qua ab Hierosolymis Damascū itur, proueniunt arbusculæ ex quibus colliguntur grana tinctoria, quæ incolæ mercatoribus Venetis vendunt. Gramotium nemus haud procul ab Mōpelio, hoc fruticis genere Coccū ferentis abundat. Scimus, & in Prouincia, & circa Narbonē Coccū ex eadē arbuscula colligi, & in Hispania, pensionem alterā tributi pauperibus Hispaniæ donans, inquit Plin. Mensibus Maio, & Iunio colligitur. Ad eum colligendū puellæ, mulierculæq; succinctæ turmatim eunt, mūdum, ornatumq; muliebrē inde sibi cōparātes. **Dioscor.** Vis huic spissandi: vulneribus neruisq; præcis cōuenienter ex aceto tritū illinitur.
- Lib. 16. c. 8. **Tempus.** **Galen.** Granum tinctorium astringentem simulque amaram qualitatem possidet. Vtraque sine morfu desiccatur. Proinde ad ingentia vulnera congruit, præsertimque neruorū: sed tunc ipsum quidā cū aceto terūt, alij cū oxymelite.
- Lib. 4. c. 43. **Vires.** **Plin.** Coccum Ilcis vulneribus ex aceto recentibus imponitur. Epiphoris ex aqua, & oculis suffusis instillatur.
- Lib. 7. sim. In lib. 4. **Matthiols.** Grani tinctorij puluere non infelicitur vtuntur mulieres Italicæ ad prohibendum abortum, ipsum grauidis in ouo sorbili propinantes, pauco addito thure, vel mastiche. **Fuch.** Eximiè confert hoc granum mulieribus aborrientibus, cum pari thuris pondere in potu sumptum.
- Lib. 1. de med. sim. **Silvius.** Robotat partes suis qualitatibus manifestis, siue etiā, vt quibusdam placet, totius substantiæ familiaritate, quā dicunt habere cum corde præcipuam. Puluisculo, de quo supra diximus, tinctorum lanas inficiunt viuido illo colore, qui in rosis micat, imperatoris paludamētis olim dicato, quo aspectu nihil gratius, & in purpuris Tyrias, dibaphasq; aut laconicas. Etenim Tyrio primum tinctas, mox & Cocco tingere mos erat, aut contra. Nam & tertio, & quarto, & quinto saturabantur, vnde nomina illa vestium, Monocoros, Dicoros, Tricoros, Tetra coros, Pétacoros in vitis Principū. Anniculo grano languidus succus, vt auctor est Plin. idem à quadrimo euanidus. Ita nec crescenti vires, neque senescenti.
- Lib. 9. c. 47.

## CASTANEA CAP. IX.

## Nomina

- N**unc arborem si quis glandiferarum generis non esse contendat, tamen huic esse affinem, cum eius fructus Sardianæ glandes, & Iouis glandes appellentur, diffiteri nullo modo potest. Castanea igitur sui nominis fructus fert, quos à Græcis κάσσινα, & κασάνεια primò dictos fuisse scribit Phocion, à Castano Magnesiæ vrbe, vel, vt Stephanus scribit, Apuliæ, non procul à Tarento, vnde aduecti sunt, vt fortè Diodorus nuces Castanajcas inde nominarit. Quid si à castitate, cum Plinius ieiuniis ferè dicatas eas innuat? Dicuntur etiā σαρδιωναι βάλανοι, id est Sardianæ Glâdes, quod Sardibus ex prouenire primum, non quod in Sardinia optimæ nascantur. Euboidas quoque, & Euboicas à Græcis dici reperio. Verum Ruell. & Tragus sic dictas fuisse nuces regias volunt. Præterea appellatur δῖος βάλανος, id est Iouis Glâdes, cum tamen hæc appellatio nucibus tantum regiis dicata sit à nostris, vnde Iuglandes dictæ. Nuces vocamus, & Castaneas, κασάνικα κάρυα, quanquam propiores Glandiū generi. Tiberius Balani nomē imposuit satuiis, cura multo excellentioribus factis, vocātur & Lopima à cortice crassiore, qui Græcis λέπος dicitur, & Leucena, à quodam montis Idę loco, qui magnā ipsarū vim profert. Nux etiam Heracleotica dicitur Castanea, vt ex Oppio in libro quem fecit de sylvestribus arboribus, docuit Macrobius, his verbis. Heracleotica hæc nux, quā quidam Castaneā vocant. Euboica etiam à regione. Theoph. tamen, atque eius interpretes Theodo. nucem Heracleoticam pro nuce Auellana vsurpant. Agelochus, vt scripsit Athenæus, ἀμωζα vocat & κασάνικα. In Dioscor. lego μωζα, quod nomen
- Lib. 15. c. 21. **Plin.** Ibid. **Fuch.** cap. de Cast. **Hermol.** **Athe.** lib. 2. **Lib. 1.** c. 90. **Li. 3.** ca. 66. **Plin.** Ibid. **Diosc.** li. 1. cap. 122. **Ca.** li. 2. ali. **Gal.** lib. de bon. & ma. suc. **Opp.** Auēt. **Li. 3.** Satur. cap. 18. **Lib. 2.**



## CASTANEA.



nomen tanquam spurium opinor ab interpretibus omissum fuisse: nescio an *ἀμύγα* reponendum. Arbor à nostris, *Chastaignier*, fructus *Chastaigne* nominatur: ab Arabibus *Sadianalach*, *Castal*, & *Stebulor*: ab Italis *Castagne*: à Germanis *Castani*, & *Kesten*: ab Hispanis, *Marrones*. Matthi. genera duo constituit, satiuū, & sylvestre. Ruell. duo apud nos Castanearū genera observantur, inquit, quædam altiles, multo maiore corporis tuberculo, quas vulgus vocat *Marrons*: alia lōgè minores, & veluti fere. Antiqui plura fecerunt, nominibus plerūque inditis à locis vnde im

Lib. 1. Diosc.  
cap. 122.

Genera.

Lib. 15. c. 23.

Forma.

tur, scrupulosa corticis interioris circa nucleos quoque ferruminatione. Castanea arbor ad eandem quā annosa Quercus magnitudinē, proceritatē, crassitudinēque tēpore accedit. Folia sunt illi magna, ferrata, venosa. Summis potissimum ramis inter folia proueniūt nuces, intus solide, & ut plurimū planæ, cordis ferè figura, triplici tegminis ambitu septē, membrana primū rubente, amara, mox lento cortice, siue corio, laui in atrū rubescēte, interius villoso: demū echinati calicis vallo, quod inchoatū glādis, intus etiā villoso, ferè albo: mirumque vilisima esse, quæ natura tanta occultauerit cura. Gale. *λοπίμυς παύγωνια* appellat. Inde etiā Virgilius Castaneas hirsutas, quāquā Hermolaus aliter accipere videatur, cū scribit. Ex Castaneis Græci Pogonias appellāt, quæ barbūlas quasdā habēt, nisi quis lanatas earū intelligat: sunt enim aliquæ pilis hirsutæ. Trini quibuscūque partus ex vno calyce, sed nō absque perniciē. Sunt enim minores ac deteriores, ut in animalium plantarūque partu, quo plures fuerint. Fructū præcedunt nucamenta longa, lutea, Iuglandis Iulis simillima. Alij nucamenta hæc floris vice putant propendere. Alij florere credūt. Pullā terrā & resolutā desiderat, auctore Columella, ubi Ruell. puram legit. Sabulonē humidum, vel refractū tosum non respuit: opaco & Septentrionali cliuo lætatur: spissum solum, & rubricosum reformidat, ut Damogeron memoriæ prodidit: sabulosis & sitiētibus gaudet. Diligit & frigidum calī statū, sed tepidū nō recusat, si humor assenserit. Delectatur cliuis, & opacis regionibus, præsertim in Septentrionē versis. Montes & valles diligit. In plerisque Germaniæ locis copiosissima puenit. In Gallia laudatissima Castaneæ, quæ apud Allobroges proueniunt, & in totam prouinciā ob præstantiam dimittuntur. Apud Petrocorios tamen maior prouentus, ut ingentes ibi eius arboris, si alterius cuiusquam syluæ cernatur. Apud illos castanea quadrupedum omnis generis, & cortis auium pabulum est. Ineunte vere germinat, feriusque vergiliarum scilicet occasu, fructificat. Castaneæ maturæ sunt circa finem Septembris, ac per totam ferè hyemem durant. Astringit & exiccat Castanea, haud secus quā alia glandes. Calida verò & sicca est primo ordine.

Plin. lib. 15.  
ca. 23.

Lib. 1. c. pa.  
Ecl. 17.  
In lib. 11.  
Diosc. ca.  
de cast.

Theoph. li.  
Hist. ca. 6.

Locus.  
Lib. 4. c. 33.

Fuch. c. 143.  
Curt. li. 25.  
cap. 12.

Tempus.  
Theoph. li.  
3. Hist. c. 6.  
Dodo. li. 6.  
cap. 55.  
Fu. h. ibid.  
Tempera.



*Vires.* DIOSCOR. Castaneæ astringunt & ipsæ, eisdemque quos cæteræ glandes effectus præbent, præsertim tunica quæ carnem & corticem media intercusat. Caro his qui Ephemerum biberunt conuenit.

*Lib. 23. c. 8.* PLIN. Castaneæ vehementer sistunt stomachi & ventris fluxiones, sanguinem excreantibus profunt, carnes alunt.

*In cap. 122. lib. J. Diosc.* MATTHIOLVS. Tritæ, cum sale mellæque subactæ, rabidorum canū morbis vtiliter imponuntur: cum hordeacea polenta acetôque illitæ mammæ duritias discutiunt. Venerem excitant, quia flatus gignunt. Largiùs in cibo sumptæ capitis dolorem efficiunt: infant: aluum astringunt, ac ægrè concoquuntur. Attamen quæ cineribus obrutæ torrentur, vulnerato priùs in latere cortice, crudis & elixis innocentiores redduntur, præsertim si cum pipere & sale, vel saccharo edantur. Interior membrana rubens, qua albicans pulpa circumuestitur, ex vino austero pota duarum drachmarum pondere, sistit valenter immodicos omnes alui fluores, & sanguinis reiectiones. Quinetiam, cum pari pondere ramentorum eboris, alba fœminarum profluvia cohibet, ex aqua albæ Nymphæe hausta. Iis vino maceratis, & cū farina subactis pessi vice vtuntur ad suppressendos menses.

*Ibidem.* DODO. Ex farina Castanearum cum melle fit electuarium vtile aduersus rufsim & sanguinis sputum.

*Li. 2. Alim.* P. VALERIANVS. Castaneæ ex omnibus fortissimum quidem cibum corpori præstant, sed qui difficile concoquatur. Coctæ in carbonibus, vel in fictili sicco assatæ, & cum melle ieiunis datæ, tussientibus profunt. Aqua, in qua cum suo cortice decoquuntur, cœliacis, dysentericis, sanguinemque excreantibus bibenda, haud, inutiliter propinatur. Interior membrana quæ corticem fructumque discernit, ad tertias decocta in aqua, & potui data mirè aluū fluentem reprimat, adeo vt Diosco. putet etiam cathartico dato per hanc potionem iri obuiam posse, si plusquam necesse sit purget. Galen. tradit Castaneas omnium Glandium præstantissimas esse, & solas inter fructus agrestes alimentū corpori memorabile præbere. Sed animaduertendum has, quamvis plurimum nutrant, tamen in cibis frequenter comedendas non esse. Nam, vt alibi scripsit, siue in aqua coctæ, siue tostæ, siue etiam frixæ, semper esitâtibz noxâ inferunt, multoq; magis, si crudæ edantur. Idem alio in libro, inter cibos crassi succi numerat.

*De tenui vict.* SYMEON SETHI. Copiosum corpori alimētum præbent, tardè transeunt, & difficulter coquuntur. Crassum humorem, capitis dolorem, & flatus efficiunt: ventrem sistunt. Si torreantur, aut siccentur, multum nocementi deponunt.

*De bon. & ma. suc.* PLIN. Proxima corpori membrana & in his, & in nucibus, saporem, ni detrahatur, infestat. Torrere has in cibis gratiùs. Moluntur etiam, & præstât ieiunio fœminarum quandam imaginem panis. Matthiolus. Mitiores faciliè purgantur, harumque illæ principem locum tenent, quas vulgus *Marrons* appellat, quod cæteris sint maiores, sapidiorez, speciosioresq;. In montibus aliarum frugum inopia, incolæ Castaneis hyeme victitant. Namque eas in cratibus primo exiccatas ab utroque cortice repurgât, moluntq; in farinâ, ex qua panē cōficiunt.

*Ibidem.* MNESITHEVS auctore Athen. Castaneas coctu difficiles esse tradit, & flatus parere. Si tamen à ventriculo victæ coquantur, vefcentes exhilarât sagina, & ex strigosis crassos reddunt. Diphilus verò, & multū nutrire ait, & boni succi esse, sed difficile concoqui, quod in ventriculo morentur: tostas minùs quidem nutrire, sed faciliè confici, elixas flatuum minus excitare, sed magis nutrire. Maiores Castaneæ, quas à Galli *Marrons* vocari diximus, lautiores diuitū mēsas claudunt: minores pauperū saturant ieiunia: illas cineribus obrutas torrent igni, has in aqua excoquunt ad satiandam plebis auiditatem, vnde populares & coctiuæ



coctiua à Plinio dicta, vt supra meminimus. Priusquam cineribus credantur, ferro vulnerari debent, vt plagæ hiatus spiritus igne citatus euadat, alioqui flantes flamma magno cum crepitu profiliunt, assidentium periculo. Flatus itaque his angustiis elusus à noxa vindicabit, impetu in sibilum abeunte. Integrarum probatio est, vt in frigidam mittantur. Siquidem quæ sanæ sunt merguntur, supernatat quæcunque vexata est. Seruantur vel in cratibus dispositæ, vel intra sabulonem, ne inuicem tangantur immersæ, vel in vasculis fictilibus nouis conditæ, & loco sicciore defossæ: vel inclusæ virgeis ex Fago receptaculis, & lutatæ, vt spiracula non relinquantur: vel hordei paleis immundissimis obrutæ: vel palustri vlua figuratis densioribus sportis reclusæ. Sunt qui filo transfixas cumulatim, & igni detostas asseruant. Indi, auctore Plinio, oleum ex Castaneis, non vinum, vt scripsit Curtius, conficiebant. Materies arboris ædificiis

Lib. 17. c. 7.  
Lib. 25. c. 12.

C A S T A N E A

*Equina.*



C A S T A N E A

*Humilis.*



atque aliis domesticis vtensilibus admodum apta est: siquidem ex ea non modò fiunt trabes, tigna, asseres, & pedamenta, sed & cadi, & eorum cinctus. Verum igniariis inepta. Nouum Castaneæ genus exhibet Matthiolus, cuius neque veterum, neque recentiorum quisquam meminit. Huic Castaneæ Equinæ nomen. Arbor est spectatæ proceritatis, folio Pentaphylli, sed longe humana manu, imò etiam ricini folio grandiore, ex longo tenuique pediculo propendente. Echinos fert in cacumine, magnitudine nostratibus æquales, rufo colore, verum durior ac crassiore putamine, aculeis raris, sed robustis firmisque, flauescens. Singuli singulos includunt partus, Castaneis nostratibus ferè similes, crassiores tamen, rotundioresque saporis optimi: cortice nigricante, præter quam anteriore parte, qua interno Echini putamini hæret, ea enim albicat, macula cordis effigiem præferente, quemadmodum in repentis vesicariæ semine videmus. Totus is cortex robustus est, simplex, nulla illi subiecta tunica, quali Castaneæ nostræ conteguntur. Hoc genus in Oriente nascitur. Hæ Castaneæ anhelosis & tussientibus equis valde profunt deuorata. Quam ob causam Constantinopolitani Equinas Castaneas nominant. Humilem Castaneam, nemini antea notam non longè à Pilatino monte contemplatus Ioannes du Choul sic depinxit. Matura, nucis auellana est magnitudine, Echinato calyculo, corio, membranæque tegitur. Sola nunquam suo calyculo includitur. Multæ simul racematim cohærent. Gustu est insuauis.

In l. r. Dio  
sc. ca. 122.

*Nomen.*

*Forma.*

*Locus.*

Li. de Qu.  
Histor.

FAGVS



Nomina  
Lib. 3. Hist.  
cap. 10.

Genera  
Theophr.  
ibid.

**F** T s i Fagus hæc nostra propriè glandiferarum generis non sit, tamen cum Castaneæ modo nucleos Echinis contextos habeat, sæpiusque in sylvis inter glandiferas arbores reperiatur, haud fuerit absurdum glandiferis eam subiungere. Quæ igitur ὄξυς à Theoph. dicitur, à Latinis Fagus, à Gaza Scissima, quod sit in laminas scissilis, ab Arabibus Chinaos, aut Chiachas, à Gallis Fau, Fouteau, & Hestre, ab Italis Faggio, à Germanis Buchbaum, aut Buche, ab Hispanis Haia. Fructus vocantur nuces, & nuclei, Latine Fagi, Gallice Faine. Fagus altera montana, candida materia, altera cam-

FAGVS PICTA  
à Matthiolo.



FAGVS PICTA  
à Dodanço.



**Forma.** pestris, nigra. Arbor est abieti proceritate, crassitudineq; ferè æqualis, caudice recto, læui, enodi, in orbè comoso. Flores producit, qui nihil aliud sunt quàm iuli quidam lutei, caduci, betulæ iulis minores, cætera similes: folia crassa, lævia, latiuscula, subrotunda, Populo similia, minora, initio viridia, mox saturatè viriditatis, celerrimè flavescentia, media superiorèque parte plerumque gignentia paruulam baccam, cacumine aculeatam, primum viridem, deinde rubentem, concavam, in qua vermiculi. Radices hæc Arbor nec multas, nec altas agit. Fructus nuclei sunt trianguli, læui cute, Castanearum modo in atrum, rubescente, echino inclusi, non spinoso, sed leni, blandoque, nec vt in Castanea pungète, cui nihilominus fructus similis est, & dulcedine, & succo. Lignum eius coloratum, robustum, neruofum. Neminem esse arbitror qui non hic sibi ante oculos positam esse videat Latinorum Fagum, quam à Græcorum Phago prorsus diuersam esse ex iis quos legi, qui hæcenus de re herbaria commentati sunt, præter Valerium Cordum, & Iacobum Dalechampium, nullus apertè declarauit. Id tantum sub odoratus fuisse videtur Hermolaus, sic scribès. Duo genera siue nomina sunt Phagi, alterius glandè ferètis, materiæ scabra, quam Græci φῦρον appellant, vt fructum quoque Hippocrates, alterius quàm Græci oxyan, Lydi

In li. Dio-  
scor. c. 145.

In c. 146. li.  
1. Dioscor.



Lydi Myſon, in Olympo eorū monte copioſam. Vnde Myſi populi, vt Strabo inquit, & Euſtathius. Noſtri ſciſſimam appellant, &c. Quæ omnia indiſtinctè capite de Fago tranſcripſit Ruell. Fagum Matthiolus legit in Dioſc. glandiferis arboribus adnumerari, tametſi fructus effigiem glādibus prorfus reclamare videat. Bellonius ſcribit arborem quam vocamus *Fontean* frequentiſſimam eſſe in monte, cui nomen Arthos, & ab omnibus vocari Oxiam. Et alibi. Magna pars arborum ſylueſtrium quæ in his montibus reperiuntur, ſunt *Haſtres*, quas Græci vocant *Oſtrias*, & *Fontean*s, quas vocant *Oxyas*. Quantum verò Fagus hæc à Theoph. phago differat, oſtēdimus, cum τὴν φρυγὸν Quercus ſpeciem deſcriberemus. Fagus eſt in mōtibus copioſa, in Gallia, Germania, Carinthia, Stiria, Carniola ſyluis frequens. Plinius. Fagus amat plana, loca item aprica, ac humida. Flores foliaque profert fine Aprilis, aut Maio menſe. Nuces Septembri maturantur cum Caſtanea. Folia Fagi refrigerant. Nuclei nonnihil humidi calidique ſunt. Folia recentia tuſa & impoſita calidis tumoribus profunt, eōſque diſcutiunt. Admouentur etiam puſtulis, atque vlceribus. Manducantur in ginguiarum labiorūque vitiis. Tuſa illatāque, torpentia membra corroborant. Calculis glandis fagineæ cinis illinitur: item cum melle, alopeciiſ. Nucleorum ſapor dulcis & ſubſtringens, inquit Matth. Glires hoc pabulo maximè delectantur, ac pingueſcunt. Quamobrem cum maturuit, innumeri capiūtur glires in Carniola, Stiria, & Carinthia ſyluis. Incolas mane inſpicias ſaccos gliribus vna nocte captis p'enos reportantes. Delectantur Fagi fructu etiam mures, cuius rei gratia è longin, quo natura ducti, gregatim ſyluas ingrediuntur. Item & ſciuris gratiſſimus eſt cibus, ac etiam turdis, merulis, aliſque auibus. Quin & obſeſſos ab hoſtibus in oppido Chio, ea tantum glande victiſſe Cornel. Alexander eſt auctor, donec ſe obſidione liberaſſent. Nucleorum Fagi, inquit Dodon. nullus uſus eſt: dulces tamē ſunt, & edules, ad ea omnia fere vtilis, ad quæ nuclei Pinei. Aqua quæ in cauīs Fagis reperitur, hominum, equorum, boum, ouiumque ſcabiem, & impetigines, ſi ea lauentur, ſanar, id quod ſe in pecoribus & hominibus expertum fuiſſe ſcribit Tragus. Cortex Fagi, auctore Plinio, in magno uſu agreſtium. Vaſa, corbēſque, ac patientiora quædam meſſibus conuehendis, vindemiis, faciunt, atque prætexta tuguriorū. Nec non in quodā uſu ſacrorū religioſus eſt Fagi cortex. Facilis & in opere Fagus, quanquā fragilis & tenera. Eadē ſcētilibus laminis in tenuia flexilis, capſiſque ac ſcriniis ſola utilis. Apud antiquos & vaſis honos. Manius Curius iurauit ſe ex præda nihil attigiſſe, præter guttum Fagineum quo ſacrificaret. Vipera teſte Ruellio, Faginei ramuli ictu, vel oblatu cohibetur.

Lib. 1. c. 72.  
In cap. 121.  
lib. 1.  
Lib. 1. Obſ.  
cap. 42.

Ibid. ca. 52.

Cap. 1.  
Locus.

Lib. 6. c. 18.  
Tempus.

Temper.  
Dod. lib. 6.  
cap. 76.

Vires.  
Trag. lib. 3.  
cap. 73.  
Dod. lib. 6.  
Plin. li. 24.  
cap. 5.  
In li. 1. Dio.  
ſcor. ca. 121.


Ibidem.

Ibidem.  
Lib. 16. c. 9.

Plin. lib. 16.  
cap. 43.

Lib. 2. c. 83.  
Plutar. h. 1.  
Symp.

CEDRVS CAP. XI.

VANQVAM Matthiolus ingenioſè de reſiniferis arboribus tractarit, copioſè etiam Bellon. libro huic rei dicato, ea res tamen detertere me non debet, ne quæ de iis longa obſeruatiōe, & Græcorum Latinorumque auctorum ſcriptis comperta mihi ſunt, hic perſcribam. Primū earum differentias explicabo. Deinde ſingularum Hiſtoriam naturæque perſequar. Reſiniferæ omnes, & iis folio ſimiles arbores, aut bacciferæ ſunt, ſive aciniferæ, aut coniferæ. Bacciferæ, Oxycedrus, Thiya Maſſiliēſis, ſeu Cedrus Lycia Bellon, Cedrus Lycia Matthioli, Lētifcus, Terebinthus, Taxus, Sabina Cupreſſo ſimilis, Sabina Tamarici ſimilis. Coniferæ ſunt Cedrus Phœnicia, Pinus, Pinaster, Teda. Picea, Abies, Larix, Cupreſſus, Thiya, altera, ſive Arbor vitæ Bellonij. A Cedrorū hiſtoria exordiar, recentioribus non

In li. 1. Dio.  
ſi o. de arb.  
comf. &  
reſin.

ſatis



**Genera.****Nomina**

Lib. 3. Hist.

cap. 12

Lib. 13. ca. 1.

Theoph. li.

5 Hist. ca. 9.

Ibidem.

Cap. 3.

Lib. 11. c. 17.

Lib. 1. Hist.

c. 17. &amp; li. 6.

Caul. c. 21.

Lib. 1. Hist.

cap. 16.

Li. 1. Diosc.

cap. 89.

Lib. 7. sim.

Lib. 3. Hist.

cap. 12.

**Forma Ce****dri Phœn.**

fatis rectè, ut ego quidem sentio explicata, quos Plinius perperam intellecta, ob rerum ignorationem Theophrasti oratione, in errorem induxisse videtur. Ac primum Cedrum in sua genera parit, quibuscum singulorū nomina declarabuntur. Eius duo genera. Phœnicia & Lycia. Phœnicia (sic quam *φοινικην* Theophr. dixit, Plinius interpretatus est, Gaza ineptè Punicam) à Phœnice quæ Syriæ pars est, dicitur, à qua Syria, etiam Syriaca, quod illic nascatur, & ea, qui Phœnicen & Syriam incolunt, ad nauium fabricam vtantur Pini vice. Cedrelate quoque nuncupatur, quia proceritate τὴν ἐλάτην, id est abietem æquat. Dendrolibanus in Geoponicis. Arabes *Serbin*, Gallia *Cedre*, Italicè *Cedro*, Hispan. *Cedro*, Græci *κέδρος*. Cedrus Lycia est, quam Oxycedrū etiam appellant, Theophr. *κεδρεῖδα*, Gaza Cedulam. Quodam tamē loco *κεδρεῖας* pro *κεδρεῖδος* mendosè legitur, quod Gaza cum non animaduertisset, Cedrias conuertit. Cedrides multitudinis numero sunt Dioscoridi, & Galeno, Oxycedri baccæ. Cum igitur hæc duo sint Cedri genera, Dioscorides, ut in sincerioribus & incorruptioribus libris reperitur, *κέδρος*, inquit, δένδρον ἐστὶ μέγα, ἐξ ὧς ἡ λεγομένη κεδρεῖα σωάγει) ἢ διὰ λεγομένη κεδρεῖς, vel ut alij, ὀξύκεδρος, vel *κέδρος μικρά*, φύλλα καὶ κάρπον ἔχει ὡς ἀρκυθός, μύρτις μέγεθος, πτερυφερή. Vel, ut ex Codice Catacuz. Constantinop. legit Matthiolus: *Κέδρος δένδρον ἐστὶ μέγα, ἐξ ὧς ἡ λεγομένη κεδρεῖα σωάγει). κάρπον ὃ ἔχει ὡς ἀρκυθός, μακρότερον μὲν ὡς ἀπόλυ. λέγει) ὃ καὶ ἄλλη κέδρος μικρά, ἀκανθώδης ὡς ἀρκυθός, φέρει καὶ κάρπον μέγεθος μύρτις, πτερυφερή. Rectè etiam Galen. Cedrum duplicè esse prodidit. Vnam fruticosam similem Iunipero, alteram arborem magnam. Vtrique Cedro folium Iunipero simile est, sed durius, acutius, spinosius Oxycedro. Præterea utraque ὑψηλὸν φασγέρας ἔστιν ἢ ἀρκυθός, sic enim in Theophr. legendum, id est procerior est quàm Iuniperus. Sed præstat ipsas sigillatim delineare. Cedrus Phœnicia, siue Syria, radicibus multis & crassis nititur, non alrè descenditibus (quod rationi consentaneum est in saxosis & asperis huius arboris natalibus) sed per summam terram vagantibus, caudice recto, maximè procerò,*



procero, alias quasuis arbores supereminēte, ab imo sursum versus gracilescen-  
te arbore, vt eminus conspicientibus metæ modo turbinata appareat, quoniam  
rami inferiore trunci parte latè circumfusi, & in orbem procul ab arbore expa-  
tiantes, quo propius ad fastigium acceditur, eo minores breuiorēque sunt.  
Cortice est glabro, & quasi arte polito, præsertim superne (nam in annosis &  
vetustis rimosus est, & scaber in ima caudicis parte, ad primum vsque ramo-  
rum ordinem) tenui, cinereo, cum vnguibus scalpitur, virente, cum pro-  
fundiùs vulneratur, rubro. Rami non quidem proni, sed subrecta diuisura  
ad cælum tendentes, poenè statim ab radice, veluti brachia transuersim lateri-  
bus inhaerent, arborem ad scandendum facilem præbentes, vt si quis in pri-  
mos subsilierit, ad verticem vsque facilè possit euadere. Ij licet vndique  
stipitem ambiant, sinuoso tamen quodam flexu truncum aspici permittunt,  
& sursum maiores repandi oneri quidem pertinaciùs renituntur, at si quis pli-  
cet, valido crepitu fragiles vno ictu dissiliunt. Minores autem pectinatim fili-  
cis modo in maioribus digeruntur. Folia huic sunt Laricis, nunquam deci-  
dentia, breuia, angusta, crebra, summo mucrone rigidiuscula, non tamen  
aculeata, ex quouis furculorum tuberculo simul numerosa, vt interdum qua-  
dragena, vel quinquagena ex vno nodo prorumpant, ita per furculum dispo-  
sita, vt tandem extremum furculi verticem coronantia pictorum penicillum  
referant, odorata, subacida, & cum amaroris pauxillulo adstringentia. Conos  
fert hæc Cedrus recta cælum spectantes, quod huic & Abieti peculiare est, Pi-  
neis graciliores, Abiegnis crassiores, maiores, duriores, quinùm vel senū digi-  
torum longitudine, subfuluos, obrufos, compactili squamarum strue coagmen-  
tatos, ramis sic hærentes, vt non nisi abstracto secum rami frustulo reuellantur.  
Porro hi dum hiantes recluduntur, subeunte rore ac pluuia madescunt, & fin-  
duntur, tùmque relicto ac nudato pediculo firmo, qui per medium coni tra-  
ducitur, circumstantes squamæ defluunt, sed hoc non nisi post biennium: an-  
no enim vt maturescant opus est. Hunc pediculum malè Bellon. scribit vocari  
hastulam à Plinio, cum illic assula legatur, non hastula, & Cedri nulla fiat men-  
tio, sed Piceæ. Verba Plinij hæc sunt. Aperitur Picea à parte solari, non plaga,  
sed vulnere ablati corticis, cum plurimum bipedali hiatu, vt à terra cubito cum  
minimum absit. Nec corpori ipsi parcitur, vt in cæteris, quoniam assula in fru-  
ctu est. Semen fert Abieti simile, vinaceo magnitudine par, gustu dulce, quale  
Pini est, oleoso quodam succo præstantissimi odoris circumfusus. Ex hac Ce-  
dro Phœnicia duplex resina, siue Cedria colligitur, vna liquida Abietis resinæ  
similis, quæ manat ex tuberculis in caudicis adhuc tenello, nec dū rugoso cor-  
tice multis, quæ adacto cornu, vt in Abiete fit, rustici pertundunt. Alteram du-  
rescentem, ac in arbore ipsa coeuntem Cedris ponte sua sudant. Mansa denti-  
bus tam pertinaciter adhæret, vt vix auellatur. Naribus admora odore suauis de-  
lectat, & tanquam fraga redolet, quod Dioscoridi planè aduersatur, à quo  
βαρβία τῆ δρυὸς, id est grauis odoris Cedria esse dicitur. Sed locum hunc ex vetu-  
stissimo Codice manuscripto Matthiolus emendauit, in quo legitur, ὀττός τῆ  
δρυὸς, id est vehementis odoris, seu vehementer odorata, cui ad stipulatur Verg.

Plin. lib. 16.  
cap. 21.

Lib. 1. de  
Conif.  
Lib. 16. c. 12.

Lib. 1. c. 89.  
Lib. 7. Aen.

*Vri odorata nocturna in lumina Cedrum.*

Id ante Matthiol. Marcellus animaduertit, validi odoris esse Cedriam inter-  
pretatus. Dicitur Cedria Gale. *κεδρία*, Arabibus *Kitrā*, & *Alkitran*, de qua Bel-  
lonij opinio à Matthiolo reprehenditur, & merito quidem. Etenim Ce-  
driam ex qualibet resiniferarum materia, modò pinguis sit, promiscuè fieri  
tradidit: nempe, ex Larice, si materia pinguis sit, Cedriam manare, ex Cupresso,  
Betula, Iunipero, eadēque vires, quas veteres veræ Cedriæ, scilicet

Ibidem.  
Lib. 7. sim.




Lib. 16. .II. corpora conferuandi, & viuientia corrumpendi, iis tribuere videtur, & in eam opinionem Plinij verbis adductus, scribentis Picem in Syria Cedrium vocari. Locus est eiusmodi. Pix liquida in Europa è teda coquitur naualibus muniēdis, multosque alios ad vsus. Lignum eius concisum furnis vndique igni extra circumdato feruet. Primus sudor aquæ modo fluit canali. Hoc in Syria Cedrium vocatur, cui tanta vis est, vt in Ægypto corpora hominum defunctorum eo perfusa seruentur. Ex quibus id solum intelligi potest Syros liquorem illum qui primus ex Cedri assulis fluxerit, Cedrium vocasse, quia ex Cedro tantum picem coquebant, vt in Europa ex teda. Cedri itaque auctore Hermolao, modò Cedri magnæ Pix, modò Cedri resina vocatur, quæ nihil est, si propriè loquendū sit, quàm cruda Cedri lacryma: Cedrium verò succus Cedri est, è teda eius concisa & accesa in furnis, qui primus aquæ modo fluxerit in canali. Nam sequens Pix iam est, non Cedrium. Sed confundūt auctores, nunc pro resina, nunc pro sudore tedarum, nunc pro Pice Cedriam & Cedrium vsurpantes, interim pro oleo Cedrino, quod Cedrelæon ex malis Cedri, vt ait Plinius, appellant. Omnibus enim iis quanquam diuersis, eadem natura inest. Cedrus Phœnicia gignitur in editis, niuosis, & gelidis montibus, Amano, Tauro, Libano, vnde ramos ex quibus vnum hîc appictum videtis, adferendos curauî, amici cuiusdam oneraria naue ex Tripoli reuertente, non in quauis montium parte, sed riguis & humidis, niuêque ferè semper obrutis eorum crepidinibus, & præcipitiis, in opacis conuallibus, propè torrentium margines. Theoph. In Syriæ montibus Cedri admiranda longitudine spectantur, tantæque crassitudine, vt sint quæ trium hominum vlnas complectentium impleant. Plin. In Ægypto & Syria reges inopia Abietis Cedro ad classes feruntur vsi. Maxima ea in Cypro traditur, ad vndeciremem Demetrii succisa. 130. pedum, crassitudinis verò ad trium hominum complexum.

Forma

Oxycedri.

Lib. 3. Hist. cap. 12. Lib. 14. ca. 5. Ibidem..

OXYCEDRVS.



Ibidem.

Oxycedrus, siue Cedrus Lycia, Cedro Phœnicia minor, Iunipero maior, radices laxas & raras per summam tellurem dispergit, cortice Cupressum emulatur, vt ait Theophrast. non semine, vt malè Plin. Iuniperi modo, eodem Theophrast. auctore, nodosam, distortam, in alas multas diuisam materiam habet, & in ea cor rubrum. A Iunipero tamen differt, quod Iuniperi materies parua sit, inodora, minime densa, cum excisa fuerit statim putrescens, Oxycedri verò tam spissa, vt maxima ex parte corde constet, putredini non obnoxia, odore grato. Sic enim locus is Theophrasti ex integrioribus libris est emendandus: ὁξάκη δὲ ἀμφοῖν (Iuniperus, scilicet, & Oxycedrus) καὶ πολυμήχαρα, καὶ ἐπεστρεμμένα ἔχοντα τὰ ξύλα. μᾶλλον δὲ ἢ ἀρκύθος ἢ ἔχει μίτρην, καὶ πυκνὴν, καὶ ὅταν κοπῇ ταχὺ σπινθηρίων. ἡ δὲ κέσρος δ' ἀλγίστον ἐγμάρδιον ἢ ἀπὲρ, &c. Folia huic sunt Iunipero similia, sed duriora, acutiora, spinosiora. Baccas fert Iuniperinis similes, initio virides,



des, deinde flauas, postremo rufescentes. Theoph. *κάρπος δὲ ὁ μὲν τῆς κέδρου ξανθός, μύρτις μέγθος ἔχων, δάδης, ἥδις ἐαδίεα*. id est, Oxycedri fructus flauus est, myrti magnitudine, odoratus, esu suauis, non vt Gaza conuertit, odoratus pulcher, gustatūque suauis. Is est in arbore sua perpetuus, vt antecedentem nouus occupet, vel vt narrant Arcades tres simul fructus habet. Vnum proximè exacti anni, nondum maturum, alterum hunc annum proximè exactum antecedentis, iam maturum & edulem, tertium nouum, iam prodeuntem. Hos fructus siue baccas *κεδρίδας* etiam à Diosco. & Galeno dici quid prohibet? Nam maioris Cedri fructus sunt coni, quibus quæ *περί τῶν κεδρίδων* scripserunt auctores illi competere vix possunt, neque in iis incluso semini, quod *σπέρμα*, opinor, vt & Plinius semen, vel *σπέρην* appellassent, non fructū, neque baccas. Plin. de vinis factitiis loquēs. E fruticū verò genere inquit, Cedri vtriusque, Cupressi, Lauri, Iuniperi, Terebinthi, Lentisci, Baccas aut lignū musto decoquunt. Quo in loco animaduertendum Plinium oscitanter vinum ex vtraque Cedro dixisse pro Cedrino, & Cedrite, quorum alterum fit ex Oxycedri baccis, alterum ē Cedria. Eodem ex loco Dioscorid. scriptura de iisdem vinis factitiis sic emendanda. *γίνε*) δὲ καὶ ἐκ τῆς καρπὸς τῶν μεθόνων κέδρων ὄινος. Quem ille *κάρπον*, Plinius Baccas appellauit, cui consentiunt quæ mox in Diosc. sequuntur. *γίνε*) δὲ ἐκ τῆς τῶν ἀρκυθίδων καρπὸς ὁμοίως τῷ κεδρίτη. Fit etiā vinum ē Baccis Iuniperi, non aliter quā Cedrites. Quod verò Dioscor. scribit, *κεδρίδες ὅ κελουῦται οἱ ἐξ αὐτῆς καρποὶ*, in plerisque exemplaribus Asterisco notatur, qui falsi locum suspectū esse significat, vt omnino legēdum putem, *κεδρίδες ὅ κελουῦται τῆς ὀξυκέδρου καρποὶ*. Quod si quis vulgatam lectionem mutare nolit, Cedrum hīc minorem intelligemus, & eius Baccas Cedridas, quemadmodum in Galeno, cū scribit Cedridas fructus esse Cedri, sicut alio in loco perspicuē vsurpat, cū ait, Cedridas nominant Cedri fructum, qui colore & figura fructui Iuniperi est similis. (Subflauus enim est ac rotundus,) dissidet autem ab eo acrimonia. Nec multū abest, quin fructus hic ex genere sit medicamentorum, quæ nullum præbent corpori alimentum, nisi quis aqua ipsum macerarit. Quinetiam vt fructu Iuniperi durior est ac siccior, ita profecto exilior, vt nihil ille habeat aromaticum. Perspicuū autem est, quod & stomachum valde mordet, & capiti dolorem infert, nisi quis ipsum parcissimè sumpserit. Hæc Galen. quæ de Baccis Cedri minoris, siue Oxycedri, non de conis Cedri maioris intelligenda quis non videt? Gaudet Oxycedrus saxoso & frigido solo. Fundi tautē gummi durum, pellucidū, mastiches tam simile, vt hæc ferè sola nota internoscatur, quod mastiche mansa in ore coit, ac spissescit, Oxycedri verò gummi, in tenuissimum puluerem friatur, nec cogitur. Id gummi, vt & Iuniperi, vulgus Vernicē appellat. Præterea ex Oxycedri lignis assulatum concisū, toto Mafsiliensi tractu pastores & rustici picis liquidæ genus, de quoidoneo loco dicetur, nigrum videlicet ac fætidum liquorem oleosum eliciunt, quem sua linguā corrupto Cedri vocabulo *Huile de Cade* nominant, ad scabiem canum & pecorum, ac cimices necandos præstantissimum, sed odoris planè abominandi. Matthiolus tria Cedri genera depinxit, ac declarauit, Cedrū maiorem mōtis Libani, siue Cedrelatē, quam ille breuius, nos fusiùs descripsimus, iisquæ addidit quæ de ipsa in Plinio & Theophr. scripta passim reperiuntur: Cedri minoris genera duo: Phœniciam folio Iuniperi, sed duro, acuto, spinoso, quæ & Oxycedrus appellatur. Lyciam cui folium est minus, densius, multo minus aculeatum, quæ paruam Iuniperum quodammodo refert, corticēque obducta est rubro, & ramos emittit lentos, vitilium modo. Vtraque, inquit, omni tempore fructum fert, sed Oxycedrus maiorem, ac pulchriorem. Frequentissima, inquit, nascitur in Istria, & in quibusdam lapidiæ locis,

Ibidem.

Lib. 13. ca. 5.

Lib. 14. c. 16.

Lib. 5. c. 45.

Lib. 1. c. 89.

Lib. 2. Alim.

Locus.

Ibidem.

Genera.



Iunipero admodum similis, nec nisi fructu distans, maiore, rubente, dulci. Lycia in quibusdam Moraviæ montibus, cuius folia si digitis terantur, odorem suavisimum spirant, illi ferè similem qui in Pinorum Strobilis percipitur. Baccæ multo quàm Phœnicia minores ex ramusculorum summitatibus prodeuntes, primò virides, deinde flavescentes, postremò cùm maturæ fuerint, rubentes. Odorata sunt, & gustui subamaræ. Harum primam Cedrum Phœniciam, secundam Cedrum Lyciam siue Oxycedrum esse ex Theophrasto satis mihi videor demonstrasse: tertiam raram sanè & egregiam plantam in Moraviæ montibus nascentem, quidam Thyiam Mafsiliensium esse putant, negligentius depictam, de qua posthac tractabitur: alij Thyiæ genus à Mafsiliensi diuersum. Similiter Cedrus Phœnicia Bellonij vera Oxycedrus est, siue Lycia Cedrus: eiusdem Lycia Cedrus Thyæ genus est Baccis rubris insignis. Hos infecutus Dodon. aliam esse Cedrum maiorem scribit, aliam minorem. Maiorem Cedrelaten & Cedrum Coniferam vocari: minoris duo esse genera, vnum, quod folio est aculeato, veluti Iuniperus, alterum, quod folio est minimè aculeato. Hoc Cedrum Lyciam vocat, quam Thyæ genus esse iam dixi: illud Oxycedrum, siue Cedrum Phœniciam, quam ego Cedrum Lyciam veram, siue Oxycedrum esse ostendi. Lonicerus Cedri magnæ, parvæq; seu Oxycedri figuras, vires, vsúmque commiscet, ac confundit. His tenebras offudit Plinius, qui velut aliud agens, imò oscitans admodum, Cedri differentias ex Theophr. exscripsit. Iuniperi similem habent Phœnices, & Cedrum minorem. Duo eius genera Lycia & Phœnicia. Differunt folio. Nam quæ durum, acutum, spinosum habet, Oxycedrus vocatur, ramosa, & nodis infesta. Altera odore præstat. Fructum ferunt myrti magnitudine, dulcem sapore. Item: Maioris Cedri duo genera. Quæ floret fructum non fert: frugifera non floret, & in ea antecedentem fructum occupat nouus. Semen eius Cupresso simile. Quidam Cedrelaten vocant. Et mox. Cedro similis est in Arcadia arbor: in Phrygia Frutex vocatur. Hæc Plinius, qui primùm contra Theophrasti sententiam scripsit, minoris Cedri duo esse genera, maiorisq; totidem, & Phœnicibus Cedrum minorem esse Iuniperi similem. Nam cùm ille duo duntaxat quorundam sententia Cedri genera constituisset, τοῖς ἐν τῇ ἰδίᾳ, id est Idæ incolis, non Phœnicibus vnicum genus esse ait Iunipero simile, quæ Oxycedrus nominatur: quarum Iuniperi, scilicet & Oxycedri similitudinem, dissimilitudinémque, deinde fufius persequitur, Has quam negligenter Plinius confuderit, expendamus. Ramosa, inquit, Oxycedrus, & nodis infesta. Theophr. ὁ δὲ πολυμάχου, καὶ ἐπετραμμένη ἔχοντα τὰ ξύλα: id est, nodosam Iuniperus & Cedrus, in multasque alas diuisam, & contortam materiam habent. Altera odore præstat. Quasi verò altera inodorata sit. Duas enim Cedros minores hîc à Plinio comparari declarant præcedentia. Duo eius genera, &c. At quæ sequuntur, fructum ferunt, &c. Theophr. καὶ ἡ μὲν τῆς κέδρου, ὕλη, subaudi, δὲ δὲ ἑτέρας ὕ. id est, Cedri materia odorata, Iuniperi verò minimè. Et, maioris Cedri duo genera. Quæ floret fructum non fert: Frugifera non floret. Vnicum maioris Cedri genus esse iam ostendimus, quæ in monte Libano provenit, florétque vt Picea: baccas autem non producit, sed Conos. Oxycedrus autem siue Cedrus Lycia, siue Cedrus minor non floret, sicuti nec Iuniperus auctore Theophr. sed baccas fert. Quare sunt qui hunc Plin. locum sic legant. Quæ floret baccas non fert, baccifera non floret, id quod verum est. Semen eius, ait Plin. Cupresso simile. Theophr. τὸν δὲ φλοιὸν ὁμοίον δοκεῖν κυπαρίσσῳ, τραχύτερον δὲ, id est, corticem Cyparisso similem videri, sed scabriore.

Sequi

L. i. de Conif.

Lib. 6. c. 83.

To. 2. de Pl. cap. 3.

Lib. 13. ca. 5.

Ibidem.



Sequitur in Plinio, Cedro similis est in Arcadia arbor, in Phrygia frutex vocatur, perperam: sic enim Theophrast. *ὁ δὲ κυνοδὼν, καὶ ἄλλοι οἱ ἐν τῇ ἰδα*: alij vnicum genus esse dicunt, vt Idæ montis incolæ. De Cedrorum & Cedridum viribus hæc Dioscorides. Cedriæ vis inest, vt defuncta corpora conferuet, & viuientia corrumpat, qua ex causa mortuorum vitam aliqui appellauere. Vestimenta quoque & pelles eximia calefaciendi & siccandi dote corrumpit, magni ad ocularia medicamenta vsus. Quippe illita oculis claritatem affert, albugines & cicatrices detergit, instillata autem cum aceto vermes aurium necat: cum Hyssopi decocto infusa sonitus, sibilosque sedat: cauis dentium indita eos frangit, & dolores leuat: idem facit cum ex aceto colluitur. Quod verò sequitur, Peruncto ante coitum genitali abortiuum fieri constat, non rectè conuertit Ruell. non ad Dioscorid. sed ad Plinij sensum potius accommodans. Sic enim scribit. Portentum est quod tradunt, abortiuum fieri in venere ante perfusa virilitate. Ille verò sic. *περιχρησθέντα ὃ ἀδίδω ποτὶ τὴν σπέρματος ἀποβολὴν ἐστὶ*, id est, Cedria ante coitum genitali circumlita conceptionem impedit, & spem partus adimit, id enim significat *ἀποβολὴν*, quod Cornar. & And. Lacu. bene annotarunt. Pergit Dioscor. Anginæ ea perunguntur, tonsillarum inflammationibus auxilio est, lendes pediculosque illitu enecat, cerasta morsibus cum sale imposita subuenit, contra hausta Leporis marini venena in passo sumpta auxiliatur: in elephantia, aut linctu, aut perunctione proficit, pulmonum vlcera purgat, & si cyathus eius sorbeat, per sanat. Vermes & tineas subter indita necat, & partus extrahit. Fit & oleum à Cedria separatum, dum coquitur, velleribus supra halitum eius expansis, vt in pice, eiusdem ad omnia vsus: priuatim viriliter perunctum scabiem quadrupedum, canum, bouumque per sanat, inhærentes ricinos enecat, vlcera quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatricem perducit. Cedrides calfactoriam vim habent, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ, menses ciunt ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur: serpentes fugantur peruncto ex adipe ceruino, aut medulla corpore: in antidota adduntur. Hæc à Galeno sunt dilucidius explicata. Vtraque Cedrus ait, calidæ siccatq; temperaturæ est, tertij quodammodo ordinis in vtroque. Cæterum Cedria (vocatur ita Cedri oleum) quartum etiam ordinem videtur attingere, admodum calida simul & tenuium partium. Mollem itaque carnem promptè, ac citra dolorem putrefacit, sicut alia omnia, quæ cum eiusdem sint in calefaciendo ordinis, adiunctam etiam habent substantiæ tenuitatem. At in duris plusculo tempore & vix effectum potest consequi. Porro talia omnia medicamenta vocantur Septica, & Septa, sed inter sese maioris minorisque ratione dissident. Est autem in hoc genere medicamentorum ex primo & infimissimo ordine Cedria: plaræque enim eorum admodum sunt efficacia. Talia itaque & mortuorum corporum carnes corrumpunt, at Cedria exsiccat, simulque à corruptione tuetur corpora demortua, vtpote humiditates eorum depascens, cæterum solida corpora haud attingens. At in viuientibus calor ipse qui in corporibus est, Cedriæ vires adaugens, causa efficitur, vt teneræ ab ea carnes deurantur. Nec mirum videri debet, si cum tanta polleat potentia, lendes, pediculos, & tineas, & in auribus vermes interficere possit, rum foetum quidem viuientem interimat, mortuum autem eiiciat, sicut sanè etiam semen corrumpit, coitus tempore pudendo circumlita. Proinde conceptui aduersum est medicamentum, si sic vtaris, nulli secundum. Alia quidem multa eiusmodi particulatim efficit. Itaque argumentum est ipsum valenter

Vires.  
Ibidem.

Li. 24. ca. 5.

Embl. 84.  
lib. 1. in an-  
not. in Dio-  
scor.



excalfacere, sicut vbi dentium foraminibus instillatur. Siquidem dolores eorum mitigat, & ipsos confringit. Extenuat quoque oculorum cicatrices, & visus hebetudini ab humorum crassitudine ortæ medetur. Porro quod eius est pinguisimum, & ad vnguem oleosum, suspensis supra eam dum coquitur lanis exceptum, ac collectum, tota Cedria tenuius quidem est, sed minus acre, quanquam non minus excalfaciens. Quare illa crassior & mordacior est, maiore aperiendi facultate prædita. Itaque vulnera irritat, phlegmonasque in illis excitat. Oleosa verò illa Cedria adeo elementibus est viribus, vt plebeij experientia docti, ouibus tondendo illata à forfice vlcera illitu sanent, sicut etiam pice humida. Utuntur etiam ea ad ouium scabiem, & ad ricinos. Cedrides moderatiores vires obtinent, adeo vt comedi possint. Si tamen liberalius iis vtare, capiti dolorem inferent, ardoremque ac morsum in ventre efficient. Plinius inquit eadem magna ex parte, quædam aliter tradidit. Cedrus magna dat picē, quæ Cedria vocatur, dentium doloribus vtilissimam: frangit enim eos, & extrahit, dolores sedat. Cedri succus ex ea quomodo fieret, diximus, magni ad lumina vsus, ni capitis dolorem inferret. Defuncta corpora incorrupta æuis seruat, viuientia corrumpit, mira differentia, cum vitam auferat spirantibus, defunctis pro vita sit. Vestes quoque corrumpit, & animalia necat. Ob hoc non censeam in anginis hoc remedio vtendum, neque in cruditatibus, quod suscipere aliqui, gustandum. Dentes quoque colluere ex aceto in dolore timuerim, vel grauitati, aut vermibus aurium instillare. Portentum est quod tradunt, abortiuum fieri, in venere ante perfusa virilitate. Phthirias perungere eo non dubitauerim, itémque porriginis. Suadent & contra venenum marini leporis bibere in passo. Facilius in Elephantias illinatur. Vlcers fordida, & excrecentia in iis, auctores quidam, & oculorum albugines caliginisque inunxere eo, & contra pulmonis vlcers cyathum eius sorbere iusserunt: item aduersus tineas. Fit ex eo & oleum, quod Pisselæon vocant, vehementioris ad omnia eadem vsus. Cedri scobe serpentes fugari certum est, item baccis tritis cum oleo, si qui perungantur. Cedrides hoc est fructus Cedri tussim sanant, vrinam cient, aluum sistunt, viles ruptis, conuulsis, spasticis, stranguriæ, vuluis, admoti: contra lepores marinos, eademque, quæ supra, collectionibus, inflammationibusque. Hippocrates Cedrum Creticam in vino coctam in vteri exulceratione infundere præcipit, & Cedri ramenta suffire. Idem vinum Cedrinum bibendum præscribit, quum vteri velut ad viscera conuersi strangularint. De vino autem Cedrino & Cedrite, vide Dioscor. Cariem vetustatémque non sentit Cedrus, auctore Plinio. Cedri oleo peruncta, materies, inquit, nec tineam, nec cariem sentit. Quare simulacra deorum ex Cedro factitabant. Salomon templum Domini concameravit lignis Cedrinis. Templi Ephesiæ Dianæ, quod tota Asia extruente quadringentis annis peractum est, tectum ex Cedrinis trabibus fuisse conuenit. Memorabile & Vticæ templum Apollinis, vbi Numidicarum Cedrorum trabes durant, ita vt positæ fuerant prima eius vrbis origine, annis mille centum octoginta octo. Numæ etiam libros chartaceos durasse ad annos quingentos triginta quinque, terræ infossos narrat Plinius, quod Cedrati essent. Ab hac materiæ arboris aternitate. Digna Cedro dicuntur, quæ immortalitate digna esse iudicatur, atque eiusmodi, vt posteritati consecrari debeant. Horatius. *Speramus carmina fingi Posse linenda Cedro.* Item Persius. *Et Cedro digna locutus.* Ausonius ad Libellum. *Huius in arbitrio est seu te iuuenescere Cedro, Seu iubeat diris vermis esse cibum.* Cedrus etiam ad naues fabricandas aptissima, & ad ædium tecta perutilis. Rimam fissuramque non capit, neque etiam clauum tenet.

Lib. 24. c. 5.

De natur.  
mulieb.  
Lib. 2. de  
morb. mul.Lib. 5.  
Lib. 16. cap.  
40. 39.Lib. 3. Reg.  
cap. 6.  
Plin. lib. 16.

Lib. 13. c. 13.

Theophr.  
lib. 5. Histo.  
cap. 8.  
Plin. lib. 16.  
cap. 40.



## PINUS ET PICEA CAP. XII.

**P**INVS à Theophr vt ego equidem cum Marthiolo sentio, *ωδύκη* dicitur, Picea *πίτυς*. Contrà multi, in quibus est Bellonius, *πέυκη*, Piceam, *πίτυν* Pinum interpretantur, quadam fortasse nominum vicinitate ducti, quam habet *πέυκη* cum Picea, & *πίτυς* cum Pinu. Sententiam nostram multis rationibus confirmare nos possumus. Teophrast. *τῆς πέυκης* nucem *τροβίλον* appellat, quæ vox, eorum qui Galenum, aliósque Græcos auctores Latinos fecerunt, testimonio, nucem Pineam significat. Galen. Nux Pineæ boni ac crassi est succi, multumque nutrit, non tamen facilè coquitur. Appellant autem nunc Græci ipsam non *κῶνον*, sed *τροβίλον*. Alibi. His crassior nec ipse mali succi nucleus pineus, idest *δ κῶνος*, quem veteres etiam strobilum dixere: ac rursus: Coni fructus, quem quidam Cocalon nuncupant, & strobilum, esculentus est, sed nutrimentum coctu difficile præbet, quod de Picea fructu (*πίτυς* enim nucem etiam *κῶνον* idem Theophr. appellat) intelligi non potest, cum is edulis non sit, eodem Bellonio auctore. Adhæc Theophr. *τῆς πέυκης* duo constituit genera, satium, & sylvestre: at Piceam nullus vnquam opinor, in hortis cultam vidit, Pinum vident omnes. Præterea *τὴν πέυκην* in Idæam, & maritimam, idem diuidit, quæ duo Pinorum genera nobis nota sunt, Picearum verò minimè, quas non nisi in frigidis, niuosis, & excelsis montibus nasci, nunquam in maritimis, compertum omnes habent: postremò picem copiosam *ἐκ τῶν πευκῶν* fieri scripsit Theophr. atque earum proprium esse, vt in tedam abeant: at nobis perspicuum est ex pinorumstrarum, nom Picearum, assulis, tedaque, picis copiam maximam in montibus Galliæ nostræ, atque etiam aliis colligi. His adiungimus Scribonij Largi testimonium sic scribentis: resinæ Pityinæ, idest ex Picea arbore. Verum si quis ad conuellendam sententiam nostram locos aliquot Plinij curiosius confectetur, ex quibus hæc nomina aliter ab eo usurpata esse ostendat, huic respondemus arbores omnes coniferas Plinio non benenotas fuisse, atque has Romano, vt ait de se iudicio discreuisse. Id, vel ex eo probari potest, quod *τὴν πίτυν* quidè Piceam, sed *τὴν πέυκην*, Laricem interpretatus est Theophr. *ωδύκη μὲν γὰρ ἐπιανθεισῶν τῶν ῥιζῶν ἐκ ἀναβλαστάνειν, τὴν πίτυν δὲ φασὶ τινες ἀναβλαστάνειν, ὥσπερ καὶ εἰς λέσβον ἐμπρησθέντος τοῦ πυρραίων ὄρους.* Plin. sic. Larix vstis radicibus non repululat, Picea repululat, vt in Lesbo accidit, incenso nemore Pyrrhæo. Item alibi, *τὴν ἀγρίαν τὴν καλεσμένην θήλειαν τῆς πέυκης* *ἔχει.* Plinius. Larix fœmina habet quam Græci vocant ægida. Alio in loco *πίτυν* pinastrum videtur is conuertisse. Sylvestrium generis folia non decidunt Abieti, Larici, Pinastro. Theophr. *τῶν δὲ ἀγρίων ἀειφυλλὰ ἐλάτη, πέυκη, πίτυς:* sed hac in re fides Plinio adhibenda non est. Larix enim nusquam in Græcia nascens, Atheniensi Theophr. ignota fuit, neque, si nota fuisset, Laricem quæ simplex est, ac vnius generis, in tot differentias distribuisset. Quare satis superque me probasse confido Theophrasti *ωδύκη* Latinorum Pinum esse, quæ Arabibus *Senabar*, dicitur, Gallis, *Pin*, Italis, & Hispanis *Pino*, Germanis, *Hartzbaum*, *Fichtembaum*, & *Pynholtz*, Anglis, *Pynetre*, Belgis, *Pinap pelboom*, Bœmis *Borouit*. Huius duo sunt genera Theophrasto auctore, Pinus satia, & sylvestris. Pinus satia proceræ arbor in caudicis summitate ramos multos producit, qui in ramulos alios rotundos diuiduntur, foliis vestitos densis, capillamenti modo prætenuibus, longis, firmis, aculeatis, ex candido virentibus, perpetuis. Nuces edit magnas, solidas, veluti ex squamis duris compactas, altissimè à terra suspensas, ac in his exiles nucleos, oblongos, lacunatis toris, ferruginea tunica obductos. Interior nucleus tenui velatur tunica, flauicoloris, qua digitorum attritu facilè spolia-

Nomina

Lib. 3. Hist. cap. 10.

Li. 2. Alim.

Li. de bon. &amp; mal. suc. Li. 7. simpl.

Ibidem. Li. de Cau. ca. de pinu. Ibidem.

Ibidem.

Comp. 201.

Ibidem. Lib. 16. c. 10. Theophr. Lib. 3. Hist. cap. 3. Li. 16. c. 139. Lib. 16. c. 21. Lib. 1. Hist. cap. 15.

Nomina

Lib. 3. Hist. cap. 10.

Genera.

Forma.



## PINVS SATIVA.

Nomina

Locus.

Matt. ibid.

Genera.

Pin. sylu.

Forma  
& Loci.

Pinearum copia per totam Galliam distrahatur. Maritimæ prope fossas Marianas non procul ab Vrbe Monspelio permultæ proueniunt, in spatioso Pineto

tur. Sapor illi dulcis ac iucundus: substantia pinguis, oleosaque. Nuces has Græci κώνισς, ερροβίλινς, κοκκίλινς & κωνάριον vt dixi, nuncupant, Galli *Pommes de pin*, nucleos vero Pineos, *des pignons*. Materia pini rubescit, grauis est, & intus circa cor liquore quodam madet. Pinus hæc in Galliæ nostræ hortis permultis colitur & perbella proceraque spectatur. Copiosa etiam in agro Rauennate reperitur, non longè ab Adriatici maris littore: atque etiam in alijs Italiæ locis, præsertim in cœnobiorum viridariis. Syluestrem Pinum siue Pinastrum (Pinastrum enim, vt scribit Plinius, nihil aliud est quàm Pinus sylvestris) in alia partimur genera. Aliam enim esse fructiferam nouimus, aliam sterilem: Fructifera alia est Idaea, siue montana, alia maritima. Montana satiuæ similis est, nuces edit similes, solidas, ex simili squamarum congerie compactas, resinosas, odoratas. Huiusmodi montanæ Pinus in multis Hispaniæ, & Lusitaniæ montibus crescunt, adeo fructuosæ, vt inde maxima nucû


## PINUS SILVE-

stris fructifera.



## PINUS

Maritima.



Lib. 3. Hist. cap. 10. Pinearum nucum copia celeberrimo, supradictis similes, nisi quod nux earum breuior, rotundior, celerius dehiscit, auctore Theophrasto. Montanarum autem



autem amplior, longior, diutius in sese compressa manet. Causa hæc est, quod in arenoso solo maritimis parcius alimentum suppeditatur ideoque minor est, ac strigosior nux. Præterea ob maris afflatum, litus apricum, austri in maritimo tractu crebro flantis occursum nux citius recluditur, non aliter quàm cum ab arbore decerptam igni admoemus vt aperiatur: contrà verò, largius alimētum montanis suggeritur, & montium aër natura frigidior, nuces sese referare non finit, iunò comprimit. Hæc cum vera esse tum ratione tum experientia cōflet, tamen Matthiolus (qui maritimarum Pinorum duo genera exhibet, nucum magnitudine, & exiguitate tantum differentium) quod obseruationi nostræ refragari videatur, scribit, Pinos sylvestres in maritimis Senensibus fructum ferre spithamam longum, pyramidis figura, firmum, solidū, nec facilè dehiscētem: quæ verò in Ananiis Tridentinisque montibus reliquis, ac in Bœmia, Moravia, Polonia proueniūt, fructum edere paruum, breuem, qui exsiccatu multum dehiscat, & ex arbore decidat, idque euenire prouinciarum & regionum alia atque alia natura, & maritimarum Pinorum diuersis generibus. At non rectè ille quidem cum maritimis fructiferis montanas sylvestres & steriles comparat, sylvestres enim montanæ, fructiferæ, cum maritimis, exemplo Theophr.

li. 1. Diosc.  
cap. 74.

Ibidem.

*PINVS Marit. altera.*



*PINVS Sylvestris.*



comparandæ potius fuerunt. Reliquæ differentiæ montanarum & maritimarum ex Theoph. hæc sunt Montana rectior, celsior, materiâque crassiore est: maritima folio tenuiore, magis deciduo: cortice læuiore, vtilique ad coria, alterius verò minimè, Maritima ligno est validiore, mōtana ramosa magis, & crassior, vt dictum est, picemque copiosiore fundit. Pinus sylvestris quam sterilem vocamus, (non ideo quòd nullum edat fructum, Conos enim fert, sed quia nucleis edules non sint, nec cibis vtilis) radice nititur recta, pali modo humi defixa, lignosa, foris nigra, gustu acerba. Caudex eius sæpè distortus subrubro cortice obducitur, ac senescens rimosus, scaber, fungosusque efficitur. Ramorum cortex glaber, præsertim teneriorum, lauri modo liuescit. Rami ipsi fragiles  
si flectas



si flectas, cum crepitu rumpuntur. Caudex adultus in ramos diffunditur sinuosos, & perpetua fronde virentes, sic ut Pini sativæ modo summo vertice in eam latissimam arbor expandatur: folia tenuia sunt, rigida, semper gemina, ab vno veluti tubulo exeuntia, in ipso exortu connexa, gustu subacida, & adstringentia. Pro floribus sunt iuli quos hyeme profert. Coni paulatim augescunt ex compactili squamarum acervo turbinati, ramis firmiter hærentes, pediculo breui, in nouellis recto, in aliis adunco, & tanquam reflexo, tam valide adnexi, ut cum rudi & nouo annotinus permaneat. Huiusmodi sterilibus Pinastris Aruernorum, Vellauniorum, & Allobrogum montes abundant, ex quibus resinam colligunt, & picem optimam conficiunt, vocantque *Pins sauvages*, & *Pinnateaux*. Pinastrum scribit Plinius mira esse altitudine, quod minimè verum mihi esse videtur, nec ex quo id transcripserit scio. Nam in hoc arborum genere Abies, Piceæque nostrates, & Cedrus Syriaca, altitudine præcellunt, Pinastri verò omnes quotquot vidi, tam steriles quam fructiferi, aut humiles sunt, aut altitudine mediocri, tamen si Bellonius prodiderit & Dictæos Pinaistros in vastitatem diffusos, ad insignem altitudinem surgere, & eos qui in Olympi Phrygij montis, aut aliorum gelidissimorum montium summis culminibus proueniunt, Abietis esse rectitudinis. Sed is Pinastrum sterilem, Piceam appellat, ac eam pro Pinu sylvestri describit, depingitque, absurdè, & contra Theophr. Plinij que auctoritatem, ut ostendemus. Matthiolus hoc Pini sylvestris genus à Bellonio Pinastrum dici coniicit: sed non rectè, inquit. Pinastrum enim Plinio auctore, nihil aliud est quam Pinus sylvestris, mira altitudine, quæ gignitur non modo in montibus, sed etiam in planis. Bellonio verò contra, Pinastrum humilior est, planaque, & montium supercilia prorsus respuit, nec alibi prouenit quam in excelsissimis montium iugis. Huic Matth. coniecturæ non assentior. Nam Bellonij pinastrum esse Tedam arborem Plinij demonstrauimus. Quid verò de pinastri Plinij mira altitudine sentiendum sit, iam diximus. Iustior est Matth. reprehensio, quam fugere non potest Bellonius, dum Pinastri vocem ex versione Latina frequenter se legisse scribit apud Theoph. eum tamen Theoph. fuisse incognitum, quod in Græciæ Asiæque montibus non nascatur. Itaque nullum esse ex Græcis auctoribus, qui Pinus sylvestris pinastrum meminerit. Quid? nonne Theoph. *πέυκην* aliam cultam, aliam incultam esse prodidit? Nos equidem nihil aliud esse *πέυκην* quam Pinum probauimus, & *πέυκην ἀγρίαν* Theoph. Pinum sylvestrem, siue Pinastrum esse. Neque enim Bellonio vnquam dabo, quod Matthiolus concedit, Theoph. illic de Picea sylvestri fuisse locutum, duosque alios Theoph. locos opponam, in quibus *πίτρυς ἀγρία* id est Pinus sylvestris legitur, vel Bellonij sententia. Fallitur enim ipse Matthiol. in his Theophr. locis, in quibus multi alij errarunt. Nam vox *ἀγρία* interdum arborem eam significat, quæ Plinio Aquifolium, officinis Agrifolium dicitur, interdum aliarum arborum epitheton est, ut cum dicitur Theo

Locus.

Lib. 16. c. 10.

Lib. de Cō.  
cap. de pic.Lib. 3. Hist.  
cap. 16.

## PINASTER III.

clusij omnium minimus.



enim ipse Matthiol. in his Theophr. locis, in quibus multi alij errarunt. Nam vox *ἀγρία* interdum arborem eam significat, quæ Plinio Aquifolium, officinis Agrifolium dicitur, interdum aliarum arborum epitheton est, ut cum dicitur Theo



Theoph. *ὡς δὲ κλην τὴν μὲν ἡμέραν ὄναι, τὴν δὲ ἀγρίαν*, idest, Pinum aliam fatiuam esse, aliam sylvestrem. Quare cū montanas arbores sic recenset Theophrastus, *ἐνταῦθα δὲ τὰ τῶν ὀρενῶν, ὃ ἐν τοῖς πεδίοις ἔσονται, περὶ γὰρ μακεδονίαν, ἐλάτη, πεύκη, πίτυς ἀγρία*, non sic hæc interpretanda, neque interpungenda. Montibus autem propria sunt illa quæ in planis non proueniunt: Macedonia Abies, Picea, Pinafter, sed Montibus autem propria sunt illa, quæ in planis non proueniunt, Macedonia Abies, Pinus, Picea, Aquifolium. Neque enim Theoph. quo loco Piceæ historiam tradidit, eam in fatiuam & sylvestrem diuisit, quemadmodum Pinum eodem loco distribuerat: quāquam non ignorem Pliniū scripsisse Piceam æuo suo iam in domos receptam consili facilitate. Adhæc quæ scribit Theophrast. *ἐνταῦθα δὲ τὰ τῶν ἀγρίων ἃ καὶ πρότερον ἐλέχθη, ἐλάτη, πεύκη, πίτυς ἀγρία*, non sic rectè interpreteris. Ergo inter sylvestria perpetuo folio sunt ea, quæ prius diximus, Abies, Picea, Pinafter, sed, Ergo inter siluestria perpetuo virent ea quæ primo libro diximus, Abies, pinus, picea, Aquifolium. Præter pinos sylvestres de quibus diximus, sunt aliæ quoque, steriles, & fructifera: Pinus Tubulus à Plinio appellata, ab Italis hodie *Mugo*, sterilis: Teda arbor à Plinio dicta, fructifera, à Bellonio Pinafter, ab Italis hodie *Cembro*, ab Allobrogibus *Aunia*. Tubulus, vel, vt in quibusdā Plinij codicibus legitur, Tibulus in aliis Stubulus, in altissimis

Lib. 3. Hist. cap. 4.

Lib. 3. Hist. cap. 10. Lib. 16. c. 10.

Genera alia. Nomina Lib. 16. c. 10. Forma. & Locus

PINUS TUBULUS,  
*Mugo Italarum.*

TEDA ARBOR,  
*Cembro Italarum.*



montibus prouenit, sine caudice, ramis à radice circū quaque per terram sparsis, tubulorum modo, vnde forasse ei nomen hoc impositum, decem, & interdum quindecim cubitos longis, gracilibus, enodibus, olim ad vsus liburnicarum, nunc ad dolia vinaria cingenda, quod sint non solum longi, sed etiam flexiles, & tenaces. Fructus eius est paulo maior quàm Pinastris sterilis vulgaris, sed plurimum resinofus, odoris non ingrati. Teda in editissimis, & frigidissimis montium verticibus gignitur, parte ad Septentrionem spectante, niues ac gelicidia minimè reformidans, vt quibus exhilaretur potius quàm ledatur, ex vltimo

Teda. Locus.



*Forma.*

ultimo prorsus montium situ ac supremo omnes alias arbores despiciens, Pino ut plurimum humilior, nonnunquam æqualis, similiter ramosa, magis quam Pinus, aut quævis alia conifera arbor, in metam fastigiata: cortice proximè terram undulatis lineis rugoso, superna caudicis parte, & in ramis, glabro, leui, tenui, subalbido, ut in Abiete, non ut in Pino subrubro, ex quo victo & corij modo ductili pyxides, corbes, aliæque vtenfilia fiunt. Rami ut in Abiete, Picea, Larice non recti, velut brachia ex lateribus panduntur, sed distorti, & valde furculosi: virides humore multo turgent, exiccati rugas contrahunt. Folia, ut in Pino, longa, mucronata, ex singulis turberculis quina emergunt, in Pino bina duntaxat. Eadem sic extremis furculis coaceruata eminent, ut penicillum, siue crinitam comam referant, in cuius medio fructus nouellus inclusus, sensim augescens in conum absoluitur, è nigro purpurascentem, Piceæ cono similem, breuiorem, molliorem, resinofum, cuius nuclei parui trianguli, ab satiuæ Pinus nucleis sapore diuersi non sunt, nisi quod syluestrium omnium modo, asperitate quadam linguam offendunt, ita fragiles ac teneri, ut non solum hominum dentibus facile cedant, sed etiam auium rostris pertundantur, quas Allobroges Piquarellas vocant, Gesnerus Caryocatactas. Quam ob causam has Tarentinas nuces à Plinio vocatas fuisse verisimile est, quo loco is nucum Pinearum genera explicat. Harum, inquit, genus alterum Tarentinæ, digitis fragili putamine, auiumque furto expositum in ipsa arbore, non quod Plin. veteresque Pini genus aliquod statuerint Tarentinum, ut putant Matthiol. & Bellon. sed quod nuces hæ Tarento Romam veherentur. Quæ de hoc Pinus genere diximus omnia, ei planè conuenire quam solam improprie Bellon. Pinastrum appellat, facile perspiciet is, qui hæc nostra cum illius capite de Pinastro conrulerit. Matthiolus ab Italis Cembro & Cirmolo vulgo vocari prodidit, & tum in agro Tridentino frequentem prouenire, tum in Gavia Phœbeæ vallis, tum in Flemenfibus, Vulturenæ, ac Rhethorum montibus, & in Comitatu Tyrolensi, non longè ab Oeniponte, ex eaque manare resinam albam, & odoratam, ut & ab aliis id genus plantis. Huius materia à Germanis ad ædificia expetitur, & maximè commendatur, non solum quod pulchra sit, & venarum fluuiis placeat, sed etiam quod odoris suauitate excellat. Eandem Tedam arborem Plinij esse idcirco diximus, quod cum sex coniferarum genera is autor enumeret, Pinus ipsius esse non possit, de satiuæ enim loqui videtur: neque Pinastrum, insignis altitudinis, & in planis nascens: neque Tubulus, quod eius historiæ repugnet: neque picea, neque Larix, ut ex earum historiis intelligi poterit. Quare efficitur ut sextum genus sit Teda proprie dicta, succo inquit Plinius, abundantiore quam reliquæ, parciore, liquidioræque quàm in Picea, sic enim legendum, flammis ac lumini sacrorum etiam grata. Hanc etiam aliquanto post inter arbores numerat, quæ montibus gaudent: montes inquit, amant Cedrus, Larix, Teda, & cæteræ ex quibus resina gignitur. His locis Matth. Bellon, atque alij Plinium falso erroris insimulant, Tedam pro arbore usurpantem, quæ τῆν δάδα, siue τὸ δαδῶν, idest pingues Pini, Pinastri, ac reliquarum resiniferarum arborum assulas, non arborem significet, quasi verò Teda ὁμονύμως de utroque dici non possit, aut illam Tedæ significationem Plinius ignorauerit, cum eo ipso loco scribat, Laricis morbum esse, ut Teda fiat. Mirum igitur nemini videri debet, Tedam modò pro arbore, modò pro pinguibus Pinorum assulis sumi, neque illud etiam, flammis ac luminibus sacrorum Tedam arborem gratam fuisse, cum ex ea, velut ex aliis id genus, resina fluat, lignumque eius, ut cæterarum, pingue, & resinofum in Tedam vertatur, idque propterea Romani domi, & in sacris accenderent. Sed quoniam in Tedæ mentionem incidimus, quid ea sit diffu

Lib. 15. c. 10.

lib. 1. dist. 74. De conif. de Pinastr.

*Usus.*

Lib. 16. c. 10.

Cap. 8.



diffusius explicemus. Morbum τῶν πεύκων, idest Pinis, accidere Idæi narrant, inquit Theoph. cum nō solūm cor, sed & pars externa caudicis, in Tedam abierit, tunc enim veluti strangulari: id autem sponte euenire, ob plenius arboris nutrimentū, coniectari nos posse, quod totū Teda fiat. Est autem hic Pinis proprius morbus, cuius causam idem Theophr. alibi explicat. Pini radix tota, inquit, in Tedam vertitur. Causa eadem quæ in animalibus. Quod enim in ea calescit perpetuò, coquiturque, purum hæret, ac coagmentatum densatūque pinguitudinem quandam efficit: quod verò nutrimentum in alias partes subit, sursum fertur ad eas quæ supra terram sunt alendas, non per hæc partes pingues, sed per alios meatus, quandoquidem totis radicibus in Tedam mutatis arbores moriuntur, intercluso spiritu, nullōsque iam aditus habente per quos commeari possit, strangulatæ quemadmodum animalibus euenit quæ nimis pinguescunt. Obturantur enim meatus à pinguitudine densata, vt ad extremas vsque partes spiritus penetrare nequeat. Hæc Theophr. Partes radicū Pini pingues. Aruerni Tiè vocant, & Thesè, vocibus à Teda deflexis, & iis concisis atque accensis lucernarum vice vtuntur. Cæterum cū multa Teda ad picem conficiendam sit opus, non defuit ratio, qua Pinus non sua solūm sponte, sed etiam arte Teda fieret. Eam sic declarat Theophr. Idæi caudici corticem auferūt à parte ad solem conuersa, duobus tribusue à terra cubitis: eo maximè confluxum Teda, siue pinguem resinōsumque succum fieri anno post affirmant. Id cum securi detraxerint, altero post anno denuo ἐν δασύτῳ, idest succum pinguem fundit, siue Teda fit: ac tertio similiter. Postea ob has incisiones, arbores putrefactæ à ventis deiiciuntur: tum earum cor eximitur: hoc enim maximè in Tedam abit, effodiuntur post & radices, quæ etiam, vt diximus, totæ Teda fiunt. Hæc Theoph. Impropriè verò Teda appellamus alia quoque ligna, quæ flāma olei vel picis illitu concepta faculæ modo lucent. Hinc Ceres dea Tedifera à Poëtis vocatur, & Teda pro nuptiis siue pro coniugio ipso accipitur, quod in nuptiis faces præirent. Fuere qui hoc modo Pinorum genera distribuerint, vt aliud esset mite, aliud agreste: & agrestis, aliud mas, aliud fœmina, marem esse maritimam Pinum existimantes, fœminam, Idæam, quibus addunt Macedones tertium genus sterile. Hæc à supradictis diuisionibus verbis tantū discrepare videntur. Marem dixerunt esse breuiorem, rigidiore folio, ligno duro, in opere fabili sese contorquente: fœminam proceriorem, pinguioribus foliis, mollioribus, magis inflexis, & incuruis, ligno in opere tractabiliore, molliore, nec sese pandante aut distorquente. Legendum Porro in Theophr. ἀστραβεί, quod opponitur τῷ στεφομένῳ, non vt in publicis codicibus legitur, εὐστραβεί. Pinus fœmina Ægida habet Spissum hoc, candidum, pulchrūque, ex arboribus vetustioribus gignitur. Faciunt ex eo tabellas pictorias atque codicillos. Id autem est cor eius, quod minus picis Tedaque gignit. Larix fœmina habet quam Græci vocant Ægida inquit Plinius, mellei coloris. Inuentum est pictorum tabellis, immortale, nullisque fisisile ærimis, hoc lignum. Proximum medullæ est. Explicatis Pinorum differentiis atque naturis, nunc de Picea dicendum.

A Theophrast. veteribꝫque Græcis πικρα Picea dicitur, à Sequanis hodie Pesse, Arabicè Arz, Italicè Pezzo, Germanicè Thamen bau, Hispanicè Pino negro, Gallicè Pesse & Soiffe, Anglicè Piche tre: ab Allobrogibus Soiffe, Bellonius Sapini nomine descripsit. Nasceitur in editis montium iugis, caudice recto, non minus quàm Abies procerò: cortice ex cinereo pallefcente, lento, & lori modo flexili, aliquantulum scabro, & dum rugosus fit sic dissiliente, vt crispus appareat: ramis Abieti similibus, similiter ordinatis, sed in terram inclinatis, surculosis, surculis propendentibus: foliis Abietis, herbaceo virore latioribus, non

Lib. 3. Hist. cap. 10.

Li. 6. caus. cap. 15.

Lib. 9. Hist. cap. 2.

Theophr. Li. 3. ca. 10.

Theophr. li. 3. ca. 10. Lib. 16. c. 39.

Nomina

Locus.


Forma.



## P I C E A.

Lib. 3. Hist.  
cap. 6.

Lib. 16. c. 25.

Lib. 4. Hist.  
cap. 10.

gna, & in opere fabrili tractabilior, quia venis est rectoribus, minúsque nodosa. Inter Piceæ corticem, & lignum, gummi modo resina cōcrefcit, ac nonnūquam etiam liquida inde manat, quam Allobroges *Binioum* vocant, quasi Benzor num, & ad recentia cruenta que vulnera summopere commendant. Hanc esse *πίτυν* Theophr. id est Piceam facile quiuis intellexerit ex eius cum Pinu collatione, si ex loco illo Theophr. maculas aliquot deleuerit, mēda quedā correxerit, meliorémque quàm Gaza interpretationem adaptauerit. Οἷδὲ περὶ τὴν *πικρὰν*, inquit Theophr. ὅτε τὴν ἀχαρπὸν λέγουσιν, ὅτε τὴν ἡμέραν *πικρὴν*, ἄλλην δὲ *πίτην* εἶναι φασί. καὶ ὅτι τὸ *φέλος* ἐμφανέστερον εἶναι τῇ *πίτῃ*, καὶ ἔχει τὴν τε *λεῖστην*, καὶ τὸ μέγεθος, καὶ ἐν ταῖς ἐργασίαις ὡχρησθαι τὸ ξύλον. Τὸτο δὲ τῆς *πικρᾶς* καὶ παχυτέρον, καὶ λεϊότερον, καὶ ὑψηλότερον εἶναι. καὶ τὰ φύλλα τὴν μὲν *πικρὴν* ἔχει πολλὰ, καὶ λιπαρὰ, καὶ διασεία, καὶ κεκλιμένα, τὴν δὲ *πίτην* καὶ κωνοφόρον τρυφήν, ὀλίγα τε, καὶ ἀρχιμωδέτερα, καὶ πεφευγμένα μάλλον. ἔτι δὲ τὴν *πίτην* ἐμφανέστερον τῇ *πικρᾷ*. καὶ ὅτι τὴν *πίτην* ἔχει ὀλίγην τε, καὶ παρὰ, ὥστε καὶ ἥτιον κωνοφόρον, τὴν δὲ *πικρὴν* ἐνυδρὴν καὶ πολλήν. φύλαι δὲ ἐν μὲν τῇ *πικρᾷ* ἡ *πίτυς* ὀλίγη, περὶ δὲ τὴν ἡλείαν πολλή. ὅπως μὲν ὅλη τὰ γένει διαμφοσέηται. ἡ δὲ *πίτυς* διοκτὶ τῆς *πικρᾶς* διαφέρειν, τῷ λιπαρώτερι εἶναι καὶ λεπτοφυλλοτέρῃ, καὶ ὁ μέγεθος ἐλάττω, καὶ ἥτιον ὀρθοφυῆς. ἔτι δὲ καὶ τὸν κῶνον ἐλάττω φέρειν, καὶ πεφευγμένα μᾶλλον, καὶ τὸ χερυον *πίτῃ* δέονται. ἀμφὺ δὲ *τελεχόφυλλα*, καὶ *πίτυς* τὰ ἐξυλὰ λευκότερα, καὶ ὁμοιότερα τῇ ἐλάτῃ. Διαφορὰν δὲ ἔχει *πίτυς* καὶ ὅλην πρὸς τὴν *πικρὴν*, &c. Id est, Arcades verò Pinum in satiuā & sterilem minimè partiuntur, sed à Pinu Piceā differre aiunt. Piceæ nāmque magis conspicuum ac eminentem caudicem esse, lauiem, magnū, in opere fabrili vtilem, vt pote qui crassior, lauior, procerior quā Pino sit. Præterea Pini folia multa, pingua, deflexa, inflexa esse, Piceæ verò, quæ & ipsa conos fert, pauciora squallidiora, horridiora. Ad hæc picem in Pinu notioiem esse quàm Picea: paucam enim ac amaram ex Picea stillare, vt & minores conos in eadem gigni, vberiorē autem & odoratam è Pino. In Arcadia sanè Piceæ pauca crescunt, circa Eleam multe. Sic igitur toto genere discrepant. Picea certè hoc differre à Pinu videtur, quod pinguior Pinus sit, humilior, folio tenuiori, minùs recta, item quòd breuiorem

conum



conferat, & horridiorem, ac nucem magis resinofam. Vtri que folium capillatum, sed Piceæ materies candidior Abietique similior. Est & alia inter Pinum & Piceā differentia, & c. Bellonius cū Abietē à Gallis *Sap*, vel *Sapin* vocari sciret, eamque quam hīc depinximus arborē Abieti admodum esse similē, Sapinum appellare voluit, quæ Picea nominari debuit. Nā Sapinus quidē non solū inferiorem Abietis partem significat, sicuti Fusterna superiorē, quod tradit Plinius, sed etiam arborem, id quod eiusdem Plinij auctoritate confirmatur. Prælum, inquit, ē Sapino, alia potissimum, facito. Alibi genera nucum Pinearū is enumerans, Tertium, ait, Sapineæ, ē Picea sativa, nucleorum cute verius quā putamine, adeo molli, ut simul mandatur. Ex his verbis perspicuum est Plinio Sapinum arborem, scilicet Piceam sativam designari, cuius nucem Sapineam vocat, siue Piceā eo loco, τὴν πεύκην, siue τὴν πίτυν intelligat. Sed quæ nā est Theo. πῖτος φθειροφόρος lib. i. *Caus. cap. 9.* quam Gaza pediculiferam, Scaliger pediculariam interpretatur: an diuersa ab ea quam idem Theophr. in historiis describit: an eadē? deinde an φθειροφόρος dicta, quod, ut tradit Plinius, totis paniculis minoribus gracilioribusque, minimos ac nigros nucleos pediculis similes gignat? Pini Piceæque fructus Septembri mēse maturi sunt. Pinus apricis locis gaudet: opacis aut nullo modo, aut malè provenit. Pinus & Picea generi eidem adscribuntur, inquit Dioscorides, sed quandam flagrant specierum distinctionem. Arbores hæc cognitæ, quarum cortex astringit. Prodest tritus & illitus intertrigini, vlcibus summum corpus occupantibus, ambustisque, cum spuma argenti, & manna: vlcera delicatulorum acrimoniam recusantium cerato Myrtino exceptus ad cicatricem perducit: tritus cum sutorio atramento serpētia cohibet: suffitu partus & secundas eiicit: potus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorum trita & illita inflammationes leniunt, vulnera ab inflammatione vindicant: trita autem, & decocta in aceto feruenti collutione dentium dolores leniunt: hepaticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua, aut mulsæ pota. Pineæ nucis cortex & folia potu idem præstant: teda earum particulatim secta, si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit Spatha acoporum, pessorumque compositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti confectionem excipitur: ea ipsa fuligo circumlitionibus efficacissimè imponitur, quibus palpebras ornant, coloremque mentiuntur: arrosis oculorum angulis, callosis glabrisque genis, & collacrymationibus opitulatur. Pityides appellantur Pinorum Piceæque fructus, qui in conis inueniuntur. Vim adstrictoriam habent, & aliquantulum excalfacientem: tussi & pectoris vitiis auxiliatur, per se, aut ex melle sumpti. Nuces Pineæ si repurgatæ mandantur, vel cum passo, aut cucumeris semine bibantur, vrinā ciēt: acrimonias in renibus & vesica hebetant: stomachi rosiones leniunt: datæ cum portulacæ succo virium infirmitatem roborant, corruptorū quoque humorum labem obtundunt. Pineæ nuces integræ recenter arboribus decerpæ in passo franguntur, & decoctæ vetustæ tussi, aut tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur. Hæc Diosc. ex Ruellij versione, in qua diligēter quædā attendenda & animaduertenda sunt: ac primū, quod dicit Diosc. πῖτος γώμεον δένδρον: ἐστὶ τὸ τῆς αὐτῆς γένους ἢ ἡ λεγομένη πάλκη, ἔσθαι διαφέρουσα: quidā, διαφέρουσι. Hæc sic Lacuna vertit. Picea vulgaris arbor, Pinusque eiusdē generis sunt, specie tamē differunt: Sed hoc leuiusculū. Prodest cortex tritus & illitus intertrigini. ἄρμος ζῶν πρὸς τὴν παρατεμνύμεναι λεῖος, καὶ πλάσσειν: Cornari⁹ legit καὶ πατρίδιμος, id est inspersus. Res ipsa vsum sui ostēdit. Pulvis enim inspergitur, non illinitur. Pineæ nucis cortex & folia potu idē præstant. πῖτος ἢ τὰ αὐτὰ ἢ ὁ τῆς προβίλης φλοιός, καὶ τὰ φύλλα πωθέντα. Cornarius hæc de strobilo arbore, non de Nuce Pineæ intelligit,

Li. 16 ca. 39.  
Lib. 15. c. 10.

Li. 16. c. 10.

Tempus.

Locus.

The. lib. 2.

caus. cap. 9.

Lib. 1. c. 74.

Vires.

Emb. 71. li. 1.

Ibidem.



Li. 16. c. 10.

Libr. 7.

quæ arbor eadem cum Pinastro est: id quod Plin. auctoritate cōfirmat, scribētis arbores quas per oram Italiæ Stobilos vocant, plerōsque arbitrari easdem esse cum Pinastris. Auctorem etiā adhibet Paulum Ægi. qui de coni cortice, & foliis eadem cum prodidisset quæ de Strobili cortice, & foliis Diosc. mox de Strobili conorum fructu seorsum tractat. Præterea cum de fuligine differit, Pinum, Conum, Piceam, vt tres diuersas arbores nominat. Hæc Cornarij opinio facile refelli potest. Nam in Plinij vetusti exemplaris membranæ pro Strobilis Tubulos legimus, vt sit Tubulus Pinastri genus, de quo inter Pinorum genera disseruimus: Conus verò Strobilifque, vt iam ex Galeno probauimus, & demonstrabimus, non pro arbore, sed pro Nuce Pineæ vsurpatur. At enim Strobilum Pinastrum esse concedamus. Cum iam Dioscor. de viribus corticis Pinus siue mitis, siue agrestis vniuersè quidem scripserit, cur frustra hîc eadem repetit? Iam verò cū Pinastri fructus edulis non sit, qui quæso Strobili, idest Pinastri fructus Cornarij sententia vires imbecillas roborare poterit, vel cætera præstare quæ Strobilis Diosc. attribuit? Quare à Galeno, Paul. Diosc. Conum & Strobilum, pro Nuce Pineæ, non pro Pinastro accipi puto. At Pineæ nucis qui cortex quæ folia erunt, cum arborum, herbarumque folia tantum, ac florū esse dicantur? Noces Pineas videmus squamatim compactilibus nucamentis siue vnguibus totas cōstare, sub quibus nuclei carnosi, molles, esu suaues abduntur. Has integras & nucleos edules Græci modo ancipiti harum dictionum significato nominant κώνες, κοκχάδες, στροβίλοις, modò epitheti accessione distinguunt, quemadmodum Diosc. ὅλως στροβίλοις πρὸς ῥάτους dixit, Galenus ὅλως χλωρὸς, id est integras Pineas noces adhuc virides, recentes, & tenellas, non, vt Ruell. in Diosc. vertit, receter ab arbore decerptas, & στροβίλοις καθαροὺς, à nucum suarum putaminibus repurgatas, quales hodie veneūt, στροβίλοις κεκαθαμένους Asclepiades, & Andromachus appellant: Galen. στροβιλιῶν πυρήνας. Paul. κώνες καθαρόν, vulgus nostrum *des pignons*. Nucum Pinearum cortex extrema est pars, ac veluti amictus tegens, & eas vndique ambiens, qui cultello vel deglubi, vel deradi potest: folia, lignosæ squamæ, aliæ aliis incumbentes, nucleorum opercula, & cōceptacula, quarum gradatim procedēte structura coagmentatur Nux Pineæ, & in metram colligitur, sic dicta, quòd foliorum modo, cum maturæ noces decidunt, sese pandunt, & explicant. Hæc folia atque cortex eadem facultate pollent, qua arboris ipsius folia, cortexque, scilicet adstringente. Quod verò de teda Diosc. prodidit, eadem Galenus. Dolentes dentes colluuntur pinguibus tedis in aceto ferue factis: aut Halicacabi corticis, & tedæ in aceto feruefactæ decocto, post longam cocturam: aut tedarum ramenta, malicorium, alumen scissum in aceto ad tertias coquuntur, eoque decocto tepido os colluitur. Idem medicamentum quoddam ad dentium dolorem præscriptum dum coquitur, σπάθη διαδίνη, idest spatha siue rudicula, ex teda parata, mouere iubet. Pityides appellantur Pinorum Piceæque fructus inquit Dioscor. πινυίδες ὃ χλωιὸν τὰν ὀκάρπος τῶν πινύων, ἢ τῆς πεύκης. Locus Matthi. suspectus is videtur. Putat enim verba illa τῆς πεύκης alicunde in cōtextum irrepisse, & merito quidem. Quid enim πινυίδες aliud significare possunt, quàm τῶν πινύων καθαρόν, id est, Picearū fructū, vt στροβίλοις, de quibus mox idem scriptor agit τῶν πινύων, idest Pinorum? Quod de Strobilis repurgatis tradit Diosc. παρηγορεῖσιν ὃ καὶ τομαίων διήλμους μετ' ἀνδράχνης χυλὸν λαμβανόμενοι, ἐξερεῖδουσι τὴν ἀλονίαν σώματος, ἢ τὰς τῶν ὑγρῶν διαφθορὰς ἐξαμβλύνουσι, Plinius his verbis expressisse videtur. Nuclei nucis Pineæ sedant acrimoniam stomachi, rosionesque, & contrarios humores consistentes ibi, & infirmitatem virium roborant, ex quibus perspiciatur Plinium nucleos nucis Pineæ Stobilos appellasse, deinde τὰς τῶν ὑγρῶν διαφθορὰς legisse, non διαφθορὰς, vt Diosc. habent vulgata exemplaria: postremò ἐξερεῖ-

Aet. libr. 8.  
cap. 46.  
Li. 6. med.  
gen.

Lib. 5. med.  
part. cap. 9.

Li. 23. ca. 8.



ἐξερῖδαν ὁρίαν σῶμας, roborant infirmitatem virium, reddidisse. Cornarius tamen non ἐξερῖδαν, sed ἐξερῖδαν legendum arbitratus, eximunt corporis debilitatem, conuertit. De Strobilo hæc Galen. Strobilus viridis torus habet cum humiditate amaritudinem, quampiam & acrimoniam. Proinde purulentis, atque adeo quibuscunque expedit quæ in thorace & pulmone sunt tussi reicere, facilem eam præbet. Porro fructus eius esculentus nutrimentum est coctu difficile, & validum, at medicamen est asperitati gutturis leniendæ congruum, cum videlicet in aqua maceratus, omnem in ea acrimoniam reliquerit. Sic enim quod superest minùs mordax, magisque emplasticum redditur, & ad mediocrem caliditatem trigiditatemque reducitur, ex aquea terreæque mixtum substantia, minimum particeps æræ. Quæ sequuntur præter illa, scripsit Matthiolus. Aqua è viridibus Pinorum nucibus destillata rûgas in facie delet, & mammas admodum exuberantes<sup>1</sup> cohibet, si linteolis in ea madefactis sapius foueantur. Eadem vuluam angustiores reddit, & à fluxionibus tætur, sed longè ad hoc efficacior est succus. Nuclei Strobilorum Pinus domesticæ valdè sunt vtilis, nimirum qualitatibus suis temperatis proximi, paululum ad calidum inclinantes. Murant, leniunt, glutinant, resoluunt, corpus pingue faciunt, & leuiuscula quadam acrimonia mordent, bene nutriunt, ac quamuis crassiusculum corpori præbeant alimentum, non tamen improbantur. Emendant enim humiditates in intestinis putrescentes, ægrè tamen coquuntur, ideòque naturis frigidis dari debèt cum melle, calidis autem cum saccharo. Caterum tepente aqua macerati acrimoniam exuūt, & oleosam quam habèt pinguedinem. Sanant frequenter deuorati neruorum ac dorsi dolores. Dantur vtiliter ischiadicis, paralyticis, stupidis, & tremore affectis. Pulmones mundant, & eius vlcera, humores lentos & saniem eorum purgantes, quare tussientibus dantur. Venerem excitant aqua tepida priùs macerati, deinde saccharo aut melle excepti, & deuorati. Semen etià augment. Præstât quoque ad renū, & vesicæ vlcera, ideòq; vrinæ stillicidiis & ardorib<sup>9</sup> auxiliatur. Corticis conorū Pini in aceto acerrimo decocti suffitus perquam vtilis est dysentericis.

Embl. 71. li.  
1. Diosc.

Lib. 7. sim.

li. 1. Diosc.  
cap. 79.

## ABIES

## CAP. XIII.

**A**BIES à Græcis ἄβιν nominatur, ab Italis *Abete*, à Gallis *Auer*, *Sap & Sapin*, à Germanis *Thannem*, & *Thannenbaum*, Hisp. *Abeto*, arbor Angl. *Mastre*, & *Deele*. Abies arbor est excelsa, Pino Piceæque procerior, imo omnium coniferarum, dēpta Cedro, altissima, rectissima, maximè enodis. Cortex huic albi-  
cat, & si flectatur, facillè frangitur. Abietis pars quæ à terra est, inquit Plinius, enodis, & fluuiata, decorticatur, atque ita Sapinus vocatur: superior pars nodosa, duriorque, Fulsterna. Rami, non vt in Picea terrā versùs flectuntur, sed in cœlū erecti stant, atque ex lateribus vtrinque prodeuntes surculos emittunt crucis figura, sicut & in Picea. In his folia similiter disposita, vtrinque scilicet ex ramorū surculorūque lateribus emergunt, & vt ait Plinius, insecta sunt pectinum modo, latiuscula, breuia, dēsa, leuiter pūgētia, hyeme nō decidua, dilutæ viriditatis. Conos fert palmæ lōgitudine, Piceæ conis adsimiles, in quibus semen est subalbū, sine vlla medulla. Theoph. Abietē quādā marē, quādā fœminā esse tradidit, easque foliis differre. Mari enim acutiora, magisque pungentia, ac magis flexa, quare aspectu crispior tota arbor videtur. Materia etiā differūt, cādidior in fœmina, molliore, operique faciliore, atque toto caudice proceriore. Mari ea magis varia est, latior, durior, medulla plenior, denique aspectu min<sup>9</sup> pulchra. Præterea Conus maris paucos nucleos habet in priore tātū parte, fœminæ Conus nullos omnino, vt Macedones dixerunt. Abieti folia pinnarū modo quæ

Nomina  
Forma.

Lib. 16. c. 39

Lib. 16. c. 24

Lib. 3. Hist.  
cap. 10.

Genera



## ABIES.

Ibidem.

Lib. 3. cōp.  
med.gen.

Ibidem.

Li. de. Cō.  
ca. de Refi.  
Lib. 1. c. 77.Bello. de  
Conif. ca.  
de refi.

aiiū alas cōponūt, in breuiora foliola continuantur, aliis super alia iacētibus & impositis, ita compacta, vt minora & breuiora perpetuo sint posteriora, quæ versus cacumē spectāt, & antepositis succedunt, ea figura testudinem referente, simillimāque Bæotorū fornicibus. Sic enim vertere, emendare, & παραφρασεως exponere mihi visum est hæc verba Theophr. ἐχει ὁ ὡστερ ἀπὲρ γαίης τὸ φύλλον, καὶ ἐπ' ἐλαττον, ὥστε τὴν ὅλην μορφὴν εἶναι θολοειδῆ, καὶ παρομοίαν μάλιστα ταῖς βοιωτικαῖς χαμαῖραις, Gaza κυάθοις legit, publica exemplaria κυάθους. Dēsa adeo sunt hæc folia, vt nec niuē, nec imbrē trāsmittāt. Denique arbor est aspectu decora, magnitudine excelsa, Pinóque procerior, à qua etiam ligno non parū distat. Nā Abieti neruosum, molle, leuég, Pino teda pingue, graue, carnosius. Nodi plures Pino, sed duriores Abieti, imo in Abiete quā in reliquis ferè omnib<sup>9</sup> duriores, & si illi molli<sup>9</sup> lignū sit. Vt Pinus Aegida, ita Abies albū habet, quod λοῦσον vocatur, Aegidi proportionē respōdēs, cuius nominis veltigia etiā hodie supersunt.

Nā Iuræ montis lignatores Abietū Picearūmq; cādidiſsimos truncos nō nodis interceptos, sed recto venarum procurſu fluuiatos, & ad opera intestina faciles, nūc *Ouchon*, nūc *Louchon*, vocāt. Abies inter cortices præstātissimū illū liquorem cōtinet, qui Itolorū vulgo *Lagrīmo* vocatur, idest, lacryma Abietis. De hac veteres, Matth. putat, nihil literarū monimētis consignasse, nisi quis dixerit Galenū liquidam illam Piceæ resinam, quā Terebinthinæ loco institores vēdebāt, pro Abiegna lacryma accepisse, tum quod scribat illā gustu odoréque terebinthinæ esse persimilem, id quod in Abiegna lacryma deprehēditur, tū quod eadem sit quodāmodo Terebinthina acrior, quibus qualitatibus liquida Piceæ resina caret. Hæc impulerūt Matth. vt suspicetur his Galeni verbis mēdū aliquod subesse, maximè cū is scripserit in Euphorbij medicamēto, inter resinas cæteris odoratiores esse Terebinthinā, & Abiegnā, hāncque illa calidiorem, quāuis, inquit Matth. veteres in arborū resiniferarū historia in multis sibi ipsis nō cōsentiant. Qui Abiegnā lacrymā clarissimā Larignā esse putant, vehemēter errāt. Illa etenim inter Abietis cortices vomica modo coaceruatur, & secta veluti cute, vt in abscessibus pure tumidis fieri solet, elicitur, Larigna verò manat ex Laricis caudice ad medullāvsque terebrato, id quod experiētia sibi cognitū ac cōpertū esse Matth. asseuerat. Abiegna lacryma, siue Abiegna resina liquida in quibusdā Italiæ locis *Olio d'aueto* nominatur, idest oleum Abiegnū, quæ vox Belloniū mouit vt crederet id resinam esse ἐλαγιώδη, idest oleosam Dioscor. quō loco non resinarum genera, id quod prius fecit, sed resinarum coloris differentias explicat. Officinæ Terebinthinam Venetam vocant, Galli *Terbentine de Venise*. Ex nouellis Abietibus ea colligitur, quarum cortex nulla rima finditur, sed glaber tuberculis scater, cū annosarum cortex in rugas contrahatur, rimosus sit, & sine vllis tuberculis. Tuberculis pastores armentarij bubuli cornu acutum fastigium sic adigunt, vt inde liquidam illam resinam excipiant, quod cum per totū diem in plurimis tuberculis moliti sunt, operē præciū se fecisse, putāt, si cornu vnū quatuor vnciarū capax liquore illo plenū domū retulerint, quia vnū quod



quodq; tuberculum vnâ vel alterâ duntaxat guttam contineat, quo fit vt rarior fit is liquor, maiorisq; pretij. Ex Abiete veluti ex Pinu; ac Picea resina etiam sicca & candida colligitur, quæ thus ementitur, ac pro eo à vulgo vsurpatur. Abies in montibus nascitur, in planis minimè: opacis locis gaudet. Paulo ante solstitium floret, auctore Theophr. Est autem flos eius κρόκινος, id est cocci colore, vt in excusis libris reperitur. Gaza verò κρόκινος legit, id est crocus. Fructum profert post vergiliarum occasum. Matthiolus id negat, Abietemque omnem flore & fructu carere scribit in Tridentinis montibus, quorum sylua Abietes multas alunt. Cortex & resina Abietis arida, qualitatibus ac viribus cortici & aridæ Pinus resinæ valdè sunt similes, nisi quod paulo acriores, magis detergent. Abietis liquida resina, calida siccaque ordine tertio, acrimonia quadam sua tergendì vim obtinet, & ad veræ Terebinthinæ qualitates proximè accedit. Vulneribus recentibus, præsertim capitis, maximè confert, quod non solum ea mundet, sed & solidet. Sumpta semiuncia pondere, per aluum biliosos humores vacuat, renes absterget, vlceratos sanat, vrinam cit, calculos eiicit, arthriticos dolores mulcet, coxendicum cruciatus lenit. Nucis magnitudine deuorata cum nuce moschata, & saccharo, stranguriam sanat, pudendorumque vlcerationi maximè succurrit. Abies nauibus aptissima est: triremes enim & longa nauigia ex ea, lenitatis gratia, fiunt. Edificiis optima quæ vetustissima, modo cariola non sit. Quin & ad tabulas pictorias, & ad plurima alia utilis est. Ponderis sustinent valdè Abies, & Pinus. Renittuntur enim, nec temerè rumpuntur, priusque carie quam viribus deficiunt.

Diosc. li. l. cap. 93.  
Dod. lib. 6. cap. 92.  
**Locus.**  
Theophr. lib. 3. Histo. c. 4. & li. 2. cau. c. 9.  
**Temper.**  
Lib. 3. Histo. cap. 6.  
Ibidem.  
**Temperam. & Vires.**  
Dod. ibid. Matthi. & Dodo. ibi.

Theophr. li. lib. 5. Histo. cap. 8.  
Plin. lib. 16. cap. 42.  
Theophr. li. 5. Histo. ca. 7.

LARIX. CAP. XIIII.



Væ Larix Latinè, & Larex, λάρικς etiam Græcè nuncupatur, Gallicè *Melese*, Italicè & Hispanicè *Larice*, Germanicè *Lerchenbaum*. Arbor est eximia proceritatis, Abiete tamen sæpè humilior, nonnunquâ verò æqualis: cortice valde crasso, multis rimis hiulco, intus rubente. Circa stipitem rami veluti per gradus collocantur, cum furculis & adnatis plurimis, Salicis modolentis, coloris lutei, odoris non iniucundi. In his folia ex tuberculis satis à sese distantibus emergunt eaque numerosa, densa, comosa, quæ circiter triginta simul iuncta penicilli pictorum summitatem referunt, oblonga, mollia, Pineis angustiora, minimè aculeata, hyeme aduentante decidua, ita vt sola Larix inter omnes arbores resinam fundentes, frigoris sæuitiam non reformidans, nuda hyemem transigat. Quare Plinius non rectè Laricem in his syluestribus arboribus numerauit, quibus folia non decidunt, neque in iis quarum pungunt folia. Sed quomodo Laricem accipiat nos supra declarauimus. Hac in re Plinij incōstantiam animaduertere licet, alio loco folia minimè aculeata, sed villosa, pingua, mollia, Larici tribuentis, nisi vitiosa in vulgatis exemplaribus lectio nos fallat. Picea minùs alta quàm Larix, inquit Plinius: illa crassiori,

**Nomina**  
**Forma.**

LARIX.



bente. Circa stipitem rami veluti per gradus collocantur, cum furculis & adnatis plurimis, Salicis modolentis, coloris lutei, odoris non iniucundi. In his folia ex tuberculis satis à sese distantibus emergunt eaque numerosa, densa, comosa, quæ circiter triginta simul iuncta penicilli pictorum summitatem referunt, oblonga, mollia, Pineis angustiora, minimè aculeata, hyeme aduentante decidua, ita vt sola Larix inter omnes arbores resinam fundentes, frigoris sæuitiam non reformidans, nuda hyemem transigat. Quare Plinius non rectè Laricem in his syluestribus arboribus numerauit, quibus folia non decidunt, neque in iis quarum pungunt folia. Sed quomodo Laricem accipiat nos supra declarauimus. Hac in re Plinij incōstantiam animaduertere licet, alio loco folia minimè aculeata, sed villosa, pingua, mollia, Larici tribuentis, nisi vitiosa in vulgatis exemplaribus lectio nos fallat. Picea minùs alta quàm Larix, inquit Plinius: illa crassiori,

Lib. 16. cap. 1.  
Cap. 12.  
Li. 16. cap. 10.



læuioríque cortice, folio villosior, pinguior, & densior, molliórque flexuat Picea rariora, siccioráque folia, tenuiora, & magis algentia, totaq; horridior est, & perfusa resina. Hanc scripturam vnus dictionis mutatione restituere licet hoc modo. Picea minùs alta quàm Larix: hæc crassiori, læuioríque cortice, folio villosior, &c. vt, hæc. ad Laricem referatur, quam correctionem sensus & contextus necessariò postulant. Nam si verba hæc, folio villosior, &c. de Picea continenter intelligantur, quí eius folia pingua, densa, molliáque esse possunt, quæ mox dicuntur tenuiora, rariora, sicciora? Ad hæc si præcedentia omnia de Picea, & non de Larice accipienda essent, cur illis particulam, At, discretiuam, vt aiunt, subiicit, cum dicit, At Picea & cætera? Ex his perspicere licet

Lib. 1. c. 91. Laricis corticem læuiorem esse quàm Picea, vt existimauit Ruell. sed eius aculeata folia non esse, cum aculeatum & villosum sint aduersa. Villi enim ad tactum molles sunt, minimè autem spinæ, siue aculei. Flores Laricis vere ex ramusculorum summitatibus exoriuntur, multum odorati, contra Plinij sententiam, qui Laricem inter tristes arbores recenset, nec villo flore exhilarari scripsit. Hi arbores suas valde ornant, quod in purpura ardentem rubescentes, comantibusque foliolis miro naturæ artificio annexi, viatorum oculos non parum remorantur, & recreant. Coni cupressinis admodum similes, paulo longiores

Lib. 16. c. 27. odoris non ingrati, breui petiolo ramis alligati, ipsiq; incumbentes, ex tenuissimis squamulis compactilibus ac foliatisq; contextuntur: quarum singulae binos nucleos foliatos, alæ cicadarum similes, semenq; exiguum, magnitudine seminis Cupressi includunt, quod mansum, Nucem Pineam odore plane imitantur. Laricis materia durissima est, præsertim quæ rubet, & in caudicis medio, odore acrior: quam ob causam in ædificiis quibusuis extruendis cæteris

Lib. 16. c. 10. omnibus longè præstat. Larix, inquit Plinius, nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis vi consumitur, quàm lapides, cum cætera quæ picem & resinam fundunt, accensa fuligine immodica carbonem repente expuant, cum eruptionis crepitu, eiaculenturq; longè. Larix Viétruuio flammam ex igne non recipit, nec ipsa per se potest ardere, nisi, vt saxum in fornace ad calcem coquendam, aliis lignis vratur, nec tamen tum flammam recipit, nec carbonem remittit, sed longo spatio tandem comburitur, quod est minima ignis & aëris è principiis temperatura, humore autem & terrena materia spissè solidata, non habens spatia foraminum, qua possit ignis penetrare, reiciatque eius vim, nec patitur ab eo sibi cito noceri, propterq; pondus ab aqua non sustinetur, &c.

Cap. 9. li. 2. Quæ falsa esse tum ratione, tum experientia constat. Nam cum omnium consensu, præsertim Plinij, ac Viétruij, Larix resinam liquidam fundat, pinguem scilicet, & quæ, non aliter quàm bitumen, igni admota facilè accendatur, quis credat Laricis lignum pingue, resinofumq; ignem respuere, quum lapides ipsi qui sua natura flammis non accenduntur, si bituminosi sint, perinde ac ligna exurantur, editis continuo flammis quoad in cineres vertantur? Cuius rei locupletissimi testes sunt Flandri, Brabant, & aliæ Aquiloniæ gentes, quæ lignorum penuria, huiusmodi lapidibus suos fouent ignes. Præterea, si Larix neque ignem admitteret, neque carbonem faceret, malè cum iis ageretur qui in Tridentinis montibus, & in ea præsertim valle Ananiis contermina quam Solis nuncupant, ac in Camonica, & Eliotropia, & in Brixienti agro in fornacibus ferrum excoquunt. In iis enim maxima Larigni carbonis ardet copia, neque (vt asserunt artifices) villo alio carbone quàm larigno, rude ferri metallum celerius colliquescit. Lignum etiam Laricis siccum, cum resinofum sit, impetu vehementi flagrat. Quamobrem in Tridentinis montibus Laricina tantum ligna in furnis accendunt, tam iis quibus panis coquitur, quàm iis quibus

hypocau

Matth. li. 1.  
Diosc. c. 74.  
& Epist. 1.  
lib. 4. Epist.



hypocausta calefiunt. Quod autem attinet ad ea quæ narrat Vitruuius de castello quodam circa Alpes, exercitum illic habente Cæsare, ante cuius portam turris erat ex hac materia, alternis trabibus tranuersis, uti pyra, inter se alte compositis, quam fasciculorum virgis alligatorum flamma, facèsque ardentes congestæ ac immixtæ lædere non potuere, existimandum est id euenisse, non quod Laricis materia vri non possit, sed quod ventorum, niuium, frigoris vi, omni denique temporis iniuria, qua perpetuò ferè Alpina regio infestatur, temporis etiam diurnitate durior, exhausto pingui succo veluti lapidea facta, à fasciculis virgarum, facibusque, non facile accendi potuerit, maximè cum arboris cuiusvis solida duraque, nec in particulas concisa materia, non statim primo ignis occurfu facile vincatur, nedum Laricea, quæ soliditate & duritie cæteras omnes antecellit. Hic rursus adnotandum mirum esse Plinium in Laricis historia tantòpere à sese dissentire. Cum enim scripserit Laricem nec ardere, nec carbonem facere, paulo post ait, In Macedonia Laricem masculam vrunt, fœminæ radices tantum. Ex Larice, ut scribit idem, liquor erumpit melleo liquore, atque lentore, nunquam durescens. Et alio in loco, Larix resinam fundit gracilem, ac mellei coloris, virus redolentem, id quod ante ipsum dixerat Vitruuius. Larix habet resinam liquidam, mellis Attici colore: quare etiam medetur phthysicis: *ῥητίνη λαερική*, vel *λαερὴ* dicitur, à Latinis refina Laricea vel Larigna, in officinis Terebenthina, sed falsò. Prouenit etiam in Larice Agaricum optimum, de quo idoneo loco tractabimus. Vallis est supra Benacum lacum, cui à Laricum copia Vallarice nomen est. Sunt & Larices in ripis Padi, & in Slesia. Initio Martij mensis pullulare folia incipiunt ab iisdem germinibus, à quibus præcedente anno deciderant. Fructus Septembri maturus est. Laricis cortex, folia, fructus, nuclei eodem sunt, quo hæc in Pinu, temperamento, sed non eadem virium efficacia. Refina Larigna calida siccaque est, ut & cæteræ resinæ, sed magis absterget. Vtiliter emplastris, vnguentisque ad vulnera detergenda curandaque accommodatis miscetur. In tussi delineta cum melle thoracem expurgat. Sumpta ventrè lenit, vrinam prouocat, calculos expellit. Tardissimè Larix cariem vetustatemque sentit, ob succi amaritudinem, auctore Vitruuio.

Loco sua  
præcitato.

Lib. 16. c. 12.

Lib. 16. c. 10.

Lib. 24. c. 6.

Locus.

Tempus.

Tèpera.

Et Vi-  
res.

## CYPRESSVS CAP. XV.

**C**YPRESSVS Græcis *κυπάρισσος* dicitur, vel *κυπάρισσος*, ἀπὸ κύβητος & ἄρεως τὸς ἀρεμῶνας, id est à partu parilium ramorum, Arabibus *Suro*, & *Seru*, Officinis *Cypressus*, Gallis, Anglis & Belgis *Cypres*, Italis *Cypressus*, Germanis *Cypressen*, Hispanis *El Cypres*. Eius duo sunt genera: Mas, & fœmina, cuius meta in fastigium conuoluitur: mas ramos in latum spargit. Vtraque procera est arbor, recta, crasso caudice, in summitate tantum ramosa: folia Sabinæ bacciferæ, viridiora, longiora, perpetuò virentia: conos Laricis similes gignit, breuiiores, crassiores, duriiores, compactiores, quos Nuces Cupressi vocat, alij pilulas, quidam Galbulos, in quibus semen, minimis granis constans, & quæ vix perspicui possint, non omitendo naturæ miraculo, è semine tam paruo nasci arbores adeo proceras. Hoc semen formicis mirè expetitur, ampliatio etiam miraculo, tantuli animalis cibo absumi natalem tantarum arborum. Id Theophr. dicit esse non *ὑπερῶδες*, ut publica habent exemplaria, id est Piceæ semini simile, sed *ὑπερῶδες*, id est furfuraceum, siue furfurosum: est enim furfuri simillimum. Ligni materies flauescit, dura est, solida, compacta, odorata, maximè cum igni admouetur. Fundit caudex resinam liquidam, Larignæ, & Terebinthinæ similem, sapore acerrimam. Cupressus non nisi in locis calidis sponte prouenit, ut in Creta, Lycia, Rhodo, ac Cyrenensi etiam agro

Nomina

Genera.

Plin. lib. 16.  
cap. 33.


Forma.

Plin. li. 17.  
cap. 10.Li. 1. Caul.  
cap. 5.  
Scalig. ibi.

Locus.

Theophr.  
lib. 4. Hist.  
cap. 6.



Plin. li. 16.  
cap. 33.Lib. 4. Hist.  
cap. 1.Tempus.  
Li. 16. c. 27.Temper.  
& Vires.  
Lib. 1. c. 86.

Lib. 7. sim.

Lib. 3. c. 3.

Lib. 1. Dio-  
scor. c. 86.

agro. Sed in Creta quocunque loco terram mouerit quispiā, nisi seratur alia, hæc gignitur, ac protinus emicat: illa verò etiam non appellato solo, ac vltro, maximè in Idæis montibus, & quos Albos vocant, summis eorum iugis, vnde niues nunquam absunt, plurimæ: quod miremur, alibi non nisi in tepore proueniens, & nutricem magnoperè fastidians. Hæc Plinius ex Theophrasto. Cupressi fructus maturus est mense Septembri, vel incunte Vere. Plinius triferam esse ait, colligique baccas eius mense Ianuario, Maio, & Septembri. Cupressi folia fructusque ad tertiū vsque ordinem desiccant sine manifesto calore, & adstringunt. Cupressus Dioscoridi, refrigerat, & adstringit. Folia ex passo, & exiguo Myrrhæ pota vesicæ rheumatismis, & vrinæ difficultati auxiliantur. Pilulæ ex vino tusæ in dysenteria, alui fluxione, tussi, orthopnœa, aut si reiciatur sanguis, cōuenientissimè bibuntur. Earum decoctum eisdem præbet effectus. Tusæ cum fico duritias emol-

liunt, nariumque polypo medentur: in aceto coctæ, & cum lupinis detrita scabros vngues eiiciunt: hernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt: Folia eadem præstant. Pilulæ cum arboris coma suffita culices abigere existimantur. Folia trita & imposita vulnera glutinant, sanguinem reprimunt: trita ex aceto capillum tingunt: illinuntur per se, aut cum polenta, ignibus sacris, vlceribus quæ serpunt, carbunculis, & oculorum inflammationibus: admodum cum cerato stomachum roborant. His addit Galenus Cupressi germina, totiusque stirpis qualitates declarat, quibus omnia efficiuntur quæ Diosc. proposuit. Cupressi folia, inquit, germina, pilulæ recentes & molles magna vulnera glutinant in duris corporibus: ex quo clarū est resiccandi vim habere absq; inigni acrimonia, vel caliditate, sicut certè & gustus testatur. Apparet enim in ea leuis quædam acrimonia, sed plurima amaritudo, multo etiam plus acerbatis in tota planta. Tanta verò illa est acrimonia & caliditas, quanta satis sit deducendæ in altum acerbatis, sic vt nullum interim morsum, nullam molestam caliditatem in corporibus efficiat. Proinde altè latentes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humiditates innoxie tutoq; depascitur, & absumit: alia verò quæ excalfaciunt simul, & desiccant, humiditates quidem illas absumunt, caterū acrimonia, & caliditate alias attrahunt. Enterocelas Cupressus iuuat, quoniā exicat, & robur addit corporis partibus præ humiditate laxis, vt pote cum adstrictio in altum subeat, deducente ipsam caliditate quæ adiuncta eum seruat modum, vt deducere quidē valeat, non autem morderere possit. Quidam Cupressi vtuntur ad carbunculos, & herpetas, polentæ miscentes, tanquam absumat citra excalfactionem eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui ad erysipellata vtuntur, admista nimirum polenta cum aqua, aut Oxycrato aquoso. Hæc Galenus. Aetius scobem, aut secamenta, ramentauæ, serra aut securi detracta, vel extrita quæ *πελεκύσματα*, & *πρίσματα* vocat, ad corpori bonū colorem inducendū vsurpat. *πελεκύσματα* *κνίπας*, inquit, *καὶ πρίμα*, *ἐλαφρὴ ψήσας*, *ἀλφρέτα σάμα*. Conorum Cupressi decoctum, scribit Matthiolus, ex aceto paratū, dentium dolores



dolores mulcere, si eo sæpè os colluatur. Idem præstat & foliorum decoctum. Hoc quoque medicamento vitilignes curantur. Eorundem & vnguium mulorum cinis oleo myrtino exceptus valet illitus ad capillorum defluuium. Idem coni, vt Marcellus inquit, impari numero minutissimè triti, & ex vino vetere hausti, tussim potentissimè leniunt. Recentes viridèsque herniosos magnopere iuuant, si eorum decoctum ex vino vetere quotidie affecti biberint trium vnciarum pondere. Interim tamen folia Cupressi trita testiculis illinèda sunt, auxilio multis experimentis comprobato. Idem præstant tenera arboris germina commāsa, ita vt eorum succus deglutiatur. His adiungit Dodon. fructum Cupressi foliorumue ex oleo decoctum, ventriculum roborare, vomitus reprimere, ventrem altringere, omnesq; eius fluxiones, & pudendorum vlcerationibus mederi. Idem fructus cum caricis tusi genitalium tumoribus medentur, & addito fermento bubones dissipant impositi. Reliqua semina foliis Cupressi tuis si misceantur, tradunt à vermiculis non tangi, neque erodi. Ligni eius nulla temporis diuturnitate suauem odore euanescente aiunt, quare id ad mensas & arculas expetitur, ac in iis numeratur, quæ cariem vetustatemq; non sentiunt. Pinum & Cupressum aduersus Cariem tineasq; firmissimas esse veteres prodiderunt, quam ob causam simulacra deorū ex ea sculpebant antiqui. Narrat Theuetus se, cum in Ægypto esset, vidisse Damiatæ capsam quandā ex Cupressi ligno fabricatam, in terram loco vliginoso, decem pedibus altius defosam, prorsus incorruptam, atque integerrimam inde extractam, cum illic sepulta fuisset ex quo Sultanus Selimus totam Ægyptum subiugauit, circiter annum Domini 1512.

Lib. 6. c. 86.

Plin. lib. 18.  
cap. 7.Plin. lib. 16.  
cap. 40. 42.  
Theoph. li.  
5. Hist. ca. 5.  
Theuet. 1.  
colinog. li.  
12. cap. 49.

## THVIA. CAP. XVI.

**D**E resiniferis arboribus quæ conos producunt, diximus, nunc de iis tractandum quæ baccas edunt. A Thuiā incipiemus, quam Cedrū Lyciam esse Bellonius existimauit. Ego Thuiæ & non Cedri genus videri supra monui. Mafsilienses & Prouinciales apud quos frequens est, *Serbin* vocant, nomine ad Sabinam accedente, quamobrem aliqui Sabinæ genus esse volunt. Lobellius esse putat Cedrum Phœniciam alteram Plin. & Theophr. Oxycedrum verò folio Cupressi, aut Sabinam maiorem Monspelienfes. Ex huius ligno virète, vt & Iuniperi, Fraxini, Sabinæ vtriusque, & Oxycedri, picis liquidæ genus foetidissimum conficitur, quod *Huille de Cade* vulgus appellat. Caudex eius est brachij crassitudine, scaber, fuluus, succo pingui madēs: folia Cupresso simillima, obtusa, quasi squamulis compactilibus coagmentata, sibi ipsis insidentia, quæ si digitis terantur, odore gratum spirant. Baccas edit rotundas, ad Iuniperinas accedentes, initio virides, mox ante maturitatem flauescences, postremo rubras, pulchras, gustu subamaro, odoratas. Aliud Thuiæ genus arborem esse puto, quam idem Bellon. Sabinā alterā, siue Sabinā arborem vocat, frequentē admodum in mōtis Amani & Olympi Phrygiæ cacuminibus: caudicem tortuoso, sæpè crassiore quā vt hominis brachiis

Thuia

genus 1.  
Li. de Conif.

Nomina

Locus.

Vfus.

Forma.

Genus 2.

Idem.

Locus.

Forma.



THVIA, Mafsiliensium.



brachiis capi possit: cortice viti simili, modicè crasso, rufo: materia foris alba, intus veluti gilua, cui nullam aliam similem reperias. Est enim ei veluti vini dilutus quidam rubor degenerans in subnigrum. Perpetua coma viret: folia Cupresso omnino similia, adeo vt si eminus spectetur, etiam harū rerū peritus homo, à Cupresso vix internoscatur, maximè si baccis suis careat: densiora tamen sunt eius folia, gustatu amara, aroma olentia, & resinosum quidpiam præferentia. Florem non promit, apparente statim seminis rudimèto. Arbor illa baccarum ferax est, quas semper seruat hyeme, deciditibus annotinis cū aliæ maturæ fiunt: nondum maturæ virent, omnino maturæ ex nigro in cæruleum degenerant, rotundæ, Cedridibus vix crassiores. In extremis ramulorum furculis, & non alibi oriuntur, ita vt singuli ramulorum furculi singulas baccas ferant. Amaræ sunt & subodoratæ, turdis & merulis cibus gratissimus. Huius arboris materiam ad testudines faciendas Turcæ expetunt, quod in rimas nunquam findatur. Thuia tertium genus in regijs Callirhoe hortis, & quibusdam

THVIAE genus tertium.  
Arbor vitæ Gallis.

Vfus,  
Genus 3.




Genus 4.  
Cap. 2.

aliis Lutetiæ viret, nomine Paradiseæ arboris, magna odoris suauitate & vehementia, quam qui Francisco Galliarum Regi dono dedit, Arborem vitæ nominavit, fortasse ob odoris vehementia. Elegans admodū est arbuscula, perpetua fronde virens, caudice recto, ligno duro, nodoso, cortice ex rubro nigricante, ramis multis & expansis, qui in ramulos alios à lateribus succrescentes diuiduntur, in quibus folia oblonga, Cupressi fere, veluti è squamulis coagmentata, quaterna ferè semper simul, ex quorum extremis flores vere exeunt, quemadmodum in Cupresso, pusilli, flauescens, quorum nonnulli deinde in exiguum fructum Pinei nuclei magnitudine formantur, Coni instar ex sex squamulis tenellis compactum, primo viridem, deinde pallescentem, & cū perfectè maturuerit, nigricantem, quaterna plerūque semina paleacea medio (in quo medulla acris & amariuscula) extuberante continentem. Tota arbor admodum odorata est. Quartum Thuia genus dixi esse Lyciam Cedrum Matthioli, minore folio, dum arbor tenera est, Iuniperi, paulo breuiore, ac molliore, post tertium aut quartum annum, rotundo, Cupresso simili, & nonnunquam in ramis inferioribus adhuc acuto, & pungente, in summis verò, iam obtuso ac rotundo: quam mutationem nisi diligenter obseruamus, facillè decepti credemus aliam esse plantam cū adolescit, & cū adulta est. In Spuriis Dioscoridis legitur Iuniperum magnam, quam syluestrem Cupressum aliqui vocant, vulgo cognitam esse, Cupresso similem, nascentem plerūque in asperis & maritimis, eadem facultate præditā quali Cupressus. Ea Dioscoridis verba huic plantæ conuenire quidam arbitrantur. Figura Matthioli ostendere videtur adolescentiam, nostra adultam. Quod si quis nostram hanc de Thuia generibus sententiam reprehendat, Matthioli auctoritate & ratione fretus, quod scilicet Thuion siue Thuia forma Cupresso similis ramis, foliis, caudice, fructu, nusquam nisi apud Ammonis delubrum proueniat, & in Cyrenensi regione, auctore



THVIAE Genus quartum.



ctore Theophr. respōdeo Theophrastum duplicis Thuiæ meminisse, huius quāmodò dixi quæ in Cyrenensi regione feruida nascitur, & quam Matthiolus Atlanticam Cedrum Plinij esse arbitratur (quāquam Hermolaus Citrum legi oportere scribat, tum omnibus approbantibus, tum ex Codicum antiquorū fide, & Thuion quod apud Homerum est, Citrum interpretetur Macrobius: Citrū autē illud crediderim, cuius in Atlante monte nobiles sylvæ materiam lautis mensarum orbibus suppeditauēre, Romanis expetitarum delictis: Alterius Græciæ familiaris, quam montium verticibus & gelidis locis gaudere tradit, & fructum tardissimè perficere, ut & Arcades narrant. Huius Arcadicæ Thuiæ ea quatuor genera esse puto, quæ à me modò sunt exposita, sententiam mutaturus cum aliquis alius de iis meliora & probabiliora in medium protulerit. Perdurat Thuiæ materies incorrupta omnino. Radice huius arboris nihil ciuspius, nec aliunde pretiosiora opera.

Lib. 5. Hist. cap. 5.

Lib. 1. Dioscor. : a. 89. Lib. 13. c. 15. In Castig. Plin.

Lib. 4. Hist. cap. 1.

Theophr. li. 5. Hist. ca. 5.

## TEREBINTHVS CAP. XVII.



TEREBINTHVS Græcè τέρυνθος nominatur, Arabicè *Baton, Boton, Botin*, siue *Albotin*, Italicè *Terebintho*, Gallicè *Terebinthe*, Hispanicè *Cornicabra*, Anglicè *Terpentine tree*. Folio est lētisci, maiore, crassiore, pinguiore, perpetuò virente. Flores edit paruos, racemosos, rufescentes, ex quibus fructus prodeunt rotundi, primum virides, deinde rubescentes, postremò nigri, resinosi, odorati, duriq;. Grana viridia vocat Auicenn. Ligni materies pulchra est, nigricans, densa. De hac arbore sic Theophrastus. Terebinthus alia mascula est, alia fœmina: & mascula quidem, sine fructu. Fœminarū altera fructum statim rubentem edit, lentis magnitudine, qui coqui nequit. Altera viridē (χλωρόν, Plinius pallidum vertit) deinde rubentem, & cum vite maturescenstem, tandem nigrum, fabæ magnitudine, resinofum, odore iucundiorē (sic enim Plinius γυνώδεςρον interpretatus est, Gaza γυνώδεςρον legit, id est, sulfurosum.) In Ida & Macedonia brevis hæc arbor est, fruticosa, contorta: in Damasco Syriæ magna, copiosa, pulchraq;. Montem enim quendam aiunt esse Terebinthis refertum, in quo arbor alia nulla gignitur. Materies ei lenta: radices validæ, & profundæ: tota arbor incorrupta, siue, ut loquitur Plinius, fidelis ad verustatem: flos oleæ similis, rubens, folia

Nomina

Forma.

Lib. 2. c. 310.

Lib. 3. Hist. cap. 15.

Genera.

Lib. 13. c. 6.

Ibidem.





in vno pediculo multa, Laurinis similia, bina veluti sorbo, in summis ramusculorum partibus imparia, nisi quod minus angulata quam sorbo, & ambitu Laurinis similia, pingua cum toto fructu. Fert & illa folliculos quosdam cauos, vt Vlmus, in quibus nascuntur animalcula quædam, ceu culices. Sic enim ex Theophrasto legendum: *Φέρει δὲ καρπὸν τῶν καύλων, non καρπὸν, vt in exculis habetur, neque καρπὸν, vt legit Gaza, qui sic vertit, Fert & ad nucis similitudinem quædam concava, &c.* Hi folliculi cornicula sunt rubentia, caprinis similia. Intus est resinofum quiddam, lentumq;: hinc tamen resina non colligitur, sed ex ligno: neque fructus Resinæ copiam fundit, sed manibus tantum adhæret, & si collectus non lauetur, coherescit, cum verò lauatur, candidus & immaturus supernatat, niger subsidit. Hæc Theophr. qui alio in loco Indicæ Terebinthi meminit, de qua idoneo loco dicitur. Resina liquida omnium præstantissima ex Terebintho manat, odorata, quæ non ita pridem in Italiam deferri cœpit. Eius locum Larigna non solum sibi vendicauerat, sed etiam cognomētum, vt iam dixi: nunc vera Terebinthina Venetias deferretur ex Cypro. Antea coctam deferebant, vel quod aduectus esset commodior, vel ad adulterandum aptior. *ῥηλιν τερμινθινῇ*, Latine Resina Terebinthina dicitur, ab Auicenna Gluten Albotin. Montes amat Terebinthus. Nascitur in Syria, & Græcia, in multis Hetruriæ locis, præcipue, in antiquorum ædificiorum ruinis, ac ruderibus, sed frequens admodum in lapidiæ collibus, prope Pucinum castrum, haud procul ab Adriatico sinu, non longe à Tergesto. Prouenit etiam in Prouincia. Veris initio floret, mensibus reddit semen. Terebinthi folia, semen, & cortex Dioscoridi astringunt, & ad eadem, ad quæ Lentiscus, conueniunt, simili parata modo, sumptaq;. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur: excalfacit, urinā mouet, venerem excitat: contra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia Petràa deferretur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Africa, & Cycladibus insulis. Sed præualeat candida, perlucida, vitreo colore, & in caruleum vergente, Terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecellit. Galen. Terebinthi cortex idē ait, folia, fructus adstrictoriū quiddam obtinent, & secundo ordine excalfaciunt: itaque quod etiam desiccant, perspicuum est: recentes quidem, humidi modicè, sicci verò ordine secundo. Cæterum fructus aridus propinquus est tertio ordini desiccantium. Est enim adeo calidus, vt mandētibus protinus eius caliditas percipiatur. Itaque urinam prouocat, & lienibus prodest. Inter Resinas, quod idem ait, præfertur Terebinthina, manifestam quidem, non tamen similiter atque Mastiche adstrictionem habens, verum adiunctam amaritudinem quandam, per quam valentius quam Mastiche digerit. Ob eandem qualitatē inest & absterfio, tanta quidem, vt & psoras sanat. Quinetiam quæ in profundo resident cæteris Resinis magis attrahit, nimirum cum illis maiorem habeat partium tenuitatem. Terebinthina Resina, Matthiolo, auxiliatur laterum doloribus: sanat labiorum facieiq; rimas: scabiem & impetigines delet illita: vlcera purgat: vulnera recetia glutinat: splenem attenuat deuorata: valet ad articulorum dolores, podagram, chiragram, & ischiadicos affectus, si frequenter sumatur vnciæ pōdere, addito Chamæpiteas, aut Saluæ, aut Stœchados puluere. Terebinthinū oleum ex fructu maturo Terebinthi fit, inquit Diosco. non secus ac Lentiscinum, quod calfacit & adstringit, non refrigerat & adstringit, vt falsò in exculis Codicibus legitur, Mesues ex baccis eius viridibus fieri scripsit, quod vulnera glutinat, spasmo, tedano, duritiei neruorum confert. Huius olei nullus est apud nos vsus, neque aliunde ad nos importatur, sed oleo nos ex Terebinthina vtimur conuenientissimè in frigidis neruorum affectibus, atque omnibus aliis ægritudinibus frigidis, & flatuosis.

Lib. 3. ca. 6.

Lib. 4. Hist. cap. 5.

Lib. 2. c. 30.

Locus.

Lib. 1. Dioscor. ca. 76.

Tempus.

Plin. lib. 6.

ca. 25 &amp; 26.

Lib. 1. c. 76.

Tēpera.

Uires.

res.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.

Li. 8. simp.



tuosis. In asthma, & anhelitus difficultate mirificū est, si duæ drachmæ quotidie hauriatur. Est & in empyemate vtile: denique in omni prava thoracis affectione ex pituita, colicis etiam doloribus, & flatuosis summopere prodest: cicatrices decorat. Quanquam Terebinthina ferè oleum sit, tamè oleum, tenuissima eius pars, à Chymistis educitur ex ea, pulcherrimum, & copiosum. Resina Græcis *ῥῆσιν* nuncupatur, Arabibus *Ratim*, siue *Natig*, Italis *Ragia*, Gallis *Resine*, Germanis *Hartz*.

Nomina

## LENTISCVS CAP. XVIII.



LENTISCVS dicta fortasse quòd lentore quodam folia lentescant, Græcis *ῥῆσος* vocatur, quasi *ῥῆσος*, fislis quòd facile & frequenter funderetur in dentiscalpia: Arabibus *Daru*, Gallis *Lentisque*, Italis *Lentisco*, Hispanis *Mata*, aut *Arueria*, Narbonensibus *Restiude*, Germanicè *Mastichaum*, Anglicè *Mastietree*. Stolonibus & caudice concolor, & similis Terebintho minori. Stolones, nullo grandiore stipite à radice sublato, Corylorum

Nomina

Forma.

## LENTISCVS.



sylvestriū modo huc illuc spargit, nisi quòd Lentiscus tum ramusculis, tum foliis densioribus est, magis que ramusculorum summitatibus ad terrā inflectitur. Folia Myrtiæmula, octona ex singulis pediculis prodeunt, pari vtrinque exortu, suauiter spirantia, pingua, friabilia, obscure virentia, in ambitu tamen rubentia, sicut & quibusdam venulis. Perpetua fronde Lentiscus viret, cortice subrubro, lento, tenaci, flexibili. Profert Terebinthi modo racemosos fructus, & præter hos, folliculos quosdam corniculorum modo intortos, quibus liquor limpidus inclusus, tandem vertitur in bestiolas iis persimiles quæ ex Vlmi & Terebinthi folliculis euolant. Lentisci fructus, siue baccas, Hippocrat. *ῥῆσidas* appellat, quanquam exemplaria Græca falsò *ῥῆσidas* habeant. Mirum est quod scribit Matthioli totā hanc plantam grauiter olere, olfactūque caput grauare, cum contrā Pena suauiter spirare affirmet, insertaq; in os folia sitim arce-re, & fauces humectare. Præterea qui norunt Mastichen, & sciunt Lentisci surculos vt Xy-

Lib. de nat  
mulieb. In  
ca. 75. lib. 1.

Locus.

lobalfami succedaneum in Officinis vsurpari, Lentiscinisque dentiscalpiis post epulas dentes mundari, illius opinioni refragantur. Ex hac manat omniū præclarissima & optima resina, quæ *ῥῆσιν* *ῥῆσιν* vocatur, Latine Resina Léntiscina, Mastich, vulgo, & in Officinis Mastix. Hæc liquida non est, nec cæterarum resinarum modo coit, sed in tenues particulas concisa manet. Omnium præstantissima in Chio Aëgi maris insula prouenit, vt à medicis Græcis Chia simpliciter pro Mastiche accipiat. Inde in vniuersam Europam comportatur. Ex mitibus tantum Lentisci plantis, vulneratis ipsarum truncis fluit, & in terra circumpauita concrefcit. Quidquid Mastiches in hac insula colligitur, reipublicæ debetur. Qui vindemiæ tempore propriis in agris legunt, id totum absque dolo in commune cōferunt. Abscissa manu pœnas dat, qui Lentiscum Mastichen fundentē in proprio vel alieno agro exciderit. Tanta est Mastiches



Lib.1. Dio-  
scor. ca.75.  
Li.2, c.461.

Lib.6. Hist.  
cap.4.

Lib.12, c.17.

Matth. ibi.  
Matth. ibi.

cura, tantus illi honos apud Chios, nec abs re quidem, cum illis vniuersus ferè orbis tam excellens ac salubre medicamentum acceptum ferat. Fert & Lentiscus Italica Mastichen, sed raram admodum, nec Chia comparadam. Quare im- merito à nonnullis reprehenditur Auicēnas, quòd Mastiches Italica memine- rit, quippe qui existiment fortasse Mastichen non alibi quàm in Chio nasci, in quo vehementer errant, arguiq; possunt Galeni & Auicēnnæ auctoritate, qui non solum Chiam Mastichen memorant, sed etiam Ægyptiam. Theophrastus ex spinosa planta quam Ixinen nominat, emitti lacrymam narrat, quam Acan- thicen Mastichen vocat, Gaza, spinale: ea spina albus Chamæleo est, ad cuius radicē liquor albus reperitur, glutinosus, quē à Mastiches similitudine sic vo- carunt.) Plinius etiam plura Mastiches genera recenset: Iam ego, inquit, transeo ad Mastichē, quæ & ex humili spina fit in India, itemq; in Arabia: Lamā vocat. Sed Mastiche quoque nobis gemina est, quoniā & in Asia Græciāq; reperitur herba radice folia emittēs, & carduū similē malo, seminis plenū, è quo lachry- ma erumpit, incisa parte ima, vix vt dignosci possit à Mastiche vera: nec non & tertia in Ponto est, bitumini similior. Laudatissima autem Chia, candida, cu- ius pretium in lib. x. x. (id est. denarij decem) nigræ verò x. i. i. (id est. denarij duo.) Chia è Lentisco traditur gigni gummi modo. Adulteratur thure & resina. Sic enim corrigendi ex Dioscoride Codices vulgares qui habent, adulteratur vt thura resina. Vera Mastiche intelligenda est quæ ex sola Lentisco fluit: quæ verò ex quauis alia planta manat, improprie & per similitudinem Mastiche nomi- natur. In Creta etiam Lentiscus resinam fundit, sed flauam, amarā, & Chia lon- ge deteriorem. Lentiscus frequēs in Italia nascitur, præsertim in Hetruria, & in Campania. Huius etiam feracissima vniuersa Narbonēsis ora maritima. Flores racemosos, muscososq; primo vere, Aprili mense, promit, non particulatim, vt putant, ex Arati & Ciceronis versibus.

*Iam verò semper viridis semperque grauata*

*Lentiscus, triplici solita est grandescere fetu*

*Ter fruges fundens, tria tempora monstrat arandi:*

Lib.1, c.76.

Embl. 72.  
Lib.1. Diosc.

quod Theophrastus merito Scyllæ attribuit, alij verò vocis affinitate decepti, Lentisco. Toti Lentisco vis inest astringēdi, inquit Diosc. Etenim fructus eius, foliū, cortexq; ramorum, & radicis, parē facultatem sortiuntur. Sic Lacu. ex Græ- co aliter quam Ruell. vertit, cui adstipulatur Cornarius: καὶ τὸ ἀγρὸς ἀπὸ τῆς, καὶ τὸ φάλλον, καὶ τὸ φλοῖος τῶν κλάδων, & τὸ ῥίζης ἰσοδυναμοῖ. Lentiscus sua adstringente vi valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profluvia, & dysenterias in potu: item cō- tra eruptionem sanguinis è vulua, & eiusdem aut sedis procidentia: in totum Acaciæ & Hypocistidis vicem representat. Idem facit succus è tritis foliis. De- coctum fotu caua explet, fracta ossa ferruminat, vuluæ fluxiones sistit, nomas arcet, vrinam pellit, motus dentium collutione stabilit. Virentes surculi acumi- natæ arundinis vice dentibus repurgandis affricantur. Fit ex fructu oleum ad- strictoriam vim habens, quod prodest cū quid adstringi opus est. Lentiscus re- sinam gignit, quæ pota, utilis est sanguinem reiiciētibus, & tussi veteri: stoma- cho auxiliatur, sed ructum mouet. Additur in dentifricia & illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum. Pilos in oculis replicat: māducata, oris halitū com- mendat, gingiuas contrahit. Præfertur nitedulæ modo resplendens, & candore Thyrrhenicæ ceræ similis, crassa, retorrída, friabilis, odorata: viridis autem in- ferior est. Hæc Diosco. in quibus quædam aliter quā à Ruellio non sine ratione verba sunt. Quæ enim Ruell. dixit, Semini, folio, ramo, cortici, radicibusque, cognatę insunt vires, And. Lac. aliter ex Græco, vt exposuimus, vertit. Quæ verò Ruellius sic, palpebras oculis incommodas replicat, Lac. hoc modo. Pilos in oculis



oculis replicat, hoc est, confirmat, stabilit, atque cōglutinat cilia: Cornarius verò, Agglutinat quoque palpebrarū pilos, oculis officientes: quæ sic intellige. Pilos in trichiasi oculorum affectu oculū pungentes, extra oculū specillo euerfos calens exteriori palpebræ, illita glutinis vice retinet, ne in oculum denuo resiliant: Nec absurdum fuerit annotare quòd Diosco. dicit, & δὲ ξυλάει χαλὰ ἀντὶ χαλαμίδων παραλεβόμενα τοῖς ὀδόντι, σμύχει τέρας, id est, ut reddidit Cornarius, Ligna viridia arundinum vice dentibus adhibentur, & ipsos repurgant, de dentiscalpiis quæ ex Lentisco fiebant, hodieq; fiunt, accipiendū esse, quæ arundinū vice esse possunt, & non de dentifriciis, quæ in puluillum comminuta affricantur, sicut mox de Mastiche dicit. Itaque improprie Diosco. παραλεβόμενα dixit, si affricari, & non velut dentiscalpium adhiberi Lentisci lignum quis accipiat, ad eximenda ea quæ in commanfu dentibus inhærent, in quem vsum pennæ formari possunt, quod declarat Martialis.

Ibidem.

*Foditque tonsis ora laxa Lentiscis.* Et alibi:

Lib. 6. in Aopoph.

*Lentiscum melius, sed si tibi frondea cuspis*

*Defuerit, dentes penna leuare potest.*

Ibidem. Cap. 77. Lib. 6. prope finem.

Porro quod Diosco. χαμπυρὸν Mastichen probat, Cornarius valde aridā intelligit, id est χαμπυρὸν. Vtitur etiam hac voce Diosco. paulo post, in Resinæ probatione, quæ esse χαμπυρὸν non debet. Vsus est & Galenus lib. ὑγιεινῶν, quo loco Codex Basilienfis habet χαμπυρὸν. Fusch. emendare volens reponit χαμπυρὸν, & vertit siccū, sicut & antiquus interpres, & recte ille quidē si χαμπυρὸν reposuisset. Mastichen Marcellus Empiricus vocat personatam, fortasse ex eo quod, inquit Cornarius, faciei illitionibus admixta, claritatem, ac nitorem inducit, sicut Dioscorides ait, ut sit veluti προσωπίς, vel potius, quod Laruis fingēdis, aut etiā exprimēdæ hominum faciei, cum alba cera mixta in vsum veniat, id quod eius artis peritis notissimum est. Ex aquea essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca composita Lentiscus est, Galeno teste. Desiccat igitur secundo ordine cōpleto, aut tertio incipiēte, in caliditatis & frigiditatis differentia quodammodo media. Similem omnibus suis partibus adstrictionē obtinet, radicibus, ramis, extremis turionibus, germinibus, ac foliis, fructu, & cortice. Si vero etiā succum ex foliis eius viridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderatē adstringēs. Itaq; bibitur & per se, & cū aliis medicamētis, quæ dysentericos & alios alui affectus sanant. Quin & ad sanguinis expuitiones, sanguinis ex vtero eruptiones, sedis, vuluæq; procidentias idoneus est, utpote ad Hypocistida nōnihil prope accedens. Mastiche quidem candida, & Chia, quodāmodo ex cōtrariis cōposita est facultatibus, adstringente videlicet, & emolliente. Proinde stomachi, vētris, intestinorum, iecorisq; inflammationibus competit, utpote secundo ordine ex-calfaciens, & desiccans. Nigra quæ Ægyptia cognominatur, magis desiccat, & adstringit, quam obrem aptior est ad ea quæ validiorem digestionem per halitum exposcunt. Hac ratione ad furunculos bonum est remedium. Porro oleum vnguentumq; Mastichinum ex Chia conficitur, non admodum sanē ex Ægyptia, simili tamen facultate. Mastiche, quod ait Matth. cohibet sanguinem è naribus fluentem, si cum Thure, sanguine draconis, & leporinis pilis cōbustis excipiatui oui albo, & fronti applicetur, fascia superposita quæ arctē constringat. Manditur cum cera odorata, ad dentium dolores, & ad piritam è capite detrahendam. Mulcet tollitq; Mastiche frigidos articulorum dolores, si cum Cymino, Pulegio, Salvia, Lauri baccis, Sabina, melle excipiatui, doloreq; affecto loco admoveatur. Valer ad ventriculi dolores, si cū itur dormitum, tres eius grumi deuorentur. Non solū enim hoc medicamento præsens leuatur dolor, sed ne iterum accidat, efficitur. Lentiscinum oleum quomodo ex maturo Lentisci

Ibidem.

Li. 8. simp.

Li. 7. simp.

Lib. 1. Dioscor. ca. 75.



Lib. I. c. 39.

Matth. lib. I.

Diof. c. 39.

Lib. 5. med.

part.

Diof. lib. I.

ca. 40.

Li. 3. Antid.

Lib. 15. c. 36.

Nomina

fructu paretur Diofco. docet. Hoc, inquit, scabiem iumentorum canumq; sanat, vtilissimum pefsis, acopis, & leprarum medicamentis: sudores cohibet. Fit hoc oleū, in Hetruria, Ilua, & Gilio Thyrrheni maris insulis, & in quibusdā Adriatici, sine alterius olei permixtione, hoc modo. Racemosas Lentisci baccas à putaminibus repurgatas sinunt aliquot dies simul flaccescere: deinde in magnum ahenum iniectas affusa aqua, igne tandiu fouent, donec dehiscant, postremo extractas, & saccis inclusas prælo subiiciunt, oleumq; inde expressum seruant. Qui hoc ita parant, ad acuendam oculorum aciem, caliginesq; delēdas vtiliter cibis commisceri affirmant. Clystere infusum dysentericis quam maximè prodest. Gingiuīs inflammatione dolentibus optimum pharmacū est hoc oleum, auctore Galeno, modice calidum, retentum ore. Mastichinum fit è trita Mastiche, contra omnia vuluā mala efficax: mediocriter calfacit, astringit, emollit. Aduersus prominētes stomachi duritias, coeliacorum, dysentericorumq; cruciatus vtile: faciem emaculat, & colorem nitidū reddit. Mesuā fit ex Mastiches vnc. tribus, vini vnc. quatuor vel octo, olei rosacei libra vna, in vase duplici coctis omnibus ad vini consumptionem. Hoc cerebrum, neruos, articulos, ventriculū, hepar, cor, roborat: tumores duos mollit, dolores sedat. Omnium verò præstantissimum conficitur vitreis organis è purissima tantum Mastiche. Lentisci baccas Plinius velut oliuas, & corna, in cadis cōdi scripsit, ne quid nō hominis ventri natum esse videatur. Resina hæc *mas-ti-chē* Græcè vocatur: Latine Mastiche, aut Resina Lentiscina: Arabice *Mastech*, *Mastechē*, siue *Mastochē*: Italicè *Mastiche*. Germanicè, ac Gallicè *Mastic*, Hispanicè *Al Mastiga*.

## IVNIPERVS CAP. XIX.



V. M Juniperus, Resinam emittat, siue gūmmi, siue lacrymam, Thuri, Mastichēue persimilem, atque alicubi montibus occupatis syluas totas efficiat, inter resiniferas syluā nostrā arbores a nobis connumerabitur. Juniperum dictam putant, quod iunio-

## IVNIPERVS maior.

Nomina

Ruel. lib. I.

cap. 20.

Genera

Forma



Matthioli.

Lib. I. Diof.

cap. 37.

res & nouellos fructus pariat antiquis maturiscentibus: solam enim ferè arborum fecutus suos in biennium prorogare aiunt. *Απυλδης* Græcè hæc dicitur, & *Απυλδης*, Arabicè *Arornas*, aut *Archenas*, Italicè *Ginepro*, Gallicè *Geneure*, & *Geneurier*, Hispanicè *Enebro*, Germanicè *Vuckholtz*, & *Kreimebaum*, Anglicè *Juniper tre*, Belgis *Geneuer boom*. Eius genera duo: altera maior, altera minor. Vulgaris nostra minor est, arbuscula aut fruticis magnitudine, ramis obductis cortice, tenui, & membranoso, qui sponte rumpitur, ac dehiscit: foliis paruis, tenuibus, angustis, duris, pungentibus, imo spinis potius quam foliis: Baccis paruis, rotundis, viridibus initio, per maturitatem nigris, odoratis, vt lignum totum, gustui primū subdulcibus, deinde amaris, quæ *Πευδιδες* Græcè dicuntur, in officinis Grana Iuniperi. Hæc Iunipero plerique colles in Gallia, montiumque iuga pubescunt. Thuscia vrbanas alit, quæ in proceram arborem assurgunt, frequen-




frequentes in agro Senensi, quarum fructus sylvestribus crassior & dulcior est. Vulgatissima est & in Gallia provincia hæc Iuniperus maior, ibi Cade vocata, bacca triplo maiore. Est & Iuniperus maximus Illyricus, cærulea bacca, ea fortassis, cuius magnitudinem cum Nuce Pontica Dioscorides confert. Iuniperi hæc omnia genera coma perpetua virent, materie fulua, odorata, ex qua

Cor. Emb.  
82. li. 1. Dio.

## IUNIPERUS

minor.



in calidis regionibus manat liquor, thuri colore & odore similis, qui cum colligitur, candidus est, cum senescit, in rufum abit. Iuniperi nostræ fructus ad eam magnitudinē non perueniunt quam Dioscor. exprefsit, vt alterius fructus Nucis magnitudine, alterius Nucis Ponticæ æqualis reperiatur. Maiorum Senensis agri Iuniperorum fructum nec Matth.

Ibidem.

quidē tradit ad eam accedere magnitudinē. Quare haud satis scio an frigiditati siccitati- que locorum id adscribendum sit, cū sint qui se vidisse è Græcia allatas testentur magnitudine fabæ, & qui nucem Auellanā ferē æquarēt, vel an Diosco. codices sint hoc loco mendosi. Nam Marcel. & Matthiol. hoc de Iunipero caput multis modis deprauatū esse adnotarunt. Serapio non nucis magnitudinem in

Lib. 16. c. 19

Iuniperi baccis agnoscit, sed fabæ, vt fortasse vbi legitur, ὁ ὅ χαρπὸς αὐτῶν ὁ μὲν τις χαρπὸς μέγεθος εὐρίσκεται, ὁ ὅ χαρπὸς ποντικὸς ἴσος, pro χαρπὸς voce, quæ Nucem Iuglandem significat καύμης legerit, & omnino legere oporteat, quo minoris Iuniperi fructus, fabæ, maioris, nuci Auellanæ magnitudine sit æqualis, Dioscoridis litera sic restituta: ὁ ὅ χαρπὸς αὐτῶν, ὁ μὲν τις χαρπὸς

ποντικὸς μέγεθος εὐρίσκεται, ὁ ὅ καύμης ἴσος. Certe Plinius cum scribit, Iunipero eadē virtus quæ Cedro: vasta hæc in Hispania, maximè que eius bacca, de diuersa Iunipero à nostrate loqui videtur, cuius etiam fructus multo sit maior. Tales Iuniperi in Castella noua, Hispaniæ provincia frequentes supra Segobiam, qua itur Madritium, arborefcunt, adeo proceræ, vt ex earum materia trabes & conignationes incolæ sibi fabricent. Iuniperi lacrymam Vernicem hodie vocant, quam recentiorum insolentia prohibere conata est Arabas, ne patrio vocabulo Sandarax appellarent, propterea quod affinis hæc vox est Græcorum Sandarachæ. Ita suis isti caueant legibus, ne Brizo fuerit Deliis dea vaticiniorum quæ per somnia fierent, quādo βρύζα fuit apud Thracas frugum genus: ne etiam ἐλάτη Diosco. sit floris palmarum inuolucrum, quoniam ἐλάτη omnibus sit Abies arbor. Sed Vernicem ab anni tempestate, & Vernilaginem docti viri etiā appellant, quod in mellificiis vocat Aristoteles Erithacem. Cornarius Verniginem siue Vernicem lacrymam aut gummi Iuniperi esse, falsò à quibusdam asseri scribit, quia factitia res sit Vernix, ex succino & oleo seminis lini, non simplex, aut sponte naturæ producta, id quod confirmat his rationibus. Vernicis gummi appellatio, inquit, ex Germanica voce facta est. Germani enim istic habitantes, vbi Succinum gignitur, & pro ornamento circum colla gestatur, Vernsten, & Bernisten id Succinum vocant, appellatione, vt videtur, ex eo facta, quod ac-

Sealig. lib.  
2. de Plan.  
Aristot.

Lib. 5. Hist.  
ani. ca. 22.  
Emble. 82.  
lib. 1. Diosc.  
In lib. 1.  
medi. part.  
& Emble.  
92. li. 1. Dio.



censum tedæ modo ac nidore flagret, quod ita fieri etiam Plinius, & Tacitus  
 prodiderunt. In iisdem porro locis idipsum gūmi cum lini semine in id quod  
 Vernicem vocant rem pictoribus familiarem, & quod Bituminis vsum hodie  
 in plerisque locis præbet, apparatus. Quod autem ut nos nunc eo, ita veteres  
 olim Bitumine vterentur, ex Plinio satis perspicitur, qui de Bitumine, ita scri-  
 psit. In reliquo vfu aramentis illinitur, firmatque ea contra ignes. Diximus, &  
 tingi solitas ex eo statuas, & illini. Placuit in ferrariis fabrorum officinis tinge-  
 do ferro, clauorumque capitibus, ac multis aliis vñibus. Ita tum in simplici re,  
 tum in factitia, Vernicis nomen apud superius sæculum ex Germanica voce  
 Vernsten, & Bernsten ob literarum V. & B. in pronunciando vicinitatem factū  
 esse Cornarius existimat. Veruntamen Vernicis nomenclatura, quasi veris ros,  
 quod vere potissimum gignatur, & æstate perficiatur, nulli non hodie nationi  
 cognita est, tum pro simplici Iuniperi lacryma, tum pro illo factitio, ex sine-  
 cra hac lacryma, & oleo lini conflato, quo illiti colores aliquantum imbuti, sic  
 tinguntur, ut pertinacius hæreant quam deleri facile possint, ne id ex eiusmodi  
 oleo & succino, solum fieri quis existimet. Succinum quidem Arabica fami-  
 lia auctores Karabe vocant, viribus non dissimile, sed re planè diuersum à Iu-  
 niperi lacryma, quam ipsi Sandarax, aut Sandaros appellant. Auicennas de his  
 diuersis capitibus tractauit. Dioscoridis & Galeni sæculo Vernix in vsum non  
 venerat. Plinius inter multa gummi genera Iuniperinum recenset, ad nihil vti-  
 le, id quod falsum esse frequens eius in medicina vsus ostēdit, ut dicemus. Mō-  
 res amat Iuniperus, & in planis nasci recusat. Non floret, nisi si puluis quidam  
 qui mense Maio ex ipsa excitatur, floris loco, id quod quidam arbitrantur, ha-  
 bendus sit. Huic mox succedit baccarum paruarum exortus, quæ Septembri  
 mense maturescūt. Sed in eadem Iunipero baccæ maturæ, immaturæ, minores,  
 maiorēsque simul reperiuntur. Iuniperus vtraque acris est Diosco. Ex calfacit,  
 vrinam mouet, accensa serpentes fugat. Baccæ modicè calfaciunt, & adstrin-  
 gunt, stomacho vtilis: contra pectoris vitia, tussim, inflationes, tormina, & ser-  
 pentum ictus efficacissimè bibuntur: vrinam cient potæ: ruptis, conuulsis, &  
 vuluæ strangulatui subueniunt. Quæ sequuntur in emendatis codicibus Græcis  
 non leguntur. Folia acrimoniam habent, ideo tam ipsa quam eorum succum  
 ex vino contra viperarum morsus illini, aut bibi prodest. Corticis cinis cū aqua  
 illitus lepras eximit. Capitis verò clausulam multo absurdiorē & ineptiorem  
 Matthioli iudicat. τὸ ὃ ῥινιμα τὸ ἔχλας ποθεὶν ἀναρρεῖ, id est ramenta verò ligni deu-  
 orata interficiunt quia nec Galen. nec Paul. nec Serapio qui verbum ē verbo  
 exscripsit, id vnquam de ligni Iuniperini ramenti literis mandarunt, cum bac-  
 cæ eius contra serpentum ictus efficacissimè deuorentur, bibaturque ac illina-  
 tur foliorum expressus succus ad viperarum morsus. Adde etiam quod facto  
 periculo id falsum esse deprehenditur. Quare hæc Diosco. falsò adscripta esse  
 plerique censent. Scaliger tamen pro falsis non habet, cū scribit Iuniperi deco-  
 ctum salutare, in quod succi sane traiectio facta est ramenta autore Dioscor.  
 necant deuorata. Ratio haud absimilis ei quæ de Colocinthidis apparatu cir-  
 cumfertur. Multum enim & pinfi, & cribrari tenuissimo incerniculo iubent, ne  
 hæreat atque vlceret, sic Iuniperi scobs ob siccitatem adhærescendo suffocat.  
 Iuniperus Galeno calida & sicca est, vtrinque tertij ordinis. At fructus similiter  
 quidem calidus est, sed non similiter siccus, verū in hoc primi fuerit ordinis.  
 Foliorum & baccarum Iuniperi decoctum, inquit Matth. potum valentissimè  
 pellit menses. Earundem confusarum ex vino albo cum Rosis, Cupressi pilulis,  
 & Myrti foliis decoctum calidum in ore retentum ad leuandos dentium dolo-  
 res est

Li. 35. ca. 15.

Li. 13. ca. 12.

*Locus.*Dodo. lib.  
6. ca. 82.*Tempus.*

Lib. 1. c. 87.

*Vires.*Lib. 1. Diosc.  
cap. 87.Exerci. 181.  
lib. 15.

Ibidem.



res est efficacissimum, præsertim addito aquæ vitæ momento. Lixiuum ex vino albo & Iuniperino cinere paratum vnciarum quatuor, aut quinque ponderis valentissimè pellit vrinam, ita vt Matth. nonnullos hydropicos sese vidisse affirmet hoc tantum auxilio sanatos. Idem scabiem sanat, si eo affecti sese abluant. Paratur balneum admirabili facultate ad podagricos ex ligni Iuniperini confici libris XII. coctis in aqua, quousque tertia pars superfit. Id decoctum cum ligno in labrum proiciendum, in quod cum descenderit æger, optimè ante purgato corpore, sedeat vmbilico tenus, & membra languida foueat. Iuniperi lauri que singulorum septenis baccis, cum casia lignea vulgaris semidrachma, & cinnamomi drachma, integris in turturis ventrem iniectis, si is assetur, gallinaceoque adipe perfundatur, & mulieri propediem pariturae, vesperi, alternis diebus edendus præbeatur, illa facillimè pariet. Fructus Iuniperi, rami, virgulta, totum denique lignum ad aerem emendandum incensa suffiuntur, & odoris suauitate grassantia pestilentiae contagia depellunt, sæuentemque eluunt perniciem. Oleum ex Iuniperi ligno Chymistæ per descensorium, vt loquuntur, conficiunt, quod calidum ore retentum dentium dolores mirificè mulcet, si à frigida defluxione oriantur. Fit ex baccis hoc longè præstantius & odoratius. Siccus vernix, idest gummi Iuniperi, auctore Serapione, destillationes suspendit, mensium profluvia sistit, sinus exiccat immissus, haustus verò pituitam, quæ ventriculo & intestinis hæserit: tineas & cætera in ventre animalia necat. Nervorum resolutionibus, quas humores frigidi effecerint, opitulatur. Capitis destillationes suffitu discutit. Idem sumptus sanguinis excreationes suppressit, & hæmorrhoidas fluentes, illitus. Addito tum rosaceo, tum myrtino sedis rimas cæcet, & hiantibus frigore manuum pedumque scissuris illitu succurrit. Eius igni impositi fumus dentium dolores sedat, si per infundibulum addentem affectum peruenerit. Eiusdem puluis cum oui albo subactus, & fronti temporibusque illitus, sanguinem ex naribus fluentem sistit: vt summatim dicam, calfacit, siccaturque primo ordine. Vernix liquidus qui ex illo syncero, & oleo ex lini semine expresso conficitur, non ad illustrandas tantum picturas, & ad nitorem ferro cõciliandum utilis est, sed & ad ambusta, dolores & tumores hæmorrhoidum conuenientissimum est remedium. Iuniperi materies cariem vetustatemque non sentit. Quare Chymistæ carbonem Iuniperinum accensum & suo cinere obrutum, ignem integro anno fouere asseuerant, id quod Scaliger persuadere sibi nequit.

Plin. lib. 16.  
cap. 40.  
Excc. 328.  
libr. 15.

## RESINA ET PIX.

## CAP. XX.

**R**ESINIFERIS arboribus tam iis quæ conos, quàm quæ baccas ferunt explicatis, de resina & pice merito mihi dicendum videtur. Earum igitur genera, cocturas, vsus, virésque declarabimus. Resina in πῆστιν Græcis nominata, Gallis *resine*, & Poix *resine*, succus pinguis est ex arboribus quibusdam sponte manans. Id indicat Plinius his verbis. Arborum succo manantium, picem resinamque in Oriente alię, alię in Europa ferunt, &c. Resinæ summæ species duæ, liquida, & sicca. Liquidam è Terebintho, Larice, Lentisco, Cupresso fieri tradit Plinius, & alibi ex Terebintho, Lentisco, Cupresso, omissa Larice. Dioscor. è Pinu, Picea, Larice, Cupresso. His addenda illa quam ex Cedro Phœnicia fluere diximus. Quod de liquida Lentisci Resina bis dixit Plinius iis locis quos modò citauimus, planè falsum est. Mastiche enim nunquam liquida est, sed semper in ipsa arbore spissatur. Est etiam falsum quod horum locorum altero legitur: Liquidam fundunt omnes, & tantum Resinam, crassiores verò, & ad pices faciendas Cedrus: at mendum illud sic tolli potest:

*Nomina*

Li. 14. c. 20.

*Genera*

Li. 24. ca. 6.

Li. 14. c. 20.

Lib. 1. c. 77.

Li. 14. c. 20.

Liqui



Lib. 16. c. 11.  
Resinæ elici-  
endi mo-  
dus.  
Lib. 9. Hist.  
cap. 2.  
In cap. 91. l.  
1. Dioscor.

Li. 16. ca. 12.

Ibidem.

Lib. 9. Hist.  
cap. 2.

Liquidam fundunt omnes, & tantum Resinam, crassiore verò ad pices faciendas idonea Cedrus: id est, crassiore resinam fundit Cedrus, quæ Cedrus picibus faciendis idonea est. Nam neque ex crassiore Cedri Resina, neque alia quavis picem fieri constat, sed ex teda, siue ex assulis arborum succosis. In Syria certe pix ex Cedro fiebat, ipsomet Plinio auctore. Sicca Resina ex Abiete, Pinu, Picea, & Pineis nucibus manat. Resina elicitur, ut docet Theoph. ex Pino, detracto tantum cortice (non detracta teda, ut scribit Hermolaus secutus Gazam) In hoc enim vulnus humor multus confluit: ex Picea verò, & Abiete non Cortice tantum spoliatis, sed ipso etiam corpore, id est ligno vulnerato. Hinc primum Plinij lapsus perspicitur, eo loco quem mox citabimus, è Picea detracto cortice resinam fluere dicentis, quod de Pino scripsit Theoph. deinde eiusdem deprauata hæc lectio: Nec corpori ipsi parcitur in cæteris, vel, ut in cæteris, sic restituenda, Corpori ipsi parcitur, non ut in cæteris. Sed quoniam totum locum hunc de Resina conficienda ex Theoph. Plinius excerpfit, hunc cum illo conferre Lectori nec iniucundum, nec inutile fore putavi, ut etiam ex hac mutua collatione iudicet, quam malè Plinius archetypum suum imitetur. Hæc igitur Plinius. Aperitur Picea è parte solari, non plaga, sed vulnere ablati corticis, cum plurimum bipedali hiatu, ut à terra cubito cum minimum absit, nec corpori ipsi parcitur, ut in cæteris, quoniam hastula in fructu est. Verum terra proxima laudatur, altior amaritudinem affert. Postea humor omnis è tota confluit in vlcus: Item in Teda. Theophr. verò sic. Idæi caudicem cum cortice spoliarent, (spoliant autem à solari parte duobus tribusve supraterram cubitis) anno post eo confluxus fit maximè ἐν δαδός, id est pinguis resinofusque. Vide quantum Plinij oratio à Theoph. oratione absit. Rursum Plinius. Cum is manare desit, simili modo ex alia parte aperitur, ac deinde alia. Postea tota arbor succiditur, & medulla eius vritur. Theophrastus verò: Quod autem confluxit, ubi securi dolauerint, altero post anno denuo ἐν δαδῶται, id est resinofum succum fundit, siue teda fit, ac iridem tertio post. Tales autem arbores quoniam subtrus cæcæ fuerunt, putrefactæ à ventis deiiciuntur, quarum cor Idæi eximunt, quod maximè fit δαδῶδες, id est pingue ac succosum, ac potissimum radices, quæ ut dixi, maximè omnium sunt ἐν δαδοί, id est succo pingui redundantes, siue in tedam mutatæ. Sic & in Syria (subiungit Plinius) Terebintho detrahunt cortices, ibi quidem & è ramis, & è radicibus, cum resina dānetur ex his partibus. At Theophrastus. Vulnerant & Terebinthos vtraque parte (ad Resinam eliciendam sub) scilicet cortice, & ramis. Sed quæ in caudicem resina confluit, & largior, & melior est, quàm quæ in ramos. Verum Theophr. quoque ipse locis quibusdam ad hanc rem spectantibus contaminatus est. In eo enim legendum ἢ ἀναπληρωσις οὐκ ἐκ τοῦ ξύλου καὶ τῆς συμφύσεως, ἀλλὰ τῆς ῥηλίνης ἐστίν, non αὐτῆς, ut in excusis legitur: id est: Expletur verò plaga non renascente ligno, neque coalescente, sed Resina. Id primum ex eo perspicuum esse potest, quod ex arboribus pix non manat: deinde ex Plinij testimonio hæc sic interpretantis. Expletur autem plaga Resina, non cortice, nec cicatrice, quæ in hac arbore non coit. Adhæc legendum. Ἀλλ' ἡ ἐργασία διὰ τοσούτου χρόνου γίνεται τῆς ῥηλίνης, ἢ αὐτῆς, ἀναγκαῖον ὃ δὲ λαμβάνει καὶ τὸ ξύλον γενέσθαι τινὰ πρόσφυσιν, ἔπειτα ἐξαίρεμένης τῆς δαδός, καὶ κραιομένης, τῆς αὐτῆς ἢ ἐκροῦ. Quæ quoniam Gaza non intellexisse, atque adeo malè conuertisse videtur, sic mihi videntur transferenda. Fit ergo tanto temporis spatio (trienio scilicet) Resina. Necesse est autem, quoniam (exacto scilicet triennio) teda detrahatur, ex qua vsta, pix fluit, ligno alimenti quidpiam suppeditari. γενέσθαι τινὰ πρόσφυσιν, subaudi τῆς τροφοῦς. Alij legunt. Ἀλλ' ἐργασία διὰ τοσούτου χρόνου μὴ γίνεται τῆς αὐτῆς. Id est ex arboribus ad resinæ cōfluxum vulneratis, toto hoc triennio

nio



nio pix non conficitur. Eo enim demum exacto ex illarum teda pix fit. Hactenus de Resinæ generibus, arboribus quæ eam emittunt, eiusque conficiendæ ratione ex Theoph. & Plinio. Sunt qui alia eius genera, statuant, *ξύλαδην* scilicet idest, lignosam, in Italia tantum nascentem, quam in dropacem ab Oribasio & Paulo admitti annotat Hermolaus, eamque fortassis esse Tyrrhenicam putat, vel Gallicam, Columellæ verò corticatam. At ego non resinam *ξύλαδην*, sed *ξύωδην*, idest viscidam lego. Etenim quæ talis est, dropacibus admixta ob glutinosum lentorem tenacius parti adhæret. Corticatæ verò Resinæ nusquam meminit Columella, sed corticatæ picis Allobrogum, de qua postea dicemus. Præterea Hermolaus in malagmate quod *βαϊον* appellat, ego *φαῖον*, idest fuscum, resinam *ξύλαν*, idest Aternam inueniri scripsit. Sed quis vnquam Acer resinofum esse aut prodidit, aut alicubi vidit? Quare non resinam *ξύλαν*, sed Phrygiam legendum puto, ex Ida monte Phrygiæ, inter Resinarum genera celebrem. Galenus etiam Resinæ siccissimæ genus vocat *πίσινον φύσημα*, veluti piceæ bullam, idest resinę veluti guttas rotundasque bullas ex Picea manantes, & in eius cortice pluuiis, ventis, æstu, frigore duratas, candidas, thuri sic similes, vt ijs olim thus adulteraretur. *Δολύται*, inquit Diosc. *πίσις λίβανος πίσινον ὁμοίῃ μεθοδεύμενος, καὶ κομῆ*. Ea fortassis Resina est è Picea quam admodum candidam in Asia fieri tradit Plini⁹, & Spagada vocari scribit. Hermolaus Epargon legit, ita enim Græcè cādida significatur, vel Psecada, quasi à roratu, *ἀπὸ τῆς Ἰεκάδης*. Quid si Stagoniā vel Stalactin legas, idest guttatim stillantē, vel stillatitiam, quibus nominibus Thuris & Calcanthi genus Diosco. appellat? De eadem resina Plinius alibi loqui videtur. Picea plurimam resinam fundit, interueniente candida gemma, tam simili thuri, vt mista visu discerni non queat, vnde fraus seplasiæ. Addam duo ex Plinio, vnum, Resinæ florem crudum ab eo dici, tenuem Resinę crudæ, & siccæ partem, quæ in ea veluti bullat, & efflorescit. Alterū, permirum id videri quod scribit: Resina omnis dissoluitur oleo: quidam & creta figlinarum hoc fieri arbitrantur. Resinam enim creta liquari aut dissolui posse, verum non est, atque adeo si quis resinæ liquatæ cretam, vel aliquod aliud terræ pinguis genus admisceat, massa fit durissima, & quouis cemēto solidior: quare locum sic corrigendum esse arbitror: Resina omnis dissoluitur oleo, Pudet confiteri maximum iam honorem esse in euellendis virorum corpori pilis. Quidam creta figlinarum hoc fieri arbitrantur, &c. Nam pili adimuntur, vel cū auelluntur, vel cū detrahuntur. Auelluntur digitis, forficulis medicamentorum tenacium impositu. Quam ob causam Archigenes apud Ætium, priusquam dropax ex pice admoueat, radi membra præcipit, ne cum dropax tollitur, magno cum dolore vellantur pili. Medicamenta huiusmodi sunt, Resina, pix, Creta pinguis Melia Creta etiam pilos velli auctor est Plinius, quanquam Dioscorides ea tantum pilos extenuari scribat. Detrahuntur autem medicamentis septicis & vrentibus, vt Calce, Auri pigmento, lacte Salamandræ, & id genus aliis. Cretam figlinarum ad vellendos pilos tutius adhiberi quàm resinam ob id puto, in facie præsertim, quod vt Resina nec calfaciat, nec humores attrahat, nec varos, papulas, tubercula excitet. Est porro deinceps de resinæ coctura dicendum. Liquida Resina in offas cogitur duras, & solidas, ducentorum fere pondo singulas, in aquæ duplotandiu cocta, quousque odorem amittat, friabilisque & tam arida reddatur, vt digitis iam non cedat, nec eorum vestigiū recipiat, vt fit, cum eius lentor nondum prorsus consumptus est. Est autem liquanda & colo defecanda, vt feculentæ sordes secernantur, priusquam in feruentem aquam coniciatur. Hoc coquendi artificio Resina candidissima euadit, ac fere niuea, etiam si antea vel fulua, vt Colophonia vera, vel oleosa, aut mellei coloris, vt Larigna,

In libr. 1.  
Diosc. c. 91.

Lib. 12. c. 23.  
Ibidem.  
Paul. lib. 7.  
cap. 18.

The. libr. 9.  
Histo. ca. 2.  
Li. 2. med.  
gen. cap. 2.  
& lib. 3. c. 2.

Lib. 1. c. 70.  
Li. 14. c. 20.  
Lib. 1. c. 70.  
& lib. 5. ca.  
de chalc.  
Lib. 16. c. 10.

Li. 14. ca. 20

Lib. 1. c. 180.

Lib. 35. c. 6.  
Lib. 5. c. 180.

Resinę co-  
ctum.



Larigna, fuerit. Ex quibus perspicere licet Ruellium, Dioscor. de hac re verba recte non expressisse: Donec inquit, friabilis, ac retorrída reddatur, & digitis cedat, cum legendum sit, *καμπυρά, καὶ ὥς μὴ τοῖς δακτύλοις ἔκειν*, id est arida ut digitis non cedat: deinde: Resina fit etiam eximij candoris, si omnis eliquata percolatur, &c. Vertendum erat, fit autem (hoc subaudi, coquendi supradicto modo) eximie candida. Omnem autem Resinam liquare, & colo defecare antea oportet, &c. Sed & Dioscor. ipsum mirantur plerique, ac iure quidem, cum declarat modum spissandæ in aqua feruente Resinæ liquidæ, eam *χρίσας*, id est vridisse, ac non potius *ἐψείσας*, id est elixari. Spissatur etiam Resinā, cocta sine aqua, in cortinis aeneis, subiecto primū igne lento, deinde vbi coire cæpit, carbonibus liberalius aggestis, & aucto igne, ut quicquid ferosi est exhalet. Si liquidam durare, & in offas redigere hac ratione libet, coquenda ea est sine intermissione, diebus ac noctibus tribus, quo ad odoris expers, friabilis, arida, nec sub digitis lentescens, ut antea, fiat. Sin iam siccam in offas ducere placet, vnodie coxisse sufficiet. Sic coctam & duratam Græci *φρυγίην* vocant, veluti frixam, Galli *Poix resine*, Piceam resinam, aut picem resinaceam. Haud adsimilis est coquendi modus hodie Chymistis vsitatus, oleum è Terebinthina elicientibus. Phialam ingentem vitream, luto oblitam, & Resina ad dimidium vsque impletam furno imponunt, alterius vacuæ, & quod stillat excepturæ collum in eius fauces inferentes. Deinde ea cautione qua dictum est, ignem accendunt. Fluit primū liquidus sudor Resinæ, aquam Chymistæ vocant, Pissellæo veterum is responderet: abiicitur is tanquā inutilis, tametsi ad ea valeat, ad quæ Pissellæon commendatur. Sequitur oleosus liquor, qui cum totus exstillauerit, arida, & friabilis in Phialæ fundo Resina superest: Colophoniam hodie nominant, magni, ut & olim, in medicina vsus. Scire tamen licet nominis Colophoniam multiplicem significatum fuisse. Sic enim dicta olim fuit Resina frixa auctore Galeno, & Resina cruda, ex Picea, Pinoue sicca, Chie Mastiche persimilis, ex Colophone aduehi solita: Præterea Resina liquida ex iisdem arboribus, ab eodem loco missa, eodem Galeno teste, quæ quod suauissimè ôleret, & admodū pauca colligeretur, summo erat in pretio. Cum à Chymistis eo quo diximus modo vritur Resina, æquum est ex singulis libris effluere aquosi feri vnciam vnam, oleosi liquoris vncias quatuor. Plinius coquendæ Resinæ modum breuiter perstringens, multum hallucinatur: E Picea, inquit Resina feruentibus cocta lapidibus, in alueis validi Roboris, aut si aluei non sint, struis congerie, velut in carbonis vstus: (vsu legit Hermolaus) Neque enim resina coquitur circum accensa lignorum strue, quemadmodum carbo vritur, sed Pix, auctore Theophr. qui in coquenda pice lignorum fieri tradit *παραπλησίαν σιμύθωσιν τῆς τῶν ἀνθρώπων ἀνθρώπων*, similem fieri struem dicit, ac si carbo vreretur. Quod verò consequitur, Resinā eo modo coctam in vinum addi, farinæ modo tusam, nigriore colore, non est sic accipiendum, ut planè nigram esse existimemus (nam cuiusvis resinæ coctæ & tusæ puluisculus ex flauo albescit) sed minus candidam, quam quæ in aqua feruente coquitur. Præterea cum scribit, Eadem resina si cum aqua leuius (*ωρὶως* Dioscor. id est leni igne) decoquatur, coleturque, rufo colore lentescit, ac stillatitia vocatur. Seponuntur autem (Hermolaus eliguntur) in id ferè vitia Resinæ, corticesque: & aliquot versibus post: Resinæ albæ congiū in duobus aquæ pluuiæ coquunt, malè conuertit, & declarat resinæ in aqua coquendæ modum, a Dioscor. traditum. Neque enim Resinæ albæ congius coquitur, sed Resinæ congius quam albam efficere volumus, neque cocta in aqua rufescit, sed fit *ἐξ ὁχρῶς λευκὴ*, id est eximie candida. Adhæc deponuntur malim, cum *χωρίζεσθαι* verbo vratur Dioscor. quàm seponuntur. Intelligit enim, id quod etiam antea diximus

mus

Li. 7. med.  
gen. ca. 3.Lib. 2. med.  
gen. cap. 2.

Lib. 16. c. 11.

In casti. in  
Plinius.  
Lib. 9. Hist.  
cap. 3.

Lib. 1. c. 94.

Li. 1. Diosc.  
cap. 91.



mus, si liquetur, & coletur resina priusquam coquatur, vitia, sordes, corticesque excerni ac detrahi, puramque ac expurgatam deinde coqui. Resina condire musta vulgare est Italia, prouinciisque finitimis, inquit Plinius, vehementiusque id fieri arbitrantur crudo flore Resinæ, excitarique lenitatem. Palladius: Quidam Resinæ sicce trite vncias tres dolio immergunt, & permouent, ac vina diuretica sic fieri posse persuadent. Columella inter medicamina musto in defrutario ad tertias decocto adicienda, Resinæ Terebinthinæ sesquilibram recenset. Ea conditura feritatem vini compescebant, virusque frangebant, aut ubi pigra vini lenitas torperet, virus addebant, ea tamen moderatione, ut multis pugnacibus plus inderetur, lenibus parcius. Resinam verò sine curiosa alia præparatione, ut ex arbore collecta fuerat, musto permiscebant, aut florem Resinæ sic præparatum. Eum cum assulis multis, tenuibus, breuibus quibus inheret, minutim concisum & cribratum, in aqua feruida coquebant. Sic enim pinguis Resina exprimebatur, rara, nec nisi paucis in locis subalpina Italia, ad vini condituram excellens, & medicinæ conueniens. Hanc condituram Plinius Crapulam vocat, quod vina, opinor, sic condita capitis dolorem & vertiginem excitarent, præsertim nouitia, nec inueterata, quod ipse declarat his verbis. Nouitium Resinatum nulli conducit. Capitis dolorem & vertiginem facit, ab hoc dicta Crapula est. Quare Columella cum aromata quibus defrutum cōdiri solebat, enumerans Crispam pampinaceam nominat, plerique docti viri crapulam resinaceam legunt, Hermolaus verò Sertam Campanicam, ob id, opinor quod ea, Palladio teste, ad vini condituram vterentur. Vina resina condita frigidis stomachis vtilia existimabantur, noxia verò vomitoribus, sicut & mustum, & sapam, & passum. Galenus Resinas omnes siccare & excalfacere scribit. Cæterum inter se discrepare, quod plus aut minus habeant in gustu quidem acrimoniæ, in facultate verò caliditatis: tum quod alia plus, alia minus sortite sunt partium tenuitatis: præterea quod nonnullæ adstrictionis sunt participes, alia nequaquam. Idem alibi, Resinarum inquit calidissima est Strobilina, & celerissime siccatur moderatissima Terebinthina, Pitynon Physema siccatur & calefacit, siccando autem à Strobilina non superatur, calefaciendo, plurimum. Inter Pitynon Physema & Strobilinam Resinam media calore est Abietina, sicut etià Colophonina Thus redolens, calore mediocri prædita. Humidissima est omniū, altera Larignæ differentia. Nam hæc duplex est: vna similis Terebinthinæ: altera acrior, calidior, magis liquida, odoratu grauior, & gustu amarior. Sed & vasis fictilibus Piceam resinam continentibus, quæ subsidit liquida Resina, consistentia & colore Terebinthinæ adamussim similis, odore & gustu diuersa, ingratior quidē olfactu est, sicut etià acrior, & gustu mordacior. Cupressi Resina non nihil adstringit. Putabit, inquit, forsitan aliquis, à nobis dissentire Dioscorid. de resinis sic scribentem: Ex omnibus principatus Terebinthinæ datur, posteam Lentiscinæ, tū ei quæ de Picea manat, & Abiete, vltimū locū Pineæ Strobilinæque obtinet. In his enim Dioscorid. quæ de infima Strobilina, optima verò Terebinthina sentire videretur. Verū ego ex his tribus Resinis, Strobilina, Abietina, Terebinthina, principem certè Strobilinam calore, secundā Abietinā, postremā Terebinthinā esse dixi. Ac de Resina quidē satis ferè dictū est, nunc de Pice differamus. Pix inquit Plinius, nihil aliud est quàm combustæ Resinæ fluxus. At ex Resina Piceam non fieri, sed ex teda vsta iam diximus. Quare Hermolaus cum hac definitione Pice notionem parum explicatam esse perspiceret, dixit, Picem esse combustæ in teda sua Resinæ fluxum. Ut enim Resina ex arboribus manat, aut liquida, & fluens, aut in ijs concreta, sic Pix ex teda, id est ex vstis arborum succosis & resinosis assulis ignis vi elicitur. Assulæ verò aut ex arboribus adhuc stantibus

*Resina**usus.*

Li. 14. c. 19.

&amp; 20.

Cap. 14.

octobr.

Li. 12. c. 29.

Li. 14. cap.

20. &amp;

Lib. 16. c. 12.

Li. 23. ca. 1.

Li. 12. c. 20.

Lib. 3. Dio-

scor. ca. 46.

Capit. 14.

octobr.

Plin. Ibid.

Lib. 8. sim.

*Vires.*

Li. 2. med.

gen. cap. 2.

Ibid. lib. 3.

cap. 2.

lib. 1. c. de

Tereb.

*Nomina*

Li. 13. cap. 1.

In li. 1. Dio-

scor. ca. 92.



defecantur, nimirum iis quas ad Resinam, eliciendam vulnerant, aut ex arboribus cæduntur, quæ nullam amplius fundentes Resinam, vel à ventis euerse sunt, vel à rusticis ad picem conficiendam deiectæ. Harum arborum præsertim Pinorum radices, eiusmodi succo pingui qui in picem liquitur, maximè abundant: & in his, media truncorum pars, quam Græci *χαρδίων*, & *μήτρην*, idest cor, & matricem vocant. Picem è pinguisimis Pini Piceæ que lignis congregari rectè scripsit Dioscorid. malè Plinius, è Piceæ Resina: in Hispania autem, è Piceastris (alijs Pinastris) nihilo magis laudata, quàm aliarum Resina, amara, arida, & grauis odoris. Terebinthum picem fundere apud Syros scribit Theophr. Quidam addunt, inquit, & Piceam, & Cedrum phœniciam (Gaza malè Cedrum & Palmam vertit.) Sed quia id rarò fit, perinde ac id quod fortè euenit accipiendum. Macedones enim ad picem faciendam, ne Pinum quidem vrunt, præterquam marem. Quandam enim marem vocant, aliam fœminam, tertiam sterilem. Fœminæ verò radices tantum ad id sumunt. Omnium nanque Pinorum succosa, pinguisque est radix. Hæc transtulit sic Plinius. In Macedonia inquit Laricem masculam vrunt: (ad picem conficiendam sub.) fœminæ radices tantum: quorum velut oblitus alio in loco, ex arbore mascula meliorem non esse picem scripsit. Spissarum inquit, vtilissima medicina est pix Brutia, quoniam pinguisima, & resinosisima, vtrasque præbet vtilitates, vtriusque (Piceis Resinæque naturam simul habet, inquit Dioscorides) ob id magis rutila quàm cæteræ. Id enim quod in hoc adiiciunt, ex arbore mascula Piceis faciendæ modum meliorem esse, non arbitror posse intelligi. Pix duobus fit modis. Prior is est. In aræa cretacea pauca teda pinguem, siue frusta truncorum veteris & pinguis Pini recta collocant, eo prorsus modo quo in carbonariis. Struem hanc fronde Abietum & Picearum contegunt, luto vndique obstruentes, ne flamma perrumpat, & emicet: id enim si contingat, pix perit. Aditu in ima struis parte relicto, ignem succendunt, quo cum ardet teda, pix liquefcens in canalem aream cingentem fluit, ac inde per alios ductus in scrobes ligneis asseribus vestitas, ne terra ebibat, deriuatur. Ea tandem excepta, dolia, cados, vtres implent. Eodem modo à Macedonibus Picem vri fusius tradidit Theophr. Posterior modus est. Ingentibus vasis terra defossis, laminam ferream multis foraminibus peruiam, vel ambiente canali cinctam adaptant. Super hanc furnum extruunt, teda assulatim cæsa complent, & obturât: ignem accensum extrorsum circundant. Feruescens teda primum aquosum sudorem mittit, deinde crassiores sudore liquidam picem. Non absimili ratione pastores & opiliones Mafsilienses ex Oxycedro picem conficiunt. Ollam enim primum defodiunt: deinde alteram ori defossæ æqualem assulis Oxycedri replent, virgulis transuersim cratis modo super impositis, ne assula decident. Ollam sic repletam in os conuertunt, defossæque applicant. Luto rimas oblinunt, quæ commissæ sunt ollæ, ac tum ignem circum accendunt. Primum sudorem aquæ modo canali fluentem in Syria Cedrium siue Cedria vocabatur, teste Plinio, quia Syri cum Pinis & Piceis carerent, rarissimè Terebinthos, sapius Cedros ad picem conficiendam vrebant, vt alibi annotauimus, cum Bellonij opinionem improbaremus, qui ex quauis arbore resinifera huiusmodi fluentè liquorem Cedrium vocat. Aquosus is sudor picis serum est. Eius Piceis vt Resinæ duo sunt genera: Liquida altera, Græcis *ὑπὸν*, Arabibus *Eerfs*, *Zefs*, aut *Kir*, Italis *Peceliquida*, Germanis Pix omnis *Bech*, sicut Hispanis *Pex negra*, Gallis *Poix fondue*. Hæc alium ignem non experta quam cuius calore fluxit, *αἰὼν*, idest cruda à Theophrasto sæpè dicitur, optima splendens, sincera, læuis. Altera Pix sicca dicitur, coctione durata, aut in doliis & seriis in quibus seruatur, diuturnitate spissata

Pix ex quibus collig.  
Lib. 1. c. 95.  
Li. 14. c. 20.

Lib. 9. Hist.  
cap. 2.

Lib. 16. c. 12

Lib. 24. c. 7.

Lib. 1. ca. de  
pi. arid.

Lib. 9. Hist.  
cap. 3.

Li. 16. ca. 11.  
Genera.

Dioscori.  
lib. cap. 95.



spissata Italis *Pece secca*, Gallis *Poix seche*. Coquitur duplici cura, aut igne tam valido, & tandiu continuato, ut absumpto prorsus humore per quem tenax est, arida, fragilis, ac rasilis fiat: aut eoque dum ad visci tantum crassitudinem coacta sit. Hanc βοοσκηδα vocant, fortassis quod in pellibus τῶν βοοσκημάτων, id est pecudū conderetur, ac venderetur, aut quod pecudū scabiē sanaret, aut quod illitu greges priuatim signarent: prior altera, ξηρὰ id est arida, siue sicca dicitur, vtraque Palimpissa, quasi recocta, ac bis factam Pix. Plinius Picem liquidam in cortinas coniectam, aceto spissari tradit. Bellonius igne spissari legendum censet. Ego verò nihil immutandum cenfeo, commodèque pici, dum coctura spissatur, affundi solitum acetum, ne pix inter coquendum, vreretur, & ut sicciior post cocturam esset. Aceto enim siccandi vim inesse cuius perspicuum est. Quam ob causam Plinius fortasse bonæ pici nec adustæ experimentum esse ait, si fragmenta subluceant, ac sub dente lentescant acore iucūdo. Theopompus scripsit referente Plinio in Apolloniararum agro Picem fossilem non deteriorem Macedonica inueniri. Est autem illa Pissasphaltum Dioscoridis, nempe ad spissitudinem pici coactum, Temporis spatio. Cocta pix ad vsus medicinae commoda probatur pura, pinguis, resinosa, odorata, subruffa, qualis Brutia à Brutis Italiae gente, & Lycia ab Asiae regione dicta, modicè cocta, nec lento resinosoque suo succo prorsus exuta, Resinae Picisque naturam simul habens. Asia picem Idæam maximè probabat, ab Ida celeberrimo Troadis monte Græcia. Pieriam à Piero Thessaliae monte, qui Macedoniam versus protenditur. Virgilius Naresiam, non, ut vult Bellonius, Lariciam, à Naresiis Liburniae populis, quorum montes Pinorum sunt feracissimi. Alij Naryciam legunt, à Naryciis Locrorum populis, qui optima Pice abundant. In Plinio eadem de re scriptum extat. Quidam arbitrantur in montosis picem copia præstantiorem ac colore, & dulciorem fieri, odore quoque gratiorem dum Resina sit: decoctam autem minus pici reddere, quoniam in serum abeat: tenuioresque esse ipsas arbores, quam in planis, sed has & illas serenitate steriliores. Fructum quædam proximo anno ab incisu largiuntur, alia secundo, quædam tertio, &c. quæ celeriter aures nostras præteruolare sanè non debent, sed diligenter attendenda, atque ex Theophrasto, à quo translata sunt, expendenda. Quod ait in montosis picem copia præstantiorem ac colore, & dulciorem fieri, Theophr. dixit ex Idæa siue montana Pino picem πλεῖστα καὶ μελανέραν γίνεσθαι, καὶ γλυκυτέραν, id est copiosiores esse, & nigriores, & dulciorem, ut in Plinio legendum sit, ac colore nigriorem, odore quoque gratiorem, ὡς δὲ εἴρηται legit Plinius, non ut in Theophrasti publicis exemplaribus legimus ὡς δὲ κενώτεραν, καὶ ὡς δὲ εἴρηται. Gaza utrumque videtur legisse, vertit enim faciliorem & odore gratiorem: Cæterum in emendatis codicibus legimus, εὐλακυνέτεραν, καὶ ἐνωδέτεραν, sinceriorem purioremque, ac odore gratiorem. Plinius habet dum resina sit. Theophrastus αἰμαίν, dum cruda sit, neque enim hîc de resina vlla mentio. Plinius decoctam autem minus pici reddere. Theophr. decoctam autem Picem minui, & pauciores fieri, quoniam in serum abeat. Plinius tenuioresque esse ipsas arbores. Theophrast. tenuioremque esse Picem ex Idæa Pino, quam ex marina. Quo enim serosior est Pix, eo tenuior, quo feri minus habet, eo crassior. Plinius. Sed has & illas serenitate steriliores. Theophrast. Ex pari Teda Pinæ quantitate Picem copiosiores, & magis serosam fieri, & frequentibus pluuiis quàm diuturnis squaloribus, & ex gelidis ac umbrosis locis, quàm ex tepentibus, & apricis. Plinius. Fructum quædam proximo anno ab incisu largiuntur, alia secundo, quædam tertio, &c. Theophr. ἐπιπρόσθην ἐν δὲ λαδὸν habet, id est confluum resinorum, pinguemque, ut iam hoc capite declarauimus. Optima

Coctura.

Lib. 16. c. 11.

Lib. 16. c. 12.

Lib. 1.

Plin. lib. 14. cap. 20.

Li. 2. Geor.

Li. 16. ca. 12.

Lib. 9. Hist. cap. 2.



& purissima Pix, Theophrasto, fit locis Aquilonem spectantibus, & apricis: ex opacis, βλοσυρότερα, aspectu foedior, Plinio, horridior, impura, sordida, & veluti cœnosa, βροβροδής, Plinio, virus praferens: hyeme leni, copiosa, bona, candidior: hyeme aspera, pauca, deterior, & decolor, quod postremum addidit Plinius, perinde ac si apud Theophrastū legisset, ὀλίγη, ἀχρῆς, μυχθιρότερα. Picis naturam, quibus ex arboribus, qua arte fiat exposuimus: item eius genera, cocturam, probitatēque. Nunc de iis quæ picis genera alia à supradictis videri possent, dicemus. Pix Nemeturica olim dicta fuit à Nemeturis Alpinis populis, quorum meminit Plinius, licet eam in Liguria confici scribat Columella. Ea pix liquida erat eodem auctore. Pix corticata qua utebantur Allobroges ad vini condituras, sic est fortasse dicta, quod in loculis ex arborum cortice factis adueheretur, aut quod tam dura esset, ut in multiplices textus, ac loricas, tanquam in cortices ac phyliras diuideretur. Hæc sicca erat, duraque, & quo vetustior, eo melior in usu, quoniam omni lentore amisso facilius in puluerem resoluebatur, atque cribrabatur. Cocta esset nec ne Columella non declarauit. Coctione duratam fuisse verisimile est. Habetur & in vulgatis Columellæ exemplaribus Pix rasis, quæ rasilis mea quidem sententia dicenda est, igne quidem non exsiccata, sed cruda, verum multis annis & vetustate sic durata, ut confusa in puluerem redigeretur, ac radi posset. Eandem esse puto quam Plinius Rabulanam, siue Radulanam, siue Rasulanam vocat, non à radula, ut existimauit Beroaldus, ferreo instrumento quo Pix raderetur ex doliis, ac educeretur. Opinioni tamen Beroaldi subscribere videtur Hermolaus, his verbis: Quidam ex Columella malunt Radulana quàm Rabulana legere, quod auctor is instrumentum in pice educenda Radulam quasi à radendo nominauerit. Sed & rabula quoque à radendo flectitur, ut à fando, pascendo, fabula, pabula. Sunt qui Rheticam legendum censent, laudatam à Constant. Casare. Picis usum duplicem fuisse rei rusticæ scriptores tradiderunt: vnum ad dolia, & ferias, cæteraque vasa ante quadragesimum vindemiæ diem picanda, & aliter ea quæ demissa essent humi, aliter ea quæ starent supra terram. Nam in iis quæ demersa essent, pix vetusta lateribus adhærens liquabatur igne in lampade admoto, & radula curua ligneo rutabulo præfixa foras eiiciebatur, post deterfa penicillo vasa, feruentissima pice infusa, scopula rutabulo alligata & circumducta picabantur. At quæ supra terram consisterent, complures dies antequam curarentur, in solem producebantur: deinde cum satis insolata essent, in os conuersa, subiectis tribus paruis lapidibus suspendebantur, atque ita ignis subiciebatur tandiu incensus donec ad fundum calor adeo vehemens perueniret, ut apposita manus patiens eius non esset, pixque vetusta liquaretur: tum dolio in terram demisso, & in latus deposito, pix feruentissima infusa dolium volutabatur, ut omnes eius partes linerentur. Picem duram & recoctam ad id commendabant, adiecta quinta parte picis Brutia. Pix in Italia, ad vasa, vino condendo, maxime probatur Brutia, inquit Plinius. Picis illitus vino duratricem firmitatem præstat, ait Plinius, ne vinum corrumpatur, & sicubi rimosum vas sit, ne transfluat. Picis alter vsus erat ad condituras. Plinius. Græcia argilla, aut marmore, aut sale, aut mari, lenitatem vino excitat. Italia pars aliqua Rabulana pice. Ratio condiendi musta in primo feruore, qui nouem diebus cum plurimum peragitur, aspersu picis fit, ut odor contingat, & saporis quædam acumina. Is picis odor saporque Romanis olim fuit gratissimus in vinis, quæ ob id Picata appellabant, Galenus οἶνον καὶ πικρὸν & πικρότην. Huiusmodi vina arte, talia erant, vel naturæ sponte, qualia Viennensia, Allobrogum. Plinius. Iam in-

uenta



uenta vitis per se in vino Picem respiciens, Viennensem agrum nobilitans: vulgus ea vina violam olere inquit. Plinius libro 14. capit. secundo. vnam ex qua vina talia exprimuntur Picatam appellat. Picem quidem non solam, sed multa alia medicamina vinis condiendis admiscebant antiqui, veluti nigram Mastichen auctore Plinio, quæ in Ponto Bitumini similis gignitur, & Iridis radicem, Folium, sic enim legendum, non oleum, Nardum Gallicam, vt tradit Columella; Crocum, Palmam, nimirum Elaten Palmæ, Cyperum, Schœnum, Myrrham, atque alia plura cum Pice rasili. Quemadmodum enim cum vinum adeo infirmum esset, vt perennare non posset, aut certe quousque venderetur, durare, periculumque esset, ne acesceret, fugeret, mucesceret, id Resinæ, flore Resinæ, crapula resinacea, sapa, defruto, aliisque odoribus condiebant, ita, Pice interdum sola, interdum cum aliis vt modo diximus, mixta, & ea quidem modo liquida, qualis fuit Nemeturica, vel sicca, qualis fuit corticata Allobrogum, Rasilis, Brutia, vina medicabantur, prius tamen pici liquidæ semper aut cinerem lixiuium infundentes, permiscensque, aut aquam marinam ex alto petitam, vt his & pici odorem auferrent, & spurcitiam eluerent. Alios duos pici apud veteres vsus libet ascribere. Pice illita pilos auellebant, è corporis partibus, quas natura iis vestitas esse voluit, quod *πικρὸν* & *καταπικρὸν* Græci dicunt, à materia qua vterentur in eo fædo ministerio. Hoc verbo vsus est sæpe Clemens Alexandrinus, molle delicatumque institutum, ac improborum hominum artificium accusans. Præterea pice torquebant corpora hominum, qua in re verbo *καταπικρὸν* longe alio intellectu quam in vasis linendis utebantur: valebat enim, cruciatu illo & supplicio afficere. Intellexit hoc Lucretius, cum pœnas mortalium, torméntaque breui exponens, inquit.

Li. 14. c. 20.

Li. 12. c. 20.

Viç. lib. 8.  
Vari. lect.  
cap. 14.

Lib. 3. pæd.

*Verbera, carnifices, robur, pix, lumina tædæ:*

In captiuis

Nec non Plautus, cum induxit Aristophontem refellentem astutam vocem serui, qui dixerat in eum, Atra bilis agitat hominem: At pol te, si hic sapiat senex, Atra pix agitet apud carnificem, actuo capiti illuceat. Pici facultates ex Dioscoride hæ sunt. Pix liquida contra venena, phtisim, purulentam excreationem, tussis, suspiria, & pectoris humores qui difficilè extulsuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. Tonsillarum & vuarum inflammationes, anginaeque, vtiliter perunguntur: purulentis auribus infunditur cum rosaceo: illinitur cum trito sale serpentium moribus: adiecta verò pari cera scabros vngues extricat, impetiginésque emendat: vuluæ duritias, ac sedis tubercula discutit: cum farina hordeacea & pueri impubis vrina decocta strumas rumpit: cohibet vlcerà quæ serpunt, cum Pineo cortice, aut sulfure, aut furfuribus illita: cum thuris manna & cerato profundos vlcerum sinus glutinat: rimis sedis, & pedum magno auxilio illinitur: vlcerà replet, & cum melle purgat, quin & cum vua passa & melle carbunculos, putridaque vlcerà emarginat, ac dirumpit. Erodentibus medicamentis probè immiscetur. Pix arida calfacit, dura emollit, pus mouet, tubercula, panosque discutit, vlcerà replet: vulnerariis medicaminibus commodè permiscetur. Pix sicca Galeno desiccatur, & excalfacit secundo excessu, plus tamen desiccare potest quam calfacere: humida contrà, plus calfacit, quam desiccatur, habetque nonnullam partium tenuitatem, qua & asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autem cyathi linxisse mensuram melli mixtæ. Abstergerendi quandam vimque habet, concoquendi, digerendi, velut & in gustu subamarum quidpiam, & acre. Sic leprosos vngues eximunt amba, mixtæ cum cera, lichenalque detergunt: concoquunt item duos & crudos tumores omnes, cataplasmatibus

*Vires.*

Cap. 81.

Lib. 8. sim.



Lib.1. Dio.  
cap. 78.

Lib.12. c.1.

inditæ. Ad ea omnia, humida valentior est, arida verò tametsi ad ea quidem deterior, glutinandis tamen vulneribus magis conuenit. Pix liquida calfacta, inquit Matthiol. vna cum Thure & Mastiche abraſo occipitio adhibita, prolapsam columellam restituit. Plinius cum de vini Resina conditi facultatibus verba fecisset, subiungit: Innocentius pice sola conditum. Hoc genus vini exalfacit, concoquit, purgat: pectori ac ventri vtile, item vuluarum dolori, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationi, ruptis, conuulsis, vomitis, neruorum infirmitati, inflationibus, tussi, anhelationibus, luxatis in fucida lana impositum. Ad omnia hæc vtilius id quod sponte naturæ suæ Picem respicit, picatumque appellatur.

## TAXVS


## CAP. XXI.

Nomina  
Lib.3. Hist.  
cap. 10.  
Lib. 6. c. 12.

## TAXVS.

Forma.  
In Alexip.  
finc.

Locus.  
Theophr.  
lib. 4. histo.  
cap. 1.  
Tempus.  
Idé ii. c. 6.  
Lib. 3. Hist.  
cap. 10.



milis Abieti, sed non tam alta: plures habet alas: folio Abieti similis est, sed pinguiore, & molliore. Quæ in Arcadia nascitur, ligno est nigro, puniceoque: at quæ in Ida, flauo valde, & Cedro simili. Quare qui id vendunt, emptores decipiunt, pro Cedro id vendentes: cortice enim detracto totum cor est. Corticem Cedro tum scabritia, tum colore similē habet: radices paruas, tennes, per summa cespitum vagantes. Rara hæc arbor est in Ida. In Arcadia & Macedonia copiosum fructum fert, rotundum, faba paulo maiorem, rubrum, mollem. Aiunt veterina, si folia comederint, mori, ruminan



minantia nihil pati. Homines quidam fructu vescuntur: est enim suavis atque innoxius, Plinius cum de Picca & Abiete differuisset, subdit. Similis his etiāmnū aspectu est Taxus, minū virens, gracilisque, & tristis, ac dira, nullo succo, ex omnibus sola baccifera. Mas noxio fructu. Letale quippe baccis, in Hispania præcipuè, venenum inest. Vasa etiam viatoria ex ea, vinis in Gallia facta, mortifera fuisse cōpertum est. Hæc Sestius Smilacem à Græcis vocari dixit, & esse in Arcadia tam præsentis veneni, vt qui obdormiant sub ea, cibūmue capiant, moriantur. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicant venena, quæ nunc Toxica dicimus, quibus tinguntur sagittæ. Repertū innoxiam fieri, si in ipsam arborem clauus æreus defigatur. In quo loco pro Arcadia legendū putat Cornarius Narbonia, velut Diosco. habet. Nam de Hispaniæ & Galliæ Narbonēsis, ad Hispaniā spectantis Taxo loquuntur. Plutarchus eo tantum tempore Taxū noxiam esse tradit, quo florere incipit, quod tum succo sit maximè prægnans. Virgilius Taxum, vt apibus noxiam, ab apiario semouet.

Lib. 16. c. 10.

Embl. 68.  
li. 4. Diosc.  
Lib. 4. sym-  
pos.

*Ne propius tectis Taxum fere.*

Galenus hæc pauca de Taxo. Smilax siue Taxus arbor est venenosa facultatis, Vbi exemplaria falso habent ἡ κακός pro ἡ τὰς. Dioscorides, Auiculæ quæ Italicè Taxi baccas deuorant, denigrantur, & qui ederint easdem homines, alui profluuiū corripiuntur. Narbonæ tam præsentis est veneni, vt si qui dormiant sub ea, aut in eius vmbra subsideant, lædantur, & sæpenumero moriantur. Et alibi. Taxus frigus vniuerso corpori, strangulatus, & celerem interitum infert. Cui eadem quæ Cicutæ conueniunt. Solum merum Nicander exhibet, idq; liberalius hauriendum esse præcipit. Testatur Matthiolus in Tridentinis montibus non veterina solū sed ruminantia etiam animalia deuorata Taxo interire, ipsiusq; baccas iisdem in locis perniciosas esse, seque curasse affirmat pastores, ac lignatores, qui saporis dulcedine allecti, cū has edissent, in febres ardentes inciderunt, & alui profluuiū, non sine magno vitæ discrimine. Contra Penna eius baccas innoxie puerulos esitare in Anglia affirmat, seque gustasse sub hyemen non ingrato sapore, sed fatuo, vel subamaro, ibiq; porcos passim eas tanquam glandes comesse. Nulli sanè Angliæ angulo deesse hanc, vbi semper virente, vmbrosa, densaq; ramorū fronde & latissima, similiter Abieti, pennatis & longis quasi pectinum radiis, ex atro virētibus comosa, in sepulcretis & areis pro templorum foribus pangitur, ad arcendos solis æstus à concione, plebeq; sub tegmine Taxi conuentus agere solita, nullo percepto inde vel tantillo incommodo. Sed hinc existit quæstio, inquit Matthiol. an frigidi, an calidi sit Taxus temperamentis? Dioscorides eiusq; sectatores frigidi esse temperamēti existimarunt, quod iisdem remediis Taxi veneno, quibus & Cicutæ occurrēdū esse ille scripserit. At his opponit Matthiol. amarorem qui cortici ac frondibus inest, comam perpetuò virentem, Pinorum, Abietū, Piccarumq; modo, quibus frondē similis est, baccarum tum dulcedinem, tum acrimoniam quandam, & quod auiculæ eas depasta nigrescant, quæ omnia insignem temperamenti caliditatem arguunt. Quare & febribus, & alui profluuiū tentantur, qui eas baccas ederint, inflāmaris scilicet spiritibus, & sanguine. Quod si quis dixerit accendi febres, fieriq; alui fluxiones ex humorum putredine, quemadmodum æstate ex frigidorum fructuum esu, nigrum verò colorem in auiculis contrahi posse tam à frigido, quàm à calido, quid tandem ad frondium corticisque amarorē, baccarum dulcedinem & acrimoniam, perpetuòq; virentem comam respondebit? Nam hæc à calore fieri nemo negauerit. Febres verò & alui profluuiū ex calore immodico potius, vt deuoratis Anacardiis accidit, quàm ex humorum putredine suboriuntur, & nigror ille pennarum à calido potius quàm à frigido auicu-

Li. 4. Geol.  
Vires.  
Lib. 3. sim.  
lib. 4. c. 75.

Lib. 6. c. 12.

In a. 12. li.  
6. Dioscor.

Ibidem.  
Temper.



*Ufus.*  
Georg. 2. larum pabulo. Frigus enim nigrorem non inducit, nisi sit immodicum, & tantum ut interimat. Quare nigror exustis humoribus gignitur, ut in Æthiopi- bus. Ex Taxo arcus & Icorpiones fiebant, atque etiam hodie fiunt. Virgil.

*Ityros Taxi torquentur in arcus.*

Taxus etiam sectiles laminas glutinandis capsis, scriniis, subfelliis, atque aliis huiusmodi præbet.

V L M V S CAP. XXII.

*Nomina* **D**E glandiferis, coniferis, resiniferisq; Sylvæ nostræ arboribus satis copiose diximus. Superest ut de aliis agamus quæ sylvarum & montium propriæ sunt. Ac primum à nostratibus, notioribusque incipimus, deinde ad externas veniemus. Græcis *ωλεία* dicitur, quæ Latinis Vlmus, Arabibus *Didar*, *Dirdar*, *Luzach*, Gallis *Orme*, Italis *Olmo*, Germanis *Vlmen*, *Ristholtz*, *Lindbast*, *Iffenholtz*, Hispanis *Vlmo*, Anglis *Elmtre*, Belgis *Olimboom*, Boemis *Gilm*. Vlmi duo genera sunt

*Genera.*

Lib. 16 c. 17.

Ibidem.

V L M V S.



Lib. 5. ca. 6.

*Forma.*

Theophr. ibid.

Lib. 16 c. 40.

Lib. 3. Hist. cap. 14.

Lib. 16 c. 17. Li. 16. c. 26.

Ibidem.

lato, & oblongiore quam Pyrus, scabro neque lævi. Materia dura, flava, nervosa, deformis, quia tota cor est, cum viret, casu facilis, si exaruit, difficilis, qua ad fores lautiores utuntur. Rigorem fortissimè servat, inquit Plin. ob id cardinibus assamentisq; portarum utilisima, quoniam minimè torquetur: permutanda tamen sic, ut cacumen ab inferiore sit cardine, radix superior. Semen fert Vlmus latiusculum, rotundum, tenue. Quare aberrarunt ij quos scribit Theophr. putasse Vlmum sterilem esse, quibus tum experientia, tum Plinij auctoritas repugnat, Vlmos omnes, præter Atinias, ex semine provenire tradentis. Sed ipsi Plinio scribenti Atinias non ferre Samaram, & fructum arborum solas nullum ferre, hoc est ne semen quidem, Tamaricem, Populum, Alnum, Vlmum Atiniâ Columella apertè refragatur, cum dicit, Atiniam Vlmum Tremellius Scrofa non ferre Samaram (quod est semen eius arboris) falsò est opinatus. Nam rariorem sine dubio creat, & idcirco plerisq; sterilis videtur, seminibus inter frondem, quam



quam prima germinatione edit, latentibus. Itaque nemo iam serit ex Samara, sed ex sobolibus. Est autem Vlmus ea longè latior & procerior quàm nostras, frondemq; iucundiorē bubus præbet. Hæc Columel. Fert & Vlmus gummi ἐν καρπυκῶς, inquit Theophr. id est in folliculis, non vt Gaza vertit, in petiolis, & animalia quædā culicibus similia. Hi folliculi sunt haud ita parui, subrotundi, crassi, scroti hominis figura, quibus clauditur humor initio lentus, tandem solis vi in gummi concrefcens. Cachryn etiam edit peculiarem, autumnō multā, minutam, nigram. Vlmus Atinia, siue montosa, arbor est multo procerior, ramos tamen tam latè non extendens, folio Vlmī superioris, per ambitum modicè serrato: ligno simili, candido, Buxi instar spisso, solidissimoq; & quod non facile findi se patiatur: vnde ad rotas molares, cochleasque, trochleas, & alia instrumenta quæ pondus magnum sustinent, maximè expetitur. Tragus Orni nomine depinxit. Galli *Charme*, vocant, & *Charpene*. Quamobrem nominum similitudine quidam falsi Carpinum esse putauerūt, cum Aceris genus Carpinus sit, non autem Vlmī. Omnium ferè Vlmī partium magnus est in medicina vsus. Folia, cortex, rami, inquit Dioscor. vim habent spissandi. Folia trita ex aceto ad lepras efficaciter illinuntur, vulnera glutināt, sed multo magis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueatur: nam in lori morē flecti potest. Crassior cortex in vino, aut aqua frigida vnciatim potus pituitas trahit. Fracta ossa celerius solidesunt, si decocto foliorum, corticis, aut radicis foueantur. Humor in folliculis nascens prima germinis eruptione, cuti illitus nitorem inducit, faciēque splendidiorem præstat, is scilicet qui dum siccatur, in animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia tenera olerum modo cocta ad obsonia vsurpantur. Eadem ferè de his Plinius tradidit. Vlmī foliis, inquit Galen. quandoque recens vulnus glutinauimus, confidentes astringentem pariter & abstergentem inesse illis facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est, & astringens, ideo cum aceto & lepram sanat. Porro viridis etiamnum ac recens, si vulneribus vinculi vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem vim obtinent. Nam & decocto earum quidam perfundunt fracturas, quæ topho siue callo inducto opus habent. In his animaduertendum hæc Dioscor. verba, ἢ τὸ φλοιὸν τῶν ῥιζῶν καὶ τὸ ἄφελῆμα τῶν φύλλων, ἢ τὸ φλοιὸν τῶν ῥιζῶν καὶ τὸ ἄφελῆμα τῶν φύλλων, sic esse vertenda. Et decocto foliorum, aut corticis radicū si fracta ossa foueantur, citius callo obducuntur, vt Dioscor. decocto foliorum, aut corticis radicū adscribat, quod Galenus, & eum securi Paulus, atque Aetius simpliciter de radicū decocto produnt. Eorū sensum in Dioscoride exprimere voluisse videtur Ruellius, aut in Dioscor. legisse, ἢ τὸ φλοιὸν, ἢ τῶν ῥιζῶν, &c. quam tamen particulam ἢ secūdo loco positam in nullis excusis exemplaribus comperi. Humor qui folliculis Vlmī continetur (vt experientia sibi compertum esse Matth. affirmat) medetur puerorum enterocelis, si linteola eo madefacta saepe inguini affecto imponatur, & perizomate seu ventrali constringantur. Eodē liquore vitreo vase concluso, & in terra aut fimo



ULMVS ATINIA.

Nomina

Lib. 3. c. 73.

Vires.

Lib. 1. ca. 95.

Vires.

Li. 24. ca. 8.

Li. 8. simp.

Lib. 1. Dio-

scor. c. 95.

viginti



viginti quinque dies condito, vasis ore diligenter obturato, fundo verò super salis communis stratum collocato, euenit vt fex subsidat, & liquor clarissimus supernatet, qui ad vulnera recentia glutinanda adeo efficax est, vt mirum dictū sit, quàm bellè celeriterq; id efficiat, cū splenis iucūdis, aut penicillis admotus. Corticis radicum decoctum articulorum duritias emollit, & neruorum cōuulsiones resoluit, fatus aut balnei modo adhibitum. Præterea tumores discutit, quos iugi attritus in collo boum excitauit. Interiores Vlmi radices si diu decoquantur, & decocto supernatans pinguitudo colligatur, eaq; illinatur sæpe locus à quo pili defluerint, ij breui renascentur. Eiusdem cortex contusus, & muria vsq; adeo subactus, vt malamagti similis sit, illitus podagricos dolores mulcet. Folia Vlmi quæ ad Orientē spectāt impari numero decerpta, & cum piperris granis cōtrita, & ex vino Cretico pota à ieiunis, auctore Marcello, purulentas tusses mirificè iuuant. Humor illè folliculorum Vlmi videtur in empla-

Lib. 2. med.  
gen. cap. 7.

Li. 3. Histo.  
cap. 14.  
Lib. 1. ca. 95.  
Lib. 5. c. 60.

Lib. 6. c. de  
cerul.

Lib. 1. ca. 95.

strum quoddam Melinum, quod Rustico adscribitur, recipi apud Galenum: *ωλεάς*, inquit, τὸ ἐν ὕλακις Δραχ. i.e. quæ non rectè vertit interpret Vlmi in sacculis ex corio recondita denarium pondo. Dicendum enim, Humoris Vlmi qui in folliculis cōtinetur drach. quindecim, vt τὸ ὑγρὸν, aut quid simile intelligatur. Nec enim video quid aliud de Vlmo sibi velit, nec aliud hic est τὸ ὕλακιον Galeno, quàm *κωρυκὸς* Theophrast. sic enim in eo legendum, non *κωρυκὶς*, & φύλα Dioscoridis quibus nominibus folliculus, vtriculus, vesicula significatur. Paulus inter remedia quæ Cerusa veneno aduersantur recenset *κοκκυμήλων κέρμη*, ἢ *ωλεάς* δ' ἐν τοῖς ὕλακις ὑγρὸν μετὰ *χλιαρὸν ὕδατος*, id est Prunorum gummi, aut Vlmi humorem, qui in folliculis ipsius continetur. Quo in loco quamuis Paulus Galenica τὸ ὕλακις voce sit vsus, tamen cum totum id caput, vt & alia ex Dioscoride ad verbum exscripsisse constet, ex eo locus Dioscoridis eadem de re, deprauatus facillè restituetur: ἢ *κοκκυμήλων*, inquit, ἢ *κέρμη* *ωλεάς*, ἢ τὸ ἐν τοῖς φύλλοις τὸ *χλεάς* ὑγρὸν μετὰ *χλιαρὸν ὕδατος*. Ruellius, aut Prunis, aut gummi quod Vlmius plorauit, aut humor quem Vlmea folia reddiderunt, &c. Legendum verò ἢ *κοκκυμήλων κέρμη*, ἢ *ωλεάς* δ' ἐν ταῖς φύλλοις ὑγρὸν μετὰ *χλιαρὸν ὕδατος*. Sed quid Paulo teste opus est, cum ipse Dioscor. alibi id satis testatum reliquerit? δ' ἐν ταῖς φύλλοις (τῆς *ωλεάς* suba.) καὶ τὴν πρῶτην ἐκέρμασιν ὁρισκόμενον ὑγρὸν, id est, Humor qui in folliculis Vlmi prima germinatione reperitur.

### FRAXINVS ET ORNVS. CAP. XXIII.

Nomina

Genera.

Lib. 3. Histo.  
cap. 11.

Li. de arb.  
cap. 16.

Ibidem.

In sympof.  
Ibidem.

Li. 6. ca. 13.



Væ arbor Græcis *μελία* dicitur, Latinis appellatur *Fraxinus*, Gallis *Fresne*, Italis *Frassino*, Hispanis *Fresno*, & *Frexo*, Germanis *Eschern*, *Eschherbaum*, *Steyneschern*, Anglis *Aschetre*, Boemis *Gisen*, Belgis *Eschen*. Eius genera duo esse prodidit Theophr. Vnum excelsum, procerū, ligno candido, neruoso, molliore, crispiore, magis enodi. Alterum humilius, minus augescens, scabrius, durius, & magis flauum. Hanc *Fraxinum*, *Ornum* esse existimant, *Fraxinum*q; syluestrem *Columellæ*, Italis *Orniello* dictam. Macedones auctore Theophr. priorem *βυμελίαν*, id est grandem *Fraxinum* vocant, non vt Theodorus interpretatus est, *Bubulam* *Fraxinum*, perinde quasi *πολυμελίαν* dixissent, βυ particula magnitudinem significāte, ab Aeolicis sumpta, β, pro ω, in dictione *ωλυ*, & expuncto, λ, elemento βυ pronunciantibus, vt testatum reliquit Plutarchus. Est vt scribit Theophr. quæ in montibus nascitur, bene colorata, lauis, spissa, lenta: quæ in planis, male colorata, rara, scabraq;. Hæc Plinius sic transcripsit, Græci duo *Fraxini* genera fecere, longam, enodem. Alteram breuiem, duriorē, fusciorēque, Laureis foliis. *Bumeliā* vocant in Macedonia, amplissimā, latissimāque. Alij situ diuisere. *Campestrē* enim esse crispam





crispam, montanam, spissam. Virgilius quoque montanam Ornum facit, cum scribit: *Cantandorigidas deducere montibus Ornos.*

Eclog. 6.

Vtriq; folia sunt Lauri latifoliae similia, in acutiùs coacta, in ambitu nonnihil ferrata, non pungentia (nam in Theophrasto falsò scriptum esse puto *καὶ ἐπαχυνθίζοντα*, vel vt Gaza legisse videtur *καὶ ἐπαχυνθίζοντα*, id est ac subsidentia, pro *ἐκ ἐπαχυνθίζοντα*.) Quod verò sequitur, aliter & rectiùs videtur legisse Gaza, quàm in Codicibus nostris sit exaratum, hoc modo. *τὸν δὲ ὅλον κλάωνον, ὅνδε ἔπει- τις μονόφυλλον, τὸ δ' αἶμα φυλλορρεῖν*, &c. Id est, Ramum totum vnum folium esse quis dixerit, quoniam ab vno pediculo folia simul iuncta exoriantur, quæ coniugatim velut per genicula in singulis ordine dependent, frequentibus ac crebris coniugationibus, perinde atque in Sorbo. Inde non illepidè Plinius folia pennata dixit. Humilis Fraxini internodia breuia sunt, foliorum

Forma.

coniugationes pauciores (legendum enim *ἐστὶ δὲ τῶν μὲν βραχέα & μετὰ γονά- τια*, &c.) Albæ autem siue montanæ longæ coniugationes, & plures, quia latius distinctæ, latioraque interualla, id quod significasse mihi vide- tur Columella, cum scripsit Ornum paulo latioribus esse foliis, sed fo- lia singula oblongiora, angustiora, obscurius virentia porracei coloris: *τὴν δὲ χροὶν παρὰ σάδην*, inquit Theophrastus, Hermolaus verò legit *τὴν δὲ χροὶν παρὰ σάδην*, id est coloris herbacei: Cortice læui, spisso, tenui, rubescente inte- gitur: radicibus crebris, crassis, altisque nititur. Idæi fructu floréque carere existimant: fert tamen in siliqua fructum minutum, nucis modo, qualem Amygdalæ, gustu subamarum. Fert & quædam alia, *ὅσον βρύα*, id est veluti muscos, inquit Theophrast. vt Laurus: cæterum densiores, & magis compa- ctos, *στυφνότερα*, non *στυφνότερα*, globosos, non aliter quam Platani pilulas, & eos quidem partim fructui propinquos, partim à fructu longè semotos, & plures quidem (*πλεῖστα*, non *πλεῖστε*) eo pacto nimirum à fructu multum distantes. Globosos hos muscos ego in Fraxino obseruavi & collegi hyeme iam desinente. Sunt autem hi tuberosi, velut ex resiccato impensius glutinoso musco


Lib. 16. c. 13.

Li. de arb. cap. 16.



## FRAXINVS CVM

fructu, &amp; Pilulis.



Locus.  
Ibidem.

Lib. 16. c. 18.

Dodo. li. 6.  
cap. 70.

Plin. lib. 16.  
cap. 26.  
Lib. 1. c. 91.

Lib. 7.

Lib. 16. c. 13.

Ibidem.

Lib. 7. Ep. 4.  
Lib. 1. Dio-  
scor. a. 91.  
Lib. 3. Hist.  
cap. 10.

Lib. 6. ca. 3.

Ibidem.

Lib. 3. Hist.  
ca. 10.

musco concreti, gustu nonnihil adstringen-  
tes, lignoso intus nodo muscosum corpus  
sustinente. An verò in Lauro tale quippiam  
gignatur nondū obseruavi. Scio tamē Theo-  
phrast. cap. 8. lib. 3. cū recenset arbores quæ  
præter fructum peculiarem alia nonnulla  
ferunt, tradere, in Ulmo gigni vuam, &  
folliculos: in fico, grossos, & ficus: in Auel-  
lana nucem, & Iulum: in Illice, glandem &  
coccum: in Lauro fructifera, non omni qui-  
dem, sed aliqua eius specie, baccam, &  
vuam, (τὸ βότρυν, nisi legendum sit, τὸ βρύον,) quæ tamen vña in Lauro non fructifera, quam marem vocant, magis gignitur. In Lauro Muscum aut Vuam me vidisse equi-  
dem non memini. Lævis Fraxinus, vt scribit Theophr. locis βαθυκλοις, id est valde umbro-  
sis gaudet, Gaza βαθυκλοις videtur legisse, vertit enim, locis concauis madidisque: sca-  
bra, siccis, atque saxosis. Plinius verò: Aquo-  
sis montibus gaudet Fraxinus. Descendunt & in plana Ornus, & Fraxinus. Fraxinus loca humida amat, vt fluuiorum ripas. Ornus in montibus prouenit, & umbrosis syluis. Fraxinus melsibus reddit semē. De Fraxino mentio nulla apud Galenū inter simplicia medicamēta, neq; apud Aetiū. Fraxini foliorum succus, inquit Dioscor. ipsaq; ex vino pota, & illita, viperarū iectibus auxiliantur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta scobemque potu perniciem asferre tradunt. Paulus hæc Dioscoridis verba transcripsit, neque quicquam amplius addidit. Quod Dioscorides de foliorum & succi ipsorum potu atque illitu scripsit, hoc etiam Plinius habet. Contra serpentes succo expresso ad potum. & imposita vlcibus, folia opife-  
ra, ac nihil æquè, reperiuntur. Sed quod idem ait: Folia earum iumentis mortifera, cæteris ruminantium innocua, Græci quoque prodidēre. Hoc autem non sine errore ab ipso proditum est, meritoq; à Manardo & Matthioli reprehendi-  
tur, quod μέλαν, quæ Fraxinus est, pro μίλῳ, id est Taxo agnouerit apud Theophr. cuius hæc sunt verba: φασι δὲ τὸ μῆλ' ὅτι φέρει ἐν φαγῇ τῶν φύλλων, ἀποθνήσκει, τὸ δ' ἐν μύλῳ τὸ ἐν πύλλῳ, quæ cum περὶ τῆς μίλῳ Theophrastus scribat, Plinius de Fraxino intellexit. Quamobrem de suo adiecit: In Italia nec iumentis nocent, quod quotidiana experientia id certissimum esse perspiceret. Quin & Columella inter frondes quibus tota æstate, & deinde autumno satiantur bo-  
ues, probat maximè Ulmeam, post Fraxineam, ab hac Populneā. His ipsis foliis tantam esse vim aduersus serpentes tradidit Plinius, vt ne matutinas quidem occidentesue umbras, quam sunt longissimæ, serpens arboris eius attingat, adeo ipsam procul fugit. Experti prodimus, inquit, si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius quàm in Fraxinum fugere serpentem. Mira naturæ benignitas, priusquàm hæc prodeant, florere Fraxinum, nec ante conditas folia dimittere. At verò non hoc solum quod modò diximus de Taxo à Theophrast. traditum, ad Fraxinum transtulit Plinius, sed etiam quod paulo ante dicit, Eam quidem Fraxinū quæ nascitur in Ida, esse in tantū Cedro similē, vt ementes fal-  
lat, cortice ablato. Hoc enim Theophr. eodem loco de Taxo sic habet: ἡ δ' ἐν τῇ Ἰδῇ



ἰδὼς ξανθὸν σφόδρα, καὶ ὅμοιον τῇ κέδρῳ, διὸ καὶ τὰς πωλόντας φασὶ ἐξαπατᾶν, ὡς κέδρον  
 πωλόντες πάντες ἔναι καρδίαν, ὅταν ὁ φλοιὸς περιμερῇ. Dicit aliquis, Fraxi-  
 neas meas quales hodie habent multi, vndoso venarum discursu, Citreas,  
 Cedrinas, & Acernas æmulari, quod ut verum esse fatear, ita pro Plinio facere  
 negauerim, qui non eo iudicio, neque eo sensu de Fraxino id prodidit, sed  
 Theophrast. verba cum Latine exprimere vellet, quod Theophr. Taxo, id Fra-  
 xino perperam illum attribuisse perspicuum est. Plura de Fraxini viribus Plin-  
 ius quam Dioscorides tradidit. Semen foliis eius inest, quo medentur iocino-  
 ris & lateris doloribus in vino: aquam quæ subit cutem extrahunt: corpus  
 obesum leuant onere, sensim ad maciem reducentes, iisdem foliis cum vino  
 tritis, ad virium portionem, ita ut puero quinque folia tribus cyathis diluan-  
 tur, robustioribus septem folia, quinque cyathis vini. Non omittendum ramenta  
 eius & scobem à quibusdam cauenda dici. Obseruandum autem ramenta  
 scobemque à Plinio hic dici quæ *τορνύμια* Dioscorides vocat, & quæ etiam  
*πέρισματτα*, & *πελεεύσματτα* à Græcis dicuntur. Galenus in confectionibus hepaticis  
 ab Asclepiade conscriptis, cuiusdam meminit, quæ semen Fraxini recipit.  
 Aetius verò idem medicamentum Asclepiadæ ex Philagrio citat, & Oribasium.  
 Fraxini semen non admittere scribit, additque Fraxini semen, seu fructum esse  
 arboris, ex qua Fraxinea ligna quocunque in opere apta ac obedientia caduntur,  
 hoc est, *ἐξ ὧν ἐργάσιμα μελινὰ ξύλα κομίζε*. Semen Fraxini, inquit Matthiol.  
 quod auis linguam vocant officinæ, vtiliter propinatur in lateris dolore, & ad  
 ciendam vrinam: venerem excitat, præsertim si cum Pistaciis, & nucleis Pineis  
 deuoretur, addito Saccharo, vel cum nuce Myristica, ut testantur Isaac, Rhazes,  
 Damascenus, cæterique Arabes. Nouembris initio decerptum, & in furno sic-  
 carum maximè confert calculosis, ex vino vetere potum. Fraxini spumofus li-  
 quor qui è viridi ligno igni imposito manat, additis succi Cyclamini, Scyllæ,  
 Rutæq; æqualibus partibus, omnibus simul parum feruefactis plurimum ad  
 surditatem valet, si in aurem sanam (alij ægram malunt) liquor hic calidus in-  
 stilletur, cum itur cubitum. Oportet autem in aurem affectam (aliorum sententia  
 sanam) iacere. Cum verò aurē utrāque surditas occupauerit, in eam quæ mi-  
 nus (aliis magis) laborat liquor infunditur, & in alteram iacet æger. E viridi  
 Fraxini ligno tessellatim conciso per descensum, ut loquuntur, aqua & oleum  
 eliciuntur, veluti ex ligno Iuniperi. Aqua cum quarta parte aquæ violarum pur-  
 purearum faciei illita, ruborem & pustulas cum eo erumpentes sanat. Oleum  
 tradente Manardo, potum, hepaticis spleneticisque maximè conducit. Corti-  
 cis ramorum ex aqua decoctum splenem absument, si eo diutius vrantur splene-  
 tici: Folia, cortexque Fraxini moderatè calida sunt auctore Dodon, & tenuium

Lib. 24. c. 8.

Lib. 8. med.  
part. cap. 8.  
Lib. 10.Lib. 1. Dio-  
scor. ca. 92.

Lib. 6. c. 70.

*Fraxineum semen cum Bacchi rore bibendum est.*

E ligno Fraxini pocula fiunt, ex quibus si quis assidue bibat, lienem  
 extenuari aiunt. Fiunt etiam ex eo mensæ, vasa, ac utensilia  
 multa. Eius enim materies, ut scribit Plinius, est  
 ad plurima utilis, multumque Homeri  
 præconio, & Achillis hasta  
 nobilitata.

Lib. 16. c. 13.



Genera.  
& No-  
mina.

Forma

**R**IA sunt Theophr. & Plinio Populi genera. Populus alba quæ Græcis λευκή, Arabibus *Haur*, dicitur, Italis *Popolo bianco*, Gallis *Aubeau*, & *Peuplier*, Germanis *Bellere*, *Poppelbaum*, & *Salbaum*, *Abiolbaum*, Hispanis *Alamo Blanco*. Populus nigra Græcis ἄργεος, Arabibus *Haur romi*, Italis *Popolo nero*, Gallis *Peuplier*, & *Tremble*, Germanis *Aspen*, & *Poppelweiden*, Hispanis *Alamo nigro*. Populus Lybica, Theophr. λευκός, quibusdam Populus Alpina, Gallis *petit Tremble*. Anglis *Asp*, or *Poplar tree*, Boemis *Topel*. Populus alba arbor est magna, proceraq; crasso caudice, cortice, præsertim ramulorum, albicanre, ac læui: foliis vitigineis, latis, angulatis, aduersa parte virētib; auersa maximè

POPVLVS ALBA.

POPVLVS NIGRA.



albicantibus, lanuginosis, læuibus, mollibusque, Bechij modo, quod à similitudine Chamæleucen vocauēre Græci, hanc verò Populum Leucen. Materia est candida, non dura. Antequam folia emittat, Iulos producit longos, coloris punicej, bene diluti. Populū hanc Homerus ἀχερῶϊδα ab Acheronte appellat, quod Hercules deuicto Cerbero Populum arborem ex Achorante secum detulit, frondibusq; Populeis coronatus, latitiam quam ex tot victoriis cœperat, declarauit. Exemplo Herculis omnes in certamine aliquo cum laude & gloria versati, victoriamq; consecuti, Populi fronde coronabantur. Populus nigra magna etiam, procera, crassaque est arbor, cortice læui minimè tenui, cineritio: folio Hederaceo, longiusculo, prope pediculum lato, apice in acutū desinente, non, vt in alba, laciniato, sed in ambitu paulum serrato, nigricante: longo, tenuiq; pediculo appenso. Huius Iuli racematim compacti multis baccis rotundis constant, in quibus multa concluditur lanugo candida, quæ maturis baccis in pappos auolat. Aprili mense, & Martij fine proueniunt. Materia est alba ad asseres faciendos præcipuè idonea. Germina quæ folia antecedunt (oculos vulgo vocant) valde odorata viscido humore & flauo turgent, ex quibus vnguentum Populeum cognominatum parant Sepalsia. Quo tempore Iuli produ

Alid. 5.



## POPVLVS LYBICA.



producuntur, ea colligēda sunt. Populus Lybica nigræ similis, hac, & alba aliquatulo minor, cortice nigriore, materia imbecilliore, alba tamen, ac tenaci: foliis latis, breuibus, rotundioribus, nigrioribus, durioribusq; Populi nigræ foliis, per oras incisis, longo tenuique pediculo appensis, eamque ob causam continuo sese mouentibus, semperque tremulis, & inter sese crepitantibus, vnde *Tremble* à Gallis nomen inditum. Iulos producit cæteris longiores, & magis nigricantes, coloris scilicet ex cinereo fusci. Gaudent Populi viginosis locis, fluminum ripis, & scrobium aggeribus. Montes amat Populus, inquit Plinius. Harum omnium sic meminit Theophrastus. Populus alba nigræque vnus sunt formæ, ambæ rectæ, sed nigra excelsior, & læuior. Foliorum figura similis, & simile lignum candore, cum caeditur. Vtramque flore carere existimant. Cercis (Gaza Alpinam, alij Lybicam vertunt) Populo albæ similis est, tum magnitudine, tum ramorum cādore: folio Hederæ, sed parte altera

*Locus.*  
Li. 16. c. 18.  
Lib. 3. Hist.  
cap. 14.

non anguloso, altera angulum habente, oblongum, in acutum desinētem: colore parte supina pronaque fere simili, ex petiolo longo, tenuique pendente, ideoque non recto, sed inclinato: cortice asperiore scabrioreq; quam Populus alba, sed Pyri sylvestris modo. Idem alibi. Quidam Populum nigram solam sterilem esse putant, vt Arcades, cæteras omnes quæ in montibus proueniunt fructum proferre. At in Creta Populi nigræ multæ sunt fructuosæ. Ex priore Theophrasti loco reprehendendi nos aniam quis arripiat, quod alia folia Populo albæ, alia nigræ tribuerimus, ille verò foliorum vtriusque figuram similem esse dixerit. Sed ex ipso Theophrasto respondemus, aliarum omnium arborum folia sibi ipsa similia esse, Populi autem, & Hederæ, & Ricini dissimilia. Recentia enim Populi vtriusq; & Ricini folia rotunda esse (de quibus intelligit, cum dicit vtraque foliorum figuram similem habere) vetera fieri angulosa. Alibi etiam scripsit Populum albam in nigram mutari, tum foliis, tum tota specie. Plinius de Populo hæc literis mandauit. Populi tria genera, alba, nigra, & quæ Lybica appellatur, minima folio, ac nigerrima, fungisque enascentibus laudatissima. Alba folio bicolor, superne candicans, inferiore parte viridi. Huic nigræq; & Crotoni folia in iuuenta circinata rotunditatis, vetustiora in angulos exeunt. Populorum foliis grandissima lanugo. Euolat candida (tradita folio numerosiore candida) vt Iulus. In quibus Plinium errorum aliquot conuincit Matthioli. Primum enim scribit Populi albæ folia superne candicare, inferne viridia esse, cum contra superne vireant, inferne candicent: Deinde quod sine discrimine, inquit, Populorum foliis grandissima lanugo, cum hæc in alba tantum efflorescat, in nigra minimè. Postremò quod populum inter eas recenscat, quæ nec fructum, nec semen ferant, cum nigra Populus, vt ostendimus, fructum ferat vuarum specie, intus alba lanugine refertum, atque etiam scribat Dioscorides, semen ex aceto potum comitialibus prodesse. At Plinius ipse alio in loco Populum vvas & semen proferre tradit, illas ad vnguentorum vsum, hoc comitialibus vtile? Ex quibus Plinij verbis natus videtur esse error Ruelli scribentis

Li. 3. Hist.  
cap. 5.

Lib. 1. Hist.  
cap. 16.

Li. 2. Caus.  
cap. 21.  
Lib. 16. c. 23.

Lib. 1. Dioscor.  
c. 93.

Li. 16. c. 26.

Lib. 1. ca. 93.  
Lib. 24. c. 3.

Lib. 1. c. 119.



vnguentum Populneum, quod Ægironon Græcis dicitur, ex vua Populi, quæ  
 Bryon est, confici verno tempore, cum plurimum grauis est, prægnansque resi-  
 na. Sed caueant Pharmacopœi, inquit Matth. vnguentum quod Populeum vo-  
 cat, ex vuis Populi conficere, quoniã Nicolaus Myrepsicus non vuas, sed ger-  
 mina, vt diximus, quæ vere primo exeunt, huic admiscet, quæ odorata sunt, &  
 veluti cera turgida, cum nullus vuis sit odor. Verum enimvero an antiqui Po-  
 puli vuas ad odorata vnguenta adhibuerint, dubitat Matth. Nam Plinius quo  
 loco de vnguentorum materia tractat, Populi vuam nihil aliud esse ostendit,  
 quam ipsius Bryon, id est Muscum, quem Populneum Muscum Diosco. & Ga-  
 lenus vnguentis oleisque inferunt, & inter odorata recensent. Optimũ, inquit,  
 Dioscorides, est Cedrinum, proximum Populneum, &c. Quare Plinius halluci-  
 natus Muscum in Populo nascentẽ nihil ab eiusdem vuis differre existimauit.  
 Eius verba sunt. Eodem & Bryon pertinet, vua Populi albæ. Optima circa Cni-  
 dum, aut Cariam, in sitientibus, aut siccis, asperisque: secunda in Lycia Cedro.  
 Hæc Plinius. At Cedrus nullas fert vuas, sed Muscũ odoratũ. Populus vtraque,  
 inquit Matthiol. nascitur frequentissima in agro Mantuano, ac Ferrariensi, non  
 modo in Padi ripis, sed & per agros, & prata, in fossarum aggeribus, Dioscori-  
 des vtriusq; Populi has esse vires tradit. Potus albæ Populi cortex vncie vnus  
 pondere, ischiadicis, ac vrinæ stillicidio. prodest. Conceptionem impedire,  
 vel sterilitatem inducere tradunt, si cum mulæ rene bibatur, (sic enim verteda  
 sunt illa verba ἰσχυρὰ καὶ ἀσθενεῖς, &c. non, abortiuum fieri tradunt, vt vertit  
 Ruellius:) folia quoque cum vino post purgationes pota, idẽ præstare produn-  
 tur. Tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pilulæ quæ pri-  
 mo foliorum partu proueniunt, tritæ & cum melle illitæ oculorum hebetudini  
 medentur. Memoria prodiderunt corticem Populi albæ & nigræ, particulatim  
 cæsum, & sulcis stercoratis mandatum, omni tempore anni edules fungos pro-  
 ferre. Populi nigræ folia cum aceto. magna vtilitate podagricis doloribus illi-  
 nuntur. Resinam Populus fundit, quæ in mal'agmata additur. Semen potum ex  
 aceto comitialibus vtile est. Eadem Plinius habet, quibus addit: virgam Populi  
 in manu tenentibus intertrigo non metuatur. Humor è cauis Populi nigræ ef-  
 fluens verrucas, papulasq;, & attrita corporis tollit. Populi ferunt & folijs gut-  
 tam, ex qua apes Propolim faciunt. Serenus.

*Sapius oculus vincta coxendue morbus*

*Perfurit, & gressus duro languore moratur.*

*Populus alba dabit medicos de cortice potus.*

Li. 7. simp.

Li. 6. simp.

Ibidem.

GALENVS. Populus alba mistæ quodammodo temperaturæ est, ex aquea tepi-  
 da, & terrena extenuata essentia. Quamobrem & abstergentis facultatis est par-  
 ticeps. Populi nigræ flores calidi facultate quidem sunt in primo recessu a tem-  
 peratis, sed in differentia quæ habetur in siccando & humectando, paulũ a tem-  
 peratis & mediis ad siccus deflexerunt, verum & subtiliorum potius quã cras-  
 siorum sunt partium. Folia quidem ipsius quodammodo floribus similia sunt,  
 nisi quod ad omnia imbecilliora, minusq; efficacia. Sed & Resina eius floribus  
 similem facultatem obtinet, atq; etiam calidiorẽ. Porro sem, tumen Resina, tum  
 floribus, & subtiliorum est partium, & magis exiccat, non tamen est admodum  
 calidum. Scribit Matthiol. nigræ Populi prima germina, odorata, glutinosaq; ad  
 capillorum nitorem à mulieribus expeti. Contundunt enim ea cum recenti bu-  
 tyro, deinde aliquot diebus insolata à butyro percolâr, quo capillos inungũt,  
 abluto prius capite. Lybica Populi folia ad ea omnia valent, ad quæ nigræ Po-  
 puli folia valere diximus, sed longẽ inefficius. Populus alba idem, inquit, hu-  
 mo tenus secta ad radicem vsque, & aqua calida, in qua fermentum dissolutum  
 fuerit,



fuerit perfusa, infra quatrimum fungos copiosos edit, esuiq; gratissimos. Vnguentum Populeum, cuius supra meminimus, contra calorem febrilem, & ad somnum conciliandum temporibus, & pulsantibus arteriis illinitur. Ex nigra Populi semine, oleum αἰχμέλων paratur æstate, cum nulla est circa illud Resina. Sumunt eius grana, modicèque confringunt, & ad pondere expensum indurientem, olei dulcis sextarium immittunt, & ad dies quadraginta insolant, atq; ita excolatum reponunt. Hoc oleum calfacit, tenuium est partium, mollit cum odore iucundo. Populi materia lenta, ideoq; scutis faciendis apta, inquit Plinius. Populi vitibus placent, nulla illarum umbra, ludentibus foliis.

Acc. lib. 1.  
Paul. lib. 7.

Li. 16. c. 40.  
Lib. 16. c. 37.  
Lib. 17. c. 12.

TILIA. CAP. XXV.

VÆ Latine Tilia, Græcè φάληρα dicitur, quod in tenues assulas & Philyras discerpatur, Gallicè *Tiller*, *Teillen*, *Teil*, Italicè *Tilia*; Belgicè *Linden*, Germanicè *Linden*, & *Lindenbaum*, *Steinlinden*, Hispanicè *Teia*, Anglicè *Lindentre*, Boemicè *Liipa*. Duo eius genera, mas, & foemina. Hæc vulgatio ac notior, procera est crassaque arbor, vastis & multum diffusis ramis, magna umbra terram opacantibus: cortice exteriori parte fusco, lævi, nudo, interiore candido, lento, flexilique, ex quo intorquentur funes. Inter corticem hunc & lignum alij tenues sunt interiores cortices, & veluti membranæ, à quibus aliarum quoque arborum cortices interiores Tiliæ vocantur, & Philyræ, quod Plinius declarat his verbis. Inter corticem & lignum tenues tunicas multiplici membrana, è quibus vincula Tiliæ vocantur, tenuissimæ earum Philyræ, coronarum lemniscis celebres, antiquorumque honore, qua in significatione ipse vsurpat de Vlmo loquens. Corticis interior tiliæ lepras sanat. Et paulo post. Idem præstant & tiliæ corticis. Materies huius ligni lævis est, enodis, in opere tractabilis, ex qua carbones fiunt conficiendo pulueri machinarum bellicarum utiles. Folia multum virent, latiuscula sunt, toto ambitu modicè serrata, Hederaceis haud absimilia. Flores albicant, odorati,

Nomina

Genera.


Forma.

Li. 16. ca. 14.

Lib. 14. c. 8.

TILIA FOEMINA.

TILIA MAS.





Forma.

Lib. 3. Hist.  
cap. 10.

Lib. 16. c. 14.

Lib. 11. Dios-  
cor. c. 108.  
Ibidem.Lib. 1. c. 138.  
Ibidem.

multi simul ex medio folioli candidi, angustiq; penduli. Fructus pilulæ sunt, siue bacculæ rotundæ, racematim Corymborum Hederae modo coaceruatæ, in quibus semen minutum continetur, rotundum, nigricans, quod ex minutis baccis immaturis ac dehiscantibus excidit. Tilia mas arbor est non minùs pro-cera, crassa, ramosa quâ fœmina: cortice lento quidem, sed minùs flexibili, magis scabro, spissiore, fragiliore, cineritio, in ramusculis candidiore, quàm in Tilia fœmina, sed non tam candido, quàm in ramulis Vlmi: materie durior, magis nodosa, magisq; fulva, Vlmo valde simili. Foliis est latioribus, scabris, parum in ambitu crenatis, foliis Vlmi, haud absimilibus. Hæc Tilia fructum semper non profert: quare sterilis à quibusdam esse existimatur. Interdum tamen siliquas edit rotundas, compressas, coaceruatas, cum crena, siue fissura in summa parte, quarum singulæ ex singulis petiolis dependent. De Tilia hæc Theophr. prodidit. Tilia altera mas est, altera fœmina. Differunt inter se tum tota forma, tum ligno, & quod altera fructifera est, altera sterilis. Mas enim ligno est flauo, duro, magis nodoso, spissioréque: fœmina candidiore. Cortex maris crassior, & detractus propter duritiam flecti nequit: fœminæ candidior, & flexibilis, ex quo cistæ fiunt, item odorator. Præterea mas sterilis est, & sine flore: fœmina florem & fructum gignit. Flos calyci similis iuxta folij pediculum, & anni sequentis Cachryn, suo petiolo nixus emergit, viridis, dum in caliculo est, detectus autem, subflauus. Floret cum vrbani arboribus. Fructus rotundus, oblongus fabæ magnitudine, Hederae corymbis similis: maiusculus quinque angulis constat, velut eminentibus fibris, & in acutum sese contrahentibus, minutior minus diuisus. Grandior exculptus, parua quædam tenuiâque semina emittit, quanta sunt Atriplicis. Folium & cortex suauia dulciâque. Folium figura Hederae folio simile, verum sensim magis rotundatur, & iuxta pediculum id quod velut in gibbum prominet, à folij medio, longiore tractu, in acutum magis cogitur. Per ambitum crispa & serrata folia sunt. Medullam paucam lignum habet, ac eam quidem quàm in aliis materie generibus molliorem: & alioqui lignum ipsum quoque molle est. Plinius horum magnam partem sic expressit. In Tilia mas & fœmina differunt omni modo. Namque & materies maris dura, rufiorq; ac nodosa, & odorator: cortex quoque crassior, ac detractus inflexibilis: nec semen fert aut florem vt fœmina, quæ crassior arbore, materie candida præcellensque est. Mirum in hac arbore fructum à nullo animalium attingi: foliorum corticisq; succum esse dulcem. Materies teredinem non sentit, proceritate perquam modica, verum utilis. Ex quibus perspicuum est Plinium φιλύραν Theophr. Tiliam reddidisse, & dixisse maris corticem odoratiorem esse, cum id de fœminæ cortice dicat Theophr. Quod verò scribit, Mirum in hac arbore, &c. hoc ex eodem Theophr. habet: ἰδιώτατον δὲ τὸ ἐπὶ τῆς φιλύρας, inquit, τούτης καὶ τὰ μὲν φύλλα γλυκεῖα, καὶ πολλὰ τῶν ζώων ἐσθίουσι, ὁ δὲ καρπὸς ὅθεν βρωσὶς. Adhuc quod dixit Tiliam proceritate esse perquam modica, cum contrâ excessam & amplam arborem esse inter omnes constet, apertè indicat (vt rectè etiam Matth. annotauit) ipsum nominum vicinitate deceptum, Theophrasti Philyram cum Dioscoridis Philyrea confudisse, quam Philyream arborem ligultri magnitudine esse Dioscor. prodidit. Præterea Plinius vulgari nostræ Tiliæ eas vires adscribit, quibus Philyream præditam esse Dioscorides auctor est. Id quod etiam fecit Ruellius ipsum secutus. Eundem Plinij errorem, etiam secuti Hermolaus, & Marcellus, Philyreâ Dioscoridis Tiliam sunt interpretati, eandem arborem esse arbitrati, quæ φιλύρα, idest Tilia dicitur. His quibus nomen similitudo imposuit: quod doctissimis viris contigisse mirum, cum Tilia à Philyrea notis omnibus diuersa sit, vt ostēdemus cū de Philyrea tractabimus. Cæterum



Caterum Tilia, aquosis montibus gaudet, inquit Plinius, & montes vallésque diligit. Eius cortex foliâque auctore Dodo. temperata sunt caliditatis, parum deficcant & astringunt, eiusdémque ferè sunt cum Vlmo temperamenti. foliorum in aqua decoctum pustulas, exculcerâque maligna in ore puerorum collutione sanat. Folia in aqua tusa commodè pedum tumoribus imponuntur. Cortex Tiliæ in aceto tritus vitiliginibus albis, & aliis huiusmodi cutis vitiiis medetur. Tradit Matth. corticem Tiliæ commansum & illitum vulneribus glutinandis efficacem esse: folia verò trita, & aqua cōspersa pedū tumores discutere: humorē medulla castrata arboris defluētē capiti illitū, capillos reddere, defluētēsq; cōtinere: quæ qui diligētius cōsiderarit, Pliniūq; attētius legerit, cōperiet, opinor ea omnia Vlmo ipsum attribuisse, Tiliæ verò ea solū qui de Philyrea Diosc. prodidit. Cū enim de Vlmi foliis, cortice, folliculorū humore dixisset, de eadē Vlmo sic deinceps scribit. Cauliculi foliorū primi vino decocti tumores sanant, extrahuntque pus fistularū. Idē præstant & Tiliæ corticis. Multi corticē cōmāducatū vulneribus vtilissimū putat: folia trita aquæ aspersū pedū tumori. Humor quoq; ē medulla, vti diximus, castrata arboris effluens capillos reddit capiti illitus, defluētēsq; cōtinet. Tū de Tilia incipit dicere. Arbor Tilia leuiter tusa ad eadē ferè vtilis est ad quæ Oleaster: folia autē tātū in vsu, & ad infantiū vlcera in ore cōmāducata: decocta vrinā ciēt, menses sistunt illita: sanguinē potā detrahūt. Quod autem quæ Vlmo propria sunt, ad Tiliā sint translata, in causā esse potuit Plinij codicū vulgatus error, in quibus legitur, Idem præstant & Tiliæ cortices, perinde ac si hæc, & quæ consequuntur de Tilia arbore intelligantur, cū de interioribus corticis Vlmi tunicis accipienda sint, vt rectē Hermolaus emēdauit, quod etiam de Tiliæ nomine initio huius capitis annotauimus. Quæ cum ita sint, perspicuū est Pliniū Tiliæ vires explicatē ea tātū descripsisse quæ Diosc. de Philyrea scripserat his verbis. Philyreæ folia astringunt: ad eadē vtilia ad quæ Oleaster, cū adstrictione opus est, maximè ad oris vlcera cōmanducata, aut si decocto colluantur: potā vrinā ac menses cient. Tilia, inquit Theophr. in opere perfacilis est, ob suam mollitiā, & foris nauium longarū, & arcarū mensurarumque fabricæ expetenda. Habet corticem ad cistas faciendas idoneū: ex eo enim illas fabricantur. Legendū enim, ἔχει ὁ καὶ τὸν φλοιὸν χερσησιμον ὡς τὰς κίτας, ὡς οἱ καὶ ἐξ αὐτῆς, non ἐξ αὐτῆς, vt habent vulgata exēplaria. Sed & hic alterum membrum deesse videtur ante τὰς κίτας. Sic enim Theod. vertit. Habet etiam corticē funibus cunisque percommodum Dioscorides flores & omnia quæ iucundum odorem spirant ἐν κισσῶν τοῖς φιλυρίοις, idest in arculis tiliaceis reponi iubet. Mollissima Tilia, inquit Plinius eadem videtur & calidissima: argumētū afferunt quia citissimè ascias retundat. Apta scutis est Tilia quia lenta, plaga se contrahente protinūs. Ob hanc Tiliæ naturam veterum quidam fasciis tiliacis vsi sunt. Iulius Capitol. de Antonino Pio: Cū senex & longus esset, incuruareturque, Tiliaceis tabulis in pectore fasciabatur. Cinesium Poëtam tam gracilem fuisse aiunt, vt Tiliaceis asseribus corpori circumdatis imbecillitatem suam fulciret: quare Aristophanes illum Poëtam Philyreum vocabat. Tiliæ solæ Columellæ ex omnibus syluestribus apibus sunt nocentes. Tilia Trago omni sua substantia mollis est, & pinguis: folia habet mollia, succum, lentū, dulcem ac glutinosam tunicam, nēpe eam quæ cortici & ligno intercedit. Quidam aquam destillatam aduersus ventris tormina exhibent, non sine ratione: nam intestinis à dysenteria erosio illa conuenit. Alij aduersus morbū comitialē vsurpant. Tilia vsta aceto carbonibus restinctis cum oculis cancerorum tritis sumpta, sanguinis grumos exigit iis qui ex alto delapsi sunt, ita vt sanguinem excreent. Libri mediij qui cortici & ligno interiacet, aqua macerati lentum viscosumque humorem ambustis maximè prodesse experientia compertum est.

**Locus.**  
Lib. 16. c. 18.  
Lib. 6. c. 73.  
**temperam.**

**Vires.**  
Lib. 1. Diosc.  
ca. 180.  
Plinius li.  
24. c. 28.

Li. 1. c. 108.

Lib. 5. Hist.  
ca. 7. & 8.  
**Vsus.**

Li. 1. prooē.

Li. 16. c. 40.

Lib. 9. ca. 4.  
Lib. 3. c. 74.



**Nomina**  
Lib. 3. Hist.  
cap. 14.

**Forma**

**B**ETVLA, vel vt alij legunt Betulla, à Theophr. *σημίδα* nominatur, à Gallis *Bouleau*, & *Bes*, à Tridentinis, *Bedollo*, à Germanis *Birchenbaum*, ab Italis *Betula*, & *Bettola*, à Boemis *Briza*. Betula sæpe in altam & crassam arborem assurgit, multumque ramosam: ex ramis virgæ plurimæ dependent, lentæ, in quamvis partem flexiles, in terram inclinatæ. Harum & teneriorum ramusculorum cortex læuis est, succosus, colore fusco, siue Castaneæ. Caudicis cortex candidus,

## BETVLA.



Lib. 3. c. 75.

**Locus.**  
Lib. 3. Hist.  
cap. 14.

Lib. 16. c. 18.

**Usus.**

Lib. 16. c. 40.

Lib. 1. Diosc.  
cap. 93.

**Vires.**

durus, scaber, rimosus, mediocrium ramorum, parum maculosus. Huic liber alius subest læuis, tenuis, candidus, chartæ nostræ modo, in quo veteres opera sua inscribebant ante repertum chartæ nostræ vsum. Tragus se vidisse Curia oppido Rhetia superioris nonnulla carmina in hoc Betulæ cortice exarata testatur, folia sunt latiuscula, in ambitu parum crenata, Fagi foliis minora, alioqui parum dissimilia. Betula Iulos edit Coryli modo, breuiiores, in quibus semen hi vnà cum semine septembri mense sunt maturi. Locis frigidis gaudet: in siluis & montibus nascitur. Betula Theophrasto folio est Caryæ (fortassis Oxyæ, quidam *ἡρωιδεωτικῆς καρύου* legunt id est Coryli) paulo angustiore, cortice versicolore, materia læui, nec nisi ad baculos utili. Betulam arborem Plinius esse tradit Gallicam, mirabili candore, atque tenuitate, terribilem magistratum virgis, eandemque circulis flexilem, ite corbiū sportis: bitumen ex ea Gallie ex coqui. Idem alibi Betulam ex eorū genere

esse docet quæ lentis imasunt, & ideo scutis faciendis aptissima, quoniam plaga contrahit se protinus. Mathiolus scribit, Betulam in agro Tridentino frequentissimam esse, materia lenta, tenaci, ex qua circuli ad dolia vinaria cingenda præstantissimi fiunt: Ananienfes ex Betulis optimos conficere carbones ad liquanda metalla: ex delibrato ac intorto cortice faces ad nocturna lumina, quæ, quod bituminosa quadam pinguitudine redundant, redæ modo flagrant, & resinofum quiddam Picis colore sudant: nec fortasse alia de causa, inquit, Betula dicitur, nisi quod bituminæ scateat. Huius caudex terebro perforatus aquæ copiam emittit, cui vim maximam inesse quidam asserunt ad cōminuendos tam renem quàm vesicæ calculos, si diutius bibatur. Eadem maculas in cute delet, nitoremque conciliat: collutione oris vlcerata sanat. Foliorum succus coagulo admixtus caseos à carie & vermibus vindicat. Betula vt olim Romanorum magistratum fascibus minax, sic & hodie in Gallia virgeis pedagogorum sceptris pueros terret. Ad Baculos & scopas vtimur. Ex ea in Aruernia circuli ad vasa vinaria constringenda factitantur, vt & in Allobrogibus, & Sebusianis.

PLATANVS



## PLATANVS CAP. XXVII.



Πλάτανος Græcè, Latine Platanus, ab amplitudine nominatur, Arabicè *Nomina*  
 Dulb, Gallicè *Platane*, Italicè *Platano* Germanis incognita. Arbor est ma-  
 gna, procera, multis longisque radicibus, patulis diffusa ramis, vnde *Forma*  
 ἐμφίλαφον πλάτανον dixerunt Græci: cortice crasso: foliis latissimis, vitigineis, ex

## PLATANVS.



longo & rubente pediculo pendentibus. Flo-  
 res edit paruos, pallidos, congestos: baccas  
 rotundas, scabras, lanuginosas, ferè nucis pō-  
 ticæ magnitudine. Platanus auctore Plinio, *Usus.*  
 vmbra gratia tantum ex alieno petita orbe *Lib. 12. ca. 1.*  
 per mare Ionium in Diomedis insulam eius  
 tumuli gratia primū inuecta, inde in Siciliam  
 trāsgressa, atque inter primas donata Italiæ, cui  
 postea tantum honoris increuit, vt mero in-  
 fuso enutrireretur, compertumque id maximè  
 prodesse radicibus, ita vt arbores vina potare  
 docuerimus, alioqui aquas amantes, & irriga-  
 tionibus gaudentes, vt scripsit Theoph. Præte-  
 rea celebrata sunt, inquit, primum in ambu-  
 latione Academia, Athenis, cubitorū xxxvi.  
 vnus radice ramos antecedente. Nūc est clara  
 in Lycia, gelidi fontis socia amœnitate, itine-  
 ri apposita, domicilij modo caua, lxxx atque  
 vnus pedum specu, nemoroso vertice, & se  
 vastis protegens ramis, arborum instar, agros  
 longis obtinens vmbis: ac ne quid desit spe-  
 lunca, imagini, saxea intus crepidinis corona  
 muscosos complexa pumices, tam digna mi-  
 raculo, vt Licinius Mutianus ter Cos. & nuper prouinciæ eius legatus proden-  
 dum etiam posteris putarit, epularum intra eam se cum duodeuicesimo comi-  
 te, large ipsa toros præbente fronde, ab omni afflatu securum, oprantem im-  
 brium per folia crepitus, & latiore quàm marmorū nitore, picturæ varietate  
 laquearium auro, cubuisse in eadem. Aliud exemplum Caij Principis in Veliter-  
 no rure mirati vnus tabulata, laxisque ramorum trabibus scamna patula, & in  
 ea epulati, circum sparsa vmbra xv. conuiuiarum ac ministerij capace triclinio,  
 quam cœnam appellauit ille nidum. Est Cortynæ in insula Creta iuxta fontem  
 Platanus vna, insignis vtriusque linguæ monumentis, nunquam folia dimittēs,  
 statimque ei Græciæ fabulositas superfuit, Iouem sub ea cum Europa concu-  
 buisse, ceu verò non alia eius generis esset in Cypro. Sed ex ea primum in ipsa  
 Creta (vt est natura hominum nouitatis auida) Platani satē regenerauere vitium,  
 quādoquidem commendatio arboris eius non alia maior est, quam solem æsta-  
 te arcere, hyeme admittere. Idem auctor cum Theophr. inter arbores longissi-  
 mæ vitæ numerat Platanum Delphicam, & alteram in Caphyis, Arcadiæ luco,  
 Agamennonis manu satas. Platani vmbra adeo delectatum fuisse Xerxem, in  
 Lydia scribit Alianus, vt diem integrum sub ea cum maximo exercitu con-  
 sumpsit, floccipendens tam breui voluptate tot copias remorari. Tenerrima  
 Platanifolia Dioscoridi in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt,  
 tumores & inflammationes leuant: decocto cortice in aceto, dentes in dolore  
 colluuntur: virides pilulæ in vino potæ serpentum morsibus auxiliantur, exce-  
 ptæ vero adipe, igne ambusta sanant: at quæ insidet folijs & pilulis lanugo ocu-  
 los

Lib. 1. Hist.  
 cap. 11. &  
 Lib. 3. ca. 1.

Lib. 17. c. 44.  
 Lib. 4. Hist.  
 cap. 14.

Lib. 7. c. 91.  
*Vires.*

Lib. 8. sim.



los & aures offendit. Galenus Platanum, scribit, esse humidioris frigidioris-  
que naturæ, sed non procul à temperata: proinde folia vitidia trita, & illita non  
obscure phlegmonas nascētes adiuuare, corticem autem & pilulas magis desiccantem vim obtinere, vt ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur  
dolores, pilulæ verò cum adipe ad ambusta: esse autem qui cortice combusto  
medicamentum desiccatorium & absterforium efficiant, quod cum aqua lepras  
sanet, per sese autem illitum, vlcera, ob humorem nimium vetera, & sordida.  
Vitandum esse puluerem foliis arboris insidentem idem monet, quoniam spi-  
ritu attractus, arteriam offendit, valenter desiccans & exasperans, vocemque  
lædit, sicut sanè etiam visum, & auditum, si in oculos aut aures inciderit. Pla-  
tani aduersantur scorpionibus, inquit Plinius, Pilulæ earum in vino potæ om-  
nibus serpentium venenis medentur, item ambustis. Tusa autem cum aceto  
acri, magisque Scyllite, sanguinem omnem sistunt: lentiginem & carcinoma-  
ta, melanias quoque veteres addito melle emendant. Folia & cortex illinuntur  
collectionibus, & suppurationibus. Cortex autem in aceto decoctus dentium  
remedium est: folia eorum tenerrima in vino albo decocta oculorum. Lanugo  
foliorum & auribus, & oculis inutilis. Cinis pilularum sanat ambusta igni, vel  
frigore. Cortex è vino scorpionum ictus restinguit. Inopia cogit aliquando lu-  
minum causa è Platani baccis oleum fieri, aqua & sale maceratis.

## ACER

## CAP. XXVIII.

## Nomina

lib. 3. Hist.  
cap. 4.

## Genera.

lib. 3. Hist.  
cap. 11.

lib. 6. ca. 15.

lib. 6. ca. 16.

**A**CER, vel Aceris vt Solinus dicit, Græcè ἡ σφένδαμονος dicitur, Gallicè  
*Erable*, Italicè *Pie d'oca*, & *Platano aquatico*. Theophr. inter campestres  
arbores τὴν σφένδαμονον, id est Acerem recenset, quæ in monte pro-  
uenit ζυγίαν vocans, Gaza Carpinum interpretatus est: quæ in plan-  
is, γλείων, Gallicam idem interpretes vertit, vt fortasse non γλείων, sed γαλά-  
τειον legisse videatur. Quanquam, inquit Theophr. alij τὴν σφένδαμονον, & τὴν ζυ-  
γίαν specie differre arbitrentur. Idem alibi: τῆς σφένδαμονος alij duo, alij tria consti-  
tuunt genera: primum quod communi nomine σφένδαμονον, id est Acer vo-  
cant: alterum ζυγίαν, id est Carpinum: tertium Clinotrochon, vt Stagiritæ vo-  
cant. Plinius etiam plura eius genera prodidit. Album quod præcipui candori-  
s, vocatur Gallicum, in transpadana Italia, & trans Alpes nascens: alterum  
genus crispo macularum discursu, qui cum excellentior fuit, à similitudine  
caudæ Pauonum nomen accepit, in Istria Rhetiæque præcipuum. E viliori ge-  
nere Crassiuenum vocatur. Græci quoque, inquit, situ discernunt. Campestre  
enim candidum esse, nec crispum, quod Glinon vocant: montanum verò cri-  
spius duriusque, etiamnum è mascula crispus ad lautiora opera: tertium ge-  
nus Zygiam, rubentem, fissili ligno, cortice liuido, & scabro. Hoc alij generis  
proprij esse malunt, & Latine Carpinum appellant. Hic tria Aceris genera no-  
bis nota proponimus: Acerem montanum, cuius duo genera, vnum candi-  
dum, quod Alpini Aruernique à similitudine foliorum Platani Plane appel-  
lant: alterum flauum, siue crispum, qui Opulus est montanus: *Erable jaune*, &  
*Erable ianne* appellant. Eius enim color nitidior est, venarumque in eo discursus  
magis apparent, præsertim si oleo nucû illinatur. Hodie quoque lignatores  
Sequani Acerem montanum mare fœminæque distinguunt: colore magis flauo  
in mare, pallidiore in fœmina: ligno in mare duriore, venosiore, magisque  
crispo, in fœmina laxiore, molliore, solutioréque, ac minus crispo, quodque  
mas prius floreat, etiam Plinio teste, fœmina tardius. Secundum Aceris genus  
est Acer campestre, siue in planis nascens, veteribus Opulus campestris. Hodie  
Infubres seruato vetere vocabulo Opolo vocant, & ea ad maritandas vites vtū-  
tur



tur, quas coniugatas *Hautains* appellant. Nos à ligni, si cum *Aceris montani* ligno conferatur, teneritudine & colore, *Erable mol*, & *Erable madré* nominamus. Tertium genus *Acer Monspeliense* nominauimus, quod in silua *Monspeliensi* vrbi vicina, eique ligna suppeditante, Valena nuncupata proueniat, *Aceris* vulgaris penè figura. *Acer campestre* siue *Opulus campestris*, vt à notiori faciam exordium, in sepibus planorum locorum, aut colliculorum fruticat, nonnun-

Forma.

*ACER MONTANVM.*



*ACER MON-  
spelianum.*



*ACER CAMPESTRE*

*Carpinus.*



quam humilis, arbuscula, interdum adhibito præsertim cultu, in procerâ arbore grandescens, crassam, ramis multis brachiatâ: cortice spisso, parum candicante, corpore candido, rariore quàm *Aceris montani*, longo & vndoso venarû discursu ornato: foliis latis, quæ quinque angulis constant: fructu longo, compresso, tenui, auicularum plumis, aut grandium muscarum alis simili: floret mense Maio, fructum maturat Septembri. *Acer montanum* siue *Gallicum* arbor est speciosa, procera, ramosa que, foliis maioribus, vitigineis, è longis, tenuibus, rubentibusque, petiolis pendulis, floribus muscosis, luteolis, foliacea siliqua *Papilionis* alas imitante, vno vtrinque semine donata, materia duriore, vnde apud *Aristophanem* homines σφενδάμνους, idest *Acerni*, pro durissimis ponuntur. Paulo ante æquinoctium germinat, autore *Plinio*, mēsis reddit semen. *Acer Monspeliense* arbor est mediocriter procera, ramis latis explicatis, cortice quodammodo purpurascēte, folio *Aceri* vulgari simili, in tres tantum

*Dodo. li. 6.  
cap. 74.*

*Tempus.  
Li. 16. c. 20.  
& 25.*



tum cuspides siue angulos diuiso, crasso, venoso, ex longo pediculo pendente, paribus interuallis vtrinq; sito: fructu gemino, membranulis duabus coherentibus, alis muscarum similibus. Hoc Aceris genus quidam esse aiunt, quod Plinius in Istria Rhetiâque præcipuum esset tradidit, crispo macularum discursu, quod cius cū excellentior fuit à similitudine caudæ pauonū nomē accepit. Horum opinioni nec assentior, nec repugno. Aceris radix contusa, inquit Plinius, iocinoris doloribus efficacissimè imponitur, quod etiam testatur Serenus his versibus.

*Vires.*  
Lib. 24. c. 8.

*Si latus immeritum morbo tentatur acuto,  
Accensum tinges lapidem stridentibus undis,  
Hinc bibis: aut Aceris radicem tundis, & una  
Cum vino capis, hoc præsens medicamen habetur.*

Li. 8. med.  
part. cap. 8.

Galenus in confectionibus Hepaticis ab Asclepiade conscriptis numerat τὴν τῆς σφενδάμνης ῥίζαν κατεΐσθαι, καὶ λειωθεῖσαν, idest Aceris radicem tufam, & tritam. Exhibet autē ex ea drach. i. cum aquæ dilutæ cyathis tribus, quo loco dubitat Cornarius an σφενδάμνης vox rectè legatur, aut potius σφονδύλης vox sit pro ea substituenda, quum ob vicinitatem scripturæ vtriusque vocis facilè committi potuerit, vt altera pro altera supponeretur. Nam de Sphendamnno arbore, idest Acere non temerè reperias hoc auxilium, quandoquidem nullam eius mentionem fecerunt Græci Medici in simplicium medicamentorum tractatu, Dioscorides, Galen. Paul. Ætius. Vnus Plinius de eius radice dixit quæ suprà citauimus. Sphodylij verò radicem ictericis & hepaticis exhiberi testatur Dioscor. item Galenus, qui ei aerem, & incidendi vim tribuit. Acer eodem Plinio teste, operum elegantia ac subtilitate Cedro est secundum, imo potius Citro, vt rectè emēdauit Hermolaus. Pulcherrimum verò est Bruscum, multoque excellentius etiamnum Molluscum, tuber vtrumque Aceris. Bruscum intortius crispum, Molluscum simplicius sparsum, quod si magnitudinē mensarum caperet, haud dubiè præferretur Citro. Nunc intra pugillares lectorūque Silaceas laminas (id est luteas, & veluti file tinctas, qui color Aceris est) raro vsu spectatur. Quidam legunt, Sicilicia, & laminas, (id est Secamenta, a Siciliendo, quod verbum secare significat.) E brusco fiunt & mensæ nigrescentes. Hæc Plinius. Brusci verò vestigium aliquod nobis superest, sed de alia arbore intelligitur. Nam in Gallia Narbonensi, locis Hispaniæ finitimis, ac montibus Pyreneis, potissimum circa oppidum dictum Limons, haud procul Carcassona, radices Buxi, quarum illic magna copia est, Brouchin appellant. Has potissimum Germani ob maculas varias, ac flexuosos venarum discursus ad opera lautiora expetunt, atque emūt. Item qui oppidum D. Claudij nomine insigne incolunt in monte Iura, ex iisdem radicibus cochlearia pulchra conficiunt.

Li. 3. ca. 90.  
Lib. 8. sim.  
Li. 16. ca. 15.

Capit. 16.

## ALNUS

## CAP. XXIX.

*Nomina*



ALNUS Græcè κλήθρα nominatur, Gallicè *Aulne*, Germanicè *Erlenbaum*, & *Elernbaum*, Italicè *Aulno*, & *Onio*, Boemicè, *Vuolse*: Arbor est magna procerâque, ramis multis, qui fragiles inflecti se minime patiuntur, vt ligna alia aquatica, cortice ex fusco rufescente, ligno satis duro, rubente statim atque cortice spoliaturum est, atque etiam vetustum, & aridum. Folio est rotundo, parum rugoso, Corylo haud absimili, crassiore, neruofiore, glutinoso, ac veluti melle asperfo. Id crassissimum esse dicit Plinius. Flores huius sunt iuli longi, Betulæ iulis similes: fructus paræ oliuæ magnitudine, virides, oblongi, Moris forma similes, ex squamis quamplurimis compacti, minuto in his semine, colore in nigrum fuluo, quod iis maturis, & siccitate hiantibus

*Forma.*

Li. 16. c. 24.



## ALNVS.



hiantibus decidit. Ex quibus Plinium errasse, sed Theophrasti fide perspicuum est, qui Alnum scripserit neque fructum, neque semen ferre. Alnus aquis gaudet, & in aquosis locis semper provenit. Germina foliaque mense Aprili profert: fructus Septembri maturefcit. Alnus Theophrasto sterilis est, & vnus generis, recta arbor natura, ligno molli, medulla tenera, vt virgæ tenues totæ excaven- tur: folio Pyri, sed ampliore, neruofioréque: cortice scabro, intus rubente, quo coria tin- guntur: radice est per summa terræ sparsa, non maiore quàm Laurus. Nascitur in aquosis, nec alibi vsquam. Idem paulo post Nucis Auellanae folio Alni folium simillimum esse ait: & alio in loco minimè sterilem esse existimat, cùm scribit, Terebinthus circa tritici messem, aut paulo seriùs, semen reddit: Fraxinus, atque Acer, æstate, Alnus, nux Iuglans, Pyrorumque genus quoddam, Autumno. Cortex Alni & folia refrigerant, siccant, & adstringunt. Recen- tia folia tumores imposita dissolunt, & in- flammationes restingunt. Nudis pedum plantis supposita viatoribus itinere defatigatis magno sunt leuamento. Rore maturino madentia cubiculis ad ne- candos pulices per æstatem vtiliter insperguntur. Ex cortice Alni ater fit color, quo pilei, & vmbracula coactilia, vulgo *Fentes*, crassiores pãni, aliâque huius- modi inficiuntur. Quidam eo, & fructu viridi vtuntur, Gallarum vice ad scri- ptorium atramentum conficiendum, addito gummi, & chalcantho. Materies Alni ad naualia commendatur, & ad palationes, idest fundamenti genus, quod

## ALNVS Nigra.



in aquis, aut vliginosis, aut congestiis locis fieri videmus. Vitruuius: Ita q; Alnus, quia non nimis habet in corpore humoris, in palustri- bus locis infra fundamenta ædificiorum pala- tionibus crebrè fixa, recipiēs in se quod minus habet in corpore liquoris, permanet immorta- lis ad æternitatē, & sustinet immania pondëra structuræ, quæ in vulgatis Vitruuij codicibus mēdosa sic legit Budaus. Vmbra pinguis Alno, sed pascens sata, inquit Plinius, & alibi: Licet Alni sepes muniant, contrâque erumpentium amnium impetus, riparum modo in tutelam ruris excubent in aqua sata, cæsaque, densius innumero hærede profint.

ALNVS NIGRA BACCIFERA.  
CAP. XXX.

Ecâ foliorum similitudine Alnus ni- gra recentioribus quibusdam vocatur, Gallis *Aulne noir*, Germanis *Faulbaum*, aliis Alnus baccifera. In arborem vix assurgit, neq; crassescit, sed virgas quâ plurimas emittit

Locus.

Tempus.

Lib. 3. Hist.  
cap. 14.Capit. 15.  
Cap. 6.

Vires.

Dodo. li. 6.  
cap. 75.  
Marth. lib.  
1. Diof. a.  
93. Trag. li.  
3. cap. 63.

Lib. 2.

In Annot.  
in Pand.  
Li. 17. ca. 12.  
Lib. 16. c. 37.

Nomina

Forma.



*Tempus.**Locus.*


longas, rectas, quæ in alias virgulas diuiduntur, cortice tenui nigroque vestitas glaucis maculis asperfo, libro subtus flauo. Lignum candicat, medulla media ex rubro nigricante. Huius folia sunt Alni, aut Cerasi, aut Corni, fusca: flosculi albicant, quibus succedunt bacce rotundæ, quætæ Piperis grana, primum virides, deinde rubræ, postremo nigræ cū maturæ fuerint, gustus planè ingrati. Prouenit in siluosis, & vdis, nec nisi ad Septentriones, vt Angliæ, Germaniæ, Northmaniæ. Floret Aprili mense: fructus Augusto sunt maturi. Siler Plinij quidam esse volunt, quod in aquosis prouenit, cap. 18. lib. 16. & folio frōti illito capitis dolores sedat: semine in oleo trito phthiriasis coercet: serpētes fugat: quā orbe baculum ex eo rustici gerūt: ca. 10. lib. 24. liber interior flauus desiccatur: in vino maceratus ac potus vomitum ciet, purgatque valentissimè phlegmaticos ventriculi putridosq; humores, & aquas. Idē in vino decoctus dētiū dōlorē sedat, si in ore cōtineatur: illitus scabiē deterget. Folia bubus sunt vtile pabulū, quia lactis copiā generant.

## SAMBUCVS SYLVESTRIS CAP. XXXI.

*Lib. 3. c. 24.**Nomina**Lib. 3. Hist.**cap. 4.*

**S**AMBUCVS sylvestris, siue mōtana, in opacis vliginosiq; syluis nascitur. Tragus, & sylvestrem vocat, & Ceruinā, quod non nisi in syluis, & mōtib; proueniat, & quod à Ceruis magnopere expetatur. Ea est fortasse arbor mōtana, quā αὐγὼν Theoph. his verbis significat: ἰδία ἢ τὰ τοιαύτα τῶν ὀρεῶν, ἢ ἐν τοῖς πεδίοις ἢ φέεται, ἐλάτῃ, πικρῇ, αἰλῇ, ἀγρία, φιλύρα, ζυγία, πηγὸς, &c. id est, montibus aut propria, q̄ in planis nasci nequeunt, Abies, Pinus, Picea, Aquifolia, Tilia, Carpinus, Pygus quā postremā arborē Gaza in translatione sua omisit. Ea frōde,

## SAMBUCVS Sylvestris.

*Forma.**Vires.**Ibidem.*

cortice, ligno, medulla, deniq; colore, odore & sapore vulgare Sambucū omnino refert, floribus dūtaxat, & fructu & pceritate, ab ea distās. Nā Sābucō vulgari semp humilior est. Flores subluteos, forma stellatos, non in vmbellis vt vulgaris, sed racematim ligustri modo, multò etiā celerius, nempe Aprili mense profert, qui in acinos abeunt, Augusto mense rubescētes, minijq; colore tinctos, nec vnquā nigrescētes, racematim ē pediculis depēdētes, iniucundi saporis. Sambucū sylvestrē frigidā esse indicat Tragus, vt pro Mandragora, si illa desit, vsurpari possit. De facultatibus acinorum nihil se obseruasse, fatetur. Illud verò experiētia didicisse affirmat, Ceruū audissimè hāc Sambucū per siluas sectari. Vbi namq; locorum duas huiusmodi stirpes puenisse senserit, eò accurrit, quod mirum est, Sambucus hęc, ac vulgaris eisdem situs occupāt. His ceruus mirificè delectatur, folia vtriusq; non baccas depascēs, ex quo intelligi pōt hāsce baccas frigidioris esse tēperaturā, atque ideo feris, nedū iumentis & hominibus minūs salubres. Harū esum somnū cōciliare tradit Pena, atque adeo veterinū, & nimiū admodū noxiū esse. Iam verò quod maiori dignū est admiratione, obseruarūt Ceruū solū foliis his vesci, non Ceruā, nisi pragnās fuerit, Ceruūque in vtero gestarīt: tū enim & folia hęc appetit, & illa degustat, aliās nunquā. Matth. Sābucū hāc Mōtanā vocat, & à vulgari differre scribit fructu, qui in Mōtana nō in vmbellā coaceruatur, nec maturus nigricat, sed racematim coheret, & perpetuò rubet. Adhęc vulgaris procerior est, & leuiore cōstat materie.

SORBUS



SORBUS torminalis.



**S**YLVESTRIS hæc arbor Sorbus est torminalis, sic dicta quòd contra tormina valeat, à Sequanis Tormine nominatur. Magna nonnunquam spectatur hæc arbor, sed non nisi longissimo tempore, & quia in frutetis sæpius nascentem agricolæ cum fruticibus cédunt, nec crescere sinunt, in iustam magnitudinem non assurgit: quare humilis sæpius reperitur, cortice fusco, qualis ferè est Alni: foliis magnis, longis, multis in vno pediculo, parum hirtis, Sorbo simillimis, in ambitu ferratis: floribus albis, racematim coherentibus, quibus succedunt bacca rotundæ, primum virides, deinde rubentes, saporis ingrati. In altissimis Sylvis provenit. Plinius quartum hoc Sorborum genus constituit. Quartum genus inquit, Torminale appellat, remedio tantum probabile assiduum provenit, minimumque pomis, arbore dissimili, foliis penè Platani. Dodon. hæc Fraxinum bubulam & Ornum appellat.

Nomina

Forma.

Locus.

Li. 16. ca. 21.

Li. 6. c. 70.

CRATAEGUS CAP. XXXIII.

CRATAEGUS

Theophrasti.



**H**ÆC arbor in densis Sylvis nascitur mediocri proceritate. In hortos tamen translata facile provenit. Caudex cortice vestitur levi, albicante: folia Sambuci aquaticæ similia sunt, minora, pedisanferini figuram quodammodo referentia. Florem mittit ex pallido candidum, racematim coherentem, Sambuci vulgaris ferè modo, quo dilapso poma nascuntur exigua, incana, Oliuarum magnitudine, gustu astringentia, veluti Mespila, quæ ut illa, lapideum semen non continent, sed nucleos nigros Piri vulgaris modo. Poma hæc autumnino mollescent, tunc palato gratiora acerbitate deposita. Tragus Sorbum esse Torminalem existimat. Hypomelides Palladij esse quidam opinantur. Hypomelides, inquit. Palladius, poma sunt Sorbo similia, mediocri arbore nascuntur, & flore candidulo. Dulcedo huic fructui cum acuto sapore commixta est. Amat loca tepida, aprica, maritima & sæpè saxosa, statum rigidum reformidat. De Hypomelidibus, siue Amamelidibus posthac agemus fusius. Arborem hanc Cratægum esse Theophrasti non absurdè quis existimaaverit. In qua opinione est Anguillara, reclamante Matthiolo, qui Sorbum Tormi-

Locus.

Forma.

Nomina

Lib. 13. c. 4.

Lib. 3. c. 30.

In cap. 336.

lib. 1.



iufqu'à ce que la nouvelle y reuienne. Sa fleur eft faite en façon d'eftoille, & blancheafre. Son fruit eftant meur, eft noir, doux au goùt, avec vn bien peu d'amertume. Il refemble à la Franche meure; mais il eft plus petit, plein d'un fuc qui eft comme de fang noir, & teint & noircit les mains. Phanius Erefius efcrit en Athence: La Meure de la Ronce dont la pilule deffieche eft femblable à la Franche Meure, a fa femence dans des petits refervoirs faits à angles, comme ceux de la Franche

Liure 6. des  
medic. des  
part. chap. 1.  
& liu. 2. des  
alim.

Aux comm.  
sur le 6. liure  
des medic.  
des part. c. 1.

Liure 15. c. 24.

Aux comm.  
sur le 6. liure  
des medic.  
des part. c. 1.  
Liure 16. c. 37.  
Liure 1. des  
Metamorph.  
Le temps.  
Liure 4. ch. 33.  
Les vertus.

Lacuna fur  
Diof.

Liure 6. des  
simpl.

Liure 2. des  
alim.

Liure 6. des  
medic. des  
part. ch. 1.  
Liure 24. c. 13.

Meure, & rend vn aliment qui à la verité eft de bon fuc, mais fluide. Galien dit, que ces Meures de Ronce s'appellent en Grec βάμα, (que quelques auteurs Latins corrompans le mot ont appellees *Vaticana*) comme les Franches Meures s'appellent μόρα, & συκαμινά, qui font mots tirez du nom de la plante βάτος, μόρα & συκαμινά. Or il y a vn paffage corrompu en Galien, là où il parle de ces Meures, lequel Cornarius corrige ainfi, τὸν τῶν βάτων καρπὸν ὀνομάζουσιν οἱ παρ' ἡμῶν ἀνθρώποις βάτμον, καὶ μόρα τὴν καὶ συκαμινά τὸν τῆς μόρας καὶ συκαμινά. Lesquels derniers mots ne font pas aux exemplaires communs; tellement qu'il estoit impossible d'en tirer aucun sens: car il veut dire, comme il a esté dit cy dessus, que le mot *Batina* vient de βάτος, comme le mot *Mora* vient de *Morea*, & *Sycamina* de *Sycaminea*. En Latin on les appelle *Mora rubi*. Il croist aussi, dit Pline, des Meures sur les Ronces, qui toutesfois ont le grain de dedans differant d'avec les autres. Combien qu'aux communs exemplaires il y a, *Rome nascuntur & in Rubis*, &c. qui est vne petite faute, à laquelle toutesfois personne n'a pris garde, ainfi que dit Cornarius: car il croist des Meures sur les Ronces, non seulement à Rome; mais aussi par tout, ce que Pline dit bien en vn autre paffage, disant: Les Ronces portent des Meures, &c. Et Ouide qui dit,

Et les Meures croissans sur les facheuses Ronces.

On amasse les fucilles des Ronces au printemps, & les fleurs au commencement de l'esté, & le fruit lors qu'il est meur, au temps des moissons, & sur la fin de l'esté. La Ronce, dit Dioscoride, a vertu de deffiecher & retraindre, & de noircir les cheueux. La decoction des branches prise en breuillage, resserre le ventre, & le flux des femmes, & est bonne contre la morsure des serpens nommez Presler. Les fucilles machées rassermiscent les gencives, & guerissent le mal de la bouche, arrestent les vlcères qui s'anacent tousiours, sont bonnes à la tigne de la teste, & aux yeux, qui sortent hors de la teste. On applique les fucilles aux hemorrhoides, & ensieures du fondement, & à ceux qui sont subjects au mal de cœur, & aux douleurs de l'estomach. Le suc tiré des tiges & des fucilles pilees, & essey au soleil, est vn souverain remede pour toutes les choses fufdites. Le suc des Meures de Ronce bien meures est fort bon pour les maladies de la bouche. Les Meures ventées mangées resserrent le ventre, & mesme la fleur beue en vin. Mais ce que Ruel a traduit, c'est vn singulier remede pour tout ce que dessus, il y a au texte Grec, C'est vn remede plus souverain que tous les autres. Et ce qu'il dit; les Meures vertes resserrent le ventre; il y a au Grec: Le fruit de la Ronce à demy meur, resserre le ventre: ou comme Cornarius le traduit; ce fruit, si on le mange à demy meur, resserre le ventre. Selon Galien, Les fucilles, les bourgeons, les fleurs, le fruit, & la racine ont vne qualité astringente, qui n'est pas petite; mais il y a difference en ce que les fucilles nouvelles & tendres ont en elles beaucoup de substance aqueuse, & peu d'astringtion, & par mesme raison les germes aussi. Parquoy estant machées elles guerissent les vlcères de la bouche tant superficiaires qu'autres: mesmes elles sont bonnes pour soudre les playes: car leur temperature est composée d'une essence terrestre, & aqueuse, tiède. Mais leur fruit estant meur a beaucoup de suc chaud & temperé, qui est doux: ce qui est cause avec ce qu'il est vn peu astringent, qu'il n'est pas mal-plaisant à manger: mais n'estant pas meur la substance terrestre & froide surmonte en luy. Aussi est il aspre & fort desicatif. L'un & l'autre estant gardé deffieche mieux que quand il est frais. La fleur aussi a la mesme vertu que le fruit qui n'est pas meur. L'un & l'autre sont bons pour la dysenterie, au flux de ventre, au crachement du sang, & à ceux qui sont debilités par maladie longue. Or la racine outre l'astringtion a beaucoup de substance subtile en soy, par laquelle elle rompt la pierre des reins. Et en vn autre paffage il dit, que les Meures de Ronce sont plus astringentes que les autres; & si quelqu'un en mange en quantité, il aura douleur de teste: parquoy il faut lauer ce fruit deuant que le manger. Et toutesfois il ne lasche pas le ventre: ains le resserre plustost; mais si quelqu'un en mange lors qu'elles ne sont pas encor meures, & les fait secher pour les garder, elles resserrent bien mieux. Et si tous les medicaments que l'on a acoustumé de faire du suc de Meure sont faits de celles-cy, ils feront de plus grande efficace. Parquoy l'on fait vn medicament pour la bouche aussi bien du suc des Meures de Ronce, que de celui des Meures de Meurier. La nature, dit Pline, n'a pas fait les Ronces seulement pour nuire à l'homme; car elle a fait qu'elles portent des Meures, dont mesmes les hommes en mangent. Elles ont vertu de deffiecher & retraindre; & sont bonnes pour les gencives, & inflammations des glandes qui sont sous la langue, & des genitoires. La fleur ou le fruit sont contraires aux plus meschans serpens de tous, qu'on appelle Hemorrois, & Presler. Et & pourfuyuant au long tout ce que Dioscoride en dit, il vient à parler du medicament qu'on fait des Meures & dit; Quant aux Meures qui croissent sur les Ronces, on en feroit de Diamoron, qui seroit beaucoup meilleur pour la bouche, que celui que l'on fait des Meures de Meurier. Prinses avec laditte composition, & seulement avec l'Hypocistis & miel, elles sont bonnes à la cholerique passion, & à ceux qui sont subjects aux deffians de cœur, & à la morsure des araignes. Entre tous les medicaments astringens il n'y en a point qui ait plus de vertu, que la racine de la Ronce qui porte Meures, estant cuite en vin iufqu'à la consommation de la tierce partie pour en lauer les vlcères de la bouche & du fondement. Car elle est de si grande



grande vertu, que mesmes elle fait deuenir les espouges dures comme pierre. L'autre espece de Ronce est appellee en Grec *Chamabatos*, qui est à dire *petite Ronce*. Gaza l'appelle *Humirubum*, *Ronce de terre*. Icelle croist sur le bord des riuieres, aux ruines des murailles, & aux champs qui ne sont pas cultuez. Il me semble que Theophraste ait entendu ceste-cy, quand il escrit *βαρύ βρύδον*, ou *πάυδον*, c'est à dire que ceste Ronce aime l'humidité comme le *Paliurus*. Ceste Ronce s'espand au long & au large, estendant ses verges menues & garnies d'espines par dessus la terre, qui ne s'esleuent iamais; mais pendent tousiours contre terre & rampent. Elle a la racine, la fleur, & la feuille comme la precedente; mais son fruit n'est pas semblable: car estant meur, il est de couleur de pers, & non pas noir, comme celui de la precedente; & est plus petit, & a aussi moins de suc, & est quasi aussi doux que celui du Meurier. L'autre espece de *Ronce*, est celle qui porte les Roses, ainsi que dit Pline. Dioscoride l'appelle *κύνος βατος*. Elle croist dans les hayes parmy les autres Ronces. En Latin elle s'appelle *Rubus Caninus*, ou *Canirubus*; en Arabe *Sent*; en Italien *Rono Canino*. Aucuns estiment que c'est celle qu'on appelle en France *Eglantier*, & *Eglantier*; ce qui s'accorde avec les marques qu'en donne Dioscoride. Car ceste plante est plus grande, que la *grande Ronce* & plus ferme: car elle croist en hauteur comme vn arbre, & ne rempe pas sur terre comme la *Ronce* fait, à cause de sa foiblesse. L'*Eglantier* a les feuilles du Myrte; mais plus larges. Ses branches sont garnies de fortes espines, qui est la cause pourquoy nous l'auons plustost mis au nombre des Ronces, que des Roses. Il fait le plus souuent ses fleurs blanches, quelquefois vn peu rougeastres, de fort bonne odeur. Son fruit est long, fait comme le noyau d'une oliue, qui deuiet iauue estant meur, & est plein de bourre. Ce fruit, (apres en auoir osté la bourre, car elle nuit à l'artere) estant seché & bouilly en vin, prins en breuage, reserre le ventre. Ruel suyuant les communs exemplaires incorrects a ainsi traduit ces derniers mots; *Son fruit seché apres en auoir osté la bourre de dedans, reserre le ventre: car estant cuit au vin & pris en breuage, il nuit à l'artere*. Mais au texte correct il y a ainsi: *Son fruit restraint le ventre, ayant osté ce qui pique (car sa bourre fait mal à l'artere) estant cuit en du vin & pris en breuage*. Ce que Cornarius a fort bien traduit, comme nous l'auons mis cy dessus. La fleur de l'*Eglantier* a encor cecy, outre ce que Dioscoride en dit, qu'estant frottée entre les doigts, elle sent bon, & sa feuille aussi. Serapio apres auoir escrit tout ce que Dioscoride en dit, adiouste, que la racine de l'*Eglantier* est plus chaude que le fruit; qu'estant pilee & mise dessus en façon d'emplastre, elle attire dehors les espines qui sont fichees dans le corps. Les feuilles aussi pilees & appliquees sur les inflammations les empenchent de croistre. Il semble, & à bon droit, que les communs exemplaires de Dioscoride soient manques en cest endroit; d'autant que Dioscoride, qui ne conuienne fort bien à ceste plante, & que la plus part de ceux qui en ont escrit en sont bien d'accord, il y a neantmoins aucuns qui en doutent. Dodon escrit qu'il estime, que le *Cynosbatus* de Theophraste soit l'*Aubespain*. Tragus aussi l'a peint & descript sous le nom de *Cynosbatus*. Les autres y contredisent ouuertement, comme fait Matthiol: Car, dit-il, si le *Cynosbatus* estoit vne espece de Roses sauages, il suffisoit à Dioscoride de dire, que l'*Eglantier* estoit semblable aux Roses, sans dire qu'il croist haut comme vn arbre, & beaucoup plus grand que la Ronce. D'auantage les feuilles du Rosier sauage sont bien differentes d'avec celles du Myrte. Leur fruit mesme est beaucoup plus gros, non seulement que les noyaux d'oliue, mais que les oliues mesmes. En outre Pline appelle la Rose sauage *Cynorrhodon*, qui est vn nom particulier, & non pas *Cynosbatus*. Qui plus est luy mesmes escrit que les anciens par le mot de *Cynorrhodon*, qui veut dire Rose de chien, n'ont entendu autre chose qu'une petite esponge qui croist au milieu des branches des Rosiers sauages. Et traitant du *Cynosbatus* ou *Ronce de chien*, il la fait bien differente d'avec la Rose sauage, disant, qu'elle a la feuille comme la plante d'un homme, & qu'elle porte (ce que Matthiol a oublié) vn raisin noir, dans les grains duquel il y a vn nerf, à raison duquel il est appellé *Neurospastos*. Or Theophraste dit, que le *Cynosbatus* est semblable au Grenadier, & porte vn fruit aussi semblable, mais que sa feuille est semblable à l'Agnus Castus. Mais on respond à toutes ces obiections; Premièrement ce que Matthiol s'eslève de prouuer contre Matcellus, que le *Cynosbatus* ou *Ronce de chien* est different d'avec la Rose de chien ou sauage, en la grosseur du tronc, en la hauteur & grandeur, & en la multitude & force des espines, & en ce que la *Ronce de chien* a la feuille qui sent bon, comme dit Pline, & est estroite, au lieu que celle de la Rose sauage ne sent du tout rien. Celle-là est aiguë, & celle de la Rose sauage est vn peu large au bout, & est diuisee par entrecoupeures plus grandes. Y ayant donc si grande difference Dioscoride ne deuoit point faire comparaison de la *Ronce de chien*, ny avec la Rose sauage, ny avec la domestique: & ne sert rien de dire, que Pline appelle la Rose sauage *Cynorrhodon*, & non *Cynosbatus*: car il n'escrit pas aussi, que les anciens n'appelloient *Cynorrhodon*, que ceste petite esponge, qui croist au milieu des branches des Roses sauages, comme le dit Matthiol: mais que l'on tiroit vn medicament du Rosier de chien; c'est que de la cendre de l'esponge qui croist au milieu de ses branches, on en faisoit recroistre les cheueux tombez par la palade. Or il est aisé à voir par ceste description, que la feuille de la Rose de chien, ressemble fort à celle du Myrte, singulierement du sauage; mais qu'elle est plus large & dentelée à l'entour, & vn peu moins aiguë; &

2. espece.

Les noms.

Le lieu.

Lieu 4. de l'hist. ch. 13.

La forme.

L'Eglantier.

3. espece.

Lieu 24. c. 13.

Le lieu.

Les noms.

Lieu 1. c. 106.

Lieu 3. ch. 31.

Lieu 3. de l'hist. ch. 18.

Lieu 3. ch. 18.

Au comm.

du 1. liure de Diosc. c. 106.

1. Raison de Matthiol.

2. Raison.

3. Raison.

4. Raison.

Lieu 3. de l'hist. ch. 4.

5. Raison.

Lieu 25. ch. 2.

6. Raison.

Lieu 3. de l'hist. ch. 18.

Refutation des raisons de Matthiol.

Lieu 1. ch. 4.

A la 1. &amp; 4.

A la 2.



Ruell. li. 1.  
cap. 55.  
Li. 3. ca. 67.

austero hausta drach. duarū pondere, diarrhœā cohibere, & alba fœminarū profluuia. Verū ad id, ac etiā ad mēses cohibēdos magis valere quidā affirmāt sub-  
ruffam medullā quæ putamini intus inhærens nucleū ambit. Plutarchus scriptū reliquit, quoties Coryli nucula laquearibus appēsa cohærebit, scorpī in domi-  
cilia nō irrepturū. Neque est omittēdū quod simplex rusticitas obseruauit, ser-  
pētē obtrōpescere, quæ Coryli caudice vel surculo fuerit icta, & tādē emori. Sed  
Coryli virga magis quā alia ictus serpēs occiditur, quia cūea flexilis admodū sit,  
parti serpentis quā attingit validius incurtitur, ac illiditur: ideōque spinę verte-  
bras rūpit quas ferit. Sic natiuo suo motu serpendi anguis priuatus, fuga eua-  
dere non potest, & aliquanto post tum doloris cruciatu, tum inedia moritur.

STAPHYLODENDRON. CAP. XXXV.

Nomina

Lib. 1. Dios.  
ca. 140.  
Li. & c. 16.  
In libr. 1. de  
plan. Arist.  
Lib. 3. c. 68.  
Li. 6. c. 60.  
In Hort.  
Germ.

Forma.

Ibidem.

Ibidem.



**H**æc arbor, quæ ut pleræque syluestres, sæpe fruticis tantū formam  
habet, Staphyloedendron Plinij à quibusdā esse existimatur. Matthi.  
scripsit quibusdā in locis Pistaciorū syluestriū nomine cuiusdā ar-  
boris fructus appellari, quā Plinius Staphyloedendron vocat, & si à pi-  
staciis figura saporeque plurimū dissideat. Scaliger ad Pistaciorū species refert.  
Tragus Nucē Vesicariā & follicularē appellat. Quidā, inquit Dodon. Pistacium  
Germanicū: fructus ipsius Germ. *Pimpernus*, vocat. Gesnerus ait ab Italis quibus-  
dā, ut Romæ, vocari *Sambucum Validā*. Anguillara *Albero de l'vna*, & quibusdā in

STAPHYLODENDRON.

locis *Pistacio saluatico*. Arbor est humilis, foliis  
Sābuci, sed viridioribus, & tenerioribus. Mēse  
Maio flores albicātes, rotūdi, multiplices, sæpe  
quaterni aut terni emicāt, qui tādē in cauas  
abeunt vesicas. Autumno verò in ipsis maturis  
binę ternęque reperiūtur nucule, Ciceris effigie  
maiores tamē in quibus subuirides includūtur  
nuclei, sapore dulces, sed nausēā mouētes. Pl.  
Est trās Alpes arbor, simillima Aceri albo ma-  
teria, quæ vocatur Staphyloedendron. Fert sili-  
quas, & in his nucleos sapore Nucis auellanæ.  
Ex quibus verbis Plinij falsum esse perspicitur  
quod multi cōtēdūt, Staphyloedendron istud Plinij  
Colyteā esse Theoph. quæ folio est Salicis,  
ramosa comosāque, atque magna prorsus ar-  
bor, fructū in siliquis leguminū modo gignēs,  
latis nō angustis: semē inclusum parū, durum  
modicē, nō multum pro siliquæ magnitudine.  
Quæ omnia diuersa sunt à Plinij Staphyloedē-  
dro. Verū cū Plinius, inquit Tragus, Staphy-  
loedendron siliquas ferre dicat, hæc verò arbor ve-  
ficas, nō video quo iure ex nuce vesicaria Sta-

Lib. 3. Hist.  
cap. 14.  
Ibidem.

phyloedendron faciāt, nisi fortē per siliquas, vesicas intelligāt. Eandē arborē luculē-  
tē descripsit Scaliger. Apud Iesuates nostros, inquit, arbor est, è qua virga pacta,  
& adoleuit celerrimē, & effusis stolonibus frequentissimam circa se confecit  
syluā. Enodis, si qua alia, Oliuæ folio, simplici, aut Salicis frōdi proximo. E ramis  
folliculū demittit, qualē Halicacabus, durū tamē. In eo fructus cōdūtur bini ter-  
niue, esculenti, natura, colore, sapore Pistaciorū, sed orbiculatiore facie. Quare  
qui Pistaciorū arborē ignotā habeā, ex hac Pistaciorū medullam esitarim, an sit  
hæc ad Pistaciorū species referenda non ambigā. Nux vesicaria, inquit Tragus,  
quocunque in loco plantata faciliē prouenit. Seritur autem nuculis, neque non  
surculis



furculis, seu stolonibus, qui quotânis è radice profiliunt, sicut & virgæ Cotoneæ Mali, & Coryli singulis annis fruticare cōsueuerunt. Hi stolones Autumno aut vere ineunte euulli transplantari possunt. Crescit, ait Gesnerus, apud nos spōre in sepibus, quamuis rara, & videtur locum humidum amare. Frequentior, vt audio, circa Arouiam. Ex nuculis orbiculi precatorij fiunt.

Ibidem.

Trag. Ibid.


## LABURNVM CAP. XXXVI.



ARBOR hæc fruticosa est, aut frutex arborefcens, inquit Solerius de Cytiso tractās, trium quatuorue vlnarum altitudine, caudice non admodum crasso, ramis hinc & inde diffusis. Nonnunquam fruticosa tantum spectatur (quia plerūque ceditur, & Coryli modo ab imo caudice regerminat) stolones innumeros ab vna radice fundens, longos, rectos, ex viridi candicantes, Viticis virgis similes, ex quibus per certa interualla erumpunt folia terna, longo pediculo nitentia, Viticis foliis similia, læuia, supernè viridia, infernè candicantia. Ex ramis prope foliorum pediculos emergunt flores lutei, quales flores Genistæ aut Brasicæ, è longis pediculis inæqualiter dependentes, rarioreq; illa ac prælonga textura, cubitalem æquantes longitudinem, apibus ingrati. Floribus decussis succedunt cornicula, siliquæque, Pisforū hortensium siliquis similes, compressiores, fractu contumaces. In extremis ac nonnunquam intermediis spatiis continetur semen Lentis magnitudine, ex latitudine subrotūdum, imo loco qua siliquæ per petiolum hæret, tantillū excauatum, renis prorsus effigie, quod ante quam maturuerit viret, post maturitatem varium est, durum, & ob læuorem splendidum. Floret mēse Maio, & Iunij initio, deinde sensim siliquatur æstate, ac tandem durefcit maturefcente vna, & circa calendas Octobris integrè perficitur. Hanc arborem Plinij Laburnum esse putat Dalechāpius. Alpina, inquit, est arbor, nec vulgo nota, dura ac candida

Forma.  
In schol. in  
Act.

## LABURNVM.



materie, cuius florem cubitalem longitudine, apes non attingunt. Hæc quidem plantæ appictæ conueniunt, hodièq; de hac arbore à rusticis & montium incolis prædicantur. Natales eius in Alpibus, & montibus fermè omnibus Delphinatus, Sabaudia, Terræ cognomento nouæ, vmbrosis & syluosis locis, sæpius siccis, nonnunquam humidis. Ab eorum locorum indigenis voce ex Laburno detorta, *Albour*, & *Aulbour* nuncupatur, materia durissima, ac palis conueniente, natura apibus inimica. Matthioli hanc arborem Anagyris Dioscori esse existimat, primum scilicet eius genus, quod maius est, in Apulia frequentissimum, & eo Cāpaniæ tractu quo Terracina itur Fundos, ad Tyrrheni maris litus: foliis Vitici proximis, flore Brasicæ, racemoso, fructu hortensi Smilaci simili, amplioribus tamen, & breuioribus paulò siliquis incluso, colore purpurascente, vsque adeo duro, vt aqua maceratum duritiā suā pertinaciter seruet. Sed Anagyris Dioscoridis est perquam grauis odore frutex: Laburni nostri, nec flores, nec folia scētent. Semen illius *ἐν καρποῖς μακροῖς*, id est in corniculis longis: huius semen in corniculis breuibus: Folia maiora latioraque habet quàm Anagyris, vt ostendemus cū veram Anagyris exhibebimus. Præterea tria quæ

Tempus.

Nomina  
Lib. 16. c. 18.

Li. 3. ca. 149.  
Dioscor.

i 4



hodie huic arbori à Rusticis tribui diximus, quòd Alpina sit arbor, quòd materie dura, ideoq; palis apta, quòd flores eius apes non attingant, nullus, quod sciam Anagyridi, at Laburno certè Plinius tribuit, quæ hîc depictam arborem non Anagyrin, sed Laburnum esse testantur. In eadem sunt sententia Cordus, & Gesnerus, quam reprehendit Matthiolus. Laburni, inquit, materies à Plinio candida describitur, non contrà medullitus nigra, cortice tenuis lutea, modo Gaiaci, qualis Egheli materies cernitur. Ad hæc Eghelus arbor est omnibus ferè cognita, quod frequentissima in sylvis reperiatur, non ea quidem vulgo incognita, vt de Laburno refert Plinius. Iam verò Egheli Flores qui in arbore ramorum instar pendent, palmi longitudinem non excedunt, quos Laburno Plinius cubitales tribuit. Postremò, illud experientia compertum, quod apes Egheli flores non aspernantur. Hæc sententiam nostram labefactare, aut infirmare non possunt. Laburnum enim hîc Matthiolus accipit, quod secundum, seu minus Anagyridis genus ipse constituit, quòdque rura Tridentina vocant Eghelo. At quod Gesnerus Laburnum, quòdque nos intelligimus, primum est à Matthiolo positum ac depictum Anagyridis genus, vt ex pictura apparet, & quod maius appellat, vt paulo ante indicauimus. Huic omnia quæ adscripsimus optimè cōueniunt, minimè verò ea quæ secundo Anagyridis generi ipse adscripsit. Quod si nostra Gesnerique sententia Laburnum Plinij sit ea arbor quam hîc proponimus, & quam Matthiolus pro primo Anagyridis genere depinxit. Cur non secūdum eiusdem Matthioli Anagyridis genus, alterum etiam Laburnū iure dicetur, cum similes natales habeat, foliorum figuram sitūque similes, vires ferè easdem, materiam similiter duram? Maio & Iunio mensibus grato in montibus spectaculo floret. Micat enim aureo flore, primo Anagyridis siue Laburni nostri generi simili: folio est non fœtente, nec ingrati saporis, Trifolij pratensis ferè. Huic cornicula prodeunt, Genistæ æmula, in quibus semen continetur, feminis eiusdem Genistæ magnitudine, sed oblongum Phaseoli modo, colore subnigro. Quod si quando ignari pastores comederint, vt legumina alia, crebris magnisque vomitionibus adeo vexantur, vt testetur Matth. se vidisse qui ad sanguinis vsque reiectionem vomuerint. Materies ligni durissima, Gaiaci modo exterius lutea, interius nigra. Incorrupta diu durat: quare vinitores ex ea palos faciunt sustinendis vitibus aptissimos, quos & ceteris omnibus præferunt. Quin & sagittarij ex ea validissimos arcus cōficiūt. Hac planta scatet Vallis Anania, ac vniuersus Tridentinus ager. Solerius certo & indubitato se scire scripsit Laburni Alpini siccatum corticē in pollinē redactum, & drachma plus minus vna, ex quopiam liquore potū, maximas vacuationes moliri. Verū diuersa ratione, quando quidem si ab infernis ad superna procedendo corticem euulsum porrigas, vomitum, sin verò à supernis ad inferna descendendo, per aluum deiectiones insignes mouebit. Quod si quis obstinatè Matthioli sententiā tueri malit, hoc saltem optimo iure mihi tribuet, & concedet, primum Laburnum Anagyrin Alpinam esse, atque fortasse etiam secundum Anagyridis Alpinae speciem.

Ibidem.


Forma.

LABURNVM alterum.

Matth ibi.  
Tempus.

Vires.

Vsus.

In Schol. lin.  
Act.

A N A



## ANAGYRIS CAP. XXXVII.

**A**NAGYRIS Latinis, vt ἀνὰ γυρῆς & ἀνὰ γυρῶς Græcis dicitur, Gallis Bois *Nomina*  
 puant, Italis Anagiri, Arelatenſibus Pudis Frutex eſt aut arbuſcula, ra-  
 mulis tenuibus, in quibus folia terna ſemper, Vitici ſimilia flores  
 lutei, & pallidi, Braſſicæ haud abſimiles, quibus ſuccedunt ſiliquæ  
 longæ, ſemen continentes durum, compreſſum, Phaſiolorum figura, ſed mi-  
 nus. Tota planta ſædo eſt & ingrato admodum odore. Dioſcoridi Anagyris  
 frutex eſt arboris inſtar, per quam grauis odoris, foliis Viticis, virgisque, flore  
 Braſſicæ: ſemen in corniculis gignit, ſubrotundum, firmum, verſicolori facie,

Li. 3. ca. 149.

## ANAGYRIS

Dodonæi.



## ANAGYRIS

vera ex agro Arelatenſi.



ſimile renibus, quod dureſcit vua matureſcente. Anagyris Plinio, quam aliqui  
 Acopon vocant, frutiſcoſa eſt, grauis odore: flore oleris: ſemē in corniculis non  
 breuib. gignit, ſimile renibus, quod dureſcit per meſſes: in quibus cum Dio-  
 ſcoride conſentit. Neque enim multum refert, an per meſſes, an vua mature-  
 ſcente ſemen dureſcat. Ex his perſpicuum eſt veram eſſe Anagyrin quam hîc  
 exhibemus, quæ tetro ſuo odore ita ſe prodit, vt nullum vnquam in eam inci-  
 diſſe putem (maximè conſentientibus cæteris notis quas ex Dioſcoride & Pli-  
 nio tradidimus) qui non Anagyrin eſſe ſibi ipſe perſuaſerit. Inde natum pro-  
 uerbiū, Anagyrin commouere, in eos dici ſolitum, qui ſibi ipſis malorum au-  
 ctiores ſunt, quique in ſuam perniciem aliquem irritant. Eandem ob cauſam  
 ſunt qui Anagyrin à Plauto Nauteam vocari putant, ſed auctorem non habent.  
 Nauteam porro herbam grauem eſſe ſcribit Feſtus, qua coriarij vtuntur, à nauj,  
 quaſi Naufeam dictam. Matthiolus duas alias Anagyridis ſpecies depinxit,  
 quas non Anagyridis, ſed Laburni ſpecies eſſe iam demonſtrauimus. Anagyris  
 locis incultis prouenit, prope Arelaten, paludofis, vnde hæc collecta, & ex  
 viuua planta depicta. Aprili & Maio menſe floret. Septembri fructum parit, Au-  
 tumno perficit. Tenera eius folia trita, inquit Dioſcorides, tumores illitu reſpi-  
 munt: ſi partus hæreat, & ſecundæ menſesque morentur, drachmæ pondere bi-  
 buntur

Lib. 27. c. 4.

In cap. 149.

Lib. 3.

Locus.

Tempus.

Li. 3. ca. 139.

Vires.



buntur in passo: sic & suspiriosis dantur, & contra dolores capitis in vino. Difficiliter parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendis discutiendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer ciēt. Hæc Dioscorides: In quibus verba ista, Radicis cortex concoquentis, &c. aliter vertit Ruellius quàm Græca significant: τῆς δὲ ῥίζης χυλὸς διαφορεῖται, καὶ ἐκπέσκει. Id est radicis succus discutitur, & concoquit. Plinius: Folia collectionibus imponuntur, difficulterque parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Quod si fœtus mortuus hæreat, & secundæ mensēsque morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo folia. Sic & suspiriosis dantur, & in vino vetere ad phalangiorum morsus. Radix discutiendis concoquendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones facit. In his Plinius in quibusdam à Dioscoride dissentit: illi enim radix, huic radicis succus discutitur & concoquit, Galeno & Oribasio radicis cortex. Nisi quis dicat quod Plinius simpliciter de radice, Galenus de radicis cortice dixerit, fieri posse ut in Dioscoride τῆς ῥίζης φλοιὸς, & non ῥίζης χυλὸς legendus sit. Quod verò sequitur multo maioris est momenti. In vino vetere folia dari ad phalangiorum morsus Plinius ait, Dioscorides πρὸς τὴν κεφαλῆς πόνον σὺν οἴνῳ, id est ad capitis dolorē in vino, ita ut vox φαλῆς pro voce κεφαλῆς in Plinio supposita sit, aut in Dioscoride pro κεφαλῆς voce, τὰ φαλῆς legere oporteat. At certè verisimilius est in Dioscoride τὰ φαλῆς pro κεφαλῆς legendum esse. Quid enim Anagyridis folia quæ subacria sunt, excalfaciētisque ac incidētis facultatis ad capitis dolores valere possunt? Proclivius quidē fuit, ut vox κεφαλῆς in Dioscor. pro τὰ φαλῆς supponeretur, quam ut Plinius τὰ φαλῆς pro κεφαλῆς verteret. Galenus de Anagyridis natura hæc scripsit. Anagiris frutex est grauitèr oleus, & digerentis excalfaciētisque facultatis. Sed folia etiamnum virentia cū propter humiditatis admistionem minùs sint acria, idcirco tumentia reprimunt. At resiccata incidentis sunt, excalfaciētisque facultatis. Similem ferè facultatē habet radicis cortex. Semen autem magis subtilium est partium. Sed & vomitum prouocat. Eadem omnino Oribasius quoque habet.

Lib. 6. simp.

RHUS CAP. XXXVIII.

Nomina  
Li. 24. c. 11.

Forma  
Li. 1. ca. 124.

Lib. 1. Dio-  
scor. c. 124.  
Embl. 121.  
Li. 1. Diof.

ibidem.

**R**hus, & Hippocrati ῥόος dicitur à colore coccineo acinorum: ῥῆς enim ἐρυθρὸν interpretatur, vnde Rufus vox Latina, & Roux vulgo Gallorum, nobis Rhus, vel Rhos: Latinum enim nomē nō habet, ut scribit Plinius, cū in vsum pluribus modis veniat. Tamen Theodorus, quæ est tataris eius audacia, Fluidam interpretatur, nomen illi à ῥέω positum fuisse existimans, Arabes vocant Sumach, Adurion, Rosbar Sadisticos, seu Rosaidicos, Itali Rhu, & Sumacho, Hispani Sumach, & Sumagro, Germani Gerberbaum. Rhus arbuscula est siue frutex hominis altitudine, vel binum ferè cubitorum, ut ait Diosc. ramis multis, foliis oblongis subrubentibus, binis ex aduerso sitis, in ambitu ferratis Ilicis modo, id est τὴν περιφέρσαν ἐν τῇ μετρίᾳ περινοφῶς, ait Dioscor. quæ postrema vox à Ruell. & Marcel. interpretibus omiſsa est, nescio qua ratione, inquit Matthioli. cum non modo eam quoque legat Oribasius, sed quod etiam Rhus foliis pulchrè Ilicem æmuletur. Cornarius verò Latine reddit, circūcirca velut ferra incisa, nō enim περινοφῶς, id est Ilicis modo, sed περινοφῶς, id est velut ferra, legendum censet. Fructus Rhos racemis paruis similis est, densus, magnitudine Terebinthi, quadantenus latus, corticosa tunica perquam utili. Sic enim legitur in publicis Dioscor. exemplaribus, τὸ περιετιμυον φλοιῶδες ἐστὶν ἄχρητον. At postremæ vocis loco Cornarius legit ἄχρητον: id est inutile, vertitque, cuius circumdatus ipsi cortex inutilis est: nullum enim eius vsum in sequētibz præscri



RHVS.



præscribit. Theophrastus hanc plantam depinxit his verbis, Græca ego adscribam, quia in vulgatis exemplaribus integra non sunt, nec Gaza interpres omnia reddidit: τῆς δὲ ῥῆς τὸ μὲν ἄρρεν, τὸ δὲ θῆλυ χαλῶσι, τῷ τὸ μὲν ἀχαρπον εἶναι, τὸ δὲ χαρπιδιον. ἐκ ἑξ ἧς δὲ ἡ δὲ τῶν ῥῶν ἐστὶν ἡ ῥῆς, ἡ δὲ παχέϊα. φύλλον δὲ ὅμοιον πτελέα, πλὴν μικρόν, καὶ ὁμομηκέες εἶναι, καὶ ἐπιδασύ. τῶν δὲ κλωνίων τῶν νέων ἐξ ἰσῶς τὰ φύλλα εἰς δύο, καὶ ἑκατέρωθεν (pro χαλῶν, &c.) ὅκ τῶν παλαιῶν, ὅτε φοιτῶν. βάπτεισι δὲ αἱ σκυλοδέλαι τὰ λακκά δέρματα. ἄνθος λευκὸν, βοτρυῶδες, ὃ γῆμα δὲ ὀλέχερες, ὅτε λυγρὰς ἔχον (ὅτε υγρὰς habent nostri Codices) ὥσπερ δὲ ὁ βότρυς ἀπανθή- (ἀνθος δὲ χαρπὸς αἶμα τῇ σφυγῇ ἐρυθραίνει), καὶ γίνον) ὅσον φακοὶ λεπτοί, συγκεκλιμένοι. βοτρυδὸν δὲ τὸ γῆμα καὶ τέτων. ἔχει δὲ φαρμακώδες τὸ τοῦ καλῆται ῥῆς, ἐν αὐτῷ ὅτε ὠδες, ὃ δὲ τῆς ῥῆς διητημιμῶν ἀπέχει πολλὰ καὶ ῥίζα δὲ ἐπιπλάσιος, καὶ μνοφυῆς, ὅτε ἀνα- σκᾶπτεται ῥαδίως ὀλέρῃον. τὸ δὲ ἔσθλον ἐντεριώνην (hic deest, ἐκ ἑξ ἧς) ἀφθαρίον δὲ κοπήδον. ἐν πᾶσι δὲ γίνε) τοῖς τόποις. ἐθνη δὲ ἡ μάστις ἐν τοῖς ἀργυρώδεσι.

Id est, Rhus alia mas, alia fœmina: hæc sterilis: illa fructifera: neque virgas rectas, neque cras-

fas habet: Folium Vlmi simile, sed paruum, oblongius, pilosum (sic Plinius ἐπιδασύ interpretatur, Gaza densum aliquantulum.) Ramulorum nouellorum folia paribus spatiis bina disposita coniugatim ex lateribus ordine seruato prodeunt. His pelles albas inficiunt (vel spissant,) qui coria condepsant. Flos est albus, racemosus, figura rotundus, cinnis, seu villis, vix modo capillatus. Flore delapso, fructus cum Labrusca rubescit, acervatis veluti lentibus multis, ac tenuibus, congestus, racemi quoque figura. In eo fructu osseum medicamentum est, etiam Rhu vocatum, quod dum vix colatur à carne separatum, huc illuc abscedit. Colatur vix, succus ut exprimatur acore grato commendatus ad ciborum condimenta, qua de causa Rhu, obsoniorum vocant. Radix per summa cespitum hæret, simplexque est: quamobrem cum integra radice facile arbor effoditur. Lignum sine medulla est, cæsumq; non corrumpitur. Nascitur in omnibus locis, sed in argilosis potissimum luxuriat. Hæc Theophr. quæ omnia si non satis recte expressero, conatum meliora ea faciendi æqui bonique consulant lectores. Plinius non omnia transcripsit, quædam veluti obscura transiliens. Etiam Rhus Syriæ, inquit, mascula fert, sterili fœmina, folio Vlmi, paulo longiore & piloso, foliorum inter se semper contrariis pediculis, gracili breuiq; ramo. Pelles candidæ conficiuntur iis. Semen Lenti simile, cum vix rubescit, quod vocatur Rhus medicamentis necessarium. Plinius alibi tria Rhos videtur fecisse genera. Nam & herba est sylvestris, inquit, foliis Myrti, cauliculis breuibibus, quæ venena & tineas pellit. Est & frutex coriarius subrutilis, cubitalis, crassitudine digitali, cuius aridis foliis coria ut Malicorio perficiuntur. Et paulopost. Rhus quæ Erythros appellatur, frutex est, & huius fruticis semen vim habet adstringendi, refrigerandique. Aspergitur pro sale obsoniis, Aluos soluit, omnesque carnes cum Silphio suauiores facit. Quo in loco hallucinatus esse videtur Plinius, cum de coriario priuatim scripserit, ipsumq; diuiserit ab eo, quo in ciborum condimentis antiqui utebantur. Quamuis enim

Cap. 18. lib. 3. Histor.

Lib. 11. ca. 6

Lib. 3. ca. 6.

Li. 24. c. 11.

Lib. 1. Dio- scor. c. 124.

apud



apud medicos, præsertim apud Galenum, tum alibi, tum maximè libris τῶν ῥῆς, multa sint Rhœis nomina, ut qui Syriacam appellant, Ponticam, Rhœm obsoniorum, coriariam, rubram, tamen non sunt hæ plantarum quæ genere vel specie differant appellationes, cū vnum sit duntaxat Rhœis genus à Dioscor. descriptum. Sed hoc animaduertendum, ῥῆν ἐπὶ τὰ ὀψα, id est Rhœm obsoniorum, nihil aliud esse quàm semen fruticis, at ῥῆν βυρσοδέφυκον, id est Rhœm coriariarum, folia & ramusculos eiusdē. Rhus quæ obsoniis aspergitur, Dioscoridi semen est coriarij fruticis. Galen. Rhœ coriarij ad desiccandas, & adstringendas pelles vtuntur, propterea coriaria appellata est. Porro medicis in vfu est in primis fructus eius, ac succus, multum austeræ qualitatatis. Rhus rubra dicitur semen eius immaturum, maiore astringendi vi præditum quàm vbi maturuit, acinis quodammodo nigricantibus. Syriaca & Pontica à regionibus in quibus nascitur, quemadmodum Iberica, & Italica dici potest. At Plinium errore liberat Cornarius, loco ex veteris manuscripti Codicis lectione emendato, quo cum de Rhœ frutice coriario tractasset, mox subdit. Rhus quæ Erythros appellatur, semen est huius fruticis. Vim habet astringendi refrigerandique. Aspergitur pro sale obsoniis aluo, soluta, omnesque carnes cum silphio suauiores facit. Quantum ad Theophrastum attinet, ex eius verbis intelligi minimè potest, alteram esse Rhœm obsoniis, alteram coriis destinatam. Cum enim eam sexu tantum discreuisset, utrâque coria alba spissari tradit. Quare non immerito reprehendendus Fuschius, qui cū duo Rhœis in vniuersum genera esse tradidisset, quod Græcis μαρφορὸν, id est Culinarium nominatur, alterum βυρσοδέφυκον, id est coriarium, subiunxit Galenum, Nicolaum Myrepsum, & alios Syriaci etiā Rhœis mentionem facere, qui à duobus supradictis differat, sitq; peculiaris cuiusdam Syriacæ arbusculæ succus. At Rhus Syriacus, ut rectè Cornarius annotauit, nihil aliud est quàm Rhus qui in Syria prouenit, succus autem Rhœis qui ex Syria defertur, idem est cum Rhœo culinario, & coriario. Syriacus verò propterea dictus videtur, quod in Syria multus proueniret, velut ex Plinio apparet, qui Rhœis Syriacæ plantæ ad pelles conficiendas commodæ, semen, quod Rhus vocatur, medicamentis necessarium adscripsit. Denique Rhœm obsoniorum, siue rubrum, siue culinarium, & Rhœm coriariarum eandem planè esse plantam, Paulus paucis, & apertè declarauit: ῥῆς τῆς βυρσοδέφυκῆς καλεσμένης τοῖς ἰατροῖς, ὁ καρπὸς μέλιτι ἢ ὀχυλὸς εἰς χρεῖαν ἥκιστον, ἵκανὸς ὅσους τυπτικοὶ μὲν, ἢ ξυραντικοὶ ἐκ τῆς τεττῆς τάξεως, ψυκτικοὶ δὲ τῇ διὰ τέραιδ est: Rhœis coriariæ à medicis dicta fructus & succus magno in vfu sunt. Abundè enim astringunt, & siccant, ordinè tertio, refrigerant secundo. Quare toto cælo errat, qui Rhœm Syriacū à Celso Mannam intelligi arbitrantur, pharmacū aluo leniter soluendæ aptum, quod ex Syria adfertur, cū nihil aliud sit Rhus Syriacus, quàm Erythros siue ruber, siue coriarius, & apud eum non ros, sed Rhos, siue Rhus Syriacus legi oporteat, sicut etiam apud Columellam non Rorem futorium, sed Rhœm Syriacū legendum est, cum Syriaci appellatio Latinis vsitata sit, ut Græcis familiaris, & recepta. Neque enim futorium à futorum siue coriariarum vfu ipsum dixisse noua appellatione efficta credere par est, veluti quidam somniarunt: neque etiam Rosmarinum paulo post legendum est, veluti recens edita exemplaria habent. Nam alio in loco idem Columella in conditura ex Cydoniis, Rhœis Syriaci contriti & cribrati heminam habet, de quo adeo in huiusmodi pharmaca ac condituras addendo etiam Galenus egit. Habetur tamen apud Marcellum medicum Rhus marinus, siue Rhus orientalis, dysentericis tritus propinandus ex vino, ut etiam apud Columellam Rhœm marinum legere possis, non rorem. Libet verò credere eundem Rhœm, siue Rhœm à diuer

Li. 3. simpl.

Embl. 111.  
Li. 1. Diosc.Matth. ibi.  
Li. de com.  
med.  
Li. 6. med.  
part.In lib. 6.  
med. part.

Lib. 7.

Crinit. lib.  
7. de hon.  
discipl.

Lib. 9. ca. 13.

Lib. 12. c. 41.

Li. 6. med.  
part.



à diuersis locis in quibus prouenit tam varias appellationes sortiri, cum etiam Eupatoricam & Ponticam Rhun (est enim generis cōmunis) Damocrates probet. Rhus nascitur in petris<sup>4</sup> Diosco. auctore. Nascitur in Italia, inquit Matthi-  
 lus, Apennino monte pluribus in locis, cuius aridis foliis hircorū caprarumq; pelles concinnantur, quas vulgo Somachi vocant. Aspergebatur olim pro sale obsoniis, vt scribit Plinius, & Dioscor. *ῥῆς ἐπὶ τὰ ὀψα.* Quod ita accipit Marthio-  
 lus, & plariq; alij, ac si pro sale antiqui in condimentis vterentur, quem eius vsum apud Syros & Aegyptios, vbi Rhus præstantior prouenit, etiamnum hodie durare aiunt. Cornarius verò non satis sese intelligere dicit, an is fuerit eius  
 seminis vsus, vt salis locum obtineret. Is enim obsoniis aspergi solitū arbitrat-  
 ur in fluidis affectionibus, maxime cœliacis, ac dysentericis astringendi gra-  
 tia, non pro sale, sed cum sale, velut hodie in Saxonia magna, in omnibus ferè  
 eduliis ac obsoniis farina auenacea crassior, quam ipsi Gorte vocant, vna cum  
 sale aspergitur. Vires Rhos medicas has esse scribit Dioscor. Folia vim habent  
 astringendi, & Acaciæ effectus præbent. Decoctum capillos denigrat: dysente-  
 ricis infunditur, & in potus eorum infususq; adiicitur: instillatur auribus puru-  
 lenti. Gangrænas & pterygia folia cohibent, ex aceto aut melle illita. Lique-  
 mentum fit ex aridis foliis, ad crassitudinem mellis, in aqua decoctis, eadem cū  
 lycio facultate. Semen eisdem effectus exhibet: cœliacorum dysentericorumq;  
 obsoniis aspergitur: fracta desquamata, liuidaq; illitum ex aqua ab inflamma-  
 tione vindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit: candida sceminarum  
 profluvia sistit: hæmorrhoidas sanat, cum Querneo carbone intrito admotum.  
 Aqua in qua semen maduit, decocta cogitur, coitq; efficacior quodammodo  
 ipso semine Gummi defert, quod dentium cauis imprimitur ad dolores finien-  
 dos. Galenus. Rhus fruticosa planta astringit & desiccet. Nam & coriarij ad de-  
 sicandum & astringendum planta vtuntur, ac proinde *ῥυσοδὲς φρυγ.* id est coria-  
 ria nominatur. Porro medicis in vsu sunt imprimis fructus eius, & succus, mul-  
 tum austerae qualitatatis. Consentaneus est vsus particularis ipsi gustus sensui.  
 Fuerit itaque & hoc medicamen ex tertio ordine exiccantium, ex secundo verò  
 refrigerantium. Medici, inquit Plinius, Rhoicis vtuntur ad contusa: item cœlia-  
 cos, & sedis vlcera, aut quæ phagedænas vocant, tritis cum melle, & illitis cum  
 aceto. Decoctum eorum instillatur auribus purulentis. Fit & Stomatice decoctis  
 ramis ad eadem quæ ex moris, sed efficacior, admisto alumine. Illinirur eadem  
 hydropicorum tumoribus. Galenus etiam Rhos succum Stomatice admiscet:  
 & apud eundem Damocrates in confectioe ex capitibus papaueris ad fluxio-  
 nes & vigilias. Quæ Rhos species ab herbariis esse putantur, subiungēdæ. Pri-  
 mæ hic propositæ, Rhus à Plinio is primo loco ponere videtur. Nec Rhus Lati-  
 nū nomē habet, inquit: nā herba est sylvestris, foliis Myrti, cauliculis breuibus,  
 quæ venena & tineas pellit. Quidam etsi fruticem istum ab ea Pliniana Rhoe  
 notis aliquot discrepare aperte videant, vt mox dicetur, tamen quia multis aliis  
 Rhos naturam & figuram refert, malunt eo nomine depingere, quàm (sicut in  
 plurimis aliis fecimus) ambitiosius & curiosius de nominibus altercando tem-  
 pus terere. Frutex igitur ad hominis altitudinē adolefcit. Caule est crassitudi-  
 nis pollicaris, fragili, cauo Sambuci modo, cortice cinereo, maculoso, membra-  
 na rufescente subiecta, paribus interuallis in nodos quosdam intumescēte, à  
 quibus furculi siue ramuli prodeūt, lenti, & flexiles, in quibus folia sunt, æqua-  
 libus spatiis bina, aduersum disposita, Myrto sylvestri & latifoliæ omnino si-  
 milia, aliquantò ampliora, venosa, altera parte rubescentia. Flores purpurei in  
 summis virgis hinc illinc enascuntur: fructus nigri è tenui pediculo pendent,  
 aliquantum compressi, veluti striis quibusdam comaliculati, fibris quaternis

Lib. 7. med.  
part.

Locus.

Ibidem.

Lib. 1. Dio-  
scor. c. 124.

Li. 24. c. 11.

Ibidem.

Embl. 121.  
lib. 1. Diosc.

Vires.

Li. 8. simpl.

Li. 24. c. 11.

Li. 6. med.  
part.Li. 7. med.  
part.

Li. 24. c. 11.



discreti, sapore acerbo: semen intus album rugosum, vinaceis simile. Ergo florum & fructus congerie, eiusdem sapore, foliorum effigie cum Rhois natura & Pliniana descriptione satis conuenit, nisi fruticis proceritate, causis crassitudine, ramulorū longitudine discrepare videretur. In sepibus agri Monspelienfis,

RHVS sylvestris Plinij.



RHVS sylvestris altera.



- Lib. 6. c. 12.** pingui, densoq; solo prouenit. Rhus sylvestris Dodonæi, & Plinij Rhus altera videtur esse plāta, quā alij Myrtum vocant, alij Pseudomyrsinē, & Myrtum Brabanticā, Germani, *Gagel*. Humilis ea est, lignosa, dura, surculis multis, in quibus folia longiuscula, Buxi arboris foliis satis similia. Inter surculos ramuli exoriuntur multas veluti spicas ferentes, primū flosculis multis onustas, deinde seminibus multis cōgestis, angulosis, pingui quodam liquore refertis, saporis foliorum, florum, fructus, surculorum amarissimi, sed odoris iucūdi. Rhoromagenfes in quorum agro plurimus hic frutex nascitur per saltus herbidos, & vligine madentes, vocant sua lingua *Piment Royal*, quasi Melissophyllum regium. Rustici æstāte surculos foliosos & seminibus onustos, in manuales fasciculos collectos vendunt, non ad alium vsum, quam vt vestes odoris suauitate commendent, & à rodentium vermiculorum noxa custodiant. Sapor tamen egregiè amarus insignem habere vim siccandi & discutiendi monstrat, sed præsertim valere eam sumptum quàm admotum ad lumbricos, necandos, & pellendos.
- Locus.**
- Vires.**
- Tempus.** Maio mense & Iunio floret, Iulio & Augusto fructum perficit.

## ZIZIPHVS CAPPADOCICA CAP. XXXIX.

Li. 12. c. 9.

Nomina



Æc arbor Ziziphus Cappadocica à Plinio nominatur, ex cuius odorato flore olearū flori simili coronæ necdebantur: quibusdam arbor Paradisæa, ob floris odorem suauissimū, quod nomen aliis etiam tribuitur. Sunt enim qui Thuiam odoratam, arborem Paradisæam etiam vocent, vt diximus. Crescit hæc Ziziphus ad Salicis magnitudinem, radicibus multis nixa, crassis, circumquaque sparsis, locique multum occupan



## ZIZIPHVS

Cappadocia.



occupantibus, summa terra vagis, Stolones multos gignentibus, qui nisi putentur matrem emaciant, & tandem enecant, putati verò & depaëti viuunt, & arborefcunt. Cortex albicat, in ftipite valdè rugofus & craffus, in ramis tenuior, & molli quadà lanugine obfitus. Porro in multos & lōgos ramos arbor finditur, in quibus lōgæ validæq; per interualla fpinæ. Folia cādida, oblōga, Oleæ, Saliciue fimilia, denfa, multa; in furculis. Flos hians aureus, in ſex cuspides diffeëtus, priuſquam dehifcat in Alabaſtrum faſtigiatus, ex viridi candicans, paruus, Rhamni ſecūdi noſtratis, aut Mali Citriæ figura, veluti floſculis cōſertis pendulus, ternis ferè ſimul ad imam foliorum partem emicantibus, odoris iucundiſſimi, mea quidem ſententia ſuauiſſimam Mali Citriæ, quæ ſumma nobis habetur, ſuperantis. Fructum fert, paruam ſcilicet baccā, Oleaſtro ſimilem minorem, breuiſſimo pediculo nexam, viridem, & qua parte ſolem magis excipit, ruſcentē, lanugiſoſo quodā puluiſculo tectam, guſtu ſubacido, carne valde ſicca

& exucca, qualis eſt Baccarum Oxyacanthæ cū maturuerunt. Huius arboris taleæ exciſæ, & in terram defixæ facilè comprehendunt, & radicantur, Salicis modo. Amatus Luſitanus hanc arborem Salicem eſſe Amerinā videtur exiſtimare. Bellunenſis Auicennæ interpres, Chalef arborē deſcribit, ſpecie Salicis,

OLIVA Boemica, ſive  
Elaagnus Matthiol.



in locis humidis naſcentem, foliis Ceraſi: quæ arbor fructum non fert, ſed flores valde odoratos, veris initio, antequam folia prodeant. Ex quibus floribus in Syria deſtillatur aqua ſuauiſ odoris, qua frequenter vtūtur in cordis morbis calidis. Ex iisdē in oleo maceratis fit oleum Chalef, nō aliter quam violaceum. Ex iis etiam permixtis cum Amygdalis, quoad eorum odore & humore imbuta fuerint, exprimitur oleum, quod etiam oleum Chalef nominatur. Id Arabum Chalef, quidam Ziziphum hīc à nobis deſcriptam eſſe putant, ſola, opinor, in vtriuſque flore odoris gratia & ſuauiſſitate moti. Nam alioqui magnum inter has arbores reperio eſſe diſcrimen. Ziziphus enim hęc noſtra editis iam foliis floret, Chalef ante foliorum exortum: hæc baccis grauari ſolet, illud fructum nullū profert. Verum tamen nō dubito, quin ex huius Ziziphi floribus in operculata concha preſantiſſimi odoris aqua ſtillare poſſit, oleumq; ex iisdem cum Amygdaliſ tritis parari, eo modo quo ex Bellunenſi recitauimus, odoris fragrantia

Lib. I. Dioſcori. ca. de Vitice. Chalef arbor.

Vires.




**Locus.** præcellens, ac pretiosum. In natali humo sylvestris hæc arbor, à Lugdunen-  
bus quibusdam in hortis colitur, huc olim, vt narrant, Rhodo, à quodam Equi-  
tum Rhodiorum procuratore translata, priusquam ea insula in Solimani Tur-  
carum Imperatoris ditionem venisset. In horto, etiam Cœnobij D. Irenæo sa-  
eri id genus arbores aliquot latissimæ visuntur. Matthiolus nomine Oliuæ  
Boemicæ, siue Elæagni pictam dedit. Nascitur in Boemia, inquit, fruticosa, fo-  
lio Vitici simili, molli, ac lanuginoso: flore albo ex virgis ordine propè foliorum  
exortum prodeunte, odore non insuavi, ex quo nullus provenit fructus. Huic  
alia per omnia similis visitur Viennæ in horto Cæsaris Ferdinandi, quæ baccas  
proferat Oleæ figura, sed minores, apice in summitate aculeo simili. Hanc Elæa-  
gnum appellarem, quod folio ac virgis Agnum, fructu Oleam referre videtur.

## CERATONIA CAP. XL.

**Nomina.**  
Li. 7. simp.

**Forma.**  
Matth. lib.  
1. Diosc. ca.  
332.

**CERATONIA** quasi cornuta siliqua arbor hæc à Galeno & Paulo  
vocatur, fructus κεράτιον, à Latinis Siliqua, & siliqua dulcis, ab Ara-  
bibus *Charnub*, ab Italis *Carobe*, & *Carobole*, à Gallis *Carouges*, ab Hispanis  
*Alcarobas*, à Germanis *S. Ioans brot*. Boemis *Suuatheo*, & *Ianachleb*. Græ-  
ci recentiores *Xylocerata* vocant. Arbor in magnam satis proceritatem attol-  
litur, cortice cinereo in caruleum inclinâte, vt in Loto arbore, ramis in latitu-  
dinem potius quâ longitudinē expâlis: foliis  
eo positis ordine quo in Fraxino, latioribus  
tamen quâ in Fraxino, durioribus, rariori-  
bus, magis circinatis, supernè ex fusco viridi-  
bus, infernè dilutæ viriditatis. Floret Cerato-  
nia hyemis fine, aut vere iam appetente. Fru-  
ctum profert æstate & Autumno. Fructus Si-  
liquæ sunt latæ, compressæ, aliquando pedem  
vnum, aut eo plus longæ, quæ semen conti-  
nent amplum, latum, etiam compressum, Ca-  
staneæ colore. Hæ recētes ab arbore decerptæ  
gustui sunt ingrata, sed diu in cratibus siccate  
adeo mitescunt, vt & dulces fiant, & gustui  
suaves. Præter semen, melleum intus succum  
habent. Eo potissimū refertæ sunt in Oriente  
provenientes, quo Indi & Arabes Zinziber,  
Myrobolanos, Myristicas nuces, aliq; aro-  
mata condiunt, vt testatur Strabo de Indiciis  
arboribus scribens. Arbor hæc amat loca ma-  
ritima, calida, sicca, campestria. Multum hæc  
cognita Nicæ & maris Ligustici accolis,  
vbi eam esitant pueri, etiamq; porci. Nascitur  
& in agro Neapolitano, inquit Matthio. præ-  
fertim in Apulia, ac etiam in Campania. In via Appia frequentissima conspi-  
citur. Incolæ Salequa vocant, nomine à Siliqua detorto. De Siliquis hæc pauca  
Plinius. Haud procul abesse videantur, & prædulces Siliquæ, nisi quod cortex  
in iis manditur. Digitorum hominis longitudo illis, interim falcatis, pollicari  
latitudine. Idem aliquanto post. Cùm in pluribus semina placeant, in Siliquis  
damnantur. Idem in Siliquis vetò, quod inquit manditur, quid nisi lignum est?  
non omittenda seminis earum proprietate. Nam neque caro, nec lignum, nec  
cartilago



**Tempus.**

**Lib. 17.**  
**Geog.**  
**Locus.**

**Ibidem.**

**Li. 17. ca. 24.**



cartilago dici potest, neque aliud nomen inueniat. Longe alia est Siliqua quam Ceroniam vocat Theophr. Ceronia, inquit, fructum ex ramis producit, non tamen copiosum. Vocat enim Ceroniam quæ Ficus quas Ægyptias vocant, producit. De illa Plini. Similis his Siliqua quam Iones Ceroniam vocant: trunco & ipsa fertilis, sed poma Siliqua. Ob id quidam Ægyptiam Ficum dixere, errore manifesto. Non enim in Ægypto nascitur, sed in Cyprio, Ioniaq; , & circa Gnidum, atque in Rhodo semper comantibus foliis, flore candido cum vehementia odoris: plantigera imis partibus, atque ideo superficie flauescens, succum auferente sobole. Pomo antededitis anni circa Canis ortus detracto, statim alterum parit: postea florem, post Arcturum hyeme fetus enutrient. Siliquarum de quibus hic agitur naturam breuiter exponit Dioscor. Siliquæ recentes stomacho aduersantur, aluum soluunt: eadem siccata sistunt, stomachoq; utiliores fiunt. Vrinam ciunt, sed præcipue quæ vinaceis condiuntur, vel, ut vertit Cornarius, maxime quæ vuarum retrimentis compositæ asseruantur: *μαλιστα δὲ τὰ ἐκ τῶν σιμφύλων συντιθέμενα*. Sic enim seruari solent, velut etiam vuarum Ollares dictæ, itemque Oliuæ, ita ut vicissim & retrimentorum, & siliquarum aut vuarum, aut oliuarum compositio fiat. Has compositiones Dioscor. *τὰ ἐκ τῶν σιμφύλων συντιθέμενα* vocat: *σιμφύλα* enim solidas vuarum in torculari expressarum reliquias, aut retrimenta appellari auctor est Galen. qui Siliquas in cibis damnat his verbis. Ceratia prauis succi sunt edulium, ac lignosum, quam rem necessario sequitur, ut concoctu sit difficile. Quinetiam incommodum id ipsis inest, quod non celeriter deiciantur. Proinde satius esset à regionibus Orientalibus, in quibus nascitur, ad nos non importari. Idem alibi. Ceratonia exsiccantis est, & adstringentis facultatis, sicut & fructus eius quem Ceratia vocant, non nihil etiam dulcedinis continens. Accidit autem istis simile quiddam Cerasiis. Nam si humida sumas, magis ventrem subducunt, sicca verò magis sistunt, ut potest cum humiditas absumentur, & quod essentia est crassioris tantum reliquum habeant. Siliquæ siccæ, inquit Matthiol. etsi omnium consensu manifesto adstringant, certum est tamen earum decoctum potum mirifice conferre tussientibus, ob dulcem melleamq; substantiam quæ iis inest.

Lib. 3. Hist. ca. 23.

Lib. 13. ca. 8.

Lib. 1. c. 130. Vires.

Embl. 127. lib. 1.

Li. 2. Alim.

Li. 7. simpl.

Li. 1. Diosc. cap. 130.

## SILIQVA, SIVE CASSIA CATHARTICA.

## CAP. XL I.

**N**ΑΞΙΑ *μέλαινα* Græcè, hæc planta, Latine Cassia nigra dicitur. Medici, Sepalsiarii que, Arabum, à quibus inuenta est, sectatores, Cassiam Fistulam vocant, alij Cassiam solutiua, alij Siliquam Ægyptiam, siue Catharticam. Italis *Cassia*, & vulgo *Cannela*, Germanis *Zimmet Roertim*, Hispanis *Canela*, Gallis *Casse*. Huius Siliquæ arbor inter proceras numeranda est, in India & Taprobana excelsissima, in Arabia & Ægypto mediocris proceritatis, radicibus magnis luglandis modo, cortice cinereo, materia solida, compactaque, cortice tenuis Buxei coloris, medullitus nigri, Ebeni, aut Gaiaci colore, quæ recens grauiter olet, sicca minime: folio est Siliquæ dulcis, sed maiore, & in acutum desinente. Ex ramis fructus fistulosus, siue Siliquæ pendent, densæ, sæpius pedes duos longæ, teretes, duræ, lignosæq; , pollicis crassitudine cum maturæ sunt, colore ex rubro nigricante. Nigrum dulcemque intus humorem concretum habent, non, ut in animalium ossibus, continuum, sed crebris, tenuibus, lignosisq; membranulis diremptum. In singulis loculis granum quoddam est durum, Siliquarum granis adeo simile, ut alterum ab altero internosci vix possit: hac de causa

Nomina

Forma. Matth. lib. 1. Diosc. c. 13.



*SILIQVA, siue Cassia  
Cathartica.**Vires.*

suntque qui affirmant eum à renum calculis, à ventriculi doloribus & apostematibus prorsus liberum fore, qui quotidie ante prandium tres pulpæ Cassiæ drachmas deuorauerit. Exterius illita erysipelata extinguit, cæterasque inflammationes quæ in cutem emergunt. Si viscera sunt sicciore, Cassiæ lubricitas augenda est oleo Amygdalarum dulcium: si debilia & lubrica sint, minuenda Myrobalanis vel Rhabarbaro, vel aqua cum Mastiche cocta, vel Spica addita. Si ad vias vrinarias ferri eam volumus, vrinæ enim difficultati mirificè auxiliatur, vretica misceantur. Sine tardius, aut imbecillius purget, veremur, acre aliquod, quale thymum, Hyssopum, actionem eius intendens misceatur, aut potius aliquot medicamentorum valenter purgantium. Efficacius autem purgat, si ex ferro lactis propinetur. Tam est benignum & innoxium hoc medicamentum, vt omni ætati, ipsis etiam pueris, & prægnantibus tutò sumatur. Salubre est sanis & ægris ad aluum clementer leniendam. Quouis tempore tutò sumitur, etiam initio epularum, aut paulo ante cœnam. Datur hodie pulpa Cassiæ cortice, membranis, & seminibus per cribrum purgata (recens enim sumenda potius, quam vasis asseruata) ab vncia dimidia ad fescunciam, vel drachmas decem, mane, vel ante cœnam. Sed paulo ante cibum duabus tribusue horis, etiam drach. duabus, tribus, quatuor datur his quibus est aluus natura pigrior. In quem vsus quibusdam iucundius est pulpam lata cultelli cuspide exceptam deuorare. Saccharo conditur recens ab indigenis ad eosdem vsus, quam primum ostenderunt Veneti, & Lusitani, nunc etiam in Galliam sic condita aduehitur. Quam autem vim purgatoriam tribuit Manardus semini ipsius, maiorem scilicet, quam pulpæ ipsi, non recipiendum confirmat Musa, suo multiplici experimento. Quod præterea nonnulli Medici existimant huius Cassiæ corticem ad menses mouendos, ad partum iuuandum, ad remorantes secundas aliquid valere, absurdissimum est, cum de Cassiæ aromaticæ siue odoratæ corticibus id sit accipiendum.

STYRAX



## STYRAX.

## CAP. XLII.

**V**T Græcè *Σύραξ*, ita etiam Latine Styra<sup>x</sup> dicitur, Arabicè *Miha*, *Nomina*  
*Mehaha*, seu *Astarach*, Italicè *Stirace*, Hispanicè *Estoraque* Officinis  
 Storax calamita. Styra<sup>x</sup> arbor est proceritate ac forma Malo Coto-  
 neæ similis, folia tamen longe minora profert, auersa parte albicā-  
 tia, solida, oblonga, sed paulo latiore ambitu. Flos illi est albus Aureæ Mali si-  
 milis. Baccas edit longo pediculo appensas, tenui quadam lanugine obductas,

Forma.

## STYRAX.



rotundas, in acutum definētes, Nucis fere Pō-  
 ticæ magnitudine, in quibus aliquot conclu-  
 duntur ossicula semen continentia. Ab hac  
 manat liquor seu lacryma eiusdem nominis.

Li. 12. c. 25.

Arbor est eodem nomine Cotoneæ Malo si-  
 milis inquit Plinius, succo prægnans lacrymæ  
 exaustero, vel ut quidam legunt, dulcioris iu-  
 cundioris: intus similitudo harūdinis: In hanc  
 circa carnis ortum aduolāt pennati vermicu-  
 li, erodentes: ob id scobe sordescit. Reperiun-  
 tur arbores huiusmodi in Italia, non solum in  
 hortis, ac viridariis, sed etiam sponte proue-  
 nientes in Romano & Tiburtino agro. Viret  
 & sylua iis arboribus, nō procul ab eo religio-  
 so templo quod incolæ vocant *les Maries*, in  
 Prouincia Romana Galliæ, verum gummi  
 non emittunt. Proxima Iudææ Syria, inquit  
 Plinius, Styracem gignit, circa Gabala & Ma-  
 rathunta, & Casium Seleuciæ mōtem: Et mox:  
 Styra<sup>x</sup> laudatur post supradicta ex Pisidia, Si-  
 done, Cypro, Cilicia, Creta, minimè ex Ama-  
 no Syriæ medicis, sed vnguentariis magis.

Locus.

Lib. 12. c. 25.

Exit & in Pamphylia, sed aridior vel, ut quidam legunt, acrior, minúsque suc-  
 cosus. Styra<sup>x</sup> auctore Dioscor. præfertur pinguis, flauus, resinofus, albicantibus  
 grumis, quamplurimum in sua odoris gratia permanens, qui dum molli-  
 tur, melleum liquorem reddit, qualis è Catabalis, Pisidia, & Cilicia deuehitur. Sed  
 non omittendum pleraque exemplaria habere pro *λιπαρὸς*, idest pinguis *ῥυπαρὸς*,  
 idest sordidus, quam lectionem secutus est Ruellius. Verum nostræ scripturæ  
 suffragatur Plinius, qui pinguius lentum probat. Colos, ait, in quacunque na-  
 tione præfertur rufus, & pinguius lentus. Et Idem alibi: Placet maximè pinguis  
 purus, albicantibus fragmētis. Apud Aetium sæpe *ξανθὸς καὶ λιπαρὸς* probatur. Hæc  
 etiam verba, *τοῖς τοῖς ὅ ἐστιν ὁ γαβαλιτῆς*, idest, talis autem est Catabalites, Oriba-  
 sius legit, *τοῖς τοῖς ὅ ἐστιν ὁ γαβαλιτῆς*, talis autem est Gabalites, quam lectionem  
 Marcel. approbat, subscribente Plinio, qui Styracem circa Gabala & Marathun-  
 ta gigni tradidit. Sed multum non refert, an Catabalites, an Gabalites rectiùs  
 appelletur: natales enim Styra<sup>x</sup>is loci multi sunt. Deterior Styra<sup>x</sup> niger, furfu-  
 rosus, friabilis, canóque situ obductus, quæ verba canóque situ obductus, quo-  
 niam in Græcis exemplaribus non leguntur, ea Cornarius in sua translatione  
 omisit, sed à Ruellio adiecta sunt ex Plinio, qui sic scripsit. Deterior furfurosus,  
 & cano situ obductus. Caterum lacryma, inquit Dioscor. inuenitur gummi si-  
 militudine, perlucida, & Myrrhæ amula (siue id colore, siue odore sit intelligē-  
 dum:) verum perpauca manat. Græci probatique auctores vnū tantum Styra-  
 cem agnoscunt. Seplassiæ hunc in siccum & liquidum distinguunt, cum Styra<sup>x</sup>,

Lib. 1. c. 63.

Ibidem.

Li. 24. ca. 6.

Li. 12. ca. 25.



- officinarum liquidus Myrrha Staete sit multorum iudicio, nec Styra<sup>x</sup> appellari debeat. Siccus iisdem Seplasiis Storax Calamita dicitur, quæ appellatio ex Gale-  
no sumpta videtur, quo loco paucissimum & optimum Styracem Calamiten  
esse indicavit, & tanto præstantiorem multo alio Styrace, quanto præstantius  
est vinum falernum, eo quod in cauponis venditur, eumque in calamis ex  
Pamphylia adferri, vnde Calamitæ nomen. Addit ex hoc sumendum esse pal-  
lidissimum, vt qui & odore, & sapore validissimus sit. Porro videtur is esse  
Sty<sup>ra</sup>x, quem Dioscorid. Gummi similem, & paucum nasci scripsit. Itaque  
cum nullus sit Styra<sup>x</sup> hoc præstantior, consueuerunt medici medicamēta præ-  
scribentes, quæ Styracem recipiunt, Calamitæ cognomen adiungere, vt in-  
telligant pharmacopœi optimum atque præstantissimum Styracem requiri.  
Manardus etiam eadem appellationis ratione ductus, hæc Dioscorid. quæ in  
vulgatis exemplaribus leguntur, τοῖς τοῖς ὅ ἐστιν ὁ χαλαβλίτης, legenda esse censet,  
τοῖς τοῖς ὅ ἐστιν ὁ χαλαμίτης, idest, talis est Calamites: sed Gabalites legi oportere  
iam docuimus. Præterea Fuch<sup>s</sup>. Styracem Calamiten liquidum fuisse existi-  
mat, non alia ratione fortasse fretus, quàm quod in Calamis afferretur. At  
Sty<sup>ra</sup>x Dioscorid. lacryma est arboris, præstatque ille cæteris qui flauus est,  
resinosus, grumósque habet albicantes, & dum mollitur, melleam humidi-  
tatem reddit. Ex quibus constat Styracem hunc liquidum non fuisse, sed in  
grumos concretum: quin si Galeni tempore in calamis adferretur: id est, ha-  
rundinum foliis obuolutus, non hinc effici necesse est liquidum fuisse. Ne-  
que enim aliam ob causam, opinor, Styracem calamis obtegebant, siue pro  
emporeticis inuolucris essent, ac Stægestribus harundinis sola folia complica-  
ta, & aduoluta, siue ex iis foliis textæ sportæ, quàm vt eius odor conseruaretur,  
id quod in Creta factum fuisse ab iis qui Pictamnum legebant, testis est  
Theophrast. ne vis eius expiraret. Adhæc veteres Græcos nullam liquidi Sty-  
racis mentionem fecisse paulo ante diximus. Verùm Calamitæ Styracis appel-  
latio Plinium mouit imprudentem, vt harundinis similitudinem intus quã-  
dam esse traderet, quæ nulla prorsus intelligi potest. Idem Scolecitis nomine  
deceptus, vermiculis similis, fabulam finxit de pennatis vermiculis circa Canis  
ortum aduolantibus, & erodentibus. Strabo in Selga Pisidiæ vrbe, plurimum  
Styracem nasci tradit, arborem non magnam, rectam, ex qua hastæ Styracinæ  
Corneis similes fiunt. Idem etiam liquoris meminit, qui ex ea destillat, ac faci-  
lè coagulatur, Succino similis. Styra<sup>x</sup> adulteratur, Plinio Cedri Resina, vel Gum-  
mi: aliàs melle, & Amygdalis amaris, quæ omnia deprehenduntur gustu: Dio-  
scoridi verò ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserunt, melle Irini  
sedimento, & quibusdam aliis. Ceram aut adipem odoribus imbutum alij fla-  
grantissimis solibus cum Styrace subigunt, & per laxa cribri foramina in frigi-  
dam aquam transmittentes, veluti vermiculos exprimunt, venundantque. Sty-  
racem hunc, quoniam in vermiculorum speciem contrahitur, Scolecitem  
etiam cognominant, quem tanquam sincerum imperiti approbant, non ani-  
maduertentes ad præcipuam odoris fragrantiam. Siquidem acer admodum  
est odore, qui adulterationis vitio caret. Styracis vires Dioscorides fusius ex-  
ponit his verbis. Styra<sup>x</sup> calfacit, emollit, concoquit: medetur tussi, destilla-  
tionibus, raucedini, grauedini, & interceptæ voci: vuluæ præclusæ, duri-  
tiæ laboranti conuenit: Ciet menses potu, appositūque: aluum leuiter mol-  
lit, si exiguum cum Resina Terebinthina catapotij modo deuoretur. Miscetur  
vtiliter discutientibus Malagmatis Acopisque. Vritur autem, & igni torretur,  
vt fiat ex eo, veluti ex Thure fuligo, ad eadem conueniens ad quæ Thuris fuli-  
go. Græcè sic ea leguntur, χαλῆαι ὅ καὶ ὀπταῖαι, καὶ φάσφαλαι, καὶ ἀθαλῆσαι, non,  
θαλῆσαι.




*Styracis*: Idest, vritur, assatur, torretur, ac fuligo ex ipso fit, &c. Ex eo etiam in Syria Styracinum oleum componitur, quod calefacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, grauâtque, & soporem affert. Eadem de Styra-  
ce Plinius prodidit. Sed præter ista, Inuenio, inquit, potu modico tristitiam  
animi resolui, largiore contrahi. Sonitus aurium emendat infusum: strumas  
illitum, neruorumque nodos. Aduersatur venenis quæ frigore nocent ideo  
& Citutæ. Styrax Galeno excalfacit, emollit, concoquit: quamobrem tus-  
sibus, catharris, pituitæ destillationibus, raucedinibusque prodest. Tum men-  
ses potus, seu admotus, deiicit. Combusti eius fuligo, Thuris fuligini quo-  
dammodo similis est. Oleum ex Stryace sic parandum esse docet Mat-  
thio. Styrax biduo aqua Rosarum maceratus, in vitreum vas luto  
oblitum, vna cum aqua immittitur, quod altero vase su-  
perimposito in furno collocatur, igne accenso mo-  
deratiore, donec aqua tota, in vas aliud exci-  
piens destillauerit. Cû verò oleum fluere  
cæperit, validiore igne opus est, donec  
totum efluxerit. Valet hoc oleum,  
non solum ad odoramenta, sed  
etiam ad ea omnia: ad quæ  
Styrax: est tamen illo  
valentius.

Lib. 14. c. 6.

Lib. 8. sum.

Lib. 1. Dios.  
cap. 68.







# HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER SECVNDVS,

*Quo describuntur, atque picta ostenduntur frutices in  
Dumetis & Frutetis sponte nascentes.*

RUBVS CAP. I.



Quoniam post nemora & maiores silvas, praesertim circa montes, dum fruticesque saepius occurrunt plerumque sabuloso & arido solo, nonnunquam vdo vliginosoque, idcirco silva nostra dumetum frutetumque subnectimus. Ut Dumetum (sive, quemadmodum antiqui dicebant auctore Festo, Dumeetum, quasi Dumicetum) locus est dumis, id est spinis cuiusvis generis, quae etiam penes omnes fruticant, obsitus, sive agros pratens sepibus muniant, sive non sic frutetum soli tractus est in quo frutices, aut Plantae fruticantes sua sponte pro-

RUBVS.



ueniunt, nihilque aliud praeter dumos ferè ac frutices nascitur. A Rubo, quod vulgaris sit notitiæ, faciam exordium. Huius genera tria sunt Theophr. βάτος, χαμαίβάτος κρυόβάτος: Plinio totidè, sed non eadè omnia. Rubi mora ferunt, inquit & alio genere similitudinè Rose, qui vocatur Cynosbatus. Tertiū genus Ideū vocant Græci à loco. Nobis quinque: βάτος, Chamabatos, Rubus, Ideus spinosus, Rubus Idæus non spinosus, Cynosbatus: βάτος, Rubus magnus, & Sentis Latinis dicitur, Arabibus Buleich, sive Haleicho, Gallis Ronce, à runcatione, quæ dumorum tantum est, Italis Rouo, Germanis Bromber Bremen, & Bramen, Anglis Bramble bulhe. Hispanis Carca. In dumetis, silvis, sepibus & agrorum limitibus cum aliis spinosis profilit, radice nodosa, virgis multis, subrectis quidem sed quæ tandem gracilitate proceritateque nimia, nisi à vicinis fuleantur, curuata defixis in terram capitibus radicatur. Id enim de Rubis omnibus verè dixit Plinius, Theophrastus de humili Rubo duntaxat. Rubi, inquit, curuati gracilitate, & simul proceritate nimia defigunt rursus in terrā capita, iterumque nascun-

Genera

Rubi.

Lib. 3. Hist.

cap. 18.

Li. 16. ca. 37.

Nomina

Sca. libr. 3.

caus. ca. 28.

Locus.

Forma.

Li. 17. ca. 12.

Lib. 3. Hist.

cap. 18.

tur



tur ex sese, repleturi omnia, ni resistat cultura, prorsus vt videri possint homines terræ caula geniti. Ita pessima atque execranda res propaginem tamen docuit, ac viuiradicem. Theophrastus verò, ὅταν συνάπῃ τῇ γῇ ριζομένους πάλιν, ὃν καλεῖται σχυμίσβαλον. Cum se terræ coniunxerit, rursus radicator, quam Chamæbaton vocant. Virgæ spinis aduncis & pungentibus aculeis vestiuntur, quibus prætereuntium vestibus sese affigunt, eosque remorantur: folium incisuris diuisum est, asperum, dorso aculeato, inferiore parte candicans, superiore nigricans, hyemē vix decidens, nisi alterum succrescat: flos stellatus, ex candido Roseus: fructus cum maturuit, niger, gustu dulcis, pauxillulum amarus, Moro persimilis, multò minor, cui succus sanguineus inest, veluti cruore atro manus inficiens.

Li. 6. med.  
part. c. 1. &  
Li. 2. alim.

In com. li.  
6. m. p. c. 1.

Lib. 15. c. 24.

In com. lib.  
6. m. p. c. 1.  
Li. 16. c. 37.  
Li. 1. Metā.

Tempus.  
Lib. 4. c. 33.

Vires.

Lacuna in  
Dioscor.

Lib. 6. sim.

Hæc Rubi mora βάτινα appellari scripsit Gale. quæ quidam Latini in Vaticanâ corruerunt, sicut μόρα, & συχμίνα vera Mora, appellationibus à plantis deductis quæ sunt βάτος, μόρεα arbor, & συχμινέα. Sed quum locus vnus Gale. de hac re sit corruptus, cum sic restituit Cornarius. τὸν τῶν βάτων καρπὸν ὀνομάζουσιν οἱ παρ' ἡμῶν ἄνθρωποι βάτινοι, καὶ ὁμοίως μόρα τε καὶ συχμίνα τὸν τῆς μόρεας καὶ συχμινέας. Quæ verba τὸν τῆς μόρεας καὶ συχμινέας in vulgatis exemplaribus Græcis desunt, vt ex præcedentibus nullus sensus erui possit. Vult enim, vt diximus, Batina à Bato dici, sicut Mora à Morea, & Sycamina à Sycaminea, Latine Mora Rubi nominantur. Plinius, Mora nascuntur & in Rubis, multum differente callo. Quamquam in publicis exemplaribus, Romæ nascuntur & in Rubis, & c. leui, tamen à nemine animaduerso errore legitur, inquit Cornarius. Non enim Romæ, sed vbi que Mora in Rubis nascuntur. Id quod repetit idē Plin. alibi, Rubi mora ferunt & c. Ouidius.

*Cornaque & in duris harentia Mora rubetis.*

Folia Rubi vere, flores æstatis initio colliguntur: fructus cum maturuit, per messes, & extrema æstate decerpitur. Rubus auctore Dioscoride vim habet siccandi & adstringendi: capillum tingit. Ramorum decoctum potu aluum sistit, & sceminarum profluua, præsteris morsui accommodatissimum. Gingiuas firmanant, & oris vitiis medentur folia commanducata: cohibent vlcera quæ serpūt vlceribus in capite manantibus, oculisque procidentibus remedio sunt: condylomatis & hæmorrhoidibus folia illinuntur: cardiacis & stomachi doloribus trita conuenientissimè imponuntur. Caules cum foliis tunduntur, exprimiturque succus, mox sole cogitur, singulari remedio contra omnia quæ modò dicta sunt. Mori in Rubo nascentis quàm optimè maturi succus ad oris medicamenta conuenit. Sistitur aluus præmaturi cibo, nec non flore in vino potio. Sed quod Ruellius interpres habet, singulari remedio contra omnia quæ modò dicta sunt, Græcè legitur, βέλδιον ποιεῖ εἰς πάλιν τὰ ἐρημμένα, est remedium ad omnia dicta præstantius: itè sistitur aluus præmaturi cibo, Græcè est, ἵς ἡσι ὁ κοιλίαν ἐσθιόμενος ὁ μέσος πέπερος: quod est, Rubi fructus in medio consistens maturitatis aluum supprimit: vel, vt vertit Cornarius, fructus is, si in media edatur maturitate, aluum sistit. Galeno Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente pollent, eaque non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia mollia & recens nata plurimum in se habent substantiæ aqueæ, parum verò adstrictionis: eadem ratione & germina. Itaque si mandantur, aphthas, & alia oris vlcera sanant. Quin & alia vulnera glutinare possunt. Est enim eorum temperies ex terrea frigida essentia, & aquea tepida. At fructus, si quidem maturus fuerit, nō parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est. Itaque ob hoc, & ob modicam adstrictionem esui non insuauis est. At immaturus frigidam terreamque substantiam vincetrem habet, & proinde acerbus est, ac valde exsiccatorius. Sane uterque reconditus, validius quàm recens desiccatur. Sed & flos eandem vim quàm fructus immaturus possidet. Vtraque ad dysenterias, & ventris profluuium, roburque



burque exolutum, & sanguinis sputum idonea remedia. Porro radix præter adstrictionem non paucam habet substantiam in sese tenuem; per quam & lapides renum comminuit. Idem alibi scribit Batina magis quam môra adstringere, & si quis largius iis vescatur, capitis dolorem sentire. Proinde fructum hunc abluamus oportet, priusquam ipsum comedamus, qui tamen ventrem non subducunt, sed potius cohibet. At si quis immatura ipsa prius siccata reposuerit, multo etiam magis cohibebunt. Omnia certe medicamenta quæ ex Mororum succo parantur, si facta ex his quoque fuerint, facultatem habebunt efficaciorẽ, Quare ex succo Mororum Rubi, itidem ut ex succo Mororum arboris stomaticum medicamentum fit. Nec Rubos, inquit Plinius, ad maleficia tantum genuit natura, ideoque ex eis Mora vel hominibus cibos dedit. Vim habent siccandi, adstringendique, gingiuis, tonsillis, genitalibus accommodatissimi. Aduersantur serpentium sceleratissimis Hæmorrhoidi, & Presteri flos, aut Mora. Reliqua idem fusius persecutus quæ Dioscorides tradit, ad Stomaticem deinceps compositionem progrediens, ait. Mora quæ in his nascuntur, vel efficaciorẽ Stomaticen præbuerint, quam satiuæ Morus. Cum eadem compositione, vel cum Hypocistidetantum, & melle bibuntur in cholera, & à cardiacis, & contra araneos. Inter medicamenta quæ Styptica vocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice, decocta cum vino ad tertias partes, ut colluantur eo oris ulcera, & sedis foucantur: tanta quidem eius vis est, ut spongiæ ipsæ lapidescant. Alterum Rubi genus Chamæbatos dicitur, idest humilis Rubus, humirubum interpretatur Gaza. Ripis fluuiorum humectis, macriis, incultisque agris gaudet. Eum intellexisse mihi videtur ideo Theophrastus, cum scripsit βαλλον ἐν ὕδατι, aut πρὸς ὕδατι, ut & Paliurum, esse. Is longe latèque diffunditur, humi serpentibus tenuissimis & aculeatis flagellis, nunquam sese attollens, sed protinus deorsum vergens, minor reptansque: radice, flore, folio priori similibus, fructu dissimili: quoniam cum maturus fuerit, cæsius est, non ut superioris niger, minor, minusque succulentus, gustus dulcedine fere eadem qua Mori arboris fructus. Aliud genus est Rubi in quo Rosa nascitur, inquit Plinius, Dioscoridis κινὸς βαλός, qui in sepibus cum Rubis aliis gignitur. Latine Rubus caninus is appellatur, aut Canirubus, Arabicè *Sent*, Italicè *Romo canino*. Fruticem eum esse putant nonnulli quem Galli *Englantier*, & *Eglantier* vocant, id quod notæ à Dioscoride posite testantur. Nam frutex est Rubo grandi maior, & firmitior, ut qui arboris instar assurgens rectus stet, nec ob imbecilitatem Rubi modo in terram flectatur. Folia fert Myrti, sed latiora, robustas circa ramos spinas, qua de causa Ruborum potius, quam Rosarum generibus comprehendimus. Florem ædit sæpius candidum, interdum ex candido subrubentem, odoris iucundissimi: fructum oblongum, nucleo oliuæ similem, qui per maturitatem fuluescit, & floccos intus continet. Fructus is exemptis interioribus floccis (nam hi arteriam lædunt) siccatus, & in vino feruefactus, ac potus, aluum sistit: quæ postrema Ruellius mendosos codices secutus sic vertit, fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruefacti enim in vino mox poti arteriam infestant. Integer autem codex habet ἡ γὰρ ἡ κοιλία ὁ κενὸς τῆς διχῆς ἐν αὐτῇ (ἐπὶ αὐτῇς καὶ αὐτῶν γὰρ τῆς ἀσπλίας τὸ αὐτὸ) ἀποζενόμενος ἐν δυνάμει καὶ πικρῶν. Recte sic Corn. hæc expressit. Fructus siccatus, inquit, sistit aluum absque interno illo lanuginoso, hoc enim arteriam lædit, si in vino, feruefactus bibatur. Addo Dioscor. histor. non Cynosbati florem solum, sed etiam folia, si digitis terantur, suauiter olere. Serapio histor. Dioscorid. quam transcripsit, adicit radicem fructu calidiorem esse: rusam & in emplastro admotam, spinas & infixas corpori extrahere: folia quoque trita & imposita phlegmonas impedire, ac prohibere:

Li. 2. Alim.

Lib. 6. m. p.  
cap. 1.  
Li. 24. c. 13.2. Genus.  
Nomina  
Locus.  
Lib. 4. Hist.  
ca. 13.  
Forma.3. Genus.  
Locus.  
Li. 4. c. 11.  
Nomina  
Li. 1. c. 106.  
Forma.Laq. in  
Dioscori.  
Embl. 102.  
li. 1. Diosc.



quæ cum in nostris Dioscoridis exemplaribus desiderantur, non sine ratione ea manca hic esse suspicari licet. In hac Dioscoridis historia cum nihil sit quod non sententiæ herbariorum de hac planta adstipuletur, dubitant tamen adhuc de ea re quidam. Dodonæus scribit Album spinam videri Cynosbaton Theophrasti. Tragus eam pro Cynosbato depinxit, ac descripsit. Alij apertè refragantur, imprimis doctissimus Matthiolus. Nam si Cynosbatos esset aliquod sylvestrium Rosarum genus, inquit, sat erat Dioscoridem dixisse Canis rubum Rosæ similem esse, non autem arboris instar assurgere, Rubo longe maiorem. Præterea Rosæ sylvestris folia à Myrto plurimum dissident. Eius etiam fructus nō modo Oliuarū nucleis, sed oliuis ipsis crassior est. Adhuc Plinius Rosam sylvestrem peculiari nomine Cynorrhodon appellat, non Cynosbaton. Præterea Cynorrhodon veteribus nihil aliud fuisse quàm spongiolam illam quæ mediis Rosarum sylvestrium ramis oboritur: idem scribit. Cū verò de Cynosbato tractat, à Rosa sylvestri longè diuersum facit, nempe folium habere vestigio hominis simile, & quod omisit Matthiolus, ferre vnam nigram, in cuius acino neruum habet, vnde Neurospastos dicitur. Iam verò Theophrastus Cynosbaton tradit Malo Punicæ similem esse, & ei fructum similem edere, folium verò Viti: quibus omnibus respondent alterius sententiæ auctores, hoc primum quod Matthiolus vehementer probat, & aduersus Marcellum contendit, Cynosbaton à Cynorrhodo siue Rosa sylvestri differre caulii robore, proceritate, crassitudine, aculeorum multitudine, & rigiditate, folio iucundi odoris, inquit Plinius, sed angusti, nec latè sese diffudentis, quod in Rosa sylvestri prorsus odoris est expers, in acutum desinente, cum Rosæ sylvestris folium summa parte latiusculum sit, & maioribus incisuris diuisum, quæ cum tantopere inter se diffideant, Cynosbaton neque cum Rosa sylvestri, neque cum satiuā à Dioscoride conferri oportuit. Nullo verò pacto aduersatur Plinij auctoritas Rosam sylvestrem Cynorrhodon, non Cynosbaton appellantis, qui etiam non scribit veteribus Cynorrhodon nihil aliud fuisse, quàm spongiolam illam quæ mediis sylvestrium Rosarum ramis oboritur, ut ait Matthiolus, sed Cynorrhodi medicinam vnam fuisse, spongiolæ quæ in mediis spinis eius nascitur, cinere, cum melle, alopecias capitis expleri. Perspicere verò ex hac historia licet Cynosbati folium Myrto, præsertim sylvestri, simillimum esse, verum latius, in ambitu ferratum, paulo minùs acuminatum. Eiusdem fructum nucleo oliuæ ἰσνότα, ut scribit Dioscor. idest similem, non ἴσον, idest magnitudine parem: quanquam nec eius magnitudo ea sit, ut oliuas superet Hispanicas, aut Narbonenses. Quod autem in Theophrast. legitur de Cynosbato, δένδρου εἶναι καὶ θάμνιν μεταξὺ καὶ παρόμοιον τοῖς ῥόζις mendosum est, scribendum enim παρόμοιον τῇ ῥόδῳ. Sic enim Plinius hæc reddidit: Rubi Mora ferunt, & alio genere similitudinem Rosæ, qui vocatur Cynosbatos. Ex quibus reliqua in eodem Theophr. per facile est emendare, κυνδοσβατον τὸν καρπὸν ὑπέρυθρον ἔχειν, καὶ παραπλήσιον τῷ τῆς ῥόδου. Idest Cynosbaton fructum habere subrubrum, similem Rosæ, non τῆς ῥόδου, ut in exemplaribus nostris habetur: Et, τὸ δὲ φύλλον, non ἀγνώδες, sed ἰχνῶδες, ut legit Plinius, folium hominis vestigio simile interpretatus. Hominis enim vestigium si cōsideres, principio nonnihil latum, medio latius, in angustum & acutum summo cacumine desinit, quale à calceatis arenæ lutove imprimitur, tali præsertim calceo, qualem veteribus in vſu fuisse ex antiquis statuis apparet. Ea figura imaginem foliorum Cynosbati representat. At quod scribit Plinius Cynosbaton vnam nigram ferre, Cynosbaton sane, id quod in plerisque facit, cum Chamæbato cōfundit, improprièque eius fructum vnam, non Morum appellat, quanquā inter vux & Mori figuram parū inter sit. Hoc inde cognosci potest, quod ex Theophr.



tria Rubi genera eo loco enumerare velle videatur. Cum enim de Rubo gradio-  
re dixisset, subdit, Alterum Rubi genus est in quo Rosa nascitur: Chamæbati  
vero tertij scilicet generis nulla mentio, nisi ea quæ modo dixi ad eum referā-  
tur, cui sententiæ subscribit vetusti exemplaris auctoritas, in quo legitur, fert  
& uam nigram Chamæbatos, in cuius Acino, &c. Tam in Cynosbato quam  
in Cynorrhodo excrementum quoddam gignitur globosum, hirsutum, tactu  
asperum, quod in Cynosbato pilulam Castaneæ similem Plinius appellat, præ-  
cipuo remedio calculosis, in Cynorrhodo Spongiolam. Cynosbati meminit  
Galen. his verbis. Huius fructus haud segniter adstringit, folia verò mediocri-  
ter. Itaque particularis eius vsus haud ignotus est. Cauendum ab eius fructu qui  
veluti lanam inclusam habet, arteriæ infestam. ac rursus: fructus Canirubi  
multo magis quam Ruborum adstringit, ob eamque causam ventrem magis  
cohibet. Vescuntur autem ipso frequenter rustici, exiguum alimentum corpo-  
ri suppeditante. De Cynosbato quidem satis diximus: iam de Rubo Idæo spino-  
so, & non spinoso differamus. Rubus Idæus appellatus est, non, ut Plinius exi-  
stimauit, quod in Ida non alias nascatur, sed quod copiosius in Ida proueniat  
Dioscoride auctore. Et certe Theophrastus Idæ peculiare arbores recensens,  
inter eas Rubum Idæum non numerat. Eum fruticem herbariorum maior pars  
esse censet, quem Galli *Framboises*, vocant, quasi fragariam ligneam aut siluo-  
sam. Germani *Hymbeccem*, ut propemodum id

Lib. 24. c. 13.

Li. 25. ca. 2.

Lib. 7. sim.

*Vires.*

Li. 2. alim.

4 Gen. Ru.

*Nomina*

Li. 24. c. 14.

Lib. 3. Hist.

cap. 17.

*Forma.*

Lib. 4. c. 34.

Li. 16. ca. 37.

*Tempus.*

*Vires.*

Ibidem.

Li. 16. ca. 37.

Li. 24. c. 14.

5. Gen.

*Locus.*

*Forma.*

RUBUS IDÆUS

spinosus.



Ida, non alias nascitur. Est autem tenerior ac minor, rarioribus hamis (non  
calamis, ut in vulgatis codicibus scriptum est) innocentioribusque, sub arborū  
umbra nascens. Huius flos cum melle epiphoris illinitur, & ignibus sacris, sto-  
machicis (non stomaticis) ex aqua bibendus datur. Cætera eadem præstat  
quæ supradicta. Rubus Idæus non spinosus non æque omnibus notus est. Gi-  
gnitur frequens in Allobrogum monte Gratianopoli vicino, quem vocant *la*  
*Motte*, caulibus multis sesquipedalibus, ut Idæus Chamæbatos iure nominari



*RVBVS Ideus, non spinosus.*  
*Chamæbatos Tragi.*

Lib. 3. a. 11.

Lib. 24. c. 4.

*Nomina*


*Genera.*



stris, aut sativa. Sylvestris species multæ, quæ in silvis, dumetis, sepibus vna cū Rubis, & sentibus aliis proveniunt. Satiarum species plures, quæ tum quod

### ROSA.

Lib. 6. Hist.  
cap. 6.



Lib. 21. c. 4.

plura sunt genera, locorum colorumque varietate distincta. Genera, inquit, nostri fecere celeberrima Prenestina, & Cāpana: addidit alij Milesiam, cuius sit ardentissimus color, nō excedens duodena folia. Proximam ei Trachyniam, minū

possit, foliosis, sine spinis vllis: folio Rubo Idæo simili, aversa parte candido, & lanuginoso: fructu rubro, sed non vt in superiore rotundo, & dulci, verū ex granis sic coagmentato, vt in metæ modum fastigietur, acido sapore, etiam cum maturuit, Fragi magnitudine. Incolæ vocant *Des Asnes*, & ab Idæi rubi fructu probè distingunt, quem vt suprà diximus vocant *Des Ampes*. Tragus Chamæbati speciem esse existimat, nec malè Rubo Idæo coniungi, & in hortos translatum in Rubum Idæum mutari, omniæque quæ de Rubo dicta sunt, huic frutici rectè attribui posse scribit.

### ROSÆ CAP. II.

**R**OSA fruticosi spinosique generis est, imo nascitur spina verius quàm frutice, inquit Plinius. Græcis *ῥόδον* dicitur quod largum odoris effluuium emittat, Plutarcho auctore, Arabibus *Nard*, *Naron*, seu *Vard*, Italis *Rosa*, Germanis *Rosen*, Hispanis *Rosas*, Gallis *Rose*, Boemis *Ruoz*. Ea est aut sylvestris, aut sativa. Sylvestris species multæ, quæ in silvis, dumetis, sepibus vna cū Rubis, & sentibus aliis proveniunt. Satiarum species plures, quæ tum quod ex sylvestribus in hortos translata, atque educata cultu & arte mites factæ sunt, tum quod cum sylvestribus magna cognatione coniunctæ sunt, hîc simul cum sylvestribus explicabuntur. Quanquam de iis libro de floribus, inter quos principatum obtinent, & quarū vsus in coronis prope nimius est, tractare consentaneum foret. Rosarum differentias Theophrastus declarat his verbis. Rosarum differentia multæ ex foliorum multitudine, paucitate, asperitate, laeuore, colore, odore. Multis enim quina in flore 5 folia sunt, quibusdam duodena, ac vicena, aliis numerosiora, cū sint quas ceterifolias vocent, cuiusmodi plurimæ circa Philippos proveniunt, quas ex Pangæo transferentes conserunt: illic enim multæ sunt: folia interna (in harum flore) parua sunt admodum: ita enim exoriuntur, vt alia intus, alia extra sint: iucundi odoris non sunt, nec amplæ magnitudinis. Odoratiores inter amplas, quibus pars inferior scabra. Sylvestres autem Rosæ asperioribus sunt, tum virgis, tum foliis flore minū colorato, minū odorato, & minore. Plinio



minùs rubentem: mox Alabandicam, viliorem, albicantibus foliis. Vilissimam verò (vel vt alij legunt vtilissimam) plurimis, sed minutissimis, Spineolam. Est & genus eius quam centifoliam vocant. Est & quæ Græca appellatur à nostris, à Græcis Lychnis, non nisi in humidis locis proueniens, nec vnquam excedēs quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Est & alia Græcula appellata, conuolutis foliorum paniculis, nec dehiscens nisi manu coacta, semperque nascenti similis, latissimis foliis. Alia funditur è caule maluaceo, folia oleæ habente, Moscheuton vocant: atque inter has media magnitudine Autumnalis, quam Coroneolam vocant. Omnes sine odore præter Coroneolam & in Rubo natam. Rosas Campanas, Rosas nostras albas esse existimo, quæ nobis omniū vilissimæ sunt, demptis Damascenis, quædam foliis densissimis, vt antiquis Alabandicæ, Spineolæ fuisse arbitror, quæ à spinis dictæ, & Centifoliæ: Rosas vero Prenestinas, rubras & in iis Milesias, quas Galli *Roses de Prouins* appellant: trachinias; minùs rubentes quas *Roses incarnates*. Græca rubra etiam est, vt ego equidem sentio, quamuis Plinius colorem non exprefferit, eaque, multorum sententia, quæ Damascena rubra nominatur, *Rose de Damas rouge*. Græcula multorum etiam iudicio, Rosæ Damascenæ genus est, flore ex albo ad puniceum nonnihil vergente, *Rose de Damas incarnate*. Moscheutos quæ sit ambigitur. Sunt qui inter Damascenas, numerant, alij inter Rosas syluestres passim nascētes in dumis. Damascenarum cortex maluacei corticis modo latius quidem viret quàm cæterarum, sed quæ foliis sit Oleæ nullam adhuc comperi quanquam in quibusdā exemplaribus folia læuia leguntur, non Oleæ. Ceterū Moscheuton Rosam dictā putat Dalechampius, nō quòd Moschū oleat antiquis incognitū, sed quod *μύχους*, idest stolonibus multis fruticet, vel quod *μύχους*, idest malleolis

## ROSA Damascena.



feliciter pangatur Vitæ modo, nō solūm viuiradice: Rosam Coroneolā à coronis nominatā, siue seram, siue autūnalē, Damascenam esse ferè omnes autumant, tum quòd autūno proueniat, tū q̄ odore suauī prædita sit. Galli *Rose Musquee*, & *Muscadelle* vocāt, Itali *Rosa Moschetta*. Anglis, Germanis & Belgis *Rosanbau*. Ea duplex est: vna enim quinq; tantū foliis: Altera densa foliorum congerie constat, quod olitorū arte & mangonio factū putant. Vtraq; eximia odoris suauitate delectat. His addenda Rosa lutea, veteribus indicata. Cynorrhodon vniuersē quidem Rosam omnē syluestrem Plinius appellat, vt supra annotauimus. Huius generā duo obseruarunt herbarij, syluestre Rosam vulgarem, quæ passim in dumetis reperitur, & Cynorrhodon Polyacāthon, forma Rosæ satiuæ. Rosā radice est ramosa, & lignosa, virgas emittit longas, lignosas, multis in locis aculeis curuis plenas: folia longiuscula, incisuris diuisa, nigricantia, aspera. Inter hæc ex longo satis pediculo emergit qui calix dicitur, ipsum ambientibus

Nomina

quinq; foliolis viridibus, duobus vtraq; parte barbarulis, duobus minimè, quinto vna duntaxat parte. Hæc foliola corticēs Rosarū nominātur. Paulatim Rosa dehiscit, ac sese pandit, emicantq; aut rubescencia, aut candicantia folia, tū aspectu pulchra, tum odoris suauissimi, quorum imæ partes candidæ, quibus capiti



Lib. 2. c. 18.

Lib. 1. c. 112.

Lib. 4. mc.

part.

herent, quæq; cum ex Rosis conficitur conditum aut syrupus, forficè defecatur, vngues Rosarū à Plinio nominantur, à Diosc. ὄνυχες τῶν ῥοδῶν. Iis detractis Rosæ ὄνυχισμέναι & ἐξὼνυχισμέναι dicuntur, hoc est exunges, & resectis vnguibus. A Galeno etiā vngues ἄπερὶ λοβοί, id est extremitates dicuntur. Nam & ῥοδῶν χαλῶν χαρὶς τῶν λοβῶν apud eum legitur, & ῥοδῶν φύλλον χαρὶς τῶν λοβῶν. Sunt enim Græcis λοβοί rerum omnium summitates. Qui in medio calicis stant lutei apices, cū capillamentis etiam luteis quibus insident, flores sunt Rosarum, Græcis ἄνθη τῶν ῥοδῶν. Hos flores qui Antheram appellant, vehementer errāt. Anthera enim Galeno, Celso, Paulo, Aetio cōpositionis nomē est, quæ apud diuersos auctores varia est. Sunt enim Antheræ stomaticæ, & aliæ aliis partibus cōueniētes: sunt & siccæ, quæ pulueris specie inspergi possunt: sunt & melle exceptæ, & non à floribus rosarū, quos multæ nō recipiūt, sed à floridis medicamentorū coloribus quæ in eas cōpositiones addūtur, nominatæ. Virides illi alabastri qui flores sustinēt, & in quibus semen cōtinetur, κεφαλὰς τῶν ῥοδῶν, Latine capita Rosarū dicuntur quæ foliis floribusq; breui dilapsis instāt. Autūno maturescētia rubescunt, semēque includunt durū, lana obuolutū. Rosa Græca à Græcis Lychnis dicta, quod flore lychnidē æmuletur, nascitur spōte in sepibus, valde humilis, spinis carēs, quod huic tantū generi Rosarū propriū est, flore lāgidiū rubro, vere & autūno prodeūte: quod etiā huic Rosæ cū Coroneola, & Græcula cōmune est. Quæ in hortis

Forma

Græca.

Locus.

## ROSA Lutea.

Lib. 6. Hist.  
cap. 6.

Forma

Græcula.



Ibidem.

Forma

Lutea.

Locus.

Forma

Rosa silu.

ut scribit Plini<sup>9</sup>. Cinnamomū olere hanc Rosam vulgus ait. Rosa lutea siue aurea q; luteo aurœque colore fulgeat nominata est. A cæteris Rosarū generib<sup>9</sup> foliis, flore, odore discrepat. Nā parua eius folia sunt rotūda, obscure viriditatis, valde infecta, incisurarū crenis propemodū rigētibus: caulibus valde spinosis, flore aureo siue luteo, cætera aliis simili, sed simplici, & quinque cātū foliis cōstare, non autem numerosis hortēsū Rosarū modo: odore graui, atque ingrato, accusanda natura, quæ flori egregio suauē odorē, id est Roseū ac suū inuiderit, quo si nō careret, haud prostremū locū inter flores excellētes obrineret. Nascitur in Italia; at nō ita pridē in hortis colere nos cœpimus. Rosa sylvestris quā Cynorrhodō à Plin. appellari diximus, foliis est asperis, aculeatis: rami surculique, ut in satia



## CYNORRHODON

Polyacanton.

## ROSA SYLVESTRIS

Pomifera.



spinis horret, sed graciliores sunt, foliaque multò minora: Rosæ ipsæ simplices, albæ, aut in albo purpureæ, inodore quibus tandē succedūt capita rotūda, vt in satiua, rubra cū matura sunt, in quibus semen lana opertum. In mediis ramis nasci pilam quandam, hirsutam, à Plin. spongiolam nominatam iam diximus. Hanc Seplassarij quidam Bedegar appellant, nō sine errore, cū Bedegar Cardui genus sit. Sylvestris Rosæ multæ sunt varietates, eaq; notatu dignæ. Sunt Cinamomeæ, foliolis omnium florum minime. In Francia, Belgia, Anglia ruris sponte oriuntur, ipso odore notissimæ. Luteæ sylvestres sunt in Africa: sunt & Caruleæ in hortis Italicis. Est & altera species foliis Myrtinis, sed latioribus, flore & elegantia Rosæ Moschata, vulgo *Eglantier*, de qua prius egimus, cum de Cynosbato differeremus. Inter sylvestres etiam non postremæ venustatis, inquit Pena, alia Angliæ familiaris, & *Esglantina* cognatior fruticat pumila, bicubito non altior, inodora, folio minore, Aroniæ non dispari pomo donata, minore multo, colore viuidiore, rubello subpuniceo, per Augustū maturo: flos Rosæ sylvestris est. Hæc Pena. In nostris Rosis luteis, delapso flore, talia poma succedunt, adeo Sorbis similia, colore, figura, & interdum magnitudine, vt imperitus ac in exercitatus ea vix à Sorbis discernat. Alterum Cynorrhodi genus, à spinarum densissima multitudine, quibus caulis, surculi, ramuli, folia rigent Polyacanthon nominavit Dalechampius. Id pedis altitudinem nunquam excedit. Flore est rubro, exiguo. Reperitur in Gramuntio nemore prope Monspe- lium. Vera Rosa, inquit Plinius, plurimum solo præualet. Cyrenis odoratissima est, ideoque ibi vnguentum pulcherrimum. Carthagine, Hispaniæ hyeme tota præcox. Refert & calis temperies. Quibusdam enim annis minùs odorata pro- uenit. Præterea locis omnis siccis, quàm humidis odoratior. Serinæ pinguibus vult, nec argillosis locis, nec riguis, contenta raris, (vel ruribus, vt emendauit Hermolaus) propriè; eruderatum agrum amat. Præcox Campana, sera Milesia. Nouissimè tamen definit Prenestina. Fodiuntur altius quàm fruges, leuius quàm vites. Tardissimè proueniunt semine, quod in cortice est, sub ipso flore, opertū

Forma

Poliac.

Locus.

Lib. 21. c. 4.

Tempus.



Lib. 6. Hist.  
cap. 6.

Tempus.

Li. 4. Geor.

Temper.

& Vires

Lib. 1. c. 112.

Lib. 21. c. 18.

Embl. 109.

lib. 1. Diof.

Li. 8. simpl.

Lib. 3. simpl.

cap. 10.

lanugine: ob id potius caule conciso inferuntur. Ex ocellis radices, ut arundo, vnum genus feritur pallidæ, spineolæ, longissimis virgis, quinquefoliæ, quæ à Græcis altera est. Omnis autem recisione atque vstione proficit. Translatione quoque, ut Vitis, optimè ocysimèque provenit, surculis quaternum digitorum longitudine, aut ampliore, post Virgiliarum occasum sata, dein per Fauonium translata, pedalibus intervallis, crebroq; circumfossa. Qui præcocem faciunt pedali circa radicem scrobe aquam calidam infundunt germinare incipiente calyce. Hæc Plinius: ex quibus locum Theophr. unde ista magna ex parte translata sunt, illustrare atque emendare licet: *δυσμύτατα δὲ, inquit, τὰ ἐν κυρήνῃ. διὸ καὶ τὸ μύρον ἡδίστον. ἀπλῶς δὲ καὶ τῶν ἰῶν, ἔ τῶν ἄλλων ἀνθῶν ἀκρατοὶ. μάλιστα, δὲ ἐκ τῆς αἰ ὀσμῆς, διαφέρουσιν διὰ τὴν χροῖν, πλεῖστον δὲ ἔτος δοκεῖ παραλλάττειν.* Gaza. Odoratissimæq; apud Cyrenam gignuntur, & proinde vnguentum iucundissimum illic faciūt. In plenum verò, & Violarum, & reliquorum florum odores ibidem sinceri præcipuè sentiuntur. Lege *ἀπλῶς δὲ καὶ τῶν ἰῶν, καὶ τῶν ἄλλων ἀνθῶν ἐκκρατοὶ μάλιστα. καὶ μὲν ὁσῶν αἰ ὀσμῆς, &c.* Id est, prorsus autem & violarum, & reliquorum florum eximius odor illic est, si tempus commodum fuerit: id enim plurimum immutat. Plinius. Refert & anni temperies: quibusdam enim annis minùs odorata provenit. Et mox. *φύει μὲν οὖν ἡ ῥόδωνία καὶ ὅτι ἀπὸ τοῦ ἀνθός ἐν τῷ μῆλει κνηκῶδες, ἢ ἀγανῶδες, ἔχον δὲ τινὰ χροῖν, ὥστε ἐγγὺς εἶναι τῶν πρώτων σπερμάτων.* Gaza. Nascitur Rosa etiam ex semine, quod flori subditum suo in malo contectum, Cneceum, vel Acanaceum lanugine quadam obductum gerit, ut primis seminibus proximum sit. Emenda. *κνηκῶδες, ἢ ἀγανῶδες ἔχον γερνὰ χροῖν, ὥστε ἐγγὺς εἶναι τῶν πρώτων σπερμάτων.* Id est, nascitur Rosa etiam ex semine, quod sub flore malo inclusum habet, lanugine Cnici modo, aut echini carduorum, obductum, omnia femina proximè ambiente. Quondam prope Allobrogum Cularonam, siue Gratianopolin, è medio floris Rosæ rubræ, cum iam folia decidissent, enatus cauliculus, gracilis, tres digitos altus, secundum florem extulit, priori similem, cum calyce subiecto, ac florem sustinente. Plinius, Tardissimè proveniunt semine, quod in ipso cortice est, sub ipso flore, opertū lanugine. Quod igitur Theophr. τὸ μῆλον Rosæ, Plinius corticem appellat, ut & paulo supra. Germinat omnis primo inclusa granoso cortice, τὴν κεφαλὴν, id est caput appellari diximus: *ἔμνη ἄλλὰ διὰ βραδείας παραγίνεσθαι, καὶ ταχέως πλῆνεις τὸν καρπὸν φυτεύουσιν ἐπικατομήνῃ δὲ, καὶ ἐπιτεμονομήνῃ βέλτιον φέρει τὸ ἄνθος, ἐμνήνῃ δὲ ἔξ ἀνέξῃ, καὶ ἀπολοχμῆται. δὲ ἡ καταφυλίσθην πολλὰς. καὶ ἔτα φασι κάλλιον γίνεσθαι ὅ ῥόδον.* Plinius. Ob id (quod tardissimè semine proveniunt) potius caule conciso inferuntur. Omnis autem recisione atque vstione proficit: relicta enim (quod omisit Plinius) excrescit, & in fruticosum dumum degenerat. Translatione quoque, ut ait Plinius, sicut Vitis, optimè ocysimèq; provenit Rosæ sativæ & sylvestres Maio & Iunio mensibus florent. Rosæ Damascenæ seu Moschata etiam Maio, sed iterum Septembri mense, siue Autumno, quod nemini mirum videri debet, cum sint etiam Pestanæ Rosæ bifferæ Virgilio. Rosæ refrigerat & adstringit, inquit Dioscor. Sed sicca magis adstringit. Idem Plinius quoque dixit. Quia verò locus corruptus est, & quæ ad Iuncum odoratum præcedentem pertinent, cum Rosæ confusa sunt, ex vetusto exemplari sic restituit Cornarius. Ad muliebres vsus decoquitur. Opisthotonicis cum Resina arida imponitur, excalfactoria. Et hætenus quidē de Iunco, dein manuscriptus habet: imponitur, excalfactoria. Rosæ adstringit, refrigerat, &c. Noster verò codex Galen. Rosam ex aquea substantia & calida, duabus aliis qualitatibus astringente videlicet & amara admixtis compositam esse tradidit: eiusque florem magis quam Rosam ipsam astringere, ac proinde etiam exsiccare Alio in loco oleum

Raso



Rosaceum idem scribit in primo esse ordine refrigerantium: ac Rosarum succum esse frigidiore quidem temperie, sed non ita multò, verùm caloris tepidi, & tenuis essentia. Auctores hi diuersa ratione ducti rectè scripserunt, illi quidè Rosam frigidam esse, hi calidam. Nam Rosa in caliditatis frigiditatisq; medio quodammodo sita est, quum sensu qualitas alterutra in ea non percipiatur. Etenim quæ caliditate sua aut frigiditate sensum mouent, ea secundo calidi frigidique ordine collocantur, sicut quæ ratione deprehenduntur, primo. Rosa igitur, vt rectè tradit Mesues, frigida est primo gradu, sicca secundo, ex substantiis diuersis etiam separabilibus composita, aquea quidè mediocri, & terrea adstringente, aërea verò, dulci & aromatica, ignea denique tenui, à qua est amaritudo, rubor, perfectio, & forma. Igneæ tamen substantiæ vis, quæ ruborem & speciem impressit, valentior fuit, quam quæ amaritudinem. Quamobrè hæc sola siccatione exolefcit, illis adhuc permanentibus. Ob eam scilicet amaritudinem Rosæ recentes succo præsertim, purgant bilem & aquas, quam vim veteres Græci videntur ignorasse: siccata verò resoluta caliditate amaritudinem excitante, substantiam adstringentem & stipantem ostendunt. Quare frigidiore sunt, & magis adstringunt, ac eæ magis quæ non fuerint perfectæ: & albæ magis, quam rubræ. Succus calidus est, prope ad primū gradū, nimirum à substantia terrestri & frigida secretus. Is recētibus foliis exprimitur, inquit Diosc. defectis forfice vnguibus, reliquum in pila teri debet, & in vmbra exprimi, donec cogatur, & ita ad oculorum circūlitiones recondi. Siccantur etiamnum folia Rosarum continuo versata, ne muceant, nè situs infideat. Aridis Rosis in vino decoctis expressus liquor facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingiuarum, sedis, recti intestini, ac vuluæ, penna illitus, aut infusus. Eadem sine expressione tusæ præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitiis, igni sacro illini profunt: sicca, ac trite fœminibus insperguntur. Misceantur solent oculariis antidotis, atque compositionibus, quas Antheras vocant. Folia vruntur in Calliblephara. Flos qui in mediis Rosis inuenitur, siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita potu citam aluum, & cruentas reiectiones sistunt. Folia Rosarum, cor, ventericulum, iecur, & eorum retentricem facultatem roborant: dolores à caliditate ortos mitigant: inflammationes tollunt. Vngues lotionibus & clysteribus ad inhibendas fluxiones vtiliter admiscetur. Flos, tradente Plinio, somnum facit. Inhibet fluxiones mulierum, maximè albas, in posca potus, & sanguinis excreationes. Calyx caputque alui fluores, & cruentas excreationes sistunt. Fructui maturo rubroque, & semini ac lanugini conclusis non obscura adstringendi vis inest. Quamobrem contra alui fluores, contra fœminarum abundantiam qualemcūque, maximè contra Gonorrhœā, remedio sunt. Succus ex Rosis puniceis efficacior est, ex rubescentibus infirmior: succus adularum melior: itémque dilutum quod ex rubescentium foliis aqua maceratis paratur, quanquam quæ Damascenæ, seu Moscatæ vocatur, longè præstent. Earum enim vicenis foliis deuoratis facilè & innoxie aluus subducitur. Rosarum succus purgat, resoluit, aperit, terget. Quare bile flaua sanguinè expurgat venarum & arteriarum. Confert ictero: quia obstructions ventriculi, iocinorisque aperit, & purgat. Cor, ventericulum, hepar roborat. Cordis tremorem sanat, vacuata eius causa: febribus biliosis confert. Dilutū ex quo pharmacopæi syrupum Rosatum quem vocant solutiuum, cōficiunt, ex eorum medicamentorum genere est, quæ quoniam clementer, & absque vlla noxa aluum subducunt, recentiores Benedicta vocant. Bilem & aquas purgat estate salubriter, ab vncis duabus ad vnc. quatuor. Albæ Rosæ nihil aut minimū purgant: potentiùs astringunt, & roborant quàm rubræ: quod cum de Rosis albis vulgaribus

Lib. I. met. purg.

Lib. I. c. 112.

Matth. li. f. Diosc. c. 112.

Lib. 21. c. 19.



Lib.2.m.  
purg.

ribus quibus passim abundant fruteta, Mesues intellexerit, iniuste à Manardo reprehensus esse videtur, quoniam albæ Rosæ quas Damascenas appellamus, inquit, maiore deiciendi vi quàm ceteræ præditæ sunt, Damascenæ Mesuæ, ut opinor, incognitæ fuerunt, atque etiam veteribus Græcis, & Latinis, tum quòd non ita pridem in Italia, & Gallia coli cœperint, tum quòd nullus veterū, quod sciam, de his aliquid memorię prodiderit, nisi eæ sint quas Coroneolas à Plinio appellari diximus, Oleum rosatum, & aqua ex Rosis educta, cor, ventriculū, hepar, facultatēque retentricem eorum roborant, cogendo ipsoꝝ substantiam laxam, inflammationem omnem extinguunt, & ortum ab ea dolorem sedant, somnum conciliant: coryzam tamen & sternutationem excitant, sed longè vehementius recentis floris odor, iis quibus facile caput repletur, catarrhis obsunt. Vuam stringunt, & guttur, illasq; partes roborant: crapulā arcant, & discutunt. Aqua in qua macerata sunt Rosæ, mundat, terget, purgat: at quæ vi caloris extillauit multum roborat, sed non purgat: quia subtilis eius caliditas igne est dissoluta. Acetum Rosatum inflammationes omnes sedat, incidit, purgat, roborat. Sylvestres Rosæ maiore adstringendi vi præditæ sunt, quàm satiuę, sed multo minùs odoratæ, & purgandi facultate destitutæ. Sylvestris Rosa, ut auctor est Plinius, cū adipe vrsino alopecias mirificè emendat. Scribit præterea Spōgiolæ quæ in mediis Cynorrhodi spinis nascitur, cinere cum melle alopecias capitis expleri: tum etiam, ad canis rabidi morsum vnicum remedium oraculo quodam nuper repertum, radicem sylvestris Rosæ quæ Cynorrhodos appellatur. Spongiolę ac fructus Cynorrhodi plurimū valent contra calculum, & vrinę difficultates, si leuigatæ in puluerem exhibeantur.

Li.21.ca.19.

Lib.8.c.47.  
&c.8.li.25.  
Fuch.c.254  
Dodo.li.6.  
c.11.

### PRVNVS SYLVESTRIS. CAP. III.

Nomina



PRVNVS sylvestris Græcis κοκκυμηλέα ἀργία, siue ἀγριοκοκκυμηλέα dicitur, Gallis *Prunelier*, & *Prunier sauvage*, & *Pelostier*, Germanis *Schlehen*. Etymon nominis est, quod magnitudine & rotunditate Cocci, mala ferat. Virgilius masculino genere Spinum hoc hemistichio, & Spi-

Li.4. Geor.


PRVNVS sylvestris.

Locus.

Forma.

Li.2. Alim.

Tempe-  
ram. &  
Vires.



nos iam Pruna ferentes, appellat auctore Seruio, quem constantissimè alij sequuntur, ut refragari non liceat. Nascitur vbiuis in sepibus, cum Rubis & Dumis aliis, quorū & ipsa genus est. Frutex est, & vix in arborem magnā adolefcit, radice lenta, lignosa, longe, latēque serpente, ex qua multos producit ramos, pungentibus aculeis horrentes: folia satiuę Pruno similia, sed multo minora: fructus rotundus, Prunis satiuis minor, gustus acerbi, & plurimum adstringentis, quem ἀγριοκοκκυμηλέον appellari scripsit Galen. & in Asia πρῆμον, Latini Prunum sylvestre vocant, Prunellum, & Prunulum, Galli *Prunelle*. Theophrastus cap.7.lib.3. Historiæ, ἀποδιάδα, vel, ut apud Athenēum legitur lib.2. ἀποδιάδα, vocat. Pruna sylvestria refrigerant, siccant, & adstringunt. Ipsoꝝ succus aluum sistit, aduersus ventris & sanguinis profluuium, scēminarūque fluores plurimū valet. Ex iis coctis succum expressum, insolūtū, ac tessellatim diuisum, vsurpamus Acaciæ veræ



veræ loco, minimo errore, inquit Siluius, quia refrigerat, siccatur, astringit, ut verum Acacia. Syluestrium quidem Prunorum bacca, inquit Plinius, vel è radice cortis in vino austero si decoquantur, ita ut triens ex hemina supersit, aluum & tormina sistunt. Satis est singulos cyathos decocti sumi. In syluestri fatiuaque Pruno reperitur limus arborum quem Græci lichena appellant, rhagadiis & condylomatis mirè utilis.

Lib. i. m.  
simp.  
Lib. 23. c. 7.

## GROSSULARIÆ CAP. IIII.



IN veteribus Græcis ac Latinis frutices tres quos hîc exhibemus cogniti fuerint, multi dubitant. Quia complures incognitos fuisse affirmant, eorum yulgaria, & quibus omnes herbarij hodie vtuntur, nomina vsurpabimus. Eorum primus Vua crispa nominatur ab intortis, ferèque in circulum versis (ac veluti crispis,) foliis, & acinis quos producit. Nonnullis Vua marina, à pluribus Vua Crespina, vulgo nostrati quod

Nomina  
Fuch. c. 68.

## GROSSULARIA

Alba.



grossorum exiguum quandam referat imaginem, Grossularia nuncupatur: Groslier, Germanis Krußelbeer: quibusdam Vitis Precia Plinij, sed perperam, quia Vitis Precia vinifera est. Post Rhamnos Theophr. Isos vel, ut alij legunt, Oesos memorat, quorum alius est flore fructuque candidus, alius flore fructuque niger. Isos, vel Oeson candidum nonnulli Grossulariam nostram esse arbitrantur, de quorum iudicio post hac amplius disceremus. Geinero Vua Crispa Ceanothus spina Theophrasti videtur esse, Ceanothon Anguillara Carduum esse credit, satis vulgarem, quem Patavini rustici Astoni vocant: sed de hoc aliàs. Vua Crispa frutex est radice gracili, dura, lignosa, fibrata: ramulis multis, candicantibus, aculeatus, rectoq; spinarum mucrone horridus: foliis ex viridi pallentibus, Apij modo dissectis: flore ex herbido purpurascete: acinis caducantibus, primò acerbis, à maturitate splendescantibus, hauescentibus, nonnunquã subrubescantibus sub dulcibus. Is fructus Grossula à nostris vocatur, Groselle. In Gallia passim frutetis & se-

Lib. 3. Hist.  
cap. 17.

In hort.  
Germ.  
Lib. 4. Hist.  
cap. 11.  
Forma.

pibus nascitur. Seritur etiã in hortis. Veris statim initio frutex iste pubet, Primò folia, dein flores, ac nò ita multo post acinos seu baccas proferens. Fructus immaturus, tunc enim magis in vsu venit acerba vua loco, frigidus sicculq; ordine secundo, adstringit, eiusdem ferè cum vua acerba facultatis. Quare grata placet acerbitate, magnamq; à palato inquit gratiam, & iuribus innatat. Appetentiam excitat: feruentem bile ventriculum refrigerat, incoctus iusculis febrientibus vtiliter exhibetur: maturitate dulcescit in cibum, qui tamen lautioribus mensis repudiatur, gravidis mulieribus, tam maturus, quam immaturus valde expetitur: Immaturus alui fluorem, & sanguinis profluuium cohibet, maxime succus ab eo expressus, siccaturq;. Idem fructus inflammationibus, & erysipelatis vtiliter admoventur. Ad idem valent folia, sed minus efficacia. Recentia & cruda si edantur, urinã cient, & calculosis profunt. Alter frutex Grossularia rubra, & Vua transmarina à vulgo vocatur, à nostris Groslier rouge, & Groslier

Locus.  
Tempus.  
Temper.  
& Vires.

Nomina



## GROSSVLARIA

Rubra.

In Hort.  
Germ.  
Forma.



Locus &  
Temper.  
Ribes of-  
ficin.  
Matth. li. i.  
Diosc. c. 105.

Vires.

Li. de Co-  
nif.  
Ibidem.

In Hort.  
Germ.

Ibidem.

Nomina

Forma.

Vfus.

Tempus.

Locus.

Lib. 3. Hist.  
cap. 17.

*Grosellier d'outre mer*: Officinis Ribes nomina-  
tur, Gesnero Ceanothus lævis. Germ. *S. Iohansz  
creublin, oder beerlin*. Ramis est lignosis, lētis, cor-  
tice furuo opertis: foliis latis, nigricātibus, viti-  
gineis, vel Populo albæ similibus, sed mino-  
ribus inter quæ flores emergunt racematim  
congesti: dein bacca primū virides, cū ma-  
turerunt rubræ ex pediculis longis tenui-  
busq; pendulæ, sapore subacido, admixta qua-  
dam dulcedine, magnitudine Piperis. Nostri  
*Groselles rouges*, & *Groselles d'outre mer*, appellant.  
Frutex hic nullis spinis horridus est, sed to-  
piarius magis, in Sequanorum & Allobrogū  
montibus nascitur sponte, à nobis vero in  
hortis cultus eleganter sepit illorum pului-  
nos thoros & areas. Iulio mense fructus ma-  
turi, adstringunt, frigidi sicciq; ordine secun-  
do. Qui hunc fruticem Arabum Ribes esse  
credunt, valde allucinantur. Nam vt Serapio  
scripsit, Ribes arbor est, capreolos proferens,  
è viridi rubescens, folia lata, magna, rotun-  
da, quæ sanè notæ huic nostræ plantæ mini-  
mè conueniunt, vt ex pictura perspicere licet,

tametsi fructus Ribis fructui qualitatibus similis sit, acidus scilicet, simul &  
dulcis, qualem esse Ribis fructum Serapio tradidit: quare eadē quæ Ribis fru-  
ctus præstare potest. Febribus igitur acutis opitulatur, æstuantem ventriculum  
refrigerat, sitim restinguit, nauseam ac vomitum sistit, cibi appetentiam inui-  
tat, cœliacos, & lentericos biliosis defluxionibus vexatos iuuat, sanguinis fer-  
uorem mulcet, bilis acrimoniam retundit, eiúsq; impetum domat. Laudādi igitur  
Pharmacopœi, qui ex huiusmodi fructu vinum exprimunt, & in hos vsus  
recondunt. Bellonius Ribem Serapionis sese inuenisse scripsit in summo cacu-  
mine montis Libani, foliis Oxylapathi, grandioribus, retusioribus, è quorum  
medio racematim exeunt bacca rubentes, vt in Hypoglossō, Rusco, Lauro Ale-  
xandrina. Eius porro iudicio Matthiolus non subscribit. Neque enim Serapio-  
nis Ribes folia habet Oxylapathi, sed rotunda, baccas è mediis foliis nō exerit,  
& Capreolos habet, quibus Bellonij Ribes caret. Huius Grossulariæ rubræ, siue  
Ceanothi lævis genus, proceritate sesquicubiti circa syluas quasdam ditionis  
Bernensium, Heluetiorum prouenire scribit Gesnerus, & à rusticis *Keozbeer* dici,  
quod tussi medeatur. Tertius frutex quibusdam Isos, siue Oesos niger. Theoph.  
Grossularia nigra, est aliis Pipirella, à baccis magnitudine, coloréque Piperi si-  
milibus, Officinis Ribes niger, Gallis *Poirurier*, & *Grosellier noir* dicitur. Frutificat vt  
Ribes ruber, eiúsque ramulis, foliis, flore, fructu similis est, nisi quod huius folia la-  
tiora, odorem nonnihil grauem cum manduntur, sed non ingratum spirant:  
fructus niger, ex subdulci austerus, *Groselles noires* nobis appellatur. Quidam ace-  
tariis, iusculis, condimentis viridibus admiscent, salubremq; eius vsum esse  
prædicant: nullius alioqui in medicina est vsus. Floret, fructumque edit eodem  
tempore quo Ribes ruber. Sponte in locis humidis, & incultis nascitur, in ag-  
geribus fossarum, & fluuiorum ripis. Ne quid verò hic præmittatur quod at-  
tentum Lectorem torquere possit, obseruandum Theophrastum de fructibus  
& arboribus tractantem, quæ vno genere comprehensæ, priuatis quibusdam  
notis



## GROSSULARIA

Nigra.



notis inter se differūt, exempli gratia memorasse *ράμνον, ἴσον, κισθόν, βιάττον*, quorum differētias sigillatim persequitur, & *Ἰσὶ* vna Oesi præcipue, qui nunc candidum florem & fructum gignit, interdum nigrum, interdum mediū, nec coloris albi dilutioris, nec crassi vini modo nigrescentis, *δινωπὸν* vocat, sed ad purpuram inclinantis. At cū doctus quispiam & acris iudicij vir, pro *Ἰσὶ* planta incognita, ad marginē scripsisset *ἴσος*, qui post transcripserunt, & *ἴσον* loco τῆς *ἴσον* immiserunt, & non deleta voce *ἴσος* literæ Theophrasti interseuerunt, gemino errore, quo Gaza etiā inuolutus est: *ἴσον* quidam Amerinam esse volunt, quā Galli Parisienses, seruatō Græco vocabulo adhuc vocant *Oser*, coloribus à Theophrasto recitatis variā. At illorum sententiam vanam id demonstrat esse, quod *ἴσος* species omnes fructum edunt, qui Amerinæ, & Salicibus nullus est. Vero propius fuerit, quod *ἴσον* Agnum esse quidā censent, in eaq; arbore conspici floris ac fructus tres illas differentias à Theophrast. recitatas.

Ideoq; Plinium cū indicatum locum Theophrasti verteret, in genera duo Viticem diuississe, alterum floris è candido purpurascens, alterum purpurei. Cæterum inuenio Theophrastum Agnon, quam Amerinam inscitè Theodorus vertit, priuatim nominasse vt plantam ab Oeso diuersam. Eustathius clarus sanè Homeri interpres magna inconstantia nunc *λήγον ἴσον* appellari tradit, & *ἰσὸν καρπὸν ἀγνολοκικόν* exponit, nunc *ἰσὸν* spinosam plantam eandem esse cum Oeso putat, cū Agnus minimè spinosus sit, sicut nec Amerina, nec Salix, nunc hoc versu *πρὶς τὸν δασύπερος ἰσὸν* expositas ex Salicis viminibus. Hæc Dalechampius.

Li. 24. ca. 9.

Lib. 1. Hist. cap. 5. &amp; 22.

## VVA VRSI CAP. V.



A GALENO *ἀρίστου φαφύλη* hæc planta nominatur, id est, Vva Vrsi, quæ radicibus est crassis, numerosis, caudice recto, firmo, candicante, vel subcinereo, simili eius arboris quam pro Oxyacantha Matthiolus exhibuit: ramis multis, longis, huc illuc diffusis, spinis crebris, validis, subrectis, atrociter pungentibus: foliis Arbuti, siue Pyri sylvestris, venosis, in ambitu dissectis: flosculis aceruatim congestis, ex luteo rubentibus: fructu similiter ex aureo colore ad coccineum vergente, densius coaceruato, rotundo, acidi gustus. Nascitur in Alpinarum gentium Brammonicum, & Ebrodunensium saxosis conualibus: maximè qua torrentes præcipiti cursu vicinas terras glareæ & arenis obruunt. Prouenit & in agro Senensi Hetruriæ prope Alcinum montem. Galenus ad hæmoptoicos Pharmacum Arrhabiani, quod Ponticum dicitur, sic describit. Vva Vrsi lib. xvi. aquæ pluuiæ sextarios xvi. Coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. Quibus mox subiungit. Quæ Vva Vrsi appellatur, in Ponto nascitur. Planta est humilis, & fruticosa, folio Mæcyli, fructum ferens rubrum, & rotundum, gustu austerum, quem

Lib. 7. med. part.

Forma.

Nomina

Li. 1. Diosc. cap. 105.

Locus.

Ibidem.

Vires.



## VVA VRSI.



Corol. 124.  
lib. 1. Diol.

Li. 1. ca. 106.

Vuam Vrsi appellant. Sunt qui Ribem rubrum, quem descripsimus Vuam Vrsi esse putant, quorum sententia ex Galeni verbis modò citatis facile refelli potest, utpote qui scribat Vuam Vrsi folio Memæcili virefcere.

## OXYACANTHA.

## CAP. VI.

**H**X fenticosis stirpibus quibus abundamus, quanam sit ea quæ Oxyacanthæ nomine à Dioscoride describatur, inter auctores ambigitur. Rura, inquit Hermol. Oxiacanthā Crispinam, quasi acrem Spinam vocant, ex cuius Acinis vinum etiam conficitur, Crispinum vocatū, eodē ferē vsu quo vinū ex Mālo Punico. Singulares in Acinis quibusq; nuclei sunt. Acini oblongi, racemosi, congesti, folia quoque oblonga. Ruellius Hermolaum secutus, scribit Oxyacantham à Gallis, quod huius

Lib. Histo.  
plan. c. 209.  
Lib. 3. ca. 21.  
Embl. 101.  
li. 1. Diosc.  
In li. 1. Diosc.  
cor. c. 123.  
Li. 8. fump.

Lib. 1. c. 105.

Cap. 133.

Acinis vinum exprimatur, Spiniuineta vocari, ab aliquibus acrem Spinam. In eadem sunt sententia Fulchius, Tragus, Cornarius, & recentiores ferē omnes Medici, quibus dum aduersatur Cordus, Oxyacanthæ nomine scribit cōfundi apud auctores duos frutices natura diuersos. Aliā enim esse Dioscor. Oxyacantham, aliam Galeni. Dioscor. Oxyacantha, pyracantha est, id est albus Spinus. Galeni Oxyacantha est Berberis Officin. Cordi sententia. Et Dioscor. quidem Oxyacantham non esse Spiniuineta, siue Berberim Officinarum ex ipsa descriptione probat: quia Spiniuineta diuersissima à Pirastris figura sit. Pirastrer enim plerumque singulari caudice assurgit, non ita recto, in diuaticatos & intortos ramos diuiso, at Spiniuineta pluribus virgis, fruticis modo se attollit, iisq; rectis. Piraastro antequam senescat cortex est læuis, glaber, in flauo spadiceus, in cæcio candicantibus maculis variegatus: Spiniuinetæ longè diuersus colore, in ipsa adolescentia rimosus, & rugis contractus. Spiniuinetæ fructus quidem ruber est, sed Myrti bacca dissimilis. Ea enim rotunda est, ille oblongus, & vtrinque acuminatus. Præterea Oxyacanthæ fructus à Dioscoride *ὀθρυνσος*, id est friabilis describitur, Spiniuinetæ bacca, quoniā lenta cute succulentam carnem continet, friabilis esse non potest. Nam friabile non de re lenta, humida, & succosa dicitur, sed arida, & fragili, quæ digitis facile, velut in puluerem atteri queat. Quare aliam esse Oxyacantham à Dioscor. descriptam, contendit Cordus, à Galeni Oxyacantha, cui adstringendi & incidendi vires tribuit, in Berberi Officinarū manifestas. Ut autem quæ sit Dioscoridis Oxyacantha explicet, annotat Dioscoridē inter Oxyacanthæ synonyma *πυρακάνθα* numerare, quæ vox cum apud nullum auctorem extet, perperam exaratam fuisse suspicatur. Cum verò Dioscor. ipse hoc eodem libro de Mespilo agens Pyracanthæ meminerit, eam esse censet quæ hîc corrupto nomine *πυρακάνθα* vocatur, facili scribentium lapsu. Dioscoridem igitur pro Berberi, quæ vera est Oxyacantha, Pyracantham descripsisse iudicat, eamque Oxyacanthæ nomine descriptam Pyracantham esse Spinam, quæ inter arbores à veteribus Latinis simplici



simpliciter Spinā, à Gallis *Aubespīn*, id est Albus Spinus, à Germanis *Hagedorn*, nominatur. Hæc enim habitu figurāq; Piraastro similis est. minor tamen, spinosiorq;. Fructum fert Myrteis baccis æqualem, rubentem, nucleos intus habentem, omnisq; succi expertem, idēque friabilem. Idem testatur Plinius, inquit, cum dixit Aquifoliæ & Spinæ baccas sine succo esse. Accedit etiam foliorum figura, quæ Apio similia sunt. Nam talia Pyracanthæ habere debet, Dioscoride Mespili Aroniæ, scilicet folia cum Pyracanthæ foliis comparare, & Theophrasto Mespili Anthenoidis, quæ Aronia Dioscoridis est, folia Apio similia describente. Hæc Cordus. Cui alio in loco de Sorbo aculeata, id est Pyriacanthæ tractanti Gesnerus album Spinum appinxit, annotavitq; Oxyacantham Dioscoridis videri, & Spinam Appendicem Plinij. Idem Gesnerus alibi Oxyacantham Dioscoridis, Spinam albam vulgo dictam arbusculam videri ait, & Plinij Spinam Appendicem, & simpliciter Spinam. Matthiolus acutissimè eos refellit qui Oxyacantham Vuam Crespinam, siue Crespinum esse credunt. Dioscorides enim, inquit, Oxyacantham Piraastro similem esse scribit, minorem tamen, spinosiorēque, & fructum ferre Myrti similitudine, plenum, friabilem, rubentem, & intus nucleum, radicēque subesse multifidas, & altè descendentes: ex quibus perspicuum est alias Oxyacanthæ notas non expressisse quam proceritatis, crassitudinis stipitis, ramorum, radicum, ac fructuum, omissa foliorū, florum & corticis historia, quæ qui accuratius expendit, Crespinum is notis omnibus Piraastro dissimilem esse comperiet. Nam sylvestris Pirus simplex è solo profilit, vno duntaxat caudice attollitur, atque tandem ita crescit, ut in proceritatem arboream confurgat, Crespinus verò nullum ab radice caudicē emit, sed surculis multis stolonibūque fruticat, qui virgarum modo crescunt, nec vnquam arboreascunt, nisi rarò, longoq; tempore: omnium enim maximi pollicarem crassitudinem vix excedunt, raròque hominis altitudinem æquant. Præterea Piraaster cortice integitur aspero, crasso, squamoso, Crespinus albo, laui, multum tenui, adeo ut vel leuissima lapide, aut ferro illata plagā difrumpatur, croceusq; subtus color appareat. Adhæc licet Pirus sylvestris, Pruni sylvestris modo aculeata sit, ramiq; frequentibus horreant spinis nigris, validis, tamen singulæ ex vno tantum loco erumpunt, in Crespino verò ternæ ex eodem loco, albæ, planæ, nec rotundæ, nota insigni, nec à Dioscoride prætermittendæ. Iam verò Oxyacantha fructum fert Myrti magnitudine, Crespinus autem racematim Vuæ modo, Acinis oblongis, rubentibus. Præterea Crespini folia Aroniæ Mespilo similia non sunt, sed potiùs Malopunicæ, latiora, nec tam in mucronem desinentia, per ambitum spinis tenuissimis, frequentissimisq; horrida. Radices quæ crocei sunt coloris, multæ quidem, sed tenues, nec altè descendentes ut Oxyacanthæ, & in obliquum summo cespite vagantes. Denique flos à Piraastri flore plurimùm dissidet: est enim melinus, ex racemio Vuæ simili prodit fruticis sui colorem referens, qui dum sese pandit, suauissimè spirat. Ex his effici vult Matthiolus Dioscoridis Oxyacantham, quæ & Oxyacanthos dicitur, id est acuta Spina Crespinum non esse, sed eam aculeatam arborem, stipitem, corticem, ramis, proceritate, floribus, ligni materie Pirastrum planè referentem, quem Itali *Bagaia* vulgò nominant, Ananienfes, & Tridentinarum vallium incolæ quidam *Amperlo*, alij *Pan d'orso*, Goritienfes *Barazzo bianco*, Arabes *Amirberim*, seu *Amyrbarim*, seu *Berberim*, Galli *Aubespīn*, Hispani *Pirlitero*, Germani *Hagedorn*, Boemi *Hloc*. Id apertè demonstrant arboris stipes rami firmis, acutissimisq; spinis armati, à quibus arbori nomen, ligni materies, subscaber squamosusq; cortex, veluti Piraastro, flos albus Piraastro haud absimilis, fructus Myrti crassitudine, rubescens, plenus, friabilis ori subausterus, quo, modò vnus, modò plures conclu-

Lib. 15. c. 24

Li. 3. de pl.  
cap. 7.In hort.  
Germ.In li. 1. Dio-  
scor. cap. 105.

Nomina

Forma.



## OXYACANTHA,

*Acuta Spina Matthioli.*

Lib. 1. ca. 133.

Lib. 3. Hist. cap. 12.

Lib. 1. Hist. ca. 15. &amp; lib. 3. Hist. ca. 4.

Li. 16. c. 20. &amp; 21.

*Locus.**Tempus.**Temper.**& Vires*

Dodo. li. 6.

cap. 31.

Lib. 1. c. 105.

Li. 8. simpl.

Lib. 1. Hist.

ca. 15. &amp; lib.

3. cap. 4.

Li. 4. Hist.

cap. 4.

duntur nuclei: radices in altum descenden-  
tes. Folia quidem à Piraistro dissident: Apij  
modo dissecta; pauloque longiora: hoc ta-  
men sententiam Matthioli labefactare mini-  
mè potest: similitudines enim ex pluribus  
partibus potius sumi constar, quàm ex pau-  
cioribus. Quali ergo folio sit: Oxyacantha  
Dioscor. non explicat, sed tantum dixit esse  
arborem Piraistro similem, quod magis ad  
stipitis, corticis, ramorum, florum delinea-  
tionem, ligni materiam respiceret, quàm ad  
folia, quæ nihilominus qualianam sint, ex  
ipso Dioscor. & Theophrasto colligere licet,  
quoniam Dioscor. de Aronia Mespilo agens,  
scribit eam arborem spinosam esse, foliis si-  
milem Oxyacanthæ (alii Pyracanthæ legunt,  
ut diximus) Theophrastus verò Anthenoi-  
dis Mespili folia dissecta esse ait, quæ, ut mo-  
nuimus, Aronia est, & per extrema Apio si-  
milia. At Theophrasti ipsius auctoritate fre-  
tus, poterit aliquis sententiam Matthioli op-  
pugnare, quod locis duobus Oxyacantham  
inter eas arbores recenset, quæ perpetua

fronde virent, cum Oxyacanthæ nostræ folia, decidere omnibus constet. Sed  
hos locos mendosos esse ex eo intelligere licet, quod Tiliam Myricam,  
Quercum, Terebinthum inter, perpetuifolias numeret, id autem falsum  
esse sciunt omnes qui has plantas cognoscunt. Hoc itaque loco pro Oxya-  
cantha Pyracantham docti viri reponunt. Nec Plinius easdem arbores ex  
Theophrasto recensens, Tiliæ, Quercus, Oxyacanthæ meminit. Hæc est Mat-  
thioli de Oxyacantha sententia, hæ rationes quibus eam confirmavit. Oxya-  
cantha in Dumetis, sepibus, & agrorum limitibus frequens provenit. Maio  
mense fleret: fructus Septembri maturescit. Is refrigerat & adstringit. Potu aut  
cibo, inquit Dioscorides, alui profluuium, & abundantiam sceminarum sistit.  
Radix illita aculeos, & spicula extrahit: abortum fieri tradunt, si ter radice ven-  
ter, aut sensim feriat, aut perungatur. Oxyacanthus arbor Galeno, ut Piro simi-  
lem habet speciem, ita & vires similes. At fructus Piri sylvestris prorsus acer-  
bus est, Oxyacanthæ verò, cum partium tenuitate, modicam incidendi vim  
habet. Cæterum Oxyacanthæ fructus, Piri sylvestris fructui similis non est, sed  
Myrti, rubens, & rarus (adpòs videtur legendum ex Dioscoride, id est plenus  
pro ἀπὸς.) Habet item & nucleos. Porro non esu tantum, sed & potu affectus  
omnes fluxionū quos ποῖδος Græci vocant, cohibet. Serapio eadem ad verbum  
transcripsit de Amirberi, seu Berberi tractans, quæ Dioscorides & Galen.  
de Oxyacantha tradidit. Anguillara eorum sententiæ vix assentitur qui  
Oxyacantham illam esse putant, quæ Italicorum vulgo *Spinbianco* dicitur, tum  
quod Theophrastus Oxyacantham inter arbores perpetuæ frondis numeret,  
tum quod Mali Medicæ spinas, Piri aut Oxyacanthæ spinis comparet, quæ in  
Spinum album competere non possunt. At Matthiolus priorem locum falsi  
suspectum esse ostendit: Spinarum verò Mali Medicæ, cum Piri aut Oxyacan-  
thæ spinis comparatio non inepta. Est enim Pirus quædam sativa, spinis  
armata, Lugduni satis frequens, quam ideo *Poirier d'espine* vocant, & fructum

*Poire*



*Poire espine.* Fructus is magnus est, viridis, qui in seram hyemem prorogatur & durat, gustus suauissimi, præsertim cum in pruna coctus apponitur, insperso saccharo. Surculos ex Neapoli, huc allatos fuisse olitores aiunt. Hæc profecto Pirus est, cuius spinas cum aculeis Oxyacanthæ comparat Theophrastus, nec immerito: sunt enim inter se prorsus similes. Multo meliore ratione, sententiam illam oppugnat Anguillara, cum scribit Oxyacanthæ à Galeno & Dioscoride tributas facultates albo spino minimè conuenire. Huius enim fructus non acerbos, sed dulces, maximè cum maturi sunt, aluum ducere magis quàm adstringere, & mulierum fluores elicere potius quàm cohibere. Hæc Anguillara. Certè vulgus Gallicum, vt scribit Ruellius, deturbandis calculis vtitur acino, singulari remedio, ex vino, quem peculiari vocabulo Senelle nominat. Rustici viuas sepes hoc frutice extruunt, quæ pecus minacibus aculeis valenter arceant. Dos eius omnis in odore, tametsi non defuerint, qui tradant hanc stirpem, instar Lauri fulmine non ici, nec vnquam de cælo tangi. Aiunt quoque pisces marinos floris odore tactos statim corrumpi, quod Ruellius arbitrat, fragranti grauitati acceptum ferendum. Huius rei piscatores gnaros florem deuotare: Mirum est, inquit, si fulminis ictum tuta respuat. Sed fama tantum hoc didicit nullo certi scriptoris testimonio. Pisces verò non ob odoris florum Oxyacanthæ vehementiam, aut noxiam aliquam qualitatem, vitium contrahunt, sed quoniam Maio iam progressu arbor illa floret, quo tempore ob æstuosum cælum pisces qui è mari vehuntur in vrbes procul remotas corrumpuntur.

Lib. 3. cap. 12.

BERBERIS OFFICINARVM, CAP. VII.

**P**LANTA hæc à Sepalsiariis Berberis nominatur, ab Italis *Crespina*, à Gallis *Espine vinette*, à Germanis *Ponsselbeel*, *Saura h*, *Versich*, à Boemis *Drac*, siue *Dristal*, ab Anglis *Berberis*. Plinij Spinam Appendicem esse multi credunt. Frutex hic è terra surculos plurimos mittit, coryli modo, ab imo ad summum spinis armatus acutissimis: longis, compressis, albicantibus, fragilibus, ternis ex eodem loco prodeuntibus. Cortex extimus totius fruticis candidus, læuis, tenuis, interior autem exilior, & ligno proximus flauus, ac cerusei, ligni materies alba, fragilis, fungosa. Numerosæ radices valdè flauæ, per summa terræ sparguntur. Folia ex viridi candicant, Punicæ similia, sed tenuiora, latiora, minùs acuminata, toto ambitu spinis tenuissimis horrentia. Flores sunt lutei, racematim congesti, odoris non ingrati. Fructus sunt Acini oblongi, racemo penduli, Punicæ Mali Acinis, haud absimiles, quanquam oblongiores, paruis intus conclusis nucleis, qui maturi maximè rubent, gustuque sunt acido, & subaustero. Ex his vinum exprimitur, quod vinum ex Berberi falsò vocant Officinæ, acerbius acidiusque Malorum Punicorum succo. Id in acutis, pestilentibusque febribus zulapio violaceo permixtum cum aqua vtiliter exhibetur. Etenim non modo sitim extinguit, sed biliosas pestilentésque exhalationes suppressit. Datur commodè celiacis, cibum reiicientibus, dysentericis, iisque quibus bilis à iocinore in ventriculum regurgitans, chole-ricum excitat affectum. Tam sumptum quàm admotum mensium profluvia cohibet. Tineas ventris enecat, præsertim si bibatur ex aqua Graminis, vel Portulacæ, vel Abrotoni, additò sacchari tantillo. Prodest cruentis excreationibus, firmat commotos dentes, si eo sæpius foueantur, gingiuas roborat, gargarizatu faucium & Vux inflammationes discutit, atque destilla-

Nomina

Lib. 24. cap. 13.

Forma.

Matth. li. i.  
Diosc. c. 105  
Vires.



## BERBERIS

Officinarum.


Rucl. lib. 1.  
cap. 106.

Lib. 24. c. 13.

Dodo. li. 6.  
cap. 21.

Locus.

**Tempus.** siccis, & aquosis. Germinat in<sup>te</sup> vere, ab occasu Virgiliarum fructum præbet, qui per Septembrem mensem, & Octobrem demetitur, campos & sylvas exornans.



tionem eo confluentes reprimi. Vulnere recentia in carnis superficie glutinat, & ulcera vetera desiccat. Nocet iis qui ventriculi doloribus ex flatu & frigiditate ortis vexantur, atque etiam agere spirantibus. Condiuntur item Acini vel melle, vel saccharo ad restinguendam sitim, depellendamque febricitantium inappetentiam, quorum morosum nimis palatum cibum ferè quemcunq; respuit. Nam elanguescens appetitus cibi mirum in modum grato huius acore recreatur. Spina Appendix appellata, inquit Plinius, quoniam bacca Puniceo colore in ea Appendices vocantur. Hæ crudæ per se, & aridæ in vino decoctæ, aluum citant, & tormina compescunt. Lixiuio in quo radix maduerit sæpe eloti capilli flavescent. Ex foliis viridibus, quemadmodum ex Oxalide, succus in ciborum condimenta exprimitur refrigerans, & appetentiam inuitans, atque biliosis, & febricitantibus perutilis. Frutex hic multis locis nascitur, nempe sylvis, frutetis, campestribus, montanis,

## RHAMNVS, CAP. VIII.

Lib. 1. c. 102.

Lib. 3. Hist.  
cap. 17.**Genera.**  
Lib. 24. c. 14.Embl. 98.  
lib. 1. Diosc.

Lib. 1. c. 102.

**R**HAMNI historia, si vlla alia, valdè est perturbata, atque impedita, & ob variam de iis scribentium tractationem magna obscuritate inuoluta. Ac primum Dioscoridis caput, quo de his agit, aperte corruptum, multisq; modis deprauatum esse ostendunt tres asterisci, in contextum inserti eius exemplaris, alioqui fidelissimi, quo Ruellius vsus est. Primus *φύλλα μικρά \* υπομήκη*, & c. Secundus, *ἐπὶ δὲ καὶ ἑτέρα \* λωποτέρα*, & c. Tertius *ἐοικὼς \* ἀσφοδέλῳ*. Deinde Theophrastus duo duntaxat Rhamni genera facit, candidum & nigrum, diuersumq; ipsorum fructum, vtrumque tamen spinosum. Plinius item duo, quæ inconsideratè Ruborum generi adscribit. Eius verba quia à Dioscor. sententia variant, & alioqui corrupta leguntur, ex veteri manuscripto Codice à Cornario emendata adscribam. Inter genera Ruborum Rhamnus appellatur Græcis, candidior, fruticosior, ramos spargens rectis aculeis, non vt ceteri (vel Rhamni, vel spinosi frutices) aduncis, foliis maioribus. Alterum genus eius sylvestre, nigrius quadantenus rubens, fert veluti folliculos. Huius radice decocta in aqua fit medicamentum quod vocatur Lycium (id porro falsum esse norunt herbarij omnes) Semen secundus trahit. Hoc Dioscor. minimè habet. Galenus, & eum secuti Paulus, atque Ætius, velut de vno solùm genere, aut certè de vna omnium facultate, omisis eorum differentiis loquuti sunt. Dioscorides tria genera descripsit, cuius breuitas, & inemendata librorum nostrorum lectio, vt diximus, in ambiguo multos habet, quinam ex tot dumis Rhamni



Rhamni dici possint. Dioscoridem siue is ex Andrea, siue ex Crateua Rhamnorum historiam concinnarit, certe Oribasius, & Serapio secuti tria quoque Rhamni genera memorant, Paliuri mentione à neutro facta, celebris alioqui plantæ, & facultate sua, quæ vesicæ lapides exterit, insignis perinde ac si Rhamnorum historia inuoluatur, aut eorum genere contineatur. De vtroque tamen seorsum dicemus ex Diosc. qualia qualia sint eius exēplaria. Rhamnus, inquit, fruticat in sepibus, ramos ferens rectos, & aculeos Oxyacanthæ modo, foliis paruis, oblongis, subpinguibus, teneris. Alterum ei genus candidius. Tertium nigrioribus, latioribusque foliis constat, & quadantenus rubentibus, cuius rami quinum ferè cubitorum sunt longitudine, spinosiores quidem, sed infirmioribus, minùsque rigentibus aculeis. Fructum edit latum, candidum, tenuem, folliculari specie, verticillo similem. His, diuersi auctores diuersas plantas aptarūt. Cornarius & Tragus Rhamni genus esse existimarunt fruticē eum quem Vuam crispam siue Grossulariam appellari diximus. Item aliud Tragus, Hermolaus, Ruellius, quem Spinum ceruinū, Itali, *Burgam spinam*. Galli vocant. Prima Rhamni species, inquit, Anguillara, omnium sententia ea est, quæ Romæ *Spino santo* nominatur, à Sānitibus, *Spino di Christo*, à Marcello lib. de re medica, Salutaris, & Spina alba. Salutaris herbæ fasciculū, inquit, idest, Spinæ albæ qua Christus coronatus fuit. Cordus etiam Rhamnum à Latinis Albam spinam dici testatur, prudenter interim nos monens ne stirpes diuersas hoc nomine confundamus. Nam præter Rhamnū spinam arborecentem, Albæ spinæ nomine passim ab auctoribus in herbaceo genere duo Cardui indicantur. Secunda species, inquit idem Anguillara, priori in omnibus similis est, nisi quod candidior, foliis longioribus & tenuioribus, in Illyrico copiosa, ex qua sepes conficiunt. Tertiam Rhamni speciem in Diosc. supposititiā esse autumat: quia in eius descriptione sibi ipse refragatur, ut pote qui fructum eius dicat esse latum, candidum, tenuem, veluti folliculum, Hastulæ regię similem. Fructus verò eius Rhamni quem representant, & si latus sit, nimirum cōpressus, minimè tamen Aspodeli fructui similis est, rotūdo, non compresso. Sed hæc ratio deprauatæ lectionis correctione facile refelli potest. Neque enim dicitur à Dioscoride tertij Rhamni fructus *ἰσχυρὸς ἀσποδελῶς*, sed *ἰσχυρὸς σπονδυλῶς*, id est similis verticillo. Ad hæc spinæ eius infirmæ non sunt, quales Diosc. esse vult. Præterea Theophrastus duo duntaxat Rhamni genera posuit, Rhamnósque perpetuo esse folio, Paliurum minimè. Matthiolus tria Rhamni genera statuit. Primum in sepibus nascens, cuius longis aculeis Hetruscæ, mulieres ficus recentes perforant, & ad solem appendunt. Hos Oxiacanthæ modo fert: folia oblōga, mollia, subpinguia: caulem habet album, læuem, & rubentes inter folia baccas. Hic spinosus Marthioli frutex ad Rhodani ripas & glareosa vada frequentissimus visitur, sæpè humilis, nonnūquam ad hominis proceritatem assurgens, cortice cinereo, ramis firmis, ex quibus surculi hinc illinc oriuntur, per interualla foliis breuioribus vestiti, spinas per interualla proferentes, & semper in rigidum aculeum desinentes, qua nota ab aliis discrepat. Fructus est circum ramos copiosus, rotundus, cum maturuit phœniceus, folliculo aut vesiculæ similis, succo luteo plenus, acidi gustus, nec ingrati, cuius Omphacij vice ad ciborum condimenta vsus esse possit. Gratianopolitani vocant *Des Argouffes*. Tertium Rhamni genus Marthioli cæteris nigrius est, quinum ferè cubitorum longitudine, infirmioribus aculeis aliis, rectis, aliis incuruis, foliis latioribus, solidioribus, neruosisque: floribus muscosis, subcroceis: fructu tenui, folliculari specie, rotundo, verticillo haud ab-

Lib. l.c. 102.  
Forma.

Nomina

In cap. 102.  
lib. 1.




## RHAMNVS

Primus Matth.



## RHAMNVS secundus


Dodonai, primus  
Pena.

## RHAMNVS

Secundus Matth.



## RHAMNVS secundus

Monspelienſum  
Pena.

mili, in cuius medio nucleus est durus, rotundus ciceris ferè magnitudine, in  
quo semen concluditur, lentis instar compressum, rubro cortice, & alba intus  
medulla



medulla. Secundum genus cæteris candidius est. Hæc Matthiolus, Penæ Rhamnus primus frutex est in Italiæ, Galliæ, & Hollandiæ, maritimis locis multis nascens, ab imo ad summū ramosus, aculeatus, surculis albidis, foliis angustioribus, multis, Chamælaæ longioribus, fructu iuxta alas denso, racematim congesto, Asparagi, aut Agrifolij, minore, succo flavo turgido. Hunc pro Rhamno secundo Dodon. pinxit & descripsit. Idem Pena Rhamnum secundum Mompeliensium, magis exquisitè Dioscoridis notis respondere ait, quam secundum Matthi.

*RHAMNUS 1. Clusij.*



Tota planta alba est, cortice ex viridi pallescēte, foliis Oleæ, sed candidioribus, floribus minoribus. Clusius Rhamnos tres exhibuit. Est autem primus frutex faciēdis sepibus idoneus, ramis rectis, in multa virgulta sese findētibz, candidis, validis ac firmis aculeis rigentibus, foliis plerumque quaternis aut quinis ad singularum spinarum exortum, oblongis, subpinguibz, Oleæ similibus, subalbidis, teneris, & succulentis, quæ Autumno novis succrescentibus, interdum decidunt: flores longiusculi, candicantes, extremis oris in quinque crenas diuisi, quibus dilapsis quoddam seminis rudimentum ut in Iasmino relinquitur. Radix subest crassa, & multiplex. Istius generis alium

Libr. stirp.  
Hispa. c. 16.

se obseruasse ait, similem ferè, sed humiliorem, & frequentioribus ramis fru-

*RHAMNUS*

*Alter Clusij.*



*RHAMNUS*

*Tertius Clusij.*



ticosum



ricosum, minoribus foliis, & magis carnosus, falso gustu superiore cãdidiorem, floribus eiusdem formæ, sed purpureo planè colore. Prior in multis Hispaniæ, Lusitaniæ, Galliæ Narbonensis locis gignitur. Illius alteram speciem vno tantum loco se inuenisse ait, iuxta Orcelimum urbem, ad flumen Serabin, vt Valentini regni extremis limitibus. Secundus eiusdem frutex ramis est & virgultis flexibilibus, spinarum etiam vallo horrentibus, angustioribus foliis, neque adeo carnosus, perpetuis, flore Oleæ herbaceo, circa ramos frequenti, fructu rotundo, per maturitatem flauescente, totaque hyeme in frutice perdurante. Totus verò frutex puluere obsitus videtur. Is in maritinis Belgicis, & quorundam montium vallibus iuxta amnes, vt & superior prouenit. Tertium addit fruticosum, frequentibus ramis, spini magnitudine, cortice nigro tectis, & spinis longis armatis, folia ex quibusdam tuberculis, vt in priore, multa simul exeunt, oblonga, angusta, carnosæ, colore viridi, gustu adstringente, & Rhabarbari saporem satis referente, semper virentia. Flos veris initio paruus, iuxta folia plurimus, & cõfertim nascens, colore herbaceo: æstate nigrum fructum fert Pruno syluestri similem, rotundum, acerbum. Hunc frequentem Granatensi & Murciano regno locis incultis inuenit inter alios frutices. Pro Rhamni etiam genere spinosam plantam Germanus quidam rei herbariæ studiosus ex Ingolstadio Dalechampio attulit, quam Rhamnum Bauaricum vocabat, quod alius aptius nomen non inueniret. Hæc planta, vt narrabat, hominis altitudinem superat, cortice est purpurascens, spinoso, foliis densis, pallidis, omnibus serratis, sed aliis longioribus & angustioribus, prima scilicet ramorum parte, nec llici absimilibus, aliis breuioribus & rotundioribus circa ramorum extrema, Rhois folia utcumque emulantibus, spinis multis, tenuibus, sed acutissimis, foliosis, vt in primo Rhamno Matthioli. Spinifarum enim stirpium, (Cuius rei lectores hinc admonuisse prodest) quibusdam exerta, foliisque nudæ sunt spine, vt Paliuro, Mespilo, Oleastro: aliis furculi foliosi in rigidas spinas mucronati desinunt vt in hac planta, Rhamno primo Matthioli, & nonnullis aliis. Rhamnus auctore Galeno, desiccatur & digeritur ordine secundo, refrigeratur primo completo, aut secundo incipiente. Proinde hirsutitas sanat & erysipelata, non magnopere calida. Cæterum ad hoc teneris utendum est foliis. Sic etiam Dioscor.

## RHAMNVS

Bauaricus.



Li. 8. simp.

Vires.

Li. 6. falso.

omnium folia erysipelatis & serpentibus vlceribus efficaciter illinuntur: fama est ramos eius valuis fenestrisque impositos veneficia depellere: quas vires Ouidius Spinæ albæ, quæ Rhamnus est, vt diximus, seu Virgæ Ianali, quæ eadem est, tribuit his versibus.

*Sic fatus spinam qua tristes pellere posses.*

*A foribus noxas, hæc erat alba, dedit.*

Et paulo post,

*Virgæ Ianalis de spina sumitur alba*

*Qua lumen thalamis parua fenestra dabat.*

DE



DE PALIVRO CAP. IX.

**P**ALIVRI qui *παλίσπος* Græcis dicitur, vnius duntaxat meminit Dioscorides. Alij plura fecere genera, Imprimis Theophrastus ita scribens. Paliuri differentia quædam sunt, omnes quidem fructifera: ac rursus Paliurus velut in siliqua foliosa fructum habet (sic enim legenda Græca, ἐν λοβῶ τινὶ τὸν καρπὸν ἔχει καὶ ὁμοίως τῷ φύλλῳ, pro τὸ φύλλον vt in vulgatis legitur: alij legunt τῇ φύσσει, idest in vesica, alij θυλακίῳ, folliculo: alij, καὶ ὁμοίως σφονδύλιον, idest veluti verticillum, vt in Dioscoride) in qua terna aut quaterna semina gignuntur, quibus tussis medici contra tussim vtuntur: habent enim lentum quiddam & pingue veluti Lini semen. Nascitur locis humidis, atque etiam siccis, sicuti Rubus: non minùs autem iuxta aquas provenit. Foliis est deciduis, non perpetuis, quemadmodum Rhamnus. Idem alibi. In Africa Loti vt & Paliuri maxima copia est: Et mox: Paliurus Loto fruticosior est, folio huic nostrati similis, fructu diuerso, non enim lato, sed rotundo, Cedridis magnitudine, aut paulò maior, nucleum habet qui non simul manditur, acinorù Mali Punici modò: fructum verò suauem, quem si vinò infundas, tum se ipso suauior redditur, tum vinum suauius, reddi aiunt, quæ breuius conuertit Plin. Cyrenaica regio Loton suæ postponit Paliuro. Fruticosior hæc, fructu que magis rubens (magis in Theophr. nò legitur) cuius nucleus non simul māditur, iucundus per se (fructus subaudi, ex Theophr.) atque è vino suauior, quin & vina succo suo cōmédans. Hæc Plinius. At Paliurus Agathoclis, auctore Athenæo, arbor est magnitudine Vlmò aut Pino nò inferior, ramis frequentibus, longis, non nihil spinosis, folio tenero, virente, figura rotundo, fructu valde dulci, magnitudine Oliuæ Phauliæ, carne, & osse illi simili, sed gustus suauitate præstanti, quem anno bis, Vere & Autumno profert. Is recens estur, cū autem siccatus fuerit, in farinam molitur, quam nec manibus subactā, nec aqua perfusam, sed negligenter, qualis est, pedibus cōculcatā reponunt in cibariū quotidianū. Ex his tribus generibus

Genera.  
Lib. 3. Hist.  
cap. 17.

Lib. 4. Hist.  
cap. 4.

Lib. 13. c. 19.

Li. 14. cap.

Li. 1. c. 104.

Lib. 15. c. 3.

Paliu. 1.

PALIVRVS  
Rhamnus 111. Matth.



Diosco. Paliurus, notus est frutex, aculeatus, durus, cuius semen pingue & fuliginosum est, si rectè λεγνύδες legatur. In duabus posterioribus descriptionibus non videntur congruere folium rotundum Paliuri Agathoclis, at in Paliuro Africano, vulgari simile: itē duplex quotannis in Agathoclis Paliuro fructuum prouentus, & eorundem magnitudo, Oliuæ Phauliæ par; omnium grandissimæ, quam & Regiam, & Maiorinem ideo vocant, auctore Plinio, non sylvestris: vt exposuit Anguillara, cū superioris Paliuri fructus Cedridibus æqualis sit magnitudine, aut eas parum excedat. Quare diuersa hæc Paliuri genera esse necesse est. Paliurus primus Theophrasti, Anguillare sententia, frutex est Italiæ & Græciæ familiaris, tertia prorsus Rhamni species, in textu Dioscoridis significata. Nascitur enim locis, tum aquosis, tum siccis, hic frutex, est valdè spinosus, foliis Ziziphi sylvestris, sed latioribus & rotundioribus, & qua parte pediculo hærent, fuscioribus: multos ramos à terra summittit, quaternum aut quinum cubitorum altitudine,



ne, furculosos, colore Castaneæ, quo & Spinæ, quæ semper binæ sunt, altera recta superiore, altera adunca inferiore: fructum edit latum, rotundum, in medio aliquantulum tuberosum, figura verticilli, in ramulis copiosum, initio ex viridi albicantem, cum inaruit fuliginosum (quod de semine legitur in Dioscoride, non de eius operimento) ternis aut quaternis seminibus intus conclusis, Lino & figura & magnitudine similibus. Hic frutex non alius esse videtur, quàm Paliurus primus Theophrasti, nec non Paliurus Dioscoridis, qui etiam nū hodie in multis Græciæ locis nomen retinuit, sed corruptum: nam Apalizu & Paliru nominatur. Hæc Anguillara. Cui assentiuntur multi periti herbarij. Eundem esse Paliurum Theophrasti, & Paliurum Dioscoridis, demonstrant facultates eadem huic ab utroque assignatæ: præterea semen utriusque pingue & Lino simile: est enim legendum in Dioscoride λίνω ὁμοιον, vel quidpiam simile, non λυγνώδες, idest fuliginosum. Cum etiam Rhamnus tertius Dioscoridis, pleræque notas habeat, quas Theophrasti Paliurus, verisimile est illius descriptionem Paliuri descriptioni adiungendam, ideoque Rhamnum istum tertium Dioscoridi falsò adscriptum fuisse. Est igitur multorum sententia, tertius Rhamnus Dioscorid. & Theophrasti Paliurus, frutex quem pro Rhamno tertio pinxit Matthiolus. Hanc sententiam confirmant Mompelienfes Medici, Paliurum nominantes, & seminum eius vim diureticam, ad comminuendos & expellendos calculos efficacissimam longo usu, felicissimisque successibus experti. Quod etiam ita scribit Dioscorides. Paliuri semen potum tussi auxiliatur, vesicæ calculos comminuit, serpentium ictibus aduersatur, folia & caulis adstrictoriam vim habent, quorum decoctum potu aluum sistit, urinam trahit, contra venena & serpentium morsus auxiliatur. Radix recentia tubercula, tumoresque omnes discutit, trita, & imposta. Huic de Paliuro sententiæ refragari quædam videntur. Primum quod ait Theophrastus. Paliuri semen ἐν λωβῶδι contineri, idest, in siliqua longa, carnosâ, ut in faba, non lata & corticosa, ut in hoc frutice. At λωβὸς non folliculus tantum lōgus & carnosus dicitur, sed omnis folliculus, & cuiusvis figuræ, λωβὸς igitur siue folliculo siue siliqua, Paliuri semen includitur, sed peculiaris naturæ, & ab aliis diuersæ, ut quæ foliosa, & membranea substantia sit, ac lata. Quamobrem euidentius exprimere Paliuri semen Theophrastus non potuit, quàm cum dixit Paliurum fructum habere foliatum, qui folliculo continetur. Alterum est quod dixit Theophrastus Aceris fructum oblongum esse, & pennatum, Paliuro similem. Huius igitur testimonio Paliuri fructus oblongus fuerit, non rotundus. Quæ ratio æquæ facile ac prior refellitur. Magna enim est Aceris fructui cum fructu Paliuri similitudo, non inuolucris rotunditate, nec verticillata figura, sed quod duriusculum semen, ut in Paliuro, membraneo tegumento operiatur, oblongo, & alis grandiorum muscarum simili, sed non tam oblongo in Paliuro, miranda Theophrasti diligentia, qui cum dixisset Aceris τὸν χειρπὸν ὃ λείαν μὲν προμήκη, περιμοιον ὃ τῷ παλίωρῳ, idest Aceris fructum non valdè oblongum, Paliuro tamen similem, statim subiicit, πᾶν προμήκερον, idest in Acere oblongiorem quàm in Paliuro, in quo rotundus est. Hactenus de primo Theophrasti, & Dioscoridis Paliuro. Agarthoclis verò Paliurum sibi esse incognitum scribit Anguillara, nisi sit ziziphus. Idem Paliurum Africanum Theophr. ziziphum sylvestrem esse arbitrat, quod Paliuro nostrati, de quo modò diximus, similis sit, non modò folijs, sed etiam ramis, & aculeis. Est enim ziziphus sylvestris, frutex quatuor, siue quinque & plures cubitos altus, ramis in terram sic inclinatis, ut in semicirculum intorti esse videantur, crassioribus spinis, & similiter acutis, semper binis, ita prorsus dispositis quemadmodum in nostrate Paliuro: folijs sicut in Sorbo

Vires.

Lil. c. 104.



Sorbo collocatis, fructu Iuiubis mitibus simili, nisi multo minor esset, & ad Oxycedri vel Lauri fructum magis accederet: maturus rufescit, & manditur, sed non cum nucleo, quia ossea est duritie. Sunt qui etiam Paliurum Africanum Theophr. & Ægyptium Agathoclis eundem esse existimant, vtrūque verò nostrā Ziziphum, quorū hæc sunt coniecturæ. Paliurū in Aphrica semper extitisse scriptorū omniū veterū monumentis constat: Ziziphū quoque Aphricæ peculiarē fuisse, & D. Augusti nouissimis tantum temporibus, inde à Sexto Papinio in Italiā aduectā Plinius scriptū reliquit. Quamobrem Dioscor. qui sub Antonio vixit homo natione Græcus, sed Romanæ ciuitatis incola, cū adhuc Italiā peregrina foret suo sæculo, nec eam cognouit, nec in opere suo celebrauit. Theophrastus in recensendis externis plantis, quas aut vidisset, aut ab alijs descriptas sciisset, diligens admodū, Ziziphi mentionē nusquam fecit, nec ullus quidem eorū qui eius memoriam aut antecesserūt, aut secuti proximē sunt. Causam esse putant, quod Græcorū, qui primi in Aphricam nauigantes eam arborem conspexerunt, cū ignorarent eius nomen, ob similitudinem quam cū Paliuri Græci folijs habet, Paliurum Aphricanum nominarunt: reliqui iis posteriores eodem nomine vti maluerunt, sibi facili, ac pronūciantibus non molesto, quā̄m barbara, & insolita voce Ziphziphī, qua fortassis tum Aphricani, vt verisimile est, eam arborem nuncupabant, nomine postea à Romanis recepto, sed linguæ suæ accomodato. Cum ergo nunquam Zizipho caruerit Aphrica, cuius fructus ad alenda seruitia in maximo vsu est illius populis, & gentibus, quod etiam apparet ex eorum historia, qui nuper Aphricæ ritus & mores enarrarunt, gustu palmulis, & vuis passis, haud absimilis, seruīque alendis idoneus, vt est eius regionis mos, & Paliuri Aphricani historia nostræ Zizipho foliorum figura, fructūsque specie optimē quadret, Paliurum Theophrasti & Agathoclis nostram Ziziphum esse non absque ratione arbitrantur, haud tamen præfractē aliorum sententiæ & iudicio, qui meliora proferent repugnaturi. Quod si hunc Paliurum alium esse, quā̄m Ziziphum existimandum sit, nullam aliam magis ad eius naturam accedere putant, quā̄m Rabich Arabum Aphricanorum, aut alteram à Ioanne Leone descriptam capite de Hain Elchallu. Rabich, inquit capite de Zarfa, spinosa arbor est, fructu minore quā̄m Cerasi, sapore fermē Ziziphorum. Idem loco citato de Hain Elchallu. Nascuntur illic Corni, & arbores multæ spinosæ, fructu terete, luteo, simili Ziziphis, nucleo maiore quā̄m Oliuæ, gustu non admodum grato. Hæc Dalechamplus, huius sententiæ tacitis autoribus.

Lib. 15. c. 14.

RHAMNVS CATHARTICVS,  
sive Spina infectoria, CAP. X.

**R**UTEX iste aculeatus, Rhamnus Catharticus vulgo dicitur, non quod Rhamnus sit, aut vlla ei cum Rhamni generibus à Dioscoride & Theophrasto traditis affinitas, est enim Pruno sylvestri similior quā̄m Rhamno, sed quod, vt Rhamni, spinis horret, eique spinis tantum non nihil similis est. At cum ei nullum nomen à veteribus positum sit, Matthiolo Spinam infectoriam appellare libuit. Hetrusci *Spino merlo*, Longobardi Venetique *Spin ceruino*, Foroiulienfes *Spin guerzo* appellant, Galli *Bourgespine*, & *Nerprun*, Germani *Uegehedorbeer*, à viis, quia nusquam maiore copia inuenitur, quā̄m in dumetis secus vias sitis. Frutex est caudice tibiæ hominis crassitudine. Cortex illi subniger, & nitidus, qualis Ceraso, intus virens, post luteus: lignum extra candidum, interior medulla rubet. Eo validos arcus nostri fabricant. Rami spinis duris, acutis, & pungentibus rigent. Folia lata sunt, Piro quadantenus similia: flores albi, baccæ rotundæ, Myrtis similes, initio foris

Nomina

Forma



## RHAMNVS

Catharticus.

Vires.



virides: maturæ verò foris nigrae, intus virides ob id colore eo pingentibus idoneæ: iis enim aqua dissolutis in qua liquatū Alumen sit, color viridis fit, qui Gallis *Verd de veschie*, dicitur: iisdem non maturis in eadem aqua dissolutis color luteus. Huic succo vis purgatoria inest. Fit ex eodem quæ diu asseruari potest compositio, hoc modo. Succu baccarum leniter tularum quatrinduo in fictili vitreato per se maceratarum in loco calido, libras duas prælo extrahito, quibus addito Sacchari optimi sesquilibram, vel Mellis selecti probe despumati tantumdem: lento igne decoquito ad Zulapij, vel serapij crassitudinem, linteolo rariore colato: admiscetóque pulueris Cinnamomi selecti, Zingiberis singulorum drach. quatuor, Caryophyllorum drach. duas, mundoque vasculo confervato. Datur vnciæ pondus, & vsque ad drachmas decem. Eductit facillè pituitam, inquit Matthiolus, & crassos ac lentos humores. Alij contra, inquit Pena non ad pituitam crassam ac viscidam, sed potius tenuem educendam, & impetum eius in

articulos citatum auertendum, & cohibendum, prudentius vtuntur. Nam sine caliditate molesta purgat, & nonnulla vi adstringendi partibus robur conciliat, neque liquefacit humores, vnde maior fluxus subsequatur. Quare podagricis optimè confert. Alij baccas in pila lapidea contundunt, dein exprimendo percolant: succum expressum coquunt lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum colant. Excolati huius & iam crassioris facti succi libram vnâ accipiunt, mellis despumati vncias octo: coquunt vnâ, donec syrupi bene cocti crassitudo fiat. Coctis, & iam prope auferendis ab igne, iniiciunt mastiches, Cinnamomi optimi singulorum drach. duas, seruântq; in vsum. Exhibetur aliquando dissolutus vino, aliquando iure carnis. Serosos humores educithic syrupus, vt & prior, aliqua ex parte biliosos, minùs pituitosos, crassosque. Frutex, hic Maio mense floret. Septembri maturæ sunt baccæ, aut Octobris initio.

## AQUIFOLIUM,

CAP. XI.

Lib. 16. c. 6. &amp; 8.

Nomina

Lib. 16. c. 24.

Lib. 16. c. 21.

Lib. 16. c. 18.

Lib. 3. Hist.

capi. 4.

Lib. 27. c. 8.

**A**QUIFOLIUM. Vm Plinius in provinciis Aquifolias Ilices appellari scripsit, indicasse videtur Ilicis folia perinde vt Aquifolij lateribus sinuosa & spinosa esse, neque enim Ilicis species est Aquifolia, quia glandifera non est, natalisque Ilicum feraces adeoque æstuosos odit: tamen, quemadmodum Ilex, folio perpetuo viret. Sylvestrii generis, inquit, folia non decidunt Ilici, Aquifolio, &c. Theoph. τῶν δὲ ἀγέλιων, ἀειφυλλὰ πρῶτος, ἀγέλια, &c. quo loco ἀγέλιων Aquifoliam rectè vertit Theodorus. Plinius. Montes amant Cedrus, Larix, &c. Item Aquifolia, Buxus, Ilex. Theophrastus ἰδία ἢ τῶν ὀρενῶν ἐλαφύνη, πεύκη, πῖτρυς, ἀγέλια, &c. Id est, montibus propria sunt Abies, Pinus, Picea, Aquifolia, &c. Quare cum his & aliis locis τὴν ἀγέλιαν Theophrasti Plinius, & eum imitatus Gaza Aquifolium interpretetur, eandem planè stirpem esse iudicamus. Sed id silentio non prætereundum videri Aquifoliam apud Plinium etiam pro alia stirpe accipi, cum ait: Theophrastus arboris genus intelligi voluit



luit Cratægonum, siue Cratægona, quam Itali Aquifoliam vocant. At Pliniū hic vehementer errasse periti omnes herbarij existimant, *ἀγελαν* quoque apud Theophrastum pro alia arbore idem videtur significare, cum scribit, Arcadum Phellodryn Dorum esse *ἀγελαν*, sic enim legit Gaza, & agrestem conuerti. Verū in vulgatis exemplaribus pro *ἀγελαν ἀπλαν*, exaratum reperias. Hic etiam scrupulum iniicit Theophrastus, cum scribit Suberem fructum ferre glandosum, vt vertit Gaza, similem Aquifoliæ, cum Aquifolium baccas ferat. Sed eum facile eximet emendata eius loci lectio, quæ est, *χαρπὸν ὃ φέρει βαλανώδη, ὅμοιον τῇ ἀπλᾷ*. Id est, fructum fert vt Glandem, Phellodryi similem, quæ Dorum est *ἀπλᾷ*, cuius paulò ante meminit. Eam non rectè Ruellius cum Agria confundit, pro Illice Aquifolia, inquit, à Doribus vsurpata. Nec probanda est eorum sententia qui Aquifolium, de quo hic agimus, Paliurum Dioscoridis esse censent. Hoc enim semen folliculo inclusum habet, pingue, & fuliginosum, illud baccas rubentes. Estigitur Aquifolium Ruellij, Dodonæi, Tragi, Matthioli sententia, quod of-

Lib. 3. Hist. cap. 16.

Ibidem.

Lib. 1. ca. 33. &amp; 68.

Lib. 1. ca. 73. &amp; 88. Lib. 6. c. 34. Li. 3. ca. 154. Lib. 1. Diosc. ca. 104.

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

Vires

Lib. 1. Dio. ca. 104.

Li. 24. ca. 13.

Ibidem.

## AQUIFOLIUM.



ficinæ Agrifolium vocant, Theophrast. vt diximus, *ἀγελαν*, Lugdunenses seruatis Græcæ vocis vestigiis Agron, & Agreunon, reliqui Galli *Houx*, & *Housson*, rusticis non ignotum, qui sæpè spinarum iniuriam experiuntur, Itali *Agrifolio*, Hispani *Azebo*: Belgæ *Hulst*: Angli, *Holy*. Germani *Vualddistel*. Frutex est hæc plata, & multis in locis tam pumila arbor, & tam crescendo pigra, vt ad fruticosas plantas potius sit referenda. Aliis in locis in quibus sibi commodam naçta est humum, in iustam arborem attollitur, perpetua fronde virens, caudice, ramisque læuibus, cortice duplici connectis, exteriori viridi, interiore pallido, odoris ingrati: ligno candido, durissimo, grauissimo, quòd Gaiaci modo in aqua fidit, eique non admodum dissimile est. Folia sunt Lauri æmula, carnosa, solida, densa, pungentibus aculeis toto ambitu armata, ex viridi splendentia, vt in Malis aureis, & Medicis, pediculo breui pendentia, saporis non tam ingrati quàm cortex. Flores venusti, albi, parui, plures simul, breuib. pediculis annexi, vt in Lauro, qui quaternis foliolis, & quaternis apicibus constant, in quorum medio baccarum rudimenta apparent. Hæ tandem rotundæ sunt, rubræ, umbilicatæ, paruæ, baccis Oxyacanthæ quodammodo similes, gustu subdulces, cum tetro quodam sapore, quaternis intus nucleis, triangularibus, & striatis. Hoc Aquifolio pleræque Galliarum syluæ scætant. Sæpe etiam in incultis iuxta vias, & inter sæpes cum aliis dumis reperitur. Fructus Septembri mense maturus est, diuque in arbore manet, temperamento calidus. Radicum decocto foueri vtiliter articulos auctor est Matthiolus, qui prius luxati duritiem contraxerint, quoniam id decoctum emollit, resoluit, tumores discutit, ossaque fracta ferruminat. Aquifolia arbor, inquit Plinius, in domo aut villa sata veneficia arcet. Flore eius aquam glaciari Pythagoras tradit, itémque baculum ex ea factum, in quoduis animal emissum, etiam si citra ceciderit defectu mittentis, ipsum per sese recubitu proprius allabi, tã præcipuam naturam inesse arbori. Scribit Dodon. quosdam iactantes se vires Aquifolij.



expertos, affirmare quinque huius baccas deuoratas, aduersus colicos dolores peritiles esse, & aluum mouere. Fit apud nos viscum ex Aquifolio, hoc modo. Huius cortices detrahunt, & facto humi scrobe, locis vliginosis maximè, obrunt, frondibus arborum inuoluentes, & ibi putrescere sinunt, quod ferè duodecim diebus fieri solet, tum marcidos eruunt, & tantisper in pila tundunt, dum in viscum lentescant: demum in profluente, vt obhærentes corticum reliquiæ fordēsque fluitent, proluunt, & adiecto olei nucum momento, fictilibus reconducunt ad aucupia.

## LYCIUM,

## CAP. XII.

Lib. I. c. 114.  
Nomina




LYCIUM Dioscoridi, arbor spinosa, etiam Pyxacantha dicitur, vt & succus, qui ex ea fit: & Lycium quidem, à Lycia, in qua, velut & Cappadocia, magnus erat huius prouentus, etiam si Indicum optimum habeatur, vt ex Galeno dicemus. Pyxacantha verò à Buxi similitudine quadam, cum Græcè Pyxacantha nihil aliud sit, quàm Buxus aculeatus: Arabicè *Hadhadh*, *Hadad*, *Kilulem*, siue *Felzacarag*, Italicè *Licio*. Est igitur

Forma.

Lib. I. Diosc.  
cap. 114.

Lib. I. c. 33.  
Locus.

Lycium arbor spinosa, ramis tres cubitos longis, nonnunquam etiam longioribus: foliis Buxi, densis: fructu Piperis, nigro, læui, amaro, densoque: cortice pallido, non dissimili Lycio madefacto: radicibus multis, obliquis, lignosis. Hunc fruticem appictum, quoniam notis ferè omnibus Lycium repræsentat, vnde etiam Lycium rectè fiat, Brasauoli, Matthioli, Dodonæi auctoritate fretus, non dubitavi pro Lycio hîc proponere. In Liguria Alpius prouenit, & in Dalmatia. Alia est planta Lycio non parum similis, inquit Matthiolus Verona à Calzolario missa, cuius effigiem hîc damus. Pinxit etiam Lobellius Lycium aliud Hispanicum, quod Clusius descripsit his ferè verbis, frutex est spinosus, multas à radice virgas ferens, cubitales, & ampliores, rectas, tenues, rubentes,

LYCIUM  
Alpinum.LYCIUM  
Italicum.


multis



multis ramulis donatas, qui in acutam spinam plerumque desinunt: tamen si alios huc illuc sparsos aculeos habeant, breues interdum & infirmos, nonnunquam verò oblongos, firmos, & multis foliis obritos, folia multo ordine digesta, Myrti Tarentinæ aut Buxi quodammodo æmula, gustu lævia, & cum quadam aciditate mordicantia. Apud Complutum aliisque Castellæ veteris locis, & Beticæ parte, quam Extremaduram vocant, circa fluentia, & decliuibus locis nascentem obseruauit Clusius. Plinius, Spinam ex qua Lycium fit in Græcia pyxacanthum Chironium vocari dicit, in cuius historia aliquantum à Dioscoride dissidet. Fert & Spina, inquit, Piperis similitudinem, præcipua amaritudine: foliis paruis, densisque, Cypri modo: ramis trium cubitorum, cortice pallido, radice lata, lignosaque, buxei coloris. Hac in aqua cum se-

LYCIUM

Hispanicum.



mine excepta in areo vase medicamentum fit, quod vocatur Lycium. Ea Spina & in Pelio monte nascitur, adulteraturque medicamentum. Item Asphodeli radix, aut fel bubulum, aut Absinthium, vel Thus, vel Amurca. Lycium aptissimum medicinæ, quod est spumosum. Indi in vtribus camelorum, aut Rinocerotum id mittunt. Spinam ipsam in Græcia quidam Pyxacanthum Chironium vocant. Dioscorides folia Buxo similia dixit. Plinius radicem buxei coloris, eandemque latam, cum in Dioscoride obliqua esse legatur, vt *ωλασεια* pro *ωλαγρια* à Plinio legi potuerit, sicut & ab Oribasio legitur. Elicitor succus ex foliis vnâ cum frutice tufis, & ad multos dies maceratis, deinde coctis. Tum abiectis lignis liquor itidem coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur id Lycium adiecta decoctioni Amurca, aut Absinthij succo, aut felle bubulo. Innatans spuma inter coquendū exempta, oculorum medicamentis additur: reliquo ad alia vtuntur. Simili modo fit Lycium semine expresso, & insolato. Plinius ex Rhamani syluestris & nigrioris radice in aqua decocta fieri medicamentum tradit, quod vocatur Ly-

Dioscori  
Ibidem.

Li. 24. c. 14.

Cap. 8.

cium, de quo iam diximus. Sed mox subdit, Lycium præstantius è Spina fieri, quam & Pyxacanthum Chironium vocant, qualem in Indicis arboribus diximus, quoniam longè præstantius existimatur Indicum. Coquantur in aqua tufi rami, radicesque summæ amaritudinis, in areo vase, ferè per triduum, iterumque, exempto ligno, donec mellis crassitudo fiat. Quo loco rursus à Dioscoride dissentit, quia ramos & radices coqui scribit, Dioscorides folia cum frutice. Ruellius tamen in versione sua Plinij sensum exprimere maluit quam Dioscor. Rami, inquit, cum radiculis tufis, &c. Cum in Diosco. legisset, *χυλίζου τῶν φύλων* id est, colligitur succus foliis cum frutice tufis, &c. Lycium optimum est, quod vri potest, restinctumque rubentem spumam *καπνοῦ*, id est fumum legit Oribasius ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus, cum fregeris, rufis, odore minimè viroso, cum amaritudine astringens, crocino colore, cuiusmodi Indicum est, cæteris præstantius, & efficacius. Hoc & Galenus confirmat, Lycium hoc in Lycia & Cappadocia plurimum prouenit. Alterum

Electio.  
Dioscor.  
Ibidem.

Lib. 7. sim.  
& 4. med.  
p. cap. 4.



L. l. i. Antid.

Emb. m. li.  
i. Dioscor.  
Lib. i. c. m. 4.

Vires.

Ibidem.

Lib. 7. sim.

L. i. 24. c. 14.

L. l. c. 10.

verò Indicum ad omnia valentius est. Hæ lycij notæ diligenter sunt animaduertendæ, quibus legitimum ab adulterino dignoscamus, etiamsi id facile non sit, Galeno teste. Quare cum id quod passim Officinæ hodie vtuntur, nec igni admotum accendatur, nec intus rufescat, nec vlla eius amaritudo gustu percipiatur, cum denique notis omnibus à vero dissideat, adulterinum esse constat. Alij enim ab impostoribus ex Ligustri fructu, alij ex Periclymeni baccis, alij ex Sanguineæ virgæ Corymbis, alij ex iis omnibus simul contusis fieri tradiderunt. Quod verò Lycium Indicum scripsit Diosc. fieri id ex frutice Lōchitide, Corn. penitus supposititiū esse iudicat, & de Lonchitide herba huc trāslata, de qua infra eadē ferē traduntur. Lycium verū, auctore Diosc. adstringit, caliginē oculorū discutit, genarū scabiē, pruritus, veterēsque fluxiones sanat, facit ad purulentas aures, exulceratas gingiuas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum: cœliacis, dysentericisque potum inditumque conuenit: datur sanguinem excreantibus, & tussi, ex aqua: contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur, flauos facit pilos, reduiuis, vlceribus quæ serpunt, aut putrent, medetur: fœminarum profluua appositum sistit, rabiosorum ictibus ex lacte potum, aut vice catapotij deuoratum, auxiliatur. Quæ postrema apertè corrupta sunt. Cum enim paulò ante de commorsis à cane rabido dixerit, quid attinet statim eadem repetere? Quare in iis quæ in Dioscoride leguntur, ἡ ἡσὶ καὶ ῥῶν γυναικείον προσθεμένον, βοηθεῖ ὁ καὶ λυσσῶν δῆλος, ποθὲν μὲν γὰρ ἄλκιλος, ἢ ὡς καὶ ἀπὸ τῆς λαμβανόμενον, Cornarius has voces redundare putat, βοηθεῖ καὶ λυσσῶν δῆλος, & pro iis particulam ἢ reponendam, vt accipiamus sistere fluxum muliebrem appositum, aut potum cum lacte, aut catapotij modo sumptum. Plinius enim, Bibitur & à mulieribus in lacte contra profluua, perspicuè dixit. Galen. verò, lycium siue Byxanthum, inquit, arbor spinosa, ex qua lycium conficitur id videlicet medicamentum liquidum, quo ad sugillata vtuntur, & sedis orisque phlegmonas & vlcerationes, tum herpetas, putredines, vlcera contumacia, aures purè fluentes, intertrigines, & paronychias. Est autem facultatis exsiccatoria, compositum ex diuersi generis substantiis, altera quidem tenuium partium, digerente, atque calida, altera terrestri & frigida, ex qua adstrictionem habet. Porro hæc qualitas pusilla medicamento inest: digerit verò & desiccet non parum, in secundo scilicet ordine: in calore autem symmetris proximū est. Proinde ad varia hoc vtuntur, vt abstergente quidem: ad ea quæ pupillas obtenebrant vt contrahente verò cœliacis, dysentericis, ac muliebri profluuo adhibentes. Lycij spuma Plinio, ac flos quidam, oculorum medicamentis additur. Reliquo succo faciem purgat, & psoras sanat, erosos angulos oculorum, veterēsque fluxiones, aures purulentas, tonsillas, gingiuas, tussim, sanguinis excretiones, fabæ magnitudine deuoratum, aut si ex vlceribus fluat (sub. sanguis) illitum: rhagadas, genitalium vlcera, attritus, vlcera recentia, & serpentia, ac putrescentia in naribus: suppurationes. Bibitur & à mulieribus in lacte contra profluua. Indici differentia, glebis extrinsecus nigris, intus rufis, cum freris cito nigrescentibus. Astringit vehementer cum amaritudine. Ad eadem omnia vtile est, sed præcipuè ad genitalia. Garcias in Aromatum Indicorum historia, auctor est Cate siue Cato medicamentum esse apud Indos cum amaritudine astringens, arborēque ex qua succus is extrahitur magnitudine Fraxini, folio minuto, Ericæ vel Tamarici simillimo, perpetuo virente. Florere aiunt, sed fructum ferre negant: multis spinis horrere: materia ligni robusta, dura, densa, ponderosa, nec, vt aiunt, putredini obnoxia, siue solibus exponatur, siue aquis immergatur: quam ob causam incolis lignum Semperuium



perituum nuncupant. Hanc arborem Hacchic vocant, cur autem siccum Cate vocent, ille intelligere non potuit. Porro succi extrahendi rationem hanc esse tradit. Ramos huius arboris minutim concisos elixant, deinde contundunt, postremo cum farina Nachani (semen id est nigrum & minutum, sapore Secales, conficiendis panibus aptum,) & cuiusdam nigri ligni, quod illic nascitur scobe (interdum etiam sine eo) pastilli aut tabellæ formantur, quas in umbra siccant, ne solis ardore earum facultas exhalet. Optimum est medicamentum non modò ad confirmandas gingivas, & desiccandum & constringendum, verum etiam ad alui profluvia curanda, oculorumq; dolores tollendos, in quibus plerumque se optimo successu usum fuisse affirmat. Idem auctor hoc Cate nihil aliud esse existimat, quam Græcorum & Latinorum Lycium. Nam eius extrahendi ratio ab omnibus eadem describitur, iisdemque facultatibus pollere, quibus Indicum Lycium, censetur. Huc adde quod Indicum Lycium præfertur à Dioscoride, Plinio, Galeno, Auicenna, & Serapione, qui Hadhath appellant. Hæc Garcias. Sed vnum hoc refragatur, quod & à Clusio annotatum est, Dioscoridi Lycium Buxi folia habere, & pusillam esse arborem, ut alia esse videatur arbor quæ à Garcia describitur. Tamen si non satis sibi constare videatur Dioscorides in Lycij historia, si modo postrema capitis de Lycio pars Dioscoridis sit. Hic etiam

Li. 2. c. 399.  
Lib. simpl.  
cap. 7.

LYCIVM

Dalechampi.



plantam secundo loco pictam, haud absurdè Lycium dici posse Dalechampus arbitratur. Est enim Spina tres cubitos alta, cortice in cinereum pallescente, radicibus multis, lignosis: foliis densis, figura Buxo non dissimilibus, colore, crassitudine, venularumque ductu ad Prunum vtrumq; accedentibus: aculeis multis, rigidis, foliosis, fructu Piperis magnitudine, nigro, adnexo breui pediculo, nunc triangulo, nunc quadrangulo, nunc cordis figura, pro nucleorum numero, è cuius fastigio pilus duplex subtilissimus eminet, gustu astringente & valde amaro. Baccis ad tingendum aureo colore sericum infectores vtuntur, easque vocant Tinctorium granum, *Graine a teindre*, aut flauum granum, *Graine iaune*, aut Auenionense granum, *Graine d'Auignon*. Id quod de Lycio Dioscorides prodidit, nimirum *ἔαυθις δὲ τὰς τοῖχας*, flauos reddere pilos, facit ut credam, quod & multi asserunt, verum Lycium quamuis hæc planta non sit, eius succosis nos vtamur, eosdem effectus deprehensuros, quos veteres suo Lycio tribuerunt. In asperis & saxosis circa Auenionem & Carpentoracte locis prouenit.

Forma.

Locus.



Nomina

Forma

Lib. 1. c. 118.

Vires.



OLEASTER, olea sylvestris & Æthiopica dicitur, Græcis, ἀγριέλαια, κρότινος, ἀιθιοπική, ἐλαία. Olea domestica fere similis est, sed foliis paulo minoribus, inter quæ pungentes aculei multi: fructus etiam minor, qui difficilè maturefcit. Quod ex eo elicetur Oleum viride est, & immaturū, cuius in Galliæ Officinis nullus est vsus. Dioscorides tamen diuersas Oleastri partes, multos & diuersos in medicina præbere vsus ostendit.

## OLEASTER.



Folia, inquit, adstringunt: trita, & imposta ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, epinyctidas, carbunculos, reduias, nomasque cohibent: crustas emarginant cum melle illita: quinetiam sordida vlcera repurgant, inflammationes panósque cum melle illita discutunt: cutem à capite vlsam conglutinant: oris vlcibus, & priuatim infantium, comanducata medentur. Succus & decoctum eisdem habet effectus: Sanguinis eruptiones ac muliebri profluuium admotus succus inhibet: vix oculorum, pustulisque prodest: vlcera, & veteres defluxiones sistit: quapropter in collyria additur, ad palpebrarum erosiones perquam utilis. Exprimatur succus tuis foliis, affuso vino, aut aqua, siccatusque sole, in pastillos digeritur. Sed longè validior, & ad recondendum aptior succus habetur, qui cum vino, quàm qui cum aqua expressus est: auribus subuenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia conuenienter cæliacis cum farina hordeacea illinuntur. Vruntur cum floribus folia, vt Spodij vicem cinis præstet, in cruda

Lacryma  
oleæ Æthiopica.

Vires.

Lib. 2. mor.  
mul.

Li. 17. c. 24.

Lib. 23. c. 7.

Lib. 1. Dioscor. ca. 119.

Lacryma

oleæ Æthiop. non

est gummi

elemni.

olla, oblito ore luto, vsque dum figlinum percoquatur: restinctaque vino, & rursus subacta eodem modo vruntur. Postremò cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum, constat spodio non cedere, sed iisdem viribus præditum esse. Oleum sylvestris oliuæ gingiuis putri vligine laborantibus colluitur, dentium mobilitates stabilit: calfacti & ex colati foci gingiuis fluxione laborantibus utilis est: lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis ad mouere, donec albæ spectentur. Oleæ Æthiopica lacryma Scammonio quadam tenus similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. Quæ autem Ammoniæ aut Gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostates Oleæ Oleastriq; similem lacrymam sudant, quæ commodè ad oculorum hebetudines illinitur: cicatrices, albuginésque illitu emendat: yrinam & menses ciet: cauis dentium impressa, ad dolorem efficax est. Inter venena scribitur, aut vt quidam interpretantur, numeratur inter ea quæ foetum corrumpunt: partus pellit: lepras & impetigines sanat. Hippocrates ad fluxum rubrum inter reliqua medicamenta ὤραν ἀγριελάας, id est oleæ agrestis scabiem habet: sicut enim Plinius ὤραν morbum arborum interpretatur. Idem limum vel lichena appellat. Sylvestris seu Æthiopica Oleæ lacryma licet multis polleat viribus, inquit, Matthiolus, eius tamen in Officinis nullus est vsus, neque vlla ad nos adfertur. Sed sunt qui hanc esse putant, id quod recentiores medici



medici & Officinæ Gummi Elemni vocant. Illos vehementer errare gustatus ipse indicat. Neque enim mordax est id Gummi, neque linguam vellicat. Gummi verò improprie dici, cum in Resinarum genere sit potius, ex eo intelligi licet, quod igni exposita hæc lacryma, statim colliquescit, ac diffunditur, non aliter quàm Resina quæ ex Pinu, Picea reliquisq; resiniferis stirpibus manat. Nul- lum autem Gummi genus igni liquatur, nisi addito aceto, aut vino, aut liquore alio, sed vritur. Cæterum etsi nobis prorsus ignota sit planta, ex qua in Oriente hæc Elemni lacryma provenit, tamen notissimæ sunt Chirurgis eius vires. Ea enim in emplastris & vnguentis ad caluaria fracturas, & vulnera sananda vt præstantissimo vtuntur medicamento. Est & alia, auctore Theophrasto, Oleæ maris rubri lacryma, ex qua medici ad cruenta recentiaque vulnera medica- mentum componunt præstantissimum.

Vires gū-  
mi Elemni

Li. 4. Hist.  
cap. 8.

## PHILLYREA, CAP. XIII.

**T**HEOPHRASTI Phillyram à Dioscoridis Phillyrea plurimum distare nemini iam dubiū est, id quod maxime descriptiones confir- mant, vt fusius diximus, cum de Tilia ageremus. Est enim Philly- ra procera, crassaq; foliis latiusculis, modicè serratis, ferè Hedera- ceis, at Phillyrea Dioscoridi arbor est Ligustri tantum magnitudine, foliis Oleæ nigrioribus, latioribus: fructu Lentisci, nigro subdulci, racematim coherente.

Forma.  
Lib. 1. cap. 108.

## PHILLYREA

Matthioli.



In asperis nascitur. Hanc Matthiolus Philly- reæ Iconem proposuit tantum, nō descripsit, quia descriptioni Dioscoridis haud parum conuenire videatur: non affirmat tamen legiti- mam esse, quod eius baccæ subdulces non sint. Pena pro Phillyrea *φιλυραία* dicere ma- uult, id est Oleæ amasiæ, vt ait, quod Oleæ non modò similis sit, sed etiam socia, vt ab Oleastris quibuscum frequens nascitur, nihil ferè discrepet. At potius *φυλεραία* dicas, id est folio Oleæ similem. Huius ille genera duo descripsit, & depinxit, quæ arborescunt in Gal- licæ prouinciæ viarum marginibus, & Oliue- tis Monspelio vicinis. Maior & rarior, persi- milis est pumilæ Oleæ, caudice, ramisque ni- grioribus, longioribus quàm Oleæ agrestis, folio magis ad Ligustrum accedente: baccis exiguis multis, è ramis prodeuntibus cum suo pediculo, minoribus quàm in Oleastro, non amaris, vt in oleastro, sed subdulcibus, nucleo intus Cerasi. Minor multò frequentior in iis- dem natalibus & Monspelij collibus glareos- sis, folio æquè longo, sed angustiore duplo.

Est etiam duplo minor tota plâta: acini simi- les lentiscinis, & similiter racematim proximè hæretes, breui admodum pedi- culo, qui maturi subdulces fiunt, aliquantùm acres, sed non ingrati vt Oliuæ fatiuæ, & agrestes. Has duas Alaterni nomine, in fine huius libri exhibuimus. Serapi Mahaleb describens, totum Dioscoridis de Phillyrea caput transcrip- sit. Sed planta, inquit Matthiolus, quam nonnulli Mahaleb vocant, cuius bac- carum nucleis Vnguentarij ad odores conficiendo vtuntur, Dioscoridis Phil- lyreæ

Cap. 44.  
simpl.  
In cap. 108.  
lib. 1.



lyreæ respondere non videtur. Nam hæc folia habet Oleæ, sed latiora, baccas racematim cohærentes, quæ notæ in Mahaleb hîc appiçto non reperiuntur.

### MAHALEB

Matthioli.




Verùm vt Mahaleb illud, cuius nucleorum Vnguentariis est vsus, negat Phillyream esse Matthiolus, ita legitimum esse Mahaleb, de quo Arabes scripserunt, multis rationibus persuasus credit. Arabes enim quos citat Serapio suo Mahaleb facultates à Phillyreæ facultatibus multùm diuersas tribuunt, quoniam Phillyrea Dioscoridi adstringit Oleæ agrestis modo; Serapionis vero, Abë Mesues & Rhafis testimonio Mahaleb calfacit, & emollit, id quod vulgaris Mahaleb nucleos, quibus vnguentarios vt diximus, euidenter præstare ait Matthiolus. Nam cutis asperitatem duritiemque læuigant, & emolliūt illiti, affrictiue: ex quibus colligit rectè eos sentire, qui plantam hîc pictam genuinùm Arabum Mahaleb esse arbitrantur. Quod, si verum est, non parum hallucinatus fuerit Serapio, qui putarit Arabum Mahaleb, Dioscoridis esse Phillyreæ, præsertim cùm Arabas citet, qui Mahaleb vires assignent, tum eas quas diximus, tum ventris tineas pellendi facultatē, quæ Phillyreæ minimè insunt. Pena Phillyream aliam de vi-

ua arbore expresit, quam hîc depinximus. Hanc prorsus refert maior priorq; illius Phillyrea hoc capite descripta. Reperitur in Gallica prouincia circa Tholonum. Æquat scapo, & sparsis stolonibus

### PHILLYREA

Mahaleb Serapionis.



Vires.

Lib. I. c. 108.

Prunū & Cerasum, folio planè Phillyreæ, aliquanto latiore: flos Illicis muscosus, albidus: & plusculæ vna aceruata & congestæ baccæ, Terebinthi, maiores, nigricantes, herbida, subdulces, nucleis, quales prorsus prostant hodie in Officinis nomine Mahaleb. Hæc, verius Serapionis Mahaleb, id est Phillyrea fuerit. Phillyreæ folia adstringunt, auctore Dioscoride, ad eadem vtilia, ad quæ Oleaster, cum adstrictione opus est: maximè ad oris vlcera, commanducata, aut si decocto dentes colluantur. Pota vrinam ac menses cient. Alias Clusi Phillyreas adiungimus illis pridem à nobis declaratis. Priorem Illice coccifera proceriorem, ramis pollicem & amplius crassis, cortice viridi, sed albicantibus, maculis asperfo, foliis Illicis coccifera, maioribus, viridioribus, densioribus, in ambitu nonnihil spinosis, gustu adstringente, sed sapore non ingrato. Fructus Lentiscino maior non est, ex foliorum alis dependens, niger cum maturuit. Hanc altera magnitudine superat



PHILLIREA

secunda Clusij.



superat, multos proferens ramos, candicante cortice obductos, folia ei frutici quem ille pro Alaterno maiori, nos pro Apharca depinximus, ferè similia, sed firmiora, & minùs nigricantia, sapore aliquantulum acri, cum quodam amarore. Fructus Decembris initio racematim inter folia propendere visus est, magnitudine granorum Piperis, aut baccarum Myrti, niger, calidus, nucleum osseum & durum cortice candido & fragili opertum contegens. Præter has, tertiam & quartam Phillyreas Clusius ostendit, easdem cum Penæ Phillyreis maiore & minore, supra memoratis, quas alibi pro Alaterno descripsimus.

CAPPARIS, CAP. XV.



T *κάνταρις* Græcè, ita Capparis Latinè nominatur. Quidam, teste Plinio, Cynosbaton appellarunt, quod, opinor, quædam illi sunt cum Cynosbato cõmunia: alij

Nomina  
Lib. 13. c. 13.

Ophiostaphylen, id est Vuam viperinā, pro qua in nothis Dioscoridis Phyllostaphylen legimus. Gaza Inturin vocauit, Arabicè *Cappar*, siue *Kappar*, dicitur, Italice *Capparo*, Gallicè *Cappres*, Germanicè *Kappern*. Hispanicè *Alcapparas*. Fructus est aculeatus, cum humi sternitur, ac iacet: huc illuc in orbem euagatur. Spinas ut

Forma.

CAPPARIS.



CAPPARIS folio Acuto.



Rubus



Rubus habet in hami modum aduncas: folia Mali Cotoneæ, rotunda: fructum Oleæ similem: is cum dehiscens panditur, florem candidum promit, quo excusso non nihil Glandis oblongæ figura inuenitur, quod apertum grana Acinis punicorum similia ostendit, parua, rubicunda. Radices lignosas spargit, grandes, numerosasq; Capparis retuso folio hîc picta est: item altera folio acuto, ea sola varietate à priore discrepans. Tenui plerumque solo, asperisque locis, in insulis, & inter rudera nascitur. In cultis Capparim provenire negat Theophrastus. Qua de causa inter frutices & dumos eam reposuimus. Seruntur tamen, columnæque perinde ac segetes & legumina. Plinius. Quippe cum Capparis quoque seratur siccis maxime, area in defossu cavata, ripisq; vndiq; circumstructis lapide: alias euagatur per agros, & cogit solum sterilefcere. Columella. Capparis in plurimis provinciis sua sponte in hortalibus nascitur. Sed quibus locis eius inopia est, si serenda fuerit, siccum locum desiderabit: q; debet ante circumdari fossula, quæ repleatur lapidibus, & calce, vel punico luto, ut sit quasi quædam lorica, ne possint eam perumpere prædicti seminis frutices, qui ferè per totum agrum vagantur, nisi munimento aliquo prohibiti sint. Quod tamen non tantum incommodum est (subinde enim possunt extirpari) quantum quod noxium virus habent, succoq; suo sterile solum reddunt. Cultu aut nullo, aut leuissimo contenta est: quippe quæ res etiam in desertis agris citra rustici operam conualescit. Seritur utroque æquinoctio. In Cypro Capparis plurimum provenit. In Italia, Hispania, Gallia Narbonensi frequens. Floret æstate. Viret usque ad Vergiliarum Occasum, fabulosis familiarissima. De huius multiplicitate, tum in cibis, tum in medicamentis usu, hæc ab auctoribus traduntur, à Dioscoride. Caulis & fructus cibi gratia cõdiuntur. Alium turbat, stomacho aduersatur, sitim gignit: cocta tamen stomacho, quam cruda vtilior est. Fructus drach. duabus in vino potus quadraginta diebus lienem absomit, & vrinam cruentumque excrementum emittit: bibitur vtilissimè in coxarum doloribus, & nervorum resolutione, item ruptis & conuulsis: menses ciet, caput purgat. Dentium dolorem sedat semen ex aceto decoctum, colluto inde ore. Aridus radice cortex ad eadẽ proficit: vlcera omnia vetera & sordida, & quæ occaluerunt, expurgat: lienosis cum farina hordei illinitur: dente demorsa dolori eius auxiliatur: cum aceto trita vitilignes albas extergit. Radix foliaque intrita strumas ac duricias discutiunt. Aurium vermiculos infusus succus enecat. Aphrica, & præsertim Marmarica Capparis vehementer inflat. Apula vomitus facit. Quæ à Lybico, & rubro mari deferretur, mirum in modum acris est, si quidem in ore pustulas excitat, gingivæque osse tenus exest. Quare in cibis non ab re damnatur. Capparis Galeno radice cortex vincentem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde acerbam. Ex quo liquet diuersis pugnantisque constare facultatibus. Nam abstergere, purgare, incidere potest amaritudine, excalfacere, incidere, digere acrimonia: contrahere, densare, constringere acerbitate. Idcirco lienes induratos, si quod aliud, hoc medicamentum iuuare potest, tum foris idoneis illinendis remediis admixtum, tum intro in corpus assumptum, siue decoctum in aceto, aut Oxymelite, siue aridum contusum, illisque permixtum. Quippe cum apertè crassos, lentosque humores hoc pacto sumptum euacuet, nec eos tantum per vrinas, sed & per ventrem: sæpe etiam sanguinolentos deferat, unde & lienes iuuantur, & coxarum dolores. Quinetiam menses promouet: ex capite purgat, detrahítque: auxiliatur ruptis, & conuulsis. Radice eius cortex, vlceribus malignis cataplasmatibus modo impositus, non malum est remedium, ut qui illa extergere valeat, & potenter desiccare. Præterea dentium dolores, prædictarum qualitatum ratione adiuuat, interim cum aceto coctus, interim cum

vino

Lib. 6. Hist.  
cap. 5.

Lib. 19. c. 8.

Lib. 11. ca. 3.

Temper.  
Plin. ibid.

Li. 2. c. 169.

Vires &  
Vfus.

Li. 7. simpl.



viño, saepe etiam solus dentibus mansus. Radicis cortici fructus proportionem virium respondet, nisi quod ad omnia imbecillior est. Imo & folia, & caules eius similem vim obtinent. Memini me foliis quandoque, paucis diebus, duri-  
 tiem coradis naturam referentem discussisse. Sed admiscemus illis quippiam, quod virium obtundat vehementiam. Iam non mirum est; quod aurum vermes succus amaritudine occidat sua. Porro Capparis quæ in feruentibus admodum regionibus provenit, ut quam fert Arabia, multo est nostrate acrior, adeo ut plurimum etiam habeat facultatis adurentis. Idem alibi. Capparis facultas tenuium admodum est partium: proinde minimum alimenti in corpus eorum, qui ipsa vescuntur, distribuit, quemadmodum & alia omnia quæ tenuibus constant partibus. Utimur autem fructu huius plantæ, magis ut medicamento, quam ut alimento. Importatur ad nos etiam sale conspersus: quia solus asseruatus putrescit. Clarum ergo est Capparis adhuc virentem, antequam sale conditur, plus habere nutrimenti. Nam ex salis conditura plurimum eius amittit, & nisi sal abluatur, prorsus haud quicquam nutrit, aluum tamen subducit. Verum ablutus, & maceratus, donec omnem salis naturam exuat, ut minimi sane alimenti cibusest, ita obsonium, & medicamentum, cum ad excitandum prostratum appetitum, tum ad deradendam deiiciendamque pituitam ventri adhaerentem accommodatum erit, ac denique ad lienis iecorisque amolendas obstructions. Verum in hos usus cum Oxymelite, aut Oxelæo ante alias omnes dapes sumi oportet. Tenellis porro Capparis germinibus homines, ut Terebinthi turionibus vescuntur, cumque adhuc virent, in oxalme, & aceto non secus atque hos reponunt. Plinij verba hic adscribam. In Ægypto & Capparis, firmioris ligni frutex seminisque in cibus vulgati, caule quoque vna plerumque decerpto. Cauenda eius genera peregrina. Siquidem Arabicum pestilens, Aphricum gingiuis inimicum, Marmaricum vuluis, & torminum inflationibus. Apulum vomitus facit: stomachum & aluum soluit. Marmaricum dixit, quod apud Marmaridas Libyæ nasci Dioscorides ait. De usu Medico idem hæc scripsit. Non vitendum transmarino. Innocentius Italicum est. Ferunt eos qui quotidie id edunt, paralyti non periclitari, nec lienis doloribus. Radix eius vitilignes albas tollit, si trita in sole fricentur. Spleneticis prodest in vino potus radicis cortex, duabus drachmis, dempto balnearum usu. Feruntque x x x v. diebus per vrinam & aluum totum lienem emitti. Bibitur in lumborum doloribus, ac paralyti. Dentium dolores sedat tritum semen, ex aceto decoctum, vel manducata radix. Infunditur & aurum dolori (semen, sub.) decoctum oleo. Ulcera quæ Phagedænas vocant folia, & radix recens cum melle sanant. Sic & strumas discutit radix: parotidas vermiculosque cocta in aqua. Iocinoris quoque malis medetur. Dant & ad tineas in aceto & melle. Oris exulcerationes in aceto decocta tollit. Stomacho inutilem esse inter auctores conuenit. Nunc ut olim floribus & fructibus muria asseruatis frequentissime in cibus utimur. Suauiores palatoque gratiores sunt recentes acerrimo asseruati aceto, quod plerique faciunt in Hetruria. Præstantissimæ Cappares ex Alexandria Ægypti Venetias adferuntur. Est & in Apulia earum prouentus, sed Ægyptiis deteriorum. Proueniunt etiam Romæ in collapsis ædificiorum parietibus, ruderibusque, præsertim circa Pacis templum, itemque Senis, quæ quidem Apulis saporis præstantia minimè cedunt. Paulus earum usum commendauit ex aceto, & oleo, quod & appetentiam inuitent, & lienem laxent, pituitamque per aluum exigant. Theuetus auctor est in Insula Suachem Æthiopico litori adiacente nasci herbam quandam *Alhaut* nomine, in rupibus, late sese diffundentem, foliis, fere Capparis: cuius fructus germina sunt, sine capitula rotunda. Folia, radices, fructus gustu

Li. 2. Alim.

Lib. 13. c. 23.

Lib. 20. c. 15.

Marth. li. 2.  
Diosc. cap.  
159.Fi. 1. ca. 74.  
The. 1. Col.  
mo. li. 5. c. 6.



suauissimi sunt, & cordi salubres, quibus indigenæ ad coliros & stomachi dolores quosuis, præterea ad hepatis & pulmonum affectus vtuntur, decocto ex tota herba parato cum corallij albi puluere.


## APHARCA, CAP. XVI.

Nomina

**D**EPICTVM hîc fruticem herbarij quidam Apharcam Theophrasti esse putant: alij Lycium alibi descriptum. Alij Phillyream Græcorum: Monspelienſes Pharmacopœi. *Bougeſpine*, id est, Spinam Burgundicam vocant. Pena eo nomine depinxit & descripsit, an Apharca sit Theophrasti dubitans. Ego de nominibus digladiari nolo, sed pro virili parte plantas minimè vulgatas & adhuc veluti reconditas in apicū pro-

## APHARCA

Theophrasti.



Lib. I. Hist.  
cap. 15.  
Lib. 3. Hist.  
cap. 6.

Locus.

θεῖντι. Δοκεῖ δὲ ταῦτα διγάρπα, ἀρχοῦν δὲ χυμῶνος, &c. Quæ cum malè à Theodoro sint versâ, sic mihi rectè videntur exprimi posse. Adrachne & Apharca fructum primum cum Vua nigrescit, & varia fit, maturant: alterum cum vitis floret. Bis enim ambæ fructum ferre videntur. Ineunte hyeme, &c. Prouenit in asperis & saxosis oræ maritimæ locis, non procul à Monspelienſi vrbe, quâ Vicum itur, pagum Apiano vino percelebrem.

## ALATERNVS CLVSII: CELASTRVS

Theophrasti, CAP. XVII.

**M**IRANTVR, & iure quidem, in stirpium cognitione versati, cur Plinius Apharcæ, Phyllicæ, atque Celastri plantarum à Theophrasto sæpè memoratarum nusquam mentionem fecerit. Ego sanè Plinium tacuisse de illis puto, quia Græciæ, & semotis ab Italia prouinciis peculiare esse, vt & Adrachnen, crederet. Phillycæ solius meminisse quidam censent, Alaterni nomine, quod vbi Phyllica nascitur, eius regionis incolæ



incolæ adhuc vocent Alaterno, Linterno, & Alarders, vocabulo ad Alaternum accedente. De illa planta nos posthac agemus. Celastrum Theophrasti plerique esse volunt plantam, quam pro Alaterno huius rei peritissimus Clusius pingit, & describit, & eam duplicem: Maiorem, nonnunquam arborecentem, ramis

*ALATERNVS prior*

*Clusij: Celastrus mas*  
*Theophrasti.*

*ALATERNVS secundus*

*Clusij: Celastrus Theo-*  
*phrasti femina.*



longis, non admodum crassis, in alas minimè diuisis, surculis flexilibus, cortice è viridi candicante, membrana subtus flauescente: Foliis nullo ordine dispositis, media inter Oleam & Ilicem magnitudine, crassiusculis, in ambitu leuiter serratis, è nigro virentibus, ingrati gustus, amaris, cum acrimonia quadam leui: Floribus Oleæ, pallidis, ad foliorum pediculum exorientibus, racemosis, vere ac interdum media hyeme prodeuntibus: marem hunc esse volunt. Minorem alteram, fœminam, humilem: breuioribus ramis: corticis colore ex albo viridi ac subpurpureo confuso: folio minore, rotundiore, serrato, dilutius virente, flore superiori simili, maiore, pallidiore: fructu racemoso, Acinis Lentisci magnitudine, ex tribus veluti granis constantibus, primum viridi, post rubente, ac tandem nigro. Floret sub finem mensis Februarij, & initio Martij. Theophrasto Celastrus semper viret: summis locis gaudet, frigoriq; & sæuis tempestatibus expositis: fructu per hyemis rigores deciduo, tardissimè maturescen- te, vt in Ilice, ac Iunipero. Cultum omnem recusat. Falluntur qui putant, quoniam Celastrum Theophrastus in summis & gelidissimis nasci montibus scripsit, eum reperiri posse in Alpibus, Apennino, Cemeniis montibus, & aliis vsq; adeo excelsis. Dictum id Theophrasti prorsus intelligendum de summis & frigidissimis locis, non nostratis regionis, sed eius in qua prouenit. Thuia, & pro-cera quidem, in frigidis montium verticibus gignitur, eodem teste. Frustra ope- ram sumat, qui in Alpibus requirit, vbi, ne nomen adhuc quidem est auditum.



Frigidos eos tractus Tauri mōtis Amani, & reliquorum montium eiusmodi in Asia & Europa Theophrastus significat, non nostros ad Septentrionem sitos.

## ACACIA,

## CAP. XVIII.

## Nomina

Lib. 4. Hist.  
cap. 3.



OMEN huius spinosi fruticis Græcum est ἀκακία, idem etiam Latinum Acacia, Arabicum *Achachie*. Dicitur autē ab ἀκάς, id est acuo, unde Acacia, quasi acuta: Theophrastus ἀκακίαν simpliciter, id est spinam, & ἀκακίαν ἀγυπτίαν, spinam Ægyptiam vocat, ita ut Acaciæ nomine & spinam, & succum ex fructu spinę expressum accipiamus: Spinę verò Ægyptiæ appellatione ipsam arborem Acaciam intelligamus. Sic Dioscorides videtur vsurpasse. Acacia, inquit, in Ægypto nascitur, Spina arboris instar, &c. & rursum: Alterum Acaciæ genus in Cappadocia, Pontoq; provenit, &c. Aetius, Spina Ægyptia, ex qua Acacia præparatur, &c. A Spina Ægyptia longè diuersa est Spina Arabica, similis Spinę albę, de qua Diosco. Galen. tamen Spinam Ægyptiam, à quibusdam vocari scribit Arabicam, similem Spinę albę, &c. seorsumq; de Acacia, & eius succo tractat. Plinius quoque Spinam Arabicam ab Acaciæ Spina distinxit. Spinę Ægyptiæ siue Arabicę laudes in odorum loco diximus, inquit, &c. Ita enim vetus Codex habet, sed in vulgatis, hæc duę voces defunt, (Ægyptiæ siue.) Idem aliquāto post eodem capite. Est & Acaciæ Spina, &c. Veteribus igitur duplex Spina est Ægyptia, hæc, quæ etiam Acacia vocatur, & ea quæ Spina Arabica. Qua Homonymia deceptus Aetius duas diuersas plantas in vnam confudit, cum scripsit. Spina Ægyptia ex qua Acacia præparatur, adstringendi ac siccandi vim habet. Quare & fluxui muliebri prodest, & vlcera sedis insufflata ad cicatricem perducit. Est enim hæc Aetij Spina Ægyptia, Arabica, cuius vires ex Galeno tradit, non Spina Ægyptia, ex qua Acacia fit, cuius paulò ante ipse meminit. Apud Plinium cap. 12. lib. 24. legendū: Spinę Ægyptiæ laudes in odorū loco diximus, Arabica spissat, &c. Huic enim Spinę omnia quæ à Dioscoride Arabicæ tributa sunt, rectè adscribit. At locus is quo se Ægyptiæ Spinę laudes dixisse ait, est lib. 13. de Ægyptia Spina, ex qua fit Acacia, nō de Arabica, id quod contextus ipse apertè declarat. Nec minus, inquit, Spina celebratur in eadem gente, duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat, ob id vtilissima nauium costis. Candida facillè putrescit. Aculeus Spinarum & in foliis. Semen in siliquis, quo coriā perficiuntur Gallæ vice. Flos & coronis iucundus, & medicamentis vtilissimus. Manat & Gummi ex ea. Sed præcipua utilitas, quod cæsa anno tertio resurgit. Circa Thebas hæc, vbi & Quercus, & Persea & Oliua, &c. à Nilo stadiis, syluestri tractu, & suis fontibus riguo. Idem paulò post. Gummi optimum esse ex Ægyptia Spina conuenit, Hunc Plinij locum citans Ruellius in Spinæ Arabicæ historia, Spinam Ægyptiam & Arabicā pro eadem planta, non sine errore vsurpat. Acaciæ duo sunt genera, Dioscoride auctore. Vna quę in Ægypto: altera, quæ in Cappadocia, Potoq; provenit. Acacia Ægyptia Spina est instar arboris, fructicosa, non sese in altum attollens, ramis pungentibus aculeatis, inter quos proueniunt folia, in plurima alia foliola diuisa. Florem habet candidum, semen Lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccatur in umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex viridi. Eligitur modicè rufus, & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex foliis & semine succū. Manat & Gūmi ex ea Spina. Acaciā Ægyptiā Dodonæi hîc depinximus, à qua permulū distat Matthioli Acacia prima hîc quoq; appicta, de qua Penæ sententiā audiamus. Sequinus Martinellus, inquit, medicus, & peritus Pharmacopæus misit ex Syria siliquarū Acaciæ Ægyptiæ saccos plenos Alberto Martinello fratri suo, perquam sædulo & erudito Pharmacopæo,

Lib. 1.

Lib. 3. ca. 13.  
Li. 6. simp.  
Cornar.  
Embl. 1. 12.  
lib. 1. Diosc.  
Lib. 24. c. 12.

Lib. 1.

Li. 6. simpl.

Lib. 3. ca. 13.  
Cap. 9. & 11.  
Lib. 13. a. 9.

Lib. 3. ca. 9.

Genera.

Lib. 1. c. 1. 5.  
Diosc. ibid.

Forma.

Li. 6. ca. 22.  
In cap. 115.  
lib. 1.



QVÆ IN DVMETIS REPER. LIB. II. 161  
 ACACIA ACACIA  
 Aegyptiaca. I. Matthioli.



pæo, ex quo semine in horto Patauino, aliisque quamplurimis Venetorum locis sato, orta est ista Acacia. Accepit & Morganus plantam nuper ex maris Occidui insulis Perunianis, ne quis putet peculiarem Aegypto aut Arabia. In neruulis prælongis foliola sunt Scorpioidis leguminis similis, aut herbae Sferæ cauillo nominata, in toto virgulto, gracili, aliquot rigidis Spinis in furculis exertis. Seminis tota siliqua non maior vno alteroue Lupino simul iunctis, sed suis alueolis distincta. Quare Matthiolus non Acaciam, sed si Spinās demas, arbori Indæ similem pictam dedisse videtur, cuius siliquæ, siue lobi non sunt Lupini similes, sed Genistæ, duplo latiores, vt Senæ compressæ: à Pena hîc descripta verior. Alterum Acaciæ genus, Aegyptiæ Spinæ est simile, longe minus, tenerius, humile, aculeorum vallo munitum: Folia habet Rutæ: fermen Lenticulæ, minus, Autumno, in loculis conuexis, ternum, quaternumue capacibus. Acaciam alterâ genuinâ esse hîc appictâ censent Periti Herbarij, folijs Rutæ aut Cytisi, ternis, siliqua Genistellæ, aut vulgaris Glycyrrhizæ, nouaculæ effigie, dorso obtusiore, & altero latere, quasi acie acutiore, tria aut quatuor etiam Genistellæ semina dura continente, quæ nondum matura flauent, postea nigricant. Hac Tyrrenum & Ligusticum, atque Mediterraneum litus scatet, & plerâque alia Italiæ loca. De Acacia, eiusque generibus hæc prodidit Theophrast. Spina ex eo nomen accepit, quod tota arbor aculeis horreat, excepto caudice: nam & super germina, foliaque aculeos habet. Altitudine procera est, vt quæ ad duodecim cubitos perueniat. Materies ex ea ceditur tectis idonea. Eius duo genera: quædam candida, quædam nigra. Candida imbecillis, & facîle putrescens, nigra robustior, & incorrupta. Quare in nauibus fabricandis ad earum costas illa vtuntur. Recta non valde assurgit. Fructus in siliqua modo leguminum, quo incolæ coria perficiunt Gallæ vice. Flos vsque adeo aspectu pulcher, vt ex eo coronas faciant, est & medicamentis utilis: quamobrem à medicis colligitur. Manat & Gummi ex ipsa, tum vulnerata, tum sponte sine vlla plaga. Cum

Forma alterius A. 2.

Lib. 4. Hist. cap. 3.

Gummi.



*Locus.* **ACACIA ALTERA**  
*Matthioli.*



*Lib. 13. ca. 9.*

*Li. 24. ca. 12.*

*Electio*  
*Gummi.*

*Lib. 9. Hist.*  
*cap. 1.*

*Lib. 1. Diosc.*  
*cap. 115.*  
*Gūmi Aca-*  
*cia, nō est*  
*Gūmi Ara-*  
*bicum.*

*Lib. 7. mc.*  
*gen.*  
*Lib. 4. Hist.*  
*cap. 3.*  
*Vires succi*

*Lib. 3. ca. 63.*

caſa fuerit, tertio anno ſtatim renaſcitur. Eius copia & ſylua ingens circa agrū Thebanum eſt, vbi & *Quercus*, & *Perſea* *Olea* quoque eodem loco gignitur, non aquis fluuij riguo (diſtat enim pluſquam trecentis ſtadiis) ſed manantibus ſponte aquis, multi enim fontes in eo ſunt tractū. Hæc Theophraſti, Plinius eo quem ſupra indicauimus loco tranſcripſit, atque vertit. Eadem de re alio loco idem ſcripſit, quo vulgati Codices ex vetuſtiſſimis ſic ſunt emendandi. Eſt & *Spinæ* ſuccus *Acacia*. Fit in *Ægypto* alba, nigraque arbore: item è ſemine viridi, aut maturo, ſed longè melior è priori. Fit & in *Galatia*, teneriore ſpinosaq; arbore. Semen huius lenticulæ ſimile: minore eſt tantum & grano, & folliculo. Colligitur Autumno, ante collectum nimio validius. Spiſſatur ſuccus ex folliculis aqua cæleſti perſuſis: mox in pila tuſis exprimitur organis: denſatūſque ſole in mortariis cogitur in paſtillos. Fit & ex foliis minùs efficax. Ad coria perficienda ſemine pro *Galla* vtuntur. Foliorum ſuccus & *Galaticæ* *Acaciæ* nigerrimus

improbatur: item qui valde rufus. Hic Plinius alteram *Acaciæ* ſpeciem, quam in *Cappadocia* & *Ponto* naſci ait Dioſcorides, *Galatiam* appellat, & cum prior, *Ægyptia*, ſcilicet, confundit, ſi ſemen omnium, & non *Galatiæ* tantum *Lenticulæ* ſimile facit. Dioſcorid. enim prioris ſemen *Lupino* comparat, alterius minus *Lente* eſſe ait. *Gummi* quod ex *Acacia* *Spinæ* ſtillat, id præfertur, quod in vermiculorum ſpeciem contrahitur, & vitri modo perlucet, ligni expers: proximum eſt candidum: ſordidum verò ac reſinoſum inutile. Id etiam optimum eſſe tradit Plinius, vermiculatum, colore glauco, purum, ſine cortice, dentibus adhærens. Theophraſtus lacrymoſum humorem hanc *Spinam* ferre tradit, non è cortice, ſed in folliculo. Serapio *Arabicum* nuncupat, quod ex *Arabia* regione *Ægypto* finitima ſuo tempore importaretur, inquit Matthiol. Scire autem oportet *Gummi* *Arabicum* *Officinis* dictum, multum à *Spinæ* *Ægyptiæ* *Gummi* diſferre: neque enim contractis vermiculis ſimile eſt, ſed grumis verſicoloribus conſtat. Aduèh non ita pridem cœpit ad nos ex *Ægypto* vera *Acacia*, in paranda *Theriace*, aliſque componendis medicamentis valdè expetita, qua nos ad hoc uſque tempus caruimus. Id *Gummi* *Galenus* aliquando *καύμυ γυμναίων* vocauit, ob id fortaſſe quod Theophraſto auctore in agro Thepano magna ſit ſpinosæ huius arboris copia, & ingens ſylua. *Spinæ* *Ægyptiæ* ſuccus, inquit Dioſcorides, oculorum medicamentis vtilis: valet ad ignem ſacrum, vlcera quæ ſerpunt, perniones, pterygia, & oris vlcera: procidentes oculos reprimat: menſium abundantiam ſiſtit, prociduum vuluam cohibet: citam aluum ſiſtit, aut potus, aut ſubter inditus: capillos denigrat. In qua Ruellij translatione id meritò reprehendendum videtur, quod *ἐπὶ τοῦ γυμναίου*, menſium abundantiam ſiſtit, interpreteretur, cū fluxum muliebrem dicere debuiffet. Diſfert enim fluxus muliebris à menſibus, ſeu menſtrua purgatione immodica, vt perſpicuè docet Paulus. Sed Plinium, Ruellius imitatus eſt, quo loco eadem quæ Dioſcor. habet. *Acacia* purpurea, aut leuco



leucophæa, & quæ facillimè diluitur, vi summa ad spissandum, refrigerandumque est, oculorum medicamentis ante alias utilis. Lauantur in eos vltus pastilli ab aliis, torrentur ab aliis, capillum tingunt. Sanant ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, & humida vitia corporis, collectiones, articulos contusos, perniones, pterygia. Abundantiam mensium sceminis sistunt, vuluamque, & sedem proidentes. Item oculos, oris vitia, & genitalium. Sed non hoc tantum loco Plinius menses pro fluxu muliebri reddidit. Gummi verò Acaciæ spissandi, refrigerandi que vi peditum esse scribit Dioscorides, cutis meatus obstruere, & medicamentorum quibus admiscetur acrimoniam hebetare: ambustis ex ovo illitum pustulas non pati erumpere. Acaciæ planta Galeno, & ipsa acerba est, & fructus, & succus, qui lotus quidem & imbecillior, & minus mordax redditur, vt pote acrimoniam quandam dum lauatur deponens (idest vehementius adstringentem vim, qua contacta corpora distrahit, ac veluti dilacerat. Ea scilicet vis aquæ perfusione diluitur, & obtunditur. Sic locum hunc exponit Dalechâpius: omnis enim acrimonix prorsus expers est Acacia, etiam si Galeno credamus partes quasdam calidas in eius substantia mixtas esse) Porro si parti alicui sanæ illinatur, protinus eam & sicciorem, & contractiorem efficiet, nullum quidem caloris sensum inuehens, sed nec frigoris admodum valentem. Vnde constat medicamen id esse frigidum & terreum, immixta quadam etiam substantia aquea, videturque sanè non esse similitum partium, verum quasdam in sese dispersas habere partes tenues, & calidas, quæ in ipsa lotione segregantur. Esto porro tertij ordinis ex siccantium, & secundi refrigerantium, cum lotum fuerit, illotum verò primi Acaciæ veræ substituunt tum Officinæ, tum medicorum vulgus succum ex syluestribus Prunis expressum, in tenues placentulas diuisum ac in sole siccatum. Dioscorides tamen eius vice tum Rhois folia, tum Lentisæ foliorum succum, tum Hypocistidem medicamentis admiscet, quibus vt edum potius fuerit, quam syluestrium Prunorum succo.

*Vires  
Gummi.*

*Ibidem.*

*Lib. 6. sum.*

*Lib. 1. c. 124.  
& 75. & 109*

## SCORPIVS THEOPHR. CAP. XIX.

**H**ÆC plantam Scorpionem Theophrasti (Gaza Latine nepam vocat) herbarij esse iudicant: quia multa ei conueniunt, quæ de Scorpio Theophrastus prodidit. Scorpium, inquit, spinosa planta, tota spinis constat vt Corruda. Sic hæc adulta nullo modo foliosa est, sed spinas tantum pro foliis habet. Præterea radice singulari breuique constat, ætatem non germinat, germinationem prorogat in autumnum. Floret etiam post æquinoctium autumnum: florem in carne extuberante sub extremo aculei profert. Quæ omnia de Scorpio scripsit Theophrastus. Quod verò idem alio loco scripsit Scorpionem radicem figura Scorpium esse similem, vtilemque & ad eius ictum, & ad alia quædam, id huic sententiæ nostræ non repugnat. Etenim de Thelyphoni, non de Scorpionem spinosæ radice id accipiendum esse ipsemet Theophr. aliquanto post perspicue demonstrat his verbis. Thelyphonum quod alij Scorpionem appellant, quia radicem Scorpium similem habet, &c. Quare Gaza superiore loco nepam vertere non debuit, hunc Scorpionem siue Thelyphonum cum Scorpio spinoso perperam confundens. Planta hæc depicta radice est crassa, lignosa, nigra, simplici, dimidium pedem longa: caulibus multis, ferè pedibus, qui plurimis aculeis rigidis, firmisque horrent: foliis in paruula & tenella planta minimis, Tragacantho similibus, in vetusta & dura nullis: flore paruulo, ad aculeorum imâ partem emergente: semine in siliquis latiusculis incluso. In aridis locis & perflatibus nascitur. Huic affinè, vel eundem Scorpionem descripsit Clusius. Pedis altitudinem rarò superat, totus densissimis spinis horret, quæ seriè quædam

*Nomina*

*Lib. 6. Hist.  
cap. 1.*

*Tempus.*

*Li. 6. Hist.  
cap. 3.*

*Li. 9. Hist.  
cap. 14.*

*Lib. 9. Hist.  
cap. 19.*

*Lib. 9. Hist.  
cap. 14.*

*Forma.*

*Locus.*




## SCORPIVS

Theophrast.

2.Sco.gen.


Lib.6.ca.9.

Lib.33.ca.4.



## SCORPIVS ALTER.

sive Genista Spinosa.



recens nati aculei : flores in firmioribus & rigidioribus spinis, terni, quaterni, aut plures simul, Genistæ similes, sed minores, nunc lutei, nunc pallidiores : semen in siliquis exiguum. Legitimā Aspalathū alteram esse non fateretur Clusius: verū cum à nonnullis sic vocetur, nomē mutandū non censuit, præsertim cū ad quam plantā à veteribus memoratā referēda sit, adhuc nesciat: fortasse ad scorpiū Theoph. inquit Clusius, Eadem est cū Genista spinosa, aut certē persimilis.

BVXVS

seruat, & semper cōtrario inter se exortu bini nascuntur, neq; aliæ ex aliis : summis ramulis inharēt bini aut terni flores, lutei, mense Martio, quo tēpore exiguas, breuēsque siliquas, vel potius semina Erui magnitudine multa incanaque lanugine hirsuta profert, dēfissimis spinis occulta: radix singularis, sed in plures deinde, ppagines sparsa, dura, liquosa. Hęc Clusius. Alterū Scorpij genus quidā statuūt fruticem spinosum, descriptum à Dodonæo pro Genista spinosa secūda, foliis carentem, spinis vndique horridum. Maio & Iunio mēlibus florere scribit. Vlicem Plinij quidam esse volunt, Roris marini similem, asperum. Belgæ *Gaspeldoren* vocant, Armorici, apud quos sylæ huius plantæ sunt, tam proceræ vt propemodum arborescat, vocant *des lams*. De spinosa hac planta, quæ sequuntur Pena tradit. Prorsum cognata Genistæ hæc, sed multum aspectu horrida, sentibus præduris, innumeris, cancellatim armata, semper virentibus, striatis, lignosis virgultis, Spartio similibus, spinis pene folia occultentibus. Quare doctiorum nonnullis placuit Gazæ Nepam esse, aut Scorpium Theophrasti: sed obstant Genistæ siliquæ, aliquanto breuiores, & flores non ab similes, concolores, eiusdem saporis, qui aurei particulatim emicant, tota æstare, etiāque hyeme in Anglia, vbi frequentissima in sterilibus & Ericetis, in Prouincia item Narbornēsi penē par proceritate. Sed Monspelij ad Lādum in collibus saxosis triplo minor, rigidior & squalidior est, adeo vt parum Genistam representet, folijs lentis. Illic Aspalathum secundum faciunt, tametsi inodora, & funis instar pertinax frāgēdo sit: floribus quidam ad ictum vtuntur, & tota planta calc faciunt furuos. Clusius Aspalathum alteram, tum Salmanticæ, tum Mōspelij sic dictam pinxit, cubitum non excedentem, fruticosam admodum multis horrentem spinis, deorsum inflexis, firmis, acutis, in quibus nascuntur pusilla folia, lentis magnitudine, viridia, qualia etiam (sed tēriora) fert in nouellis ramulis, quibus subsunt



## BUXUS. CAP. XX.

**G**RÆCIS *πύξος*, Latinis Buxus & Buxum dicitur, Gallis *Bouys*, Italis *Bosso*, HISPANIS, *Box*, Bœmis, *Pofspan*: Anglis, *Burs*. Belgis *Palmeboom*: Germanis *Buxbaum*, Buxus quædam frutex tantum est, quædam in arborem magnam affurgit. Tria eius genera, inquit Plinius. Gallicum quod in metas emittitur, amplitudinemque proceriorem: Oleastrum in omni usu damnatum, grauem profert odorem. Tertium genus nostrate vocant; sylvestre, ut credo, mitigatum satum, diffusius, & densitati parietum virens semper, ac tonsile. Hoc Plinij loco mirum certè est, cur secundum Buxi genus Oleastrum vocet. Annotat Dalechampius Plinium, aut eius scribam libertum in Oleastri voce deceptum fuisse. Nam cum apud auctorem Græcum reperisset secundum Buxi genus *ἀγρίον ὄλον εἶναι*, omnino agreste esse, nec utile materia, ut primum genus, nec vestiendis parietibus idoneum ut tertium, imo etiam abominandum fœtore, & grauitate odoris, incautè legit *ἀγρίον εἶναι*, Oleastrum esse. Buxus arbor crasso est trunco, spisso, duro, valido: ramos emittit multos ca-

Nomina

Genera.

Dodon. li.

6. cap. 32.

Li. 16. c. 16.

## B V X V S.



terarum arborum more, duros, crassosque, foliis plurimis vestitos, Myrto similibus, minoribus, densioribus, crassioribus, subrotundioribus, saturatè viriditatis, perpetuis nec vnquam decidentibus: flore herbaceo: fructu quaternis apicibus in cacumine diuiso, Ciceris magnitudine, semine rufescente, omnibus animantibus inuiso, quod Carthægo vocari Plinius scripsit ineptè, cum enim Theophrastus libr. 3. cap. 15. historiæ Buxi Cratægi descriptionem statim subiecisset, Plinius hæc confundens, dixit Buxum granum ferre quod Cratægum vocant. Ineptius idem Buxo tribuit, quæ de Illice Theoph. prodidit, nempe à Septentrione viscum gignere, à meridie hyphæar. Buxus tertius, frutex, ramos multos sepe ex ipsamet radice, nonnunquam ex paruo trunco in latum spargit. Folia habet dilutioris viriditatis, rotundiora, minora, cetera similia supradictis duobus generibus. Buxus, inquit Theophr. magnitudine est haud procera, folium ei Myrteo simile, (Plinio cœcauum.) Buxus montes amat, in planisque

Forma.

Li. 16. ca. 30.

Lib. 3. Hist.

cap. 15.

Li. 16. c. 24.

Locus.

nasci recusat. Pyreneis ac Cytoriiis montibus plurima, & Berecynthio tractu: crassissima in Corsica, flore non spernendo, vel, ut quidam legunt, apibus florè non spernentibus, quæ causa amaritudinis mellis. Semen illius cunctis animantibus inuisum. Hæc in Olympo Macedonia gracilior, sed brevis. Amat frigida, & aprica. In igni quoque duritia, quæ ferro, nec flamma, nec carbone utili. Hæc Plinius ex Theophrasto, transtulit, sic scribente. *φύλαξ ὁ πύξος ἐν τοῖς ψυχροῖς τόποις, καὶ τραχέσιν, καὶ τὰ κύβωρα τοῦτον, ἢ ἡ παλαιοὶ γίνονται. ψυχρὸς δὲ ὁ ἄλμπος μακεδονικὸς, καὶ ἐν ταῦθα γίνονται, πολλὰν οὐμεγάλοι μέγιστοι δὲ καὶ κάλλιστοι ἐν κυρήνῃ* legendū ἐκέρων in Corsica, καὶ ἐν μύκεις: καὶ πύξος ἔχουσα πολὺ παρὰ τὰς ἄλλας: διὸ καὶ τὸ μέλι οὐχ ἡδύ, ὅσον τῆς πύξου, πολλὴν δὲ πολὺ. Id est, Buxus locis frigidis & asperis nascitur, etenim Cytorij montes tales sunt, in quibus plurima prouenit. Olympus quoque Macedonia frigidus, in quo nascitur, sed non magna. Maxima autè & pulcher-

Li. 16. c. 26.

Lib. 3. Hist.

cap. 15.



rima in Cyrene, (in Corsica.) Nam procera est, & crassitudine cæteras longè superat. Quamobrem mel insuaue est, Buxum olens, multum autem, & copiosum. Plinius dixit Buxum in Corsica crassissimam esse, flore non spernendo, hancque esse causam amaritudinis mellis: Theophrastus in Corsica crassissimam, melque illic insuaue, quia Buxum oleat. Quod vterque de Cytoriaca Buxo tradidit, id & Poëtæ cecinerunt: Cytorus enim buxifer à Catullo dicitur:

*Et inuat undantem Buxo spectare Cytorum,* dixit Virgilius. Buxus Februario &

Li. 2. Geor.

Tempus.

Temper.

& Vires

Ibidem.

Libr. Hist.

pl. ca. 347.

Plinius li.

16. cap. 16.

Plin. ibid.

ca. 40.

Plin. ibid.

Ruell. li. 1.

cap. 60.

Ufus.

Buxus gaia  
cū non est.

Lib. 1. Dio.  
cap. 114.

Fusc. Ibid.

Martio mensibus floret. Septembri semen maturum est quibusdam in locis. Buxi folia calida siccaque esse, atque adstringere ipse gustus perspicue demonstrat, inquit Dodon. In eadem sententia est Fuchsius scribens à recentioribus temperatam eius arboris essentiam statui, sed id multas ob causas verisimile non videri. Haud dubie verò adstringere, & siccare. Quia Buxus immortalī coma viret, topiario operi accommodatissima est, ac tonsilis. Imprimis verò materies honorata illi est, raro crispanti (crispante, vetust. cod.) nec nisi radice: cæterò lenis quies materiæ, silentio quodam, & duritie ac pallore commendabilis. Idem alibi: spississima ex omni materie, ideo & grauissima iudicatur Ebenus, & Buxus, graciles natura, vel, gracilis natura, vt de Buxo tantum hoc intelligatur. Neutra in aquis fluitat, nec Suber, si dematur cortex nec Larix cariem vetustatēque Buxus non sentit. Nunc sola pectinum dote commendatur, ad plaustrorūque axes, & aratorum buras. Fiunt & ex ea tibiæ ac fistulæ, pertusæ rotundis foraminibus, quibus digitorum appositu clausis, aut apertis, cantus moduli variantur & pyxides, quibus nomen dedit. Nullus Buxi in medicina vsus: folio tantū cum materiei Scobe & lixiuio capillum rufat. Sunt qui dicāt ligni scobe hausta sanari alui profluuia. Nec desunt ex recentioribus, qui sentiant nihil aliud nobis esse Buxum, quā Indis lignum, quod Gaiacum appellatur: quoniam Buxi decocto feliciter sanatos esse lue venerea affectos, frequenti experientia compertum est, quam opinionem refellit Matthiolus. Nam & si, inquit, eas esse Buxei ligni vires experientia doceat, id tamen, & Indorum Gaiacum eandem esse plantam non rectè colligas. Gaiacum enim lignum est pingue, resinofum, materia intus nigra, Ebeni fere modo, amara, acrique. Quibus notis siccam Buxi materiam carere constat. Præterea Gaiaco (testibus iis qui in India viderunt) folia sunt Plantaginis, breuiora, crassiora, duriora: lutei flores: fructus luglandis magnitudine, Buxo verò folia Myrti, breuiora: flores herbacei: fructus Myrto nunquam maior. Somnum capere sub hac arbore cerebro vehementer incommodat, quod eius odor naturæ prorsus aduersetur. Ferunt serpentes vulneras eius radice degustata, statim sanitatem recuperare. Germani ex Galliæ Narbonensis locis Hispaniæ finitimis, præcipuè montibus Pyrenæis, circa oppidum Limons, haud procul Carcaffona, crispum Buxi radicem magnam copiam aduehunt, ob varias maculas & intortos linearum discursus ad opera lantiora expetitarum, ex quibus cochlearia, cultellorum manubria, latrunculi, & imungula fiunt, ab his præcipuè qui oppidum incolunt celebre nomine D. Claudij in monte Iura: Eas radices quamuis seruato prisco vocabulo, sine discrimine *Brouchin*, quasi Bruscum vocent, in iis tamen, vt & tuberibus Aceris Bruscum & Molluscum facile discernas, lineis vel simpliciter sparsis, vel flexuosis distortis. In eodem mōte Iura quod antea nos monuimus, lignarij Abietum & Picearum candidissimos truncos recto venarum discursu fissiles, nullis interceptos nodis, ad opera faciles, seruata dictione vetusta λασόν, qua Theophrastus vsus est, adhuc Louchon vocant: Aruerni verò cuiusvis arboris crassiore ramum *Lusse*.

SPAR



**D**E Spartio, Genista, & Sparto, lunco, magna est inter auctores controuersia. Hermolaus, & Marcellus Dioscoridem cum Spartiū dixit, Genistam, non Spartum Hispaniæ descripsisse videri aiunt. Horum summus alioqui imitator Ruellius falli eos scribit, qui Genistam eandem esse cum Spartio contēdunt. Amatus Lusita. & Andreas Lacu. superiorum sententiæ subscribunt. Matthiolus cum aliquando idem sensisset, tandem mutata sententia, Spartium Dioscoridis, & Spartum Hispanicum eandem stirpem esse existimauit, atque à Genista diuersam. Fuchsius & Tragus pro Genista exhibent, eam quæ Genista angulosa à nobis dicitur, at pro Spartio ille quidem eam quæ à Matthiolo depingitur Spartij nomine, hic verò florem tinctorium vulgò nominatum, quem seorsum describemus. Dodonæus Spartum nomine Genistæ Hispanicæ descripsit, quæ in Hispania & Gallia Narbonensi prouenit, & eam pinxit, quam à Fuchsio & Matthiolo Spartij nomine pictam esse diximus. Alia in historia, Spartum est, inquit, non quæ Genista appellatur, siue illa Italica dicta, aut alia quæuis, sed alia stirps Hispaniæ familiaris, Genista quidem Italica virgarum multitudine, ac tenuitate quadantenus similis, nullis, aut omnino paucissimis, ac minimis foliolis, quæ non siliquas veluti Genista, aut legumen aliquod, sed lobos paruos, hoc est exigua vnde quæque conclusa capitula, in rotunditate oblonga, & sub candida fert, Bonis, id est, Fabis minoribus magnitudine formæque æqualia, & candidis earum colore quoque similia, in quibus semen vnum aut alterum conditur, nigrum, aliquantulum compressum, Aphacæ fructum satis referens. Hæc ille, qui in Sparti historia parum sibi constare videtur. Vtroque enim loco Spartum non Spartiū Genistam Hispanicam appellas, illo in Hispania & Gallia Narbonensi eam nasci tradit, hoc, Hispanicam ab Italica differre, cum Italiæ, & Galliæ Narbonensis Genista eadem plane sit, nec Amatus Lus. nec And. Lac. inter Hispanicam & Italicam aliquid esse discriminis arbitrentur. Dicit verò non potest Spartij, id est Genistæ Hispanicæ nomine, Spartum Hispanum designari: de eo enim post eum locum quem citauimus seorsum tractat Dodon. ex Plinio. Cordus Spartum Latinis vocari Genistam scripsit. Esse autem duplicis differentię. Quandam in funes torqueri, ex qua etiam corbes Vuis passis, & ficibus seruandis texuntur in Hispania, Spartumque à veteribus eam plantam vocari: Alteram non tam Lentas habere virgulas, vt simile quiddam ex iis fieri possit. Alio in loco Genistam idem Iunceam depinxit, ac descripsit, eam planè quæ fuchsius Matthioloque Spartum est à Genista diuersum. Sed quid mirum de hac re inter recentiores controuersiam extitisse: cum Plinius ipse dubitauerit, an Genista sit, quam Græci auctores Sparion appellauere, ex qua lina piscatoria apud eos factitabantur. Cornarius Genistam esse Sparion Dioscoridis vult, cui Plinius easdem vires, quas Dioscorides Spartio adscribit, neque dubitat, vt Plinius, quin Spartum Græcorum Genista sit, sed Hispanici generis, apud Græcos rari, ex quo Asia populi lina ad retia præcipua facerent: quando quidem ex Genista nulla fieri possunt. Ex quibus intelligere licet Cornarium aliam sentire esse Genistam Hispanici generis, aliam ex qua lina piscatoria fieri non possunt, quæ fortasse nostra est Genista angulosa: duplexque esse Sparion, alterum etiam hodie in Hispania copiosum, alterum quod Dioscorides Spartum appellat, Plinius Genistam. In hac opinionum varietate, si quid statuere & discernere mihi liceat, iis potius assentiendum puto, qui Spartium Dioscoridis & Græcorum Genistam esse

Nomina

Li. 1. ca. 84.

Lib. 4. Dio.  
cap. 152.

Libr. de  
Hist. pl. 6.  
cap. 7.

In frume.  
Hist. ca. 33.

In libr. 4.  
Diosc. c. 153

Lib. 3. Hist.  
pl. ca. 34.

Li. 24. ca. 9

Emble. 137.  
lib. 4. Diof.



esse arbitrantur Spartum vero Iuncum Hispanicum. Nam Ruellij Matthiolique rationes facile dilui possunt. Prior, quod Dioscoridis Spartum frutex sit sine foliis, quibus scatet Genista: Altera quod Spartum florem habet, ut albæ Violæ, luteum verò Genista ferè piso similem. Spartum enim plantam quæ iam virgas florésque protulerit, id est senescentem Dioscorides describit, quo tempore foliis caret. Eius verò adolescentiæ statum, quo novos ramos, foliaque minuta profert, negligentius prætermisit. Sic dictamnium Dioscorides flore semineque Chamæscen flore carere scripsit. Quæ si vera essent, nothæ essent hæc Dictamni & Chamæscyes plantæ, quæ pro veris habentur. Quare ex eo quod Spartum iam adulto folia nulla sunt, non efficitur id Genistam esse non posse, quæ pululans folia habeat. Quod de flore dicunt, nullius est momenti. Dioscorides enim non floris Spartij figuram cum floris Leucoij figura hic comparat, sed colorem cum colore. Esse autem Leucium aliud flore albo, aliud melino, &c. Dioscorides ipse alio loco testatur. Spartum igitur planta hæc dicitur, quod funiculi, & vinculi vsum in alligandis vitibus præbeat τὸ ἀσπρὸν, id est Iunci Sparti modo, & Genista, fortasse quia genu modo flexilis ad nexus sit, vel quia genibus medeatur dolentibus, vel quia, ut alij censent, facillimè & celerrimè lobolem generet suo semine Gallis, *Genest*, & quibusdā in hortis lata, *Genest d'Espagne*, *Genest de Florence*: hodie vulgo in tota Græcia, quæ *lucū Spartū* nō novit, *ασπρὸς* vocatur, Italis *Genestra*, Hispanis *Genestra*, *Giesta*, & *Giesteira*, Genista hæc, siue Spartiū Dioscoridi & Græcorū frutex est, cuius rami in multas virgas diuiduntur, longas, rectas, teretes, glabras, iunceas, firmas, fractu contumaces, foris lento, nervoso, flexili, egregiè virente cortice, intus inani, fungoso, candidoque, leuem Iuncum prorsus referentes. De foliis, qui plantam diligentius contemplatus fuerit, hæc verissima esse comperiet, in teneris scilicet, & nuper enatis virgis folia esse latiuscula, utrimque acuminata, pauca, ex interuallis plerumque singula, non ut in

Lib. 3. ca. 21.  
Li. 4. c. 164.

Li. 3. c. 121.

Fuch. c. 289


**Nomina**

**Forma.**

Cord. libr.  
3. de pl. c. 43.


SPARTIVM DIOSC.

siue Genista.



SPARTIVM MATH.

siue Genista.



Genista



Genista vulgari & Scoparia angulosa, in vno quoque exortu terna. Quo magis adolescit planta, eo pauciora habet folia, angustioraque, in locis æstuosis adeo exilia, ut marcida facta, nulla prorsus, extitisse videantur, in vetustioribus, & senescentibus, quæque iam siliquas habent, virgæ ac ramuli foliis omnino carent: Flores habet luteos, ut Leucoium, figura Pisi flori similes, quibus singulæ succedunt siliquæ, angulosæ Genistæ siliquis longiores quidem, sed angustiores, in quibus semen compressum Lenticulæ simile, Phasiolorum modo nascitur, angulosæ Genistæ semini simile & æquale. Cortex caudicis, ramorum, radicisque gustu Genistam angulosam æmulatur, ut & semen illius gustum. Omnes tamen eius partes remissiores sunt tam odore, quam sapore. At extremæ virgæ, & nouella germina nihil graue, nihil nauseosum, nihilque amarum olent, aut resipiunt, sed herbaceam, & insipidam Iunci qualitatem. Mēsues breuius sic descripsit. Spartium Genista Latinis, arbor est montana, cuius rami desinunt in virgas multas, rectas, flexiles, fractu contumaces, quibus vites, & alia ligantur. Flores habet flauos, lunata figura: siliquas Phasiolis similes, & semina in his Lenti similia, interuallis distincta. Hæc ille à quo Genistæ semen non rectè obseruatum esse Matthioli ait, quod Erui, aut Vicæ faciem potius referat, quam Lentis. Imo verò Matthioli negligentiam hîc mirari licet, Genistæ in Italia vulgarissimæ semen adeo oscitanter contemplati, ut id Erui, vel Vicæ compararit, quod compressum est, & Lenti simile, etiam auctoribus Fuchsio, Ruellio, Dodonæo, nisi semen siliquas accipiat. Etenim Genistæ huius siliquæ, Erui vel Vicæ siliquis similiores sunt, quam Lentis. Nascitur Genista in Italia, & Gallia Narbonensi, locis siccis, adeo copiose, ut Maio & Iunio mensibus iucundissimo sint viatoribus spectaculo, collibus huius pulchris floribus ita ornatis, ut procula rei videantur. In multis aliis regionibus non passim in agris reperitur, sed in hortis seritur, & colitur. Semen Augusto mense & Septembri maturescit. Id calidum siccumque esse, tum gustus, tum vires indicant. Purgant, inquit Dioscorides per superna vehementer, Ellebori vice, citra periculum flores, & semina, quinis obolis in aqua mulsâ pota. Semen deiectiones mouet. Ramis in aqua maceratis, mox tuis extractus succus ischiadicis, & angina laborantibus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. Quidam marina aqua macerare malunt, vel infundere ischiadicis clystere: strigmenta autem elicit cruenta. Quæ postrema Græcè sic leguntur. *ἐνιοὶ δὲ ναυπορρέξαντες ἀλμύρῃ, ἢ θαλάττῃ ἐγκλύζουσι τοὺς ἰσχιαδικὰς αἰγὰς, ἢ ἀμυγδαλῶδες, καὶ ξυσμαλῶδες.* Id est. Nonnulli autem ipsos macerant muria, vel aqua marina, quam clystere infundunt ischiadicis. Educit enim cruentum quendam humorem, & veluti intestinorum ramenta. Plinius dubitans, an hæc Genista spartium sit Græcorum, eadem illi tribuens quæ Dioscorides Spartio, mox tanquam iam sublata omni dubitatione iudicat Genistam, & Græcorum Spartium idem esse, ut & Cornarius annotauit. Semen inquit, in folliculis phasiolorum modo nascens, purgat Ellebori vice, drachma & dimidia pota in aquæ mulsæ cyathis quatuor ieiunis. Rami similiter cum fronde in aceto macerati pluribus diebus, & tuis, succum dant ischiadicis vtilem, cyathi vnius potu. Quidam marina aqua macerare malunt, & clystere infundere. Perunguntur eodem succo ischiadici addito oleo. Quidam ad stranguriam vtuntur semine. Genista tusa cum axungia genua dentia sanat. Præterea quod scribit Genistam vinculi vsum præstare, & Asiam lina ex ea facere ad retia præcipua, in piscando durantia, frutice madefacto decem diebus, id de Genista nostra intelligi oportet. Hæc enim ligandis viribus in Italia Salicis vicem ex-

Lib. 2. met.  
pur. ca. 29.

Lib. 4. Dio.  
cap. 152.

Locus.

Tempus.

Fuc. & Do-  
don. ibid.

Temper  
& Vires.  
Lib. 4. c. 152.

Lacu.

Emb. 137. li.  
4. Diof. Pl.  
li. 24. ca. 9.

Lib. 19. c. 1.

Matt. ibid.



Ibidem.

Li. 24. ca. 9.

Li. 19. ca. 1.

Iliad. 2.

Ibidem.

Correctio.

Lib. 8. mp.

Lib. 7.  
Plinius li.  
24. cap. 9.

plet, maceraturque etiam in aqua Cannabis modo, fiuntque inde funes, & rudia lintea faciendis faccis aptissima. Hæc cum Genistæ angulosæ non convenire perspiceret Cornarius, Genistam quandam Hispanici generis confinxit. Dubitat etiam Plinius, nunquid Genistam designaverit Homerus, cum dixit nauium Sparta dissoluta. At verò mox illa, neque ad Genistam, neque ad Spartium Græcorum, neque ad Spartum Hispanum pertinere satis declarat, cum dicit, Nondum fuisse Africanum, vel Hispanum Spartum in usu, certum est, & cum futes fuerint naues, Lino tantum non Sparto vnquam futas. Idem alio loco, ex Lino fuisse nauium armamenta apud Homerum eruditiores interpretatos esse asserit: quoniam cum Sparta dixit, significauerit fata, hoc est res sariuas, Cannabim & Stupam. Versus Homeri est *Καὶ δὴ δῶν παύσῃ περὶ νεῶν, καὶ σπάρτα δέχυσθαι*. Scholiastes *σπάρτα* interpretatur *σπάρτα*, *χονία*, id est funes, & rudentes. Mesue auctore Genista calida & sicca est ordine secundo, semen calidius, floribus & ramulis humiditas inest, incidens, sed excrementosa, ob id vomitoria. Quin planta hæc omnibus suis partibus conturbat, prouocat, incidit, tenuat. Pituitam & humores extrahit ab articulis valenter, vomitu, & deiectione: renes omnibus excrementis perpurgat: vrinas strenuè mouet, calculum frangit in renibus, atque adeò in vesica, nec in his materias spissari, ac in calculum durescere finit. Flores quoque huius cum Melle Rosaceo, aut ouo strumas resoluunt. Oxymel etiam ex his, aut feminibus, tumores lienis discutit. Vomitus quoque cum his frequens, ischiadi, podagræ, & renum doloribus prodest. Nocet stomacho & cordi. Ob id cum Melle Rosaceo sumi vult Philagrius, vt his partibus nocere desinat, & eadem ratione cum Rosæ & Mastiche. Semen verò eius cum aqua Mellis Rosati fumendum est. Anisi quoque, & sceniculi, vel Dauici semen eius noxas castigant. Flos modicum coqui potest, semen diutius. Datur flos à drach. duabus, vsque ad drach. quinque: semen autem à drach. duabus ad drach. quatuor: Sparti vires breuiter perstrinxit Galenus: Spartij, quo vites apud nos alligant, tum semen inquit, tum virgarum succus non instrenuè trahentis est facultatis. Paulus eademque Dioscorides habet. Genistæ flores apibus gratissimi: quare circum aluearia feruntur. Coronis etiam eos addidit antiquitas. Alia duo Spartij eiusdem genera in Hispaniis à Clusio obseruata noua quidem, & à nemine adhuc descripta hinc ob oculos ponimus. Prius stipite est plerumque cubitali, pollicari crassitudine, cortice scabro, & striato, qui in multos ramos cubitales, virescentes, & striatos diuiditur: deinde hi in virgulas iunceas, virides etiam & striatas, quæ dum nouellæ sunt & primum germinant, aliquot foliis exornantur, statim atque planta florere incipit decidentibus, vt postea *ἀπὸ τῶν* tota planta conspiciatur: à virgularum lateribus prodeunt oblongi pediculi, ex quibus dependent flores aliquot exigui, Clycyrrhizæ ferè vulgari

## SPARTIUM

Hispanicum alterum  
Clusij.






## SPARTIVM

aliud Hispanicum  
Clusij.

## SPARTIVM

Aphyllon fruticosum,  
Iuncea lanata  
capitulis.

vulgari similes, aut trifolio pratensi, colore luteo, inodori: deinde siliquula cartilaginea, rotundiuscula, colore ex flauo rufescente, in quibus semen vnicum saepius continetur, (raro bina) durum, nigrum, exiguo reni simile, quod in siliquulis, dum quatuntur, crepirat, & sonum edit: radix dura, lignosa. Alterum planè huic simile, longè tamen maius, & hominis altitudinem superans inuenitur, virgulis priore tenuioribus, lentioribus, magis obsequiosis flore paulo maiore & omnino candido: siliquulis à superiore, forma non differentibus, sed minoribus, semen etiam minus continentibus. Primum variis Castellæ vtriusque locis crescit, arenoso solo, florètque Maio: semen maturum est Iulio. Secundū Gadibus, & locis vicinis aura marina perflatis, arenoso, & sterili solo Februario florèt. Aliud Spartiū ἀφυλλον, fruticosum iuncea, aculeis lanatis capitulis depinxit Pena, inuentu minus frequens, nascens in asperioribus præruptisque cliuis Alpium Magdalenæ in Gallo Prouincia parvus hic frutex est, Latiusculè in latera aliquot Sparteos striatos, ex pullo Buxeos, lignosos, & sesquipedales surculos spargens, ea radice Tragacanthæ simili, prolixiore, nullis foliis, sed multis Senticosis ac rigidis stilis pungentibus, iuncea, in summo tantum aduncis, quorum singulis fastigiis aduoluuntur tomentaceæ gemmulae, vitis oculo similes, minores, sed concolores partim longiusculæ, & incuruæ, partim breuiusculæ, gustus nonnihil amari, exsiccantis, adstringentis: nullo aut folio, aut flore, qui hæc contemplanti visus sit.



## GENISTA ANGULOSA,

sive vulgaris. CAP. XXII.

Lib. 6. ca. 6.

In Hist. ca.

79.


Li. 3. pl. c. 33.

Nomina

Forma.

## GENISTA

angulosa seu vulgaris.

Dodon. li.  
6. cap. 6.

Tempus.

Vires.

GENISTA hæc species, veterum Genista non est, quod & si Dodon. senserit, tamen eam nomine Genistæ descripsit: Fuchsius pariter Genistæ nomine depinxit: Cordus Genistæ angulosæ nomine proposuit, Chamæspartij Tragi addita figura. Genista hæc vulgaris Gallis, Genest, & Geneste, Italis Genestra: Hispanis Genestra: Giesta, & Giestra, Germanis, Ginst, & Geinst, & Psim, & Psymmen nominatur. Fruticis huius rami in virgas plurimas distribuuntur, longas, gracilitate iunceas, angulosas, egregie virente, cortice vestitas, rectas, lentas, flexiles, distractu difficiles, & scoparum modo in densam cogeriem stipatas, in quibus folia sunt parua, oblonga, utrinque acuminata, singulis ferè exertibus terna. Flores vere virgas totas vestiunt, pisi florum figura, valde lutei, ex quibus singulæ prodeunt siliquæ, parvæ, principio leuiter hirtæ, in latitudinem quandam compressæ, cum maturæ sunt nigricantes, in quibus semen clauditur fuscum, Lenticulæ simile, minus, mediocriter durum. Radice nititur multifida, neruosa, lenta, flexili, minime fragili, coloris lutei. Totus frutex grauius olet, Sambuci propemodum instar. Saporem caudicis ramulorumque cortex, folia, virgæ, flores, semina, & radices habent, amarû, & quod reliquorum purgantium medicamentorum modo nauseam moueat. Folia Autumni exitu amittit, virgis tota hyeme inter niues grato aspectu virentibus. Nascitur in montanis & asperis locis, nec non in planis campis. Hæc

Aruerniæ montes maximè scatent. Est autem Genista hæc calida, sicca ordine ferè tertio, terget, tenuiûmque est partium. Huius foliorum, virgarum, summarumque partium decoctum ex vino, aut aqua hydropicis summopere auxiliatur, omnibusque qui hepatis, lienis, renum, vesicæ obstructionibus laborant, quia partim per aluum, partim per vrinas aquosos, serosos, aliòsque superuacuos humores educit. Eadem præstat semen drachma sumptum. Crentibus vrinam medicamentis, & lapidem comminuentibus vtiliter permiscetur: quoniam sua partium subtilitate eorum vires adauget. Flores cum axungia tusi, & admoti arthritidis dolores leniunt. Denique hanc Genistam easdem prorsus vires habere quos Spartium Dioscoridis, auctor est Dodonæus.

GENI



GENISTELLA. CAP. XXIII.




Superioris Genistæ similitudinem hæc planta à recetioribus herbariis Genistella appellatur, quod illa exilior, & humilior sit: Gallicè, *Petite Geneste*, vel *Petit Genest*, Germanicè, *Erdphymmen*, & *Stechende Ginst*. Prutex est virgas plurimas emittens, graciles, lignosas, quæ

Nomina

Dodo. li. 6. cap. 9.

Forma

GENISTELLA.



in initio, & adhuc teneræ, vestiuntur foliolis virentibus spinisque, tum etiam mollibus horrent, & parum pungentibus: At cum annum ferè excesserunt, foliolis ferè destituuntur, spinæque tum rigent, & vehementer pungunt. Inter foliola flores exoriuntur lutei, superiori Genistæ similes, sed minores, & pallidiores. Semen exiguis siliquis includitur, rotundum & rufum: radix lenta est, & sublutea. Nascitur in incultis & arenosis, ac secus vias, Maio & Iunio mensibus florere. Adstringenti cum amaritudine facultate prædita est, ac proinde valenter, citra mordacitatem exiccat. Decoctum foliorum ex aqua aut vino, si bibatur, profluuium menstruorum sistit. Ventris etiam fluori succurrit. Quare non sine magno errore quidam pro Genistâ utantur, quum facultatibus diuersis prædita sit. Genistella, inquit Ruellius, colore Rosmarini, & pene folio, flore luteo, semine rufo, quod serpentibus aduersari tradunt. Sed & frondis decocto utilis natura ad sistendos mulierum cursus menstruos: eodem aluinis succurrunt potio. Sunt qui hanc esse putant quam Galli Rosmarinum aculeatum, vel potius Iomarinum appellant, Libanotidis folio, sed rigido, ac pungente, cuius floribus pastæ apes improbum mel conficiunt. Nascitur in arenosis, secus vias, flore melino. Scorpium secundum, & Vlicem nos antea suo loco vocauimus. Armorici in quorum vastis saltibus frutex is plurimus nascitur, appellant *des Ians*, quod supra nos monuimus.

Locus.

Tempus.

Temper.

Uires

Fu. h. c. 80.

Dodo. Fu.

ch. libid.

Lib. i. c. 84.

GENISTA minima.



GENISTA MINIMA.

CAP. XXIIII.



B caulis breuitatem, & cum cæteris Genistis similitudinem hæc planta Genista minima vocatur, in sabulosis, & lapidosis tumulis Oeno fluuij per Sequanos labenti propinquius nascens, quæ à Liono Salinario Nozeretum oppidum itur. Radice est longa, crassa, lignosa, in multas radículas diuisa, nigricante: caule breui: ramis multis per terram spar-

Nomen.

Locus.

Forma.



que nous suyons les auteurs Grecs, & entre autres Dioscoride, traduisans fidelement ses mots, comme il est requis, quand il dit, qu'il sort des langues en l'Hippoglossé à la cime, & le long des fueilles, & non pas des fueilles; mais au bout de la tige, là où il n'y a plus de fueilles: car le mot en grec, signifie ouvertement cela. Par ces mots Marcellus veut donner à entendre, que l'Hippoglosson n'a pas pris ce nom de la grandeur de ses fueilles, qui sont semblables à celles du Ruscus, ny aussi pour estre formé à la façon d'une langue de cheual; & que Pline a eu tort de l'appeller Hippoglosson, veu qu'il ierre au sommet ce qui ressemble à vne langue d'homme; mais qu'il doit estre appellé Hippoglosson, c'est à dire grande

Liure 4. de  
Diosc. c. 132.

Langue. Or il semble que Cordus n'a pas bien entendu le dire de Marcellus, quand il dit, que Marcellus estime qu'il ne faut pas lire Hippoglosson: car c'est tout le contraire, comme il a esté dit. Mais il a bien meilleure raison de dire, que Marcellus ne décrit pas le vray Hippoglosson en les Commentaires, veu qu'il parle d'une certaine bourre en façon d'espice, de laquelle il n'y a aucun auteur qui en ait parlé en ceste plante. Qui plus est, ie suis de mesme aduis que Cordus, assauoir qu'il faut escrire Hypoglosson ou Hypoglossidion, ou bien Hypoglossion, comme venant de la proposition Grecque *γλωσσά*, comme il sera monstré cy apres. Mais aussi ie ne m'accorde pas avec luy en ce qu'il dit, que l'Hypoglosson est la mesme plante que le Laurier Alexandrin, assauoir celle que nous auons cy dessus nommée *Laurus Taxa*: ny aussi peu avec Matthioli, qui appelle la susdite plante Hippoglosson, encor qu'il la face differente d'avec le Laurier Alexandrin. Car si c'est là l'Hypoglosson de Dioscoride, comme pourra on entendre ce qu'il dit, qu'il a les fueilles comme le Ruscus? Ou quelles langues a il qui sortent de ses fueilles? car il n'en sort pas, ny des fueilles du milieu de la plante, ny de celles du sommet, ny aussi du plus haut de la tige. Doncques Dalechamp croit, que l'Hypoglosson de Dioscoride soit vne autre plante; assauoir celle qui est icy peinte, laquelle Matthioli a mis pour le Laurier Alexandrin: & qu'il y a tout plein de fautes en ce chapitre de Dioscoride, lequel

Liure 4. de  
Diosc. c. 142.

La forme.  
Liu 1. c. 118.

Hypoglosson.



Liure 8 des  
simpl.

Au liure des  
simpl.  
Liur 7.  
Liu 27. c. 11.

il faut ainsi corriger: L'Hypoglossé est un petit arbrisseau, semblable au Meurte sauvage (& non pas au Ruscus, comme Ruel l'a traduit) mince, (il seroit mieux s'il y auoit blanc: car Dioscoride mesmes dit que le Myrte sauvage est blanc, & a la fueille plus large & plus grande que le Meurte noir). Au sommet il y a des fueilles piquantes, & des petites langues au bout des fueilles. Ou bien comme André Lacuna le lit sur un vieil exemplaire: Et à la cime des fueilles il y a des petites iettons comme de langues. Ce que si Marcellus eust leu, il n'eust pas tant pris de peine à declarer ces mots, en grec, & n'eust eu que faire de forger ie ne sçay quelles langues. Or il n'y a point de fueilles qui puissent à meilleur droit estre comparees ensemble, ne si à propos, que celles de l'Hypoglosson, & du Myrte blanc sauvage; car elles sont piquantes au bout, & outre ce il croist au bout des fueilles des queuës longues & grailles, comme de langues qui soutiennent le fruit. Pour plus grande confirmation de cecy il y a le tesmoignage de Galien, qui doit beaucoup seruir: car il escrit ainsi: L'Hypoglosson a esté ainsi nommé, à cause qu'il sort des petites langues au dessous de ses grains. Dont il appert que ces langues ne sont pas petites fueilles qui sortent du milieu des grandes; & que pourtant l'Hypoglosson de Matthioli & des autres, qui a ces petites fueilles, n'est pas le vray Hypoglosson: mais que ce sont petites queuës, auxquelles les grains sont attachez. Mesme il met là raison pourquoy il a esté appellé ainsi: car, dit-il, il a esté appellé Hippoglosson, tant que dessous ses grains il y a de petites langues. Mesmes l'ordre de l'alphabet que Galien a suyuy monstre cela. Paulus aussi lit en la mesme façon. Pline mesme l'appelle Hypoglosson, & le décrit ainsi: L'Hypoglosson, dit-il, a les fueilles comme le Myrte sauvage, creuses & piquantes, & en icelles comme des langues, & une petite fueille qui sort des autres fueilles, &c. Or en ces derniers mots il a mal traduit ce que Dioscoride dit *ὅτι τῶν φύλλων*: car veu qu'il apert au texte: L'Hypoglosson est vne plante qui ressemble au Myrte sauvage. Il a les fueilles creuses (ou bien) il a plusieurs fueilles piquantes, & en icelles comme des langues. Or pource qu'il a obmis le mot de *minor*, aucuns ont pensé, qu'il fust superflu en Dioscoride. Ceux qui l'y adioustent disent, qu'Oribasius l'a ainsi leu, & disent qu'il a esté adiousté avec grand raison, pour monstre en quoy l'Hypoglosson doit estre comparé au Myrte sauvage. Car il y a deux sortes de Myrte sauvage; l'un qui est odorant, dont il y en a grande quantité le long de la Marine en Prouence, & croist à la hauteur d'un homme, ayant le tronc gros: l'autre qui ne sent rien, & est petit, iettant plusieurs petites verges,



## Du Laurier Alexandrin. Chap. XLVII. 175

qui est appelé *Ruscus* en Latin. Les feuilles de ce dernier sont plus grosses: celles du premier sont plus minces, auxquelles celles de l'*Hypoglosson* sont comparees. L'*Hypoglosson* croist aux forests & lieux montueux. Dioscoride dit qu'une couronne des feuilles d'*Hypoglosson* amoindrit la douleur de teste en la mettant dessus; on melle sa racine, & son suc parmy les emplastres. Selon Galien, sa racine & son suc ont vne vertu d'amollir.

Le lieu.  
Au meillieu.  
Au meillieu.

Du Laurier Alexandrin,

CHAP. XLVII.



AVANT que ces trois plantes ont les feuilles, le fruit & leur nom semblable, cela a esté cause, qu'elles ont esté diuerfement nommees par les auteurs: car celle qui est appelée *Bislingua*, aucuns l'appellent *Hypoglosson*; & les autres *Laurier Alexandrin*, comme il a esté dit. Cordus prend la *Bislingua*, l'*Hypoglosson*, & le *Laurier Alexandrin* pour vne mesme chose. Matthioli & Cornarius estiment, que l'*Hypoglosson* & le *Laurier Alexandrin* sont plantes differentes. Dalechamp les distingue autrement & mieux, à mon aduis: car il veut que la plante appelée *Bislingua*, *Bonifacia*, & *Vunlaria*, soit le *Laurier Taxa* de Plinie; & que la plante descrite au chapitre precedent, soit l'*Hypoglosson* de Dioscoride, & de Galien, & l'*Hypoglossa* de Plinie: & que la plante qui est icy peinte, soit le *Laurier Alexandrin*, combien qu'aucuns l'appellent aussi *Hypoglosson*, & *Hypoglossidion*. Les Grecs l'appellent *δάφνη ἀλεξάνδρεια*, & *ιδέα*: Les Latins *Laurus Alexandrina*, & *Idaea*, d'Alexandrie, qui est en la region de Troas, où est le mont Ida, autour duquel ceste plante croist: & non pas, comme dit Marcellus de ce qu'Alexandre estant vainqueur s'en fit vne couronne. Les autres, selon que dit Plinie, l'appellent *Hypoglosson*, ou *Daphnitis*, ou *Carpophyllon*, ou bien *Hypelate*. Or que ce soit la plante qui est icy peinte, la description que Dioscoride & Theophraste en font le monstre clairement. Voicy comme en parle Dioscoride: Le

Les noms.  
Livre 4. de  
Diosc. c. 132.  
Livre 4. de  
Diosc. c. 142.  
Enabl. 127.  
Livre 4. de  
Diosc.

Les noms.  
Livre 4. de  
Diosc. c. 148.  
Liu. 15. c. 30.  
Liu 4. c. 142.

Vray Laurier Alexandrin.



*Laurier Alexandrin* a les feuilles comme le *Rusc*, (Plinie dit comme le *Myrte*) toutefois elles sont plus grandes, plus molles, & plus blanches, (Plinie adiouste plus aiguës. Il porte son fruit au milieu de ses feuilles, (& non pas comme Plinie & Ruel disent, la semence entre les feuilles) rouge, de la grosseur d'un pois Ciche. Ses branches sont couchées par terre, de la longueur d'une paume, ou un peu plus longues. Sa racine est semblable à celle du *Rusc*, (non pas comme dit Ruel, à celle du *Myrte* sauvage,) plus grande, plus molle, & odorante. Il s'en treuve aux montagnes. Theophraste dit ainsi: Il y a des plantes portans fruit, qui embrassent leur fruit dans le milieu de la feuille, comme le *Laurier Alexandrin*, qui porte son fruit sur ses feuilles. Et derechef: Le *Laurier* a cecy de propre, qu'il porte le fruit sur ses feuilles, comme le *Rusc*: car l'une & l'autre de ces plantes fait le fruit sur le dos de la feuille. Or veu que ceste marque est toute evidente en la plante qui est icy peinte, cela monstre que sans doute c'est le *Laurier Alexandrin*, mesme que toutes les autres marques luy conuiennent bien. Le *Laurier Taxa* a bien vne petite feuille qui sort du milieu de la grande, & laquelle couvre le bout d'embas de la queue qui soutient son fruit: l'*Hypoglosson* a des petites langues qui sortent des feuilles, & soutiennent le fruit: mais ce *Laurier Alexandrin* porte son fruit aux feuilles mesmes, qui n'est point couuert d'aucune petite feuille. Or combien que ces plantes soient ainsi distinguees par ces marques si signalees, & que Dioscoride, Galien & ceux qui les ont suyuy, ayent traité de chascune à part, comme estans differentes; ce neantmoins Cordus

Livre 1. de  
l'hist. ch. 16.  
Livre 4. de  
l'hist. ch. 17.

Au meillieu.

tient, comme il a esté dit, que c'est vne mesme plante, alleguant ces raisons icy: L'*Hypoglosson*, dit-il, ou *Hypoglossidion*, ou *Hypoglosson* est aussi appelé *Laurier Alexandrin* par Dioscoride & tous les autres, disans que l'un & l'autre a les feuilles comme le *Rusc*. Toutefois Dioscoride en traitant du *Laurier Alexandrin* ne parle point des petites feuilles, qui sortent des grandes, comme aussi en traitant de l'*Hypoglosson* il ne dit pas que le fruit soit attaché à la feuille. Mais il est aisé de supplier à ce qui s'en faut en leur description par la description mesme d'une chascune d'icelles: car parce que la description de l'*Hypoglosson*, & du *Laurier Alexandrin* conuient fort bien avec celle de l'*Vunlaria*; & ce que des grandes feuilles il en sort des petites, qui sont toutes piquantes comme celles du *Rusc*: ce qu'il le porte aupres des petites feuilles un fruit rouge, de la grosseur d'un pois Ciche, il veut inferer de cela que l'*Hypoglosson*, & le *Laurier Alexandrin* sont vne mesme plante, assauoir celle qui est

P 4 appelée




## CHAMAESPARTIVM

Tragi.



## CHAMAEGENISTA

peregina Clusij.



Li. 3. Plant.  
cap. 33.  
In Hort.  
Germ.

Planta omni prorsus odore caret. Hæc paucis cognita est: nonnullæ tamen mulierculæ *Clein Strehblumen*, hoc est paruos Tinctorios flores vocant. Sunt qui *Erdspimmen*, id est terrestrem, seu humilem Genistam nuncupant. Græcè fortè licebit *Χαμασπάρτιον* dicere. Flores puerorum quoque crepundii, & lusibus inseruiunt, & temperamento Orobi Fœnigraci esse mihi videtur. Hæc Tragus in cuius figura Chamaespartij, flores non recte sunt expressi. Plantam hanc si Gesnerus Genistam esse angulosam Cordi existimauit, quod eius picturam Genistæ angulosæ descriptioni apud Cordum apposuit, rem non satis inspexisse videtur. Cordus enim Genistam angulosam à nobis descriptam, vulgarem nostram Genistam, siue Spartium angulosum intellexit. Chamaespartij etiam meminit Gesnerus. Alia quædam in Genistarum genere, inquit, caulibus angulosis, & peculiari quodam modo foliatis. Chamaespartium dixeris. Ab hoc diuersa est Chamaegenista peregrina Clusij, quam Lobellius pingendam curauit, Clusius sic descripsit. Vix palmari magnitudine assurgit, admodum fruticosa, foliis Chamælexæ proximis, breuioribus, duris & carnosiss, per ambitum aliquantulum sinuosis, & crispis, rigidiusculisque, vno ex altero è medio neruo prodeunte, quem admodum in Chamaegenista illa, quam nonnulli Sagittalem vocant, interdum vero binis ternisque simul exorientibus: hic verò neruus paulatim intumescit, & in ramulum conuertitur, quandoquidem tota planta foliosa sit: in extremis istis foliis quini sensue, aut plures flores simul iuncti, ex villosis caliculis nascuntur, Genistæ similes, sed minores, aurei plane coloris, quorum bina inferiora folia incana lanugine pubescunt. Floret Martio in incultis locis Valentini regni.

SPAR



## SPARTVM HISPANICVM, CAP. XXVIII.

**H**ONGE aliud esse Spartum Hispanicum à Græcorum Spartio. Hermol. Marcell. Dodonæus, Cornarius, Amatus Lusitan. Andreas Lac. rectè existimarunt. Id hodie in Betica Hispaniæ regione, & Algarbia Lusitanorum, Aphrica finitima provenit: & ab incolis Spartio etiamnum vocatur. Est autem frutex lunci aculeati modo aceruatim sponte sua nascens, virgis ad summum cubitalibus, solidis, fractu cōtumacibus sine folio, semine, & flore, præcipui ad vincula vsus. Ex his etiam sportula, corbes, calathi fiunt, quibus ficus, Vuæ passæ, aliæq; merces in alias regiones asportantur. Hoc Spartum Plinius à Græcorum Spartio distinxit, eiusque naturam seorsum explicavit his verbis. Sparti quidem vsus multa post sæcula cœptus est, nec ante Pœnorū arma, quæ primū Hispaniæ intulerunt. Herba est hæc sponte nascens, & quæ non queat feri, Iuncusq; propriè aridi soli, vni terræ dato vitio. Namq; id malum telluris est, nec aliud ibi feri, aut nasci potest. In Aphrica exiguum & inutile gignitur. Carthaginienfis Hispaniæ citerioris portio, nec hæc tota, sed quatenus parit, montes quoque Spartio operit. Hinc strata rusticis eorum, hinc ignes faciesque, hinc calceamina, & pastorū vestis, animalibus noxium, præterquam cacuminum teneritate. Ad reliquos vsus laboriosè euellitur, ocreatis cruribus, manibusq; testis manicis conuolutum osseis ligneisque cōnamentis. Nunc iam hyeme vix: facillimè tamen ab idibus Maiis in Iunias: hoc maturitatis tempus. Vulsū & examinatum, fascibus in acervo biduo, tertio resolutum, spargitur in sole, siccaturq; , & rursus in fascibus reddit subtectā. Postea maceratur aqua marina optimè, sed & dulci, si marina desit, siccaturq; sole, iterum rigatur: si repentè vrgeat desiderium, perfusum calida in folio, ac siccatur stans, compendium operæ fatetur. Hoc autem tunditur, vt fiat vtile, præcipuè aquis mariq; inuictum. In sicco præferunt è Cannabi funes: At Spartū alitur etiam demersum, veluti natalium sitim pensans. Est quidem eius natura interpollis: rursusq; quamlibet vetustum nouo miscetur. Verumtamen completetur animo qui volet miraculum æstimare, quanto sit in vsu omnibus terris, nauium armamentis, machinis ædificationum, aliisque desiderijs vitæ. Hæc Plinius: qui paulo post Theophrastum nullam omnino Sparti mentionem habuisse tradit, cuncta cura magna persecutum ante ipsum annis cccxc. Cornarius tamen Linospartum Theophrasti non aliud esse quam Spartū, è quo Plinius Lina ad retia præcipua fieri dixit, constanter credit, eiusq; mentionem fecisse Theophrastum, cum inter ea recenset, quæ multiplicem corticem habent. Verba eius hæc sunt. καὶ τῶν μὲν πυλῶντος ὁ φλοιὸς, οἷον φιλύρας, ἐλᾶτης, ἀμπέλης, λινωσπάρτου, κρομύων. Matthioli aliam Genistæ, aliam Spartij Dioscoridis figuram pinxit, quod idem esse cum Hispanico à Plinio descripto videtur existimare. Sed in hac figura quædam absurdè picta esse animaduertunt docti Herbarij. Eam tamen imitati Dodon. & Fuschius pro Spartio etiam exhibuerunt. Gesnerus Genistæ Iuncea Cordi eandem apposuit. Flores enim minimè quadripartiti esse debent, etiam si Dioscorides Spartium florem habere vt Leucoium dixerit, colorem colori, non figuram figuræ, ferens, vt iam indicauimus. Spartū certe Hispanicum folio, floræ, & semina destitutum est, nec ramos habet, qui in ramulos diuidantur, atque adeo Sparti planta nihil aliud est, quàm tenuium Iuncorum aceruus. Qua de re vt diligentes Herbarij ex collatione verius iudicare possint, Spartij Icones aliquot ex Clusio hîc adiecimus. Spartum Hispanicum, siue Plinij, numerosa, tenuia, Iuncea viridiæq; folia habet, ex eadem radice prodeuntia, cubitali longitudine, quæ dum nouella sunt, latiuscula cernuntur, & inferiore parte canescentia, tempore verò contrahuntur & conuoluuntur, fiuntq; Iuncea

Corol. 160.  
lib. 4. Diosc.  
In hist. su.  
cap. 33.  
Embl. 137.  
li. 4. Diosc.  
Enar. 18. li.  
4. Dioscor.

**Nomina**

**Locus.**

**Forma.**

**Vfus.**

Lib. 19. c. 2.

Embl. 137.  
li. 4. Diosc.  
Lib. 19. c. 2.

Lib. 1. Hist.  
cap. 8.  
Lib. 4. Diosc.  
scor. ca. 152.  
Lib. 19. c. 2.

Li. 3. pl. c. 34  
Lib. 4. c. 152.

Lib. 2. stirp.



## SPARTVM PLINII

ex Clusio.




apud quos nascitur Sparto nuncupatur, à Prouincialibus Elpho, illud ipsum quod Plinius eo loco, quem hoc capite citauimus, descripsit. Eodem est in vsu nunc apud Hispanos, qui fuit Plinij tempore. Nam ex crudo & siccato taperas, siue aulæa, storeas, corbes, rudentes, aliòsque funes cõficiunt: Ex eo aqua, veluti

Iuncea, dura, flexilia tamen, & marginibus, sic agglutinatis, vt vix rima appareat, nisi curiosius obserues. Ex his foliis culmi emergunt paulò longiores, qui vere & æstate paruam paniculam arundinaceam ferunt. Arundinis ferè modo florentem, deinde oblongum semen, veluti nonnulla graminis genera. Radices subsunt fibratæ & perennes. Multæ simul nascuntur huiusmodi plantæ, contiguæ Iunci modo, vt nonnunquam vna planta, siue multarum congestarum cumulus duorù pedum spatium, aut amplius in ambitu occupet. Plurimum nascitur in multis Baeticæ locis, sed omnium copiosissimũ ab initio Regni Granatensis siue Baeticæ limitibus vsque ad Murgim vrbẽ, vulgo Murcia dictã, vt non sine causã totus ille tractus à veteribus appellatus sit Cãpus Spartarius, quo noua Cartago, vulgò Cartagena, vrbs maritima cõtinetur, à nònulis etiã Spartaria cognominata, ob Sparti eo in loco nascentis copiã. Nascitur & in Valétino agro longè vberius, & lætius. Est verò Spartum hoc, quod etiam ab Hispanis

## SPARTVM ALIVD

Plinij ex Clusio.



## SPARTVM tertium

Clusij.



linum,



dinum, materato, deinde siccatō tuloq; calceaminis genus quod ipsi Alpergates vocant, funes etiam & alia subtiliora opera nectunt. Aliud Sparti genus nascitur in Mūrciano regno, humidioribus præsertim locis, superiore tenuius, cuius rarus est vsus floreis, aut aliis huiusmodi conficiendis, sed plurimus ad lineos saccos quos lectis substernunt, implendos, quemamodum nos stramine vti solemus, quoniam molliore tenuioreq; sit lunco quàm superius: paniculam fert breuem, & membraneo folliculo, instar floris Narcissi, & similium ferè, inclusam. Nascitur eodem quo prius modo, & paulò maturius floret, nempe Martio mense. Incolæ *Albardin* vocant, fortasse quia clitellas ex crassiore cannabina tela confectas, quas iumentis imponunt, quasque *Alabardas* vocant, isto Sparto compleant. Inuenitur apud Bergas atque etiam in nonnullis Galliæ locis, in aggeribus sabulosis Oceano propinquis. Sparti genus quoddam *Halm* ab incolis vocatū quasi ὁλμυρον, ἀπὸ τῆς ἁλὸς, id est à sale, priori ferè simile, sed multo maius, & rigidius, cruribus eorum, quibus per eos aggeres iter est sine ocreis, permo- lestum: pungit enim, & cutim penetrat. Crescit eodem modo quo superiora, spicam ferens secales ferè instar. Hæc de Sparto Hispanico literis mandata, & obseruata.

## TAMARIX, CAP. XXIX.

**T**έριν, Latinè etiam Myrice, & Myrica, & Tamarix Plinio etiā Tamarice, in Achaia Bria sylvestris, Officinis Tamariscus, Arabicè *Tarfa*, seu *Carfa*, Gallicè *Tamaris*, Italicè *Tamarigio*, Germanicè *Tamarisken*, aut *Porst*, Hispanicè *Tamargueira*. Eius genera duo sunt Dioscoridi, altera sylvestris, arbor vulgo cognita, quàm hîc pictam damus, altera quæ in Ægypto, Syriaq; gignitur, mitior sylvestri. Rursus Tamaricis duplex

**Nomina**  
Lib. 13. c. 21.

Lib. 1. c. 99.  
**Genera.**

In lib. Dioscor. ca. 17.

TAMARIX  
Matthioli.

genus in Germania inueniri tradit Cordus. Alterum solidiore ligno, medullaq; admodū exili, & foliis tenuioribus, copiosè ad Rhenū circa Argentoratum nasens: alterum ampliore medulla, foliis latiusculis, lignoq; non vsq; adeo solido, quod frequenter ad Danubij, & Vuertachi ripas in Vindelicia provenit, præsertim circa Augustam. Tamarix quæ vulgo in Italia, & Gallia Nabornensi nascitur, frutex est, aut arbuscula, sæpius hominis tantum altitudine. Quam ob causam Virgilius humiles Myricas appellauit, ramis plurimis aliquando in viridi pallidis, aliquando fuscis: foliis Sabinæ, aut Ericæ, paruis, carnosiss, & nūquam decidentibus, vt ait Plinius, fructu florī simili in purpureum inclinante, muscoso, qui demū in pappos euolat. Plinius fructum nullum ferre, hoc est ne semen quidem, sed scopis tantum nasci scripsit. Vt qui id quod Dioscorides dixit, ἡ γὰρ οὐκ ἔχει σπέρμα, & πρὸς τὸν τὸν σπέρματι, neque semen, neque fructum esse, aut dici debere putarit. Narbonensem & Germanicam Tamaricem Pena sic descripsit & depinxit. Vulgatiorem, inquit, facieq; Ericæ

**Forma.**

Eclo. 4.

Lib. 16. c. 21.  
& 24.  
Lib. 16. c. 26.

prioris videas præcipuè in riguis & maritimis Gallo prouinciæ & Lio Venetorum,



TAMARIX  
Germanica.TAMARIX  
Narbonensis.

Lib. 24. c. 9.

fert in Ægypto Syriaq; etiam abundanter lignosum fructum, maiorem Gallæ, asperum gustu, quo medici vtuntur vice Gallæ, & in compositionibus quas Antheras vocant. Quæ alicubi reperitur in hortis, & in quibusdam viridariis, minor credita, inquit Matth. non alia est quàm sylvestris in locos mitiores translata. Indicio sunt fructus & flores sylvestribus omnino similes, non autem Gallæ. Romæ Tamaricem insigni proceritate sese vidisse idem testatur, in hortulo quodam, quæ etsi pro satia ab omnibus haberetur, tamen fructus, florésque ferebat sylvestri similes. Apud pigras & stagnantes aquas nascitur. Ad fluminû ripas frequentissima provenit in Italia. Satiua in Syria & Ægypto copiosa est, cuius infœlicia ligna appellantur, inquit Plinius. Cur autem infœlicia alio loco docet. Infœlices arbores existimantur, inquit, damnataq; religione, quæ neque feruntur vnquam, neque fructum ferunt. Rursus alio loco de Tamarice loquês. Vulgus infœlicem eam arborem appellat, quoniam nihil ferat, nec feratur vnquam. Steriles igitur arbores infœlices nominantur. Cicero. Infœlici arbori suspendito, & ita Liuius. Attamen hanc Myricam, cuius infœlicia ligna appellari ait, fructum ferre Gallæ similem idem Plinius scribit, & infœliciora ligna esse Græciæ, Ostryiæ quæ Ostrygn gignat. Ostryis tamẽ ordeo simile semen habet, figura, & colore: Illa verò puella Catulli, quæ vouet se daturam Vulcano lectissima Volusij Poëtæ carmina, Infœlicibus vstulanda lignis, non temerè infœliciû lignorum meminit. Sciendum enim veteres solitos esse plerumque prodigia & portenta sic procurare, vt exurerent lignis infœlicibus. Macrobius. Arbores quæ inferum deorû auertentiumq; in tutela sunt, eas infœlices nominât: subiicitq;, quibus portenta prodigiaq; comburi iubere oportet. Græci ex spinosis lignis quæ infœliciora videbantur, comburere solebant, & cinerem in profluentem proicere, vt ostendit Theocritus de anguib; quos Hercules in cunis eliserat. Ergo Catulli puella, vt malum quoddam prodigium vouerat se crematuram versus optimos Volusij lignis infœlicibus. Sed ad Tamaricem redeat oratio.

Huius

Lib. 1. Diof.  
cap. 99.

Locus.

Lib. 13. c. 21.  
Lib. 16. c. 26.

Lib. 24. c. 9.

Pro Rab.

Cap. 21. 13.

Tur. T. 2.  
Ad. lib. 18.  
cap. 11.  
Lib. 3. c. 20.



Huius fructus, inquit Dioscor. datur cruentæ excreationi in potu, & cœliacis, & contra profluvia fœminarum, regium morbum, & Phalangiorum morsus: illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum lienem absomit: ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxione vulvæ opportunis, in desseffionibus: phthiriasi, Lendibusq; circumfusum prodest. Abundantiam fœminarum sistit impositus arboris cinis. Potorios calyces è caudice lienosis moliuntur, quo datus in his potus proficiat. Myrica Galeno abstergentis est incidentisq; facultatis, absque manifesta desiccatione. Habet verò etiam adstrictionem nonnullam. Has ob qualitates, facultatesque admodum prodest lieni duro, decocta cum aceto, aut vino, siue radice, siue foliis, siue extremis ramulis: sanat etiam dentium dolores. Cæterum fructus, & cortex non paucam sortita sunt adstrictionem, adeo ut Galla Omphacitidi proxima sint, nisi quod acerbitas evidens est in Galla, sed Myricæ fructui temperatura inest inæqualis, quoniam immixta est naturæ eius multa partium tenuitas, atque vis adstringendi, quod sanè in Galla non inest. Attamen ubi Galla fortè ad manum non erit, eo uti liceat ad omnia, ad quæ illa utimur, ad eademque, præterea & cortice. Porro Myricæ combustæ cinis admodum desiccatoris facultatis est, plurimam habens abstergerendi facultatem, paucillam adstringendi. Myricen & Ericen vocat Lenæus, inquit Plinius, (sic emendat Cornar. ex vetere libro manu scripto vulgatos Codices, in quibus habetur, Myricē, quam & Tamaricen vocat Lenæus) similem scopis Amerinis dicit. Sanari ea carcinomata, in vino decocta, tritaque, cum melle illita. Arbitrantur quidam hanc esse Tamaricen. Sed ad lienem præcipua est, si succus eius expressus in vino bibatur. Adeoque mirabilem eius antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt, ut affirmet, si ex ea alueis factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini quoque splenetico cibum protumque dant in vasis ex ea factis. Grauis auctor in medicina virgam ex ea defractam, ut neque terram, neque ferrum attingeret, sedare ventris dolores asseueravit impositam, ita ut tunica cinctumque corpori apprimeretur. Datur sanguinem reiicientibus cortex tritus, & contra profluvia fœminarum, cœliacis quoque. Idem tusus, impositusque, collectiones omnes inhibet: Foliis exprimitur succus ad hæc eadem. Et in vino decoquuntur. Ipsa verò adiecto melle gangrænis illinuntur. Decoctum eorum in vino potum, vel imposita cum rosaceo & cera sedant: quidam hæc conturbata sic legunt. Et in vino decoquuntur ipsa: adiecto vero melle gangrænis illinuntur, vel imponuntur cum Rosaceo & cera. Sedat & decoctum eorum in vino potu. Sic & epinyctidas sanant. Ad dentium dolorem, auriumque, decoctum eorum salutare est: radix ad eadem, similiter & folia. Hæc amplius ad ea quæ serpūt imponuntur cum polenta. Semen drachmæ pondere aduersus Phalangia & Araneos bibitur. Cum alrillium verò pingui furunculis imponitur. Efficax & cōtra serpentium ictus, præter quam Aspidum. Nec non morbo regio, phthiriasi, lendibusque decoctum infusum prodest, abundantiamq; mulierum sistit. Cinis arboris ad eadem omnia prodest. Scribit Columella, sues dum dulcedinem pabuli confectantur, supra modum æstate splenis incremento laborare. Cui succurritur, inquit, si fabricentur canales ex Tamaricibus, & Rusco) repleanturq; aqua, & deinde sientibus admoueantur. Quippe ligni succus medicabilis epotus intestinum tumorem compescit. Myricæ cinerem omnia vlcera ignis exustione contracta efficaciter exsiccare auctor est Serapio. Folia, inquit Matthiolus, simul cum tota planta potu frigidas collectiones inhibent, ac reprimunt. Rami contusi ex aceto illiti lienem attenuant. Datur ramorum cortex ad diuturnas alui fluxiones.

Lib. 1. c. 99.  
Vires.

Li. 7. simp.

Lib. 24. c. 9.  
Embl. 95. li.  
1. Dioscor.

Lib. 7. c. 10.

In li. 1. Dic-  
scor. c. 99.



Ibidem.

Lib. 2. mor.  
mulieb.  
Ibidem.

Fructus potui datus confert viperæ morsibus. Elephantiasim lienis vitio obortam Myricæ radicem decoctam, cum vis pafsis epotum sanare tradidit Alcanzias Arabs, id quod se vidisse ait in duabus mulieribus, quæ illo morbo tenebantur. Ex quo colligit Matthiolus id decoctum commodum fore morbi Neapolitani remedium, Gaiaci ligni decocto fortasse haud absimile. Myricæ radices pro odorata Calsia vendirabant impostores. Sed fraude à Peritis materiæ medicæ viris deprehensa, eius in Officinis vsus penitus exoleuit. Hippocrates eodem libro *πρόμαλον* bis habet, qua voce Myricam Cornarius intelligit. Posteriore loco, id ad suffitus, cum vteri loco moti vexant, probat. Priore verò sic habet: *ὅν δὲ ἐτι φέρηται ὁ ῥόος, πρόμαλον φώξας, & τριπλῆς ἐν ὀνυφιδίῳ*. Id est Cornario interprete. Si verò adhuc feratur fluxus, *πρόμαλον*, siue Myricâ torreto, & tritam in vino dato. Græci dictionarij *πρόμαλον*, *ἡ μυρικήν*, *ἢ ἄγρον* exponunt. Quidam eam quæ felici auctu adoleuit *πρόμαλον* intelligunt. Videtur autem Hippocrates liberum reliquisse, siue quis fructu, siue cortice Myricæ uti velit: vtrumque Dioscorides fluxione laborantibus fœminis commodum esse tradit.

## S A B I N A, CAP. XXX.

Nomina



ABINA, vel Sauina Romanis, *Σάβινος* Græcis, & *Σάβυρον* dicitur, Arabibus *Abhel*, seu *Alharar*, Gallis *Savinier*, Italis & Hispanis *Sabina*, Germanis *Sebenbaum*, Boemis *Klafterska*, *Cuuogka*, Belgis *Sauelboom*, Anglis *Sauin tre*. Officinæ Sauinæ nomen retinuerūt. Sabina duum est generum auctoribus Dioscoride & Plinio. Vna foliis Tamarici similis, altera Cupresso, quare quidam Creticam Cupressum dixerunt. Vtraque in multis Galliarum nostrarum hortis provenit, miranda natura, & contemplatione dignissima. Frequentior quæ Tamarici similis est, Fruticis, seu arbusculæ forma crescit, semper tamen altera humilior, ad sesquicubiti, aut vix ad cubitorum duorum alti-

Genera.

Lib. 1. c. 88.

Li. 24. ca. 11.

Locus.

Forma.

## S A B I N A

Tamarici similis.



## S A B I N A

Cupresso similis.



rudinem



tudinem sese erigens, trunco brachij interdum crassitudine, ramos plurimos in latum fundente, & explicante. Folia cum oriuntur, Cupresso similia sunt, deinde in foliorum Tamaricis figuram abeunt, candidiora, leuiusculè pungentia, perpetuò virentia. Odorem planta hæc valde grauem & validum spirat. Quæ Cupressum refert, procerior est. Sæpè etenim hominis altitudinem attingit, interdum celsior. Folia recentia, & adhuc tenella Tamaricis foliis proxima sunt, cum adoleuerint foliorum Cupressi figurā imitantur. Imbecillioris hæc ac minus grauis est odoris quàm prior: immortali, vt & altera coma viret: vtraque baccas fert nigras Iuniperinis similes. Id testantur Fuschius, Dodon. Cordus, Gesnerus, atque ipsa experientia. Quare non rectè videtur Matthiolus partiri Sabinam in sterilem & fructiferam: & hanc baccarum colore differentem, quæ in altera cærulea, in altera rubentes spectantur. Quanquam Plinij auctoritate sese tueri potuerit, qui Sabinam negat fructum ferre, cum dicit. Sabina herba propagine feritur, & auulsione. Et paulò post. Iisdem modis Rosmarinum ferunt, & radio: quoniam neutri semen. Hæc accedit Serapionis testimonium, sic scribentis. Abhel, id est Sabina, quæ & Brathys dicitur, non habet fructū. Sed hac in re temerè his auctoribus fides adhibenda non est. Vtraque enim tam Rosmarinus, quam Sabina semina ferunt, demonstrante id annua experientia. Sabina verò non semina tantum, sed & fructum fert Iuniperi baccis colore & figura similem, vt diximus, verum paulò maiorem, & gustu acriorè. Sed cū non in omnibus locis, & rarissimè fructum proferat, id in causa fuit, cur multi sterilem esse existimauerint. Secundæ Sabinæ coniungenda alia quam Lobellius ostendit, ramulorum exilitate, & foliorum lenitate duntaxat diuersa, inquit, media inter Sabinas, & Cedros Phœnicias videtur, sed folia tenuiora & delicatiora, minimè aspera & pungentia sunt. Fructus Iuniperi minori par, similis, & concolor. Natalibus gaudet motosis Calabria, & Apulia. Hæc Lobellius. Nascitur & in cõualibus Alpibus supra Gratianopolim, prope vicū què incolæ vocāt *Bourgduisanz*. Mirum etiam quod herbam Plinius appellet Sabinam, cum omnibus constet fruticem, atque etiam arborem esse, non herbā. Quæ verò Sabina baccis rubentibus à Matthiolo esse dicitur, Sabina proculdubio non est, sed Thuia Malsiliensis, quam *Serbin* vocant, à nobis iam descripta, & quam Cedrum Lyciam esse Bellonius putat, à qua non solum baccarum colore Sabina differt, sed & odoris proprietate. Idem Bellonius Sabinam alterā Cupresso similem affirmat se frequentissimam vidisse in Amano, & Olympo Phrygiæ montibus, tota facie Iuniperum maiorem referentē, magnitudine Amygdalæ arboris maioris, foliis Cupresso per omnia similibus, baccis per maturitatem in cæruleo nigricantibus, & caudice resinam ferente. Eum Matthiolus meritò reprehendit, Sabinam hanc ineptè inter resiniferas recensentem, quam tot notis ab altera Sabina non distinxit Dioscorides. Eandem paulò post, parum sibi constans Bellon. quam Sabinam alteram Dioscoridis esse assererat, arborem eam esse statuit, quæ à Plinio Brutes

De Histor.  
ca. 54.  
Lib. 6. c. 84.  
In li. 1. Dio-  
scor. c. 105.  
In Hort.  
Germ.  
Lib. 17. c. 13.

Cap. 280.  
Cordus  
ibidem.

Li. de Co-  
nif.

Lib. 12. c. 17

S A B I N A  
Baccata altera.





- Lib.12. c.11. appellatur, quasi vero Plinius Sabinæ vtriûsque suo loco non meminerit, nulla Brutæ arboris in Sabina describenda facta mentione. Hanc Bellonij Sabinam
- Inhil. c.16. pro Thyiæ genere alibi descripsimus. Sunt qui Auicennam censent Sabinam vno loco cum Iunipero altero cum Absinthio marino turpiter confudisse.
- Lib.2. ca.5. Prior locus is est. Abhel quid est? Est fructus Alharar, similis Alzarur. Et mox, Arboris eius duæ sunt species. Vna cuius folia sunt sicut folia Cupressi, multas habens spinas, quæ dilatatur, & non elongatur. Alia est cuius folia sunt, sicut Tamaricis, &c. Quem locum sic exponunt. Abhel fructus est Iuniperi, similis Mespilo Azarolo, ut quæ sequuntur de Iunipero non sint accipienda, quam alibi nomine Harar in minorem & maiorem distinguit, sed de vtrâque Sabina, cum Abhel, id est Iunipero perperam commixta. Quare Matthiolum hoc Auicennæ testimonio Sabinam fructiferam esse probare volentē, nominis Abhel homonymia deceptum fuisse arbitrantur: quod ut à Serapione pro Sabina, ita hîc quoque ab Auicenna fructum Harar esse definiente, pro eadem usurpari crediderit. Imo ipsos falli, ac vehementer errare putauerim. Auctorem enim habeo Andr. Bellunensem, qui scribit Abhel non esse verum Alharar, sed eius speciem, & in libro Ebenbitar reperiri, eos errare, qui dicunt Abhel esse Alharar: quare ex eius effectis, & foliis Tamarici similibus colligi Abhel Sabinæ, aut generis ipsius fructum esse, & non Iuniperi. Verborum igitur Auicennæ is sensus erit. Abhel fructus est Iunipero similis, & Mespilo Azarolo, siue Aronia, &c. Posterior locus Auicennæ est de Sceha, id est Absinthio marino. Sceha sunt duæ species. Vna est spinosa habens folia Cupressi, &c. Et alia habet folia ut Tamariscus, &c. Quo loco cum de Absinthio marino ex Dioscoridis sententia tractet, absurde admodum ut Sabinam in duo genera distribuit, ut alterum foliis Cupresso, alterum Tamarici simile sit. Nunc de Sabinæ viribus dicamus. Vtriûsque folia nomas sistunt, inquit Dioscorides, collectiones illitu mitigant: quin & cum melle illita nigritias, sordesque repurgant, & carbunculos rumpunt: cum vino pota sanguinem per vrinas eliciunt: partus apposta extrahunt, & suffitu idem præstant. Quod de carbunculis Dioscorides dicit, in Græcis legitur, *ἡ ὑβραγὸς ἀεὶ πρὸς τὸν ἰλὸν*, id est carbunculos deterunt, sed falso, ut annotat Cornarius, legendum enim *ἀεὶ πρὸς τὸν ἰλὸν*, id est, abrumpunt, emarginant, circumscribunt, ut idem sit quod *ἀεὶ πρὸς τὸν ἰλὸν ὑβραγὸς*, velut de Pice liquida dixit. Sabina Galeno est ex numero fortiter exsiccantium, idque secundum tres qualitates quas in gustu præfert, similiter Cupresso, nisi quod ea acrior est, & ut sic dixerim magis aromatica, seu odoratior. Igitur huius quam modo dixi qualitatibus particeps est, nempe acrimoniæ consistentis in temperamento calido, præterea amaritudinis, & adstrictionis obscurioris quàm in Cupresso. Siquidem quanto magis acrimonia superat, tanto etiam potentiùs digerit. Itaque glutinare nequit ob siccitatis & caliditatis robur. Nam vtriûsque illi tantum inest, ut etiam tendat. & inflammationem adferat. At putredinibus similiter Cupresso accommodari potest, maximè ubi rebelliores, & diuturniores fuerint. Nam hæc citra noxam vim medicamenti perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida cum melle expurgat: carbunculos soluit. Porro essentiæ tenuitate menses quoque prouocat, ut si quid aliud, & sanguinem per vrinas mouet. Fœtum etiam viuentem interficit, & mortuum eiicit. Esto autem hoc medicamen tertij ordinis tum exsiccantium, tum desiccantium, ex numero eorum quæ maximè tenuium sunt partium. Quidam Cinnamomi vice duplum eius substituunt. Est enim extenuantis & digerētis facultat is, si potum fuerit. Sabina, inquit Plinius, à multis in suffitu pro Thure assumitur. In medicamentis verò duplicato potere eisdem effectus habere, quos Cinnamomum, tradunt. Collectiones minuit, & nomas



nomas compescit. Illita vlcera purgat. Partus emortuos apposita extrahit, & suffitu. Illinitur igni sacro, & carbunculis. Cum melle & vino pota regio morbo medetur. Gallinacei generis pituitas fumo eius herbæ sanari tradunt. Matthi-  
 ulus auctor est Sabinæ puluerem cum butyro permixtum, ad manantia infan-  
 tium capitis vlcera magnopere conferre. Eundem drachmæ pondere ex butyri  
 vnciis tribus & duabus mellis sumptum asthmaticis mirificè prodesse. Dari  
 quoque summo auxilio succi Sabinæ drachmas duas cum Chrysocollæ fossilis  
 drachma, & vini albi vncia, ægrè parturientibus, sed non nisi flagitante neces-  
 sitate. Tragus herbæ cuiusdam meminit, quam Sabinam nominat. Sed cum mu-  
 sci genus sit, de ea magis idoneo loco dicetur.

Lib. I. Dio-  
 scor. ca. 88.

Lib. I. ca. 189.

ERICA, CAP. XXXI.



VÆ Græcis ἐρεῖκη, Latinis etiam Erica nominatur, similiter Italis,  
 Germanis, & Belgis Heyden, Hispanis Queiro, Gallis Bruiere, Anglis  
 Heth. Athenienses, vt Plinius ait, Tetralicem appellant. Eubœa Si-  
 saram. Codices quidam Tetradicè habent, & Sisarum. Theophra-  
 sto quidem ἡ τετραδικὴ recensetur in genere aculeatorum fruticum, & æstate ger-  
 minantium. Sed hanc Ericen hic intelligi non puto. Varro Sisaram habet, ex Si-  
 saræ flore liquidum mel fieri scribens. Lenæus, Plinio auctore, Myricam etiam  
 Ericam vocat, & ob similitudinem quandam vtrâsque inter se confundit, quod

Nomina

Lib. II. c. 16.

Lib. 6. Hist.  
 cap. 3.

Lib. 3. c. 16,  
 Lib. 24. c. 9.

Lib. 12. c. 8.

Lib. II. c. 16.  
 Forma.

ERICA PRIMA

Matthioli.



ipse quoque Palladius fecit, cum scribit. Hu-  
 ius mensis (Nouembris) initio Apes ex Ta-  
 marisci floribus, reliquisq; syluestribus mel-  
 la conficiunt. Quod Plinius de Erica tradit,  
 vt mox dicemus. Erica planta est lignosa, fru-  
 ticosa, Tamarici similis, longè minor, tene-  
 rior & humilior. Folia sunt minutissimè in-  
 cisa, Chamæcyparissi foliis haud multum  
 absimilia, fusciora, & duriora: Flores in can-  
 dido purpurei, venusti, nonnunquam, sed  
 rarius, albi, qui sunt veluti capitula quadri-  
 partita, ramos à medio ad summum vsque  
 exernantia. Radix est longa, lignosa, in rubro  
 nigricans. Dioscor. Ericam Myricæ similem  
 facit, sed longè minorem: alio in loco Corin-  
 folio Ericæ, pinguiore, minore. Plinius scri-  
 bit Ericam fruticem esse non multum à My-  
 rice differentem, sed colore Rosmarini &  
 pene folio. Ex quibus colligere licet diuersa  
 esse Ericæ genera. Primam hic pictam vete-  
 rum Ericam esse multa arguunt. Nam fruti-  
 cosa est arbor, Myricæ similis, longè minor,  
 vt scribit Dioscorides. Præterea vere primo,  
 & Autumno floret, prima videlicet, & vlti-  
 ma syluestrium, quod huius fruticis proprium esse rei herbariæ scriptores asse-  
 runt. Adhæc huiusce flore Autumno maximè depascuntur Apes, quod de  
 Ericæ tradiderunt antiqui. Dioscor. Huius flore Apes improbum mel efficiunt.  
 Plinius. Tertium genus mellis minimè probatum, sylvestre quod Ericeum vo-  
 cant. Conuehitur post primos Autumni imbres, cum Erice sola floret in syluis,

Lib. I. c. 100,  
 Lib. 24. c. 9.

Ibidem.  
 Lib. II. c. 16.





Lib. 6. c. 16.

Hist. ca. 95.

Locus.

Lib. 1. Dio-

scor. c. 19.

Ibidem.

Lib. 6. c. 16.

ob id arenoso simile. Gignitur id maximè ab Arcturi exortu, Pridie Calend. Septembris. Quidam æstiuam mellationē ad Arcturi exortum proferunt, quoniam ad æquinoctium Autumni ab eo supersunt dies xlii. & ab æquinoctio ad Vergiliarum Occasum diebus xlviii. plurima floret Erica. Dodonæus & Fuschius eandem plantam pro Erica representarunt. In frigidis regionibus & ad Septentrionem versis provenit, macilento & sterili solo, atque etiam in calidioribus, eodem solo, sed rarius. Marcel. Ericam in Genistarum genere esse non rectè scripsit. Erica plura genera fecerunt Herbarij. Mathiolus Ericam alteram, hinc depictam, quæ fortasse non minùs quàm superior, Ericam veram referat. Plurima ea nascitur in Exiceto Paliffæ oppido vicino, toto eo saltu per quem iter faciunt qui Lugduno Lutetiam proficiscuntur. Frutex ramulis densissimis cubito procerior est, foliis oblongis, tenuibus, exiguis, creberrimis, ramos vestientibus, & undique proiecto, ac prominente, coloris è puniceo subrubentis, aspectu pulcherrimi, & qui ad decerpendum prætereuntes inuitet. Sapor idem qui & primi generis Ericæ, verum amariuscule. Eius florem Apes consecrari credibile est potius quam superioris. Floret Augusto mense. Dodonæus Ericam aliam humilem, furculis quamplurimis fruticantem, teneris, gracilibus, ex radice nascentibus, colore rubro, aut fusco, ex quibus scopæ Gallis fiunt excutiendo vestium pulveri. Vnde Scoparia iure nominari potest. Folia ei parva sunt admodum, Thymi vulgaris foliis haud absimilia, minora, & tenuiora. In summis furculis flores emicant, quini senue, in terram vergentes, è rubro purpurei, oblongi & rotundi, caui, parte extrema aperti, dolioli instar. Radix tenera per humum serpit, hinc atque illic nouellos furculos producens. Gaudet



*ERICA IIII. Monspel.*



*ERICA V. Chrysanthemos.*



*ERICA VI. BACCIFERA*  
*Dodonai.*



Gaudet locis sabulosis, muscosis, & riuulorum fontiumque vligine madentibus. Copiosa gignitur in Aruernorum pago quem Diuum Anthemium vocant, alibi ferè inutilis. Rhomagenses & Lugdunenses scoparij inde mercantur, ac in suas tabernas comportant, prætenues eas virgulas cultellis radentes, ac dirigentes contortas, vt in scoparum structuram aptari possint. Quartum Erica genus in agro Monspelienfi, & in Aquitania saltibus crescit, prope Burdegalam, & à Burdegalensibus, vicinisque Bronde nominatur. Radix illi subiacer crassa, longa, lignosa, dura: rami sunt sesquipediales folia parua, Thymo nostro vulgari, aut Cori-di similia: flos Ericæ vulgari similis, exiguus, purpureus circa summos ramulos vtrinque prodit. Ad hominis proceritatem hoc Erica genus assurgit in Aquitania, nisi amputetur, aut à pecore arrodatur, aut, quod sæpe fit, admoto igne vratur. Radicem commendant ad carbonem faciendum, ideo fabris ferrariis expetitur, quod non nisi flatu accendatur, flatuque cessante protinus extinguatur, fabris sic sæpius recoquentibus. Quintum genus Erica Chrysanthemos, à floris colore sic nuncupata. Humilis est frutex, radice crassa, nigra, lignosa, furculosa, fibrata. Ramulos emittit multos, sæpius per terram repentes, nonnunquam paululum supra terram sese attollentes: folia Coridis circa ramulos densa, gustus adstringentis. Flos est violæ similis, aureus: semen durum, Milio grandius, in folliculis turbinatis, & striatis, per maturitatem flauescens. In sabulosis æditorum collium locis, apricis & perflatis gignitur. Floret Iulio. Sextum genus esse dicemus Ericam eam quam Matthio. in postrema com-


mentariorum in Diosc. editione Ericam bacciferam vocat. Nascitur in montibus, inquit, qui Bohemiam à Silesia separant, humi serpens, & latas occupans areas, folio penè vulgaris Ericæ, Baccas edit purpureas, Iuniperinis haud minores, sed molliore pulpa, lenta, & colore subuirescente, vt in Pruno. Ramis est lignosis, lentis, ex atro rufescentibus. Hanc plantam descripsit & depinxit Dodonæus pro Vaccinio palustri, quod *Confinnes de marais* Gallicè vocari scripsit, cauliculosque habere paruos, breues, graciles & teneros, per terram sparfos, foliis

Lib. 6. ca. 8.



*ERICA BACCIFERA*

Matthioli.

Lib. 1. stirp.  
Hist. ca. 30.

paruis, angustis que vestitos, Thymi vulgaris foliis satis similes, sed minores. Circa cauliculorum summitates nasci baccas ex pediculis valdè tenuibus pendentes, Vacciniis rubris ferè similes, tamen oblongiores & maiores, coloris aliquando tantum rubri, aliquando maculosi, gustus acerbi, adstringentisque. Clusius primū Erica genus statuit simile Myricæ, alterum diuersum, quod Myricam folio non refert, sed Corin & forma foliorum & situ admodum æmulatur: cuius generis multæ sunt species, magnitudine, foliorum & florū forma, colorēque, inter sese differentes. Prima omnium maxima, hominis altitudinem interdum superat, fruticosa admodum, ligno duro, ex rubro nigricante, foliis exilibus, & breuibus, quaterno ordine ramos ambiētibus, gustu admodum adstringente, flore copioso, racematim totos ferè ramulos occupante, vt interdum maiores rami pedali longitudine floribus onusti conspiciantur. Est autem is flos concavus, vti paruum cymbalum, oblongus, odoratus, pulcher, albus. Nascitur in Lusitaniæ solitudinibus, inter Vlysi ponē, & Conimbricam. Floret Nouembri & Decembri. Prima Matthio. Erica videtur hæc esse. Secunda eiusdem ferè cum prima altitudinis, æque fruticosa, tenuioribus ramis, eiusdem cum superiore coloris, foliis etiam exilibus, quaternis semper simul ramulos amplectentibus, quorum extremis insidēt flores oblōgi, superioribus similes, colore purpurascens. Tota etiam est adstrictionis parti-

*ERICA II. Clusij.**ERICA III. Clusij.*

ceps.



ceps. Prouenit iisdem quibus prima locis, atque etiam abundantius: eodem etiam tempore floret. Illi ferè similis est. Narbonensi agro frequens, longiore paulò & copiosiore folio, flore purpureo, minore, extremos ramulos occupâte. Hæc secunda videtur esse Matthioli Erica à Fallopio missa. Tertia eius Erica est secundæ admodum similis, sed paulò humilior, folia maiora & latiuscula aliquantulum, & nigriora habet, quaterna semper circum ramulos nascentia, flores plurimos per interualla secundum ramulorum longitudinem proueniētes, superioribus forma similes, primum herbacei coloris, deinde ex albo purpurascētes. Tota etiam adstrictoria facultate pollet. Supra Vlyssiponem frequens cum superioribus, pluribus tamen locis occurrit. Floret Decembri, & Ianuario. Quarta Clusij eadem est quæ à nobis etiam quarta & depicta est, & descripta. Vulgaris in tota Hispania, Lusitania, & Aquitania, nota etiam Gallia Narbonensi, scopis faciendis maximè idonea vere & sub hiemem floret. Huic similis inquit Clusius, sed minor omnino pedalmque altitudinem rarò superans, & plerumque humi præcumpens, foliis quaternis etiam semper ramulos ambientibus contrariis inter se pediculis, inuenitur in montibus Pannonia: quæ florem herbaceum alteri similem extremis ramis, & foliacea illa capitula profert mense Augusto & Septembri. Quinta minor est superioribus, cubitali tantum altitudine plerumque, ramis gracilibus fruticosa, quos terni per interualla ramuli ambiunt, ternis foliis admodum exilibus circa eos ordine dispositis, flores superioribus paulò maiores plurimi & conferti circum ramulos, longis pediculis hærentes, colore purpureo obsoletiore. Incultis Lusitania: locis supra Vlyssiponem frequens. Florebat illis Decembri. Sexta superiori admodum similis est, paulò tamen humilior, neque fruticosa, sed omnes ferè virgas, seu tenues ramos à radice proferens, singulares, cortice cinereo obductos, quos ambiunt ordine terna ramulorum rudimenta, seu germina ex multis foliis confertim nascentibus constantia, nigrioris quàm alterius coloris,

ERICA V. Clusij.



ERICA VI. Clusij.



flores





flores concaui, iam postremo descriptæ floribus forma similes, colore saturatioris purpuræ, elegantissimo, è longis pediculis verticillato ambitu per intervalla, & è summis ramis pendent. Nascitur in Hispaniæ Castella veteri, tum in Gallia supra Luteriam, & in Anglia supra Vindeforam. Floret Septembri. Septima fruticosa est, cubitalibus assurgens ramulis, fragilibus, nigriore quàm reliquæ cortice: folia superioribus similia, sed nigriora, & crassiora, gustu cum adstrictione calidiusculo, trino ordine circa ramulos disposita. Septembri & Octobri fructum à reliquis diuersum, summis ramulis inhaerentem gerit, pulcherrimum, candidum, pellucidum, vniones obscuriores, tum forma, tum colore referentem, succulentum, sapore acido, tria granula dura plerumque continentem, qui Nouembri desiccatur, & per se decedit. Nescit Clusius, an floreat, incolæ negabant. Est verò hæc longè diuersa Matthioli Erica baccifera. In Lusitania dūtaxat genus hoc obseruauit non procul Vlysi pone. Octaua cubitali ferè est altitudine, fruticosa etiam, & tenuibus ramulis prædita, qui terni semper circum maiores ex interuallis prodeunt, folia etiam similiter terna, exigua quidem, sed latiora quàm in reliquis supra descriptis, inferiore parte nonnihil candicantia, hirsuta, & gustu adstringente: summi ramuli ad foliorum exortus verticillatim exornantur per intervalla ternis semper floribus, æquali distantia à sese nascentibus, & in vnā partem spectantibus, maioribus quàm in reliquis generibus, concauis, prominulo magis ventre, colore ex rubro purpurascete, nouem numero, duodecim, quindecim, aut pluribus. Inuenitur plerumque cum septima, & aliis, in arenosis Lusitaniæ locis. Floret Octobri. Semen huic quale in reliquis supra descriptis (præterquam septima) exiguum, nigricans. Nona non multum ab hac foliorum forma differt, & plerisque Brabantiæ locis, nonnullis etiam Castellæ veteris crescit, pedalibus solum fruticans ramusculis, tenuibus, ex rubro nigricantibus, cingentibus eos frequentibus foliis, quaternis simul dispositis, superiore angustioribus, & Thymi vulgaris minoribus, hirsutis. E summis ramulis pendent plerumque quini, aut seni flores simul iuncti,



iuncti, floribus Lilij conuallium similes, paulò tamen oblongiores, neque adeo  
vti superioris ventrosi, colore vt plurimum ex rubro dilutius purpurascēte,  
interdum etiam albo. Floret vere & autumnò. Hæ sunt Ericæ species à Clusio  
traditæ. Nunc facultates eius declarandæ. Ericæ tam flos quàm coma serpen-  
tium ictibus illitu medetur, inquit Diosco. Erica Galeno digerendi per halitum  
facultatem obrinet. Paulus citra rofionem adiecit. Flore eius potissimum ac  
foliis vtendum. Ericæ Plinio contra serpentes prodest. Idem Ericæ folium ad-  
uersari serpentibus tradit. Ericæ vulgaris decoctum, inquit Matthiolus, in aqua  
tepidum sumptum, tam mane quàm vesp̄i, triginta dies, quinque vnciarum  
pondere, tribus horis ante cibum valet ad vesicæ calculos comminuendos, &  
expellendos. Sed postea malè affecti in balneum ex decocto eiusdem plantæ  
descendere debent, atque in eo Ericæ decocto insidere, id quæ sæpius facien-  
dum. Hoc tantum decocto epoto, seruataque recta victus ratione, nonnullos  
affirmat. Matth. vesicæ calculum in minimas partes comminutum eiecisse. Flo-  
rū decoctū porū lumborū & vētris doloribus succurrit: foliorum succus oculo-  
rum imbecillitatem sanat, si iis guttatim instilletur. Rondeletius oleo ex Ericæ  
floribus confecto felici successu vtebatur ad delendos herpetas scēdos, & iam  
inueteratos totā faciē occupātes. Vaccinia palustria, auctore Dodon. sitim sedāt,  
aduersus calores febriles, sanguinis, partiūque interiorū inflāmationes cōferūt.

Vires.

Lib. 1. c. 100.

Lib. 6. sim.

Lib. 7.

Lib. 9. c. 20.

Lib. 24. ca. 2.

Lib. 1. Diosc.

cap. 100.

Ibidem.

IDAÆA VITIS, CAP. XXXII.

**I**DAÆA vitis, vt scribit Theophrastus, nascitur in parte Ida, quam  
vocant Phalacras. Est fruticosa, virgis paruulis, & ramulis cubitali-  
bus penè exporrigitur, quibus acini ad latera adherent, nigri, fabæ  
magnitudine, dulces, vinaceorum instar, (ἡ γαῖα ὡς τῆ) aliquid in-  
tus continentes, molle: folium rotundum, indiuiduum, paruum. Plinius hunc  
locum sic transtulit. Alexandrina appellatur Vitis circa Phalacram, brevis, ra-  
mis cubitalibus, acino nigro, fabæ magnitudine, nucleo molli & minimo,

Lib. 3. Hist.

cap. 17.

Nomen.

Forma.

Lib. 14. c. 9.

IDAÆA VITIS.



obliquis racemis, prædulcibus: folio paruo &  
rotundo, sine diuifuris. Alexandrinam vocat,  
quam Theophrastus, Idæam, non ab Alexan-  
dria Ægypti, sed Alexandria Troadis iuxta  
Idam montem. Sic & ficus Idæa Theophrasti,  
Plinio Alexandrina dicitur. At hæc Vitis non  
solum circa Idæ, sed etiam Aruerniæ, Phala-  
cras, idest montosa loca siluis nuda, ac veluti  
caluitio glabra nascitur copiosissima nonnū-  
quam etiam in siluis ipsis. Airelles, vocant Itali  
Vua dell' orso, Germani Heidelbeer, Est autem fru-  
tex humilis, ramulis plurimis, nonnunquam  
cubitalibus, sæpè minoribus: foliis rotundis,  
saturæ viriditatis, Buxæis, Myrtæis ve simili-  
bus, instante hyeme cæterarum modo deci-  
dentibus, vere ex iisdem ramulis renascenti-  
bus: flosculis rotundis, cauis, circa ramulos  
inter folia emergentibus: bacculis rotundis  
vmbilicatis, primū viridibus, deinde per ma-  
turitatem nigris, succo nigerrimo plenis, gustui  
non ingrato. Radice nititur longa, gracili, len-  
ta, lignosa. In syluis nostris nascitur, duro, macro, edito, & ventis exposito solo.

Hermol. in

Plin.

Lib. 15. ca. 18.

Locus.

Vuam



Lib. 6. ca. 11. Vuam vrsi Anguilara vocat, Dodonæus Vaccinia nigra, à parvis baccis: quia Vaccinia docti quidam existimant dicta esse quasi Baccinia à baccis, minimè tamen Vaccinia nigra Virgilij esse intelligit. In quibusdam Galliæ locis idem *Coufmes* nominari scribit. Sunt qui putant Vitem Idæam esse illam quæ passulas Corinthiacas vulgo dictas fert. Sed nobilissimum illud vuæ passæ genus, inquit Gesnerus, non in Ida, nec in aliis æditis, niuosisque montibus nascitur, verum in planitie, vel in collibus apricis, magna hominum cura. Vitis Idæa mense Maio floret, bacca Junio sunt maturæ. Refrigerant secundo gradu, adstringunt, & paulum siccant. Crudæ coctæve cum Saccharo, aut absque eo si edantur, febre biliosa, & ardenti cruciatis prosunt. Valent aduersus ventriculi ardorem, hepatis, aliarumque interiorum partium inflammationes, ventrè adstringunt, & nauseam reprimunt: ab hac Idæa vite differt à Lobellio picta Myrtus Germanica foliorum incisuris, & magnitudine, flore & fructu eadem, de qua hæc tradit Matthiolus. In Germania & Bœmia, quia legitima Myrto carent, aliam in syluis nascentem sibi compararunt Pharmacopæi & Myrtillum vocarunt. Frutex est cubitalis, caudice & ramulis viridibus, foliis Buxo ferè similibus, sed tenuioribus, & leuiter per ambitum serratis, floribus tintinabuli figura è pediculis inter folia pendentibus, colore subpuniceo, rufo intus, stamine. Floribus bacca succedunt, quæ maturæ, colore & magnitudine Juniperinis non sunt absimiles, vinosæ, teneriusculæ, umbilicatæ. Hæc Germanis cum vniuersa planta haud inefficaciter Myrti vicem præstant. Peculiariter autem iis vtuntur ad inficienda stamina, & charitam ceruleo colore. Eduntur etiam à rusticis, nec gustui sunt ingrata. Hæc Matthiolus.

Vires.

MYRTILLVS

Germanica.



## IDÆA RADIX. CAP. XXXIII.

Nomen.

Forma.

**I**DÆA Radix, siue Idææ vitis species hæc planta esse putatur, superiori & magnitudine, & ramulis similis, nisi quod huius folia sunt maiora, duriora, Buxi maioris foliis similia, hyeme non decidunt: flores in candido purpurei, longi, rotundi, multi simul in summis ramulis. Baccas edit rotundas, quæ à superioribus parum differunt, non ita succi plenas, gustu acerbæ & astringentes. Radix subest lignosa, & longa. Dodon. Vaccinia rubra nuncupauit. Lobellio & Penæ est. Alpina Chamærtio dodædros, odora, Clusio vuæ vrsi Galeni, Italis Rhododaphne parua, rustica: quibusdam Balsamum Italicum vulgare: Therionarca Plinij Guilandino. Idææ radici, inquit Dioscorid. folia sunt ea quæ Rusco: adherent iis veluti exigui capreoli, è quibus flos. Radix spissandi naturam habet, iis conueniens quibus adstrictione opus est. Bibitur etiam ad alui fluxiones, & fluxum muliebrem, omnemque sanguinis eruptionem sistit. Idææ herbæ folia sunt inquit Plinius, quæ Oxymyrines: adherent iis veluti pampini, in quibus flos. Aluum mensēsque, & omnem



IDAEA RADIX.



nem obundantiam sanguinis sistit, spissandi, cohibendique natura. Ita enim vetus Plinij codex habet. Quæ cum Dioscoride consentiunt, præterquam quod herbam vocat, quam ille radicem, & menses, more quodam suo, pro fluxu muliebri reddidit. Idæa radix Gale-  
no, gustu admodum acerba est, ac si opere periculum facias, eam vim præferet, nimirum alui profluvia, dysenterias, profluuium muliebri & quæcunque eius sunt generis, tū pota, tū foris imposita curans. Quæ omnia cū frutici hîc depicto satis bene convenire videantur, non absurdè fortassis pro Idæa radice ostenditur. Gignitur in altissimis Allobrogum montibus, humi iacentes cauliculos huc illuc spargens.

Lib. 6. f. 10

COGGYGRIA THEOPHRA.  
CAP. XXXIIII.



THEOPHRASTVS arbusculæ cuiusdam meminit Arbuto & Adrachnæ similis, cui hoc proprium esse tradit, ut fru-

Lib. 1. Hist. cap. 16.  
Nomen.

ctum lanugine amittat, Quo loco Gaza κοκκυμυλίας legit, & Prunum vertit. Sed fallitur, ut opinor, quod Theophrasti locum turpi mendo inquinatum esse nō animadvertit, quem ex Plinio emendasse debuerat, qui Coggygriam, siue Coggyriam legit. Theophrast. cum de Arbuto & Adrachnæ dixisset, subiicit, ὁμοίον ἢ τοῖς τοῖς φύλλον καὶ τῆς κοκκυμυλίας, τὸ δὲ δένδρον μικρόν, ἴδιον δὲ ἔχει καὶ τὸ ἐκπαππῶδες τὸν καρπὸν τοῦτο γὰρ οὐδ' ἐφ' ἐνὸς ἀντιδραμεν ἄλλῃ δένδρου. Plinius cum eandem Adrach-

Lib. 12. ca. 22.

COGGYGRIA THEOPH.

Cotinus Plinij.



nem depinxisset, ait. Similis & Coggygia folio, magnitudine minor. proprietatem habet fructum amittendi lanugine, pappum vocant, quod nulli alij arborum evenit. Præterea quid absurdius quàm Prunum dicere arborem esse, quæ fructum lanugine amittat? Fortasse & Cotinus quoque Plinij appellari potest illa arbuscula Italico & vernaculo nomine, ut postea dicetur. Verū Coggygia Theophr. nihilo secius esse creditur, hac maxime ratione ducti, quod eius fructus in pappos abeat, quæ nota huic peculiaris à Plinio tribuitur. Frutex est, nunc humilis, nunc ad Punice magnitudinem assurgens, radicibus multis, modicè crassis: ramis furculosis, cortice subrubro vestitis: folio Terebinthi, carnosio, & spisso Arbuti modo, leui, parum laciniato, minusque acuto, venoso, maiore, & latiore, qua cum Terebintho similitudine decepti quidam Macedonicam Terebinthum esse putauerunt: flore per initia racemoso, ex viridi pallefcere, qui tandem in papposum muscariū dilatatur, & evanescit, innu-

Ibidem.

Forma.



**Locus.** meris tenuissimisque capillamentis villosum, nutantibus in militum galeis plumosis cristis non absimile, papporum lanugini inter sparsis minutis granis, nigris, figura cor æmulantibus. Crescit in montibus Allobrogum tractu aprico, cliuoso, aspero, non nimis alto, nec insidentium niuium frigore rigido. Alicubi cum Terebinthis pumilis, breuibz, contortis, quales circa Idæ & Macedonia montosos tumulos prouenire Theophrastus scripsit. Folia, flores, tenella germina, cum teruntur odorem spirant resinofum, Terebinthi modo, non iniucundum. Eorundem sapor austerus est, & valde astringens, gustanti non insuauis. Dientes Allobroges sua lingua Rhu vocant, corticęque coria spissant ac concinnant, id quod nonnullos mouit, vt rhoem coriariorum esse crederet. Grarianopolitani eius foliis summisque ramusculis ad Lineas vestes nigro colore inficiendas vtuntur, quas aliis mulierculę super imponunt, ne subiectę puluere & sordibus inquinentur. Allobroges Sabaudi arbusculas integras, vel earum grandiores ramos delibratos vendunt, suęque lingua Fustet vocant, ad pannos luteo colore tingendos. Is enim est, ligni color. Qui radices Apennini incolunt Rossolo vocant: qui ædita Apennini iuga, Scotano: quotiesque ictericum felle suffuso luridum esse significant, eum magis quam Scotanum flauescere dicunt, hac voce Cotinum Plinij exprimentes, fruticem, vt ait, ad lineamenta modo, conchylij colore insignem. Quamquam falsi suspectus sit is locus, flauo colore, quo lignum Cotini tingit, a conchylij colore multum distante, nisi de arboris cortice subrubro aut purpurascente intelligendū id tantū sit: quā ob causam Rossolo vocat, a roseo colore. An verò huic soli peculiare sit, in pappos fructū auolare, multis dubium est, cum Nerij siliquę papposa lanugine semen includant.


Lib. 16. c. 18.

## IOVIS BARBA, CAP. XXXV.

**Nomina**  
Lib. 16. c. 12

**Forma.**

## IOVIS BARBA.

**Locus.**

Vnc fruticem Iouis Barbam esse, cuius à Plinio fit mentio, Herbarij putant. Ac quoniam Aizoō Iouis Barba Officinis dicitur, hanc quoque plantam Aizoon arborem, quidam nuncuparunt, vt sic ab Aizoo herba distinguerent. Fruticosa est arbuscula, magnitudine hominis, ramis densissimis, folio Lenticis, argenteo, sic collocato, vt lateribus folia paria sint, impar autē foliis versum claudat: coma in opere topiario tonsilis, & in rotunditatem spissa, elegantissimi aspectus, si quis in hortis serat, vestiendis arearū viarūque marginibus, vt à nobis de Lauādula fieri solet, flore in summis ramis copioso, coaceruato velut in cumulum, luteo, Genistę simili, si sumas singulas quasque floris coaceruati partes. Gignitur in lapidosis, & saxosis locis maritimis, præsertim montibus ad litora positis. Pulcherrimam hanc plantam mons Serius (hodie Cap, de Sette vocant) ab Agatha & Bliterris non admodum semotus nutrit. Anguillara in Monte nigro prope Liornam gigni tradit, foliis ordine dispositis, candidis, nitentibus, Lenticulę similibus, angustioribus, flexilibus ramis, luteis floribus.

ARBV



## ARBVTVS, CAP. XXXVI.



ARBVTVS frutex, siue arbor est: Arbutum fructus eius à Virgilio dicitur. Cum iam glandes, atque Arbuta sacræ deficerent syluæ. Græcè κόμπος, fructus μεμακύνων, Arabicè Hutladib, Italicè Albatro, Hispanicè Madronho, seu Madromeiro, Gallicè Arboufier, fructus Arboufes. Arbutus frutex est, siue arbuscula Cotonea Malo non maior: caudicis cortex subruber, asper, squamosusque, à quo rami prodeunt rubentiores, lauioreque, præsertim nouelli: folia Laurinis, Iligneisve similia, paulò tamen breuiora, crassioraque, non decidua, toto ambitu serrata, colore pallido potius quam

1. &amp; 2. Geo.

Nomina

Forma.

Matt. c. 138.

lib. 1. Diosc.

Dodon. li.

6. cap. 53.

## ARBVTVS.



viridi, rubra per medium excurrente costa. Flores parui, candidi, caui, floribus herbe quæ vulgo Lilium conuallium dicitur, figura similes, racematim pendentes. Fructus parui, rotundi, Sorborum ferè magnitudine, qui primo exortu virent, deinde flauescunt, maturi verò rubent, tactu asperiusculi, nullis intus osiculis, fragorum modo, quorum etiam effigiem referunt. Sapor his insipidus, simul & austerus, qui dum eduntur, acerosa pulpa linguam palatùmque vellicant. Ab his paulum discrepare videtur Dioscorides cum scripsit. Arbutus arbor est Cotoneæ Malo non dissimilis, tenui folio: cuius fructus Pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo, huic Memacylum cognomen est. Maturus aut flauescit, aut rubet, in esu acerosus. Sed cum Arbutum Malo Cotoneæ comparat, magis id ad arboris proceritatem, quàm ad folia, & caudicis corticem referri intelligendum. Deprauatos etiam esse hoc loco Dioscoridis codices suspicio est: quoniam Serapio qui omnia ex Dioscoride transscripsit, totam Arbutum non

Lib. 1. c. 138.

Matt. ibid.

dicit Cotoneæ Malo similem, sed folia proferre Malo Cotonea minora, nec tenuia folia habere scribit. Alij λεπτόφυλλον, non tenuifolium, sed angustifolium interpretantur. Plinius folium Mali Assyriæ folio Vnedonis rectè viderur comparasse. Theophrastus sic descripsit. Arbutus quæ Memacylon fert esculentum, non valdè magna est arbor. Corticem habet tenuem, Tamarici similem: folium inter Vlicem & Laurum medium. Floret mense Iulio. Flores prodeunt ex vna appendice, extrema parte, racematim: quorum quisque Myrti bacca oblonga, forma similis est, & magnitudine par, non foliatus, cauus, velut ouum exscalptum ore aperto. Cum autè defloruerit, etiam retinaculum quod adhæret perforatum est. Quod defloruit, tenue est, ac veluti verticillum circa fustum, aut Doricæ columnæ capitulum. Fructus anno maturefcit, ut simul contingat & hunc haberi, & alterum florere. Plinius. Aliud corpus est terrestribus fragis, aliud congeneri eorum Vnedoni, quod solum pomum simile fructui terræ gignitur. Arbor ipsa fruticosa: fructus maturefcit, pariterque floret subnascens, & prior colligitur fructui terræ, inquit Hermolaus, hoc est fragis terrestribus, nihil enim est ferè tam Vnedoni simile quàm fraga. Ob id quidam fraga montana in Ouidio Arbutos interpretantur, ad differentiam terrestrium. Cæterum quia Theophrast. aliter & melius Arbutum expresse, aliam esse hanc à Dioscor. Arbutum quidam

Lib. 12. c. 3.

Lib. 3. Hist.

ca. 16.

Li. 15. c. 24.

In Casti in Plinium.



Li. 7. sim. &  
2. med. p. c.  
1. & 2. Ali.  
Lib. 35. c. 24.

Li. 23. ca. 8.

Lib. 6. sim.

Li. 2. alim.

Lib. 7.

Lib. 1. c. 20.

Lib. 1. c. 97.

*Locus.*  
Lib. 1. Obf.  
cap. 43.

Li. 15. c. 24.

*Tempus.*

*Temper.*

*Vires*

Ibidem.

Lib. 7. sim.

Lib. 2. m. p.

cap. 1.

Ibidem.

Ecl. 3.

consent. Sed eruditorum sententia eadem planè est vtriusque Arbutus, ex ni-  
mirum ea quam hîc depinximus. De eius fructu etiam inter veteres controuer-  
sia est. Dioscorides, & Theophrast. vt diximus, eum Memæcydon appellant.  
His ad stipulari videtur Galenus, qui non vno loco eum fructum Memæcydon  
nominat. Plinius & arborem & fructum vnedonem vocat. Vnedo, inquit po-  
mum in honorum, vt cui nomen ex argumento sit, vnum tantum edendi. Duo-  
bus tamen hoc nominibus Græci appellant, Comarum & Memæcydon. Ex quo  
apparet totidem esse genera & apud nos. Alio nomine Arbutus vocatur. Qui-  
bus verbis Plinius quatuor voces Vnedonem, Comarum, Memæcydon, Arbu-  
tum vni arbori ac fructui tribuit. Et alibi. Arbutus siue Vnedo fructum fert dif-  
ficilem cōcoctioni & stomacho inutilem. At verò Vnedonem fructum Arbuti  
non esse, sed Epimelidis arboris Galenus tradit his verbis. Epimelis acerba est  
planta, & vt, ita dicam, sylvestris Malus. Appellatur autem à rusticis in Italia  
ὑνεδών, idest Vnedo. Frequens in Calabria nascitur. Fructus eius acerbus est, sto-  
macho incommodus, & capitis dolorem inducens, admixta enim est ei pere-  
grina quædam qualitas. Idem alibi perspicuè Memæcydon ab Vnedone distin-  
xit: Et qui frutex inquit, Epimelidas fert. Appellatur autem is fructus in Italia  
Vnedo, stomachoque nocet, & capiti dolorem adfert, acerbûsque est admodum  
cum exigua quadam dulcedine. Quibus mox subiungit. Cornis quidem & Ca-  
nirubi fructu, & Glandibus, & Memæcydon (sic autem Comari fructus appellan-  
tur) rustici passim vescuntur. Galenum Paulus secutus est. Quare dubitandum  
non est, quin alia arbor sit Epimelis, quæ vna cum fructu suo in Italia Vnedo  
appellatur, & alia Arbutus, cuius fructus Memæcydon Græcis dicitur. Has arbores  
Plinius fortasse ob similes vires pro eadem vsurpauit. Quod igitur Ruell. scrip-  
sit Galenum & Paulum Arbutum, Comarum, Vnedonem à rusticis Italiæ vo-  
cari scripsisse, minimè verum esse ex supradictis intelligitur, atque adeo nec il-  
lud quod alio loco ait, Galeno & Paulo Epimelida esse genus quoddam Arbu-  
ti, quæ Græcis Comaros dicitur, cui eandem omnino vim reddiderunt, hoc  
addito, quod fructum Memæcydon nominant. Perspicuè enim illi Arbutum ab  
Epimelide distinxerunt, & de iis diuersis in locis tractauerunt, nec, si similibus  
præditæ sint facultatibus, inde efficitur eandem esse stirpem. Plurimæ enim stir-  
pes iisdem qualitatibus, viribûsque præditæ, forma & genere sunt diuersæ. Que-  
nam sit Epimelis in historia Mespilarum nos ostendemus. Arbutus in syluis,  
Italiæ & Galliæ Narbonensis copiosa nascitur. Bellonius scripsit in monte, qui  
Athos dicitur, arbutos quæ aliis in locis frutices sunt, in magnas arbores euade-  
re. Iuba auctor est, tradente Plinio, quinquagenum cubitorum altitudine in  
Arabia esse eas. Florent mensibus Iulio & Augusto. Fructus Septembri, & sub  
hiemem maturus est, qui frigidus stomacho aduersatur, inquit Dioscorides, ca-  
pitisque dolorem mouet. Eadem omnino tradit Galen. Arbutus Arbor ipsa  
qualitate acerba vna cum fructu est, eum Memæcydon nuncupant. Est autem  
hîc & infensus stomacho, & capiti dolorem adfert. Idem in omni capitis do-  
lore vitandum esse præcipit Arbuti fructum. Sunt qui credant, inquit Matthio-  
lus, Arbutum magno esse aduersus pestem præsidio, aquam quæ ex eius foliis  
extillauerit, admixto osse in corde cerui reperto, statim ipso Morbi initio pro-  
pinantes. Arbuti fructibus Turdi Merulæque delectantur. Quare hyeme, quo  
tempore ij maturi sunt huiusmodi aues ab aucupibus faciliè capiuntur. Fron-  
des ab hædis expetuntur teste Virgilio.

*Dulce satis humor, depulsis arbutus hædis.*

CORNVS






Theophrasto *θηλυκρηνεία* dicitur Cornus fœmina, à quibusdā *ψευδοκρηνεία*, idest falsa Cornus, ab aliis diuersis nominibus nuncupata, diuersas quoque plantas pro Corno fœmina repræsentâtibus. Cornus fœmina, inquit Ruellius, dumetis & nemoribus familiaris. Sed quia neglectas & ingustabiles fert baccas, indignam quæ Corni nomine vocaretur rura putauerunt. Arbori quam Cordus Pseudocraniam vocat describitque, præfixit Gesnerus eius fruticis picturam quam Tragus Germanicè à ligni duritia *Hartriegel* appellari scripsit: hicque admonet Gesnerus quærendum,

## CORNVS

fœmina.



an hæc Cordi Pseudocrania, sit arbuscula seu frutex, quem Germani *Hartriegel*, vocant, Plinius virgam sanguineam appellauit. Eruditi quidam Cornū fœminam esse coniiciunt. Sed paulò post Cordus aliam Cornum fœminam describit, cui Gesnerus figuram Corni à Trago descriptæ apposuit. Idem Gesnerus Sanguineam virgam Plinio dictam, quæ passim in sæpibus crescit, Cornum fœminam esse ait quorundam sententia. Cornum fœminam esse putat Cornarius, quam Germani ex argumento *Faulbeerbaum*, & *Faulholtz*, vocant. Sed an is Alnum nigram Dodonæi, de qua iam dixi, an Tragi *Faulbaum*, arborem à fœtido, tū odore, tum sapore sic dictam intelligat, scitu difficile est. Dodon. Cordi pseudocraniam Cornum fœminam, syluestremue, ac Opulum Columellæ esse arbitratur. Eandem plantam etiam Cornum fœminam ac sanguineos frutices esse Bellonius videtur existimasse cū scribit. Arbor quam Macedones olim Cornum fœminam nominarunt, nunc Galli Latinos imitati *Des Sanguins*, in monte cui nunc Castagna nomen, inter vrbes Philippos, & Bucephalum, nunc Cauallam vulgo dictam sito, non multo minores proueniunt, quam magnæ nostræ Corni mares. De planta igitur hîc agimus, quam Tragus *Hartriegel*, Cordus Pseudocraniam, Dodon. Cornum fœminam, & syluestrem, & Opulum Columellæ vocant. Hæc Cornus fœmina frutex est in arborem non assurgens, durissimò stipitum, veterumque ramorum ligno, nouellis ramulis nodosis, medulla plenis, Sambuci modo: folio Corno mari simili: flore in muscarii albo: baccis rotundis, primùm viridibus, per maturitatem nigris. In sæpibus ac dumetis cum reliquis fruticibus nascitur. Floret mense Aprili, & Maio. Fructus Septembri sunt maturi, nullius in medicina vsus. De Virga autem sanguinea, si eadem est quæ Cornus fœmina, pauca hæc Plinius. Nec Virga sanguinea, inquit, felicior habetur. Cortex eius interior cicatrices quæ præsanare aperit. Et, Sunt qui Virgis sanguineis tangunt ea quæ nolunt Erucis obnoxia esse. Idem alibi sanguineos frutices inter vitilia numerat. Corno non multum absimilis est planta, inquit Matthiolus, quam Hetrusci, à sanguineo virgarum colore Sanguino, & Sanguinello vocant. Crescit in dumetis, & sepibus, virgis Corno tenuioribus, robustis, nodosis, cortice sanguinis modo rubescente: foliis Corno proximis, paulò tamen latioribus, neruosis, rubenti pediculo

Nomina

Lib. 1. ca. 71.

Lib. 3. pl. c. 26.

Lib. 3. c. 26.

Cap. 36.

Lib. 3. ca. 37.  
In hortul.  
Germ.Emb. 13. li.  
1. Dioscor.

In Sil. c. 30.

Lib. 6. ca. 51.

Lib. 1. Obs.  
cap. 36.

Forma.

Locus.

Tempus.

Li. 24. c. 10.

Li. 20. c. 10.

Li. 19. c. 37.

Lib. 1. Diosc.  
cap. 135.



nitentibus. Floret vere umbellis albicantibus: flores baccas edunt racematim coherentes, sanguineis tenuibusque petiolis appensas, Orobi magnitudine, primum virides, per maturitatem nigricantes, è quibus rura Tridentina oleum ad lucernarum usum torculari exprimunt, iis prius in aqua decoctis. Ligni materies dura, osseaque est, Corno minimè cedens. Quare quidam Cornum fœminam esse volunt, sed infirmis rationibus nixi. At fortasse non erraret, qui diceret virgam sanguineam esse, cuius Plinius meminit. Id tamen non affirmat Matthiol. cum nondum periculum fecerit, an planta Sanguino vocata id præstet, quod de virga sanguinea Plinius tradidit. Baccæ maturæ amaro, acerbo, adstringentæque sunt sapore. Quare oleum ex iis expressum tale quoque esse necesse est.

EPIMELIS. CAP. XXXVII.

Li. 1. ca. 13.  
Nomina  
Lib. 6. diu.  
& li. 2. Ali.

Li. 1. Diosc.  
cap. 133.

In Diosc.  
lib. 1. ca. 70.

Lib. 6. ca. 43.



V *ἔπιμηλις* à Dioscoride secunda Mespili species ponitur, à Latinis etiam Epimelis vocatur. Galeno Epimelis acerba planta est, ac ut dixerit quispiam, Malus sylvestris: vocatur ab Italiæ incolis Vnedo: eius magnus est in Calabria prouentus. Hæc de Epimelide, non ut de Mespili specie, sed seorsum à Mespilo scripsit. Qua ratione moti quidam, aliam Dioscor. aliam Galeni Epimelidem esse censuerunt. Matthiolus Dioscor. Epimelidas vulgares nostras Mespilos esse ait, Sed Galenum Epimelidis appellatione diuersam arborem à nostrate Mespilo intellexisse. In eadem est sententia Andr. Lac. Cordus Epimelidem quidem vulgarem nostram Mespilum esse putat, sed Galenum in viribus illius explicandis aberrasse. Scribit enim Cordus Epimelida, siue Hama melida dici, quod iuxta Malos nasci soleat. Copiosè in Germania & satam, & spontè prouenire. Cum spontè, semper vicinam habere agrestem Malum, unde & nomen à Græcis illi positum. Huius fructum Vnedonem ab Italis vocatum fuisse, teste etiam Galeno, quod præter vnum nemo comedere, & deglutire possit antequam mollescat, adeò fauces adstringit. Sed non verè ab eo dici stomacho eum esse noxium capitique dolorem excitare, quæ vitia Arbuti sunt, Epimelidi immerito attributa, cum constet Epimelida, idest Mespilum vulgarem, nec stomacho inimicum esse, nec capitis dolores adferre. Dodonæus etiam Epimelidis nomine vulgare nostram Mespilum describit, ac depingit. Gesnerus Chamæmespilum appellat. A quibus omnibus dissentit Dalechampius. Nam Mespilus nostras, nec folia habet Malo similia, nec minora, qualia Epimelidis esse dicit Dios. quin potius Lauro similia, & foliis Mali maiora. Adhæc fructus illius, ut Epimelidis, rotundus non est, sed oblongus, inferne gracilior, superne latior. Arbusculam igitur hîc appictam, Epimelidem Dioscoridis esse arbitrat, & Theophrasti Mespilum Antheno idem Epimelidemque nuncupatam, ob foliorum cum Malo similitudinem, Anthenoidem verò, quod eius fructus rubro colore, globosa figura, & umbilicato vertice fructum Mespili Anthedonis, de qua suo loco dicam, æmuletur, à quo Mespili nostratis

EPIMELIS.



nostratis



nostratis fructus multum dissidet, turbinatus, & ex rufo liuescens. Ex vnica autem lacunosi vmbilici nota in Mespilo nostrate valde perspicua, quam etiam Epimelidi Dioscorides assignat, inductos fuisse Herbarios verisimile est, vt hanc crederent esse Epimelidem. Sed & hæc in Epimelide hîc depicta euident est, cæteris à Dioscoride traditis notis consentientibus, nostrati vero Mespilo repugnantibus. Est igitur hæc Epimelis arbuscula, cortice rubescente, sed cinerea quadam cuticula obducto. Folia fert Mali, minora, inferne candida & lanuginosa, supernè viridia, venosa: fructum rubentem, rotundum, ex longiusculo petiolo pendentem, vmbilico lato, ternis intus ossiculis, duris, oblongis, hinc angulosis, illinc planis & læuibus. Fructus is adstringit, gustu plane vulgaris Mespili, acerbior, ideoq; minus grato, Peculiari nomine Italici olim Vnedonè appellatū fuisse ex Galeno iam aliquoties diximus. In Alpibus, Apennino, & in excelsi mōtis iugo qui apud Allobrogas diui Rāberti cænobio imminet. Frutex


Forma

Vires.

Locus.

Lib. .mor.  
muli.

EPIMELIS ALTERA  
Cotonaſter Geſneri.



hic copiosus nascitur. Hippocrates ἀμαμαλίδας dixit Epimelidas à Dioscoride nūcupatas, vt Galenus in Glossis testatur, velut hoc loco παρμηγας ὁ ἐμέλι, ἢ ἀμαμαλίδας, εἶτα ἐπ' αἰμα μέλανι διδόναι τὸν δν. Id est, & mel aut Hamamalidas permisceto, deinde in vino nigro bibenda dato.

EPIMELIS ALTERA,  
CAP. XXXVIII.

**F**RUTEX hic ramosus furculosusque est, cortice subrufo, folio Mali Cydoniæ, neruoso, paulò obtusiore, auersa parte candicante, & lanuginosa, aduersa virente: fructu paruo, rubente, vmbilicato, Mespilo exiguo simili, saporis acerbis. Coronastrū Gesnerus clarissimus Philosophus, ac Medicus, & plerique Herbarij nominant, ob foliorum cum Malo Cydonia similitudinem. Eius ramum fructu onustum cum ad Dalechampium ille misisset, Epimelidis genus esse iudicauit, ex fructus tū figura tū sapore. In niuosis Alpibus nascitur.

Forma.

Nomina

Locus.

FICVS IDÆA, CAP. XXXIX.

**V**Æ hîc planta exhibetur, pro Halimo à Trago, & Lonicero depicta est, à quo quantum differat, cum de Halimo agetur, demonstrabimus. A nonnullis Idæa Ficus esse dicitur, ab aliis Chamæmespilus. Fruticat ex radice crassa, dura, lignosa, brachiata, ramis tam multis, vt cubiti circumquaque spatium cum sua sobole vnica planta occupet. Hi plerumque ad hominis altitudinem attolluntur, nonnunquam breuiores, lenti, flexilesque in orbem prosiliunt, minimè spinosi, cortice cinereo, qua primum erumpunt folia, tuberoso, velut quodam articulo nodosi: ligno distorto, infernè læui, supernè frondis suæ comam fundente: folio Mali Cydoniæ, molli, venoso, altera parte virente, altera pallido, siue cano, sic digesto, vt ex quouis alarum sina bina semper exeant, O' ex folio multo latiore & longiore, illiq; planè dissimili, etiamli Tragus & Lonicerus

Nomina  
Lib. 3, c. 22.  
Cap. de Ri  
be in Hist.  
plan.

Forma.

Ibidem.





Cap. 28. hu  
ius lib.

Tempus.

Lib. 3. Hist.  
cap. 17.

Lib. 15. c. 18.

aliter scripserint: flore inter rubrum & phœniceum medio, calathi figura, Idæa Vitis, quam Myrtum Germanicam idem Tragus, Dodon. Vaccinium nigrum appellauit, vt diximus, florem nonnihil imitante: baccis coralli modo rubris, longo pediculo appensis, gemellarum instar binis coeuntibus, & coalescentibus, linea tantum distinctis, cordis figuram ob huiusmodi coalitum penè referentibus, Oesi rubra, quam Ribes vocant, magnitudine paribus, binis velut Ocellis nigris in vertice pertusis, gustu principio subdulci, sed postea tam ingrato & insuauis, vt fastidium nausæamque moueat, & vomitum prouocet. Nascitur in Germania cum aliis fruticibus secus vias, in saporibus, & Dumeris Alfarie prouinciæ. Apud nos verò in editissimis & gelidissimis Sequanorum & Allobrogum montibus, nec vnquam in plana descendit. Floret Aprili mense. Eorum sententiam magis probat Dalechampius, qui Idæam Ficum hunc fruticem esse putant, quod eius historia à Theophrasto descripta huic sententiæ adstipulari videatur. Ficus Idæa, inquit, fruticosa est, nec excelsa, sed crassa, sic vt cubiti spatium in orbem fruticantes ramuli occupent: ligno contorto, lento, infernè laui, sinè nodis, supernè in orbem comofo, colore tam folij, quàm corticis liuido: folio figura Tiliæ simili, molli quoque & lato, magnitudine pari: Flore Mespili, qui & cum Mespili flore emergit. Fructus quem Ficum appellant, rubet, magnitudine Oliuæ, sed rotundior: esu Mespilum refert. Crassas radices habet mitis Ficus modo, & lentas. Arbor hæc non putret. Cor illi solidum est, & sine medulla. Ex quibus hæc Plinius transtulit. Idæa Ficus rubet, Oliuæ magnitudine, rotundior tantum, sapore Mespili: Alexandrinam hanc ibi vocant, crassitudine cubitali, ramosam, materie valida, lenta, sine lacte, cortice viridi, folio Tiliæ, sed molli. Hunc fruticem Chamacerasum montanam vocat Gesnerus, seseq; audiisse scribit quatuor aut quinque huius Cerasæ deuorata vomitum ciere, aliquando etiam aluum. Sunt & multe aliæ, variæq; plantæ Chamacerasi nuncupatæ.

CHAM



CHAMAECERASVS, CAP. XL.

**H**DEM Gesnerus in variarum rerum cognitione optimè versatus, hanc etiam fruticis effigiem ad Dalechampium misit, quæ nascitur, vt scripsit, in montis Generosi Insubriæ crepidinibus, cliuis, ac præcipitiis, folio Aceris albi, quod Galli, vt diximus *Plane* appellant, latiore & ampliore, per ambitum valde infecto: Fructu rotundo, rubro,

*Locus.*

*Forma.*  
in syl. c. 28

CHAMAECERASVS

montis Generosi.




CHAMAECERASVS

Alpina.



CHAMAECERASVS

Matthioli.



Ceraso simili, vnde Chamæcerasi nomen. Est alia Chamæcerasus Alpina à Lobellio picta, Cordi etiã Chamæcerasus, Xylosteu alterum, quorundam. Rara est, hæc cubitum pedemue æquans, foliis, ramis, & stipite Corni, albidis, squallidis, nodosis: floribus candidis, pallentibus, aut luteolis. Fructus binos maturat in pediculis longioribus, pedulis, Cerasi ritu, sed in imo duo foramina parua albida, quoddam rudimentum pupillarum, aut oculorum adumbrantia: grana quina, aut sena, albida, lucida, Oxyacathæ paria. Hæc quæ Pena scripsit, tanquam de rara planta, & paucis cognita, Idæam Ficum modo descriptam videntur ostendere, pictura etiam, si attentè consideres à nostra, vel parum, vel nihil discrepante.

MATTHIOLVS sylvestre Pumilumq; Cerasoru genus, nullo adhibito cultu in Tridentino agro, & in Bohemia circa Pragam, ac in Austria, circa Viennam sponte provenire scribit, gustu admodum acido, imo acerbo, colore perpetuò rufescente, nec vnquam in ærum vergente

*Forma.*



vergente, quæ ex breui pediculo pendent in pusillis fruticibus, & admodum paruis, tantæq; breuitatis, vt pauci sint, vel potius nulli, qui dodrantem æquent, vt credat (etsi id non affirmet) ea esse hæc Cerasia quæ Plinius Macedonica vocat. Caterum hunc fruticem Chamæcerasum potius vocandum esse censet. Ibidem. Meminit etiam Plinius Chamæcerasi Ceraso Macedonica minoris. Sunt & Macedonica Cerasa parua arboris, raroq; tria cubita excedentis: & minore etiam frutice Chamæcerasi.

## ARIA, CAP. XLI.

Nomina

Forma.



R BOREM hîc depictam Sequani & Aruerni *Alister* appellant, Nantuatenses, Galli etiam ipsi *Cirer*, vocabulo ex Aria detorto. Itali *Matallo*, Herbariorum bona pars Ariam. Humilis est arbor, seu frutex in Cædua sylua, sæpibus, ac Dumetis, si verò crescere permittatur procera, valta, ramosaq; Vlmò & Tilia nihilo minor, nec minùs ampla, diffusaq;. Cortex nonnihil in cæreuleû colorê vergit: folia sunt magna, & lata, Tiliæ,

## ARIA CVM FLORE

&amp; fructu Dalechamp.



Locus.

Tempus.

Vires.

Lib. 5. Hist.  
cap. 5.  
Ibid. ca. 6.  
Ibid. ca. 10.

aut Matthioli Viburno, siue Spiteæ non dissimilia, venosa, per oras incisa, supernè viridia, infernè candida: flos qualis hic exprimitur in summis ramis candidus, densus, odoratus: fructus ruber Oxyacanthæ similis, summa parte denticulatus, suavi dulcedine gratus: semen Malo Pirouæ simile, tenero & subatro cortice medullam occultans, saporis non in iucundi. Gignitur in frigidissimis & altissimis montibus. Cultum omnino dedignatur, ac respuit. Quare in hortos translata minimè proficit. Floret mense Maio, tardè fructum perficit. Maturum huius arboris fructum rustici legunt, & condunt: neque enim fugax nimis est, sed in hyemem usque durat, si bene asseruetur. Tussis non aliter quàm Zinziphi bacca lenit, sputum adiuuat, crudos humores pulmoni infarctos coquit. Materia arboris dura, candida, baculis apta: ex ea enim firmi ac solidi fiunt. Theophrastus Ariam inter eas arbores recenset, quæ cariem vetustatemq; non sentiunt, idemq; Ariam ac Quercû omnium in opere difficillimas esse paulò post

tradit, carbonemque optimum fieri ex spississima materia, vt Ariæ, Quercus, Arbuti.

## HAMAMELIS ATHENÆI, CAP. XLII.

Nomina

Lib. 14.



Li. 16. ca. 16.

Ic expressam plantam censet Dalechampius esse eam quæ ab Athenæo ἀμαμηλὶς, & ὀμομηλὶς dicitur. Cordus Myrtomelidem vocat, ob fructus cum Myrti baccis similitudinem. Vulgus Allobrogum *Amalenchier* vocat, perinde ac si μᾶλιχρον, id est, mellitum pomum dicere vellet, aut Hamamelida, Nantuatenses *Manternier*, quæ vox ex Alaterno videtur esse deprauata, cùm tamen Alaternus esse non possit, cui folium est, Plinio auctore, inter Illicem & Oleam, nec vlla fructus fecunditas. Est hic frutex



HAMAMELIS

Athenai Latiore folio.

HAMAMELIS

Athenai Angusto folio.



frutex hominis altitudine, cortice subrubro, folio ad Pruni figuram accedente, venoso, serrato, altera parte virescente, altera candicante: flore albo. Fructum edit Myrtis similem, umbilicatum, prædulcem, cum maturuit purpureum ante maturitatem, ex purpureo sub rubescentem, semina terna, quaternæ includentem, Piro similia, nigra. Quæ faciunt, ut credibile sit Hamamelida esse Athenæi, quia fructus purpurascens similis est, valde dulcis, & ἀπύρνος, id est, sine nucleis lignosis, quorum loco semen continet, nec durum, neque lapidesum, sed ut in Piro, tenero contextum cortice, quæ de Hamamelide tradidit Athenæus. Nasceitur in locis asperis confragosisq; interdum ex scopulorum rimis profilit, nec est ut quidam autumant, Gallorum *Alisier*, de qua superiore capite diximus.

Forma.

Locus.

LAURVS TINVS, CAP. XLIII.

**D**E PICTAM hîc arborem Laurum Tinum Plinij esse inter Peritos Herbarios constat, quam Laurum nonnulli sui generis arborem intelligunt, alij sylvestrem Laurum, etiam Theophrasto in iis numeratam quæ perpetuò virent, tamen si Gaza eo loco simpliciter Laurum vertit, cum tamen in omnibus nostris exemplaribus ἀγλαὸν δάφνη legatur, id est, sylvestris Laurus. Alij δάφνην ἀγλαὴν, id est Laurum sylvestrem esse malunt veram Laurum sine hominum cultu operaque sponte provenientem, & ob id sylvestrem, quales multæ circa Monspelium in sæpibus videntur. Arbor hæc cortice vestitur subrubro: ramis abundat, ex quorum nodosis articulis folia enascuntur, bina semper aduersis pediculis sita, venosa, carnosæ, minime dissecta, in acutum desinentia. Flos ex albo purpurascens est in umbellis, copiosissimus: Cærulea bacca plurima, oblonga, angulosa, gustu adstringens. Arbor ista foliis nunquam exuitur. Quare mirificè intuentium oculos delectat, & allicit frondis honore sempiterno, umbellarum aureo fulgore, & baccarum Cæruleis.

Lib. 15. c. 30.

Nomina.

Lib. 1. Hist.

cap. 15.

Forma.



## LAVRVS TINVS

Dalechampij.

Locus.



ruleis acerbis. Nascitur in asperis, saxosis & maritimis Gallicæ prouinciæ, Hetruriæ, agrique Latini collibus. Itali vocant *Lantagine*, & *Lagro saluatico*, diuersam à *Lantana* sua, quam Matthiolus *Viburnum* esse arbitrat. Nascitur & in plerisque locis montis Cestij, inter cocciferas lices. Clusius duas alias *Lauros Tinos* exhibuit. Alteram quæ eadem est qua superior altitudine, ramis frequentioribus & firmioribus, cortice ex rubro virescente testis, circa quos folia superioris, angustiora & oblongiora, aliquantulum, venulis quamplurimis distincta, inter sese opposita, vt in priore: flores extremis ramis umbellarum specie etiam nascuntur, colore nonnihil purpurascente, neque adeo odorati vt superioris: fructus etiam minor, plenior, nigrior. Vno tantum loco in Lusitania quodam monasterio Pera Longa dicto supra Vlyssiponem extracto se obseruasse ait, secundum piscinas, & in Bæticæ maritimis. Tertia in hortis Belgicis colitur à rei Herbariæ studiosis, semine ex Italia delato nata, arbusculæ magni-

## TINVS II. CLVSII.



## TINVS III. CLVSII.



tudine, quæ quotannis & florem & fructum profert, minore est quàm superiores folio, Laurino, tamen latiore, laui & nigricante, perpetuo, ramos ordine quodam per intervalla ambiente, vt in prioribus generibus: Umbellæ florum alborum, foris nonnihil purpurascentium, summos ramos coronant, deinde fructus



fructus ex Cæruleo nigricans, laevis minor, quàm in aliis, Bis plerùmque floret, vere, & sub hyemem. Lucitani *Vua de Perro* vocant, & *Fallado*.

LAVRVS TAXA, CAP. XLIIII.

**P**LINIVS Lauri genera multa enumerat, tum ea quæ verè Lauri sunt, quales Delphica, Cypria, Mustax, Regia, Spadonia, Triumphalis sterilis: tum ea quæ verè Lauri non sunt, Lauri tamen vel à Græcis, vel à Latinis nominantur, ob foliorum cum vera Lauro similitudinem quandam, quales Laurus Tinus, Laurus Taxa, Chamædaphne, Daphnoides, Laurus Alexandrina, quod cum non satis accuratè perpendisset Manardus, pro Lauro Taxa, Laurum Fraxineam, vel Fraxinum Laureum (vtrum enim velit, non satis explicat) legendum esse censet, quoniam Lauri folio Fraxineum simile sit. Sed cum inter tot Lauri genera nemo vnquam Fraxinum retulerit, nec Lauri Fraxineæ vllus vnquam meminerit, exquirere & perscrutari debuerat, quænam esset illa Laurus Taxa, præsertim tam illustri nota ei à Plinio assignata, quæ Fraxino minimè congruit, potius quam Plinij lectionem sine

Lib. 15. c. 30.

Nomina

LAVRVS TAXA.



ratione immutare. Laurus Taxa Dalechampion ea est, quæ Matthiolo & Dodon. Hyppoglossum, Italis *Bislingua*, & *Bonifacia*, Hispanis *Lengua de Cauallo*, Germanis *Zeptflurkrant*, quibusdā *Pagana lingua*, Herbariis *Vuularia*, Fuschio Laurus Alexandrina. Id ita esse conuincit sola, & insignis illa nota, quæ huic plætæ cum nulla alia communis est, nempe in maioris medio folium paruum accrescens, quod veluti maioris lacinia, pediculi cui bacca insidet scapū & exortū cōtegit. Accedit in topiario opere Taxa, inquit Plin. excrecente in medio folio paruulo, veluti lacinia folij. His adde Lauri & Taxæ appellationes optimè conuenientes: Lauri quidem à Laurini folij figura: Taxæ verò à colore, figura, magnitudine fructus, qui Taxi baccas omnino refert, hac aptissima nominis ratione à Dalechampion primum obseruata, & explicata. Idem plantam istam Dioscoridis Chamædaphnè esse non sine multis & validis rationibus arbitratur, quas capite de Laureola fœmina diffusius explicabimus. Hæc Laurus, Mat-

Lib. 4. Dioscor. ca. 27.  
Lib. 6. c. 14.  
Hist. plant. cap. 87.

Lib. 15. c. 30.

thioli Hippoglossum nascitur in Liguria Alpibus, Vrbinatè agro, & in aliis syluosis montibus. Ab Herbariis colitur in hortis. Tradunt recentiores radicis aut herbæ puluerem Coclearis mensura ex vino potum strangulationibus vteri succurrere: herniis à prolapsu intestinorum protuberantibus mederi, si diutius diluculo, puluis idem sesquidrachmæ pondere ex maioris Symphyti decocto hauriatur. Sed ventrali cingendus est æger, & fasciandus primis diebus, ne rursum foras intestina prorumpant. Folia, radixq; vuæ, gutturis, ac tonsillarum tumores, ac earūdem vlcerationes gargarizatu sanant. Scribit Marcellus in Italia plantam istam puerorum collo appendi ad vuam reprimendam, quo ad vuam prolapsam contrahendam vsu, Vuulariæ nomen. Tradit Cordus constare etiam

Li. 4. Dioscor. c. 27.  
Locus.  
Vues.

Lib. 4. Dioscor. c. 32.



menes ciere & calculos pellere, quæ licet omnia vulgi experimenta sint, tamen eandem etiam facultates Lauro Alexandrinæ auctores adscribere.

## HYPOGLOSSVM, CAP. XLV.

Nomina  
In lib. 4.  
Diosc. c. 133.



VIDNAM sit Hypoglossum verum, nunc ostendamus. Ac primum cum in multis Dioscoridis exemplaribus Hippoglossum in Plinio Hypoglossum legeret Marcel. Verg. de huius nominis ratione & varietate ita differit. Rusci, inquit, folia habere Hypoglossum omnes testantur. Sed non adeo grandia sunt: præterea, in cuspidem acuminata desinunt. Quam ob causam, siue magnitudinem, siue equorum linguæ figuram ea voce intelligas, nulla in foliis ratio eius erit. Nec si etiam, ut in Plinio legitur, Græcam præpositionem ὑπὸ, coniunctam linguæ à Græcis fuisse credideris, Dioscoridis Historiæ respondebit: ἐπ' αἶψα enim, id est in summo lingulas exire hic ait, παρὰ τοῖς φύλλοις, id est secus & secundum folia, quæ hic intelligit in caule suprema. At caulis definens non folia profert, sed conferet lanuginis potius quàm foliosæ comæ in latitudinem se aperiens inuolucrum non aliter quàm in spicatis seminibus aliquibus, & floribus fit. Differt tamen à Spica, quod rotundæ, quatuorue plerumque angulis Spicæ surgunt: in hoc quod ultimum in caule exit in latitudinem se explicat. Et quoniam humanam linguam imitatur, ideo Hippoglossum quasi grandis lingua dicta. Hæc Marcello origo nominis & causa est. Quæ licet Plinij Historiæ aduersari videantur: (ait enim & in iis ceu linguas, folio paruo exeunte de foliis) meminerint omnes, inquit Marcel. sequi nos Græcos scriptores, præcipueq; Dioscoridem, & in vertendis eius verbis quam debemus illi fidem præstare, qui ἐπ' αἶψα παρὰ τοῖς φύλλοις prodire linguas in Hypoglossum dicit, quod est in summo, & secundum folia, non ex foliis, sed ex summo caule, qua parte desinunt folia: id enim ἐπ' αἶψα aperte significat: quibus verbis intelligi vult Marcel. Hippoglossum neque à foliorum quæ Rusco similia habet magnitudine, neque ab Equinæ linguæ figura dici, neque Hypoglossum à Plinio rectè nominari, cum ἐπ' αἶψα, id est in summo caule proferat quæ humanam linguam imitantur, vnde Hippoglossum, id est grandis lingua nuncupandum. Quam Marcelli mentem non satis intellexisse videtur Cordus, cum scribit Marcellum Hippoglossum malè legi censere: imo Hypoglossum legi vult, ob causam modo dictam. Multò verius dixit ille Marcellum nequaquam verum Hippoglossum in commentario suo indicare: qui nescio quam Spicatam lanuginem inducere conatur, cuius nullus vnquam auctor in hac planta mentionem fecerit. Præterea, ut cum eodem Cordo sentio, Hypoglossum, siue Hypoglossidion, siue Hypoglotion cum præpositione Græca ὑπὸ, scribendum esse, quod paulò post ostendam, ita ab eodem dissentio dicente Hypoglossum eandem esse plantam cum Lauro Alexandrina, eam nimirum quam pro Lauro Taxa exhibuimus: Atque etiam à Matthiolo, eandem quidem pro Hypoglossum pingente, sed à Lauro Alexandrina rectè distinguente. Si enim, id est, Dioscoridis Hypoglossum, quomodo eius folia Rusco figura similia intelligi possunt? aut quas in summo linguas è foliis exeuntes habet? non è mediis foliis totius plantæ, non ex summis, neque ex summo caule hæ linguæ exeunt. Quare aliud Dioscoridis Hypoglossum esse putat Dalechampius, id nimirum quod hic depinximus, & quod idem Matthiolus pro priore Lauro Alexandrina proposuit, & hoc Dioscor. caput mendis inquinatum, atque deprauatum Legendum igitur: ὑπόγλωσσον θάμνισκος ἐστὶ μυρσίνη ἀρχαία καὶ λεπτὴ (melius fortasse λευκὴ) τὰ φύλλα ὁμοῖος. Κόμην δὲ ἀκανθώδη ἔχει ἐπ' αἶψα, καὶ ὡς γλωττίδας παρὰ

Li. 4. Diosc.  
cap. 132.

Ibidem.

Li. 4. Diosc.  
cap. 142.  
Forma.



## HYPOGLOSSUM.



παρὰ τοῖς φύλλοις. Id est, Hypoglossum frutex parvus est, Myrto sylvestri (non rusco, ut vertit Ruellius) tenui (melius candida: nam & Dioscor. Myrtus sylvestris est candida, folio quàm Myrtus nigra latiore & maiore.) Commam in summo spinosam habet, & prope folia ligulas. Vel ut Andr. Lacu. ex veteri codice legit, καὶ ἐπ' ἄκρου ὡς περ ἐπὶ γλωττίδας παρὰ φύσιν μικρὰς ἐν τοῖς φύλλοις. Quod est, & in summitate foliorum germina quaedam exigua instar ligularum. Quæ si sic legisset Marcel. nec in verbis illis ἐπ' ἄκρου declarandis tantum operæ sumere, nec in summis caulibus nescio quas linguas cōminisci necesse fuisset. Nullorum sanè foliorum aptius inter se facies comparari potest, quàm huius Hypoglossi, & Myrti sylvestris candidæ. Nam ea in summitate aculeata sunt; præterea, iuxta folia graciles longique petioli nascuntur ligularum instar, qui fructus sustinent. His accedit grauiissimi auctoris Galeni testimoniū sic scribentis: ὑπογλωσσὸν ὠνόμασαν μὲν ὅτι

Lib. I. c. 12.

Li. 8. simpl.

παρὰ φύσιν ἐπ' ἄκροις τοῖς κορυμμοῖς ποιεῖται γλωσσάκια. Id est, Hypoglossum sic nominatum est, quia propagines paruarum linguarum sub summis corymbis producit. Ex quibus verbis intelligere licet γλωττίδας, siue γλωσσάκια, id est, ligulas, non esse foliola in mediis foliis nascentia, ac proinde Matthioli cætorumque Hypoglossum, quod hæc foliola habet, non esse verum hypoglossum, sed propagines, siue petiolos ex quibus corymbi pendent, simul & appellationis rationem reddi: dictum enim esse Hypoglossum quod ligulas sub corymbis habeat. Idem demonstrat literarum ordo, quo plantarum tractationem digessit Galenus. Ita etiam legit Paulus. Plinius autem Hypoglossum pariter vocat, ac sic describit. Hypoglossum folia habet figura sylvestris Myrti, concaua, spinosa, & in his ceu linguas, folio paruo exeunte de foliis, & cætera: postremis verbis male interpretatus Dioscoridis illud, παρὰ τοῖς φύλλοις. Hæc cum ex Dioscoride traducta esse constet, videtur legisse Plinius: ὑπογλωσσὸν γαμνίσκος ἐστὶ μυρσίνη ἀρχαῖα ὁμοίος. Κοιλὴν, vel πολλὴν δὲ κοιλὴν ἔχει καὶ ἀκανθώδη, καὶ ἐν ταύτῃ ὡς περ γλωττίδας. Porro cum vocem tenuis omiserit, nonnullos hoc mouit, ut suspicarentur eam in Dioscoride redundare. Qui retinent, sic legi ab Oribasio aiunt, ideoque magna ratione adiectam, ut ex ea cum qua Myrto sylvestri compararetur Hypoglossum, cognosceremus. Est enim Myrtus sylvestris duplex, altera odorata in ora maritima prouinciæ nostræ frequens, ad hominis proceritatem assurgens, crassius stipitibus: altera inodora, humilis, tenuibus virgulis fruticosa, Rusco à Latinis appellata. Posterioris folia crassiora, superioris tenuiora, cum quibus Hypoglossi folia comparata sunt. Hypoglossum in syluis, & montosis locis nascitur. Capitis dolorem corona ex huius coma imposita minuit, inquit Dioscorides. Malagmatis radix, succusque admiscetur. Galenus. Radix & succus mollendi vim habent.

In li. simpl.

Lib. 7.

Lib. 27. c. 11.

Locum.

Ibidem.

Ibidem.



HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
LAURVS ALEXANDRINA,  
CAP. XLVI.

Nomina

Li. 4. Dios.  
cap. 132.  
Lib. 4. Dios-  
cor. c. 142.  
Embl. 127.  
Li. 4. Diosc.



OLIORVM, fructus, & nominis similitudo in tribus fruticibus effecit, vt à diuersis auctoribus aliter atque aliter nominarentur, atque vsurparentur. Quam enim Bislinguam vocant, alij Hypoglossum, alij Laurum Alexandrinam, vt diximus, nuncupant. Cor- do Bislingua, & Hypoglossum cum Lauro Alexandrina idem esse videtur. Matthiolo, & Cornario, Hypoglossum, à Lauro Alexandrina diuersum cense- tur. Dalechampius aliter, & aptius, vt arbitror, distinxit, vt quæ Bislingua, Bo- nifacia, & Vuularia dicitur, sit Laurus Taxa Plinij: Hypoglossum vero Diosco- ridis & Galeni, & Hypoglossa Plinij, sit frutex præcedenti capite descriptus. Laurus autem Alexandrina ea de qua nunc agitur, hîc depicta, etiam si Hypo- glotton, & Hypoglossidion etiam quidam appellent. Δάφνη ἀλεξανδρῆ, & ἰδαία à Græcis dicitur, à Latinis Laurus Alexandrina & Idæa, ab Alexandria Troadis, vbi mons est Ida, circa quam nascitur, non vt scribit Marcel. quod Alexander victor ea vsus fue- rit. Alij Hypoglotton, alij Daphnirin, alij Carpophyllon, alij Hypelaten vocant, in- quit Plinius. Eam esse quam hîc exhibemus apertissimè declarat eius historia à Diosco- ride & Theophrasto tradita. Δάφνη ἀλεξάν- δρῆ, inquit Dioscorides, φύλλα ὀξύμυρσιν ὅμοια ἔχει, μετ' ὅνα δὲ καὶ μαλακότερα, καὶ λευκότερα. Καρπὸν δὲ ἐν μέσοις, ἐρυθρὸν, ἐρεβινθα τοῦ μεγέθους. Κλωνας ἐπὶ γῆς, ἀνιθαμίας, ἢ καὶ μετ' ὅνας. ῥίζαν παραπλησίαν τῇ ὀξύμυρσιν, μετ' ὅνα δὲ καὶ εὐώδη, καὶ μαλακότερα. φύε' ἐν τόποις ὄρεσιν. Id est, Lau- rus Alexandrina foliis est Rusci (Myrti Plini- us habet) maioribus, mollioribus, candi- dioribus (Plinius addit acutioribus) fructum habet in mediis foliis (non vt Plinius, & Ruellius, semen interfolia) rubrum, Cice- ris magnitudine, ramos humi iacentes, do- drantales, vel etiam longiores: radicem Ru- sco (non sylvestri Myrto, vt Ruellius) similem; maiorem, molliorem, odora- tam. Inuenitur in montosis. Theophrastus. ἔνια δὲ τῶν φύλλων καρποφόρα ἐστὶ, μέγα- ξον περὶ ληφόντα τον καρπὸν, ὥστερ ἡ ἀλεξανδρῆ δάφνη ἐπιφυλλοκαρπός. Id est, Stirpium quædam fructifera sunt, fructum mediis foliis amplectentes, vt Laurus Ale- xandrina, fructum super folia gignens. ac rursum: τῆς δάφνης ἐν τῷ τῷ ἰδίον, ὅτι ἐπιφυλλοκαρπός ἐστι, ὥστερ ἡ κεντρομυρσίνη. ἀμφότεροι δὲ τὸν καρπὸν ἔχουσιν ἐπὶ τῆς ραχέως τοῦ φύλλου. Id est, Lauri hoc proprium, quod fructum super folia ferat, quem- admodum Ruscus: fructus enim vtrique dorso ipsius folij insidet, quæ nota cum in ea stirpe quam exhibemus sit euidentissima, omnibus aliis consen- tientibus, Laurum Alexandrinam esse planè conuincit. Laurus quidem Taxa in medio folio paruulum habet, pediculi qui fructum fert exortum tegens: Hypoglossum ex foliis ligulas exeuntes, quæ fructus sustinent: Laurus hæc Alexandrina ipsimet foliis fructus gignit nullo foliolo tectos: quibus notis tam

LAURVS ALEXAN-  
drina vera.

in lib. 4.  
Diosc. 142.  
Li. 4. Diosc.

Forma.  
Li. 4. Diosc.



Lib. 1. Hist.  
cap. 16.

Li. 3. c. Hist.  
cap. 17.

fco (non sylvestri Myrto, vt Ruellius) similem; maiorem, molliorem, odora- tam. Inuenitur in montosis. Theophrastus. ἔνια δὲ τῶν φύλλων καρποφόρα ἐστὶ, μέγα- ξον περὶ ληφόντα τον καρπὸν, ὥστερ ἡ ἀλεξανδρῆ δάφνη ἐπιφυλλοκαρπός. Id est, Stirpium quædam fructifera sunt, fructum mediis foliis amplectentes, vt Laurus Ale- xandrina, fructum super folia gignens. ac rursum: τῆς δάφνης ἐν τῷ τῷ ἰδίον, ὅτι ἐπιφυλλοκαρπός ἐστι, ὥστερ ἡ κεντρομυρσίνη. ἀμφότεροι δὲ τὸν καρπὸν ἔχουσιν ἐπὶ τῆς ραχέως τοῦ φύλλου. Id est, Lauri hoc proprium, quod fructum super folia ferat, quem- admodum Ruscus: fructus enim vtrique dorso ipsius folij insidet, quæ nota cum in ea stirpe quam exhibemus sit euidentissima, omnibus aliis consen- tientibus, Laurum Alexandrinam esse planè conuincit. Laurus quidem Taxa in medio folio paruulum habet, pediculi qui fructum fert exortum tegens: Hypoglossum ex foliis ligulas exeuntes, quæ fructus sustinent: Laurus hæc Alexandrina ipsimet foliis fructus gignit nullo foliolo tectos: quibus notis tam



tam perspicuis cum hi tres frutices à sese secernantur, cum Dioscor. Gale-  
 nus, alij eos secuti seorsum tanquam de diuersis tractarint, tamen Cordus,  
 vt diximus, pro vna eadēque planta his rationibus adductus accepit. Hy-  
 poglossum, inquit, siue Hypoglossidion, siue Hypoglotton, etiam Laurus  
 Alexandrina à Dioscoride, & aliis omnibus vocatur. Vtrūque folio Rusci  
 describitur, tamen in Lauro Alexandrina paruorum foliorum ex foliis na-  
 scentium Dioscorides non meminit, contra in Hypoglossi historia foliis ad-  
 nati fructus mentionem non fecit. Sed quod vtriusque descriptioni deest,  
 id etiam ex vtriusque historia sarciri potest. Quod Hypoglossi, & Lauri Ale-  
 xandrinæ descriptio cum historia Vuulariæ optimè conuenit, quod ex eius fo-  
 liis minora alia nascantur folia, quæ omnia Rusci modo aculeata sunt, quod  
 iuxta parua folia rubentem ferat fructum, Ciceris magnitudine, hinc vnā  
 tantum plantam esse Hypoglossum & Laurum Alexandrinam colligit, eam  
 scilicet quæ Vuularia vulgo dicitur. Nec me mouet, inquit, quod Galenus, &  
 Ægineta diuersis locis de Hypoglossi, & Lauro Alexandrina agant. Ægineta  
 enim ex Galeno, Galenus ex Dioscoride earum vires transcripsit. At Galenus  
 Hypoglossi nomine ab Alexandrina Lauro diuersam herbam non nouit. Po-  
 tuit itaque hæc vna planta ab alio Hypoglossum, ab alio Daphne Alexandrina  
 appellari. Nam Theophr. Alexandrinæ Lauri tantum meminit, sub hac etiam  
 Hypoglossum intelligens, cuius alibi nusquam meminit. Vnde Dioscorides  
 etiam, & qui Dioscoridem secuti sunt scriptores, occasionem nacti sunt cre-  
 dendi Hypoglossum ab Alexandrina Lauro differre. Talis quoque error ipsi  
 Dioscoridi in Phyllo & Mercuriali accidit. Similes etiam innumeros in Plin-  
 io inuenias. Alexandrina Laurus etiam Idæa dicitur, quod si aliquis ignora-  
 uerit, & nomen illud solum apud auctorem aliquem inuenerit, statim opina-  
 bitur, eam sui generis esse herbam, sed falsò. Constat etiam, inquit, certissi-  
 mis vulgi experimentis Vuulariæ radicem etiam siccam bubones in peste ma-  
 turare. Hinc est, quod malacticam vim Hypoglossi radici auctores tribuunt.  
 Quinetiam Vuularia difficile parientes epota adiuuat, menses, & calculos  
 pellit, quæ licet omnia vulgi experimenta sint, tamen easdem etiam facultates  
 Lauro Alexandrinæ auctores adscribunt. Quare cum Vuularia vtriusque de-  
 scriptioni respondeat, & vtrique etiam attributis viribus, polleat, ac Alexan-  
 drina Laurus, & Hypoglossum etiam eandem historiam, & idem nomen ha-  
 beant, proculdubio Vuularia eadem est cum Lauro Alexandrina, & Alexan-  
 drina Laurus eadem cum Hypoglossi. Hæc Cordus, quæ etsi ex iis quæ de tri-  
 bus fruticibus modò à me dicta sunt, facile refelli possunt, tamen hic monebo  
 sæpissimè diuersis plantis idem positum esse nomen, eamque ob causam falli  
 multos & errare, qui diuersas pro vna habeant. Præterea eandem non esse  
 Lauri Alexandrinæ & Hypoglossi descriptionem Dioscorides docet, qui  
 Hypoglossi folia *μυρσίν ἀγρίαν*, idest Myrto syluestri similia esse scribit, & in  
 iis veluti ligulas, Lauri vero Alexandrinæ folia *ἀγυμυρσίν*, idest Rusci, &  
 in ipsorum medio fructum, &c. Postremò si vulgi experimenta vera certaque  
 sint, ac eadem sunt Vuulariæ vires quæ Hypoglossi, & Lauri Alexandrinæ,  
 eas tamen vnicam esse plantam non rectè concluderis: quoniam plurimæ  
 sunt & forma, & genere differentes, quæ iisdem pollent viribus. Sed de  
 nostra Lauro Alexandrina dicamus. Nascitur plurima in Ida, & circa He-  
 racleam Ponti, inquit Plinius, nec nisi montosis. Lauri herbæ, quam &  
 Laurum Alexandrinam appellant, inquit Galenus, temperatura euidenter  
 est calida, sapore gustantibus acri simul & subamaro: ideoque pota tum vri-  
 nas, tum menses prolicet. Difficiles partus accelerare, Dioscorides ait,

Ibidem.

Locus.

Lib. 15. c. 30.

Lib. 6. sim.

Tempera.

&amp; Vires.

lib. 4. c. 142.



Lacu.

radice pota sex drachmarum pondere in vino dulci, & stillicidio vrinæ auxiliari, sed sanguinem extrahere. Additur in veteri codice, μετὰ οἷνι γλυκέως κυάθου ἐνός, id est, in vini dulcis cyathovno. Plinius maiorem modum habet.

Lib. 23. c. 8.

Scribit enim. Laurus Alexandrina partus celeres facit, radice pota trium denariorum pondere in vini dulcis cyathis tribus. Secundas etiam pellit, mensesque eodem modo pota.

## DAPHNOIDES, CAP. XLVII.



Nomina

Lib. 15. c. 30.

Lib. 23. c. 8.

Li. 4. Dios.

cap. 143.

Lib. 3. c. 36.

Ibid. ca. 38.

Lib. 3. ca. 6.

&amp; 7.

Ibidem.

Ibidem.

Non minus obscura est Daphnoidis, & Chamædaphnes, quam Hypoglossi & Lauri Alexandrinæ historia, tum ob nominum varietatem, tum ob diuersas auctorum de his plantis sententias. Id quoque quod Daphnoides vocatur genus, inquit Plinius, in nominum ambitu est. Alij enim Pelasgum, alij Eupetalon, alij Stephanon Alexandri vocant. Alio in loco syluestrem Laurum, idem appellat. Officinis & Herbariorum vulgo Græcæ vocis imitatione Laureola dicitur. Sed cum Laureolæ duplex sit genus, mas, & fœmina, alij Daphnoidem Laureolam fœminam esse contendunt, Chamædaphnen marem, alij contra, alij Chamædaphnen esse à Laureola diuersam arbitrantur. Quam Chamædaphnen, siue Laureolam marem, Matthiolus: (alij fœminam, siue albam), Dodon. Daphnoidem & Laureolam marem vocat: quam Matthiolus & Fuschius Daphnoidem & Laureolam, Dodon. Chamæleam Germanicam, & Meze-reon vulgare. Hanc Tragus etiam pro Thymelæa, & Chamæleâ describe-re ac depingere videtur, & in eum errorem incidisse cuius alios insimulat, qui Chamæleam cum Daphnoide, seu Laureola confundunt. Nam illas minimè Thymelæam & Chamæleam esse suis locis demonstrabitur. Germanorum autem *Zeiland*, quam ille Thymelæam, & *Zeidelpast*, quam Chamæleam vocat, Fuschio auctore eadem est planta, scilicet Daphnoides, seu Laureola. Quare figuras duas, & descriptiones duas vnus plantæ exhibet, & Thymelæam, Chamæleamque cum Daphnoide confundit, si Fuschium sequamur: si Dodonæum Thymelæam similiter cum Daphnoide quam Germanicè *Zeiland*, vocari etiam scripsit. Quam autem ille Chamæleam Germanicè *Zeidelpast* vocat, Dodon. veram Chamæleam esse negat. Dicit aliquis Tragum his duabus figuris Chamædaphnen, & Daphnoidem expresse. At Daphnoides nostra, vt dicemus, folia magna in summo caule habet, quibus Tragi pictura caret: neque flores in caule habet siue foliis, quales in vtraque figura pinguntur. Dalechampius cum Dodonæo Laureolam Officinarum, siue Laureolam marem Dioscoridis Daphnoidem esse rectè censet, quæ Matthiolo est Chamædaphne, vt dictum est, à Germanis *Zeiland*, nuncupata, à Gallis *Laureole*, ab Italis *Oliuella*, vel *Oreola*, ab Hispanis, *Loreola*. Est autem frutex paruus, cubitalis, ramos multos habens Lauri modo flexiles, à medio sursum: versus folia ferentes, cortex est circa ramos admodum viscidus, folia Lauro similia, sed molliora, graciliora, (ισχυρότερα legimus in vulgatis Codicibus vetus ισχυρότερα habet, id est validiora, sic etiam Plinius legisse videtur, crassiore, inquit, & molliore quàm Laurus folio: quale reuera est Laureolæ folium) & quæ non facile franguntur, quorum gustatu os & fauces incenduntur: flores edit multos densos, oblongis quibusdam, gracilibus stellatisque veluti calathis, ex herbaceo albos, vel luteolos: semen initio viride, cum maturuerit, nigrum, baccis Lauri simile, sed minus: radicem lignosiore & duriorem. Daphnoidem siue



QVÆ IN DVMETIS REPER. LIB. II. 211  
 DAPHNOIDES, DAPHNOIDES,  
 seu Laureola. seu Laureola cum flore



siue Laureolam cum flore : item Laureolam cum fructu Lobellius exhibuit. Theophrastus Daphnoidis crocei meminit, quod de fructu interpretantur. Sunt qui Laureolam fœminam, intelligant. Daphnoides inquit Plinius, frutex est ramosus, crassiore ac molliore quam Laurus folio, cuius gustatu accenditur os atque guttur, baccis è nigro rufis. Laureola in mōtibz alperis, & siluis provenit, Germaniæ, Galliæ, Angliæ. Citò floret, Februario scilicet mense, semen Maio maturescit. Dodonæus Laureolam calidam siccāque esse tertio gradu, & ferè ad quartum vsque scripsit. Pituitam, inquit Dioscori. extrahit folium recens, vel aridum in potu: menses ciet, & vomitum: caput inanit cōmāducatū: sternutāmēta mouet. Baccæ quindecim potæ aluum resoluunt, Quæ cum Græcè sic legantur, Ἄγχι ὅτι τὸ φύλλον αὐτῆς ἔσπρον, ἢ νεαρὸν ποθὲν, καὶ τὰ κοιλίαν φλεγμώδη, sic etiam perspicuè verti possunt: folium eius aridū recensve potum humores pituitosos per aluum ducit: ac rursus διαμασσηθὲν ἀποφλεγμώδεις, Pituitam à capite extrahit commanducatum. Daphnoides Plinio, siue his nominibus quæ diximus sylvestris Laurus, aluum soluit, vel recenti folio, vel arido, drachmis tribus, cum sale, in hydromelite. Manducata pituitas extrahit: folium: & vomitus, stomacho inutile. Sic & baccæ quinæ denæ purgationis causa sumuntur. Sic enim ex veteri codice emendandus & distinguendus locus iste. Galenus eodē loco Daphnoidis id est, Clematidis prioris, seu Vincæ peruinæ, quā etiam Chamædaphnen Plinius vocat cap. 11. lib. 21. & Chamædaphnes, idest, Lauri Taxæ, meminit his verbis. Chamædaphnes germina tenera edi quoque assolent. Est autem persimilis viribus Lauro Alexandrinæ, sicut sanè & quæ Daphnoides, idest, Clematis, vocatur. Folia Laureolæ sumpta hydro-picis multū profunt, quia vacuāt aquas: similiter & baccæ: sed ventriculum evertūt, eūque ac cæteras partes internas inflāmāt, quæ noxa corrigitur, si in aceto macerentur, cui iniectum sit nonnihil Mali Cotonei, & granorum Berberis.

Li. 9. Hist. cap. 15.

Li. 15. c. 30.

Locus.

Lib. 3. c. 36.

Temper.

Virides

Li. 4. c. 143.

Li. 23. ca. 8.

Lib. 6. sim.

Ibi. Dodo.



HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
 LAVREOLA FOEMINA, CHAMAEDAPHNE  
 MVLTORVM, CAP. XLVIII.

Nomina  
 Lib. 3. ca. 38.



AVRI quoque siue Laureolæ effigiem vendicat hæc planta, herbariis & Officinis Laureola, foemina, seu alba nuncupata, Dodonæo Chamæla Germanica, siue Mezereon vulgare, Germanis, Zeidelphast, Sequanis Bois Gentil, Eandem periti etiam herbarij Dioscoridis Chamædaphnen esse censuerunt, idest humilem pumilamve Laurum, tum quod illi effigie sit affinis, tum quod probabile sit Dioscoridem tractare incipientem de Catharticis validis, Daphnoidi, idest, Laureolæ mari, Chamædaphnen, idest Laureolam foeminam statim subiecisse, congenerem plantam, &

Forma

LAVREOLA  
 foemina.

Dioscorid.  
 li. 4. c. 144.  
 Caput. 334.  
 simpl.



iisdem præditam facultatibus, purgandi aquas bilem, pituitam. At cum Dalechampius descriptiones propius inspexisset, & accuratius expendisset Chamædaphnes effectus ac facultates, mulcendi ardores stomachi, sedandi capitis dolores, & quod addit Serapio; discutiendi inflationem stomachi, mitigandi tormina, menses & vrinas ciendi, quæ omnia cum viribus Alexandrinæ Lauri conveniunt, & ab albæ Laureolæ natura plantæ acerrimæ & feruidissimæ plurimum, remota sunt, præterea cum animaduertisset Chamædaphnes fructum foliis adnecti, qui albæ Laureolæ ramis & non foliis inhæret, ab aliorum sententia desciscere coactus est, & statuere Chamædaphnem Dioscoridis, minimè habendam pro Laureolæ genere. Cum autem ex his tribus supra memoratis, quæ ob foliorum cum Lauro similitudinem Lauri vocantur, duæ, nempe Laurus Taxa Plinij, & Laurus Alexandrina fructum rubrum adnexum foliis ædant, tertia verò Hypoglossum ligulis siue gracilibus pediculis affixum, & Lauri Alexandrinæ

tradita historia Dioscorides Lauri Taxæ nullam mentionem fecerit, insignis herba, nec silentio prætereundæ, Laurum Taxam Plinij ab eo Chamædaphnè vocatam fuisse prorsus arbitratur, optimè congruente tota narrationis serie, si folioli laciniam fructum contegentem Dioscorides addidisset, quod etiam nonnulli putant in eius historia memoratum, sed deletum & inductum fuisse: quoniam virgas emittit cubitales, singulari ramo constantes (quæ præter Dioscoridis literam ex Plinio Ruellius adiecit) rectas, tenues, læues: folia Lauri, læuiora multo, pallidiora: semen rotundum, rubrum, annexum foliis. Quibus adde ex Galeno Chamædaphnen Alexandrinæ Lauro viribus esse similem, quemadmodum Vuulariam, Dalechampij Chamædaphnen, viribus iisdem præditam esse, quibus Laurus Alexandrina, Cordus quotidianis vulgi experimentis constare affirmat, ut diximus. At hic duo valdè refragantur, & ambiguo nos reddunt. Primum, si Laureola alba Chamædaphne non fuerit, quænam planta sit apud Dioscoridem pro hac Laureola habenda? Alterum quidnam significet Galenus, cum scribit Daphnoides similem Chamædaphne vim habere, cum acerrima & feruidissima planta sit Daphnoides, Chamædaphne verò non

Lib. 6. sim.

Cadelau.  
 Taxa.

Lib. 6. sim.



non solum non vrat, sed ardores stomachi leniat: Ad id quod priore loco proponitur, respondet Dalechampius, albam seu fœminam Laureolam nostram ignotam fuisse Dioscoridi, vt quæ in nostris montibus gelidissimis, & à Græciæ Asiæque montium cælo, statu, temperie diuersissimis gignatur, saltem nulum apud Dioscoridem locum extare vnde notam illi fuisse coniectemur, aut veterum scriptorum cuius, nisi fortè Plinium eam indicasse putemus, cum scribit Daphnoiden fruticem esse ramosum, folio crassiore & molliore quàm Lauri, os atque, guttur accendente, baccis nigris vel rufis, sic enim quidam legunt, non è nigro rufis. Sed hanc Daphnoidem, Laureolam marem esse diximus. Quod quæritur secundo loco, apud Galenum sic legitur, τῆς ὁ χαμαδάφνης, καὶ ἐοικυίας αὐτῇ κλωνες: παραπλησια δὲ καὶ ἡδὲ τὴν δλωάμιν ἐστὶ τῇ ἀλεξανδρείᾳ δάφνῃ καθαπτερ, καὶ δαφνοειδὲς ὀνομαζόμενον. Paulus qui ad verbum Galeni orationem transcribere solet, presius hæc ita retulit, Καὶ τὸ γε δα φνοειδὲς τῆς αὐτῆς ἐστὶ δλωάμεως, καὶ ἡ χαμαδάφνη, αὐτῇ δὲ ἐοικεταί. Ætius qui Galenum vbique sequitur, non aliter quàm Paulus, cum de Lauro strictim verba fecisset, de Chamædaphne, Daphnoide, atque adeo Clematide tacuit. Serapio ex Galeno & Dioscoride colligere solitus omnia quæ ad historiam & vires explicandas pertinet, cum recitasset quæ de arbore Lauro, Chamædaphne, & Lauro Alexandrina vterque auctor prodidit, eandem post historiam Daphnoidis petitam ex Dioscoride, scripsit ex Galeno, Ortus. (Alij, & rectius, virtus) eius est sicut Chamædaphnes. Oribasius pro suo more tradita ex Dioscoride nuda historia Lauri arboris, Chamædaphnes, Daphnoidis, Lauri Alexandrinæ, de hac facultatis similitudine inter Chamædaphnen & Daphnoides prorsus silet. Ex quibus intelligitur Galenum eam similitudinem primum ostendisse absque Dioscoridis testimonio, sic tamen vt ei fides constet, si vel δαφνοειδὲς, accipiamus non quidem vlcerantem & vrentem fruticem Laureolam nostram, sed Clematidem Galeni secundam quam paulo post δαφνοειδὲς, μυρσινειδὲς, πολυγονοειδὲς etiam vocari testatur. Ambabus

Li. 15. c. 30.

Lib. 6. sim.

L A V R E O L A  
cum fructu.



enim vis est adstringens & siccans. Vel si parem vtriusque vim, Chamædaphnes, inquam, & Daphnoidis cathartica, in prouocandis tantum mensibus intelligas: menses enim & hæc & illa ciet. Hæc est Dalechampij de Chamædaphne sententia. Nunc quæ de Laureola fœmina dicenda sunt persequamur. Frutex est paruus, binum, ternumve pedum, ad summum quaternum altitudine, ramulis breuib<sup>9</sup>, fractu contumacibus, cortice & foliis pallide virentibus Laureolæ, vel Ligustri, vel Oleæ: secundum ramulos flores oriuntur odorati, subpurpurei, deinde bacculæ initio virides maturæ rubent, aridæ & iam viætæ maturitatis, nigre, & rugosæ: piper rusticum eis vocant, & perperam Granum Cnidium. Cortex exemptus detegit granum medullosum, Canabino, aut Lithospermo maiori simile, gustu feruidissimo, & fauces gulam adurentem, diu multumque durate impressione similiter vrunt folia, cortex & radix. Nascitur in montosis & syluestribus locis Sequanorum, Germaniæ, & Heluetiæ, tum in Allobrogum, Ligurum & Delphinatus montibus

Forma

Locus.

Tempus.



*Tempus.* ribus ac collibus syluosis, opacis. Flos puniceus, aspectus venustissimi, prodit Martio, antequam folia erumpant: semen cum maturuit rubrum visitur Augusto. Non minus hæc per aluum deicit crassam viscidamque pituitam, & intestina abradit, quàm Laureala mas, cui non dissimilis, sed vehementior facultas inest, eadèmq; in aceto maceratio ad corrigendum debetur. Huius ramulum præcisum à Matthiolo pictum hîc posuimus. Quod monuimus, Sequani Lignum nobile vocant, ob floris elegantiam, sua lingua, *Bois gentil*, & initio veris ante aliorum ferè omnium florum prouentum, hunc decerptum & in vasa coniectum voluptatis gratia domi seruant. Daphnœiden alteram esse plantam hanc ignoraremus si Theophrastus in his enarrandis alioqui breuis, & concisus apertè non docuisset, Daphnœidis esse genera duo, fructu præcipuè distincta, qui niger in altera est, in altera croci colore, nempe staminum quæ à flore croci auulsa reconduntur, non autem Croci liquore diluti, vt merito hæc Daphnœides, crocea nominari possit.

## COLVTEA VESICARIA, CAP. XLIX.

Lib. 1. Hist.  
cap. 16.

*Nomina*

Lib. 3. Hist.  
cap. 17.

*Forma.*




RBOR quæ à Theophrasto *κολυτρία* dicitur, nisi mendosi sint codices, & *κολυτρία*, à quibusdam *κολωτρία*, Latine etiam Colutea dicitur, à Gallis *Baguenaudier*, Locis incultis frutex est, cultis arbor, in multos sese ramos diffundens, ligno Sambucino ferè simili, satis duro, cortice exteriori cinereo, interiori viridi, in cuius medio cauitas parua inest, medullæ loco. Folia sunt Fœnogræco similia, Sennæ foliis rotundiora, nec in acutum desinentia, superne glabra & viridia, inferne candidiora & hirsuta, gustu amara: flores multi ex longis pediculis propendent, vt in Piso & Cicerula coloris crocei, horum & Genistæ floribus forma similes, non quadripartiti, quales à Matthiolo pinguntur. His succedunt membranosi folliculi, pellucèntes, interdù rubentes, prætumidi, ac veluti quodam spiritu distendète tur-

Lib. 3. Diosc.  
cap. 70.

COLVTEA VESICARIA,  
seu Liparea Theophrasti.

COLVTEA  
vesicaria. Matth.



gidi



gidi, ita vt si digitis præmantur, crepitantes dissiliant. In his semina multa, quæ immatura renis formam habent, lutea, gustu Pisi vel fabæ: matura lentis ferè forma sunt nigra, dura, in medio compressa. Colutea Liparæ peculiaris inquit Theophrastus, arbor procera, fructum fert in siliquis, magnitudine Lentis, qui mirum in modum oues saginat. Nascitur semine, fimo stercoreata, præcipuè ouillo. Serendi tempus cum Arcturus occidit. Mandari solo debet præmacera- tum, cum iam in aqua tumet, siue flatu distenditur (legendum enim Græcè ὅταν ἡδὴ διαφυσῇται, vel διαφυσῇται ἐν τῷ ὕδατι, non διαφύσσει, vt legit Gaza, & vt ha- bent vulgata exemplaria) folium mittit fœnogræco non absimile. Germinat primum singulari caudice, triennio maximè, quo concidendis scipionibus me- lioribus idonea. Si quis decurtauerit, emoritur: stolonibus enim non regermi- nat (καὶ ὅτι ἀπὸ βλαστῶν ἐστίν. Gaza, haud enim latere plantigera constar) Spargitur deinde in ramos, quadrima prorsus arborefcit. Hæc Theophrasti Colutea, quæ non temerè alibi quàm in Lipara nascebatur, nunc in Gallia, quo nomine dixi- mus cognita est, notis omnibus maximè adstipulantibus, & Matthiolo, Do- donæo, Ruellio consentientibus. Sed Ruellius istam Coluteam, Gallorum *Baguenaudier*, Mauritanorum Sennam esse scripsit, quod fortasse vt apud Theophr. legerat coluteæ fructu oues mirè pinguescere, ita apud Serapionem in Sennæ historia, caducas eius siliquas ab opilionibus legi, saginandis ouibus perquam vtilis, demirarique se ait hanc arborem Theophrasto celebratâ, à Plinio, Dio- scoride, Galeno, Paulo prætermisam. cuius & siliquarum & foliorum, furcu- lorumque tantus inualuerit vsus, vt apud posteros nullam ferè sit purgantis me- dicamenti confectio, quæ eius mixturam non admittat. Hunc Ruellij errorem faciliè refellit Matthiolus, quod Senna herba sit paucis mensibus superstes, Co- lutea verò arbor multis perdurans annis: hæc siliquas proferat primum purpu- rascentes, deinde albicantes, flatu turgentes, semine intus paruo, rotundo, Len- tis effigie, illa folliculos falcatos, compressos, in quibus includitur semen vina- ceorum figura. Fuchsius, καλύσαν, Græcis Colyteam, & Coluteam Latinis dici scripsit, duòque eius genera esse. Vnum quod priuatim colytea vocatur, officini- nis incognitum, à Germanis *Vuelchlinfen*, appellatum (Gallorum id est *Baguenau- dier*). Alterum officinis cognitum, & frequenti vsu à medicis vsurpatum, quod Mauritano sermone *Sena*, nominatur. Altera, opinor, editione, de Colutea & Sena tractans ait se Græco Theophrasti codice destitutum putasse Latinè hanc plantam Colyteam & Coluteam dici, sed cum Græcum Theophrastum nactus esset, facile se καλύσαν & καλύσαν, diuersas esse deprehendisse: & rectè quidem. Theophrastus enim cum Coluteam Liparæ propriam descripsisset, statim sub- iicit. Aliud genus est Colytea circa Idam proueniens, fruticosa, nodosa, alis multis concaua, non admodum rara (σπάνιον ὃ οὐ πολὺ. Gaza legit σπάνιον ὃ καὶ πολὺ. inuentu rarum, non crebrum) folio Lauri latifolia, sed rotundiore, am- plioréque, Vlneo simile vt videatur, oblongiore, superne viridi, inferne cano, fibris tenuibus ac rotundis neruoso, inter eas positis, quæ à media, costarum in- star ducuntur: legendum enim, πολύμνον, ταῖς λεπταῖς ἰσὶ, μεταξύ τῶν πλεuroειδῶς ἀπὸ μέσης κατὰ τὴν σὺν. deletis superuacuis his dictionib⁹, ἐκ τῶν ὑπάρχοντων, & καὶ τοῖς ῥιζαῖς. Gaza, tum ibidem neruulis prætenuibus, fibrisque inter eas propagines quæ de medio callo in costarum speciem adducuntur, cortice non læui, sed quasi viti- gineo, materia dura spissaque, radicibus per summa gracilibus, fungosis, crispis, & mirum in modum flauis. Fructu floréque carere aiunt. Cachryn autem in thyrsu fastigiatam (τὴν ὃ κορυμώδη καὶ χύρον) gemmâsque circum folia id est, quæ globum nascentium foliorum nondum explicatum ac reclusum obuoluunt, & operiunt, valde læues, pingues, candidas, cachryi similes gignit. Præcisâ vel

Lib. 3. Hist.  
cap. 17.

Lib. 1. c. 70.

Lib. 4. Diosc.  
cap. 70.In Hist. pl  
ca. 168.

Capit. 170.

Lib. 4. Hist.  
cap. 17.

igne



Lib. 3. Hist.  
cap. 14.

igne exusta ab imis rediuiua iterum surgit. Secundam Colyteam, Idæam, Theophrasti, Berberim nostram quidam esse volunt, vt ita credant adducti præcipue fungosæ radicis gracilitate, coloréque valde flauo. Cæterum nec videtur conuenire spissæ materiæ durities, nec foliorum delineatio. Quod ad fructum & florem spectat, eum statim scrupulum eximam. Quidam potius eam plantam esse arbitrantur Sambucum montanam, non reiicienda opinione, si esset dura spissaque materia, & radicis color admodum flauus. Nam quod hanc Colyteam flore ac fructu lignatores & incolæ montis Idæ carere aiebant, non affirmat Theophrastus, & id ipsum de Corno mascula Idæi prædicabant, asserentibus contra Macedonibus eam esse fructuosam, quod vbiuis esse verissimum nemo nescit. Sambuci quidem montanæ cachrys, id est foliorum primus conceptus, siue, vt Plinius loquitur, excrecentium cacuminum articulatio geniculata, flos, fructus, sunt prorsus κορυώδη, id est, in thyrsum fastigiata, quam notam in eius plantæ τῇ κορχυῖ Theophrastus insignem proponit. Sambuci profecto vulgaris folium à qua parum montana dissidet, Capit. 13. 3. Histor. Theophrasti, simile est folio Lauri Latifoliæ, maius, latius, infernè ad sui exortum, & in medio rotundius, in extremo acutius. Eiusdem, veris initio, aut extrema hyeme, germinantis conspicuæ tanquam clauatæ cachryes, (κορυώδεις.) Materia, recens, fungosæ: siccata, valida, nec senescens, etiam delibrata, & vel in aquis demersat radices per summos cespites fusæ: quæ omnia à Theophrasto prodita de hac Idæa Colytea, agnoscuntur in montana Sambuco. In Colytea tertiæ historia sub finem Capit. 14. lib. 3. literam Theophrasti sic lego: ἡ δὲ κερκίς, ὡς περ κολυτέα ἑλλοδος, ἔχει τὸ μὲν φύλλον ἐγγύθεν τῆς κισσῆς: πολύλορον ἢ πολύφυλλον τὸ δένδρον, ὅλον μέγα. τὸν δὲ καρπὸν καὶ θάλασσαν χέδροπα, ἐν λοδοῖς ἔχει πλετέσι, ἢ τὸ σπερματικὸν τὸ ἐνὸν, μικρὸν, σκληρὸν δὲ μετρίως, ὀλίγα δὲ τοιαῦτα τῶν δένδρων: deletis aliis vocabulis, quæ ineptam & ridiculam stultitiæ imitationem præse ferunt, indignam oratione terribissima Philosophi tam diferti. Sonant autem hæc verba: siliquata est Cercis, vt & Colytea. Arbor tota nodosa, foliosa, magna. Fructus, vt leguminum in siliquis latis Semē exiguum paucum pro magnitudinis ratione inclusum siliquis, modicè durum. Tales verò paucae arbores: &c. qua oratione dilucidius & apertius nihil est. Si probetur hæc lectio arborem Iudæ hanc stirpem esse omnino arbitror, præsertim si turbatis his & confusis historiis, ex descriptione secundæ Colutea huic assignes, folium esse ἐπὶ θάτερα χλοερὸν, ὅπιαθεν δὲ ἐπιλευχρῶνον, ἢ πολὺν τὰς λεπταῖς ἰσὶ, μεταξὺ τῶν πλευροειδῶς ἀπὸ μέσης κατὰ τὴν σὺν: id autem est, altera parte virere, inferiore & auersa candicare folium, tenuibus multis fibris neruosum, inter eas sitis, quæ costarum instar à media protenduntur. Folij namque huius figura tametsi à folio montanæ Sambuci aliena non sit, tamen in huius plantæ foliis euidentior ac manifestior est. Theophrastus sane cap. 18. lib. 1. historiæ, Colyteam & Cercida tamquam congeneræ afinesve plantas inter siliquatas recensuit. Colyteam istam tertiam, seu rectius Cercidem, nonnullis senam esse placet, vt Amato Lusitano, quem non iniuria Matthiolus reprehendit, quod Sena herba sit, aut humilis frutex, Colytea arbor magna, foliis Salicis, vt habent nostri codices, à quibus Senæ folia multum discrepant. Sed iustiore de causâ miratur Constantinus, cuius auctoritate contendat Amatus Lusit. Coluteam arborem Theophrasti, Latinorum esse alburnum: cum sciamus Plinium alburnum vocasse partem illam in arboribus, quam adipis loco natura tribuit. Ipsius hæc verba sunt. Atqui in toto corpore arborum, vt reliquorum animalium cutis, sanguis, caro, nerui, venæ, ossa, medulla. Pro cute cortex: proximi plerisque adipēs: ij vocantur à colore alburnum, mollis ac pessima pars ligni, etiam in Robore putrescēs, teredini obnoxia, quare semper

ampu

In Amat.  
Enar. 83. li.  
3. Dioscor.

Li. 16. ca. 38.



apparetur. Et alio in loco Robur exalburnatum vocauit, cui alburnum detractum. Coluteam primam Theophrasti eum Lipare peculiarem multis locis sponte natam vidimus, inquit Matthiolus, praesertim in Tridentino agro apud Ananios. Iam nouit & Gallia, ut dictum est. Maio mense floret, semen Augusto maturum est. Folia seminaque temperate calida & humida sunt, auctore Dodongo. Fuchsius scripsit Sennam & Coluteam facultate inter se minime differre, non sine errore, inquit Matthiolus, quod certo sciam Coluteae non minus quam Genistae semen vomitiones ciere.

Li. 16. c. 40.

Locus.

Lib. 3. Dios.

cap. 70.

Temper.

Temper.

& Vires.

Lib. 6. c. 61.

In histo. pl.

cap. 168.

Ibidem.

COLUTEA SCORPIOIDES. CAP. L.



COLUTEA secundum hoc genus videtur, Scorpioides à scorpionis caudae figura nominatum. Frutex est ex radice crassa, brachiata in caules multos assurgens, lentos & flexiles, angulosos, ruuido cortice vestitos, ex viridi rufescente: ramis multis, quotannis ex stipitum duriorum veluti nodis prodeuntibus, virgatis, angulosis, ex quibus virgulae nascuntur, septenis plerumque foliis pinnata, Lenti similibus, senis, ex aduerso collocatis, septeno in vertice, foliorum

Nomen

Forma.

COLUTEA

Scorpioides.



Trifolij, situm, & figuram, cum binis proximis plane referente: flore Pisi, copioso, luteo. Siliquas fert fere semper geminas, longas, tenues, longo tenuique pediculo haerentes, rotundas, tanquam articulis sine nodis discretas, hic graciles, quae semen includunt, crassiores, caudae scorpionis, aut Scorpioidis à Matthiolo descripti effigie. Semen fere rotundum est, saenogræco utcumque simile, sed oblongius, angulosum, nigrum, sapore saenigræci. Nascitur in asperis locis, & saxosis, saepe ex rupium fissuris. Eadem vires huic plantae tribuuntur, quae & Coluteae.

Locus.

SENNA, CAP. LI.

SENNA Hermolao, Serapioni Sene, Officinis & Gallis Sene, Italis Senna, Hispanis Sene d' Alexandria, Arabis Sene, Germanis Sener, dicitur. Hanc quidam Dioscoridis Delphinium, alij Pelecynum, alij peplium, alij Empetron, alij Alypon, alij Theophrasti tercidem, siue Coluteam, tertiam, alij Coluteam primam esse putant, quae falso credi videbit, qui eam cum horum picturis & facie conferet. Res autem noua potius videtur, veteribus Graecis, & Latinis scriptoribus indicta. Constat Senna folijs Glycyrrhizae, crassis, subpinguibus, fabarum sapore, caule cubitali, à quo ramuli exeunt, lori modo flexiles. Flores aurei, velut Brassicae, purpureis intercurrentibus venulis. Post hos nascuntur folliculi falcati, adeoque natura compressi, ut superior membrana inferiori hereat: in quibus semen includitur ex nigro subuirescens, vinaceis adeo simile, ut non facile primo aspectu alterum ab altero secernatur. Folliculi ex ramusculis tenui pediculo pendent. Quamobrem maturescentes paruo ventorum flatu decutuntur. Planta est frigoris impatiens: quare serenda Maio, nec ultra Autumnum perdurat. Prius sata frigore facile perit: serius verò hyemem non to-

Nomina

Forma.

Matth. li. 3.

Diosc. c. 70



## S E N N A.

Capit. 58.

Lib. 2. sim.  
purga.

Locus.

Ibidem.

Tempus.

Ibidem.

tempera.

Vires.

Lib. 3. c. 43.

Li. 5. meth.  
cap. 8.

Lib. 15. coll.

Senna an  
foliis, an  
folliculis  
magis pur-  
get.

lerat. Huius meminit Serapio his verbis. Senna afferuatur sicca. Siliquas lunatas & oblongas profert, in quibus semina in ordinem digesta clauduntur. Siliquæ tenui pediculo pendent: ob id facile ventorum impetu deturbantur. Caducas opiliones colligunt. Senna, inquit Mesues, est folliculus plātæ dictæ Persis Abalzemer, Orobi modo nascentis. Satiua est, & agrestis. In Syria & Ægypto nascitur, vnde Alexandrina dicta. Nunc in Hetruria passim feritur, inquit Matthiolus, præsertim in Florentino agro, in Apulia, Liguria, & Prouincia Gallia. Ægyptia siue Alexandrina, & Syriaca præstantissima est. Vere feritur, media æstate flores & siliquas profert. Folliculus sennæ auctore Mesue, calfacit initio secundi ordinis, siccatur primo. Folia etiam primo calfaciunt. Dodonæo folia calfaciunt secundo ordine, siccant primo. Actuarius solus ex Græcis qui extant Sennæ meminit, & eam citra noxam purgare ait, pituitamque ac bilem educere, id quod experientia comprobatur, quamuis ne-

get Auerrois Sennam purgare posse pituitam. Contra eius sententiam Manardus purgare pituitam, & in morbo Hispanico valere se expertum tradit. Aquas etiam purgare sæpe visa est Siluio. Mesuæ Senna terget, expurgat, digerit, purgat clementer melancholiam, & bilem vltam à cerebro, sensuum organis, pulmone, corde, hepate, liene. Proinde morbis harum partium ab humore huiusmodi proficiscentibus succurrit, vt melancholicis febribus, & antiquis. Gaudium gignit sublato humore siue causa interna quæ tristitiam affert, & floridum corpus efficit, obstructions viscerum aperit. Foliorum huius & Chamæmeli decoctum lotionem cerebrū, & nervos roborat. Eadem quouis modo vsurpata visum & auditum firmat. Eius purgationem tardam & imbecillam celerat, & intendunt mixta acria, vt Zingiber, Sal Possilis, Sal Indus: ne verò stomachū lædat, cardiaca, vel stomachica sunt miscenda. Ob id Galeni decreto coquenda largo pondere ex iure galli, gallinæ, vel aliarum carnum, vt citra molestiam purget, vel sero lactis infusa cum Spica, deinde parum diu feruescenda, vel puluis eius ex lacte dulci sumendus est. Vino musteo albo miscebat quidam vim magnam Sennæ, post tres menses potandum vinum dabat, sicque purgabat cerebrum, sensuum organa, & gaudium augebat. Sunt qui decocto eius cum prunis & Spica feliciter purgant. Mediocre autem coctionem sustinet. Infunditur ab aureis tribus ad vnciam vnam. Hæc Mesues, qui in Sennæ præparatione declaranda male Galenum citat, cum illi Senna prorsus ignota fuerit. Senna, inquit Serapio mirificè prodest delirio, amentia, scissuris totius corporis, resolutioni neruorum, phthiriasi, cephalalgia, scabiei, pustulis, pruritu, & epilepsia. Cor etiam roborat, potissimum si iis miscatur quæ ipsum maximè confirmant vt Viola. Is trita drach. vnam quod parum esse videtur, cocta drach. quinque dat, vnciam ex aqua cocta mediocriter purgare affirmat Manardus. Mesues Sennam folliculo quàm foliis esse efficaciorē tradit, præsertim si is ex viridi nigricat, & modicè amarus est. Substringit absolutus, & recens, nam vetustate exanimatur, in quo semen amplum, & compressum: subalbidus & imperfectus improba



improbatur. Folia viridia præstantiora sunt subalbidis & tenuibus: furculi verò inutiles. Actuarius de Sennæ tantum fructu purgandi vi prædito loqui videtur. Contra folia valentius purgare folliculis affirmat Manardus, ei subscribente longa medicorum experientia, & si Brasauolus dissentiat, Mesuénque tueri velit. Ad quam controuersiam dirimendam cum certam longamque experientiâ Matthiolus adhibuisset, sic decreuit. Sennæ folliculos duum esse generum. Vnum in planta arefactum, & per se caducum, à quo semen eximunt nigrum, prorsus euandidum. Alterum ante perfectam maturitatem decerptum, succo prægnans, crassum, ponderosum, quod tegetibus expansum in umbra siccat, raroque venditur: huic non minor quàm foliis purgandi vis inest: illi quo omnes officinæ abundant, non modo minor, sed prope nulla. Mesuen autem de secundo folliculorum genere loqui aperte declarant ipsius verba quæ supra citavi, non de caducis illis, & euanidis folliculis, quibus tantum vtuntur ij qui ipsi reclamant. Præterea scribenti Mesuæ Sennam obesse ventriculo, ob id cardiaca, & stomachica admiscenda, iisque qui torminosum esse medicamentum conqueruntur, non assentiuntur Manardus, & Matthiolus. Cum enim Senna subamara sit, adstrictionis & siccitatis particeps, roborare potius ventriculum, quàm perturbare, & debilitare iudicandum. Quod si quibusdam, præsertim mulieribus, accidat vt epoto Sennæ diluto torminibus vexentur, id non medicamento, sed variæ fumentium naturæ, & pituitosis, crassis, viscidisque humoribus adscribendum, qui cum à medicamento impelluntur, intestina distendunt, & ex solutione continui dolores pariunt: at vix quempiam inuenias, qui sumpta Senna ventriculi dolore se vexari queratur: vt rectè Actuarius Sennam citra noxam purgare scripserit. Recte tamen Mesues scripsit Sennam stomachicis & cardiacis esse corrigendam. Nam si siccitate & adstrictione ventriculum iuuaret, sic brassicæ marinæ, Thymelææ & chamælææ siccitas stomachum iuuaret, quem tamen lædunt viroso illo odore, & purgatrice qualitate, à qua non longe absunt folia Sennæ, vt dum virent adhuc, aut macerantur, odorantur. Sennæ dilutum, quod nulla ex parte exhalet, decocto præstat, cuius vnciæ quinque vel sex aluum sine molestia soluunt, tutoque dari potest id medicamentum prægnantibus, pueris, & cuiusvis ætatis hominibus. Redditur in deiicienda aluo præstantius atque valentius, si Cassia cathartica aut Manna, aut Rhabarbarum, aut Rhodopharmacum, quod officinæ syrupum Rosatum solutium vocant commisceatur, aut caprino sero Senna maceretur. Ex Senna etiam adhuc virente & Rosarum diluto paratur syrupus tuto & abunde omnes purgans humores. Præstantissimum quoque dilutum hoc modo conficitur. Selectissimæ Senne drachmæ sex, Zingiberis, aut Cinnamomi triti drachma vna, florum Buglosi drachmæ duæ, miscentur simul, & fictili vitro circumlito, aut stanneo vase oris angusti excipiuntur, & affusis feruentis aquæ, aut feri caprini vnciis decem, vas ita obturatur, vt nullus omnino vapor pateat exitus. Id puluinari plumis anserinis facto, ignique calfacto inuoluitur, & totam noctem in arca reponitur. Sic enim conseruato calore dilutum omnem Sennæ virtutem in sese recipit. Miratur Ruellius Sennæ esu oves pinguescere & sagina quadam exhilarari, quod ante hac diximus Theophrastum de Liparæa Colutea prodidisse homines macrescere, & inaniri.

Ibidem.

Li. 3. Diosc.  
cap. 70.

Lib. I. c. 70.



Gesne. in  
Gor. ger.  
Nomina



ENVSTA hæc arbor Monspelienfibus arbor Iudæ dicitur, Gallis Gainier, à filiquarum cum vaginis, quas Gaines, vocant, similitudine, quibusdam hodie Ceratonia sylvestris, Carrobaria, Italis quam id nomen, Ceratoniæ aptius tribuunt. Folio est prorsus rotundo, Alari aut Cyclamini, nervoso, & venoso, crasso, nitido: flore copioso ex stipitis capitato globosoque vertice, non ex ramis furculisve prodeunte, cō-

Forma.

ARBOR IVDÆ.



Cap. 14. lib.  
3. histor.

In Hort.  
Germ.  
In Sil. c. 36.  
Cap. 49.

Lib. 1. ca. 79.

Lib. 1. Hist.  
cap. 8.

Lib. 3. Hist.  
cap. 14.

fertim pullulantibus aut nondum exortis foliis, purpureo, punicante, hilari, Cicerculæ aut Pisi. Siliquæ per Augustum maturantur: semen Lentis effigie compressum, Genistæve. Ipsæ siliquæ foris xerampelino aut spadiceo fulgore micant compressæ, digito latiores, & longiores, quadantenus Sennæ, sed rectæ, nascitur prope riuos aut latiorum agrorum margines, interdum & in collibus Veronæ, amœnis, & Narbonæ, Hetruriæ etiam non procul Senis & prope Tinum oppidulum, Turnoni ex aduerso situm, in altera ripa Rhodani, videtur quibusdam esse vel Laburnum, vel eius species. Sunt qui sentiant Theophrasti Colyteam tertiam esse. Sed quamvis siliquata hæc sit arbor, à Laburno tamen colyteaque plurimum differre. Gesnerus censet, quoniam Laburnum, autore Plinio, Alpina est arbor, flore cubitali, quæ huic minimè conueniunt: Colytea verò siliquata, Theophrasto, folio est salicis vel Coluteæ, ut in publicis codicibus legitur, siliqua lata, ut Senna, non angusta. Sed de hac tota quæstione dum coluteurum historiam excute remus, paulo ante iudicium nostrum exposuimus. Esse porro eo non potest, de qua Ruellius scripsit his verbis. Ostenditur apud nos in cortibus, arbor, Sycomori, ut aiunt, nomine, frondosa, Moro non dissimilis conspectu, folio, magnitudine. Sed neque germinibus, neque ramis quicquam prouenireprehendimus, nisi quippiam ineunte vere cum parturit, veluti nucamentum prælongum: fructum foliacea siliqua, inflexu fere falcato gerit. Sed scalpitu vulnerata nihil remittit lactis, cum vera sycomorus æstate multo humore lacteo scateat. Hæc Ruellius, At hæc arbor florem non nucamentum vere parit, nec foliaceas & falcatas siliquas fert, sed rectas, & leguminum siliquis similes, ut pictura ostendit. Sed hic intelligat Lector arborem quam Ruellius sycomori nomine describit, Acer album esse, Gallorum Plane, ante hac descriptum, & depictum, illumque falli, cum Moro foliis similem esse scribit. Sunt quibus Cercis siliquata Theophrasti videatur esse. Quædam etiam arbores, inquit, semen in siliquis inclusum habent, ut Cerania quam Egyptiam ficum vocant, Cercis, & Colutea Liparæ. Alio tamen loco cercida, quam Alpinam Populum Gaza interpretatur, particularim describens siliquarum non meminit. Cercis populo albæ similis, tum magnitudine, tum ramorum candore, folio Hederæ, sed parte altera non anguloso, altera oblongo, in acutum coacto, colore parte supina pronaque fere simili, pediculo longo, tenuique adnexo,



adnexo, ob id non recto, sed inclinato: cortice asperiore quàm Populus alba, scabrioreque velut Pirus sylvestris. Hæc Cercis populus est Lybica, à Matthiolo depicta libr. i. Dioscorid. cap. 93. de qua fufe suo loco tractauimus. Hic Lector, meminerit Matthiolū secunda commentariorum in Dioscoridem editione, arborem hanc pro vera Acacia depinxisse atque descripsisse. Acacia imaginem, inquit, detulit ad me Constantinopoli Augerius de busbech, Cæsaris ad Turcarum Imperatorem Orator, quæ omnibus suis partibus, notisque veram, legitimamque Acaciam imitatur. Nam plantæ integræ imago caudicem habet non in rectum, sed in obliquum se attolentem, nigro omnino libro, ramos surculosque vbique spinis rigentes. Foliis est rotundis, Piri magnitudine, venosis, parte prona fuliginosis, supina ex viridi subalbicantibus, minimè ferratis, subnigricante pediculo: floribus ex albo purpurascantibus: siliquis & semine Lupino similibus. Hæc Matthiolus. Cuius pictura vna duntaxat re ab hac nostra differt, quod hæc spinis careat, illa spinis horrida sit, quas commentitias esse suspicantur multi.

Lib. i. c. 115.

## XYLON, CAP. LIII.

**V**T Græcè ξύλον & γοσσιπίον hæc planta, ita Latine Xylon & Gossipiū nominatur, Officinis Bombax, Gallis Cotton, Germanis Baumwol, Italis Bambagia, & Corone, Hispanis, Algodon: frutex est humilis, foliis latis, altius incisus, Viti aut Alceæ quadantenus similibus, sed minoribus: incanis floribus luteis, in medio nonnihil purpureis, per oras cre-  
natis: fructu Nucibus Ponticis compressis & latis ferè simili, aut Malis exiguis, pullo colore candidissimo vellere pleno, quo semen occultitur, Terebinthi aut Cubeæ, oblongum, copiosum, medulla plenum, alba, oleaginosa, non in-

Nomina

Forma.

## GOSSIPIVM

sive Xylon Matth.



suau gustu, Pinæ aut Amygdalarum, præsertim dum recens est. Superior pars Ægypti in Arabiam vergens inquit Plinius, gignit fruticem, quem aliqui Gossipion vocant, plures Xylon, & ideo lina inde facta Xylina. Paruulus est, similèmq; barbata Nuci fert fructum, cuius ex interiore bombyce lanugo netur. Nec vlla sunt ei in candore, mollitiæque præferenda. Vestes inde sacerdotibus Ægypti gratissimæ. Id Gossipium priscis rarum, & ferme ignotum, adeo frequens est nostro æuo, vt ex tractibus & insulis Arabicis non opus sit petere. Multis enim Mediterraneis in litoribus alitur, & venum inde aduehitur. Plantam istam veteribus Græcis incognitam fuisse multi arbitrantur. Sed illi errant. Est enim ad lanigeras Theophr. vires planè referenda. In Tylo insula quæ in sinu Arabico est, inquit Theophrastus, parte adoriète spectante tanta est arborum multitudo, vbi æstus recesserit, vt Locus incultus deferatur: earum autem multæ lanigeræ. Folia vitis habent, verum minora, fructum nullum (fortasse vescum intelligit) quo lana continetur, Mali magnitudine, vere nascitur, occlusum: at tem-

Lib. 19. ca. 1.

Li. 4. Hist. cap. 9.



*Locus.* pestiua maturitate aperitur, lanâque eximitur, ex qua telas texunt, alias viles, alias pretiosas. Hoc idem in India, & in Arabia fit. Xylon non solum sponte in Ægypto & India, sed etiam hodie in Cipro, Creta, Melita, Sicilia insulis fatum copiosissimum provenit, atque etiam in Apulia aliisque regionibus. *Temper.* Huius lanugo sine dubio exalfacit, & siccatur, & combusta mirum in modum sanguinem ex vulneribus manantem sistit. Semen auctore Serapione calidum est, & humidum. Eius medulla tussi, & difficile spirantibus auxiliatur, genitale semen procreat, quare Venerem stimulat. Oleum ex ea exprimitur, quo tum lentigines in facie, tum alia etiam corporis maculae optimè delentur.

## CISTVS,

## CAP. LIIII.

*Nomina.* **K**ΙΣΤΟΣ & κισθος, κισθαρον & κιστορον Græcis, Latinis similiter Cistus, & Cisthus dicitur. Arabibus *Ramet*, Hispanis, *Cerguacos*, & Italis, *Cisto*, fortasse quod κιστος idest, hederæ foliis, sit rotundis. *Genera.* Duo eius genera. Cistus non Ladanifer, & Cistus Ladanifer. Illius duo etiam genera: mas, & femina. *Forma.* Quibus marinum addidimus. Cistus non Ladanifer, frutex est stipitibus rotundis, hirsutis, geniculatis, ramosis: foliis mas rotundis, crispis, hirsutis, albicantibus, acerbis: femina oblongis, Saluiae æmulis. quàm ob causam rustici Patavini hanc Saluiam agrestem vocant. Flos emicat in summis stipitibus, ut Mali Punica, vel ut Rosæ sylvestris, in mare rubescens, in femina albus, deinde in triquetro & tricocco, fructus inuolucro pusillum semen Hypocryami, quale & reliquis Cistis. Cistus inquit Dioscorides, ramosus frutex est, non altus, foliosus, saxosis locis nascens: foliis rotundis, acerbis, hirsutis: flos masculo ὡς περ ροῦς, idest, ut Mali punica, alias ὡς περ ρόδου, idest, ut Rosæ: feminae albet. Græci, ait Plinius, vicino Hederæ vocabulo, Cisthon appellant fruticem maiorem Thymo, foliis Ocimi. Duo eius genera, flos masculo rosacens, feminae albus. Quæ de Dioscoridis Cisto à Plinio dicta esse dubium non est, & si non omnia prorsus similia sint. Id verò cuius recte nos admonet, hederæ nomen Cisson, Cisto vicinum esse, si memoria retinisset, Hederam idest Cisson, penitus cum Cisto nominum vicinitate deceptus non confudisset, cum scribit. Duo genera eius (loquitur de Hederæ) prima ut reliquorum mas, & femina Maior traditur mas corpore, & folio duriore etiâ & pinguiore, & flore adpurpurâ accedente. Viriusque autem flos similis est Rosæ sylvestri, nisi quod caret odore. Quæ Cisti propria ad Hederam à Plinio translata esse, eumque plantas has natura diuersas confudisse, iam dudum à Leoniceno demonstratum est, quamvis frigidi, argumentis Plinium defenderit Collinutius. Leoniceno assentiuntur Marcel. Matthiolus, Cordus, Ruellius Verum Pliniani erroris originem manasse credimus ex Theophrasti



Li. 1. c. 129.

Li. 24. c. 10.

Lib. 16. c. 34



phraſti in emendata lectione. Καὶ ἡ κίττου δύο γένη διακρίσει, τὸ μὲν ἄρρεν τὸ δὲ θῆλυ. Lib. 6. Hist. cap. 2.  
τὸ μὲν μείζον ἔσκληρότερον, καὶ λεπρότερον ἔχον τὸ φύλλον, ἔτ' ἀνθος ἐπιπορφυρίζον.

*CISTVS MAS FOLIO*

*rotundiore Matthioli.*



*CISTVS FOEMINA*

*Matthioli.*



*CISTVS CVM*

*Hypocistide Matth.*



ἅμω δὲ ὅμοια ῥοδοῖς τοῖς ἀγροῖς. Quæ verba cum apertè Plinius verterit, exēplaria verò Theophrast. etiam hodie κίττου pro κίττω habeant, ita vt Theodorus quoque Hederam pro Cisto reddiderit, verisimile est etiam Plinium falsa lectione deceptum, Hederam pro Cisto legisse, ac expressisse. Nam & alioqui in breui hoc loco vox φύλλον post ἔχον, & vox ῥοδοῖς ante voces τοῖς ἀγροῖς in impressis Theophr. Codicibus desiderantur. Κίττω autem pro κίττω legi ex ipso Theophrasto facillè confirmatur, qui alio loco Hederam multiplicem esse tradit, alteram humi nascentem, alteram in altum sese attollentem. Huius tria esse summa genera, cādidam, nigram, & Helicem. Parum igitur sibi constitisset Theophrastus, qui tot Hederæ genera prodidisset, & aliquantò post duo tantum, solo sexu discreta retulisset. Hypocistis iuxta vtriūsq; Cisti, etiā Ladani radices nascitur, floris Mali punici figura, vel potius Orobāches. Dioscor. Hypocistis. Orobe-  
thron, aut Cytinus à nonnullis cognominata, iuxta Cisti radices nascitur, floris Mali Punicæ similitudine. Quædā rufa, altera

Cor. Emb.  
105. lib. 1.  
Dioscor.

Hypocistis



herbacea, tertia candida. Liquatur Acaciæ modo. Aliqui tamen exsiccant, frætâque macerant, & incoquant, reliquæque, vt in Lycio, prosequuntur. Sub Cistis maximè nascitur Hypocistis, inquit Plinius, ac rursus: Hypocistis Orobethron quibusdam dicta, Malo granato immaturo similis. Nascitur, vt diximus sub Cisto, vnde nomen. Hæc arefacta in umbra sistit aluum ex vino austero, nigroque, vtraque: duo enim genera eius, candida, & rufa. Eadem duo genera tantum posuit Oribasius, prætermisso eo quod χλωρόν, id est, herbaceum Dioscorides habet. Fuschius Pastillos ex Succino examinans, Hypocistida fungum esse falso prodidit. Hypocistis enim, vt scribit Matthiolum, fungus non est, sed veluti germen è Cisti radicibus pullulans, effigie ferè Punicorum Cytinos referens, vt sciunt ij qui Cistum sæpe viderunt, & in eius radicibus Hypocistida, quam colligere ex eaque succum elicere seplasiarios oporteret. Hypocistis enim qua pæssim omnes vtuntur, adulterina est, ex Barbæ hirci radicibus succo ab impostoribus expresso, atque insolato, cui imposturæ causam dederunt Arabes, quod Cistum Hirci Barbulam appellant. Cistum enim eam esse stirpem rati, quam Græci τριφυλλὸν ὀνόμαζον, id est, Hirci barbam dicunt, ex eius radicibus adulterinam, vt diximus, Hypocistida conficiunt.

**Locus.** Cistus in Cypro, Creta, Sicilia, Italia, vt in Hetruria, præsertim in Apennino monte, Gallia Narbonensi, locis incultis, asperis, & saxosis provenit. Cisti flores & folia ordine secundo desiccant, & modicè adstringunt. Hypocistis eodem prædita est temperamento, sed magis adstringit. Cisto, inquit Dioscor. vis adstringens inest: vnde flores in vino austero bis in die poti profunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent: vetustati vlcera, & igni ambustis cum cerato medentur. Hypocistis vires Acaciæ habet, verum aliquanto magis siccat, & adstringit. Proinde dysentericis, celiacis, sanguinem excreantibus, sceminarum profluuiio & pota, & indita prodest. Cistus frutex Galeno, est gustu adstringens, omnibusque particulatim operibus. Attamen folia, & parua germina trita adeo desiccant, adstringuntque, vt vlcera glutinare possint. At flores magis sunt efficaces: itaque cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates fluxusque ac humiditates sanant: cataplasmatibus modo illita vlcera putredinosa iuuant. Est enim facultas eorum non instrenuè desiccans, ferèque secundi excessus absoluti. Sic verò frutex hic frigidus est, vt tepidi caloris sit particeps. Porro Hypocistis multo magis adstringit quàm folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta, sanguinis reiectiones, muliebria profluua, celiacos, dysentericosque. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ scilicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac siccitatem illi non segniter addit. Sic sanè stomachicis epithematis, hepaticisque commiscetur, & ex viperis confecto antidoto inditur, nimirum quia corpora confirmet ac roboret. Ambo (Cisti genera) dysenterias prodesse tradit Plinius, & solutionibus ventris, in vino austero ternis digitis carpto flore, & similiter bis die potio: vlcerebus veteribus & ambustis cum cera, & per se oris vlcerebus. His subiungimus longe plures Cisti species à Clusio obseruatas & traditas, ac primum Cisti maris quinque, inter se foliorum forma, aut colore differentes. Primus Cistus, cuius hic Iconem cum sua Hypocistide vides, hominis altitudine, plerumque fruticat, ligno satis fragili, cortice candicante tecto, frequentibus ramis alternatim semper ex aduerso respondentibus, eandem etiam seriem seruantibus foliis, quæ omnino sunt incana, molliora & longiora in nouellis plantis in adultis verò contractiora, duriora, & aspera, foliorum Saluæ modo, mucronata, gustu adstringente: Flos eius Cynorhodi, aut Rosæ sylvestris magnitudine, quinque foliis constans, colore rubro dilutiore, multis staminibus croceis medium florem,

Li. 24. c. 10.  
Lib. 26. c. 8.

Hypocisti.  
Vires.  
Lib. 11.

Lib. 2. com.  
med.

Lib. 1. Diosc.  
cap. 109.

Matth. ibi.

Tempera.  
& Vires.  
Dodo. li. 6.  
cap. 3.

Li. 7. simpl.

Li. 24. c. 10.



## CISTVS MAS

I. Clusij.



disposita, molliora, longiora, angustiora, & magis acuminata: Flos superiori similis, ex albo purpurascens: capitulis & semine parum differt. Nascitur etiam

## CISTVS MAS

II. Clusij.



mum, pedalis ramis aut paulo amplioribus, multis ex eadem radice prodeuntibus: folia crispa, & quodammodo sinuosa, candicantia, hirsuta, gustu acerbo,

florem, ut in Rosa simplici occupantibus. Flori succedunt capitula quadam pentagona, dura, hirsuta & incana, mucronata, in quibus est semen exiguum, ex rufo nigricans, feminis Hyascyami, aut Papaveris magnitudine. Ad huius Cisti radices quæ summis cespitibus vagantur copiosè nascitur elegantissima omnium Hypocistis primo vere, cū Cistus iam ad florendum se præparat: cum primum è terra emergit, purpureum, siue Kermesinum sericum esse diceret: deinde paulatim assurgens, & sese explicans, multum de pristini coloris elegantia remittit, cum Cytinos suos profert, candicantes, turgidosq; & lento succo plenos, qui à Peritis Pharmacopœis in Hypocistidis succū densatur. Frequens est hic Cistus cum in Hispania præsertim Bætica, tum in Lusitania, & Gallia Narbonensi. Secundus hic quoque depictus eadem altitudine qua superior assurgit, interdum etiam maiore, non minus fruticoso stipite, neque minore ramorum frequentia, minus tamen candicat: folia eodem ordine hic in Hispania, & diutius reliquis maris generibus floret: illius etiam ramuli teneriores sub Autumnum, rarulentum quiddam pingue & odorem contrahunt. Tertius superioribus breuior est, non minus fruticosus, sed tenuioribus ramis, folia superiore breuiora, & dilutioris viroris, rugosiora, pinguiora, odoratiora, flos aliis similis, dilute rubens, & aliquantulum odoratus: capitula superioribus paulo minora, & suis inuolucris (quæ florum calyces sunt) diutius occultantur: semen in capitulis ceteris æquale. In Lusitania sponte nascitur supra Vlyssiponem. Quartus hominis altitudine plerumque attollitur, ut reliqui fruticosus, ramulis aliquantum in canis, folia reliquis maiora, & quasi orbiculata, hirsuta nonnihil & rugosa: flores reliquis forma similes, paulo maiores, & colore saturatius rubente: capitula hirsuta, dura, pentagona, superioribus maiora, in quibus semen rufum maius, quàm aliorum continetur. Reperitur in regno Valentino, atque Arragonia. Quintus humilis est, & supinus ut plurimum,



## CISTVS MAS

V. Clusij.



## CISTVS FOEMINA

Clusij.



Lib. stirp.  
Hisp. c. 35.

acerbo, & adstringente: flores ramulorum summitatibus æquali altitudine & quasi umbellatim nascuntur, superioribus paulo minores, sed eleganti & purpureo colore: capitula reliquis minora, suis involucris plerumque contexta semen continent reliquis simile, sed atrius. Hunc in Lusitania tantum nascentem vidit Clusius, qui Cistum foeminam etiam in suas species distribuit. Nam aut elatior est, & rectis virgis fruticans sicuti mas, aut supina, & humi se diffundens. Vtriusque generis color in flore variat: nam vel candidus est magna ex parte, vel luteus, seu Ochrae colore. Est igitur Cistus foemina frutex ramosus, cubitum interdum altus, nonnunquam humi stratus, gracilibus ramis, nigricantibus, folio non minore quam in maris quarto genere, ferè rotundo, rudi & aspero, viridi, sapore, ut maris adstringente, & acerbo: flos paulo minor quam in mare, quinti generis flori ferè similis, albus nonnunquam, interdum luteus, fibris luteis, ut in Rosa sylvestri, medium florè obtinentibus: capitula minora & nigriora sunt quam in mare, non acuminata, sed compressa nonnihil superiore parte, semen paulo nigrius & satis magnum continentia. Eius qui albo est flore tum recti tum supini magna est copia in Hispaniis, Lusitania, Gallia Narbonensi & Aquitania. Qui verò luteum profert, nonnullis duntaxat Hispaniae locis, & extrema Aquitania, Cantabris finitima, circa Baionam visitur. Aliquot alia Cisti genera per Hispanias & Lusitaniam Clusius se observasse ait, quæ ad foeminam potius referenda esse putat, quam ad marem, aut Ledon, quoniam nullo pingui lentore sint prædita, neque florem Roseum, siue purpureum habeant, nisi fortè quis eam speciem quæ Thymi foliis est, inter Ledi genera recenscat. Horum primus Cistus est Halimi folio: Is cubitales, aut ampliores profert ramos, graciles, satis fruticosos, in quibus folia Portulacæ marinæ similia, sed omnino incana ut Halimi, mucrone obtusiore, sub acido & adstringente gustu. Summi rami multos proferunt flores, quinque foliis constantes, colore luteo, cum suis in medio fibris, minores quàm in superioribus. Semen in capitulis longiuscu



## CISTVS FOLIO

Halimi I. Clusij.



## CISTVS FOLIO

Halimi I I. Clusij.



longiusculis, & triangulis exiguum, & subrutum. Ad huius radices Hypocistis nascitur, lutea omnino, siue Ochra colore, quæ plantæ ipsius florem colore æmulatur. Cistus alter folio Halimi procerior est priore, ramis firmioribus, incanis vt priori folia superiore paulo longiora, angustiora & magis mucronata,

## CISTVS LAVAN-

dula Clusij.



dorso elatiore, incana tamen tota, & sicca, gustu etiam subacido, & adstringente. Vterque frequens est in Lusitaniæ solo arenoso, & aura marina afflato, inter Ericas, non procul Vlyssipone, nusquam alibi à Clusio visus. Cistus folio Lauandulæ plerumque cubitali est altitudine, admodum ramosus, sed breuibis ramis, foliis confertim nascentibus, angustis, incanis, sapore adstringenti: Floribus parvis non multum à superiore differentibus, albis. Est hic frutex Lauandulæ adeò similis, vt nisi sapor & odor prohiberent pro Lauandula sumi posset. Flores etiam perspicuè distingūt. Hunc solummodo in regno Valentino vidit; aridis & petrosis locis, quarto à Valentia miliari, Aprilis initio. Cistus folio Sampfuchi planta fruticosa est, multos tenues ramulos proferens: Folia in his parua, pene rotunda, incana, Sampfucho similia, minora paulo, & dorso eminente, cum quadam aciditate & farsedine adstringentia: Flos in summis ramis candidus, copiosus, villis & staminibus luteis, vt in reliquis Cisti generibus extantibus in medio flore, quinque foliis constante



## CISTVS FOLIO


*Samplicis Clusij*

## CISTVS FOLIO

*Thymi Clusij*

constante, quorum medium macula ex purpura nigricans occupat: capitula exigua. Lini fere, trigona, in quibus semen minus Hyoscyami, ex nigro candicans, siue cinereum continetur: totus ille oblongus ramulus, qui flo-

## CISTVS ANNVS

*1. Clusij*

rem & fructum sustinet, arescit eo maturo, ut in singulis Cisti generibus. Primus hic repertus est in Castella veteri, deinde copiosum in Castella noua, & toto Bærico agro, inter Tagum & Anam flumina. Cistus folio Thymi pedali fruticat altitudine, ramulis ex purpura nigricantibus, duris, lignosis, qui magna ex parte sine foliis conspiciuntur, præterquam circa summitates, in quibus confertim nascuntur, exilia admodum, viridia, Thymi amula, gustu adstringente: Florem summis ramis superiori similem, minorem, nullis maculis notatum fert. Visus hic est in extrema Bætica parte, qua Castellam & Lusitaniam spectat. Superioribus plantas duas adiungit Clusius, quarum priorem Helianthemi albi, alteram Helianthes lutea nomine ostendunt Herbarij. Postrema Oculi est ea quæ in vinearum Salamanticensium marginibus & Granatensi regno gignitur, rectis, longioribus, & rarioribus virgatis, foliis amplioribus Helianthemo, & virentioribus, gustu



## CISTVS ANNVS

alter Lobel.



gustu adstringente: flore pallido, aut albicante, semine minuto, rubescente, in capitulis trigonis Inuenitur & eodem autore, alia in sylua Madriciana, secundo ab vrbe Lutetia miliari, ad Cisti genus referenda, pedali altitudine, exilibus cauliculis, rectis, tenellis, non admodum ramosis: foliis oblongis, angustis, hirsutis, virescentibus, quæ cum ramulis per caniculæ ætus, humore quodam pingui & lento obsita sunt: flore pusillo, quinque foliis constante, pallidi coloris, & macula punicante insignibus: capitulis tenellis admodum, triquetris semen pusillum & cinereum continentibus. Hanc Lobellius pictam monstrat. Annua est vtraque hæc postremo descripta planta: vel altero à satu anno floret, deinde perit. Florent Cisti omnes eodem quo mas tempore, & semen etiam ad maturitatem perducunt. Omnibus perpetuum folium, sed eorum flos admodum caducus, statimque senescens: radices duræ, lignosæ, diuisæ, in diuersa tendentes.

## LEDVM, CAP. LV.

**I**STI Ladaniferi genus λήδων (sic fortasse dictum, quia folia eius, neque læuia, neque nitida sunt, sed scabra & pannosa: λήδης enim vestis est ex panno raro & detricto) & λείδων, similiter Ledum & Ladam appellatur, Arabicè *Chafus*. Frutex est, inquit Dioscorides, Cisti modo nascens, longioribus foliis, & nigrioribus, quæ verno tempore quiddam contrahunt pingue. Hunc à superiore, velut diuersum Galenus non distinguit, sed de illo ita tradit. Cistus Ledō in calidis regionibus proueniens, tamen si haud alius sit genere, quam qui apud nos nascitur, eximiam tamen à regione, ac peculiarem digerentemque caliditatem nactus est, atque vtroque à nostrate differt, tum quia frigiditatem deposuit, tum quia calorem assumpsit. Pingue illud, quod ex eo colligitur λείδων, Latinis etiam Ladanum dicitur, Officinis Lapidanum, Mauritanis Leden, & Laden dictum, Italis Ladani colligendo modi. *Lodano*, & *Odano*, Hispanis *Xara*. Huius colligendi modos duos prodidit Dioscorides. Cum Cisti frondes pascuntur capræ hirci, pinguitudinem aut ille, conspicuè barba carpunt, & suo lentore villosis cruribus adhærescentem reportant: quam depectentes incolæ, colantésque cogunt in offas, & ita recondunt. Alij attractis funiculis, insidentem fruticibus liquorem abstergunt, conglomerantque in Ladanum. Arabia etiâ nnum & Ladano gloriatur, inquit Plinius. Forte, casuq; & iniuria fieri hoc odoris genus plures tradidêre, Capras maleficum aliàs frondibus animal, odoratorum verò fruticum appetentius tanquam intelligant pretia, carpere germina caulium prædulci liquore turgentia, distillantemque ab his, quasi cæsurâ succum improbo barbarum villo abstergere. Hunc glomerari puluere, incoqui sole. Et ideo in Ladano caprarum pilos esse. Sed hoc non alibi fieri quam in Nabatæis, qui sunt ex Arabia contermini Syria. Recentiores ex auctoribus Strobil hoc vocant: traduntq; sylvas Arabum

Nomina

Forma.

Lib. 1. c. 110.

Li. 7. simpl.

Lib. 12. c. 17.



## L E D U M

Matthioli.



Lib. 26. c. 8.

Lib. 1. Obf.  
cap. 7.

nugine. Toxicon à modo colligendi Ladanum hoc dictum est: quia Toxon Græcis arcum significat. Et aliam quandam legendi Ladani rationem hodie in Creta vſitatam Bellonius declarat his verbis. Inter ea quæ memoratu digna in Creta ſpectantur, numeranda eſt Ladani conficiendi ratio, inter odoramenta noſtra maximè celebris. Id ex Ledo planta non fit, vt veteres exiſtimauerunt, ſed ex arbuſcula quæ Ciſtus nominatur (quasi verò Ledon ſpecies Ciſti non fit) tam copioſa, vt ea Cretæ montes ſint referti. Hæc natura ſua perpetuò virens folia hiberna, florèſque vernos exuit, æſtate noua induit, ſerè lanuginofa, ad ſolis calorem ex vlginoſo quodam rore in ſuperiore parte pingitudinem quandam contrahunt, quòue maior eſt æſtatis ardor, eo maior huiusmodi roris copia foliis inſidet. Qui eum colligunt instrumento ad id comparato vtuntur, quod vernacula lingua Ergaſtiri appellant, Id raſtello non dentato ſimile eſt, loris multis ex corio non deſato aptatis, & ex eo pendentibus. His loris leniter ea foliis affricando, ros ille adhæreſcit, qui deinde cultello deraditur, loris iis ardentiffimo ſoli expoſitis. Maior Ladani copia ad radices Ida montis conficitur in vico qui Cigualinus vocatur, & prope Milipotamum. Hæc Bellonius. Ex ſuprà citatis Plinij locis alia duo licet cognoscere: nimirum Plinij ipſius errorem, & quibus in regionibus Ladanum proueniret. Quod aperto errore Ciſſon pro Ciſto uſurpauerit, iam oſtendimus. Quid verò apertius quam cum Ladanum Cyprium dicit hircorum barbis genibuſque villoſis in hære Hederæ flore deroſo, paſtibus matutinis, rorulenta Cypro. Quin ipſemet indicat Ciſſon, id eſt, Hederam pro Ciſto ſe dixiſſe, cum ſubiungit, eſſe qui herbam in Cypro ex qua Ladanum fiat, Ledam appellarent? Minimè verò ex Ciſſo, id eſt, Hederæ cuiuſvis generis, ſed ex Ciſto Ledo tantum Ladanum legi Dioſcorides, Galenus, cæterique omnes teſtantur. Quare Hermolao non aſſentior, temerè reprehendi Plinium ſcribenti, quod Hederam vocet herbam, ex qua Ladanum fiat, quòd Paulus Ciſſon hanc

In caſt. Pl.  
lib. 12. c. 1.  
& 1. or. 140.  
lib. 1. Dioſc.



hanc etiam vocet Hederam quandoque, & Dioscorides herbam vnde Ladanum conficitur, Cissarion à quibusdam vocari tradat, id est, Hederulam. Nam ex Cissari, siue Cissarij appellatione Ladanum alia ex planta, quàm ex Ledo fieri; nemo rectè colligat: neque id prætermisissent Dioscorides & Galenus. Quod si alicubi apud Paulum Cissos, id est, Hedera pro Cistos legatur, id scribentium errori imputandum, in quem ob nominum. Cissi & Cisti affinitatem facilis est lapsus: neque is, Dioscoridem & Galenum secutus ex alia stirpe quàm ex Cisto Ledo fieri Ladanum intellexit. Idem error in Galeni Codices etiam irrepsit, quo loco versus Rufi Ephesij recitat, de Ladano hæc scribentis.

Lib.1.c.109.

Ἄλλο δὲ πᾶς κατὰ γαστρίαν ἐρέμβων λάδανον εὔροισ

Αἰγῶν ἀμφὶ γένει, τὸ γὰρ καταθύμιον αἰγῶν

Κίος ἀνθρώπος ἐπεδμεναι ἀκραι πέτηλα.

Quæ sic vertit Cornarius:

*Inuenias in Ereborum quoque Ladanon orbe*

*Caprarum circummentum: gratissimus illis*

*Succus is è Cisti folio decerptus amico.*

Tertio igitur versu mendose κίος pro κίσου legitur. Nunc de locis in quibus Ladanum proueniebat, dicamus. Dioscorides in Cypro optimum nasci scripsit, in Arabia Libyâque vilius. Galenus in calidis regionibus gigni, & in Asia. Plinius. apud Nabatæos Arabas hoc fieri, atque mox verum Ladanum Cypro insulæ attribuit. Nobilius in Arabia: fieri etiam in Syria, atque Africa: Rufus apud Erembos populos prouenire. Sunt autem Erempi Æthiopix populi, qui & Troglodytæ, vtrique simili nominis etymo appellati. Siquidem ἐρέμβων ἀπὸ τῆς ὑπὸ τὴν ἔραν ἐμβαλίνην, id est, quod terram subeant; & sub terra habitent dictos volunt: sicut τρογλοδύτας ἀπὸ τῆς τῆς τρώγλας διώεσθαι, id est, quod in cauernis condantur. Possidonius apud Strabonem ἐρέμβων, & ἀραβας

Locus.

Lib.1.c.110.

Lib.7.sim.

Lib.12.c.17.

Lib.16.c.8.

Lib.16.

## LEDI SPECIES

*Bauhini.*



eosdem esse dicit, facta leui nominum commutatione & corruptela, ἐρέμβων nimirum ἀντὶ ἀράβων λεγομένων. Hodie Ladanum in Creta fit, vt diximus. Ledum planta in Gallia Narbonensi nascitur, cuius species à Bauhino reperta hic expressa est, candicantibus foliis longis, acuminatis, cortice rubente, foliis circa florem luteum multis. Ladanum maximè probatur, inquit Dioscor. odoratum, subuiride, facilè mollescens, quod arenas non collegit, nec squallore obsitum est, resinosum. Plinius. Probatur maximè purum odoratum, molle, viride, resinosum, cui cum dissimile sit Ladanum Officinarum, facile intellectu est, id minimè sincerum esse, sed omnino adulteratum, nullarumque virium. Natura ei spissandi, vt docet Dioscorides, calfaciendi, molliendi: ora venarum patefacit: capillum fluentem continet, addito vino, myrrha, & Myrteo oleo: cicatricibus decorem reddit cum vino illitum: medetur aurium doloribus cum hydromelile, aut rosaceo infusum: suffitu secundas elicit:

Electo.

Ibidem.

Lib.16.c.8.

Ibidem.

Vires.



Li. 7. simp.  
Tempera.  
& Vires.

Lib. 26. c. 7.

Lib. 26. c. 8.

Li. 26. c. 14.

peffis immistum vuluæ duritiâ sanat. In medicamenta quæ aurium dolo-  
rem tussimque finiunt, & malagmata vtiliter inseritur: aluum sistit cum  
vino vetere potum, & vrinam ciet. Foliorum vis adstringens, ac eosdem  
quos Cistus effectus præbens. Ladanum Galeno primo excessu quodammo-  
do completo calidum, vt videlicet & secundum attingat, habet etiam ad-  
strictionis paululum. Adhæc substantia est tenui, ac proinde emolliens, pa-  
ritérque moderatè digerens, atque etiam concoquens. Itaque mirandum  
non est, si peculiariter ad vteri vitia conueniat: quandoquidem ad dicta  
paulum quidam adstrictionis obtinet: quocirca defluentes capillos conti-  
net. Nam quicquid ad radices eorum prauis humoris infederit, id omne  
absumit, tum meatus quibus infixi sunt contrahit. Caterum alopecias &  
ophthalmias sanare non potest, vtpote maiores & efficaciores vires, quam  
quæ Ladano insunt, poscentes. Quippe proueniunt istæ ex prauis succis,  
lentis crassisque, quos siccantia ac digerentia medicamenta potissimum  
euocant, atque euacuant. Sed tenuium partium sint oportet, non tamen  
vsque adeo tenuium partium, & desiccatoria, vt nimio plus desiccant, vnaq;  
cum collectis ibi succis præter naturam, naturalem quoque humiditatem in-  
crementa pilis suppeditantem absument. Nam sic non tantum alopecia li-  
berarent, sed & caluitiem afferrent. Natura Ladano molliendi, Plinioteste, sic-  
candi concoquendi, somnum alliniendi. Capillum fluentem cohibet, nigri-  
tiamq; custodit. Auribus cum Hydromelite, aut rosaceo infunditur. Furfures  
cutis, & manatia vlcera sale addito sanat. Tussim veterem cû styrace sumptum.  
Efficacissimum ad ructus. Ladanum Cyprium potu interaneorum vitiis occur-  
rit: cicatrices cum elegantia ad colorem reducit, suffitu corrigit vuluas: dolori  
earum exulceratisque imponitur. Præter hæc Cistos semper virentes rarior  
alia species quædam Ladanifera depicta est, à Pena & descripta, virgis,

### CISTVS LEDON

*aliud latifolium Pena.*



### CISTI LEDI AR-

*bor peregrina Pena.*




*furculis*



furculis, foliis multò crassioribus, latioribus, longioribus, Rhois Plinij, aut Rusci modo fruticans, semine tricocco: multa lasciuit in mōte quopiā cellissimi agri sterilis Seuena, cui nomen S. Columbæ, alioqui gustu Cisti Ledi, & odore nonnihil graui. Idem arboris peregrinæ ramulum pingendum curauit, Cisti Ledi

## CISTVS LEDVM

I. Clusij.



## LEDVM II.

Clusij.




folio, extremis virgultis lignosis, Cisto similibus, & eiusdē coloris, folio rugosō, oblongo, Saluæ, aut Menthæ: in summis ramulis villosos prorsus sphaericos globos ostentantibus, siue lanosa capitula Platani. Hæc Pena. Clusius multò plures Cisti Ledi species descripsit. Primum Ledon, inquit, fruticat ad hominis altitudinem, quam etiam interdum superat, ramis frequentibus, lignosis, duris, nigris. Folia, uti rami, ex aduerso sita, oblonga, transversum digitum quandoque lata, nonnunquam etiam latiora, superne nigra, inferne candicantia, quæ cum tenellis ramulis pingui quodam, odorato, calidoq; & pellucido liquore adeò copioso aspersa sunt, ut procul etiam conspici possit, & octaua miliaris parte odor naribus percipi. Flore est inter reliqua Cisti genera pulchertimo & latissimo, magnæ Rosæ amplitudine, simplici quoque foliorum textura, omnino interdum candido, sed cuius maxima ex parte folia singula, circa vnguem, purpurea nigricantēue macula, rhomboide, nunc maiore & latiore, nunc minore & angustiore insignita sunt: floris umbilicus multis fibris croceis plenus, uti reliquorum Cisti generum: capitula in longis pediculis, foliorum delapsum omnium maxima visuntur rotunda ferè, & plana, non mucronata, sæpenumero decagona, dura, intus flauescencia, quibus dehiscentibus semen decidit copiosum, subrusum, omnium minutissimum. Crescit in multis Hispaniæ & Lusitaniæ locis frequentissima. Alterum genus ubi Sponte nascitur non tam alte fruticat, sed bicubitalibus duntaxat assurgit stolonibus, ramis multis, fragilibus, foliis omnium maximis, virentibus superne, nonnihil inferne candicantibus, Hedera foliorū speciem interdum, & Populi nigra plerumque æmulantibus, satis carnosus & rudibus, hyeme nonnihil rubentibus, gustu subacido, & adstringente: Flos Cisti feminæ, cum forma, tum magnitudine, candidus: capitula pentagona, acuminata, semine exili & nigricante referta. Huius generis alia species reperitur per omnia ferè similis, sed humilior,



neque cubitum excedens, foliis etiam minoribus: alioqui neque facie, neque flore, neque semine, neque sapore dissimilis. Vtraque nascitur in Mariano monte, per quem transeunt qui Vlyssipone Hispalim proficiscuntur. Reperitur etiam in collibus Granatæ vicinis. Tertium semine ex Italia misso Ledi Cy-

**CISTVS LEDON**

*III. populnea fronde.*




**LEDVM IIII.**

*Clusij.*



prij nomine in Belgio natum est, cubitali, interdum maiore amplitudine, fruticosum, ramis nigricantibus, foliis carnosiss, in viridi nigricantibus, mediæ inter primi & secundi generis folia magnitudinis, breuioribus tamen quàm vtriusque, & rhomboide quodammodo figura, quæ cum nouellis ramis lento & viscida humore obsita sunt, non adeò tamen copioso & denso, neque etiam adeo odorato, vt in primo genere: flos albus secundo generi similis, semen etiam exile, nigricans in capitulis rotundis. Cistus Ledo populnea fronde à Lobellio depictu est, & secundo modo descriptum cultu fortasse, duntaxat diuersum. In Belgij horto viret: odore grato Ledi Gallici, folio latiore quàm superioris. Flos non dissimilis, sed fruticat ad hominis, sæpè proceritatem, quam & interdum superat. Hec Lobellius. Quartum genus multis ramis fruticat, cubito longioribus, lentis & flexilibus, hirsutis, albicantibus: folia reliquis Ledi generibus molliora, ad Cisti femine folia accedentia, verum angustiora, hirsuta, nigriora, & pingui lentoque succo conspersa, non modò vernò tempore, sed etiam per totam æstatem: flos candidus, Cisti femine flore non minor, nec absimilis: capitula exigua membranosis, quibusdam & laxis inuolucris tecta semen continent omnium, maximum, nigrum. Nusquam hoc genus quam in Castella veteri inuentum Clusio, vicinis pago S. Martini del Castannal locis, vbi Ardiuieja nuncupatur. Quintum genus eodem quo quartum assurgit modo, verum ramis duris, lignosis, nigricantibus, foliis longis Oleæ angustioribus, nigricantibus, pinguis, & cum nouellis ramulis lento humore conspersis: flos albus, omnium ferè minimus: capitula oblongiuscula, angulosa, in quibus semen ex rufo nigricans, exiguum. Nihil isto Ledi genere vulgatius toto regno Valentino, & Gallia Narbonensi: in plerisque etiam aliis Hispaniæ & Lusitaniæ locis reperitur. Sextum ferè simile est quinto breuius paulo, minoribus angustioribusque foliis, lento etiam humore aspersis: flos maior. quinque





quinque foliis constans, candidus: semen etiam simile. Septimum cubitale est, multis & frequentibus ramis fruticans, colore cinereo, frequentissimis foliis ramos septientibus, Rorismarini coronariae, sed omnino canescentibus, & hispidis, non tamen minus pinguibus & glutina illitis cum suis tenellis ramulis quàm quintum genus: flos in summis ramis copiosus, candidus, superiori similis: semen etiam non dissimile. In Valentiae regno hæc duo postrema gi-

LEDVM VIII. Clusj.



gnuntur. Octauum genus eadem qua superius magnitudine crescit, ramis tamen magis expansis: & foliis tenuioribus, superna parte ex atro virentibus, inferna verò candidantibus, Rorismarini coronariae ferè æmulis, sed gustu adstringentibus tametsi lento quodam humore & pingui sint cum tenellis ramis obducta: flores numerosi secundum ramorum longitudinem, quinque foliis constantes, exigui, lutei: semen in exiguis capitulis ex cinereo nigricans. Reperitur hoc frequens in incultis illis locis citra Tagum, supra Vlyssiponem, cum Cisto foliis Halimi, & aliis nonnullis Baticæ locis. Nonum minus est superiore: folia paullo maiora, neque subtus incana ut in octauo, rariora item, & magis glutinoso succo madida: ramuli quibus flos inhaeret tenues, & ex succi, planèque rectorridi, in quibus capitula. Decimum attollitur pedali duntaxat altitudine: ramulis exilibus, lignosis, & satis fragilibus, nigricantibus, pinguibus, & lentore quodam saluosis: folia





longe minora quàm in nono, non multum à Thymi foliis dissidentia: in oblongis ramulis flores, deinde capitula exigua quasi umbellæ specie prodeunt. Nascuntur hæc duo postrema in extrema Baticæ parte qua Castellam spectat. Non minus perpetuo folio sunt ista Cisti genera quam mas & fœmina.

## MYRTVS, CAP. LVI.

## Nomina

**M**YRTVS & Murtus Latinis, Græcis *μυρσίνη*, & *μυρρίνη* nominatur à Myrsine Atheniensi puella pulchritudine & robore insigni, amica Palladi, quam iuuenis ab ea cursu & palestra superatus interemit, invidia ductus, quod elegantia, cæterisque naturæ dotibus reliquis virginibus præstaret. Arbuscula in demortuæ vicem successit, semper, ut olea, Mineruæ chara. Quidam sic vocatam volunt, auctore Pena, propter æmulam Myrrhæ quandam odoris gratiam, in eius baccis recentibus. Dicitur etiam, inquit Hermolaus, Myrsinos, item Phibaleos ab Antiphane sed & Myrton ab Archilocho. Ab Arabibus, *Aes*, *Alas*, *As*, à Gallis *Myrte*, & *Meurte*, ab Italis *Myrto*, ab Hispanis *Murta*, aut *Raiam*. Myrti genera sunt multa. Est enim Myrtus sylvestris, & Myrtus fatiua: Hæc vero, nigra, & candida. Sylvestris itidem alia nigra, alia candida. Sed hic Lectores monitos esse volumus, cum de sylvestri Myrto loquimur, non de Rusco, qui sylvestris & acuta Myrtus Dioscoridi & Plinio dicitur, nos intelligere, sed de vera Myrto sylvestri, quæ fatiua opponitur. Hæc duo Myrti genera quamvis Dioscor. non expresserit, tamen cum dicit, Myrtus fatiua nigra utilior est, &c. atque rursus, Myrto nigra sylvestri, aut fatiua, &c. sylvestrem etiam eiusdem generis esse indicat. Sylvestri quidem Myrto Tyrreni maris litora virescunt. In toto Ligustico, Neapolitano, & Romano tractu Myrti sponte proueniunt. Nascuntur etiam copiose in Gallia Narbonensi, maxime qui in parte eius maritima, quam Provinciam vocant. Seruntur etiam in hortis à plurimis in Italia. Myrtus frutex

Corol. 177.  
li. 1. Diosc.

## Genera.

Li. 1. ca. 128.


Lib. 1. ca. 37.

## Forma

Pœtarum



## MYRTVS.



Pœtarū carminibus celebris, sed viribus quas in medendo præstat multo clarior. Quæ satiua est, in aliquam proceritatem, si studiōse colatur, adolescit, atque etiam arborefcit, ramis flexilibus, rubro cortice: foliis longiusculis, perpetuò virentibus, Punicæ æmulis, aut lentisco vel buxo similibus, acuminatioribus tantum, gustu aromatis aliquid præseferentibus, & odoratis, quæ in nigra Myrto nigriora, in candida candidiora spectantur. Flores omnibus sunt candidi, & odorati. Baccas fert vtraque Myrtus satiua oblongas, agrestes Oleas quadantenus referētes, multo sanè syluestribus maiores, & si aliter sentiat Marcel. hac in re experientiæ repugnans, quæ docet Myrta satiuarum, aliarum stirpium more, cultu mansuescere, atque grandiores vegetiores que baccas à Myrtis satiuis edi. Syluestris Myrtus forma haud multum superiori dissimilis minor est frutex, foliis Buxo similibus, minoribus, angustioribus, nec tam saturata viriditatis: floribus candidis. Baccas candidas, vel

Matth. li. i.  
Diof. c. 128.

in purpura albicantes candida, nigra nigras parit. Vnde & Ouid.

*Myrtea sylua subest bicoloribus, obsita baccis.*

Hæ μύρτα Græcis dicuntur, Latinis Myrta & Murta, Officinis Myrtilli. Sunt veteribus plura Myrti genera, de quibus fusè Plinius, sed hæc imprimis scripsit. Fuit (Myrtus) vbi nunc Roma est, inquit, iam tum cum conderetur. Quippe ita

Li. 15. c. 29.

MYRTVS  
Tarentina.

traditur Myrtea verbenæ Romanos Sabinosque, cum propter raptas virgines dimicare voluissent, depositis armis purgatos in eoloco qui nunc signa Veneris Cluacinae habet. Cluere enim antiqui purgare dicebant. In ea quoque arbore suffimenti genus habetur, ideo tū electa, quoniam coniunctioni, & huic arbori Venus præest. Cato tria genera Myrti prodidit, nigram, candidam, coniugulam (in nostris Catonis exemplaribus Myrtum, nigrum, candidum, coniugulum legimus masculino genere) fortasse à coniugiis ex illo Cluacinae genere. (Alij coniugulam dictam volunt, quod opere topiario cum pergulis & parietibus hortorum elegantissimo spectaculo aptissimè coniūgatur.) Nunc & alia distinctio, satiua & syluestris. Satiuarum genera. Topiarij faciunt. Tarentinum folio minuto, nostratem patulo, exoticam densissimo, senis foliorum versibus. Hæc non est in vsu: ramosa vtraque alia. Coniugulam existimo nūc nostratem dici. Hæc Plinius: Huius Myrtum Tarentinam & Exoticam sibi notas Matthio.

Capitu. 133.

Li. i. Diof.  
cap. 128.

his



## MYRTVS MINIMA

Angustifolia.

## MYRTVS

Exotica.

Forma  
tarentina.

his picturis representavit, ac descripsit. Tarentina Myrtus, inquit, à Tarento Apuliæ ciuitate dicta, folio est nostrate longè minutiore robustiorque: fructu minore, copiosiore, in summitate pluribus apicibus coronato, colore ex nigro purpurascens, minutis, crebris, albicantibusque intus ossiculis. floribus vulgari Myrto similibus.

## MYRTVS BÆTICA

Latifolia domestica II. Clusij.

Exotica.

Libr. stirp.  
Hisp. ca. 33.

Myrtus minor, Gallis *Myrte petit*, Italis *Myrto mortella* dicitur. Eius differentias aliquot facit Lobellius: harum vna est Myrtus minima, foliolis angustis Thymi Cretensis, longioribus. Exotica Myrtus Plinij pluribus foliorum versibus, nunc in Italiæ hortis & viridariis colitur, folio nostrati non absimili, dilutione tamen, acuminatio- re, copiosiorque, & adeo denso, vt eo rami vndique stipentur, fructum fert oblongum vulgari Myrto haud absimilem. Vtraque topiariis operibus peridonea est, virisque easdem quas nostras habet. Clusius cum in Hispaniis, tum aliis locis multo plura Myrti genera obseruauit. Vnum ramis satis crassis, foliis duplici serie rarius dispositis, magnis, vt interdum ad Lauri tenuifoliae aut Arbuti foliorum amplitudinem fere accedant, colore dilutius paulo virente, odoratis. Rarius hoc floret aut fructum fert, quoniam eo sepius texendis, quas tondere solent, plerumque vtantur. Nusquam id genus visum Clusio, nisi in cœnobio quodam Hispali, & in latissimis

Maurita



## MYRTVS BAETICA

sylvestris Clusij.



Mauritanorum Grauatæ viridariis, omnibus sepibus ex illo Myrti genere confectis, & ex alio quodam huic non multum dissimili, minoribus tamen foliis, & paulo densioribus, hic depicto, & quod Myrtum Baticam, Latifoliam, domesticam, secundam vocauit. Idem aliam quoque pinxit Myrtum Baticam siluestrem non adeo dense fruticantem, neque admodum sese attollentem ramis tenuibus, & fragilibus: foliis mucronatis, duplici serie rarius circa ramos nascētibz, nigricantibus, odoratis, flore aliis simili, candido: fructu rotundo, oblongis pediculis ex foliorum alis prodeunte, inhærente tenacius, copiosa, primum viridi, deinde candicante, per maturitatem verò nigro, vinoso, grati admodum cū adstrictione quadam saporis. Sponte prouenit in plerisque agris & collibus Baticæ, ad Anam flumen sitæ, & Lusitanix, adeo copiose, vt per aliquot miliaria nulli ferè alij frutices conspiciantur. Octobri interdum florent, sed maxima ex parte fructu tum onusta est.

Myrtus celerrimè à frigore vritur, auctore Theophrasto. quamobrem nulla in Olympo, nulla in Ponto gignitur, etiam si summo studio, adhibitæque omni solertia etiam religionis causa conseruerint. Circa Bosphorum Cimmerium, inquit Plinius in Panticapæo vrbe omni modo laborauit Mithridates Rex, & cæteri incolæ sacrorum certè causa Laurum, Myrtumque habere, quod non contigit. Montes igitur, & frigidos tractus odit. Tamen partim in mediterraneis, scilicet hortis, viridariis, vinetis diligenti cultu maximè prouenit, partim in amænis stagnorum & lacuum ripis, sine vllo cultu edita mirè proficit, sed maximè in litoribus marinis. Quamobrem Veneri sacra est, quæ & è mari orta dicitur: hinc & arbor sacra coniugio. Circæ promontorium excelsum refert Theophrastus Myrtis abundare, quod Circen incoluisse tradunt indigenæ, & tumulum Elpenoris monstrant, ex quo Myrti enascuntur humiles, ac veluti coronariæ, cum cæteræ magnæ sint. In hoc tumulo ex omnibus Europæ locis primum visam fuisse Myrtum tradit Plinius. Græcūque ei nomen remansisse, quo peregrinam esse apparet. Myrtus etiam umbras amat, vt scribit Theophrastus. Præter baccas Myrtus Myrtidanum producit tanquam appendicem quandam Dioscoridi, seu adnatum tuber inæquabile, verrucosum, intumescens, & concolor, quod perinde quasi manus Myrti caudicem amplectitur. Id, inquit Matthiolus, notissimum est, vbi Myrtus frequens nascitur. Galenus Myrtada appellat, Paulus Myrtida. Sed in Glossis Hippocraticis idem Galenus Myrtidanum à plerisque piper appellari scribit, & citato hoc Dioscoridis loco, in quo appendicem circa Myrti truncum esse ait, subiungit. Hippocrates tamen fructum ex planta sic nominat, quem ipse à Persis Piper appellatum esse dicit. Est autem id aliquot locis apud Hippocratem, ex quibus hi duo sunt insigniores. Προσθεν η̄ κδικας εκλεφαντα, ὅσον τριάντα, ἡδινε φαρμάκον τοῦ τῶν ὀφθαλμῶν, ὁ καλέσται πέπερι, η̄ τὸ τροχίλον, ἐκ τῶν τρία. Τὰ ἡλκτα τριλειν, καὶ ὀίνω παλαιῷ χληρὸν διέτις, βαλάνιον περὶ πλερὸν ὀρυθὸς τιθέναι, καὶ ὡς προσάγειν: quæ sic reddi possunt, Subdititium. Aut graua Cnidia triginta detracto cortice, &

## Locus.

Li. 4. Hist.  
ca. 6. & li.  
5. ca. 18.  
Lib. 16. c. 32.

Lib. 5. Hist.  
cap. 9.

Li. 15. ca. 29.

Lib. 3. caus.  
cap. 8.  
Myrtidanum.  
Li. 1. ca. 128.

Ibidem.  
Lib. 7. sim.  
Lib. 7.

Lib. 1. mor.  
mul.

Indici



Li. 2. mor.  
mul.

Indici pharmaci oculorum, quod vocatur piper, & rotundi, vtriufque grana tria. Hæc autem terito, & vino veteris diluta, instar glandis circa gallinæ pennam formato, & sic adhibeto: acursum: *προσθεὶν ἐκλέψας κόκκους τριάκοντα, τὸ ἰνδικόν, ὃ καλεῖται διπέρσαι πέπερι, καὶ ἐν τῷ τέτῳ ἐν τῷ ῥόγγυλον, ὃ καλεῖται μυρτίδανον ξὺν γάλακτι γυναικείῳ ὅμῳ τρίβειν, καὶ μέλιτι διέναι: ἔπειτα ἔριον μαλθακὸν καὶ καθαρόν ἀναφυρήσας περὶ πλερὸν περιελίξας προσδεῖναι.* Hoc est, Grana Cnidia decorticata triginta, Indicum quod piper Persæ vocant, & in hoc inest rotundum, quod appellant Myrtidanum, cum lacte muliebri simul terito, & melle diluito: Deinde lana molli ac pura excepta. & pennæ aduoluta subdito. Græca hæc quidam sic legunt: *ἰνδικὸν φαρμάκει δ' καλεῖται τῶν ὀφθαλμῶν*, Indici medicamenti quod oculare vocatur, nempe Lycij, καὶ τῶ πέπερος τῶ ῥόγγυλος: posteriore verò: *τριάκοντα, καὶ ὃ καλεῖται διπέρσαι τὸ ἰνδικόν: πέπερι, καὶ τοῦτο μὲν ῥόγγυλον, καὶ ὃ καλεῖται μυρτίδανον: &c.* At Plinius Myrtidanū vinum esse scribit, ex silvestris Myrti baccis factum. Attramen alio libro, Myrtidanum, inquit, diximus quomodo fieret: Et mox subiicit eius vsum, eadem tradens de Myrtidano vino, quæ Dioscorides scripsit de suo Myrtidano trunci Myrti appendice. Vulvæ, inquit, prodest appositu, potu, & illitu. Multo efficacius & cortice, & folio, & semine. Gale-  
no Myrtus ex contrariis substantiis constat: vincit tamen in ea frigidum terrenum. Habet verò etiam tenue quiddam calidum. Itaque valenter desiccatur. Porro ramis & trunco adnascens tuber, quod quidam Myrtada nuncupant, quanto dictis siccus est, tanto & desiccatur, & adstringit vehementius. Quidam id tundentes reponunt, postea vino subigentes in pastillos formant, folia item arida viridibus plus desiccant: miscetur enim virentibus humiditas quædam. Porro succus non tantum ex virentibus foliis exprimitur, sed & fructu. Adstringendi vim hæc omnia habent, tum foris imposita, tum intro sumpta, quod scilicet nullam deleteriam, aut purgatoriam substantiam habeant admixtam. De iisdem hæc. Vis & Myrti & fructus adstringit Dioscoridi, fructus viridis aut aridus in cibo datur sanguinem excreantibus, & vesicæ erosionibus. Succus ex virentibus baccis expressus eisdem effectus exhibet: stomacho utilis: urinam ciet: prodest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero. Seminis decoctum capillum tingit. Ius decocti in vino vlcera in extremis membris nata sanat: oculorum inflammationes illitum cum polentæ polline lenit: contra ægilopas illinitur: crapulam arcet præsumptum vinum, quod feruefacto aliquantum eius fructu exprimitur, alias enim acorem contraheret. Præstat eundem semen effectum: vtile procidentia vulvarum in defectionibus, sedis yitiis, & fæminis fluxione vulvæ laborantibus: purgat furfures, vlcera capitis manantia, atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur quoque in medicamenta quas Liparas vocant, vti oleum, quod ex foliis eius fit. Decoctum foliorum ad defectiones balnearum conuenit, & contra laxatos artus, & male solidescences. Eo fracta ferruminationi repugnantia vtilissimè fouentur: vitilignes emendat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat. Succus eorum eadem efficit. Trita folia, & ex aqua illita humidis vlceribus, & partibus omnibus fluxione laborantibus, celiacisque profunt: & admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo, cum vino, ad vlcera serpentia, ignem sacrum, testium inflammationes, epinyctidas, & condylomata. Arenium foliorum farina vtiliter inspargitur paronychijs, pterygijs, & contra alarum fæminumque madores: cardiacorum sudores cohibet. Folia cruda seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs, pterygijsque medentur. Exprimitur folijs succus affuso vetere vino, aut aqua cælesti, cuius recentis vsus est: nam exiccatus planè cariem sentit, & vires amittit. Myrtidanum magis quàm

Myrtus

Lib. 14. c. 16.  
Li. 23. ca. 8.  
Cor. Emb.  
125. lib. 1.

Li. 1. ca. 128.

Lib. 7. sim.  
tempera.  
Vires.

Lib. 1. ca. 128.



Myrtus adstringit. Tufum addito auctero vino reponitur, coactumque in paffillos ficcat in vmbra: multò efficacius & folio, & femine, cerato, pelfis, infefionibus, cataplafmatis admixtum, vbi adstringendum aliquid eft. Eadem etiam de Myrto, & quædam alia Plinius tradidit, fed multum confufa, quædam etiam repetita. Semen Myrti, inquit, medetur fanguinem excreantibus. Item contra fungos in vino potum. Odorem oris commendat, vel pridie commanducatum. Item apud Menandrum Synariftufa hoc edunt. Datur & dysentericis denarij pondere in vino. Vlcerà difficilia in extremitatibus corporis sanat cum vino fubferuefactum. Imponitur lippitudini cum polenta, & cardiacis in mamma finiftra, & contra fcorpionis ietus in mero, & ad veficæ vitia, capitis dolores, & Ægylopos, antequam fuppurent. Item tumoribus, exemptis que nucleis in vino vetere tritum eruptionibus pituitæ. Succus feminis aluum fiftit, vrinam ciet. Ad eruptiones pufularum, pituitæque cum cerato illinitur, & contra phalangia. Capillum denigrat. Lenius fucco oleum eft ex eadem Myrto. Lenius & vinum quod nūquam inebriat. Inueteratum fiftit aluum & ftomachum, tormina sanat, ftidium abigit. Foliorum arentium farina fudores cohibet infperfa, vel in febris: vtilis & cœliacis, & procidentia vuluarum, fedis vitiis, vlceribus manantibus, igni facro fori, capillis fluentibus, furfuribus: item aliis eruptionibus, ambuftis. Additur quoque in medicamenta, quæ Liparas vocant, eadem de caufa, qua oleum ex his, efficaciffimum ad ea quæ in humore funt, tanquam in ore, & vulua. Folia ipfa fungis aduerfantur trita ex vino, cum cera verò articularibus morbis, & collectionibus. Eadem in vino decocta dysentericis, & hydropicis potui dantur. Siccantur in farinam, quæ infpargitur vlceribus, aut hæmorrhagiæ. Purgant & lentigines, pterygia, & paronychias, & epinyctidas, condylomata, testes, tetra vlcerà: item ambufta cum cerato. Ad aures purulentas & foliis crematis vtuntur, & fucco, & decocto. Comburuntur & in antidota: item cauliculi florentes decerpti, in nouo fictili operto cremantur in furno, dein teruntur ex vino. Et ambuftis foliorum cinis medetur ex vino. Inguen ne intumefcat ex vlcere, fatis eft furculum tantum Myrti habere fecum, non ferro, nec terra contactum. Exprimitur & fuccus è foliis molliffimis in pila tufis, affuso paulatim vino auctero, aliàs aqua cœlefti: atque ita expreffo vtuntur ad oris fedis que vlcerà, vuluæ, & ventris, capillorum nigritiam, alarum perfufiones, purgationes lentiginum, & vbi constringendum aliquid eft. Sic enim legendum pro malorum perfufiones, vt vulgati codices habent. Eft enim id quod Diofcorides dixit: *καπνιστὸν καὶ καθύστερον μαγάλαις, καὶ μυρρίσιν*. Eft etiam ibidem legendum, Additur quoque in medicamenta, quæ Liparas vocant. Intelliguntur enim medicamenta, fiue *ἐμπλάστρα λιπαρὰ*, quæ Celfus Lenia emplastra appellare maluit quàm pingua, Plinius Græcam appellationem hic retinuit, & alio in loco: Additur in medicamenta quæ vocant Liparas. Dicuntur autem *λιπαρὰ ἐμπλάστρα*, ob adipis fuilli, aliarumque pinguitudinum, & oleorum admixtionem, & contra, quæ hæc non habent, aut omnino parum *ἀλιπανία* dicantur. Celfus de emplastris quæ protinus vulneribus injiciuntur. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideòque *ἀλιπανία* nominantur, quam alipenæ corruptè eo in loco legitur. Succorum natura præcipuam admirationem in Myrto habet, inquit rurfum Plinius, quando ex vna omnium, olei vinique bina genera funt. item Myrtidanum, vt diximus. Et alius vſus bacca apud antiquos fuit, antequam Piper reperiretur, illius obtinens vicem, quondam etiam generofi obſonij nomine inde tracto, quod etiam nunc Myrtatum vocant. Eademque origine aprorum ſapor commendatur, plerumque ad

Lib. 23. c. 9.

Corn. Em.  
bl. 12. libr.  
1. Diofcor.Corn. libr.  
1. m. p.

Lib. 5. ca. 19.

Lib. 33. c. 5.

Ibidem.

Li. 15. c. 29.



Myrteum  
condim.

Lib. 1. Diosc.  
cap. 128.

Plin. li. 14.  
cap. 16.

Diosc. li. 5.  
Myrtites  
vinum.

Oleū myr.  
Siliu. in lib.

3. Antid.  
Mefu.

Ibidem.

Theophr.  
lib. 6. Hist.

cap. 7. & li.  
2. cauli. ca.

18. Plin. lib.  
11. cap. 29.

Lib. 14. cap. 29.

intinctus additis Myrtis. Veterum exemplo Hetruscæ mulieres, inquit Matthiolus, ex Myrtibaccis bene maturis ciborum intinctus parant, qui cum assatis carnibus esitati maximam cum palato ineunt gratiam. Myrteum hoc condimentum languidos ventriculos roborat. Quare & cœliacis, & dysentericis vrile est, & sceminarum fluxiones quascunque cohibet. Fiebat & olim tum Myrtites vinum, tum oleum Myrteum. Illud obsoleuit, hoc hodie quoque in vsu est. Quod per expressionem baccarum Myrti conficitur, adstringit, & siccatur: quod ex oleo & Myrtis, aut Myrti succo compositum est, alstringit solum à Myrtis, digerit ab oleo. Myrti folia, Matthiolo, baccarumque semen tritum, contra fungorum strangulationes mirificè valent: foliorum autem baccarumve decoctum calidis collectionibus succurrunt, scilicet erysi pelatibus & herpetibus. baccæ quoquomodo haustæ aut deuoratae corroborant, & eius tremori valde conferunt: folia sicca vruntur in fictili crudo, quousque in cinerem albissimum redigantur, deinde lauantur, ac pro spodio, & pompholyge supponuntur. Ex Myrti floribus destillata aqua odoris suauitate præstat, myropolis multum expetita. Ea tamen longe sit odoratior, si ex Myrti Ægyptiæ floribus eliciatur: quia Myrtus odoratissima est in Ægypto, vt ex Theophrasto scripsit Plinius. Myrto in Hetruria pelles perficiuntur, densantur, crispantur, atque crassescunt. Bellicis quoque se rebus Myrtus inseruit, vt prodidit Plinius, triumphansque de Sabinis Posthumius Tubertus in consulatu (qui primus omnium ouans ingressus urbem est, quoniam rem leniter sine cruore gesserat) Myrto Veneris victricis coronatus incessit, optabilemque arborem etiam hostibus fecit. Hæc ouantium postea fuit corona, excepto M. Crasso, qui de fugitiuis & Spartaco Laurea coronatus incessit. Massurius auctor est curru quoque triumphantes Myrtea corona vsos L. Piso tradit Papyrium Massonem, qui primus in monte Albano triumphauit de Coris, Myrto coronatum ludos Circenses spectare solitum. Ma. Valerius duabus coronis utebatur Laurea, & Myrtea.

## RUSCVS,

## CAP. LVII.

Nomina

Lib. 3. Hist.  
cap. 17.

Forma.

E. lo. 7. &  
Geor. 2.

Li. 4. c. 141.



VI Latinis Ruscus & Ruscum, officinis addita litera, licet corruptè, Bruscum vocatur, Græcis *μυρσίνη ἀγρία*, idest Myrtus syluestris, & *ὄξυμυρσίνη*, idest acuta Myrtus, & *μυρτάχρηθα*. Alij, inquit Plinius. Chamamyrsinen vocant, alij Acaron à similitudine: est enim breuis, & fruticosa. A Theophrasto *κελπομυρσίνη* nominatur, ab Arabibus qui Cubebas cum Rusco confundunt, Cubebæ, ab Italis *Rusco*, & *Pongitopi*, quod arcendis muribus à falsa carne appensa circum ligetur, à Germanis *Brusoch*, ab Hispanis *Inbarba*, à Gallis quibusdā *Bouys piquant*, ab Anglis *Kuehull*, & *Kuehulme*. Humilis est frutex, lignosus, radice alba, ramosus, stipitibus rotundis, cortice fusco, teetis, & spisso: foliis densis, nigricantibus, spissis, Myrto, aut Buxo haud multū dissimilibus, sed duris, mucrone aculeatis, rigentibusque. Quare horridum Ruscū Virgilius dixit, & aspera Rusci vimina. Fructus in foliis ipsis crescit, ruber, duro intus semine. Dioscorides, Ruscus Dioscoridi folium fert Myrti, latius, in formam lanceæ mucronatum. Baccæ per maturitatem rubescunt, rotundæ, à medio folio pendentes, osseo intus nucleo cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo lentī, fractu contumaces, foliosi: radix gramine similis, acerba, & subamara: in qua Ruellij versione baccæ à medio folio pendentes haud rectè dicuntur, cum Græcè legamus, *καρπὸν δ' ἐν μέσῳ τοῦ πτελέως*, idest, Baccas habet in medio folio rotundas: non enim ex foliis illæ quidem



## R V S C V S.



quidem pendunt, sed ipsi harent, id ipsa experientia docente & approbante, his verbis Theophrasto. Τῆς δ' αὖτις ἀλεξανδρείας τοῦτο τὸ ἴδιον, ὅτι ἐπιφυλλὰς καρπὸν ἔχει, ὥσπερ καὶ ἡ κεντρομυρρίνη : ἀμφότεραι δὲ τὸν καρπὸν ἔχουσι ἐπὶ τῆς βάχεως τοῦ φυλλοῦ. Lauri Alexandrinæ hoc proprium est, quod in folio fructum habeat, veluti & Ruscus. Vtrique enim fructus ex foliis ipsius dorso enascitur. Hic Rusci fructus plurimum differt à Cubebis aromaticis granis. Serapio verò duos hos fructus eosdem esse credidit : errore iamdudum deprehensio, & scriptis mandato à doctissimo viro Leonicensi. Prouenit Ruscus in asperis & præcipitibus locis. Ab herbarijs in hortis seritur: folia nunquam amittit. Germinat vere Asparagi modo, turionibus tamen breuioribus, crassioribus, hirsutis qui elixi eduntur ex oleo, sale, & aceto. Sed quum non obscure eorum amaror gustatu percipiatur, in medicamentis potius, quàm in cibis sunt habendi: ad ciendam enim vrinam, aperiendâsque obstructions plurimum valent. Plinius quo-

Lib. 3. Hist. cap. 17.

Locus.

Tempus.

Lib. 21. c. 15.

que inter herbas sponte nascentes, & in cibos expetitas, quæ in Italia paucissimæ sunt Ruscum recenset. Fructus Augusto mense maturus est. Radix & folia secundo gradu calfaciunt, siccant primo. Galenus, Paulus, Aëtius ruscum in simplicium censu silentio præterierunt. Eius igitur virtutes ex Dioscoride hæc sunt. Folia & bacca in vino potæ vrinam cient, menses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio vrinæ medentur, dolores capitis sanant, & regium morbum. Decoctum radices in vino potum eosdem præbet effectus. Cauliculi recentes asparagorum vice in cibo sumuntur: amari tamen sunt, sed vrinam mouent. His admodum consentanea sunt quæ scribit Plinius. Myrtus sylvestris, inquit, siue Oxymyr sine, siue Chamæmyrsine baccis rubentibus & breuitate à satiua distat. Radix eius in honore est, decocta vino ad renum dolores pota, & difficili vrinæ, præcipueque crassæ, & graue olenti: morbo regio, & vuluarum purgationi trita cum vino; Cauliculi quoque incipientes asparagorum modo in cibo sumpti, & in cinere cocti: semen cum vino potum, aut oleo, aut aceto calculos frangit. Idem in aceto & rosaceo tritum capitis dolores sedat, & potum morbum regium. Castor Oxymyr sinem hanc Myrti foliis acutis, ex qua fiunt ruri scopæ, Ruscum vocauit, & ad eosdem commendauit. Idem vsus alio in loco. Rusci radix inquit, decocta bibitur alternis diebus in calculorum valetudine, & tortuosiore vrina, vel cruenta. Radicem pridie erui oportet, postero mane decoqui: ex ea sextarium, vini cyathis duobus misceri. Sunt qui crudam radicem tritam ex aqua bibant: & in totum ad virilia, vel, vt quidam legunt, vrinam difficilem, cauliculis eius in vino & aceto tritis nihil vtilius putant, aut, quomodo in vetere codice legitur, cauliculis eius aceto tritis, &c. In quibus Plinij verbis vrinam tortuosam intelligimus, exitu flexuoso prodeuntem, ac procursu veluti diuiso, ob crassum humorem impactum vri-

Dodo. li. 6. cap. 13.

Temper.

& vires

Lib. 4. c. 14

Li. 23. ca. 81.

Li. 21. ca. 27.



Leoni. en. nario meatui, aut extumefcentem carunculam, quam Græci vocant Hyper-  
 Li. 15. ca. 7. farcosin, in vrinæ via, lotij meatum impediens. Porro hic animaduer-  
 tendum Plinium proculdubio Ruscum cum Myrto sylvestri confudisse, de  
 qua suprà tractauimus, maximè cum de oleis factitiis loquitur. Simile est  
 (oleum) è Myrto nigra: & hæc latifolia melior. Tunduntur bacca aspersæ  
 calida aqua, mox decoquuntur. Alij foliorum mollissima decoquunt in oleo,  
 & exprimunt. Alij deiecta ea in oleum, prius sôle macerant. Eadem ratio &  
 in satiuâ Myrto, sed præfertur sylvestris, minore semine, quam quidam  
 Oxymyrsinen vocant, alij Chamæmyrsinen, &c. Sylvestrem Myrtum pro  
 Rusco à Plinio hîc vsurpari ex iis quæ ex ipso iam citauimus perspicuum  
 est. At ex Rusco Myrteum oleum non fieri, sed ex Myrto sylvestri satiuæ op-  
 posita, de qua præcedenti capite egimus, Dioscorides à quo modo recita-  
 ta Plinius mutuatus est, aperte demonstrat his verbis. Myrtei faciendi ratio  
 Lib. 1. c. 37. hæc est è Myrto nigra sylvestri, aut satiuâ, foliorum mollissima quæque tusa  
 premuntur: succo pares olei omphacini portiones adiiciuntur, subiectisque  
 carbonibus inferuescunt, donec concoquantur: innatans oleum deraditur.  
 Sed longè facilius hæc compositio. Tenera folia contusa coquuntur in oleo &  
 aqua, & quod innatat eximitur. Priuatim alij deiecta in oleum folia in sole  
 macerant. Præterea cum Myrtei olei vires ex Dioscoride persequitur, nempe,  
 Li. 23. ca. 4. quod adstringit, indurat, medetur gingiuis, dentium dolori, dysenteria,  
 vuluæ exulceratæ, vesicæ, vlceribus vetustis, vel manantibus, cum squa-  
 ma æris, & cera: item eruptionibus, ambustionibus: attrita sanat, rhaga-  
 das, condylomata, articulos luxatos, odorem grauem, Denique quod ad  
 omnia valet, adstrictionem spissationemque desiderantia, vt ait Diosco-  
 rides, subiicitque Chamæmyrsinæ, siue Oxymyrsinæ eandem esse naturam,  
 perspicuum est Oxymyrsinen, id est Ruscum, vt ipse interpretatur, cum  
 vera Myrto sylvestri confundere. Est autem Ruscus ad ea præstanda plane  
 inepta, ad quæ Myrteum oleum Plinius ipse, atque Dioscorides commen-  
 darunt, vt ex ipsius Rusci viribus suprà ex vtroque auctore narratis liquet.  
 Georg. 2. Ruscilientis ramulis ad colligendas vites utebantur antiqui. Virgil.

*Nec non etiam aspera Rusci,  
 Vimina per syluam, & ripis fluuiialis arundo  
 Cadatur.*

## NERIVM SIVE RHODODENDRVM,

## CAP. LVIII.

Nomina

In Theri.

Lib. 24. c. 11.

Forma

Lacu.

**N**ERIVM, & ροδόδενδρον vocant hanc plantam, alij ροδodάφνην,  
 à flore Rosæ simili, & foliis laurinis: Nicander Nerin. Nos quia  
 ne nomen quidem Latinum inuenit, vt ait Plinius, Nerium  
 etiam vocamus, & Rhododendrum, & Rhododaphnem, Apu-  
 leius Rosam Lauream, Galli Rosage, & Rosagine, Itali Rosalauro, & Oleandro,  
 Hispani Adelfa: Germani Olander. Frutex est vulgaris notitiæ, inquit Diosco-  
 rides, longioribus quàm Amygdala foliis, crassioribusque: flore in Rosam  
 conformato: fructu Amygdalæ simili, corniculato, qui patefactus quan-  
 dam lanosam naturam ostendit, spinarum nimirum Carduorum pappos  
 representantem: radice longa, acuta, lignosa, gustanti falsa. Hæc Diosco-  
 rides interprete Ruellio: qui vbi vertit, longioribus quàm Amygdala foliis,  
 legitur in vetere codice, ἀμυγδαλῇ φύλλῳ ἔχον ὅμοια, μακρὸ τέρας τε, καὶ παχύτε-  
 ρα, καὶ



## NERIVM SIVE

Rhododendron.



ρα, καὶ πλεονέστερα, καὶ τραχύτερα: Hoc est, Habens folia similia Amygdalæ, longiora tamen, crassiora, latiora, & asperiora. Rectè verò fructum intus lana quadam refertum dixit, spinarum, seu carduorum pappis simili, quæ in quibusdam Dioscoridis exemplaribus falso ὑακινθίνους πάππους similis esse legitur, cum hyacinthus nullos prorsus pappos habeat. Quare legendum ῥοδανθίνους πάππους, idest spinarum, seu carduorum pappis, ut meliores codices, & ipsa experientia testantur. Similitudo fructus Nerij cum Amygdala intelligenda prorsus est, vel adhuc exigua siliqua, & adolescente, vel ob corticis viriditatem, & crassitiem, alioquin haud rectè adulta siliqua, angusta, oblonga, nullo subiecto duro & lignoso nucleo, lanuginosis tantum villis farsa cum Amygdala compareretur. Et quamvis herba dicatur Sabina, Rhododendron, inquit Plinius ut nomine apparet à Græcis venit. Alij Neriō vocarūt, alij Rhododaphnē, sempiterno frōdis honore, Rosæ similitudine, caulibus fruticosum: qui locus falsi suspectus est. Sunt qui legant Sabinē, hoc est lingua Sabinorum, quibus non accedit Hermolaus,

Li. 16. c. 20.

In cast. Pl.

huncque eius loci sensum esse ait, Rhododendron Sabinam herbam dici, cum tamen in Sabinis primū orta non videatur, ex ipso nomine quod Græcum est: Sciendum enim aliud fruticis genus Sabinam vocari, Græcè brathy. Nerion nascitur in amēnijs, maritinis & secus amnes, inquit Dioscorides. In hortis etiam colitur ab herbariis. Copiosissimum provenit in tractu maritimo alpino & montoso Liguriæ, inter Nicæam, & Genuam, cum Siliquis. Vidit hoc primum Matthiolus ad Benaci ripas, & in Argentario promontorio in maritimis Senensibus. Planta est Laurifaciē, non iniucunda spectatu, præsertim suis floribus ornata, quorum similitudine deceptus quondam L. Apuleius in asinum mutatus, dum Rosas quæreret, quarum pastu in pristinam formam restitueretur, parum ab fuit, quin imprudens eos deuoraret. Verū qui in plantarum historia, & viribus cognoscendis diligentissimus fuerat, recordatus Nerij flores asinis venenum esse præsentaneum, statim labra substraxit, demissis quæ auribus abiit. Idem Lucianus sibi in asinum quoque transformationem narrat accidisse. Sed Nerium ῥοδανθινὸν ἀργεῖον, idest Laurum siluestrem vocat, perniciosum asino & equo cibum, cum asserant id comedentes euestigio mori. Dioscorides etiam tradit flores & folia mulis, asinis, canibus, & quadrupedum plurimis venena esse, hominibus verò contra serpentium morsus conferre, è vino pota, eoque magis ruta addita. Imbecillas etiam animantes, ut pecus & capras, si aquam bibant in qua folia ea maduerint, mori. Eadem planè tradit Plinius. Nerium iumentis, caprisque & ouibus venenum est. Idem homini contra serpentium venena remedio: quæ iterum alio loco repetit. Mirum folia Nerij quadrupedum venenum esse, homini verò contra serpentes præsidium, Ruta addita, è vino pota. Pecus etiam & capræ, si aqua biberint,

Locus.

Ibidem.

In libr. 4.

Diosc. c. 77.

In Lucio.

Ibidem.

Vires.

Li. 16. c. 20.

Lib. 24. c. 11.

Lib. 8. sim.




Ibidem. in qua folia ea maduerint, mori dicuntur. His maximè refragatur Galenus, ita scribens. Nerium aut Rhododaphne notus omnibus frutex, foris quidem illitus digerendi vim obtinet: intro verò in corpus assumptus, perniciosus ac venenosus, non solum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus est. At dicendum, inquit Matthiolus, Nerium sumptum hominibus à serpentibus non demorsis perniciosum esse, Dioscoridis verò sententia idem iis remedio esse quos serpentes momorderint, qua ratione Cantharides auctore Auicenna, à cane rabido demorsis medentur, & Euphorbium à scorpione ictis, alia denique letalia medicamenta aliis venenis aduersantur. Cordus alio modo conciliari posse hos auctores scripsit. Si intra corpus sumatur Nerium venenum esse, si foris imponatur, contra venenatorum morsum auxiliari. Sed reuera Nerium intro sumptum contra serpentium morsus opitulari Dioscorides intellexit: fideliora enim exemplaria habent

Li. 4. Dios.  
cap. 81.

### NERION

albis floribus.



Li. 11. c. 100.  
Lib. 7. ca. 11.

Ibidem.

In Exhort.  
ad art.

συνέειναι πινόμενα, cum vino pota, videlicet flores, & folia. Sic etiam in Plinio perspicuè legitur, qui proculdubio videtur hæc ex Dioscoride transcripsisse. Præterea in Esdræ antidotum, cuius contra venenata animalia præcipuus est vsus, flores Nerij recipiuntur, ceu medicamentum contra venena efficax. In hac verò apud Ætium, & Paulum compositione Esdræ, malè legimus flores Nerij, deinde paulo post, Rosæ Rhododaphnes. Nerion enim & Rhododaphne idem est frutex, & Rosæ Rhododaphnes nihil aliud sunt, quàm flores Nerij. Videtur itaque flos Nerij, interpretatio esse Rosarum Rhododaphnes, quæ in margine notata, ab aliquo indocto in contextum inserta est. Id tamen verum esse tradit Cordus florem Nerij infaniam parere, sed non semper: accidere enim id quibusdam locis, & quibusdam temporibus, arborémque quibusdam temporibus venenatam esse, ex cuius & Aconiti floribus in Ponto venenatum melapes colligunt. Scribit etiam Galenus athletarum dorsum Rhododaphnis vellicari. Καὶ ῥοδοδάφνης ἐν ᾧ τὴν τὰ νῦν τὰ διακινεῖται. Nerium aliud pinxit Lobellius, flore albo quale se vidisse ait Pena, tum in hortis Italicis, tum in maritimis.

GLYCIS




## GLYCYRRHIZA. CAP. LIX.

**V**T à Græcis γλυκύριζα, ita à Latinis Glycyrrhiza, & Glycyrrhizon **Nomina**  
appellatur, & dulcis radix, à Sepalsiariis corrupto, aut potius bar-  
baro nomine Liquiritia, ab Arabibus *Sus*, Italis *Rigolitia*, Gallis *Re-*  
*chisse*, & *Regalisse*, à Germanis *Lechkrutz*, & *Sueszholtz*, ab Hispanis *Rega-*  
*liza*, Boemis *Lekorice*, Polonis *Lackrycyra*. Fruticosa est planta, inquit Dioscorides, **Lib. 2. ca. 5.**  
ramis binum cubitorum altitudine assurgentibus: foliis Lentisci, densis, pingui- **Forma.**  
bus tactuque gummosis: flore Hyacinthi: fructu pilularum Platani magnitudi-  
nis, asperiore, in siliquis Lentium modo, rufis, parvis: radicibus longis, vt  
Gentianæ, coloris buxei, sub acerbis, & dulcibus, quarum succus densatur Lycij  
modo. Vel vt in vetere Codice legitur, χαλκιδεύουσι ὡς περ τὸ γλαύκιον, ἢ λίκιον. Id est,  
ex quibus elicitur succus, veluti ex Glaucio, au Lycio. Ea est planta quam hic  
primo loco proposuimus, ramis ternos, quaternosue cubitos altis, in quibus  
folia bina ex aduerso sita, Lentisco similia. Flores breuibus pediculis hærent,


## GLYCYRRHIZA

echinata Matthioli.



## GLYCYRRHIZA

echinata Dodonæi.



Hyacinthi purpureo colore, in globulos veluti congesti, post quos fructus  
oriuntur, quorum globosum acervum cum Platani pilulis comparat Dioscori-  
des. Sunt enim rotunda capitula, echinata, magnitudine pilularum Platani, aut  
maiora, composita ex Siliquis parvis, multis, Lenti similibus, coaceruatis, hirsu-  
tis, & tenuiorum aculeorum stipatu velut armata, vt pictura monstrat, colore in  
atrum rufescente, in quibus semen compressum clauditur. Radix longa vt Gen-  
tianæ, foris nigricans, intus lutea, dulcis. Est & altera Glycyrrhiza priori addi-  
ta, à Matthiolo priore editione commentariorum in Dioscoridem pro Gly-  
cyrrhiza Dioscor. depicta, qua abundat Apulia, inquit, præsertim in Gargano  
monte, ex qua quotannis succus in pastillos densatus conuehitur, & magna ra-  
dicum copia. Visitur etiam in multis Italiae hortis, non modo ad spectaculum  
sata, sed & ad medicamentorum vsum. Nam recens effossa radix sicca præstan-

Lib. 2. Dio-  
scor. cap. 5.  
**Locus.**



## GLYCYRRHIZA NON

echinata: Scythica herba.

Ibidem.

Lib. 6. c. 28.

In Hist. pl.  
cap. 70.Ruel. lib. 3.  
cap. 5.Lib. 2. pl.  
cap. 156.

tior est, & ori gratior. Sed cum altera editione diligentius opinor, hanc Glycyrrhizę speciem considerasset, nullumque in ea fructum, aut magnitudine, aut asperitate cum fructu Platani conferendum animadvertisset, adiecit Glycyrrhizam duum esse generum, alteram non echinaram, de qua modo tractamus, alteram echinatam, de qua supra verba fecimus à Dioscoride descripta, quę copiosa in Germania nascitur in Bambergensi agro, non longè à Norimberga, à Ioāne Hesso medico Norimbergensi ad se missa. Illam etiam echinatam Glycyrrhizam Dodonęus pro vera, siue Dioscoridis Glycyrrhiza descripsit, ac depinxit: alteram verò, non echinatam, (cui Siliquas quasdam paruas, vt & Cordus, attribuit, quod dicemus) nequaquam asperas, aut hirsutas, sed leues & Lęrium valvulis similes, in quibus semina parua. Germanicā, siue vulgarem Glycyrrhizam appellat, vt in Italia, ita in Germania quoque nascentē. Eadem à Fuschio depingitur, multaque, vt inquit, nec ignana aliquot Germaniæ locis, Pabēbergen-

si præsertim agro producitur. Hodie nusquam ferè non seritur in hortis, eaque vt semel comprehenderit, tam pertinaci fertilitate coheret, vt vix vnquam possit radicitus extirpari, vsque adeo restibili fecunditate regerminans. A Cordo verò prolixè admodum & curiosè describitur, his ferè verbis. Glycyrrhiza ab vno radice capite caules emittit, virgis Alhææ similes, binum ternumue cubitorum altitudine, prope terram minimi ferè digiti crassitudine, teretes, solidos, lignosos, in viridi subflauos, intus fungosā medulla plenos, inferne tactu asperos, ex interuallis inæquali ordine surculos proferentes, in quibus folia alarum figuram referunt, vtrinque quina, sena, & nonnunquam septena, pari ferè interuallo distantia, ea ratione vt bina semper in vno exortu coniungantur, atque breuibus admodum pediculis ex aduerso opponantur, prominente in summitate surculi recto folio in reliquo surculo, foliorum pari numero, impari autem vno hoc efficiente. Singula folia sesquiuncialē longitudinem habent, latitudinem vncia minorem, aut vncialem, quædam etiam nonnunquam maiora. Eadem sub crassa, pinguis, glutinosaque sunt vtraque parte, ideoque tactu digitis adhærentia. Inest præterea iis peculiaris quædam natura, & cum paucis communis. Oriente sole singula folia in latitudinem primum æqualiter explicantur, mox vna cum ascendente sole eriguntur, atque interdum sursum omnino rigent, & vna cum surculo cymbam, aut nauium carinam formam referunt. Occidente sole rursus se demittunt, demissaque pendent. Quinetiam aëris constitutionibus reguntur. Nam si dies sereni fuerint, interdum eo modo quo dictum est, erecta sunt, pluuiosis verò, nubilis, tristibus, & frigidioribus diebus, etiam æstate, atque ipso meridie se demittunt: quæ de foliis tantum intellige, non de eorum pediculis, quorum positus neque à sole, neque ab aëris constitutione mutatur. E summis caulium alis oblonga quædam, dissecta, & veluti aculeata prodeunt capitula. (Hæc Dioscoridem pilulis Platani comparare, fructus improprie appellando, perperam scripsit Cordus, non enim huiusce,



huiusce, sed superioris Glycyrrhizæ fructus cum Platani fructibus confert.) ea se paulatim in quadrantalem, & nonnunquam in quincuncialem pediculum extendunt, vndique vsque ad summitatem paruis floribus, oblongis, papilionum alis similibus, & colore in candido, caruleoque purpurascentibus, circumdatum, ex quibus vncialis, gracilis, subrubens, atque in latitudinem compressa prodit exigua siliqua, tribus, aut quatuor oblongis feminibus grauida, vel, vt Dodonæus ait, circa graciles pediculos flores & parua siliqua proueniunt, spicarum effigie, vt in Galega, & Vicia sylvestri, non vt rotunda capitula, hirsuta, quæ ex pluribus paruis siliquis echinatis constant, Platani pilulis similia, quemadmodum in superiore Glycyrrhiza. Diu frutex hic viret, antequam folia amittat, quæ postea cum florum defluuij tempus aduenerit, non singillatim, sed vniuersa simul vna cum pediculo decidunt, & illi etiam postquam deciderint, adhærēt. Radice nititur superne trunco simili, quo vetustior fuerit, eo crassiore, plerumque crassitudine pollicari, inferne in multas longissimas radices quaquauerfum in obliquum exeuntes distracta, quæ arenosum solum, aut arenam tantum nactæ, duarum orgyarum longitudinem excédūt. Substantia eis est neruosa, flexilis, distractu difficilis. Ideo cum inter effodiendum extrahuntur, raro abrupuntur, maximè solo arenoso. Colorem habent foris in spadiceo, aut subruffo pallentem, intus buxum. Superior radices pars, à qua modo dictæ exeunt, & quæ veluti truncus, seu caput earum est, peculiare, & à prioribus diuersas emittit radices, minimi digiti crassitudine omnino transuersas, Asparagis similes, sub terræ superficie quoquo versus serpentes, quæ cum in cubitale, bicubitale, & interdum longius spatium progressæ fuerint, acuminato germine è terra emicāt, & caules producunt, qui sequenti anno deorsum obliquas demittant radices, quales descripsimus, flaccescentibus postea, & pereunribus iis à quibus ortæ sunt, transuersis radicibus, quibus veris tempore in candido pallidus est color, substantia autem tenera, succosa, fragilis: ab ætate deinde in Autumnum superficies earum in fungosum corpus mutatur, interior verò pars obliquarum radicum modo in neruosam, minus tamen firmam, aut lentam, & colore buxam substantiam transit. Saporem radices habent valde dulcem, imo etiam Saccharo dulciorem, modicè astringentem, & subacrem, cui etiam iuncta est minima quædam amaritudo. Colitur in Germania luci causa, præsertim Bambergij in Franconia, vbi maximus est eius prouentus. Ex his Glycyrrhizam Dioscoridis, eiuſque aliud à Matthiolo, & Dodonæo proditum genus omnibus fore notissimum arbitror. Plinius in describenda Glycyrrhiza Dioscoridem secutus est, nisi quod eam inter aculeatas plantas falsò retulit. Et ipsa, inquit, sine dubio inter aculeatas est, foliis echinatis, pinguibus, tactuque gummosis, fruticosa, binum cubitorum altitudine: flore Hyacinthi: fructu pilularum Platani magnitudinis. Et alio in loco. Quædam spinosa foliata sunt, vt Carduus, Eryngium, Glycyrrhizon, Vrtica. Horum enim in omnibus foliis inest aculeata mordacitas, Cuius erroris causam Matthiolus, Cordus, Cornarius mendoſo, quo Plinius vsus est, Codici imputant, quod *φύλλα ἐκινέτα ἐχίνω* facile lubricoque non aduertentium lapsu, falsò legerit, cum Dioscorides rectè habeat *ἐκινέτα χύμα*, id est similia Lentisco. Nec sunt audiendi qui ne desciscant à Plinij sententia, credunt Glycyrrhizā spinis olim fuisse præditam, verum mangonio longi cultus edomito rigore tandem mitigatam. Nam diligentia, opinor, minores innocentioresque spinas reddere potest, in totum abolere minimè. Scythica planta Theophrasti nihil aliud est quàm Glycyrrhiza Germanica, secundo loco descripta, frigidas etiam regiones, qualis est Scythia, minimè respuens, sic dicta, quod eius vsu aliquot dies sitim famemque tolerare Scythas posse

Ibidem.

Locus.

Lib. 22. c. 9.

Lib. 21. c. 15.

Lib. 3. Dioscor. cap. 5. In Diosco. lib. 3. cap. 7. Embl. 5. lib. 3. Dioscor.

Scythica planta.



- posse auctores tradant, de qua tamen & de Hippice Plinius tanquam diuersis  
 seorsum à Glycyrrhiza tractat. Sed quæ de ea scripsit cum à Theophrasto sum-  
 pserit, omnesque quas Scythica Theophr. vires tribuit, ipse Glycyrrhizæ assi-  
 gnauerit, ut dicemus, hinc perspicere potuit, eandem esse Theophrasti Scythi-  
 cam, cum aliorum Glycyrrhiza: Γλυκεία δὲ καὶ ἡ σκυθικὴ, inquit Theophr. καὶ ἔνιοι γε κα-  
 λῶσιν γλυκυρρίζαν αὐτὴν (sic enim ex vetusti Codicis fide legendum) γίνεσθαι δὲ παρὰ  
 τὴν μαζῶτιν, χρησίμην τε πρὸς τὰ ἀσθματικά, & βήχα ξηρὰν, & ὅλως τὰς περὶ τὸν θώρακα πόνους,  
 ἔτι δὲ πρὸς τὰ ἐλκὴ ἐν μέλει, διυάται δὲ τὴν διήφον πύλιν, ἐάν τις ἐν τῷ στόματι ἔχῃ· διὸ τὰν τὴν  
 δὲ καὶ τὴν ἰππακὴν διὰ τὴν φασὶ τὰς σκύθας ἡμέρας καὶ ἑνδεκά, καὶ δωδεκά. Id est, Dulcis quidē  
 & Scythica est, quam nonnulli Glycyrrhizā appellant. Ad Mæotim nascitur.  
 Vtilis est asthmati, tussi sicca: denique thoracis malis. Præterea vlcerebus cum  
 melle prodest. Sitim sedat, si in ore habeatur. Quapropter Scythas contentos  
 ea & Hippice vndecim, aut duodecim dies vitam sustinere aiunt: quem locum  
 permirum est quam supinē atque peruersē Plinius vertisse, & intellexisse vi-  
 deatur. Inuenere herbas & vniuersas gentes, inquit Plinius. Scythia primū eam  
 quæ Scythice vocatur, circa Bæotiā nascens, prædulcem alias, vtilissimamq; ad  
 ea quæ asthmata vocant (nam ex vetere Codice, & Theophrasto sic legendum,  
 non ut in vulgatis exemplaribus, prædulcis. Aliam vtilissimam ad ea quæ spaf-  
 mata vocant) Magna & ea commendatio, quod eam in ore habentes famem si-  
 timque non sentiunt. Idem præstat apud eos Hippice dicta, quod in equis  
 quoque eundem effectum habeat. Traduntque his duabus herbis Scythas  
 etiam in duodenos dies durare in fame sitique. Hæc Plinius, qui circa Bæotiam  
 nasci Scythicam scripsit, Theophr. ad Mæotim: at huius erroris minimē Plinius  
 est accusandus, sed mendosa exemplaria quibus ille utebatur. Ipsemet enim ali-  
 bi Scythicam herbam à Mæotidis paludibus portari scripsit. Ad hæc Hippacen,  
 id est caseum equinum in ciborum necessitate pro alimento Scythis esse, sicut  
 delinitam Glycyrrhizæ radicem pro potu in aquarum penuria, vagantibus per  
 aridas vastasque solitudines iis populis. Plinius verò ex Hippace, id est caseo  
 equino Hippicen herbam confinxit, addita perinde absurda etymologia, quod  
 scilicet equorum famem sitimque sedaret. Hippacen alibi de hac eadem re scri-  
 bens rectē vsurpasse videtur. Quædam inquit, rursus exiguo gustu famem ac si-  
 tim sedant, cōferuāntque vires, ut Butyrum, Hippace, Glycyrrhizon. Idem ipse  
 Hippacen caseum equinum esse dixit. Sestius eosdem effectus equino, quos  
 bubulo tradit. Hunc vocant Hippacen. Alibi coagulum equi sic vocari idem  
 scribit. Equi coagulum, inquit, quod aliqui Hippacen vocant. Gazæ errandi oc-  
 casionem præbuit Plinius, vterque Hermolao. Ille enim Hippacen equestrem  
 herbam interpretatus est: hic differre Hippacen ab Hippice scribit, quod Hip-  
 pace caseus, & coagulum sit, Hippice verò herba Scythica, equestris à Theodo-  
 ro dicta. Glycyrrhiza plurima, inquit Dioscor. gignitur in Cappadocia & Pon-  
 to. Præstantissima in Cilicia, auctore Plinio, secunda in Ponto, radice dulci, &  
 hæc tantum in vsu. Capitur ea Vergiliarum occasu, longa ceu vitis, coloris bu-  
 xei. Melior, quæ nigra, quæq; lenta, quàmque fragilis. Prouenit in Italia, & Ger-  
 mania, ut dictum est. Est & alia Glycyrrhizæ sylvestris species, Lobellio Glaux  
 vulgaris, Cordo Polygalon, Gesnero, Glycyrrhiza sylvestris à consimili radicis  
 sapore: radice crassa, longa, ramosa, nigra, lignosa, caulibus multis, ima parte ru-  
 bentibus, rotundis, per terram sparsis, gustu dulcibus, odore, saporeque Glycyrr-  
 rhizæ, quæ in hortis nostris alitur, similibus. Quam ob causam Glycyrrhizam  
 sylvestrem vocant: flore Lentis, copioso, in luteo pallecente: siliquis angulo-  
 sis, curuis, & falcatis, semine Lenticulæ. Tragus pro Fænogræco sylvestri descri-  
 psisse ac depinxisse videtur. In vmbrosis sæpius subaltis sæpibus gignitur non-  
 nunquam



nunquam & in apricis. Glycyrrhizæ succus, auctore Dioscoride, in arteriæ *Vires.*  
scabritia efficax habetur: verum oportet, vt linguæ subditus eliquescat: *Lib. 2. ca. 5.*  
æstuantî stomacho, thoraci, ac iocinori conuenit: sanat vesicæ scabiem, &  
renum dolores cum passo potus: idem eliquatus sitim sedat: vulneribus il-  
litus accommodatur: commanducatus stomacho prodest: recentis radice de-  
coctum ad eadem conuenit. Eiusdem farina pterygiis commodè inspargitur.

## GLYCYRRHIZA

*sylvestris.*

Plinius similia ferè omnia habet, quibus-  
dam additis. Vfus in linguæ subditis: sic  
enim legendum, Plinio Hypoglottidas ira  
appellante, decoctæ ad tertias, cætero ad  
mellis crassitudinem, aliquando & tusa:  
quo genere & vulneribus imponitur, &  
faucium vitiis omnibus. Item voci vtilissi-  
mo succo, sic vt spissatus est, linguæ sub-  
dito. Item thoraci, iocinori. Hac diximus  
sitim famemque sedari. Ob id quidam ad-  
ipson appellauere eam, & hydropicis dede-  
re ne sitirèt. Ideo & cõmanducata stomati-  
ce est, & vlceribus oris inspergitur sape, &  
pterygiis. Sanat & vesicæ scabiem, renum  
dolores, condylomata, vlcera genitalium.  
Dedere eam quidam potui in quartanis;  
drachmarum duarum pondere, & Piperis  
vna, hemina aquæ. Commanducata fan-  
guinem ex vulnere sistit. Sunt qui & calcu-  
los ea pelli tradiderunt. Hactenus Plinius,  
qui sicut errore deceptus  $\chi\lambda\iota\upsilon\varsigma$  pro  $\chi\lambda\iota\upsilon\varsigma$  in  
Dioscoride legit, sic in eodem Dioscor. fal-  
so nunc legitur succum Glycyrrhizæ esse  
 $\sigma\upsilon\mu\alpha\chi\iota\varsigma$   $\epsilon\delta\omega\kappa$   $\delta\iota\alpha\mu\epsilon\tau\epsilon\sigma\tau\acute{\alpha}\mu\epsilon\tau\epsilon\upsilon$ , vt rectè mihi anno-

*Lib. 22. c. 9.**Lib. 11. c. 54.**Emb. 5. li. 3.  
Dioscor.**Li. 6. simpl.*

tasse videtur Cornarius, contra rectè in Plinio, Ideo & commandueata stoma-  
tice est, Nam qui suprà dixit, ad ardorem stomachi facere, nunc ait stomaticum  
esse medicamentum, tum ipsam, tum eius succum. Cæterum quod idem scribit  
Glycyrrhizæ radicem capi, vel carpi, Vergiliarum occasu, longam, ceu Vitis, co-  
loris buxei, Dioscorides longam esse inquit, & coloris, sicut Gentianæ, buxei.  
Huius fruticis radicem succus, Galeno imprimis vtilis est, perinde vt ra-  
dix, dulcis, simulque leniter adstringens. Proinde asperitates lenire potest,  
nec modo in arteria, verum etiam in vesicæ scabie; idque temperaturæ  
mediocritate. Quocirca fuerit sanè natura eius familiaris nostræ tempera-  
turæ: nam tale monstratum est esse dulce. Sed cum adstrictio quædam ad-  
iuncta sit, vniuersum eius temperamentum, quantum ex caliditate & ad-  
strictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quam proximè accedens  
ad temperatum. Porro quoniam temperiæ quoque est humidum id quod  
modice est dulce, iure etiam siti congruens medicamentum est,  
nimirum modicè humidum, simulque humana natu-  
ra frigidius. Refert Dioscorides radicem siccam  
ad lauorem redactam oculorum Ptery-  
gij idoneum esse illitu  
medicamen-  
tum.

LIGV



Nomina



IGVSTRVM Latinis, Græcis *κύπρος* appellatur hic frutex, Arabibus *Kenne, Henne*, Officinis *Alcanna*, Italis *Guistrico, Oliuella, Oliuetta*, & *Cnambrossena*, Patauinis *Conastello*, Gallis *Troefne*, Germanis *Rhein vuciden, Beynholtzlin*, & *Mundholtz*, Hispanis *Alfena*, seu *Alhena*, Boemis *Ptacij, Zob*, Anglis *Pryuet*, Belgis *Keeleruyt*, & *Mondthoudt*. Ligustrum frutex est, seu arbuscula, virgas producens multas, graciles, lentas, flexilisque. Circa has folia Oleæ similia, latiora, molliora, & colore viridiora. In harum cacumine flores proueniunt candidi, muscosi, vel vt Oribasius legit, racemosi, odorati, sed

Forma.

## LIGVSTRVM.



Lib. I. Diosc.  
cap. 107.  
In lib. I. Diosc.  
scor. ca. 25.

Lib. I. c. 94.

Lib. 3. c. 27.  
Enar. 114. li.  
1. Dioscor.

In Hist. pl.  
cap. 181.

Lib. 12. c. 24.

Lib. 6. Hist.  
cap. 25.

In Enar. A-  
mat 114. li.  
1. Dioscor.  
Lib. 24. c. 10.

Lib. 12. c. 24.

qui decerpti statim flaccescant. Oriuntur ex eis bacca racematim coherentes, Pyramidis figura, Sambucinis similes, nigrae, Hederae bacis minores, lauiiores, nigriores, sapore amaro ac iniucundo, purpureo intus succo. Tale est Matthioli, & permultorum Herbariorum Ligustrum, siue Cyprus, quibus assentitur Cordus. Ligustrum, inquit, sine dubio arbuscula est, quæ Græcis Cyprus vocatur: propterea Plinium idem scripsisse nunquā pœniteat. Ruelius, Ligustrum apud nos eandem arborem esse ait, quæ in Oriente & Græcia Cyprus, Gallis *Troefne*, Officinis tum *Alcanna*, tum *Henne*. His *Tragus*, & *Amatus Lusit.* consentiunt, quia Ligustrum omnibus suis notis Cyprus Dioscoridis refert, foliis circum ramos Oleæ similibus, latioribus tamen, mollioribus, ac viridioribus, gustu adstringentis: flore candido, muscoso, odorato: fructu nigro, Sambucini æmulo. Præterea, inquit Matthiolus, nullus est medicus qui nesciat Ligustrum iis omnibus præditum esse virtutibus, quibus Cyprū polere Dioscorides & Galenus prodiderunt. Alij

Ligustrum & Cyprum diuersas esse stirpes censent. Fuschius quo nomine Ligustrum. Græcis appellatum sit, cerò nobis constare negat: neque enim vt ferè omnes hodie putant, Cyprum esse, quæ Plinio teste semen habet Coriandri, & arbor peregrina est. Ligustrum enim semen non Coriandro simile, quod rotundum ac sublauium est, sed potius atrum, & altera parte latum, modicèque concavum in racemis profert. Præterea arbor peregrina non est, sed sponte in sepibus & senticetis vbique prouenit: Phillyream, itaque Dioscoridis potius esse Ligustrum is arbitrat. Dodonæus eandem plantam quam Fuschius ostendens, Phillyream Dioscoridis vocat, Plinijq, Virgilij, Columellæ Ligustrum. Anguillara quoque eam, Ligustrum Latinorum esse non negat, sed Cyprum non esse contendit, Ligustrum autem Phillyream Græcorum esse. Lonicerus quoque Ligustrum Latinorum Dioscoridis Phillyream esse ait, & Phillyreæ apud Dioscoridem descriptionem Ligustro nostro pulchrè conuenire. Horum igitur sententia Ligustrum ea stirps erit, quàm hîc pinximus, Cyprus autem minimè. Constantinus idem esse Ligustrum & Cyprum existimat, sed quid sit ignotum esse his nostris temporibus, à Plinio quidem Cyprum Ligustrum dici his duobus locis. Prior est. Ligustrum eadem arbor est, quæ in Oriente Cypros. Suos in Europa vsus habet. Succus eius neruis, &c. Alter est, Cyprus in Ægy



in Ægypto est arbor Ziziphi foliis, semine Coriandri, flore candido, odorato. Coquitur hic in Oleo, premiturque postea quod Cyprinum vocatur. Pretium ei in libras x. (id est, denarij) quinque. Optimum habetur è Canopica in ripis Nili nata: secundum Ascalone Iudeæ: tertium Cypro insula odoris suauitate præcipuum. Quidam hanc esse dicunt arborem, quæ in Italia Ligustrum vocatur. Sed Dioscor. Cyprus folia habet Oleæ, Ligustrum Plinij Ziziphi, & semen Coriandri, Dioscoridis verò Sambuci. In flore etiam vix conueniunt, cum Dioscoridi muscosus sit, Plinio tantum albus & odoratus. Quare Cyprus Dioscoridis à Cypro, siue Ligustro Plinij dissidet. In hoc solum hi duo auctores consentiunt, quod vterque dicat esse arborem: qua vel sola nota ab huius consortio excluditur vulgaris hæc planta, quam cum multis aliis pro Cypro & Ligustro ostendimus, quod hic frutex sit tantum in sæpibus frequens, vix vquam arborescens. Non erit igitur Cyprus Dioscoridis, aut Plinij, Ligustrum, imo nec Columella, qui dixit. Et nigro permista Ligustro. Balsama, Cyprum siue Ligustrum, id est Arabum Alcannam, arborem raram esse, & inter pretiosa simplicia semper adnumeratam probatur testimonio Iosephi, cuius hæc verba sunt, cum de valle Hierichuntina loquitur: *φέρει δὲ ὀποβάλας αἰωνίαν, ὅσην τῇ μὲν τάλαν τῶν τῆς δὲ καρπῶν, κίπρον τε, καὶ μυροβάλανον.* Et subiungit, *εἶναι ὁσπινθὶ τὰς καὶ κάλυττα.* Cyprus, inquit diuus Hieronymus, cum Nardo, Nardus & Crocus, fistula & Cinnamomum cum vniuersis lignis Libani. Hæc Constantinus. Quia verò Alcannam Arabum Cyprum illam raram, & nobis ignotam esse ait, quid de ea alij sentiant exponamus. Qui Arabas scriptores Latinè interpretati sunt, Henne, siue Alcannam Cyprum verterunt, Serapionis, opinor, auctoritate freti, qui Henne, siue Alcannam nihil aliud esse vult quàm Cyprum. Henne, id est Alcanna, inquit, Isaac Ebenamram, flos Alcannæ est, similis floribus Myrti, nisi quia est velut in racemis, & flos eius est albus, decliuus ad glaucedinem, acuti odoris. Dioscorides. Est arbutum habens folia super ramos suos, & cætera, quæ hic citare superuacaneum foret, cum sint ea omnino quæ Dioscorides & Galenus de Cypro scripserunt. Auicennæ interpretes Alcannam etiam Ligustrum vocat, cui Auicennas easdem virtutes tribuit, quas Dioscorides & Galenus Cypro inesse tradiderunt. Bellonius Henne, siue Alcannam arborem in Ægypto nasci prodidit, eoque à Ligustro diuersam, quod huius folia hyeme decidunt, illius verò minimè. Alio in loco fruticem, siue arbusculam esse ait, quam Latini Arabum interpretes Ligustrum falsò vocant, quod ab illa Ligustrum differat. Henne igitur ad Mali Punicæ proceritatem assurgere: sed quia crebro ab Ægyptiis cæditur, & diligenter colitur, virgas sæpius tenues, vt vimina producere. Folia eius siccari in farinam, luteo colore tingentem, quo cum valde delectentur omnes qui Turcarum imperio parent, atque aliæ etiam gentes, adeo vt mulieres eo colore manus, pedes, crura obscænas partes ad vmbilicum vsque infici pulchrum, ac decorum existiment, maximum ex hoc puluere vectigal colligere Turcarum Imperatorem. Quenam igitur tandem hæc erit stirps quam pro Ligustro proponimus: fortasse, inquit Constantinus, Ligustrum Virgilij. Quare de re minimè ambigunt citati iam à me auctores, qui hoc nostrum Ligustrum Dioscoridis Cyprum esse autumant, in eoque Seruium Grammaticum reprehendunt, qui illo Virgilij versu,

*Alba Ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.*

Ligustrum eam Cautoluuli speciem esse scribit, flore candido, Liliij, seu Calathi effigie, quæ vicinis sese circumuoluit. Sunt etiam qui Ligustri baccas à Virgilio Vaccinia nigra vocari putent. Sed non rectè illi quidem sentiunt, inquit Matthiæolus, nec etià Fuschius qui Rubi mora, quæ Græcis *Βάμνα*, & *Βατρία* dicuntur,

Lib. 10.

Li. 4. c. 10.

In Cantic.

Lib. 2. ca. 1.

Lib. 1. Obs. cap. 44.

Lib. 2. Obs. cap. 74.

Eclog. 2.

Lib. 1. Dios. cap. 107.



In Hist. pl.  
cap. 35.

à Virgilio vnus literæ immutatione Vacinia vocari scripsit. Vaccinium enim pro flore non pro fructu vsurpari constat, inquit Matthiolus. At cum in nothis Dioscoridis stirpium nomenclaturis legamus Hyacinthum Romanis Vaciniū dici, credendum Vacinium Virgilij Hyacinthum esse, flore cum Violis purpureo colore certante, qui cum ab aliis, tum ab ipso Virgilio niger appellatur, Vacinia cum floribus, non cum fructibus numerante, his versibus:

Eclo. 2.

*Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.*

*Mollia luteola pingit Vaccinia caltha.*

Eclo. 10.

*Etnigra Viola sunt, & Vaccinia nigra.*

Li. 1. ca. 107.

Li. 12. c. 24.

*Locus.*

*Tempus.*

Lib. 1. c. 107.

Oleum Cyprinum.

Li. 24. c. 10.

Embl. 103.  
lib. 1. Diosc.

Li. 12. c. 24.

Ibidem.

Lib. 23. c. 4.

Quidam Vaccinium aliam ab Hyacintho plantam, arbusculam nimirum bacis nigris à Virgilio intelligi credunt, de qua proximo capite dicetur Matthioli sententiæ accedit Vvlichius, & Vaccinium in Virgilio Hyacinthum interpretatur, flore purpureo, quem vulgo brunum appellant, Græci *φαιδον*, cum nigro aliquid ruboris admiscetur. Plautus morulum appellare videtur. Nec placet Marcelli opinio, Vaccinium Irim esse putantis. Nam neque Iris in coronas veniebat, neque color responderet, quod varius sit, adeo vt à colorum cælestis arcus varietate nomen inuenerit. Adhæc cum Iridis flos maximè fragilis, caducūque sit, Poëta Ligustro non prætulisset. Sed ad Ligustrum nostrum redeat oratio. Id optimum nasci in Canopo & Ascalone scribit Dioscorides. Plinius optimum haberi è Canopica in ripis Nili nata, secundum Ascalone Iudeæ, tertium Cypro insula. Nihil frequentius Ligustro nostro in Dumetis occurrit, ita vt hoc nomine contemnatur. Qua propter Virgilius eius flores negligi à pastoribus, & inutiliter perire cecinit. Maio mense floret, Autumno maturæ bæcæ nigrescunt. Folia adstrictoriam vim habent, inquit Dioscor. Quare comanducata oris vlceribus medentur: illita feruidis inflammationibus, carbunculisque profunt: decocto eorumdem igni ambusta fouentur: capillum rufant trita folia, quæ in radiculæ succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus capitis dolorem sedat. Cyprinum Oleum quod ex eo fit odoratū est, excalfacit, emollitque neruos, si quæ feruenti natura sunt assumat. Quas sex postremas voces Græci Codices, neque Cornarius in translatione sua habent. Quare has ex Olei Cyprini compositione, quæ ex quibusdam natura calfacientibus constat, adiectas fuisse credibile est. Ligustrum eadem arbor est, quæ in Oriente Cypros, inquit Plinius. Suos in Europa vsus habet. Succus eius neruis, articulis, algoribus: folia vtique veteri vlceri cum salis mica, & oris exulcerationibus profunt. Acini contra phthiriasim, item contra intertrigines, foliæque. Sanant & gallinaceorum pituitas acini. Cornarius annotat hoc loco in vetusto Pliniano exemplari coniunctionem, si, haberi, quæ in vulgatis deest: perinde ac si ambigat, an Ligustrum sit Cyprus, quemadmodum alio loco Cyprum in Ægypto dictam, à quibusdam in Italia Ligustrum vocari tradit. Deinde acinos hic dici quos alio loco semen Coriandri dixit, Dioscor. verè, semen nigrum, Sambuci fructui simile. Plinius alio loco de Cyprī viribus hæc scribit. Cyprī natura excalfacit, mollit neruos. Folia stomacho illinuntur, & vuluæ concitata: succus quoque eorum apponitur. folia recentia comanducata vlceribus in capite manantibus, item oris medentur, collectionibus & condylomatibus. Decoctum foliorum ambustis & luxatis prodest. Ipsa rufant capillum tusa, adiecto Struthei Mali succo. Flos capitis dolores sedat cum aceto illitus. Idem combustus in cruda olla nomas sanat, & putrescentia vlcera per se, & cum melle. Odor floris suauis, & qui somnū faciat. In quibus de foliis Cyprī dicit, Ipsa rufant capillum tusa, adiecto Struthei Mali succo, quod Dioscorides, *ξανθίζει δὲ τὰς τεύχας τρυθίου χυλῶν τὰ φύλλα λεῖα βραχύντα, καὶ ἐν χειρὶ πτενίνα*. Ex quibus perspicuè apparet deceptum fuisse Plinium



nium, qui pro *φρσθλς χαλῶς*, id est pro Radiculæ, siue Herba lanariæ succo, Struthi Mali Cotoneorum generis succum accipit. Neque Constantino assentior, meritò reprehendi ad Amato Marcellum & Ruellium scribenti, quod cū succo Lanariæ herba, non cum succo Struthi Mali & foliis Cypri rufari capillos interpretati sunt. Cypri arboris folia, summâque germina, inquit Galen. in vsum veniunt, facultatis & qualitatibus mixtæ. Habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modice calida, habentque etiam quiddam adstringens ex terrea substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam ambusta fouent. Vtuntur etiam aduersus igneas phlegmonas, & carbunculos: nam absque molestia & morfu desiccant. Quinetiam sponte prouenientibus in ore vlceribus aphthis cognatis, & ipsis aphthis mansa commoda sunt. Fit ex Ligustri floribus oleum, inquit Matthioli, cum oleo insolatis, quod ad vulnerum inflammationes plurimum valet, & ad capitis dolorem à bile ortum. Destillatur ex iisdem floribus aqua non inodora, ad ea utilis quæ refrigerationem adstrictionemque postulant. Eadem pota, celiacis, dysentericis, & cæteris alui fluxionibus affectis auxiliatur. Vteri fluxiones inhibet, tum pota, tum supposita. Datur vtiliter potanda sanguinem reiicientibus. Oculorum fluxionibus per se, aut cum Pompholyge medetur.

Ibidem.  
Enar. II. li.  
1. Dioscor.

Li. 7. simpl.  
Tempera.  
& Vires.

Lib. II. Dio-  
scor. c. 107.

VACCINIVM PLINII, CAP. LXI.

**S** VNT qui plantam, cuius figuram hic proponimus, Vacciniū Plinii, Theophrasti verò Lacatham arborem in Macedonia planis nascentem esse suspicantur. In sæpibus gignitur, sæpius humilis frutex, nonnunquam arborefcens, ad magnitudinem Mali Punicæ crescit, ramosa, & furculosa arbuscula, minimè spinosa, radicibus crassis, multis, brachiatis: caudice cum arborefcit plerumque intorto, cortice, rimoso,

VACCINIVM PLINII,

*Lacatha Theophrasti.*



scabro, subcinereo, ramorum verò cortice ex caruleo nigricante, ac læui, colore oculis non ingrato: folio Pruni sylvestris, latius & pallidius virente, venoso: flore albo, suauissimè olente ex quatuor foliolis composito, filis intus candidis, apice rubro coronatis: baccis nigris, rotundis, gustu subamaro, non tamen insuaui, succo plenis purpureo, qui expressus linthea, coriâque munda, & candida, floridissima purpura tingit, colore nec fugaci, nec caduco, sed diutissimè permanente, nucleis, Cerasorum nucleo odore & sapore similibus, osiculo similiter Lacunato inclusis, ex quibus oleum conficitur iucundi odoris, quo ad illinendas, manicas vtuntur. Baccis istis maturis turdi, merulae aliæque auculae avidissimè vescuntur. Quamobrem Italia ad eas alliciendas sæpes ac Dumeta Vacciniis conferebat. Plinius. Item Vaccinia Italiæ in aucupiiis sata: Galliæ verò etiam purpurea, tingendi causa, ad seruitiorum vestes. Nonnulli hunc fruticem Chamæcerasum, siue sylvestrem Cerasum esse

*Nomina*

Lib. 16. c. 18.

Lib. 3. Hist.

cap. 4. & 7.

*Locus.*

*Forma.*

Lib. 16. c. 18.



existimarunt. Verùm à quouis Cerasorum genere differt, florescendi celeritate parvulis foliis, fructus amarore, apicibus in flore rubris, in Ceraso luteis. Fructus quidem Cerasi sylvestris esset, nisi breviori pediculo niteretur, ac minor foret, quippe qui Pisi magnitudinem non excedat. Hyacinthum Romani Vaccinium vocant, rura nostra hodie *Vaciet*, in quo nomine, quia pristini vocabuli quædam rudimenta relucet, quasi Vacinium & Vaccinium innuant, Ruellius Vaccinium Hyacinthū esse arbitratus est, à quo planè dissentio. Nam hæc Hyacinthi appellatio in iis habetur, quæ Dioscoridi falsò sunt adscriptæ, & incerta est, fallaxque coniectura ex sola nominum affinitate sumpta: neque etiam Hyacinthi vllus ad aucupia vsus esse excogitariue potest, neque Hyacinthi flores, quatumvis eos manibus teras, purpureo succo digitos inficiunt. Præterea Vaccinium à Plinio inter arbores, non inter herbas numeratur. Quod si quis Hyacinthum ideo Vaccinium appellatum fuisse contendat, quod eius flos veluti Vaccinij succo imbutus purpureo colore niteat, huic non valde repugnauerim. Sed ab hoc, Plinij Vaccinium, quo de hîc agitur, longe diuersum esse dico. Non desunt etiam qui Vaccinij nucleos ex Oriente aduectos pro nucleis Mahaleb ostendant, & vendant. Tamen Mahaleb de qua nos antea tractauimus, longè alia est arbor. Vaccinium in sæpibus ferè semper, vt dictum est, prouenit cum Ligustris. Quam ob causam Virgilius fortasse eodè versu coniunxit:

*Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.*

VIBURNVM, SPIRÆA THEOPHR.

CAP. LXII.

Lib. I. Dioscor. c. 124.  
Nomina  
Eclat.  
Forma.



RVTEX hic qui ab Italis *Lantana*, & *Viburno*, appellatur, Germanis *Schlingbaum*, maximè lentus est, obsequiosus, flexuq; inuictus, quale esse Viburnum Virgilius cecinit hoc carmine:

*Quantum lenta solent inter Viburna Cupressi.*

VIBURNVM,  
Spiræa Theophr.



Locus.

In Lexi.

Lib. I. Hist. cap. 23.  
Lib. 6. Hist. cap. 1.

Ramos edit digitali crassitudine, bicubitales, folia Vlnæa, incana, & hirsuta, paribus internodiis & aduersis pediculis coniugatim adhærentia, per ambitum tenuissimè ferrata: florem album, velut in umbellam coaceruatum, à quo acini prodeunt lentium modo compressi, primum virides, deinde rubri, postremò nigri: radices per summa cespitem vagantur. Virgæ adeo flexiles, lentèsque sunt, vt ad fasciculos colligandos iis vtantur rustici. Nascitur in sepibus & frutetis, incultòque solo. Fruticem hunc Spiræam esse Theophr. primus animaduertit Dalechampius, cuius sententiam probauit Constantinus his ferè verbis. Spiræa frutex est lentus, & vitilis, ita vt in Spiram torqueri possit, vnde & nomen ἀπὸ τῆς ἀσπράς. Fructum fert in summitate racematim rubrū, & maturitate nigrescentē. Theophr. τῶν γαμνιδῶν (ἀεροκάρπων) ἐρεῖν, ἀσπρά, ἄγνος, id est, fructū qui in cacumine fructū ferunt, Erica, Spiræa, Vitex. Alio loco corruptè scribitur σπινρέα, pro ἀσπρά, nec alij rectè ἀσπρά emendarunt: οἶον κισσός, μνησθρὸν, ἐρδιδανον, ἀσπρά, κνέωρον



κνέσπον, δελανον, &c. Sic etiam Plinius legit. Ergo in coronamenta folio venere Lib. 21. c. 9.  
 Melothron, Spiræon, Trigonon, Cneorum, &c. Ruellius cum de Rhoe Lib. 1. c. 125.  
 ex Dioscoride & Theophrasto scriberet, vt Rhoeon quam non nouerat, in  
 Lutetia suburbanis reperiret, fruticem depinxit, quem antea citra Historiam Lib. 1. c. 85.  
 solo nomine Halini indicauerat, & à Gallis *Blancheputain* vocari dixerat. Idem  
 apertissimè capite de Vite syluestri eam *Viorne*, & *Hardeau*, (à Gallica voce Lib. 3. c. 163.  
*Hard*, quæ vinculum & fune significat) nominari tradit: vt necesse sit aut Ruel-  
 lium hæc obliuiose & incogitanter confudisse, aut duas illas plantas æquè vo-  
 cari à Gallis *Viorne*: quo nomine appellari iure possunt aliæ quæuis lentæ, flexi-  
 les, vietæ. Nam ruborem tantum etiamnū rustici ex baculis contortis & simul  
 implicatis, spiras factas quibus clatros aditui suorum hortorum obiectos li-  
 gant, vocant nunc *Viorne*, nunc *Riorte*. An verò spirea Viburnum sit Virgilij, an  
 potius Vitis syluestris, parum refert, cum vtraque planta, sicum Cupressu com-  
 paratur, humilis sit, & altitudine longe inferior. Flexilis tamen lentor Viti syl-  
 uestri magis quàm Spirææ conuenit. Præterea obseruandum: quod Ruellius  
 non animaduertit, Rhoeon & Vitem syluestrem coriarias esse plantas, sed à Vi-  
 te syluestri coria depfari, à Rhoe perfici. Nam plantarum id genus aliæ ferui-  
 dæ & acres, vt Vitis syluestris, calcis modo: qua nostro sæculo vtuntur coriarij,  
 tanquam Psilothro, pelles aqua maceratas, pilis nudant, & sic molliunt, vt  
 subigi, radiolisque purgari ac exteri possint, quod depfare est. Aliæ deglabra-  
 tas pelles, maceratas, emollitas, derafas sic rursus spissant, densant, durant, vt  
 ad vsum calceorum, solearum, ocrearum, thoracum firmæ solidæq; sint, quod  
 perficere est. Eiusmodi sunt Rhus, cortex Quercus, & Galla. Hoc quidem modo.  
 Rhus sanè Coriaria est, altero, Vitis syluestris, & aliæ multæ plantæ, id quod  
 Theophrastus scripsit his verbis: *ἡ ῥίζα, διὸ καὶ εἰς ψιλωθρον χρήσιμον, καὶ ἐφελιδας ἀπαγῆ* (non ἐπαγῆ) *τῶ δὲ καρπῶ ψιλῶσι*  
*τὰ δέρματα* (non δένδρα) *τέμνεται διὸ πᾶσαι δὲ μάστιγι.* Id est, Vitis syl-  
 uestris radix acris est, & calfactoria, ideoq; ad psilothrum utilis: maculas in facie  
 sole contractas delet: fructu coria depfantur. Cæditur quouis tempore, sed Au-  
 tumno præcipuè. Absurdum est quod scribit Ruellius, acinorum & radicis hu-  
 ius plantæ naturam esse gelidissimam, cum feruidissima sit. Viburni folia aspe-  
 ra sunt, & adstringentia, auctore Matthiolo. Quare ad vacillantes dentes con-  
 firmandos valent, & ad gingiuarum rheumatismos, si eorum decocto cum Oleo  
 folijs in aqua & aceto dentes sæpè colluantur. Gargarizatur ad columellæ  
 prolapsam, & ad faucium fluxiones. Vuarum acini ante maturitatem arefa-  
 cti, in puluerem redacti, & poti alui profluuia sistunt. Ex radicibus sub  
 terra maceratis, deinde decoctis, diuque tuis fit viscum ad aucupia. Folia in  
 lixiuio decocta pilos denigrant, & fluentes inibent.

Ibidem.

Lib. 9. Hist.  
cap. 22.

Lib. 3. c. 152.

Vires.  
Ibidem.

PHILTYCA CAP. LXIII.

**P**HILTYCA Græcis dicta, arbor hæc Dalecampio esse vide-  
 tur, Illyrici gentibus, Comoricha. Galli oppido S. Spiritus  
 nuncupato, ad Rhodanum sito vicini, in quorum sepibus fre-  
 quens hæc stirps gignitur *Alardens* vocant: Monspelienfes se-  
 plasia Phillyream, vt & Pena, Clusius tertium & quartum Phillyreæ genus  
 has duas plantas esse putat. De qua Theophrastus: *ἐν τῷ ταύτῳ δὲ φιλύκη,*  
*καὶ ἡ λευκότης ὡστερ τοῦ κηλάτρου.* Quæ sic Gaza vertit, Obedientissima


Nomina

Lib. 1. Obf.  
cap. 16.



## PHILLYREA PENÆ


maior, III. Clusij, Alaternus  
maior Dalechampij.



## PHILLYCA

III Dalechamp.

Forma.



## PHILLYREA MINOR

Penæ, & IIII. Clusij, Alaternus  
minor Dalechampij.



Philyca est, candorque ei Celastri modo: rectius firmissima, sed legisse videtur *ἐυκαμπές*, siue *Δεργον*, vel quid simile. Philyca Ligustri est magnitudine, multum fruticosa, coma perpetua, caudicis cortice cinereo, rugoso: foliis Lentisco fere similibus, amplioribus, longioribus, carnosius, obscure virentibus, gustu adstringentibus: fructu racematim congesto, antequam maturescat anguloso, cum maturuit, rotundo, nigro. Is constat pulpa tenera, succosa, gustu principio dulci, mox amaro, cum acrimonia tantillo, ac dum manditur suaue quiddam olente, quod cum baccarum Iuniperi odore comparari possit: Pulpa subiectum est lignosum, sed valde tenerum ac fragile putamen, nucleum contegens rotundum, gustu amarum. Huiusmodi est hinc depicta à nobis arbor. In Grammontio luco haud procul à Montpelio, ac in eius tractus saxosi glareosiq; sapibus crescit.

CYT I



## CYTISVS,

## CAP. LXIIII.

**C**YRTEX, non herba est, quæ <sup>ῥαμνός</sup> Græcis dicitur, Latinis Cytisus à Cythno insula, in qua inuentus est, auctore Plinio, vnde translatus in omnes Cycladas, mox in vrbes Græcas magno casei proventu: propter quod maximè miratur idem Plinius rarum esse in Italia. Est autem Cytisus, Dioscoridi, frutex albus in totum, vt Rhamnus, ramos spargens cubitales, sæpè maiores, in quibus folia fœnigræci aut Loti trifolia sæpè minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita Erucam olent, gustatâque Cicer recens sapiunt, quæ descriptio tam accurata non est, vt ex ea verus Cytisus cunctis innotuerit: diuersi enim auctores diuersos Cytisos exhibent. Ac primum Matthi-

Nomina

Libr. 13. ca. 24.

Lib. 4. c. 108

## CYTISVS MATTH.



## CYTISVS TRAGI.



lus credidit aliquando Cytisum eam esse Trifolij odorati speciem, quam Itali Trifolium equinum, quod equis gratissimum sit pabulum, vocant. Sed cum postea trifolium illud Loton urbanam esse deprehendisset, & Cytisum non herbam sed fruticem esse Myrti magnitudine apud Galenum legisset, imo inter arbores recenseri à Plinio, & Strabone, ipse sententiam suam retractans, aliam Cytisi plantam à Cortuso missam pingendam curauit, quam legitimū Cytisum notis omnibus referre putat, non solum foliis & totius plantæ colore, sed etiam ipsius ligni materie, quæ nigra est, & Ebeni modo firmissima, quod de Cytiso Theophrastus & Plinius tradidere. Hanc nasci copiosam audiit in Regno Neapolitano, ac etiam alibi fortasse gigni in Italis suspicatur, nusquam tamen ante à se visam. At hanc non Cytisum, sed Medicæ speciem esse autumant periti herbarij. Trago Cytisus pes milui pandectario, trifolij genus, nihil aliud est quam procerus & nodosus caulis, multis adnatisiisque geniculatis brachiatus, foliis vestitus Trifolij, fœnogræco quadâtenus similibus at maioribus, firmioribus, acutioribus & prolixioribus, per ambitum leuiter ferratis, incanis, gustu Trifolium referentibus in agris sponte nascitur. Marcellus Empiricus Cytisum etiam sua sponte prouenientem describit his verbis. Herba vel fruterum, quod maximè circa sepes vinearum nascitur, Latine Cytisus dicitur. Virgultis est sub tortis vel curuis, foliis oblongis, bene virentibus: floribus conclusis, oblongis, albis vel galbineis, bene olentibus, idest mellito odore fruterum ipsum semper virens æstate atque hie-


In cap. 108. libr. 4.

Lib. 2. ca. 6.



me: quæ descriptio fortasse Tragi Cytisum exprimit. Constantinus Scholiis in Dioscoridem Cytisum verâ se vidisse affirmat in hortis monasterij D. Germani Lutetiae Parisiorum, omnibus Dioscoridis notis congruentem, vidimus ac rursus in hortis Franciscanorum Lugduni. Hunc eadem qua plurimas alias

*CYTISVS GESNERI.*



Lib. 13. c. 24

*CYTISVS ALPINVS*

*Dalechampij.*



stirpes diligentia & fidelitate delineavit Dalechampius his verbis. Cytisus in hortis Franciscanorum Lugduni multos annos viguit, iniuria mortuus cum ætate feruidissima transferre coactus fuisset olitor, ob metum imminentium hostium subrutis eius sodalitiij hortis. Frutex est hominis fere altitudine, ramis multis, canis, folio sænigræci, perpetuo, flore Pisi luteo, nigris maculis compuncto, semine Genistæ, siliquis abdito: radice pro fruticis proceritate, crassissima, alba, in profundum obliquè acta, carnosa Raphani modo, tenera, gustu subdulci. Floret hyeme tota vsque ad vernum æquinoctium, ætate siliquatur, fructum Autumno perficit. Folia trita prorsus Erucam olent, & gustata Cicer recēs sapiunt. Quod florem edat hyeme, anni tempestate ad euocandos flores incômodissima, hæc esse potest causa, quam Constantinus Scholiis in Dioscoridem reddidit, nempe quod vegetali calore adaucto externi frigoris percussu, fructuosa alioqui planta, & ob radice teneritatem maximè obediens, cum minimè sit alsiosa (neque enim æstuum, neque frigor, inquit Plinius, neque grandinum aut niuis iniuriam expauescit) vberius alimentum ad fruticandum proliciat. Cytisum cuius imago hic appicta est, Conradus Gesnerus ad Dalechampium misit. Est autem, ut eius verbis utar, frutex τριφυλλος, sapore glutinosæ maluæ, id quod in eo Galenus requirit. Alius Cytisi effigies sequitur, quem à natalibus Alpinum vocant. In Appennino crescit, frutex ad hominis proceritatem assurgens, interdum humilior, stipitibus multis, ramosis, foliis sænigræci, aut Loti trifolia, trigeminis, ex ramorum quibusdam velut extantibus tuberculis prodeuntibus, gracili pediculo appensis, vno ex loco nonnunquam binis pediculis, nonnunquam ternis enascentibus, qui singuli terna folia sustinent. Flos in summis ramis est copiosus, luteus, vel pallidus, Pisi similis. Folia, surculi, denique totus frutex candicant. Pena cum diu auxius in Cytisi veri historia hæsitasset, subductis hinc inde rationum momentis, ac collatis



CYTISVS

prior Pena.



ramosas, è quibus folia terna oriuntur, (ea pictor omisit, binis tantum pictis,) maiora quam in priore Cytiso, rotundiora, ex atro virentia: flores Genistæ similes in summis cauliculis copiosi pusilli, lutei, densius stipati, quã pro magni-

collatis variis plantis, tandem eum probatū iri credit candidis arbitris, quem vidit in via regia qua Roma Florentiam itur, in oppidulo cui nomen Aquæ pendulæ, declivi & depressa planitie feracissima nempe fruticem, quinque sexve cubitis proceriorem, Genistæ sarmentis pluribus, gracilibus, præduris, striatis, statim ab imo sese attollentibus, aut paullo supra lignosam radicem foliis ternis, pediculo subnixis, non ita numerosis, simili scæno-græco, angustioribus, habitioribus, rutaceis: flore Genistæ, vel Spartij, aut Pisi, luteo, sed minore: siliquis Genistæ paribus, cinericiis, gracilioribus, compressioribus, semine Genistæ, intus loculis discreto, ex atro virenti. Tota planta incana est, ut Rhamnus Mom-peliensis. Sapor Ciceris aut similis leguminis. Alteram idem notio rem frequentiorẽque, Italiæ & Galloprovinciæ exhibet, in squallidis saxosisque collibus inter Ilices cocciferas, & maiores Ericas virentem, florũque amœnissima copia oculos oblectatẽ, & capras pascentem æstatis initio. Sessquicubitales spargit is frutex virgas, tenues, lignosas,

CYTISVS

alter Pena.



CYTISVS

Hispanus Clusj.



tudine



rudine fruticis, quo aduolant apum mellificantium examina: odor illi gratus: sapor alterius: siliqua, & semen minora. Hos frutices pro Cytisi periti herbarij proponunt. Post eos Clusius aliquot alios frutices recensuit, ad Cytisi genera referendos, vt putat. Primus ad arbusculæ magnitudinem crescit, interdum,

## CYTISVS II.

Clusij Hispan.



## CYTISVS III.

Clusij Hispan.



stipite duro, materia flauesciente, medulla nigricante, maioribus ramis, & virgulis cortice candicâte obductis Tenelli ramuli toti hirsuti sunt: folia numerosa ramos ambiunt, terna singulis pediculis hærentia Medicæ modo, dilutiore virore, sapore leguminum viridium, amaro tamen. Aliquot flores extremis ramulis ferè spicæ modo insident, Genistæ similes, lutei, nonnihil odorati: deinde siliquæ Genistæ figura, oblongæ, asperæ tamen, & hirsutæ, in quibus semen exiguum, tumidiusculum, nigricans, Genista minus: radix lignosa, in diuersa tendens. Secundus est duorum cubitorum duntaxat altitudine, fruticosus, virgas ferens prorsus candidas, tenues, ramosas, folia superiori similia, terna semper, ex singulis pediculis pendentia, sed minora, omnino incana, & nunquam expansa, sed ferè semper complicata, dorso prominente, impense amara: flores vt in superiore extremis ramis insident, eidem forma similes, sed colore nitidiori & plane aureo: siliqua itidem oblôga, aspera, mucrone deorsum inflexo ex nigro purpurascens: semine quàm in superiore paullo maiore, & subnigro: radix superiori similis. Vterque prouenit in Salmanticensi agro, & aliis vtriusque Castellæ locis, secus vias: florêt Iunio, semen edunt Iulio, & Augusto. Tertiarius pedilibus, & raro cubitalibus, assurgit ramulis, tenuibus, prorsus incanis, quos exornant folia terna, breui pediculo nixa, quorum medium folium dupla lōgitudine reliqua folia superat, colore cinereo, & incano, sapore adstringente, & linguam exsiccante. Ramusculi fere ab imo ad summum per singulorum foliorum exortus floribus onusti exeunt, binis, aut ternis, simul nascentibus ex vaginula quadam molli, & candida lanugine hirsuta, aureo colore fulgentibus, odore iucundo, simili cum superioribus forma, sed minoribus. Inuenitur in variis Hispaniæ locis, præsertim Bætica, sed nusquam copiosior quàm in regno Valentino, vbi plurimus eius vsus. Nam qui bombyces alunt, eius ramos supra tegetes spargunt, quibus iam Mori foliis saturi bombyces stamina sua aduolunt, quæ deinde



CYTISVS IIII.

Clusij Hispanus.



deinde à mulierculis & pueris explicantur. Quartus, hominis est altitudine, oblongis virgis, non admodum fruticosis, neque obsequiosis, cortice nigrescente obductis: folia ei sunt Trifolij aut Medicæ, terna simul ex singulis pediculis, superna parte virentia, prona verò subrufa, lanugine hirsuta, sapore leguminum, amariuscule: flores ex alarum sinu quam in reliquis maiores, Genistæ similes, luteo auri colore. Solummodo ad montium radices circa Calpen, & Baticæ maritima, Februario florentem Clusius vidit. Cytisi folia auctore Dioscoride, refrigerant, tumores initio discutunt, si cum pane trita illinantur. Decoctum potu urinam ciet. Nonnulli quod apes alliciat prope aluearia serunt. Quod inquit Galenus, Cytisi folia digerendi facultatem obtinent aqueæ temperatæ mistam, sicut & Maluæ folia. Eius vero longe maximus fuit apud veteres vsus ad pecoris passionem, & ad lactis fœtuūque prouentum, vt diligenter tradidit Columella his verbis Cytisum, in agro esse quam plurimū maximè refert, quod

Li. 4. c. 108.  
Vires.

Lib. 7. sim.

Libr. 5.  
cap. vlt.

gallinis, apibus, capris, bubus quoque, & omni generi pecudum vtilissimus est, quod ex eo cito pinguescit, & lactis plurimum præbet ouibus: tum etiam quod octo mensibus viridi eo pabulo vti, & postea arido possis. Præterea in quolibet agro, quamuis macerrimo, celeriter comprehendit: omnem iniuriam

CYTISI FACIE

Alyssan quorundam Lobell.



sine noxa patitur. Mulieres quidem si lactis inopia premuntur, Cytisum aridum aqua macerari oportet, & cum tota nocte permaduerit, postero die expressi succi ternas heminas permisceri modico vino, atque ita potandum dari: sic & ipsæ valebunt, & pueri abundantia lactis confirmabuntur: &c. Eadem declarat Plinius, frutex est & Cytisus, inquit, ab Aristomacho Atheniensi miris laudibus prædicatus pabulo ouium, aridus verò etiam suum: spondetque iugero eius annua H. S. M. M. vel mediocri solo redditus (alias mediocri soli redditu) utilitas quæ Eruo, sed ocyor satietas, per quam modico pinguescente quadrupede, ita vt iumenta hordeum spernant. Non ex alio pabulo lactis maior copia aut melior, super omnia pecorum medicina à morbis omni vsu præstante (alij legunt medicinæ in omni morbo. Alij medicinæ & morbis ouium.) Quin & nutricibus in defectu lactis aridum, atque in aqua decoctum potui cum vino (dari iubet, & firmiores celsioresque infantes fore. Viridem etiam gallinis, aut si aruerit, madefactum. Apes quoque

Li. 17. ca. 24.



quoque nunquam defore Cytisi pabulo contingente, promittunt Democritus, & Aristomachus. Nec aliud minoris impendij est. Seritur cum hordeo, aut vere, semine, vt porrum: vel caule autumnò, ante brumam. Si semine, madidum: & si defint imbres, satum spargitur (Alij satum aqua spargitur) Plantæ cubitales seruntur scrobe pedali. Seritur per æquinoctia tenero frutice. Perficitur triennio. Demetitur verno æquinoctio cum florere desiit, vel pueri vel anus vilissima opera. Canus aspectu, breuiterque si quis exprimere similitudinem velit, angustioris Trifolij frutex (verius amplioris) Datur animalibus post biduum semper. Hyeme vero quod inaruit, madidum. Satiant equos denæ libræ, & portione minora animalia, &c. In hac Cytisi historia inscite Plinius vertit, (vt Porrum) ex aurore Græco, apud quem fuit, *ἡς ὡπαλός φνίετα*, id est, in areolis feri, quemadmodum & Columella reddidit. Cytisis subiungi potest Cytisi facie Alysson fruticans quorundam, auctore Lobellio, Parum admodum notus, perelegans frutex, exoticus rarus, nisi cultioribus Belgij viretis, vbi floribus luteis, Leucoij, minoribus æstate nitet, è sparsis numerosis, anfractuosis, Polemonij, istriatis cauliculis. Folia Cytisi, habitiora, albidia, hispida, setaceis pilis villosa. Radix lignosa, durior & in folliculis semen.

HALIMVS, CAP. LXV.

Nomina



ARIÆ sunt plantæ à rei herbariæ scriptoribus Halimi nomine descriptæ, & picturis expressæ. Nos de vero, vt arbitramur, Dioscoridis Halimo hîc dicemus ex Dalechampi sententia. Reperitur

Herm. cor.  
122. libr. 1.  
Dioscor.  
Corn. Em.  
lib. 99. lib. 1.  
Dioscor.

modo aspirata, modò nude scripta litera. Placet aspiratio, quoniam à falso humore nomen inuenit, vnde Ætius Halimum Halmyrida à falsugine appellari dixit. Solinus Alimon in Creta nasci tradidit, mirabili, si credatur, effectu, quod ad morsu ea interdum fames nulla sentiat, vt nomen inde positum sit ei quod famem arceat, propterea que nec aspirationem prima litera recipiat. Halimon Latini, vt Plinius, Anreonem vocant, Tolosates *L'herbe du malsou*, id est, herbam colicis doloribus vtilem. Multa alia Halimi nomina, in iis quæ falso Dioscoridi sunt adscripta, legere quiuis potest, quæ sciens omitto.

Li. 22. c. 22.

Est Halimon non parui erroris inter auctores, ait Plinius. Alij fruticem esse dicunt densum, candidum, & cætera ferè omnia quæ Dioscorides habet: alij olus maritimum esse dixere falsum, & inde nomen. Duorum præterea generum, siluestre, & mitius. Cratenas tertium genus addidit. Sunt & aliæ plantæ, vt diximus, Halimi nomine appellatæ. De primo genere, id est, de Diosc. & vero Halimo hîc tractamus. Halimus frutex paruus radicem habet altam, inflexam, longius euagentem, crassam, duram: caules multos, latius in orbem terram opacantes, cubito altiores, angulosos, ramosos: folia multa in surculis, per caules, cauliumque ramulos imparib<sup>9</sup> interuallis dispositis acruatim cumulata, crassa, candida, Oleæ similia, breuiora, quamuis Rhamno longitudine paria interdum sint, qualia in secundo genere Halimi sui describit Clusius, latiora Dioscoridi, molliora Plinio, vtrumque enim verum est, etiam hyeme virentia, saporis primum quidem salsi, ac subalstringentis, qualis in permultis maritimis plantis percipitur, deinde subdulcis. Ab hoc falso sapore Halimo vt diximus, nomen positum est, nequis à maritimis solum natalibus dictum existimans alibi prouenire neget. Semen producit latum, candicans, in summis ramis copiosum.

Lib. 1. c. 103.

Forma

Tertiū Halimi genus in maritimis frequens à Clusio descriptum, Crithmum est Dioscoridis, Italarum *Bidone*, quod suo loco declarabimus. Halimus Dioscoridi frutex est sepimentis idoneus, similis Rhamno, sine spinis, foliis Oleæ, sed latioribus, Nascitur in sepibus, & maritimis. Eadem planè Oribasius habet.

Li. 1. ca. 103.

Locus.

Lib. 11.

Li. 4. Hist.

cap. 20. &

lib. 5. caus.

cap. 22.

Theophras



HALIMVS

versus Dalech.



Theophrasto, Halimus autore vicinas plantas enecat, valentius quàm Hedera aut Citysus, nam & Citysum ipsum interimit, eoque perniciosius quò plus habet falsuginis. Scribit Ruellius in viuis Gallia sœpibus frequentem esse fruticem quem *Blancheputain*, rura vocant, gustu subacerbo in falsuginem vergente, quare mensis folia cum tenerescunt non esse ingrata. Eum fruticem si Halimon esse existimat, vehementer errat, vt capite de Spiræa diximus. Bellonius multis locis Halimi meminit, sed ita vt ex illius verbis quænam planta sit Halimus intelligi non liceat: Frutex Halimus, inquit, in Creta Halimatia vocatur, adeo ftequês, vt magna pars sepium ex eo constet. Cimæ sunt dulces. Idem alibi: Recensetur Halimus inter plantas perpetuò virentes. Idem in prato quodam plano se Halimum vidiſſe affirmat, qui licet natura se attollat in fruticem ramosum, sine spinis, vt in Creta, illic tamen per terram spargebatur instar Capparum spinosarum. Idem alibi. In Ægypto aggeres Nili mu-

Lib. l.c. 85.

Lib. 1. obf. cap. 18.

Ibid. ca. 44.

Ibid. ca. 60.

Lib. 1. Obf. cap. 31. Ibid. ca. 73.

niuntur fascibus ex Halimo: ac rursum. Sepes in Ægypto fiunt ex Halimo. Amarus Luf. etiam de Halimo satis multa, sed ita vt ex iis Halimum non internoſcas. Nec magis in hac historia ſibi conſtat Anguillara, qui aliquot locis provinciae Samnitum mari vicinis, Halimum propriè à Dioſcoride deſcriptum reperiri tradit, qui eſtur, ſepimentis que eſt idoneus: Aliud etiam genus ei non ſimile conſpici aliis in locis maritimis: poſtremo eſſe plantam iis cògruentem, quæ de Halimo ſcripſit Dioſcor. in Creta edulem ibi vocatam Sandalida, ex qua & ſepes fiunt in Sicilia. Cordus Halimum ſibi incognitum eſſe fatetur, conſiderandumque in hac planta cenſet, aut quomodo concilientur Dioſcorides, & Serapio. Ille enim ſcribit Rhamno ſimilem eſſe Halimum, ſed ſpinas non habere, hunc autem plures illi quàm Rhamno ſpinas tribuere. Serapionis hæc verba ſunt. Dioſcorides. Quæ ex hac planta naſcitur in campis, aſſimilatur Rhamno, ideſt Naufegi, niſi quia multas habet ſpinas, & folia eius ſimilia ſunt foliis Olearum. Ex quibus nihil aliud colligas, quàm Halimum ſimilem eſſe Naufegi, ideſt Rhamno, niſi Rhamnus ſpinas multas haberet, quo ſenſu Serapio Halimo, quam Molochiam vocat, ſpinas non tribuit: quamobrem eum cum Dioſcoride conciliare nihil opus eſt. Halimus Tolofa in hortis colitur, ſponte verò naſcitur in ſepibus, vt etiam auctor eſt Dioſcorides, præſertim ad vicum tribus miliaribus ab vrbe diſtanti, quem *Saint Hourens* vocant, loco macro, ſquallido, alto: vt rectè dixerit, Oribasius naſci in maritimis locis, & præruptis, itémque in ſepibus. Plurimum in Cilicia prouenire, Galenus ſcribit, vbi & germina eius recentia eſtant, & reponūt, in poſterum futura vſui. Semen pariter, & planta ipſa lac generat, guſtus ſalſi & ſub adſtringentis. Ex quibus omnibus perſpicuum eſt ipſam diſſimilium eſſe partium. Maior autem pars eius calida eſt temperatè, cum humiditate incocta, & leuiter flatuoſa, folia inquit Dioſcorides, decoquantur ciborum gratia. Radix conuulſa, rupta, torminàque mitigat, drachmæ pondere in aqua mulſa pota. Eadem lactis vbertatem facit. Quod autem radici tribuit Dioſcorides, Tolofates in foliis quotidie

In li. 1. Dio. cap. 121. Ca. 85. ſim.

Locus.

Lib. 1. c. 103.

Lib. II. Lib. 6. ſim.

Vires.

Li. 1. ca. 103



experiuntur. Horum enim manipulum terunt, & ex vino albo propinant, maximo doloris colici, torminūque leuamento. Quam ob causam *L'herbe du maseclou*, vulgo vocant. Quod lac attrahat, ipsūque ac semen augeat, rationi valde consentaneum est. Salsa etenim nitrosaque substantia crassiolem sanguinem extenuat, vt in mammas fluat, & penetret facilius, sub adstringente partes glandulosas roborat, ad lactis materiam melius concoquendam, dulci sanguinem copiosorem gignit: quoniam dulcia in sanguinem facile commutantur. Rustici pabulo sale condito, in pecudibus etiam lac magis affluere credūt.

## S A M B U C V S, CAP. LXVI.

Nomina

Corol. 184.  
lib. 4. Diosc.Lib. 4. c. 168  
Genera.

AMBUVS à Græcis ἀμβύς dicitur, ab Arabibus *Infacti*, ab Italis *Sambuco*, à Gallis *Sureau*, & *Sayer*, ab Hispanis *Sabugo*, & *Caninero*, à Germanis *Holder*, à cauitate, siue *Holler*. Sambucum arborem dictam putat Hermolaus à Sambuca, musico instrumento, quod alij petida vocant, alij Magadin. Sambuca porro ab auctore videtur appellata, cui nomen Sambyx fuerit. Vsam ea primam omnium Sibyllam perhibent. Dicitur & Sabucus arbor à Quinto Sereno. Sambuci duo genera sunt Dioscoridi. Vnum, Sambucus vulgo cognita in arborem assurgens: alterum humilius, Ebulus nomine, de quo sequenti capite. Prioris & si vnū tantum genus descripserit Dioscorides, id nimirum quod notum omnibus est, hūcque depictum, tamen à posterioribus duo alia obseruata sunt genera, syluestre scilicet, siue montanum, de quo in Silua egimus, & quibus notis à superiore differat ostendimus. Alterum palustre, siue aquaticum, de quo etiam infra dicemus. Sambucus vulgaris frutex est, sæpe in arborem accrescens, trunco crasso, lignoso ex quo rami multi prodeunt, harundinū modo rotundi, longi, recti, geniculati, caui, medulla alba, dulcique pleni, cortice cinereo obducti, cui subest alius viridis, medianus Officinis dictus. Ex geniculis prodeunt furculi, circa quos folia, saturæ viriditatis, in ambitu parum crenata, grauis odoris. In ramorum summitatibus flores sunt candidi, in umbellis. Deinde bacca rotundæ, initio virides, tandem ex nigro purpureæ, copioso succo vinosæ, in quibus semen est minutulum, & cōpressum. Sambucus Dioscoridi, furculos spargit arundinaceos, teretes, cauos, candicantes,

## S A M B U C V S.



Capit. 31.

Forma.

Lib. 4. c. 168.

Andr. Lac.

Lib. II.

proceros: folia iuglandis terna, quaternæue ex interuallis circa ramos exeunt, graui odore, minutim in ambitu secta: in ramulorum cacuminibus cauliculifque circinatae umbellæ, quæ florem candidum pariunt, mox acinum Terebintho similem, in nigredine sub purpureum, racemosum, succo madentem, vinosumque. Quos hūc furculos cauos vertit Ruellius, Græcè legimus *ὑποκλάδεις*, idest aliquantum cauos; neque enim Sambuci furculi omnino sunt caui, sed laxa medulla pleni. Vbi verò folia dixit graui odore, minutim in ambitu secta, legitur in vetere codice, *βαρύτερα ὅ καὶ πικρότερα*, idest, odore graui, amarioraque. Oribasius



bafius legit *μακρότερα*, idest *lōgiora*, alij *μικρότερα*, minora. Theophr. diffusius Sambucum exprefsit his fere verbis quæ ideo refero, quia Theodori interpretatio non placet. Sambucus maximè iuxta aquas nascitur, & in vmbrosis locis, in aliis tamen etiam prouenit (legendum enim, *ἐν μὴ τοῖς τοῖς τοῖς*) fruticosa est, virgis anniculis vsque ad foliorum defluuium in longitudinem crescentibus, postea in crassitudinem. Virgarum proceritas non valde magna, sed senum cum maximè cubitorū. (*Τῶν δὲ τελέων πάλχος τῶν γερανδρῶν ὅσον περιεφραγίας*,) caudicum veterum crassitudo, quæ trabis in nauium prora super carinā positā (nam *περιεφραγία* polluci *τὸ λος*, lignū mediū super carinā erectū vnde pēdet anchora, & cui vtrinque affiguntur conti lignei, *ἀπὸ προεμβολίδες*, excipiendis rostris areis, vel ferreis subrecti, & prominentes, *ἐμβολα* vocant, quibus ad cōfringendā hostilē classem imperus fit. Cū ea trabe vetusti Sambuci caudicem Theophr. cōfert, non cū galea. Vocabulū id nauticū Atheniensibus & Lesbiis notissimū & vsitatissimū fuit) cortex laevis, tenuis, rufus: materies fungosa, si reficcetur, levis, medullā mollē habens, vt totā virgā concauentur. Ex hac baculos leues faciūt. Siccata valida est, & in aquis minimè senescens, etiam si delibrata fuerit. Delibratur autem sua sponte cum aruerit. Radices per summā terram spargit, non multas, neque magnas. Folium sigillatim exit molle, oblongū, veluti Lauri latifolia, sed maius, latius, rotundiūque à medio & inferiore parte, suprema autem in acutum contractius, in ambitu ferratū: totū autem circa vnū pediculū crassum neruofūque, veluti ramulū pendet. Foliorū alia hinc, alia inde geniculatim coniugatimque adhærent, à sese distantia, vno ex pediculi fastigio exeunte, subruffa leuiter, rarāque. Defluit totum simul. Quare id totum vnū folium esse merito putaueris. Rami quoque nouelli quādā geniculorū specie habent. Flos albus ex multis paruis candidis constans, specie faui, pediculi diuisi surculis infidet. Huic odor validus, qualis est Lirij, non nihil grauis. Similiter fructum edit, racematim, pediculo crasso subuectum. Maturescens nigrescit, immaturus *ὀμφακώδης*, idest acerbus est, vel vix acerba colore, magnitudine Erui, paulo maior. Quæ sequuntur adeo sunt deprauata, & mutila, vt vix vllus ex iis sensus elici possit. Sic in vulgaris exemplaribus leguntur. *τὴν ὑπερπρίαν δὲ ὀνῶδην τῇ ὀψι, καὶ τὰς \* χεῖρας δὲ τελέως, ἀναβλάσκει δὲ καὶ τὰς κεφαλὰς, ἔχει δὲ, &c.* Quæ Theodorus sic interpretatus est. Humore aspectu vinaceus, & interna visu Sesamacea continet. Sed sic corrigi, restituīque possunt ex Diosc. & Plinio. *τὴν ὑπερπρίαν δὲ ὀνῶδην τῇ ὀψι καὶ ὁπρὸς τελέως ἀνήκει, τὰς χεῖρας ἀναβλάπτουσαν, καὶ τὰς κεφαλὰς ἔχει δὲ, &c.* Idest, humorem specie vinosum maturus fructus reddit, manus & capillum tingentem. Quæ intus continentur Sesamo similia sunt. Sambucus in sepibus nostris frequentissima, locis humidis & vmbrosis gaudet. Maio mēse floret, aut paulò serius. Septembri fructus maturus est. Sambucū aliam Lobellius ostendit, foliis Laciniatis & minutim dissectis, in Belgij hortis virentē, quæ alioqui fructu, flore & ligno, à vulgari nō differt. Sābuci & Ebuli vis eadem, inquit Diosc. & vsus exsiccans, aluo detrahens aquā, stomacho inutilis. Folia Olerū more coquūtur ad pituitam bilēmque detrahendam. Caules teneri in patinis cocti eadē efficiūt. Radix in vino decocta, & in cibis data hydropicos adiuuat: prodest viperarum morfibz eodem modo, vulgas emollit infidentiū decocto, patefacit earū spiracula, & vitia corrigit. Acinij in vino poti eodem funguntur munere: denigrāt capillos illiti. Folia prætenera ac mollia si ex polenta illinantur, inflammationem mitigant: ambustis, & canum morfibz illita profunt: vlcera quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant. Iis qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino profunt illita folia. Plinius partim eadem, partim etiam ampliora quam Diosc. tradit. Sambuci & Ebuli decoctum inquit, in vino vetere foliorū, vel seminis,

Lib. 3. Hist.  
cap. 13.Locus.  
Tempus.Li. 4. c. 168.  
Vires.

Li. 24. ca. 8.



*SAMBUCUS* foliis,  
Laciniatis Lobell.



Lib. 16. c. 37.

Lib. 6. sim.

Lib. 7.  
Li. 4. Diosc.  
cap. 168.

Dodo, li. 3.  
cap. 44.

acinos habent nigros, atque paruos, humoris lenti, inficiendo maximè capillo, qui & ipsi aqua decocti manduntur. Vtraque Sambucus, Galeno, tū magna illa, & arborecens: tum herbacea, quam & Chamæacten vocant, desiccandi, conglutinandi, modicèque digerendi facultatem obtinet, quibus verbis Paulus adicit, potam & manducatam aquam per aluum educere. Aqua ex Sambuci floribus, auctore Matth. fronti &incipiti admota capitis dolores mulcet à calido humore ortos. Succus ex radicis cortice vomitum valentissimè ciet, & aquā inter cutem pellit. Ex Sambuco vnguentum præstantissimum ad igni ambusta fit hoc modo. Corticis viridis qui libro & ligno intercedit librā vnā, olei ex aqua stillaritia florū Sābuci sēpius loti libras duas simul feruere aliquādiu finito, percolato, exprimito: deinde additis ceræ nouæ odoratæ, succi furculorū Sābuci, singulorū, vnciis quatuor rursus ferueant simul, quousque succus euanescat. Ab igne sublata hæc rudicula agitator post, sub cocturæ finē Vernicis liquidę vncias duas, Thuris in tenuem pollinē triti vncias quatuor, albumen ouorū duorū diu priº cochleari agitatu addito, permiscetorq; omnia diligēter, & mūdo vase asseruato. Fungi ad imū Sābuci caudicē nati, aqua rosacea prius macerati, capitis dolores & inflāationes mulcent: Stillaritia tū Sābuci, tū Ebuli radicū aqua hydropes tympanite laborātes mirificè iuuat, si huius binas, illius quaternas vncias simul mistas hauriāt ægri diebus trīginta cōtinuis, vsta Sābuci folia, & in puluere trita manātē ex naribus sanguinē sistūt. Baccarū Sābuci succus à recremento purgatus, & cū melle optimo coctus ad zupij crassitudinem, aurium dolores sedat, si calidus instilletur. Sābuci tenerrima folia, quę prima statim germinatione prodeūt, cū pari pōdere radicū plātaginis, suillæque axūgiæ veteris cōtrita, subactaq; podagricos dolores præsentaneo auxilio mulcēt. Quod in baccis semē cōtinetur minutulū & cōpressum hydropicis pdest, & nimiū obesis qui macilēti fieri volunt, si quotidie drachmā vnā in vino biberint. Sed id diu faciendum.

EBVLVS



## EBVLVS, CAP. LXVII.

**Q**VAMVIS Ebulus herba sit potius quàm arbor, aut frutex, tamē veterum omnium exemplo Sābucō nos coniunximus. Dicitur hæc etiam Latinis Ebulum, Græce χαμαίοκλυς, idest humilis Sambucus, aliis Helion, inquit Plinius, Arabice Kameactis, Gallice Hieble, Italice Ebulo, Anglice Maluourt: & Bloedtuourt: Belgice Hadick, Germanice Attich, & Niderer hol-  
 der, Hispanice Hiez guos, & Sabugo pequeno. Ebulus caules producit longos, rectos, crassos, angulosos, geniculis distinctos, ramulorū Sābuci modo, in quibus folia obscura viriditatis, foliis Sābuci, tū odore, tū figura similia. In caulium summitate

Nomina

Lib. 24. c. 8.

Forma

Li. 4. c. 163.

## EBVLVS.



Ebulum Sambuco longe humilior est, inquit

Diosc. magis que herbaceo generi assignandū,

caule quadrangulo, geniculato: foliis Amyg-

dale, ex interuallis, longioribus, geniculatim

expansis, pinnatisque, graueolentibus, in am-

bitu serratis: muscario Sābuci, flore, & acino

eiusdē. Radice nititur longa, crassitudine di-

gitali. Ebulus locis incultis, & secus vias, non-

nunquā & in agris prouenit. Tardius floret,

Iunio videlicet, & Iulio mēribus, Augusto bac-

cas profert. Sambucus & Ebulus adeo inter se

sunt affines, vt earū vires ab auctoribus, at-

que etiam à nobis superiori capite simul sint

explicatae. Quædā tamen alia hic exponuntur:

Ebuli quoque, quem nemo ignorat, sumo fu-

gantur serpētes, inquit Plinius: ac rursus Ebu-

lū tenerū cū foliis tritū, ex vino potū calculos

pellit: impositū testes sanat. Et aliquāto post

inter ea quæ hydropicos sanant numeratur

Ebuli recētis radix excussa tantū, nec colluta,

quantū duo digiti cōprehēdat, ex vini veteris

calidi hemina: ac mox, Acte quā quidā Ebulū esse putant, radice cōtrita in vini

cyathis tribus, si febris absit, vel semine ex vino nigro. Præcipue tamen chamæ

actæ succus aptissimus creditur, ac rursus, Ebuli folia contrita, & e veterē vino

imposita Boā sanāt, idest rubētes papulas. Scribit Cornarius Pliniū alio loco vi-

deri Ebulū Actæā appellasse. Actæa graui foliorū odore, caulibus angulosis (non

asperis, neque anisi, vt vulgata exēplaria falsō habēt) geniculatis, semine nigro,

vt Hederæ, baccis mollibus. Nascitur in opacis & asperis, & aquosis. Datur ace-

tabulo pleno interioribus scēminarū morbis. Paulus quoque Actææ radicē in vi-

no coctā hydropicis bibēdā exhibet quo loco ipsemet Cornarius, & Anderna-

cus Actæā Sābucū interpretati sunt, etiā si mox corticis radicis Sābuci succū cū

cōdito iisdē hydropicis Paul⁹ propinet. Alij Plinij Actæā lōge diuersam ab Ebu-

lo esse statuūt, de qua suo loco dicemus. Reliquas ebuli vires persequamur. Ex

radicibus Ebuli extractus succ⁹ magnopere vomit⁹ ciet, & aquas detrahit, cras-

samque pituitā ad articulos fluentē. Ebuli semē permultis in aqua lotionibus à

nigro succo expurgatū datur vtiliter ex Chamæpityos decocto drachma pon-

dere podagricis, ischiadicis, & hispanico morbo laborantibus: dolores enim eo-

rum mulcet, humores cōfluentes tum reuocādo, tū deiciēdo. Sunt qui ex Ebuli

radicibus succum eliciant, & insolutum in pastillos redigant. Hic clystere infu-

sus intestinorum & coxendicū dolores à frigiditate & flatu genitos mitigat.

Locus.

Lib. 25. c. 10.

Vires.

Lib. 26. c. 8.

Capitulum.

Emb. 13. li.

4. Dioscor.

Lib. 27. c. 7.

Actæa non

est Ebulus.

Li. 3. ca. 48.

Matth. lib.

4. Dioscor.

cap. 168.



Lana exceptus inditur foëminarũ locis ad menses euocandos. Illitus Ebuli radicũ succus procidentem sedem reprimat, & anginam tollit, si circa gulam calidus illinatur.

*SAMBVCVS AQUATICA, THRAVPALVS*  
*THEOPHR.* (AP. LXVIII.

**Nomina**

Lib. 1. c. 109.

Lib. 4. Hist.

cap. 1.

**Forma**



LIAM Sambuci speciem diximus esse Sambucum palustrem, siue aquaticam. Galli *Obier*, vel *Opier*, Germani *Bachhoder*, vocant. Belgii, *Gelders Roosen*. Opulus tamen non est, vt Ruellius existimauit. Theophrastus multorum iudicio *θραυπάλον* appellat. Arbuscula est vlig-

*SAMBVCVS*

*aquatica, Thraupalus*

*Theophrasti.*



**Tempus.**

notis & palustribus locis nascens, virgis Sambuci amulis, geniculatis, alba intus medulla, sed fragili, & caduca materie: folio vitigineo, sed minore: flore in mustariis albo Sambuci modo, odore non prorsus iniucundo: qui in multis Germania locis cultu & crebro satũ densissimus sit ac spississimus, fertisq; additur, aspectu valde formosus. Ab eo bacca prodeunt rubentes, baccarum *Oxyacanthæ* magnitudine, vinoso succo plena, quæ deuorata vomitiones cient. Floret Maio mense, bacca Septembri sunt matura.

*EVONYMVS.* (AP. LXIX.

**Nomina**

Li. 1. ca. 77.

Lib. 27. c. 4.

Lib. 3. Hist.

cap. 18.



VONYMVM (quam aliqui Anonymum vocant, quasi a non habendo nomine inuenerit inquit Ruellius: quam Anonymos alia planta, herba Plinio sit,) arbusculam esse hic depictam, & à Theophrast. descriptam herbarij non pauci credunt, multis sane notis eorum sententiæ adstipulantibus: aliis *Chamænerion* dicitur, idest humile *Nerium*, siue *Rhododendron*, siue *Nerium Alpinũ*, quod foliis, flore, fructu siliquato, quam-

uis siliquis diuersis *Nerium* vtumque referat. Balsamum Alpinum Gesnero, & Rosa Alpina: Matthiol. vero libr. primo in Discor. Cneoron vocat quamuis idem alterum Cneoron Theophr. pinxerit libr. quarto in Dioscor. qui hanc *Euonymum* esse putat, arborem pro *Euonymo* hactenus receptam, *Fusoriam*, & *Fusanum* appellatam, *Euonymum* esse negant, sed Theophrasti *Tetragoniã* esse volunt, Plinij virgam sanguineam à Sanguineis eiusdem fruticibus diuersam. *Euonymus* auctore Theophrasto, cum alibi, tum in *Ordymno* Lesbi monte nascitur (sic enim ex Plinio legendum, non *ὀρυκνίω ὀρδύνω καὶ λευμένω*, vt Theophrasti exemplaria habent) magnitudine folioque *Punica*, pariter molli, maiore quam *Chamædaphnes*. Circa Septembrem germinare incipit, floret vere, floris color qualis in *Leucojo*, odore graui, & qualis sentitur trucidato caduere in tabum putrescente, vel quasi casum animal referat (sic enim hæc vertenda videntur, *ὅς ἐστι λευκὸν, ὡς περ φόνος*, Plinius transtulit statim pestem denuntians, sed non satis recte alioqui cum floreat quotannis, pestem quotannis facere necessum quoque foret,) fructu cum suo putamine loculoque *Sesami* sili-

quis

Lib. 3. Hist.

cap. 6.

Li. 24. c. 10.

Lib. 3. Hist.

cap. 18.

**Locus.**

Lib. 3. ca. 3.

**Forma**


Li. 13. ca. 22.



quis non absumili, intus solido, sed in quatuor versus distincto. Esu letalis est arbor tam fructu, quàm foliis pecori, & ouium gregibus, sed præcipuè capris, nisi purgentur. Purgantur autem inedia & cibi abstinencia. Quæ postrema sic

## EVONYMVS

Theophrasti.



fidelius opinor, traducta sunt, quàm à Theodoro, qui sic reddidit. Hic pecus enecat gustatus: quinetiam folium idem facit, & potissimum capras, nisi purgentur, interimit, purgantur autem anocho. Nusquam certe legi quid sit ἀνοχον. Quare ἀνοχον legi potest, id est inedia, & cibi abstinencia. Alij ἀνοχον interpretantur vomitionem, & per superna purgationem, ut vox sit ἀπό τῆς ἀνά. Sic interpretatur Dodonæus, cum scribit esu foliorum capras interire, nisi superne & inferne purgentur. Plinius vertit. Succurrit aliquando præcipuè alui inanitio. Nostras hæc Euonymus in Allobrogum saxosis & asperis montibus nascitur, prope Muram oppidum, decem miliaribus à Gratianopoli distans, Punica non altior, sæpius breuior, & fruticosa, ramis virgultisq; multis: folio carnosio, oblongo, Punica vel Laureola albæ simili, ni minus esset, Rhododendron emulante, quam ob causam Chamænerium vocat, tactu molli, superne viridi, inferne rufo, flore in ramorum fastigio copioso, Leucoio simili, purpureo, aspectu pulcherrimo, graueolente, tanquam virus cruores effusi, & corrupti naribus afflante, fructu siliquæ specie. Hanc & capras & oves refugere opiliones asserunt. Dalechampius quidem cum attentius contemplaretur caprarum greges, vicina fruteta depascentes, nullam vidit quæ hanc attingeret, atque adeo cum decerptam obiceret, auersari deprehendit. Allobroges apud quos nascitur, vocant *Des ourles*. Huic de Euonymo opinioni qui refragabitur, primum obiiacet Euonymum Theophrasti folio esse maiori quàm Chamædaphne, cum hæc nostra folio sit minori. Deinde florem illius similem esse colore τῷ λευκῷ ἴσῃ, id est albæ Violæ: at huius flos purpureus est. Postremo eiusdem florem non tam abominandi esse odoris: quibus respondere perfacile est. Nam quo loco folium maius Chamædaphnes folio esse dicitur, mendum subesse asteriscus indicat, & Gaza non Chamædaphnen, sed Clematidem legisse videtur, qui vincamperuincam verterit: florem vero non λευκῷ ἴσῃ similem esse lego, sed λευκοῖσιν, præsertim puniceo. Multa enim sunt genera τῆς λευκῆς præter album, & luteum, figura & colore distantia. Adhæc floris tam grauem & detestandum odorem potest non significare vox φόνος. Nam præter eum quem diximus, significat odorem etiam Atractylidis, quàm φόνον à quibusdam appellatam fuisse auctor est ipsemet Theophrastus: quo loco, pro ἐχθρὴ δὲ τὴν Lib. 6. Hist. cap. 4. ὁσμὴν δὲ τὴν καὶ φονάδην, vel δυσωδὴν, legunt alij ῥητινώδην, quem odorem Atractylidi conuenire optimè sciunt, qui plantam nouerunt. His adde huius nostræ Euonymi fructus quatuor folliculis constare, (Theophrastus τὰ κελύφην vocat) oblongis, ex quibus coniunctis vnica videtur componi siliqua, Sefamo verò à Matthiolo picto similis, grano intus solido.



Nomina

Lib. 3. Hist.

cap. 6.


In Diosco.

lib. 1. ca. 114.

Forma.

TETRAGONIA

Theophrastus.



Locu.

Lib. 3. c. 17.

VONYMVM falso creditam ab omnibus fere herbariis, Theophr. Tetragoniam multorum Herbariorum sententia esse diximus. In Tuschia, inquit Matthiolus, *Silio* dicitur, ab aliis *Fusaro*, quod ex ea optimi fusi fiant, *Fusoria*, & *Fusanum* à recentioribus, à Gallis *Fusain*, *Couillon de Prestre*, & *Bois à faire lardoires*, quod ex ea culinæ transfigendis lardo carnibus verucula faciant, à Germanis *Spindelbaum*. Frutex est in arborem non assurgens, ramis multis, cortice in vetustis, & trunco, candicante, in nouellis virente rectis, qui ob linearum quatuor rufarum, serratarum, dorsum modo extantium, recta per viridem corticem porrectarum discursum quadranguli apparent, id quod huic arbori non solum peculiare est, sed etiam, quod in fructu quadrangula siliqua sit. Quam ob causam *Tetraptylos* dicta est. Gaza Quadratoriam interpretatur. Ligno est duro, flauo: foliis longis, latiusculis, teneris: flosculis candicantibus, quinis, sessibus simul: folliculis paruis, rotundis, quaternis simul coniunctis, qui maturo intus semine dehiscunt, membranula lutea contexto, quæ si in aqua maduerit, luteo colore inficit. In sepibus nascitur, & in agrorum sylvarumque limitibus. Floret Aprili mense, Septembri fructum perficit. *Tragus* pro Theophrasti *Συζα*, id est *Carpino* non sine errore descripsit.

## PERICLYMENUM TERTIVM,

## CAP. LXXI.

Lib. 6. sine.

Forma.


Li. 3. purg. cap. 22.

Le frutex in plerisque Sabaudia, & Heluetia locis crescit, quem Dodonæus pro tercio Periclymeni genere depinxit. A reliquis Periclymeni generibus hoc differt, quod nullis viticulis vicinis frutibus sese alliget, & circumvoluat, sed sine adimiculis stat, & per sese erigitur. Foliis est longis, mollioribus: floribus item longiusculis, candidis, multis intus capillamentis, binis floribus semper in singulis pediculis: binis similiter baccis, rotundis, in rubro nigricantibus cum maturæ sunt. Has ab Heluetiis appellari scribit Dodonæus *Hundskirschen*, id est *Cerasa canina*. Huius fruticis meminit etiam Gesnerus. Periclymeno, inquit, cognatus est sylvestris frutex, qui locis saxosis nascitur apud nos passim, in sepibus, muris, syluis, acinis rubicundis, gemellis. Non circumuoluitur. *Brimhungen* vocant Heluetij, à duritie ligni tanquam ossea, unde *Xylostei*, id est ligni ossei nomen ei dedit Dodonæus, qui luculentius eam stirpem alio in loco descripsit. Caudice est, inquit, mediocris crassitudinis, materia ligni candida, ramulis rotundis, albicante cortice contextis, initio tamen & cum primum erumpunt subrubentibus, foliis alterius Periclymeni oblongis, mollioribus, ex albido virentibus, prona parte candidioribus, ac leniter hirsutis: Flores minores sunt quam alterius Periclymeni candidi, bini in vno pediculo: succedunt fructus gemelli, instar exiguiorum Cerasorum, rubentes,



## PERICLYMENVM

tertium Dodon.



## PERICLYMENVM

rectum secundum Clusij.



rubentes, altero eorum sæpe minore. Aprili, aut Maio floret: fructus Autumnomaturus est. Clusius alia duo genera Periclymeni erecti, quodq; nullo adminiculo egeat, descripsit. Periclymenum erectum secundum, inquit, superiore multò humilius est, ramis multò gracilioribus & rarioribus, cortice albicante obtectis: folia quàm prioris teneriora, longiora, per ambitum nonnihil ferrata, superiore parte virentia, inferiore parum lanuginosa, non adeò tamen ut superioris. E tenellis germinibus inter folia nascuntur exiles pediculi, vnum & plerumque binos flores sustinentes, superiore minores & teneriores, neque ut alterius pallecentes, sed purpurascens, quibus succedunt fructus gemelli non minores quàm in superiore, sed nigri, succulenti, gustu ingrato: radix dura, lignosa. Tertium genus est prorsus humile, & quod raro ad cubitalem accedat magnitudinem, ramis secundo crassioribus, candidioribus, lentis, & fractu contumacibus, contrà quàm in duobus superioribus: folia omnium maxima, Laurinis non minora, in extremo mucronata, superne virentia, inferne candidiora, sed nulla lanugine obducta, neque in ambitu ferrata, duriora etiam quàm superiorum: flores in oblongo crassiusculoq; pediculo gemelli, superiori forma similes, candidi: fructus plerumq; vnicus, raro geminus, etiam si gemino flori succedat, omnium crassissimus, exigui Cerasi magnitudine, ruber, succulentus, pellucidus, duobus in summo, ubi flores inhaeserunt vestigiis insignitus, vnicum granum continens. Floret vterque cum aliis Periclymenis. Semen secundi Iulio, tertij Augusto maturefcit. Secundus rarus est inuentu: vnicum fruticem so-

Lib. i. stirp.  
Hispa. c. 25.

Tempus.

Locus.

SALI



Lib. 3. Hist.  
cap. 13.

Nomina

Cap. 37. 16.

Cap. 30. li. 4.

VANQVAM Salicē *ωάπυδρον* esse, id est aquaticā dixerit Theophr. ideoque cum iis plantis quæ umbrosis, vdisque locis gaudent explicanda foret, tamen cum etiam in frutetis ac nemoribus Salices proueniant, & in sepibus cum aliis fruticibus dumisque, circa hortos, vineas, agros, aquarum ripas, & rusticas casas, hinc de Salicibus tractare haud absurdum fuerit, quamuis tractationis consecutione quædam genera hinc exponantur, de quibus aliis fortasse magis idoneis locis dici possit. Salix Latine appellata dicitur, quod ea celeritate crescat, vt salire videatur. Eadem de causa *ιτέα* Græcè *ωάπυδρον* Arabibus *Bules*, *Bhulles*, *Saffas*, aut *Chalif* dicitur, Gallis *Saulx*, & *Saule*, Italis *Salice*, & *Salcio*, Germanis *Vueiden*, & *Felbinger*, & *Meydenbaum*, Hispanis *Salce*, & *Salgueiro*, Boemis *Vurba*, Belgis *Mulheboem*. Salicis multas species veteres distinxerunt, colore primum, albo: nigro, siue purpureo, siue phœniceo, & Vitellino, siue rubente, qui in cortice spectatur: deinde, vsu: quod alia sit perticalis, alia viminalis, alia fisisilis. Postremo q̄ alia præbeat vnde vincula fiant, alia virgas textiles ad varia opera tennes & inualidas alia, aliæ firmiores, & crassiores: quibus præcipuis differentiis adde si libet & hæc, quod alias steriles esse omnes fateantur, quandam verò fructum edere nonnulli putent, vt Arcades Helicem. Albæ Salices duæ sunt, altera perticalis, arborecens, perticas emittens in magnam proceritatē, vinearum iugis, ridicis, compluviatis cameris aptas, & stipitibus, quos sustentandis, ac cōtinuandis sepibus defigunt. Huic potissimum conuenit quod scribit Plinius, Cæduæ Salici densiorem esse tonsura fertilitatem, & breui, ligno verius quam ramo, sic enim emaculandus est ille Plinij locus. Viminalis est, alba secunda, quam & Gallicam nominant Autores, excepto Columella, cui Viminalis nigra, Gallica dicitur. Huius inter Viminales firmissimæ quidem virgæ sunt, non vt apud Plinium legimus, tenuissimæ, & aliis crassiores, Theophrasto *ωυκνοτέρας*, derisiores, non *ωυπποτέρας*: laudatæ ad corbes, supinas cathedras, & agricolarum plurimam supellectilem, vasis melioribus quàm si è corio fiant, sic enim apud Plinium quidam legendum censent, quamuis seruata scriptura intelligi possit, non tanti esse vasa illa, vt corium magno sumptu conquirendum sit, è quo conficiantur. Natura quidem albicat huic cortex, & nonnihil scaber est, verum eo detracto magis candicat, tractatūq; vel vt quidam legunt, attritu, politur, ac læuigatur. Sic ergo verum est, quod ait Plinius, albæ, nempe vtriusque huius, agricolis vsum esse. Nigra cuius color niger est, vel phœniceus Theophrasto, purpureus Plinio, obsolete purpurascens Columellæ, Gallicam vocanti, vt monuimus, Viminalis quoque est, ad cistarum & calathorum opera lauciora experita virgarum prætenuium spectabili subtilitate. Ruber seu vitellini coloris est Græca, etiā viminea, quam Latini peculiari nomine vocant Amerinam, nos seruato prisco vocabulo *Amarines*, & *Ambres* nuncupamus. Flauam in hoc genere Columella Græcam priuatim appellat, rubram autem, siue rutilam, gracilibus virgis, Sabinam, & hanc Amerinam veram esse inquit. Flaua Plinio Vitellina à colore vitellorum, cui dicitur, agnoscente in Plinio hanc lectionem Hermolao, ex vetustis codicibus, cum in nostrorum quibusdam legatur Nicelina, in aliis, Italina. Quemadmodum arborecens candida, pertica ad vsus de quibus nos supra discernimus, ita huius virgæ finduntur, sequacis ad vincuturas lentitiæ, vitibus iugandis, ligandis, palandis, in hortorumque marginibus, ac ambulationibus Rosserigendis, ac reuinciendis: ad quem vsu etiam perticarum arborecens Salicis baltheus corticis laudatur, nimirum cortex ille crassus, quo vestitæ spoliantur, dum ad pedamenta eas findunt. Apud Plinium, & recte, vt arbitror, quidam



quidam legunt: Finditur Græca rubens, Amerina, vt & candida, haud paulo flexilior: ideo solido ligans nexu: nam fragilioris solidus esse nexus non potest. Theophrastus viminalis albæ & nigræ quoddam genus tradit, vt in Cedris, & Palmis, in altum nunquam crescere, (siue naturæ proprietate id contingat, siue ariditate soli, siue opificibus viminum crebrius tondentibus:) idq; vocari ab Arcadibus Helicem, vel quod Hedera modo, quam Helicem vocant, humi repentis, humilis semper sit, vel quod εἰς τὰ πλεονάζοντα, ad viminum textus plicatilis est. Putant, inquit Columella, tria esse genera præcipua Salicis, Græcæ, Gallicæ, Sabinæ, quam plurimi vocant Amerinam. Græca flauæ coloris est, Gallica obsoleti purpurei, & tenuissimi viminis. Amerina Salix gracilem virgam & rutilam gerit, quæ omnia intelligenda esse de Viminali ex superioribus liquet, ac eius auctoris testimonio, qui illic de viminea Salice verba se facere apertè loquitur. Matthiolo, Salicis quatuor sunt genera. Nam quædam in tantam proceritatem assurgunt, vt ex eis in Liguria fiant perticæ & pali maximi vsus ad vitium pedamenta. Aliæ non tam proceræ colore rufescentes, sequacis Lentitiæ, quæ ligandis cadorum vinariorum circulis commodè finduntur. Hanc Salicem Græcam vocat Cato: Aliæ firmiores, corbibus, & rusticæ supellectili admodum expetitæ. Aliæ minores ac mira tenuitate texendis canistris, cistellis, calathis aptissime. Tragus quatuor quoque Salicis genera constituit: Fuschius tria, Dodonæus duo. Vnam quæ cæterarum arborum modo in proceritatem magnam assurgit: alteram quæ semper humilis est, & vimina profert. Huius cortex interdum rubescit, aliquando candicat, nonnunquam flauescit. Salicum differentias à locis in quibus nascuntur, vsu, & corticis colore potissimum hic sumemus ex Dalechampio. Salices igitur aliæ sunt πέρυλοι, id est aquaticæ: aliæ sicca loca non dedignantur, vt Amerina, quæ in vineris quantumvis aridis, & siccaneis passim profilit. Aquaticarum aliæ pigris & stagnantibus aquis gaudet, & ad riuorum fluuiorumque margines, vel leni lapsu fluentium, vel pingue crassumq;

Lib. 17. c. 20.  
Lib. 4. c. 30.

Lib. 1. Dio-  
scor. c. 117.

Lib. 3. c. 60.  
In Hist. pl.  
cap. 25.  
Lib. 6. c. 67.

*SALIX ALBA,*  
*Perticalis vulgaris.*



solum rigantium proueniunt: aliæ glareosis, lapidosis, arenosisq; torrentium & rapidorum amnium ripis. Ex corticis colore, candido, nigro, phœniceo, luteo differentia aliæ sumuntur. Primum genus ex eiusdem Dalechampi sententia dicimus esse vulgarem Salicem, in magnam arborem crescentem, cortice candido, quæ Theophrasto, ac Plinio est Salix alba, prior, arborefcens, & perticalis. Nec Fuschij placet opinio, qui Salicem Theophrasti candidam Plinij Vitellinam, id est flauam, esse putat, quoniam in flaua Salice virgas πυκνότερας spissiores, quàm in nigra non videmus, vel, vt quidam legunt, καρυώτερας, id est, fragiliores: quas tamen habet candida, Theophrasto auctore, sed tenuiores Plinij sententia, vel, vt legendum supra monuimus, firmiores. Cæterum folia habet Salix arborefcens oblonga, angusta, Oleæ similia, superne virentia, inferne candicantia. In locis madidis crescit, circum prata rigua maxime. Secundum genus Salix est Platyphyllos, siue Leucophlæos, id est latifolia, & candido cortice:

1. Salix vul-  
gar. candi-  
da.

*Forma.*  
Lib. 3. Hist.  
cap. 13.  
Lib. 16. c. 37.  
Li. 17. c. 20.  
Ibidem.

Ibidem.  
Ibidem.

*Locus.*  
2. Latifol.  
cand.

*Forma.*  
huic



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,  
*SALIX PLATYPHYLLA*  
*phyllos Leucophlæos.*




huic enim etiam candicat cortex, sed vergente in cinereum candore, folio brevior, latior, aduersa parte incano, aduersa pallidius virente, in ambitu serrato: interiore cortice rubro, quod huic generi proprium est, exteriore ad ligandum apto, ut & ligno contuso, ac intorto. Quamobrem eo rustici Allobroges lignorum fasciculos quos venales in oppida comportant, vinciunt: ligno fragiliore quam in priore. Hanc quidam pro

*SALIX PURPUREA*

*Locus.*

*nigra, viminalis.*




*Salix purpurea.*  
*Forma.*

Elæagno depinxerunt. Gignitur in solo macro arenoso, lapidoso, sed vdo, ad torrentium margines, & in sylvis umbrosis, præsertim qua collectis in lacunas aquis terra humescit, aut qua fontium scaturigines profiliunt. Huius carbonis ignem concipit, quapropter ad pulverem excutiendis bellicis tormentis necessarium vritur. Præstat etiam delineandis iis quæ pictores ante accuratam operam imitanda sibi proponunt. In cōuallibus altissimorum montium & frigidissimorum Segusiam tractus, ad fontium scaturigines, & stagnantes in pratis riuiulorum aquas, huius generis arbuscula nascitur, velut abortiua, foliis tam exiguis, ut tercio ampliora non sint rotundis, cōsertim stiparis, supernè, ac infernè candicantibus, & lanuginosis, toto frutice nō altiore palmo, quem ob breuitatem, & ita compressam ramusculorum ac frondis congeriem pro Salice vix agnoscas. Tertium genus Salix purpurea, cortice obscure purpurascens, quam μελανόφλοιον, id est cortice nigro amictam,




amictam Theophrastus, & Asiani vocant, Plinius purpureâ, viminibus texendis Lib. 3. Hist. cap. 13. virgas tenues præbentem, quibus corbes, sportas, quallos, canistra, fiscinas, & id genus alia utensilia vasaq; conficiunt spectabili subtilitate. In fluuiorum fabu- Lib. 16. c. 37. losis ripis, qui præcipiti cursu vorticosi ruunt, Rhodani, & Isaræ hæc prouenit, Locus. hominis altitudine, fruticosa, cortice qualem diximus: foliis venosis, obscure Ibidem.

**SALIX PHOENICO-**  
*phlæos, siue Phænicea.*



**SALIX HELICE**  
*Theophrasti.*



virentibus, in ambitu ferratis, ad folij cuiusq; petiolum geminis semper foliolis, subrotundis, quod peculiare nacta est. Iisdem in locis proueniunt reliqua tria Salicum genera, Salix Phœnicea, Helice, Elæagnus. Salix Phœnicophlæos, siue phænicea, quod eius cortex palmularum colorem referat, vnde & nomē, folio proximè dictæ similis est, minus serrato, ad cuius exortum nullæ foliorum appendices emergunt, qua nota à superiore facilè distinguitur, viminum & virgarum pari gracilitate. Omnium breuissima Helice fructifera, à nigra certè & alba diuersa, quamuis pumilam in eo vtroque genere, vt diximus Theophrastus esse tradat: virgas tenuissimas, maximèque exiles profert, cortice subluteo vestitas. Huic folia paribus semper interuallis gemina, cum in aliis generibus temerè, nulloquē ordine disposita sint, candicantia, sed non lanuginosa, breuissima, conferta, in ambitu minimè crenata, protuberante semper ad foliorum radicem velut nouo aliorum foliorum conceptu, quod huic proprium est. Porro sæpe foliis insident vesicæ, quales in Vlmi foliis reperiuntur, subrubentes: ramorum autem, vertici foliosa capitula, squamatum compacta, echinis carduorum similia, sed minimè pungentia, & delapsis iam foliis in arbore manentia, quare hanc Salicem, vt auctor est Theophrastus, fecundam esse Arcades existimarunt. At cum idem scribat Helicem, pumilam esse Salicem, siue candida sit, siue nigra, hæc autem de qua nunc agitur, omnium sit humillima, & iis quas diximus notis à cæteris differat, Helicem appellare hoc Salicis genus libuit. Elæagnum etiam Salicis genus esse Dalechampius arbitratur, in Lib. 3. Hist. cap. 13. fabulosis nascētis prope rapidos amnes duntaxat, vt ad Rhodani ripas, quæ huius sunt feracissima, cum in Araris propinqui amnis marginibus nusquam reperiatur. Cortice est Lib. 6. c. 37. luteo: foliis inter omnia Salicis genera longissimis, angustissimis, minimè venosis, nervo medio discriminatis, in ambitu minime ferratis, vtrobiq; albicantibus, auersa parte

4. Salix  
Phœnic.  
Forma.

5. Helice  
Salix.  
Forma.

Lib. 3. Hist.  
cap. 13.

6. Elæagn.  
Locus.

Forma.  
Lib. 16. c. 37.



## ELÆAGNVS

Dalechampij.

Lib. 4. Hist.  
cap. II.7. Salix  
Amerina.**Genera.**

Lib. 24 c. 9.

Lib. 16. c. 37.

**Forma.**

Finditur, inquit Græca rubens Amerina, vt & candida, haud paulo flexilior, &c. Sic & Amerinæ duo nobis nota sunt genera. Alteri enim cortex magis rubet, quā Græcā Amerinam, & rubentē vocauit Plinius, Galli *Franc ofier*, nominant: alteri nigricat. Vtriusque virgæ cuneis triplici canaliculorum ordine striatis finduntur ad vincula, quibus in aqua maceratis vites, & doliorum circuli vincuntur, & ligantur. Trunci capitæ ex quibus virgæ prodeunt, humilia sunt,

## SALIX HUMILIS

repens angustifolia.

Lib. I. c. 141.



Lib. 6. ca. 2.

lanuginosis, vnde Elæagnus nominatur, ἐλαγνός enim ἐξ ἐλαίας καὶ ἄγνης, id est ex Olea & Vitice nomen componitur, quod folio Agno simile sit, & Oleæ modo candicet. Elæagnus, inquit Theophrastus, fruticosa planta est, Agno similis, folio figura eidem simili, molli & lanuginoso, vt Mali Cydoniæ: flore albæ Populi, minore, fructu nullo. Sic enim Theophrastillo-  
cus & legendus & vertendus est. Maxime nascitur, inquit in insulis fluitantibus, siue natan-  
tibus, scilicet aut ventorum, aut contorum im-  
pulsu, quales sunt in lacu Orchomenio, & in  
Egypto circa paludes, & in Thesprotide, & in  
aliis stagnis, de quibus multa Plinius libro se-  
cundo, cap. 95. Sunt qui foliorum squamatim  
cumulatorum congeriem carduorum echinis  
haud absimilem, sed non pungentem, quæ in  
Elæagno, & quibusdam aliis Salicum generi-  
bus reperitur, earum fructum esse credant, alij  
minimè. Amerinæ duplicis meminit Plinius,  
nigræ, Amerinæ nigræ semen, &c. & rubentis.

nec altius eriguntur, putanturque ac cadun-  
tur quotannis. Ruellius farragine nomencla-  
turarum quæ spuria in Dioscoridem irrepre-  
sunt deceptus, tradit Viticem auctore Dio-  
scoride Salicem Amerinam à Latinis appella-  
ri, cum inter has duas stirpes multum interfit,  
vt dicemus. Lugdunenses & Allobroges Ame-  
rinam, vt diximus seruatō prisco vocabulo  
des *Amarines* vocant, Parisienses *Ofier*, Norman-  
ni des *Ambres*. Theophrastus in Salicū histo-  
ria Amerinæ non meminit, nisi eam, quod  
quidam arbitrantur τῷ οἷον nomine designa-  
uerit, hoc maxime loco: οὐδὲ καὶ χρῶνται πρὸς  
τὸ καλαδεῖν, καὶ πρὸς λαμβάνειν ὡς περὶ τῷ οἷον. Id est,  
quamobrem hisce vtuntur (de Cneori radici-  
bus loquitur) ad colligandum & comprehen-  
dendum Amerinæ Salicis modo. Gaza vertit.  
Quamobrem hisce ad colligandum Iunci  
modo vtuntur. Hic igitur οἷον Salycem Ame-  
rinam & vitilem à Theophrasto significari  
putant, ad quam vocem alludentes Galli *Ofier*  
vocant. Repugnat tamen horum sententiæ  
in Oeſo altero flos cœruleus, fructus niger, in  
altero



altero, flos & fructus candidus, qui in Amerina Salice nullus est. Sed de hac questione supra nos, cum grossulariarum naturam explicarem, fusius disceptauimus. Est præter has Salices alia, humilis, repens, angustifolia, in Ericetis Antuerpiani agri: palmaribus & sequipalmaribus cauliculis: folio Rhamni primi, & floribus muscosis Salicis, gustus amari.

*SALIX MARINA,*



His Salicem marinam addimus, quæ tamen inter marinas plantas reponi posset. Ea testis ostreorum, & saxi quæ sub aqua marina sunt, innascitur, & sic adhæret, vt iis agglutinata, non radice defixa videatur. Rami multi ex glauco nonnihil rubentes in aqua natant, foliis comantes longis, Salici similibus, maxima ex parte per oras non incisus, quibusdam, veluti incisuras nonnullas ostendentibus, gustu salis. Inter ramos virgulæ subriguntur, florem Salicis sustinenti furculo haud absimiles, apicibus plurimis, veluti squamatim compactis, non alia forma, quam quæ spectatur in Salice, dum herbaceo iulo florem parit. Hactenus de Salicum generibus. Salix initio veris florem mittit, seu nucamentum squamatim compactile, lanuginosum, propendentem, demittitque veluti panos spicatum confertos, & lanicium quoddam, inquit Scali-

8. Salix marina.

Tempus.

In lib. 1. pl. Lib. 3. Hist. cap. 2. Lib. 16. c. 26

Ody.

Vires seminis Salic.

Vires. Lib. 1. c. 117.

Succus Sal.

Lib. 2. c. 9.

Theophrastus, πρὸ τοῦ τελείας ἀδρῶναι καὶ πέσει τὸν καρπὸν. διὸ καὶ τὸν ποσειδῶν ἐοικὸς πρὸς Γεωργεῖν ἀνθὴν ὠλεσιν καὶ καρπὸν. Quæ sic Plinius interpretatus est. Ocyssimè autem Salix amittit semen, antequam omnino maturitatem sentiat, ob id dicta Homero frugiperda. Hæc Theophrastus, quibus addit Plinius. Secutæque ætas scelere suo interpretata est hanc sententiam, quando semen Salicis mulieri sterilitatis medicamentum esse constat, id est sterilitatem inducere: quod de foliis Dioscorides dixit, ἀσυλληψίαν καὶ ἐργάζεσθαι, ita vt Salicem ὠλεσιν καὶ καρπὸν dictam, quia cito semen amittat, interpretati sint, vel quia semen hominis infœcundum reddat & ἀγόνον, id est ineptum generationi, efficiat, vt à fœminis non concipiatur. Quod autem καρπὸν & semen dicunt, id Galenus, ipsumq; secuti Aetius, & Paulus, florem solum videntur appellasse, quod nunquam ad perfectam seminis maturitatē perueniat. Huius arboris passim obuia permultæ sunt & magnæ vires. Semen, folia, cortex, & succus, inquit Dioscor. spissandi vim habent. Trita folia cum exiguo pipere, & ex vino potabileosis subueniunt: sumpta per se, & cum aqua, præstant mulieribus, ne concipiant. Salignum semen in potu sanguinem expuentibus prod est. Cortex eosdem præbet effectus. Corticis cinis admisto aceto maceratus illitu clauos & callos tollit. Ex foliis & cortice succus cum rosaceo in calice Punici, siue malicorio calfactus aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foueri vtilissimum: furfures purgat in corpore. Excipitur succus qui manat ex eo cum floret, exciso cortice, in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda quæ pupillas obtenebrant suam vim præbet. Plinius eadem scribit, sed triplicem colligendi succi modum docet, cum Dioscorides vnum tantum tradat. Salicis fructus, inquit, ante maturitatem in araneam abit, sed si prius colligatur, sanguinem eiicientibus prodest. Corticis è ramis primis cinis clauum &



callum aqua mistus sanat. Vitia cutis in facie emendat, magis admisto succo suo. Est autem hic trium generum. Vnum arbor ipsa exudat Gummi modo: alterum manat è plaga, cum floret, exciso cortice trium digitorum magnitudine. Valet hic ad expurganda quæ obstant oculis, item ad spissanda ea quæ opus sunt, ciendamque vrinam, & ad collectiones omnes interiorum, vel, vt quidam legunt, illitus extrahendas. Tertius succus est detractione ramorum, à falce distillans, nempe illa remota, post cæsura. Ex his ergo aliquis cum rosaceo in calyce Punici calfactus auribus infunditur: vel folia cocta, & cum cera trita imponuntur: item podagricis. Cortice & foliis in vino decoctis foueri nervos utilissimum. Flos tritus cum foliis fursures purgat in facie. Folia contrita & pota intemperantiam libidinis coercet, atque in totum aufert: vsus, sæpius sumpta. Amerinæ nigre semen cum spuma argenti pari ponderè, à balneo illitum psilothrum est. Salicis foliis, auctore Galeno, ad cruenti vulneris glutinationem vti possis: verum floribus eius maxime propè omnes vtuntur medici ad exsiccantis emplastri præparationem, (quod propterea *Nix iræas* nominant.) Est enim vis eorum ita desiccatoria, vt mordax non sit: habet verò etiam quandam adstrictionem. Sunt verò etiam qui succum ex ea expressum, seruent, vt medicamentum mordacitatis experts, & exsiccatorium, ad multas res vtile. Arboris cortex similem facultatem obtinet, tum floribus, tum foliis, nisi quod temperatura sit siccioris, velut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eiusque cinere vtuntur ad ea omnia quæ valenter desiccare oportet, Nam clauos, callos, & myrmecias tollunt, aceto ipsum macerantes. Nonnulli autem dum floret Salix, corticem eius incidunt, & succum quendam colligunt, vtunturque ad ea quæ pupillas obtenebrant, extergente videlicet, simulque tenuium partium medicamento: Cædunt Salici fertilitas, inquit Plinius, densior tonsura, & breui ligno verius (non pugno, vt mendosi Codices habent) quam ramo, non vt remur, in nouissimis curanda arbore. Nullus quippe tutior est reditus, minorisue impendij, antea tempestatum securior. Tertium locum ei in æstimatione ruris Caro attribuit, priorè quæ oliuetis, quàmque frumento, aut pratis, nec quia defunt alia vincula. Aliquanto post idem etiam scribit in iis quæ propter alias feruntur, maxime propter vineas, Cæduo ligno, principatum obtinere Salices.

## VITEX, CAP. LXXIII.

Nomina  
Li. 6. l. 1.  
Lib. 4. c. 16.



VITEX Græcis dicitur *ἄνθος*, idest Castus, quod, auctore Galeno, castitatem conseruet iis à quibus aut estur, aut bibitur, aut substernitur, ve' vt Dioscorides tradit, quoniam matronæ in Thesmophoriis Atheniensium castitatem custodientes, foliis huius cubitus sibi internebant. Dicitur & *λίγος*, quasi vimen, propter inuictam ferè ramorum flexilitatem. Officinæ Græca & Latina voce coniuncta Agnum Castum appellant. Arabes *Famanchest*, *Samachest*, & *Bengiechest*, Itali *Vitice*, & *Agno Casto*, Galli *Agnus Castus*, Hispani *Gatillo Casto*, Germani *Schaffs mullem*, & *Keuschlamp*, Boemi *Drimek*. Vitex frutex est, ramos plurimos emittens, flexiles, fractuque contumaces, in quibus folia sæpius quina, aliquando septena, vt in cânabe, longa, angusta, Salicis foliis haud absimilia, sed minora. In ramulorum cacumine flores emergunt spicati, aliquando purpurei, aliquando subpurpurei candido permixti. Semen ob similitudinem cum Pipere, à quibusdam Piper vocatur. Vitex frutex est Dioscoridi in arborem assurgens. Nascitur in fluminum ripis, asperisque locis, ac torrentium alueis. Ramos gerit longos, fractu peruicaces: folia

Oliuæ,



QVÆ IN DVMETIS REPER. LIB. II. 281  
*VITEX* *VITEX LATIORE,*  
*Matthioli.* *& serrato folio Lobelij.*



Oliuæ, sed molliora. Duo genera eius. Altera florem ex albo subpurpureū mittit. Altera tantum purpureū: vtriusq; semen, vt Piper. Non multū à Salice vitilium vsu distat Vitex, inquit Plinius, foliorū quoq; aspectu, nisi odore gravior esset. Græci Lygon vocant, alij Agnon: quoniam matronæ Thesmophoriis Atheniensium castitatem custodientes, his foliis cubitus sibi sternunt. Duo genera eius. Maior in arborem assurgit, Salicis modo. Minor ramosa, foliis candidioribus, lanuginosis. Prima album florem mittit cum purpureo, quæ & candida vocatur: nigra, quæ tantum purpureum. Nascuntur in palustribus campis. Vitex Dioscoridi, excafactorias vires habet, & adstrictorias. Semen eius potum venenatis icibus, aquæq; cutem subiit, lienosisq; auxiliatur: lac euocat: mensesciet drachmæ pondere in vino potum: genituram exoluit, caput tentat, & soporem adfert. Decoctum herbæ & seminis in defensione mulieribus vuluæ malo oportunis opitulatur: item inflammationibus, Purgationes mouet semen cum Pulegio potum, etiam suffitu, vel appositu: capitis dolorem dissoluit illitum: instillatur cum aceto & oleo in lethargo, & phrenitide: folia suffitu, aut substratu fugant venenata: illita quoque serpentium moribus auxiliantur: testium duritias cum butyro, & foliis vitium emolliunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mitigat: cum foliis medetur luxatis, vulneribusque. Virgam qui manu teneat cum iter facit, negatur intertriginem sentire. Semen potum, auctore Plinio, vini quendam saporem habet, & dicitur febres soluere, & cum vnguntur, oleo admistum sudorem facere, sic & lassitudines dissoluere. Vrinam Agni cient & menses. Caput tentant vini modo: nam & odor vtraque similis est. Inflationes pellunt in inferiora, aluum sistunt, hydropicis & lienosis perquam vtilis. Lactis vbertatem faciunt. Aduersantur venenis serpentium, maximè quæ frigus inferunt. Minor efficacior ad serpentes. Bibitur seminis drachma in vino, vel posca, aut duæ foliorum tenerimmerum. Illinitur vtraque

Lib. 24. c. 9.

Lib. 1. c. 116.  
 Tempera.  
 & Vires.

Lib. 24. c. 9.



aduersus araneorum morsus, vel perunctis tantum vtili remedio: suffitu quoque aut substratu fugant venenata. Ad Venerem impetus inhihent: eoque maxime phalangiis aduersantur, quorum morsus genirale excitat. Capitis dolorem ex ebrietate sedant cum rosaceo, flos, tenerique cauliculi. Seminis decoctum vehementiorem capitis dolorem dissoluit fotu: & vuluam etiam suffitu vel appositu purgat: aluum, cum Pulegio & melle potum. Vomica panòsque difficiles concoquit cum farina hordeacea, & mollit, Lichenas, & Lentigines cum aphronitro & aceto semen sanat, & oris vlcera, & eruptiones cum melle: testium duritias cum butyro, & foliis Vitium: rhagadas sedis cū aqua illitum: luxata cum sale, nitro & cera. Et semen & folium additur in malagmata neruorum, & podagras. Semen instillatur in oleo & aceto decoctum capiti, in lethargo, & phrenesi. Virgam qui in manu habeant, aut cinctu, negantur intertriginem sentire. Vitex calidus & siccus est tertio ordine. Galeno, verum multum tenuis substantia, tum gustu, acris simul, & adstringens. Ipsas tamen Vitices ad medicinam habet inutiles. Cæterum folia seménque calida siccaque facultate sunt, substantia verò tenui. Nam & vtentibus ita apparet, & gustantibus acre simul, & subastringens percipitur tum folium, tum flos, tum semen. Edendo ramentum etiam semen est, verum tam perspicue calfacit, vt hoc nomine capiti dolorem pariat. At si frigatur, minùs caput tentat. Porro flatus ventris discutit etiam non frictum, & multo magis cum frictum fuerit. Cohibet etiam impetus in venerem, siue frigatur, siue non frigatur. Folia, florésque idem præstare possunt. Galenum secuti Paulus, & Aetius Viticem tertio ordine calfacere siccaréque, & tenuis esse substantiæ tradiderunt. At Galenus duobus aliis locis valde à sese dissidet, quod in tanto scriptore permirum videri debet. Scribit enim. Non quemadmodum planta ipsa Cannabis Vitici quodammodo similis est, ita semen semini facultate est simile, sed plurimum ab eo differt, vt quod concoctu sit difficile, stomacho ac capiti noceat, prauique sit succi. Sunt tamen qui eo quoque frixo cum aliis tragematibus vescuuntur. Multum autem calefacit: ideoque sumptum paulò largius caput ferit, vaporem sursum ad ipsum mittens, calidum simul ac medicamentosum. Viticis semen etià per se crudum, ac frixum manditur, crediturque appetitus venereos inhibere: alimentum autem corpori præbet exiguum, idque siccans, ac refrigerans: flatus autem valde dissipat, quorum omnium occasione, iis qui à venere puros sese seruare volunt, est accommodum: quam sententiam alio in loco approbat, medicamenta ad capitis dolorem ab Archigene conscripta expendens, inter quæ hoc refert. Lauri folia, & Populi albæ, & Viticis cum oleo & aceto. Hoc Pharmacum, inquit Galenus, ex simplicibus facultatibus differentibus composuit. Lauri enim folia calidissima Viticis verò moderatè refrigerantia sunt, in medio vtrorùmq; Populi albæ folia sunt. Vides igitur hîc Viticem à Galeno frigidum, siccumque statui, cum primo loco calidum siccumque esse, idq; non moderatè, sed tertio excessu posuerit. Nos tamen in medendi ratione vt calido siccóque vtimur ad ea quæ præscripsit Dioscorides. Cæterum vt ab ea secum dissensio ne Galenus vindicetur, acuti homines iudicij legendum putant: Lauri enim folia calidissima: Populi verò albæ moderatè refrigerant: in vtrorùmq; medio sunt Viticis folia: quod est verissimum.

Li. 6. simpl.

Lib. 7. lib. 1.

Li. 1. Alim.  
Cornar.  
Embl. 114.  
li. 1. Diosc.

Lib. 2. m. p.





SPALATHI duas species Diosco-  
 rides memorat. Priorem quidem  
 sat luculenter descriptam: secun-  
 dam inodoram, lignosam, candi-  
 dam, deterio rem. Hanc Plantam esse poste-  
 riorem Dioscoridis Aspalathum Monspe-  
 ssulanorum Officinæ crediderunt, ac iactarunt,  
 & vt arbitror, haud probabiliter. Tota Planta  
 cubitum non excedit, fruticosa admodum &  
 ramosa, multis horrens spinis deorsum infle-  
 xis, firmis, acutis, in quibus enascuntur pusil-  
 la folia Lentis magnitudine, viridia, qualia  
 etiam (sed teneriora) fert in nouellis ramulis,  
 quibus subsunt terens-nati aculei: flores in  
 firmioribus & rigidioribus spinis, terni, qua-  
 terni, aut plures simul nascuntur, Genistæ si-  
 miles, sed minores, colore nunc luteo, nunc  
 pallescente, semen in siliquis exiguum, Cre-  
 scit in Cantabris superata Pyrene, variisque  
 Hispaniæ locis: atque etiam in Gallia Narbo-  
 nensi. Ab herbariæ rei studiosis, cum Salma-

Forma.

Locus.

ricæ, tum Monspeessuli Aspalathus altera dicitur vulgo *Eulalia*. Huius floribus  
 tritis & Saccharo conditis ad firmandas & restaurandas vires collapsas Salmā-  
 ticensēs vtuntur.

Vires.

ASPALATHVS II. HISPANVS, QVIBVSDAM,  
 ALTER SCORPIVS, CAP. LXXV.



RVTEX hic rarò pedis altitudi-  
 nem superat, totum densissimis  
 spinis horrens, quæ non inordi-  
 natim vt in alio nascuntur, sed se-  
 riem quandam seruant, & semper contrario  
 inter se exortu binæ nascuntur, virentes qui-  
 dem, sed languidiore colore quàm superiores,  
 neque aliæ ex aliis: summis ramulis inhærent  
 bini aut terni flores superiori similes, colore  
 luteo, mense Martio: quo tempore exiguas  
 breuésque siliquas, vel potius semina Erui ma-  
 gnitudine, multa incanâque Lanugine hirsuta  
 deprehenduntur, densissimis spinis occultata  
 vt ex superiore æstate deciderant: adeo verò  
 canescebant, vt initio araneorum telas existi-  
 mare: radix singularis, sed in plures deinde  
 propagines sparsa, dura, lignosa. Nascitur in  
 collibus Granatæ vicinis.


Forma.

Locus.



**A**bsoluto iam Dumeto nactus imagines Erica prima & quarta Clusij, quarum historiam antea tradidi cap. xxxj. dum eius plantæ genera persequer, illas potius volui spectandas hic præbere, quàm lectorem, cuius studio & voluptati inferuendū precipuè duxi, angī eorum desiderio, secundam editionem expectantem, in qua cognatis addantur, & suis restituatur eis locus.

ERICA I. Clusij.



ERICA II. Clusij.





# HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

## LIBER TERTIVS,



*Quo describuntur, atque pictæ ostenduntur arbores,  
quæ in Viridariis & Pomariis coluntur.*

### MALVS CAP. I.



ILVIS egressi, densis que fruticibus & dumis extricati in Viridario paulisper spatiemur, Pomiferas que arbores in eo contemplemur, atque alias quæ mitioribus succis voluptatem primæ cibis attulerunt, & necessario alimento delicias immiscere docuerunt, ut ait Plinius, siue illæ vltro, siue ab homine didicere blandos sapes adoptione & conubio: à quibus etiam salutare petuntur medicinæ. Nam si ne sylvæ quidem, horridiorque naturæ facies medicinis carent, quanto magis his Viridarium abundabit, cuiusvis generis stirpibus diligenti cultu atque industria educatis, quæque arte & humanis ingeniis fiunt verius quam nascuntur, constitum. Scire autem licet quemadmodum in sylvis quasdam esse arborescentes stirpes quæ in dumetis & frutetis humiles nascuntur, & fruticosas quæ non solum in frutetis & dumetis, sed etiam alibi proveniunt, ita in sylvis quasdam sponte, & in dumetis frutetisque nonnullas citra cultum prodire, quæ in Viridaria translatae diligenter coluntur atque aluntur, quarum historia utrobique explicari potest. A Malis quæ pueris etiâ & mulierculis notissimæ sunt, Viridariū exordiemur. Dicitur Malus Græcis *μηλέα*, & *Μαλὺ μῆλον*, Arabibus *Tufa*, *Tufaha*, Italis *Mele*, & *Pomi*, Hispanis *Manzanas*, Germanis *Oepffel*, *Apffel*, Angl. & Belg. *Appel*: Gallis à pomis ferendis nomē retinet, vocatur enim *Pōmuer*, & fructus *Pome*, Sed *Pomi* nomē apud Latinos multò latius patet. Verum obtinuit usus, ut quemadmodum caulium appellatio deflecteret à generis significatione ad Brassicam priuatim designandam, ita pomus pro Malo, & Pomum pro fructu caperetur. Tamen Plinius genere neutro ipsam quoque arborem Pomum appellavit, ubi Poma putanda esse docet sicut & vites. Pomum inquit Hermol. coplectitur quicquid apud Græcos *ὄπωρα* continet, in quo significatu est, cum dicitur à Medicis omne Pomum refrigerandi & humectandi vim habere, &c. Scaliger fructum omnem in Pomum & Nucem perridiculè secari à Grammaticis scripsit, ut Nuci extra sit cortex, intus caro, Pomo contrà. Nam etiam quæ carnem foris, os intus habent, nihilo

Li. 16. pref.

Nomina

Li. 5. ca. 17.  
Cor. 16. li.  
1. Dioc.

In lib. 2. de pl.



- nihilominus habent *φλοιὸν* extrā. Nemo enim vidit fructum cortice carentem, aut corio, aut cute. Simplicior in Malo ratio est. Caro intus, foris cutis multiplicior in Pruno: cutis extima, os intimum, caro media. Operosum æquē in Armeniaco cutis extima, nucleus intimus, os circū nucleū, caro sub corio, nucleus sub cuticula, duo esculenta, caro, nucleus, os inutile ad cibum, cutes indifferentes. Plinius Nuces Poma vocavit. Solum hoc Pomum, inquit, natura compacti-  
 Lib. 15. c. 22. li operimento clausit: & Mora, minimē in hac arbore (Moro) ingenia profecerunt, nec nominibus, nec insitis, nec alio modo quā Pomī magnitudine. Neque Varroni assentitur Scaliger, scribentī quod indigent potu Poma dici potuisse: imo Pomum dictum esse ille arbitratur, quia etiam sitim tollant eorum plurima, simul ut sint cibo & potui. Malorum genera Dioscoridi sunt, Vul-  
 Li. 15. c. 24. In li. 1. cauf. cap. 21. **Genera.** garia, Cotonea, Persica, Armeniaca, Medica, siue Citria. Vulgaria, Verna, Melimela, Epirotica, siluestria. Posteritas multo plura addidit genera. Ac primū vulgariū quidem prope infinita, & plura quā ut hīc explicari possint, sapore, forma, inuentoribus, regionibus, atque pluribus alijs differentiis distincta.  
 Lib. 1. c. 131. Lib. 15. c. 14. Malorum multa genera Plinius etiā numerat, Citrea, Zizypha, vulgo (Iuiubes) Tuberes, & vulgo *Peschenoix*, in agro Veronensi nascentia lanata, à lanugine obducente nuncupata: ac rufum, Reliqua cur pigeat nominatim indicare, cū conditoribus suis aternam propagauerint memoriam, tanquam ob egregium aliquod in vita factum? Ni fallor apparebit ex eo ingenium inferendi: nihilque tam paruum esse, quod non gloriam parere possit. Ergo habent originem à Matio, Cestioque (vnde Cestiana quibusdā *Pommes de Capandū*.) & Manlio, item Claudio. Quin & (non quibus, ut vulgo legitur) Cotoneo insito ab Appio è Claudia gente, Appiana sunt cognominata. Odor est his quæ Coroncorum, magnitudo quæ Claudianis, color rubens. Ac ne quis id ambitu valuisse claritatis & familiæ putet, sunt & Sceptiana, ab inuentore Libertino, insigni rotunditate. Cato adiicit Quiriana, & quæ tradit in dolliis condi, Scantiana. Omnium autem nuperrimè adoptata sunt parua, gratissimi saporis, quæ Petisia vulgo *Apioles*, nominantur. Patrias nobilitauere Camerina, & Gracula. Cætera è causis traxere nomen: germanitatis, cohærentia & gemella, nunquam singula in foetu: coloris, Serica: (vulgo *Suzine*.) cognationis, Melapia (neque enim accipiendum est Melappia, ut in omnibus ferè exemplaribus legitur, cognationis nomen è gente, vel familia accepisse, sed à cognatione quam Mala ipsa cum Piris habeant (vulgo *Giraudete*, *Pomme poire*.) Mustea à celeritate maturescendi quæ nunc Melimela dicuntur, à sapore melleo, (vulgo *Pomme de Saint Jean*.) Orbiculata à figura orbis in rotunditatem circumacti (vulgo *Pomme Rose*.) Hæc in Epiro prouenisse, argumento sunt Græci qui Epirotica vocant. Mammaram effigie Orthomastica, (vulgo *Pomme Taponne*) A conditione castrali seminis, quæ spadonia appellant Belgæ (vulgo *Pomme Grillote*, & *Pomme de passépomme*) Melofoliis, vel, ut alij legunt, Melophyllis, folium vnum, aliquando & geminum erumpit è latere medio. Celerrimè in rugas marcescunt Pannucea (*Panettes*.) Stolidè tument Pulmonea (*Pommes follanes*.) Sunt quibus sanguineus est color, origine ex Mori insitu tracta. (*Grosses Pommes rouges*, vulgo.) Cunctis verò quæ fuerunt à sole partes rubent. Sunt & parua gratiâ saporis, atque etiam acutiore odore, syluestria. Iis peculiare improbitatis & acerbitalis conuiciū, & vis tanta, ut aciem gladij perstringat. Dacis ferè vilissimis nomen, quanquam primis aduentu, decerpique properantibus. Hæc Plinius. Nunc singula regiones plurimas habent malorum differentias. In Gallia sunt propemodum innumera. Sed hæc principatum obtinent. Capendula, siue Curtipendula, vulgo dicta, sui saporis, verum adeo grati, ut & trans maria veneant. Gestatum plus quam alicui credibile sit tolerant, in  
 tanta

Lib. 15. c. 14.  
 Corna. li. 8.  
 ca. ph. par.  
 cap. 4.

Ruell. libr.  
 1. cap. 96.



tanta suauitate minimè fugacia, magnitudine media, colore cum maturuerunt luteo, suauis odore, sed angusto, quo tamen animus exhilaretur: cartilagine corporis dura, vt quæ possint in annum custodiri. Sæpe & bina visa sunt. Secundas partes sibi vendicant quæ in Ambianensi municipio Rambura vulgus nominat, prægrandia, rotunda, callo fragili, tenero, vt quæ ventorum flatu deturbata in partes desiliant, mira & suauitate gustus, & teneritudine, ita vt in ore frustra liquefcat. Sed vt fugientia diu seruari non possunt, neque ferè ad exitum Autumni prorogantur. Proxima sunt, neque eis suauitate cedentia, quæ vulgus Palsipoma nominantur, quod cum reliquis omnibus de primatu certarent, nisi tam fugacia nascerentur: inde vernaculum nomen ductum est: mediocri magnitudine, turbinatiore figura, carne suauis, prætenera, gustu perquam iucundo, semine per maturitatem in utero sonante. Sed vt mirè placent, ita cito fugiunt. Accedunt quæ Paradisiæ, quasi cælitus missa nominantur, præparua, mellea dulcedine, præcoci celeritate, quasi verna, concretu pauco, Dacæ Plinij, vt quidam opinantur. Ea malacis prægnantium expetuntur, omnium ferè Pomorum fugacissima. Alia dulcia sunt callo corporis duriore, rotunda, quæ ob sui nimiam dulcedinem à palato morosiore fastidiuntur, fortasse Melimela dicta à melleo sapore, vt à maturefcenti celeritate, Mustea. Melimela tamen non solum natura prouenire, sed etiam mellis conditura fieri, ac dici alia Mala posse indicat Martialis hoc disticho.

*Si tibi Cecropio saturata Cydonia melle,*

*Ponentur, dicas hæc Melimela licet.*

In Xen.

Quam custodiendorum & condiendorum Cydoniorum rationem exposuit Columella, eiusque conditura liquorem Melimeli appellari scripsit. Acida vulgus nostrum Malacria à saporis acrimonia nuncupat, oblongiora, dura carne, ex acerbato leuiter acescente. Annum hæc sæpius durant, ægris ad inuitandam elanguescentem appetentiam nonnunquam concessa. Alia Castinia austeriore gustu, dura, velut Castaneæ cartilagine, mediocri magnitudine, oblonga. Alia vulgo francetura, rotundo habitu, & amplo, duriore callo, grata acerbitate, quæ tandem in dulcedinem abeat. Ea diu seruari possunt, & annicula sæpe reperiuntur. Sunt & Rubelliana sanguineo cortice, carne intus friabili, sapore non ingrato, ex austero subdulci, nec cito fugientia. Apud Allobroges celebrantur quæ vulgo Girodeta nominantur, parua, in latitudinem rotunda, & in rubrum rufa, multum ferotina. Reliqua non pigeret nominatim persequi, atque alia plura à Cordo descripta, quædam etiam ab Athenæo breuiter explicata, vbi & Dionysius primus Pomorum inuentor fuisse legitur, nisi prolixior de iis oratio ab utilioribus nos diutius reuocaret. Præterea in tanta Malorum nomenclatura, ferèque nationibus omnibus varia, in tantisque insitionum adulteriis perfacile nos fallimur. Porro genera quæ quotidie nouo insitionis ingenio prodeunt, nec scribit, nec in tanta gentiliū vocabulorum discordia pernotari planè queunt, ea tamen obiter quæ Gallico vulgo peculiaria nascuntur, retulimus. Malus in proceram & crassam satis arborem accrescit tempore, vnico caudice, ramos ex eo statim emittens, in latum longumque sese diffundentes, crasso satis libro connectos, foris cinereo, intus flauo, læui potius quàm aspero. Folia huic vident oblonga, mucronata, inquit Plinius, carnosæ, per ambitum tenuiter serrata, instante hieme decidua, Maio mense renascentia. Flores edit verè foliatos, sæpius albos, nonnunquam ex candido rubentes, ex quibus oriuntur Mala innumeris differentiis, vt diximus, discreta. Radicibus nititur paucis, non in profundum actis, sed summa tellure vagantibus. In viridariis & hortis colitur, soloque pingui & fecundo gaudet. Floret mensis Aprilis fine, aut Maii initio.

Li. 12. ca. 45.

Libr. 3.

Forma.

Li. 16. c. 24.

Locus.

Tempus.

fructus



Lib.1.Dios.  
cap. 131.Lib.2.c.m.  
pa.  
Li. 12. c.45.  
Li. 15. ca. 14.

Ibidem.

Temper.  
& vires  
Li.2. Alim.

fructus in quibusdam Iulio mēse maturus est, in aliis Augusto, in aliis Septembri. Seminis nigredo maturitatem ostendit. Matthiolus ea Mala principatum obtinere in Hetruria scribit, quæ Appiole, & Meleroſe vulgo vocantur: quoniam hæc duo genera tum ſuauiſſe olent, tum guſtui ſunt gratiſſima. Quare is, inquit, non ab errarit, qui Appia eſſe dixerit Dioſcoridis Melimela, Roſea verò quæ eidem Epirotica, & Latinis orbiculata dicuntur Cornarius Ceſtiana mala, quæ Seſtiana Columella vocat, Arantia, ſive Aurantia eſſe putat, quæ in citreorum genere ab omnibus recenſita, hoc maximè perſuaſus, quod ea frequenter cum Malis punicis Galenus coniunxit. Eum ſententia reuocare debuit Plinius apertiſſimè ſcribens à Ceſtio Ceſtiana, ſicut à Matio Martiana, & alia ab inuentoribus à Romanis fuiſſe cognominata. Quare Galenus cum ex auctoritate Apollonij tradit in capitis dolore ex ebrietate Ceſtiana mala Romæ ſic appellata in cibis cocta conferre, Aurantia intelligere non potuit, tum quòd Apollonio & Galeno incognita fuiſſe cenſentur, tum quòd ea nunquam cocta exhibentur. Galenus in tanta malorum varietate, quomodo de eorum temperamento, viribus, uſu recte iudicare poſſimus, docet his ferè verbis. Quædam Mala ſaporem habent aſterum, alia acidum aut dulcem, nonnulla etiam ex iis miſtum, apparētque & dulcia ſimul & adſtringentia. Præterea alia quædam cum dulcedine maniſtum habent acorem. Adhæc alia cum acore acerbiter. Inuenias autem interdum & quæ hos tres ſapores ſimul habeant euidenter, adeo ut acida appareant & dulcia, acerbiterque habeant nonnihil: Et mox. Quæ quidem aſtringunt, ſuccum habent frigidum & terreum. Quæ acida apparent, frigidum quidem, verum tenuium partium. Mediæ autem temperaturæ ſunt dulcia, quæ tamen ad calidius vergunt, quemadmodum quæ omnis qualitatis ſunt expertia ac veluti aquoſa, ad frigidum inclināt. Malis igitur utimur pro vincente in ſaporibus facultate aſteris quidem cum ventriculus vel propter calidam intemperiem, vel multam humiditatem fuerit imbecillior. Acerbis autem cum duo hæc aucta admodum fuerint. Acidis quādo ſuccum craſſum, qui non magnopere frigidus fuerit, ſuſpicaberis, in ipſo eſſe collectum. Si quidem ſuccus frigidus non acida, ſed acria poſtulat. Vtraque certe & acida & acria ſuccos craſſos incidunt, in eo tamen differunt, quod hæc quidem cum calefactione, illa autem cum refrigeratione hoc præſtent. Porro dulcis Malorum ſuccus cum ſine acrimonia & craſſitie, hoc eſt cum ſolus ex quiſitè fuerit, celerius quantum in ipſo eſt diſtribuitur: Sin acrimoniam, aut craſſitiem habuerit, citius ſubducitur. Cæterum optima etiam genere Mala vitanda ſunt, antequam in arboribus maturuerint, quoniam concoctu ſunt difficilia, & frigida, prauiq; ſucci, & tardè permeant. Adhæc ſuccum habent frigidū & leuiter craſſum. Quæ verò bellè matura in hiemem, & ver proximū aſſeruāt, morbis ſæpe numero per quam vtilia ſunt, aut farina aqua ſubacta circumſita, aut calidis cineribus mediocriter aſſata, aut pulchrè in aquæ bullientis vaporibus percocta. Dare autem ipſa conueniet ſtatim poſt cibum, aliquando etiam cum



cum pane, ad ventrem & stomachum roborandum, iis qui cibum fastidiunt, rardēque concoquunt, quique vomitu, diarrhœa, ac dysenteria infestantur. In hunc quoque usum apta sunt acerba. Nam parata ut modò dixi, mediocrem retinent adstrictionem. Idem Galenus alibi. Malus non omnis eiusdem naturæ est, velut nec eiusdem fructus. Quædam enim dulcia sunt, quædam austera, nonnulla acida, alia summo opere exoluta, & aquea. In ipsis sanè aqueum exuperat, ut temperies eorum sit tum humilior, tum frigidior, in acerbis autem terrenum frigidum, in austeris tum istud, tum aqueum frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum: Sic quoque succi, cortices, & arborum folia inter sese dissident. Itaque si austeriora sint, atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio fluxionem repellere, ac stomachum ventremque exolutum & languidum roborare: aquosioribus autem mediocres phlegmonas incipientes & gliscientes lenire. Porro quod plurima Malis omnibus recrementitia frigidaque insit humiditas, vel hinc liquet, quod eorum omnium nullus omnino succus durare, ac vetustatem ferre possit, verū acescunt corrumpunturque vniuersi. Folia, inquit Dioscorides, flores, & germina cum omnis Mali, tum maximè Cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi vis inest, maturis verò longè secus. Ex iis verna bilem gignunt, nervos omnes lædunt, inflationes pariunt. Melimela ventrem molliunt, & ab eo animalia expellunt: stomacho negotium exhibent: astuationem faciunt. Ea multis dulcia Mala vocantur. Epirotica mala, quæ Latine orbiculata dicuntur, stomacho vtilia, sistunt aluum, vrinas euocant, Malis tamen Cotoneis inualidiora. Syluestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Sanè in hunc usum immatura omnia opus sunt. Mala verna inquit Plinius, acerbis, stomacho inutilia sunt: aluum & vesicam cogunt: sic enim legendum: nervos lædunt. Cocta meliora. Melimela & reliqua dulcia, stomachum & ventrem soluunt, siticulosa, æstuosa, sed nervos non lædunt. Orbiculata sistunt aluum & vomitiones, vrinas cient. Syluestria mala similia sunt vernis acerbis, aluum que sistunt. Sanè in hunc usum immatura opus sunt. Mala dulcia, inquit Matthiolus, ad melancholicos affectus valent, atque etiam ad pleuritidem, si in calidis cineribus cocta, & Glycyrrhizæ succo, Amylo, & Saccharo albissimo conspersa pleuriticis edenda præbeantur, tam mane quam vesperi horis duabus ante cibum. Acetum sic è Malis fit acerbis, aut syluestribus, quæ in cumulo per triduum reseruantur, deinde mittuntur in cadum, cui fontana, aut pluuias aqua miscetur, & opertum vas per triginta dies finitur, ac subinde quantum fuerit aceti sublatum ad usum, reddita pari aquæ copia id reparatur. Fieri vinum è Malis testatur Plinius. Nostri etiam è Malis vinum primum faciunt, quod vulgo *Cidre*, vocatur, prelo, vel trusatilibus molis expresso, tortino succo. Deinde rursus secundarium, fratribus & recrementis in aqua maceratis, ita ut è Malis lora dici possit, non parui ad restringendam rusticorum sitim momenti. Vino è Malis vtuntur Septentrionales gentes, apud quos cæli iniuria provenire vites minimè finit. Malis omnibus caducis suillum pecus optimè pascitur, sed ea gestantibus dorsuariis iumentis tam graui, ut oneri alioqui viribus non impari succumbant. Siquidem vires (quod Apuleius in *Asino aureo* tradit,) odore illorum offensæ ita fatiscunt, ut oneri pares non sint, quod paulo aliter tradidit Plinius, nempe Pomorum onera à iumentis statim sentiri, ac nisi prius ostendantur his, quamuis pauca portent, sudare illico. In vniuersum de Pomis seruandis præcipitur, inquit Plinius, ut Pomaria in loco frigido ac sicco contrabulentur, Septentrionales fenestras sereno die pateant: Austri specularibus arceantur, Aquilonis quoque afflatu Poma derurpante rugis colligantur Mala post æquinoctium autumnale,

Lib. 7. sim.

Lib. 1. c. 131.

Li. 23. ca. 6.

Li. 1. Diosc. cap. 131.

Ruell. libr. 1. cap. 96.

Li. 14. c. 16. Ruell. libid.

Li. 24. præf.

Li. 15. ca. 16.



neque ante xv. lunam, neque ante primam horam: cadiua separarentur stramentis, storeis, paleisve substratis: rara componantur, vt limites peruijs spiritum æqualem accipiant.

## MALVS CYDONIA,

## CAP. II.

Nomina



V. *ἡ μῆλα κυδωνία*, Latinè Malus Cydonia à Cydone Cretæ oppido dicitur, vnde primùm aduecta. Cotoneam Malum primus Cato nominavit, Officinæ Citoniam, Galli *Coignier*, & *Coignacier*, Germanis *Quitten*, & *Kuttum*: *Kuttenbaum*, & *Quittenbaum*. Fructus *μῆλον κυδωνιον* Græcis nuncupatur, Latinis Malum Cydonium, & Cotoneum, Officinis Citonium, Arabibus *Saffargel*, Gallis *Coing*, & *Pomme de coing*, Germanis *Kuttenopffel*, & *Quittenopffel*, Italis *Melo Cotogno*, Hispanis *Membrillo*, & *Marmello*, Anglis *Quintet*, Belgis *Que perreboem*: Cotoneæ arboris mala, Dioscor. & Galeno auctoribus, duû sunt generum. Vera, inquit Dioscorides, rotunda, parua, & odorata: quæ verò Struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus vtilia. Malorum Cotoneorum quædam dulciora, maiora, ac minus acerba esse Galenus scribit, quæ in Asia Struthia vocantur, alio in loco Cydonia à Struthiis, quæ etiam Struthiomela nominat, aperte distinguens, Cydoniorumque succum minùs esse suauem, & maximè adstringentem. Columella tria ipsorum genera facit, Struthia, Chrysomela (legitur tamen corruptè Chrysomeliana) Mustea. Idem tradit & Plinius, pluribus sed adiectis. Chrysomela, incisuris distincta, inquit colore ad aurum inclinante. Quæ candidiora, nostratia cognominata, odoris præstantissimi. Est & Neapolitanis suus honos. Minora ex eodem genere Struthea, odoratius vibrant, serotino prouentu, præcoci verò Mustea. Strutheis autem Cotonea insita suum genus fecere Muluianum (aliàs Miliuanum) quæ sola ex his vel cruda manduntur. Sunt præterea parua syluestria, à Strutheis odoratissima, in sepibus nascentia. Hæc Plinius. Chrysomela syluestribus arboribus Malorum generis attribuit Vergilius, cum dixit.

*Quod potui puero, syluestri ex arbore lecta,*

*Aurea mala decem misi, cras altera mittam.*

Eclo. 3.

Struthia verò vel aperto errore Plinius minora esse dixit, vel in eo lectio vitiosa est, leguntur, cum Dioscorides & Galenus palam Struthia magna esse dicant, vera & genuina Cydonia; parua & rotunda. Aetius quoque ad medicamenti ex Malis Cydoniis compositionem, ex ipsis maiora iucundioraque, & minùs acerba, quæ videlicet Struthia appellantur, eligere præcipit. Quare maiora etiam in Plinio legendum esse apparet. Malorum Cydoniorum tria in Italia inueniuntur genera, inquit Matthiolus. Palma illis quæ peculiariter Mala Cotonea nominantur, pressa, incisuris interfecta, colore ad aurum inclinante, lanuginosa, & longè cæteris odoratiora. Proximo loco sunt quibus multo maior corporis moles, Dioscoridis, & Galeni Struthia. Hetrusci hæc, Pira Cotonea vocant, quod forma magis Pira, quàm Mala referant. Pulpa ac succo cæteris prævalent: colore, suavi odore, ac viribus cedunt. Postrema sunt Plinij Miliuana; ea quidam Notha vocant, quoniam ex Cotoneis quæ Strutheis, vel ex Strutheis quæ Cotoneis insitæ fuerant, proueniant. Totidem apud Gallos sunt genera. Quædam minora, rotunditatis in orbem circinata, odoratius spirantia, quæ peculiariter *Coings*, vocamus: Alia grandiora amplitudine pinearum nucum, pauciori lanugine operta, colore tam intus, quàm foris aureo, odorem non tam latè iactantia, quæ *Coignasses*, quasi *Cotonacea* vulgus nostrum

In libr. 4.  
Diosc. c. 131.Rucell. libr.  
4. cap. 72.



nostrum appellat. Alia medio habitu inter ea visuntur, sibi priuatim Cotoneorum nomen vendicantia. Malus Cotonea vulgari Malo ferè similis est, foliis angustioribus, læuoribus, carnosioribus, durioribus, à tergo albicantibus, altera parte viridibus: flore albo, vel ex albo rubente, syluestris Rosæ figura,

*Forma.*

**M A L V S**

*Cydonia.*



quinque per ambitū foliolis distincto. Haud procera est arbor, fructu incuruatos trahente ramos, prohibentēque crescere parentem, tenui lanugine pubescente. In cultis, & hortis prouenit. Locum autem peculiariter frigidū & humidum desiderat. Si in calido statuatur, assidua rigatione illi succari opus est: fert tamen mediocris situs inter vim frigoris & caloris statum. Planis & decliuibus gaudet. Septembri & Octobri mensibus Poma eius maturescunt. Ea frigido & terrestri temperamēto prædita sunt, ac propter vincentem adstrictionem minus cæteris Malis humectant. Frigida itaque sunt primo ordine, & sicca secundo. Stomacho sunt vtilia, auctore Dioscoride, vrinam cient: verūm tosta nitiora sunt. Pro sunt cœliacis, dysentericis, purulenta extusientibus, cholericis, præsertim cruda. Maceratorum liquor commodè in stomachi aut ventris fluxionibus potui datur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis salutaris est. Decocto fouentur vuluæ, & sedes si procidant. Quæ melle condiuntur, vrinam mouent: mel autem sibi constringentem il-

*Locus.*

*Tempus.*

*Temper.  
& Vires*

*Lib. I. c. 131.*

lorum vim, & spissantem adsciscit. Quæ cum melle coquuntur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minùs spissant. Cruda cataplasmatibus adiiciuntur ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, præduros lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsis tuis, expressisque: sed quo perduret, quindecim sextariis succi vnus mellis adiungitur, alioqui in acorem degenerat. Fit oleum ex iis, id Melinum vocant, quo vtimur quoties adstringente oleo est opus. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus additur, & iis conuenit quæ adstrictionem desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibusque sanguinis: contra citam aluum, & mensium impetus in vino bibitur. Cotonea, inquit Galen. eximium quiddam, quod in aliis non inuenitur, habent. Nam præterquam quod adstrictionem sortita sunt copiosiore, succus etiam eorum diu durat, si quis ipsum cum melle coctum asseruet: cum aliorum pomorum succus, si reponatur, acefcat, quia multam habet humiditatem. Permanet & Struthiorum succus, quando paratus rectè fuerit, quemadmodum & Cydoniorum. Verūm hic minus est suauis, & summopere adstringens. Quare ad ventriculi maximè exoluti robur vti eo aliquando possis. Cotonea Plinio, cocta suauiora. Cruda tamen, duntaxat matura, pro sunt sanguinem excreantibus, ac dysentericis, cholericis, cœliacis. Non idem possunt decocta, quoniam amittunt constringentem illam vim succi. Imponuntur & pectori in Febbris ardoribus: & tamen decoquuntur in aqua cælesti ad eadem quæ supra scripta sunt. Ad stomachi autem dolores cruda decoctæ cerati modo imponuntur. Lanugo eorum carbunculos sanat cocta

*Li. 2. Alim.*

*Lib. 23. c. 6.*



in vino, & illita cum cera alopeciiis, capillum reddit. Quæ ex iis cruda in melle condiuntur, aluum mouent. Mellis autem suauitati multum adiciunt, stomachoque vtilius id faciunt. Quæ verò in melle condiuntur cocta, quidam ad stomachi vitia trita cum Rosæ foliis decoctis dant pro cibo. Succus crudorum lienibus, orthopnoicis, hydropicis prodest: Item mammis, condylomatibus, varicibus: flos & viridis & siccus inflammationibus oculorum, excreationibus sanguinis, mensibus mulierum. Fit & succus ex iis mitis cum vino dulci rufis, vtilis celiacis, & iocinori. Decocto quoque eorum fouentur, si procidant vuluæ, & interanea. Fit & oleum ex his, quod melinum vocauimus, quoties non fuerint in humidis nata. Ideo vtilissima quæ ex Sicilia veniunt. Minus vtilia Struthia, quamuis cognata. Phylarchus memoriæ prodidit latalium medicamentorum vim Cydoniorum Malorum odore iucundo hebetari, Phariacum que venenum iniectum canistro, quod adhuc olebat Mala Cydonia in eo reposita, euanidum factum, maleficam vim suam amisisse: itaque mixtum & in potu datum, iis nihil attulisse noxæ quibus insidiæ struebantur: causamque postea eius rei cognitam fuisse illius inquisitione ac inuestigatione qui venderat. Compertum enim hoc accidisse, propterea quod condita in eo calatho Mala fuissent. Celtiberi Veratri albi succum, quo sagittis illitis feras immedicabili vulnere conficiunt, si vbi Cydonia Mala fuerint, reponatur, elanguescere, & maleficam vim suam exuere vsu deprehenderunt, eamque recuperari, si venenum per aliquot dies in foriis suspensum maneat, vbi alui excrementa egeruntur. Est & id animaduersum Cotonea cruda per hiemem asseruata, acerrimo suo sapore vuas pensiles adeo vitare, vt ex statim marcescant, quare seorsum ab iis reponenda esse. Multa hodie ex Cydoniis Malis parata in Officinis conseruantur. Ex iis enim sectis, diutius in aqua elixis donec tabescant, postea per linteum colatis sine compressione, deinde cum Saccharo percoctis in cerati consistentiam, fit quæ vulgo vocatur Galatina Cydoniorum (*Gelée de Coing*, Gallicè nominatur) res perlucida, pulcherrima, & gratissima. Ex eo quod reliquum est Valentius compressu cochleariis excreto, & cum Saccharo percocto, ad emplastri ferè consistentiam, Cydoniatum crassius & vilius fit. Si tam pellucidum illud quàm crassum simul cernantur, & cum Saccharo vt prius percoquantur, Cydoniatum fit (*Codignat* vulgus nostrum vocat) quod omnibus in vsu est, quodque ante epulas ad vnciam vnā sumptum, aluum sistit, post epulas verò soluit, & vapores ad caput ex ventriculo attolli prohibet: Estque id simplex. Aliud verò compositum, ex carne Cydoniorum in vino cocta, & melle despumato igne lento percoctis, iniectis Cinnamomo, Caryophyllis, Galanga, & variis aliis aromatibus, pro vario vtentium scopo, ad ventriculum firmandum, coctionem iuuandam, vomitum biliosum & pituitosum sistendum, ad pristinum calorem corpori restituendum, dissipandos flatus, & id genus cætera, si affectus sit frigidus: Si verò calidus, Cydonia cum aceto coquunt, adiectis quæ refrigerent. Sunt qui cholagogum vt parent, Scammonium admiscunt, vt phlegmagogum, Turpetum cum Cnico. Paratur etiam

*Mesulib. 3.*  
*Antid.* Cydoniatum, siue Diacydonium, ex succo Cydoniorum variis immixtis aromatibus, ad languentem appetentiam excitandam, ventriculum & hepar roborandum, coctionem iuuandam, & confirmandam vtriusque vim retentricem. His accedit Conditum Cydoniorum, quod Miua officinis dicitur. Equæ nunc simplex, ex succo Cydoniorum fit cum vino cocto, addito melle optimo, & despumato: nunc composita, & aromatica, ex succo eodem similiter cocto, & in eo suspensis linteolo exceptis aromatibus diuersis. Ventriculum, hepar, & cætera viscera hoc medicamentum roborat, appetentiā excitat, coctionem iuuat, vomitum



vomitum & lienteriam sedat. Galenus in Syria edulium componi tradit, quod *μυλων γαλκός*, idest placenta ex Malis Cotoneis appellatur: id adeo durare, vt patinæ recentes ipso plenæ Romam adferrentur. Componebatur autem ex melle, & carne Cydoniorum læuigata simul coctis. Meminit & Galenus medicamenti quod non ex Melle solo & Malorū succo constar, sed & piperis albi habet quidpiam, & Zingiberis, & Aceti. Id diacydonion aliis locis etiam fufius idem describit, item Ætius, quod tum ad appetentiam excitandam his quibus ea languet, tum ad concoctionem iis qui parum fœliciter cibos concoquunt, valet, quod denique ventri robur conciliat, nec non id quod ex Cydoniorum carne, & iisdem ferè constar. Hæc Diacydonio Mesues ex succo, & Diacydonio ex carne, viribus affinia sunt. Illud Diacydonium ex succo. Galeno *δια μύλων*, & *δια μέλων*, idest ex Malis, scilicet Cydoniis dicitur, quæ absolute *μύλων* dicuntur totius generis appellatione, sicut & oleum priuatim *μύλωνον*, idest Cydoniorum, atque emplastra *μύλωναι*, quæ colorem Mali Cydonij referunt ex ærugine vsta. Pauli *ὕδρ μύλων* ex succi Cydoniorum sextariis duobus, Mellis sextariis tribus, aquæ sextariis sex, omnibus simul coctis, iisdem viribus pollet quibus Miua simplex Cydoniorum. Est etiam in Officinis frequens syrupus de Cydonijs ex eorum succo & Saccharo confectus qui dysenteriam hepaticam mirè sanat, valètiore ex Cydoniorum paruorum, quàm ex Struthiorum succo. Oleum Melinum refrigerat, & astringit. Ob id ventrem totum inferiorem & neruos laxiores cogendo roborat, sudores immodicos sistit. Mirum est quod multi aiunt mulierè grauidâ, si crebrius Mala Cydonia esitauerit, pariturâ infantè tû ingeniosum, tû industriû. Semina eorû decocta in aqua; quousque in mucû liquefiant, profunt illita omnibus inflammationibus, linguæque scabritiæ mirificè læuigant. Eorûdè succus libræ pondere, in quo Corallorû rubrorû, seminis Rosarû rubrarum, & Rhabarbari, cuiusque drachma, cû Hypocistidis & Acaciæ binis scrupulis ad tertias bullierint, magno est ad biliosas vomitiones, & ad dysenteriam auxilio. Datur bis quotidie potandus, mane & vesperi, horis duabus ante cibum, sed agris iam purgatis.

Li. 2. Alim.

Lib. 6. fan. tu. &amp; libr. 8. c. ph. par. cap. 4. Lib. 9. c. 24.

Lib. 6. cap. ph. par.

Lib. 2. cap. ph. gen. Lib. 7.

Matt. libid.

## MALVS PERSICA, CAP. III.

**G**RÆCIS *περσικὴ μῆλα*, Latinis Persica malus dicitur, & Persicus Paladio, Gallis *Peschier*, Germanis *Pfersichbaum*, fructus *περσικὸν μῆλον*, Persicû malû, Arabibus *Sauch*, *Chauch*, Gallis *Pesche*, Italis *Persiche*, Germanis *Pfersing*, Hispanis *Pexegos*. In totum quidè Persica peregrina etia Alia, Græciæ que esse, ex nomine ipso apparet, inquit Plinius, atque ex Perside aduecta: ac rursum Persicæ arbores ferò, & cû difficultate tansiere, vt quæ in Rhodo nihil ferant, quod primû ab Ægypto earû fuerat hospitium, tû etiâ Persicæ arbores in Rhodo florent tantû. Quibus accedere videtur Theophrasti testimoniû scribentis Persicâ in Ægypto, & in vicinis locis ferre, in Rhodo ad florè tantû peruenire. Hoc tamen loco Græci codices mendosi sunt, quo pro Persica quidâ Perseâ legunt. Rhodacena non aliâ esse, quàm Malû Persicâ, & ipsa Mala Persica Rhodacena esse contendit Cornarius, atque in omnibus Plinij, Pauli Palladij, Constantini de Agric. locis, quibus hac de re agitur, *δωράκινα*, & duracina falso legi pro *ροδάκινα*, & Rhodacena, ita vt ex Latinis Duracinis Græci nomen non sumpserint, sed contrâ, vt apud Latinos Rhodacenorû nomen in Duracenorû appellatione corruptû sit. Rhodacineæ arboris meminit etiâ Ætius, inquit, & fructus Rhodacenorû de Persica Malo agens, vbi apertè Rhodace non appellari eius fructû testatur, quod tamen in codice meo non lego. Videtur autem Cornario appellatio eâ Rhodo deducta esse, quod primû ab Ægypto Per-

Nomina Lib. 12. c. 7.

Li. 15. ca. 13.

Li. 16. c. 26.

Lib. 3. Hist. cap. 5.

In lib. 2. ca. ph. par. &amp; lib. 1. Pauli.

Li. 13. c. 108. Lib. 1.



Lib. 1. Diof.  
cap. 131.

Lib. 1.

Lib. 14. C. 3.

*Genera.*  
Li. 15. C. 12.In lib. 1.  
Diofco. 131.

Li. 15. ca. 28.

ficarū arborū fuit hofpitiū, vt ex Plinio diximus: quomodo Damafcena à Damafco funt appellata. Ab hac Cornarij fententia valde diffentit Matthiolus, negatque eum quid Plinio & Palladio Duracina, quid Paulo *δοράκια*, quid Ætio, Constantino, alijsque Græcis auctoribus *ροδάκινα* fignificant, intellexiffe, quod hæc tria & nominibus, & reipfa differant. Rhodacene enim non aliã effe quàm Malū perficã, & Rhodacena ipfa nihil aliud quàm Mala Perfica cū Cornario cēferat Pauli *δοράκια* genus effe præcociſ ſeu Armeniaci Mali q̃ ipſe declarat his verbis, τὰ ὅ παλαιόνια τε, καὶ δοράκια, καὶ ἀρμένια κρεῖττονα τῶν περσιῶν: ὅτε ἔξινε, ὡσάντως διαφθίρει. Ideſt Præcocia, Doracia, & Armenia Perficis præſtāt: neque enim aceſcunt, neq; ſimiliter corrūpuntur. Hic igitur *δοράκια*, rectè legi Matth. putat, non *ροδάκινα*, quod *ροδάκινα* Mala Perfica ſint duntaxat, non præcocia, *δοράκια*, Armenia, quæ & ſi inter Perfica numerentur à quibuſdam, nō tamen ſunt ſimpliciter Perfica. Neque tam ineptè dixiſſet Paulus, Rhodacena Perficis præſtare, cum Rhodacena ſint ipſamet Perfica. Iam verò Duracina Perfica Plinio Perficorū ſpecies ſunt, non genus, quẽadmodū Duracina Ceraſa, & Duracinæ vuar̃ eidẽ, & Palladio Ceraſorū vuarūque ſpecies. Quare alia iis erunt Duracina, alia Græcis Rhodacena, quæ vniuerſè quidem Perficū omne ſignificant, non autẽ aliquā eius ſpeciem. Neque, vt Cornarius ait, vocat noſtra ætas quædā Perfica Mala Duracina, quod ſint offe cæteris duriore, ſed antiquos ſecuta, quod pulpa, carnẽque guſtui gratiora ſint, longiorique tempore perdurent, quod de Duracina vua Plinius apertè ſcripſit. Duracina vua ſine vllis vaſis in vite ſeruabilis eſt: tanta eſt contra frigus, ætus, tempeſtatẽsque firmitas. Hæc ex Matthio. Plinius aliquot Perfici genera recenſet. Perficorum palma Duracinis. Nationū habent cognomen Gallica, & Aſiatica. Poſt autumnum matureſcūt, æſtate præcocia, intra xxx annos reperta, & primo denariis ſingula venundata. Supernatia è Sabinis veniunt, popularia vndique. Pomum innocuum expetitur agris: pretiūmque ſingulis tricenis nūmi fuẽre, nullius maiore, quod miremur, quia non aliud fugacius. Longiſſima nāque decerpro bidui mora eſt, cogitque ſe venundari. Perficorū multæ ſpecies, inquit Matthio. Quedā rubent, quædam aureo colore fulgent, alia viſcunt, alia candida ſunt, alia ſanguinea, alia Duracina, alia Cotonea vocantur. Præterea nonnulla dulcia, nonnulla acida, quædam vinoſa, quædam amariuſcula, quædam etiam auſtera. Prima laus in cibis Duracinis ſic dictis, quod caro tam pertinaciter oſi hæreat, vt auelli non queat. Duracinis adhæret corpus, inquit Plinius, è ligno que auelli nequit, cū in cæteris facile ſeparetur. Inter hæc primas tenent quæ ab aureo colore, & odore pericuūdo Cotonea cognominantur. Secundas quæ cortice detracto ſanguineum ſuccum fundunt, non quod guſtu reliquis ſint ſuauiora, ſed quia magnitudine excellunt, & pulchro ſunt colore. His fortæſſe non cedunt, quæ à Nucis ſimilitudine Nuciperfica nominantur, & colore, ſaporẽque Perfica Cotonea referūt, tū nō ingrata dẽtibus duritie guſtū mira afficiūt voluptate. Eſt & aliud in Hetruria, & alijs Italia locis Perficorū genus, agricolarū māgonio factū, quæ Perfica Amygdala vocāt, quoniā pro amaro Perfici nucleo dulce Amygdalarū modo includūt. Perficorum in genere multiplex differentia eſt. Prima *ευτελεστάτη καὶ φαιλοτάτη*, vulgare eſt Perficum, carne ſuccoſa quidem, ſed flaccida, molli, tenera inodora, quæ à nucleo tota recedit, vulgo *Pefche qui laiſſe le noian*. In hac ſpecie, Perfica quædā parua ſunt, quædam magna & ampla, quædam viridia prorſus, quædā rubris maculis picta, quædā carne vſq; adeo rubra, vt ſanguinolẽta videatur, & hæc nucleo etiā foris rubẽte, alia nigro, lanata omnia. Altera ſpecies eſt eorū quẽ Duracina Latini vocarūt, Græci quidā Rhodacena. Duracina quidẽ, non quod ſeruari poſſint diuti⁹, ſed ob carnis duriore ac ſolidiorẽ callū: Rhodacena verò



verò, aut quod odoris suauitate Rosam imitetur, aut quod plerūque roseo colore, id est rubro altera sui parte niteant. Gallorum alij *Presses*, & *Perses*, vocant, alij *Auberges*, præsertim si candida eorum pulpa fuerit, alij *Myrecotons*, si lutea, veluti Cydoniorum. Omnibus compacta, dura, solida, firma caro nucleo tenacissimè adhæret, & mandentium dentibus non alter resistit, quàm Mali aut Piri:ideoq; postrema mensa vtiliter sumitur, nec ventriculum cōturbat, aut in eo corrumpitur, cum alia Persica prima statim mensa præbenda sint, alioqui putredinē corruptionēque obnoxia. Duracinorum varietas in pulpæ colore sita est, nunc cædida, nunc lutea, quod genus frequentius reperitur, nunc ex albo subrubentis. Mira in omnibus & saporis, & odoris iucunditas, vinum etiam commendantis, si detractō cortice immergantur. Proueniunt insitione & nucleorum sattu: quod sic fit. Duracinorum præstantiorum nuclei defodiuntur, exacto biennio tenella arbor transplantatur, & cum abierit tertius annus, ea quæ bene comprehenderit, vno supra terram pede secatur: cicatrice obducta plaga, qui postea nascuntur rami fructus gignunt, & ampliores, & sapidiore, quàm si arbor insita fuisset: adde quod adulta sic arbor, viuacior est quàm insita, & ætatem melius fert. Apud Paulū qui Latinas voces vsurpauit pro *Μορένια* legēdum est *Μορένια*. In Persicorum genere quidam Nucipersica recensent. Armeniaca & præcocia an Persicorum generi adnumeranda sint, plerique dubitant, & iure quidem. Arboris certè tota facies à Persico discrepat, si proceritatem, vastitatem, ac foliorum figuram spectes. In fructu cognatio quædam intercedere videtur, sed quæ hoc nomen sibi vindicare non debeat. Malus Persica arbor est inter cæteras Malos humilis, folio Amygdalæ, maiusculo, in ambitu leuiter serrato: flore subpuniceo, Amygdalæ simili: Pomo carnosio, succulento, extrinsecus lanuginoso, cute modò candida, modò rubente, modò lutea, in cuius altera parte profunda incisura, seu rima in longum porrigitur: dura intus & scabra nuce, in qua nucleus qualis Amygdalis, minor tamen, & amarior. Radicibus nritur debilibus, minimè in altum actis. Quamobrè cito confenescit, caditque hæc arbor, materia fungosa & imbecilli. Nucipersica arbor est humilis, præcoci Persici proceritate, folio Amygdalæ, sed maiore: flore Puniceo. Pomum emicat viride, carnosum, succulentum, nulla exterius lanugine pubescens, dura intus & scabra nuce, in qua nucleis, qualis Persicæ Pomis. Passim in viridariis, hortis, & vineis nascitur Malus Persica. Gaudet etiam aquosis & apricis. Floret vere: fructus Autumno maturescit, celerimè marcescens. Nucipersicæ fructus Autumni exitu maturescit, diutiusq; Persicis ætatem prærogat: τὰ περσικά μήλα, auctore Dio-



scoride, ἐστὶ μαχα, ἐν κοίλια τὰ πέπρω. Id est, Persica Mala stomacho grata sunt, matura faciem reddunt aluum (sic enim melius quàm Ruellius, Persica Poma matura, tam stomacho, quàm ventri vtilia) acerbam eam cohibent, sed sicca vehementius. Decoctum è siccis alui, stomachique fluxiones sistit. Galenus verò scribit arborem ipsam in germinibus & foliis vincetem habere amarā qualitatem:

Locus.

Tempus.

Temper.

& Vires.

Lib. I. c. 13.

Li. 7. suppl.



Li. 2. Alim.

ideoque folia eius trita, & vmbilico imposita, lumbricos necare, & alioqui sane etiam discutiens esse medicamentum. Fructum eius esculentum, scilicet Persicum humidius esse, & frigidius temperie. Idem alibi auctor est, Pomorum Persicorum succum, & veluti carnem, facile corrumpi, omninoque noxam inferre. Quamobrem non post alios cibos, vltimaque, sicut nonnulli solent, illa offerri oportere, quod in summo natantia corrumpantur. Hoc verò, quod omnibus commune est, memoria tenendum, quæcunque vitiosi succi, humidæque & lubrica sunt, facileque descendunt, ac se cedunt, præ aliis comedenda esse: sic enim & ipsa celeriter subeunt, & aliis præeunt, ac quasi iter muniunt. Postrema verò sumpta, vnà secum alia quoque corruptioni reddunt obnoxia. De iisdem Persicis hæc Plinius Valerianus. Persicum in cibo est quidem stomacho inutile, eo quod cito succus eius marcescit, & caro æque per concoctionem vitatur, verum minimè graue, dum modo, non diu in intestinis moretur, & ad ima semper exitu celeriter festinet. Persica in cibo negant medici membra nutrire: sed & Galenus suadet nunquam omnino post cibum sumere, quoniam corrumpuntur, si cibis cæteris innatent. Persicorum folia trita, & imposita, ventris animalia perimunt, & expellunt. Eadem sicca, & in puluerem tusa, recentes plagas vulnorum cruentorum claudunt. Nucleus Persicorum capitis dolori cum oleo & aceto tritus illinitur, quamuis quidam cum solo rosaceo terere malint. Gummi, seu gutta quam Persicorum truncus illacrymat, fluenti aluo medetur. Eadem mixta cum vino, etiam in vesica lapillos frangit. Trita cum aceto impetigines reprimat. Decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperum arteriæ canalem læuiorē facit. Excreantibus sanguinem miro modo subuenit. Thoracis obstructos sinus referat, vitia pulmonis expurgat. Non rectè igitur Plinius scripsit Poma Persica innocua expeti ægris, vtilioraque; Prunis Persica, succumque, eorum etiamnum in vino, aut in aceto expressum, vel, ut alij legunt, succumque, eorum etiam expressum, cum vino, aut aceto. Nec esse alium eis Pomis innocentiorē cibum. Nusquam minus odoris, succi plus, qui tamen sitim stimulet. Folia eius trita & illita hæc morrhagiā sistere. Nucleos Persicorum in aceto & oleo, capitis doloribus illini. Flores Persicæ, inquit Fuschius, Saccharo coditi instar Rosarum, aut Violarum, aluū haud leuiter mouet, atque subducit. Esu etiā idē præstāt, auctore Matthiolo, vomitionesque, cient, Hydropicorum aquas pellūt, si recentes in acetariis edatur, sed non absque labore. Arboris lacryma datur ex aqua plataninis, aut portulacæ vtiliter ad cruētās reiectiones, tussis etibus verò, & anhelosis ex mulsæ, aut tussilaginis decocto, addito croci momento: facit ad raucedines, & asperæ arteriæ impedimēta. Datur calculosis cum succo Raphani, aut Limonū, aut ex vino duarum drachmarum pōdere. Folia cōtusa illinuntur vtiliter vētri, ex aceto, ad interaneorum vermes. Eorundē succus purulētis, vermiculosisque auribus instillatur. Nuclei tormina vētris tollūt, si deuorētur: ebrietatē mirū quantam arceant, si seni, septenūe præsumantur. Tunduntur, & decoquuntur in aceto, quousque liquecant, puliculæ modo, ad alopecias: nā illiti mirū in modū capillos euocant. Contusorum cremor ex aqua Verbenacæ vtiliter frōti ac tēporibus illinitur in capitis dolore. Ad idē valet oleū ex iisdē expressum. cōuenit enim peculiariter hemicranie, somnumque cōciliat, id quod & cremor facit. Instillatur idē oleū ad aurium dolores. Tam potū, quā clysteribus infusum, coli dolores à flatu genitos, ac etiā à facibus exsiccatis valde mulcet. Datur quoque potādū iliatis, ac calculosis quatuor vnciarum pōdere. Maximè verò nuclei Persici calculosis auxiliantur, si quinquaginta cum centū cerasorum nucleis, florū Sábuci manipulo, vini Cretici libris tribus excipias fictili nouo, & in fimo sepelias diebus decē, deinde vitreis organis destilles. Aqua enim, quæ inde fluxerit ante cibū hausta 4. vnc. pōdere mirificè renū calculos expellit.

MALVS



*MALVS ARMENIA. CAP. IIII.*

**M**ΗΛΕΑ ἀρμενιακή, Latinis Malus Armenia, fructus μήλα ἀρμενιακά, *Nomina*  
 Mala Armeniaca, seu Armenia, Latinis Præcocia, auctoribus Dio- *Lib. 1. c. 131.*  
 scoride, & Galeno. Dicuntur & Præcoqua: Græci Bericoca ferè pro- *Li. 7. simpl.*  
 nunciant, Galli *Abricots*, Mauritani *Mermex*, seu *Mirmix*, *Mex*, *Mes-*  
*mes*, *Mismis*, Itali *Armeniache*, *Bacoches*, *Moniache*, & *Grisomele*, Hispani *Albiricoques*, *Al-*  
*barchigas*, & *Aluaricoques*, Germani *S. Iohans Pfersich*. Armeniaca peregrina quoque *Li. 2. Alim.*  
 fuisse ex nemine cognoscitur. Ex genere Persicorum esse Galenus scribit. *Genera*  
 quot eorum distinguuntur genera, sapore & præcipuè magnitudine differentia, *Forma.*  
 quod non solum cœli solique clemètia euenire credendum, sed etiam agrico-  
 larum artes: frequenti enim insitione maximè proficiunt, & augescunt, Sed duo  
 præcipuè Gallis nota, magnitudine tantum paruitatèque fructus distantia. Ma-  
 iora & mole corporis, & suauitate præcellentia, Præcocia, Galli vocant *Gros*  
*Abricots*, quod insita fuerint, minora Armenia, quæ in Gallia Narbonensi *Arme-*  
*gnes* vocantur: Gallis cæteris *Petits Abricots*, quod sponte gignantur. Malus Arme-  
 nia rarò procera est arbor, Persicæ ferè similis, nisi quod folia sètt Populi nigrae  
 æmula, in summo acuminata, per ambitum serrata, quaterna, quinæue simul  
 emergètia: flores albos, Cerasi florum figura, ex quibus fructus proueniunt Per-  
 sicorum quadatenus specie, aureo colore cū purpura mixto, propter quem Gri-

*MALVS ARMENIA*

*maior.*



*MALVS ARMENIA*

*minor.*



*somela* Romanis vocantur, quasi Crysomela, id est, aurea Mala, eaque præcipuè  
 quæ eo in tractu Persicorum magnitudinem æquant. Os intus cōcluditur, non,  
 vt in Persicis, scabrum, vtraque parte turgens, in quo nucleus eadem figura, in  
 quibusdam amarus, vt in Persico, in aliis dulcis, vt in Amygdala. In viridariis *Locus.*  
 & hortis coluntur. Maturescunt ineunte æstate, mense Iunio, ante alios fugaces *Tempus.*  
 fructus, vnde Præcocia dicta. Bonitate Persica superant, inquit Galenus: neque *Vires &*  
 enim in ventriculo, vt illa corrumpuntur, neque in ventriculo acescunt. Vulgo *Temper.*  
 autem



autem suauiora apparent, vnde etiam stomacho sunt gratiora. Idem alibi fructus, inquit, Mali Armeniæ frigidior, humidiorq; est secundo quodammodo ordine. Armeniaca, inquit Dioscorides, minora sunt Persicis, & stomacho vtiliora. Quidam tamen recentiores medici refragantur, & ea magis quam Persica corrumpi affirmant. Oleum ex nucleis expressum, Matthiolo teste, mirificè valet inunctum ad inflammatas hæmorrhoidas, ad vlcerum tumores, linguæ impedimenta, & aurium dolores.

*MALVS CITRIA, LIMONIA, AVRANTIA,  
POMA ADAMI. CAP. V.*

*Nomina*  
Lib.1. c.131.  
Lib. & cap.  
4. Hætor.

**M**ΗΛΕΨΑ μηδική, Malus Medica, & Assyria dicitur, vtroque nomine à regionibus ducto, præterea Citria, seu Citrea. Fructus, Mala Medica, & Cedromela, & Persica, auctore Dioscoride, ac Theophrasto: ἡ δὲ μηδικὰ χώρα, καὶ πέρις ἀλλὰ τε ἔχει πλείω, καὶ τὸ μῆλον τὸ μηδικόν, καὶ περὶ σικκὸν καλεῖται. Id est, Media regio & Persis alia plura profert, & quod Malum Medicum & Persicum vocant. Citria Latini appellant Citrea, & Citromela, Galli Citrons, Itali Cedri, & Citroni, Hispani Cidras, Germani Citrimoepffel, Iudænoepffel, & Citro naten. Angli Citron tre, Belgi Citrotuen. Malus Medica Aurantiis, & Limoniis arboribus magnitudine par est: folia fert Laurina, vel Aurantium foliis similia, foraminibus visum fere effugientibus vndique punctim traiecta. Quare valde deprauatos esse Theophrasti Codices, falsamque Theodori interpretationem, in quibus Mali Medica folia Portulacæ foliis comparantur, Matthiolus, doctique alij viri rectè videntur existimasse. Sic enim Theophrastus: ἔχει δὲ τὸ δένδρον τὸ το φύλλον μὲν ὅμοιον, καὶ χεδὸν ἴσον τῷ τῆς ἀνδράχνης, ἀκάνθας δὲ διὰς ἀπίας, ἢ ὀξύακας, λείας δὲ καὶ ὀξείας σφοδρά, καὶ ἰσχυράς. Theodorus. Habet hæc arbor foliū simile, & penè æquale atque Portulacæ, aculeos quales Pirus, aut Spina acuta, sed leues, acutiusque vehementer, & validos. A quibusdam scribit Matthiolus pro ἀνδράχνης legi ἀράχνης, id est, araneorum telæ, quod iis videantur Mali Medica folia tota valde exilibus foraminibus peruia, vt per ea, veluti per linteum spissius, transpici possit, facile telis araneorum comparari posse: à quibus tamen dissentit, ex Plinio pro ἀνδράχνης reponens ἀδράχνης, quæ

*Forma.*

*MALVS CITRIA.*



In li.1. Dioscor. ca.131.

Lib.13. c.22.  
Lib.12. ca.3.  
Lib.3.

Adrachne Plinio sylvestris est arbor, neque in planis nascens, similis Vnedoni, cuius folio, idem Plinius Medica Mali folium simile facit. His addo Athenæi testimoniū indicatum Theophrasti locum citantis: ἔχει δὲ τὸ δένδρον τὸ το φύλλον μὲν ὅμοιον, καὶ χεδὸν ἴσον τῷ τῆς ἀράχνης, ἀδράχνης καὶ καρύας. Id est, folio est hæc arbor simili, & ferè pari Lauri folio, Adrachnes, & Nucis iuglandis. Non dissimulandum tamen in Codicibus vulgaribus, ἀνδράχνης reperiri, id est, Portulacæ. Sed duæ voces ἀράχνης, & καρύας legendū esse ἀδράχνης necessario conuincunt. Quæ enim foliorum Lauri, & Iuglandis cum Portulacæ foliis affinitas? Est & hîc pro Theodoro dicendum, videri eum in Theophrasto ἀδράχνης legisse, non ἀνδράχνης, quoniam



quoniam in eius versione lego. Habet hæc arbor folium simile, & penè æquale atque Portulaca: sic enim ἀδράχην vertit, ad ἀνδράχνης discrimen, quæ Portulaca est. Malus Medica igitur folia edit Lauri, siue Adrachnes, quæ folio, vt ait Theophrastus, & fructu omnino similis est Arbuto, nisi vtrumque id minus esset, quod etiāmnū Græci narrāt, præcipuè Cretēses, apud quos Adrachne frequens, antiquo vocabulo vtrumq; seruatō Andracle nominatur. Arbutus autem folio inter Ilicem & Laurum medio, cuius Arbuti folio, Mali Medica folium confert Plinius, vt diximus. Ramos habet flexiles, viridi libro vestitos, atque spinosos: flores candicantes, Calathi effigie, capillamentis quibusdam in medio extantibus. Arbor hæc omnibus horis pomifera est, inquit Plinius, aliis cadentibus, aliis maturefcentibus, aliis verò subnascētibus. Quibus verbis hæc Theophr. interpretatus est: φέρει δὲ τὰ μῆλα πᾶσαν ὥραν. τὰ μὲν δὲ ἀφήρη, (ἀφήρηται. Ath.) τὰ δὲ ἀνθεῖ, τὰ δὲ ἐκτέλλει. Pomorum aliqua est diuersitas tum magnitudinis, tum saporis. Quædam in molem excrefcunt Melopeponibus parem, cuiusmodi sunt quæ ex Liguria, & Adriatici, Ægæique maris insulis afferuntur, *Pomcires* ea nos vocamus, quasi Poma Citria. Alia his minora. Alia Limonum magnitudine, aut paulo maiora, qualia sunt quæ à lacu Benaco comportantur. Hæc principem in cibis locum obtinent, orique suauiora habentur, etsi cæteris minora. Illa verò grandia, & speciosa magnitudine præstantia, cum insipida ferè gustui non multum placeant, non æquè recentia, atque hæc in cibis probantur. Sed quia pulpæ multo plus habeant Officinis expetuntur Saccharo, vel melle asseruanda. Color omnibus aureus, facies oblonga, vt Limonum, sed crassior corticis pulpæ. Cortex tuberculis, seu rugis asperatus, odore præstat, valde grato. Intus medulla succo acido plena, in qua semen hordei figura, grandius, sapore amaro, duro obiectum cortice. Apud Athenæum magna est inter Diphnosophistas quæstio, an mali Citrij apud antiquos facta fuerit mentio. Inter cæteros Æmilianus refert Iubam Mauritanorum Regem, in iis quos de Libya edidit commentariis Citrij meminisse, & apud Lybes Hesperidum Malum fructum eum dici, ab Herculéque translatus, id in Græciam, dictumq; ibi à quadam auri similitudine aureum Malum, quod edidisse tellurem nunciato Iouis & Iunonis connubio fabulantur: Vnde nuptiale Pomum hoc intelligi volunt. Democritus verò apud veteres Citrij nomen reperiri negat. Eresij tamen Theophrasti verba cogunt, inquit, fateri de Citriis audienda, quæ quarto de Plantar. Historia Philosophus scribit: ἡ δὲ μηδία χόρα, &c. quæ partim recitauimus, partim referemus post hac. Plinij ætate non erant in Italia, vt ipse testatur his verbis: Tentauere gentes transferre ad sese propter remedij præstantiam fictilibus in vasis, dato percavernas radicibus spiramento. Mox subiicit. Sed nisi apud Medos & in Perside nasci voluit. Theophrastus: αἰσίνεται δὲ καὶ εἰς ὅστρονα διαλέρημιά, καθάπερ οἱ φοίνικες. Seritur etiam fictilibus in vasis perforatis, quemadmodum Palmæ. Nunc contra vernæ factæ sunt istæ arbores, atque Italo solo tam familiares, vt non modò in maritimis, sed in mediterraneis etiam tum hortis, tum viridariis, tum etiam insignium lacuum ripis frequentissimæ sint: postea quam Palladij diligentia, industriæque (is enim primus proditur artem hanc inuenisse) factum est, vt ex Media in Italiam translata prouenerint, ac propagata fuerint, quem solers imitata posteritas ea Gallia, Hispaniæq; communicauit. Maturefcunt integro anno, decerpunturq; aureo colore fuluescentia. Theophrasti sæculo nondum Citria Mala in ciborum vsum venerant, id quod testatur his verbis: τὸ δὲ μῆλον ἐκ ἐοδεται μὲν, ἔυσσιμον δὲ πάνυ, καὶ τὸ φύλλον τὸ δένδρου, καὶ εἰς ἱμάτια τεθῆναι τὸ μῆλον, ἀκοπα διατηρεῖ. χρήσιμον δὲ ἐπὶ δὲ τὴν τύχην πεπωκώς τις φάρμακον, ἢ πρὸς τὸ βλάσιν ἀσθμῶν. ἐὰν γὰρ τις ἐψύσας ἐν τῷ ζυμῶ, ἢ ἐν ἄλλῳ τινί, τὸ ἔσθθην

Lib. 3. Hist. cap. 16.

Lib. 12. ca. 3.

Ibidem.

Lib. &amp; cap. 4. Hist.

Matth. ibi.

Lib. 3.

Cap. 4. Lib. 12. ca. 3.

Matth. ibi. Locis.

Tempus.

Lib. 4. Hist. cap. 4.



- Lib.3. εσοθεν τῷ μῆλις ἐκπίεση εἰς τὸ τῶμα, καὶ καταφύφησιν, ποιεῖ τὴν ὁσμὴν ἡδεῖαν. Athenæus verò sic legit. χρήσιμον δὲ, ἐπιδὼν καὶ τύχη τις πεπωκὼς θανάσιμον φάρμακον. Διοβέν. καὶ ἐν ὄνῳ διακρίβῃ τὴν κοιλίαν, καὶ ἐξέλθῃ τὸ φάρμακον, καὶ πρὸς τῶματος, &c. Id est, Pomum eius non estur, sed ipsum odore pollet, & arboris folium, ac si vestibus interferatur Malum, eas ab offensis vindicabit. Vtile etiam cum letale venenum quis hauserit: quippe in vino datum ciet alium, & venenum exigit. Oris quoque suavitatem commendat, & si quis in iure cocti, vel in quodā alio liquore, expressi Pomi interaneis succum sorpserit, suavem halitum cōciliabit.
- Lib.12.ca.3. Malus Assyria quam alij vocant Medicam, inquit Plinius, venenis medetur. Folium eius est Vnedonis, inter currentibus spinis. Pomum ipsum aliàs non manditur: odore præcellit foliorum quoque, qui transit in vestes vnà conditus, arcetque animalium noxia, Et paulo post. Hæc est autem cuius grana Parthorum proceres incoquere diximus esculentis, commendandi halitus gratia. Refert apud eundem Athenæum Democritus Citrium Malum veneni cuiuslibet remedium esse, quod à ciue suo Ægypti gubernatore, didicerat, qui cum deprehensos in maleficio quosdam ad serpentum morsus damnaasset, quos omnibus eiusmodi bestiis lacerandos obicerent, productis illis, & ad theatrum euntibus latronum supplicio destinatum, in via fortè caupona quædam mulier eorum miserta, quod in manibus tum habebat, & arrodebat, Citrium Malum dedit, acceptum verò illi comedere, & paulò post ferocissimis maximisque anguibus oblatis, & ab aspidibus commorssi, nihil læsi sunt, hæsitabundo & attonito iudice, qui tandem custodem eorum militē cum interrogasset, nunquid bibissent, aut edissent, vt id comperit quod acciderat, nimirum absque dolo Citrium illis traditum fuisse, postridie alteri rursus dari iussit, alteri minimè. Percussus hic confestim periit, incolumi altero qui Citrium prægustauerat: indeque cognitum est, multis expertis, Citrium aduersari venenis omnibus. Quod si quis Citrium integrum, quale natura est, cum semine, in Attico melle coquat, donec liquatum tabescat, & eius liquoris, in matutino, tres quatuorue digitos sumat, tutus erit à venenatis omnibus medicamentis. Easdem Mali Medici vires Vergilius quoque celebravit, & faciem arboris depinxit his versibus:
- Georg.2.  
*Media fert tristes succos, tardumque saporem  
 Felicis Mali: quo non præstantius ullum;  
 Pocula si quando seus infecere nouerca,  
 Miscueruntque herbas, & non innoxia verba,  
 Auxilium venit, ac membris agit atra venena.  
 Ipsa ingens arbor, facièmq; simillima Lauro:  
 Et si non alium latè iactaret odorem,  
 Laurus erat: folia haud ullis labentia ventis:  
 Flos apprimè tenax: animas & olentia Medi  
 Ora fouent illo: & senibus medicantur anhelis.*
- Lib.1. c.131. Malum Medicum Dioscoridi oblongum est, rugosum, colore aurum imitans, cum grauitate odoratum: semen habet Piri. Id in vino potum venenis resistit, alium mouet, oris suavitatem commendat, decocto eius colluto, aut succo: estur in malacia mulieribus: vestiariis impositum ab erosionis vitio vestes vindicare existimatur. Citrea contra venenum in vino bibuntur, inquit Plinius, vel ipsa, vel semen. Faciunt oris suavitatem decocto eorum colluto, aut succo expresso. Horum semen edendum præcipiunt in malacia prægnantibus: ipsa verò contra infirmitatem stomachi, sed non nisi ex aceto facile eduntur. Mali
- Li.7.simpl. Medicæ fructus, quod ait Galenus, non iam Malum Medicum, sed ab omnibus Citrium



Citrium nuncupari solet. In fructu vincentem is habet qualitatem acidā & siccam, vt tertij sit ordinis resiccantium, refrigerantiūque. In cortice verò desiccantem etiam temperiem est sortitus, non parum habentē acrimonia. Quare hic desiccat secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infra: Cæterum caro eius crassi pariter succi est, & pituitosa, frigidāque: nam & ipsa editur, sicut & cortex. Fructus totus edulis nō est, nempe nec humidum illud & acidum, de quo primū differui, nec granum quod in illo inuenitur, & reuera semen est. Amarum hoc est, & digerendi videlicet, siccandique facultatem obtinet, secundo propemodum ordine à temperatis recedens: folia verò exsiccandi, ac digerendi vim habent. Hæc Galenus. In quibus animaduertendum esse annotat Matthioli, hæc Galeni verba, In fructu, ἐν τῷ καρπῷ, quidem vincentem habere qualitatem acidam, & cætera, non de nucleis, seu verò semine accipienda esse, sed de acido Citrij succo, cuius in medio semē includitur. Eam Galeni mentem esse declarant ipsius verba in fine capituli adiecta, Fructus totus esui ineptus est, nēpe tum humidū illud & acidū, de quo primū differui, tum nucleus qui in illo inuenitur, & reuera semen est, & cætera: quam Galeni sententiam non rectè asscutus Auicenna, inquit Matthioli, semen Citrij secundo ordine calidum siccūque esse scripsit: at libro de viribus cordis frigidum siccūque tertio, nulla acidi succi Citrij mentione facta, quem Galenum seminis Citrij nomine comprehendisse diximus. Ego verò in Codice Auicennæ Venetiis excuso, & ab Andræa Bellunenſi correcto, lego corticem Citri calidum esse primo ordine, siccum in fine secundi: carnem eius calidam humidāq; primo: succum ipsius acidum, frigidū siccūq; tertio: semen calidū primo, siccum secundo. Libro verò de viribus cordis, semen esse siccū tertio excessu, in quibusdam exemplaribus frigidū, siccūq; esse secundo. Citria si cruda manduntur, inquit Math. non facili cōcoquantur, & crassum generant succū: quare iis melle, aut Saccharo conditis vesci satius est: ventriculū enim calfaciūt, & roborāt. Nostra tamen ætas gulę nimii indulgēs in cibis Citria cruda præfert cum assatis carnibus esitata. Citria aduersus atrā bilē, & tristitias quas illa exci-

Temper.

In li. 1. Dioscor. c. 13.

Lib. 2. Can. ibidem.

Lib. 2. Can. cap. 39.

Tract. 2. c. 3

Ibidem.

LIMONIA MALVS.



tat, opitulantur. Semen priuatim scorpionum ictibus & potum, & appositū medetur. Acidus eorum succus flauam reprimat bilem, arcetq; pestis contagia. Quare recentiores medici ad febres pestilentes, Serapiis ex eo confectis feliciter vtuntur. Hominū industria translatione, insitione, omni denique cultus māgno Citria in plures digessit formas, vt remissiore sapore & vehementiore, item dilutiore saturatioreque colore differret: non multum tamen natura, & viribus, veluti Limonia, Aurantia, atque Poma Adami vulgo nominantur. Limonia quæ Galli *Lemons* vocant, Angli *Limontree*, Itali *Limon*, tum facie, tum facultate Citria magis referūt: sunt tamen illis minora, oblonga, cute minū crassa, pallida, copiosiore succo pręnantia, & acidior: semine ferē simili, minore. Arantia Poma, siue Aurantia, quod colore auri reluceant, ab auro meritò dicta esse videtur, vt aurea Mala verē nominari possint, Gallice *Aurenges*, Germani

Matthioli.

Forma

Limo.

Nomina

Nomina



## AVRANTIA MALVS.

Forma  
Aurant.

sed etiam ad medendum perutilis, præsertim ad pestilentes febres cū exanthematibus corpus obsidentibus. Nam sex vnciarum pondere hausta putres humores ab internis ad exteriora attrahit per sudores, quos valenter euocat, cordiꝫ plurimū confert. Arbores istæ, vt & Mali Citriæ, semper fructu onustæ sunt. Aurantia calidiore sunt cortice quā Limonia & Citria. Ille enim reliquis acrior & amarior gustu deprehenditur. Dulcia omnibus partibus excalfaciunt,

## POMA ADAMI.

Forma  
Arbo. A-  
dam.

*Pomerantzēn*, Angli *Orenge tree*, Belgæ *Arangie oppel*: Hispa. *Naranzas*. Rotundiora Limonibus, sunt cortice spissiore, amarioreꝫ, primum viridi, per maturitatem aureo prorsus colore nitente, minutissimis punctis notato. Intus alba caro intercurfantibus membranis conclusa, succo multo abundans, qui in quodam genere acidus, in alio dulcis, in alio vinosus est: semen paruum amarum. Horum & Limonum arbores, vt & Citriorum, coma perpetua virent, foliis Lauro latifoliæ proximis, crassis, læuibus, odoratis, in acutum desinentibus. Sed Aurantium foliis hoc propriū est, vt ad petiolorum omnium exortum, foliolum præcedat cordis figura, cui adnectitur foliū maius quod sequitur. Rami perinde ac in illis sunt flexiles, lenti, aculeati, cortice ex viridi subalbicāte: flores albi, odoris præstantissimi. Quibus in locis copiose proueniunt, sedulò ab vnguentariis ij decerpuntur ad varia odoramenta conficienda: maximè verò ex iis aqua elicitur non solum odore præcellens, sed etiam ad medendum perutilis, præsertim ad pestilentes febres cū exanthematibus corpus obsidentibus. Nam sex vnciarum pondere hausta putres humores ab internis ad exteriora attrahit per sudores, quos valenter euocat, cordiꝫ plurimū confert. Arbores istæ, vt & Mali Citriæ, semper fructu onustæ sunt. Aurantia calidiore sunt cortice quā Limonia & Citria. Ille enim reliquis acrior & amarior gustu deprehenditur. Dulcia omnibus partibus excalfaciunt, ceterorum succus refrigerat, & putredini aduersatur: quare febricitantibus conueniunt, dulcia verò contra. Ex Limoniorum sicuti & Citriorum succo fit Serapium ad extinguendum bilis feruorem non inutile, item ad pestilentes febres, & eas quæ contagionis vitio inficiunt. Aqua quæ ex Limonū succo vitreis metis extillauit, præterquam quod à mulieribus expetitur ad ornandam fucandamq; faciem, vitiliginēs & totius corporis maculas emendat, varos delet, acaros interimit: Serapiis admixta febribus acutis & cōtagiosis mirè succurrit. Epota ventris tineas necat, id quod etiam præstat succus recens expressus vnciæ pondere potus. Ex vino Cretico haustus mirificè calculos pellit. A Limonibus nō multū natura & viribus differunt Poma Assyria, quæ dicuntur vulgo Poma Adami, Gallis *Pommes d'Adam*. Plāta etenim quæ hæc gignit, folio est Limonij arboris, maiore, latiore: ramis similibus, floribus Citrei Mali: fructu Aurantiis duplo triplōue maiore, rotūdo, cortice non



non admodum crasso, pallido, crispo rimis quibusdam aspero & inæquali, perinde ac si dentibus demorsus esset: quare putat ignarum vulgus hoc illud esse Pomum, quod in Paradiso deliciarum Adamus ederit. Succosa & acida madet pulpa, sapore Limonibus haud absimili, sed non tam palato grata, in qua latent semina Citreis, aut Limoniis similia. Valet horum Pomorum succus ad ea omnia, ad quæ Limonia, sed minore efficacia. Peculiariter autem valent hæc Pomina ad scabiem, si per medium secta, & tenuissimo sulfuris puluere aspersa, deinde cinereferuente calfacta, corpori scabioso affricentur.

MALVS PVNICA, CAP. VI.

**M**ALVS PUNICA Græcis *ροῖα* & *ροῦα* dicitur, quo nomine fructus etiam nuncupatur, Latinis Malum Punicum, Africa circa Carthaginem Punicum Malum cognomine sibi vendicat, inquit Plinius, aliqui granatum appellant. Hippocrates *σίδας* appellat *ροῖα*, id est Mala Punica, *σίδας* *δινώδες* *ἐκ* *χυλῶσας*, *ἀλφίτα* *φυρήλας* *τῷ* *χυλῷ* *ἐπράνον*, &c. Ibidem tamen mox etiam *ροῖην* *γλυκείην* habet: Et alio in loco: *ροφέν* *σίδης* *δινώδες* *τὸν* *χυλὸν*, id est, Mali Punici vinosi succum sorbendum præcipit. Arabes *kuman*, *Ruman*, seu *Roman* vocant, Itali *Melagrano*, & *Pomogranato*, Germani *Granatoepffel*, Hispani *Granadas*, & *Romanas*, Galli arborem *Grenadier*, fructum *Pome de Grenade*, & *Migraine*, Anglis *Pomaranat tree*, ab interiorum granorum multitudine. Sunt tamen qui ita dici velint à Granata Hispaniæ regione, quod in ea valde multa proueniant. Plura Mali Punici genera sunt. Plinius. Diuisit & in genera, Apyrenon vocando, cui lignosus nucleus abest. Sed candidior ei natura, & blandiores sunt acini, minusque amaris distincti membranis. Mox addit. Nucleos habentium quinque species, dulcia, acria, mista, acida, vinosa. Quum itaque genera quinque hoc loco tradiderit, superuacua vox legitur alio in loco, in quo legitur: Punici Mali nouem genera nunc iterare superuacuum. Dioscor. tria tantum agnoscit, dulcia, acida, vinosa, quæ vinosa mediam, inquit, sortiuntur naturam. Alij *μέλα* vocant, id est, nec dulcia, nec acida, sed inter hæc media, Arabes *Muza*, quia *μέζον* in Muzum corruperunt. Monspelienses *Mezanus* appellant, seruatō quidem *τῶν* *μέσων* nomine, quamuis non integro, Dioscor. igitur vno genere dulcia, altero acria & acida, tertio mista & vinosa comprehendit. Præterea alia sunt syluestria, alia mitia, & in cultis nascentia. Punica Malus arbor est haud adeo procera, folio angusto, nitidique virosis, Oleæ, aut Myrti æmulo, crasculculo, rubris intercurfantibus venulis, è rubro pediculo pendulo. Rami multi, flexiles, spinosi: flores phœnicei, oblongi, calathi modo patuli, ore stellatim dissecto, è quo folia emergunt tenuia, colore coccineo, agrestis Papaueris æmula, cum granulis quibusdam, mediis capillamentis appensis, vt in Rosa. Fructus Pomum est, corio & membrana relictum, extra rufescente, intra flauescente, innumeris granis factum, angulosis, rubentibus, vinoso succo refertis ossiculosis in eis latentibus, quæ grana intercurfanti-

Nomina

Lib. 13. c. 19.  
Li. de mul.  
nat.

Lib. 1. de  
mor. mu.

Genera.

Lib. 13. c. 19.

Lib. 23. c. 6.

Lib. 1. c. 127.

Forma.

Matth. lib.  
1. c. 127.





bus flauis tenuibûsque membranâs miro naturæ artificio distinguuntur. Ligni  
 Li.16. c.26. materies flaua, cinereo cortice vestita. Punica in iis numerat Plinius quæ fructû  
 perdunt facillimè ante maturitatem, & quæ roribus etiam nimis, & pruinis flo-  
 rem amittunt. Qua de causa inflectunt ramos eius, ne subrecti humorem infe-  
 stum excipiant, atque contineant. Si florem non continet, vrinam veterè cum  
 aquæ mensura pari temperabis, & ter per annum radicibus infundes, vel arbo-  
 ris florentis truncum plumbeo concludes circulo. Quidam Punicis Malis sub-  
 Plin.lib.17. strato lapide non rumpi Pomum in arboribus tradunt. Punica satiuæ florem  
 cap.11. Cytinum Dioscorides vocat, Balaustium syluestris. Plinius sine discrimine Pu-  
 Lib.1.c.127. nica florem Balaustium nominat, & medicinis idoneum, & tingendis vestibus,  
 Lib.13. c.19. quarum color inde nomen accepit, nimirum Punicæus. Et alio in loco, primus,  
 Lib.23. c.6. inquit, Pomi huius partus florere incipientis, Cytinus vocatur Græcis. In hoc  
 ipso Cytino flosculi sunt, antequam scilicet malum ipsum prodeat, erumpen-  
 tes, quos Balaustium vocari diximus. Sic & Officinæ citra distinctionem Ba-  
 laustia nominant & vsurpant, vt quibus Cytinorum appellatio de satiuorû flo-  
 re penitus ignota sit. Præstâtissimi Cytini, & valde rubri ex Creta, & Cypro ho-  
 die Venetias importantur, aspectu quidem pulcherrimi, & cæteris efficaciores,  
 quibus similes fiunt in Italia mangonio, sed non adeo præstantes. Asperû Mali  
 Punici putamen Græci Sidion appellant, Officinæ corrupta voce psidion, Lati-  
 ni Malicorium, quod Plinio auctore, vulgus coria maximè perficere illo nouit.  
 Lib.23. c.6. Punica genera omnia non solum in Africa, sed etiam in Italia, Hispania, Gallia  
 Locu. Narbonensi, in Viridariis, hortis, & vinetis copiosa nascuntur. Amat solum cre-  
 tosum, macilentum, sed in pingui quoque prouenit. Regio ei apta, quæ calida  
 Vires. est. Malum Punicum omne boni succi est, auctore Dioscoride, stomacho vtile,  
 Lib.1.c.127. perexiguum præbens alimentû. Dulcia stomacho vtiora habetur, sed aliquan-  
 tulum in eo calorem gignunt, inflationes pariunt, vnde in febre abdicantur.  
 Acida adstringunt, æstuanti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt,  
 ac vrinâ cient. Vinosa verò mediam fortiuntur naturâ. Nuclei acinorum acidi  
 Punici in sole siccati, & obsoniis insparsi, concoctiue, fluentem aluum stoma-  
 chumque sistunt: iidem cælesti aqua madescunt, bibunturq; cômmodè sanguinem  
 excreantibus: ad defessus dysentericorum, fœminarumq; fluxione vuluæ labo-  
 rantium vtilis sunt. Expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris,  
 virilitatis, & sedis vlcera, nomas, reduuias, & ea quæ in corpore extuberant, au-  
 rium dolores, & narium vitia, præsertim acidorum. Huius flores, Cytini vocati,  
 adstringunt, siccant, cohibent: sanguinolenta glutinant: quas & Malum Punicû  
 præstat vtilitates. Humida gingiuarû vitia, mobilisq; dentes decocto colluun-  
 tur: herniam prolapsu intestini erumpentem cataplasmate repellunt. Memoria  
 tradunt, qui tres quàm minimos Cytinos deuorauerit, nullam eo anno lippit-  
 tudinem passurum. Eliquatur Hypocistidis modo. Malicorium asperû est Mali  
 Punici putamen, quod aliqui Sidion appellant. Id spissandi vim habet, & quos  
 Cytini præbet vsus. Decoctû radicis potu latas ventris tæniâs pellit, & ead-  
 em euocat. Balaustium syluestris Punica flos est, Cytino similis. Eius complura sunt  
 genera, candidum, fuluum, colore rosaceo. Succus ex eo exprimitur Hypocisti-  
 dis modo: cui adstrictoria vis inest, eadem efficiensq; Hypocistis & Cytinus.  
 Hæc Dioscorides, in quibus quæ Græcè leguntur, εἰς ἐγκαθίσματα διυστερευόντων, καὶ  
 ποικίλιν ἀρμόζει, & vertit Ruellius ad defessus dysentericorum, & fœminarum flu-  
 xione vuluæ laborantium vtilis sunt, Cornarius aliter interpretatus est, iis ad  
 infessus dysentericorum, & fluxione alui laborantium nucleus commodus est:  
 vt sint ποικίλοι, qui ποικίλιν γὰρ πὸς τὰ αὐτὰ habent, neque ποικίλιν γυναικείας hîc intelligendæ  
 Lib.23. c.6. sint. Punica dulcia, quæ Apyrena alio nomine appellauimus, inquit Plinius,  
 stoma



stomacho inutilia habentur, inflationes pariunt, dentes gingiuasque lædunt. Quæ verò ab his sapore proxima vinosa diximus, paruum nucleum habentia, utiliora paulo intelliguntur. Aluum sistunt, & stomacho profunt, duntaxat pauca, citràque satietatem. Sed alimenti dulcia minimum dant, atque omnino nulla in febrì, nec carne acinorum utilia, nec succo. Medentur æquè in vomitionibus, ac bilem reicientibus. Vuam in his, ac ne mustum quidem sed protinus vinum aperuit natura. Vtrúmque; asperiore cortice. Hic ex acerbis in magno usu. Vulgus coria maximè perficere illo nouit: ob id malicorium appellant Medici. Vrinam cieri eodem monstrant: immistâque Galla in aceto decocto, mobiles dentes stabiliri. Expetitur grauidarum malaciæ, quoniam gustatu moueat famem. Diuiditur malum, cælestique aqua madescit ternis fere diebus. Hæc bibitur frigida cæliacis, & sanguinem excreantibus. Ex acerbo (Punico) fit medicamentum quod stomatice vocatur, utilissimum oris vitiis, narium, aurium, oculorum caligini, pterygiis, genitalibus, & iis quas nomas vocant, & iis quæ in vlceribus excreant. Contra leporem marinum hoc modo. Acinis detracto cortice tuis, succoque decocto ad tertias cum Croci, & Aluminis scissi, Myrrhæ, Mellis attici, selibris. Alij & hoc modo faciunt. Punica acida multa tunduntur, succus in cacabo nouo coquitur Mellis crassitudine, ad virilitatis & sedis vitia, & omnia quæ Lycio curantur, aures purulentas, epiphoras incipientes, rubras maculas. In manibus rami Punicorum serpentes fugant. Cortice Punici ex vino decocti & impositi perniones sanantur. Contusum Malum ex tribus heminis vini, decoctum ad heminam, tormina sedat, & tænias pellit. Punicum in olla noua, operculo indito, in furno tostum & contritum, potúmque in vino sistit aluum, & discutit tormina. Primus Pomi huius partus florere incipientis, Cytinus vocatur Græcis, miræ obseruationis multorum experimento, (id Dioscorides & sine superstitione tradidit.) Si quis vnum ex his, solutus vinculo omni cinctus, & calceatus, atque etiam annuli, decerpserit duobus digitis, pollice & quarto sinistræ manus, atque ita lustratis leui tactu oculis, mox in os inditum deuorauerit, ne dente contingat, affirmatur nullam oculorum imbecillitatem passurum eo anno. Idem Cytini siccati tritique, carnes excrecentes cohibent: gingiuis & dentibus medentur, vel si mobiles sint decocto, vel succo. Ipsa capitula trita, vlceribus quæ serpunt, putrescuntue illinuntur. Item oculorû inflammationi intestinorumque, & fere ad omnia quæ cortices Malorum aduersantur scorpionibus. Non est satis mirari curam diligentiamque priscorum, qui omnia scrutati nihil intentatû reliquere. In hoc ipso igitur flosculi sunt, antequam scilicet Malum ipsum prodeat, erumpentes, quos Balauistium vocari diximus. Hos quoque ergo experti inuenerunt scorpionibus aduersari. Sistunt potumenses fœminarum: sanant oris vlcera, tonsillas, vuam, sanguinis excreationes, ventris & stomachi solutiones, genitalia, vlcera quacumque in parte manantia. Siccauere etiam, vt sic quoque experirentur, inueneruntque tusorum farina dysentericos à morte reuocari, & aluum sisti. Quin & nucleos ipsos acidorum experiri non piguit. Tosti tuisque stomachum iuuant, cibo aut porioni insparsi. Bibuntur ex aqua cælesti ad sistendam aluum. Radix decocta succum remittit, qui tænias necat victoriati pondere. Eadem discocta in aqua, (id est tam diu cocta, quoad coctura tabescat,) quas Lycium præstat utilitates. Est & syluestre Punicum à similitudine appellatum. Eius radices rubro cortice denarij pondere ex vino potæ somnos faciunt. Semine poto aqua quæ subierit cutem, siccatur. Mali Punici corticis fumo culices fugantur. Hactenus Plinius. Li. 8. simpl.

Malum granatum omne Galeno teste adstringentem qualitatem habet, non tamen in omnibus ea exuperat: sunt enim inter ea quædam acida, quædam



magis dulcia quàm austerà, & sanè quæ ab vnoquoque eorùm procedit vtilitas, secundum vincentem eueniat qualitatem necesse est. Porro acini magis quàm succus, tum adstringunt, tum exsiccant: his etiã magis putamina, quæ vocantur Sidia. Similem illis vim habent Cytini. Paratur, inquit Matthiolus ex floribus Punica, hoc est, ex internis Cytinorùm Puniceis, ac tenuibus foliis, & Saccharo conditum; quemadmodum ex Puniceis Rosis, admirabilis facultatis ad vtrâque vteri fluxiones, si seminiaciâ pondere sumatur ex vino rubro austeriusculo, aut ex Punicorùm acidorùm succo, aut ex aqua in qua stomonia extinctum fuerit, vel etiã ex carniùm iure, si alia defuerint. Cæliaci quoque & dysentericis, & gonorrhæa laborantibus valde confert. Malicorùm exsiccatum cum sicca similiter marita spōgia, & Aloe tritum, æquali omniũ pondere, addito Aluminis vsti momento penis & vuluæ vlcera breui sanat. Punica folia diligenter contrita, aut eorùm succus Rosaceo permixtus, inueteratos capitis dolores valde mulcet, fronti frequenter illita. Punicum Malum fictili vase conclusum, operculo argilla circumlito; in furno combustum, dysentericos ac torminosos præsentaneo remedio iuuat, pulueris ipsius sesquidrachma hausta. Olsiculorùm Punicorùm acidorùm vncia cum thuris drachma in tenuissimũ puluerem trita, auxiliatur scæminis albo vteri profluuiò laborantibus, si quotidie ex aqua rosacea binas huius pulueris drachmas hauserint. Fit ex Punicis maturis vinum, quod Rhœtes nominatur, fucto expresso ab acinib; eorùm, quibus lignosus nucleus abest, Apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluuiò exortam: stomacho vtile astringit aluum, & vrinam mouet. Hodie acini maturi diligenter à coriis & membranis purgati. Prælo committuntur, ac exprimuntur: mox vinum faccis ad id accommodatis percolatur, & in vasculis id excipientibus residere sinitur, defæcatum reponitur affuso oleo, ne corrumpatur, vel acefcat.

Dioscor. li.  
5. cap. 34.

P I R V S, CAP. VII.

Nomina



RÆCIS ῥῆκος, Latinis Pirus dicitur, multis Pyrus à fructus figura, quod ad Pyramidis similitudinem è lato in acutum spectet, & in mucronem turbinetur, Gallis *Poirier*, Germanis *Byrbaum*. Fructus vocantur Pira, Græcis ῥῆκια, Arabibus *Humelthe*, *Cirmetre*, seu *Kemetri*, Italis *Pere*, Germanis *Pyren*, & *Byren*, & *Byr*, Hispanis *Pyras*, Gallis *Poires*, Anglis *Pear*, Boemis *Hrusky*, Belgis *Perre*. Vt Malorũ, ita Pirorũ plurima fuere apud antiquos genera, quæ à primis auctoribus, regionibus, colore, sapore, notis quibusdam, tempore quo decerpuntur, nomina inuenerunt. Sunt superba, inquit Plinius, parua, sed ocysima, (vulgo *Poires muscadelles*), cunctis autem Crustumina gratissima, (vulgo *Poire perle*). Proxima iis Falerna à potu, quoniã tanta vis succi abundat, (vulgo *Poire Bergamote*). Lactea à candore vocantur, vulgo *Poire Blanchete*: alia colore nigro donauit Syria. Reliquorùm nomina aliter in aliis, atque aliis locis appellantur. Sed confelsis vrbis vocabulis auctores suos nobilitauere Decimiana, & ex eo tractum quod Pseudodecimianum vocant. Dolabelliana longissimi pediculi, (vulgo *Poire musset*). Pompeiana cognomine māmōsa, (vulgo *Poire de Bon chrestien*), Liceriana, (vulgo *Poire d'argent*), Seueriana, & quæ ex his nata sunt Tyranniana, longitudine pediculi distat, Fauoniana rubra, (vulgo *Grosse Muscadelle*), paulo superbis maiora. Lateriana, (à colore laterum, vulgo *Poire prenost*), Anitiana, post Autumnalia, acidulo sapore iucunda. Tiberiana appellantur, quæ maximè Tiberio principi placuere, (vulgo *Poire forest*), Colorantur magis sole, grandel

Genera.

Lib. & c. 15.



grandescuntque, alioqui eadem essentq; Liceriana, Patriæ nomina habent, serenissima omnium Amerina, (vulgo *Poires de saint Martin*.) Picentina, Numanina, Alexandrina, Numidiana, Græca; ex Achradè Spinosa arbore, quam Græci maxima diligentia coluerunt, & adhuc colunt, *Poire d'Espine*: & in iis, Tarantina Siguina, quæ alij à colore Testacea appellant, vulgo, *Poirechat* sicut onychina à colore gemmæ onychis, vulgo *Poire de cuisse madame*: purpurea. Ab odore Myrapi, qualis est vnguentorum fragrantium, vulgo *Caluau rosat*, Laurea: Nardina. A tempore, Hordearia, quæ cum hordeo maturescunt, vulgo, *Poire de S. Ian*, à collo, Ampullacea, vulgo, *Poire d'Angoisse*, à corio, nimirum cortice deplato simili, vulgo, *Poire de ialouise*, Bruta gentilitatis Cucurbitina, (vulgo, *Poire Courle*,) Acidula, succi, vulgo, *Poire pomme*. Incerta nominum causa est, Barbaricis, Venereisque, quæ Colorata dicunt, *Poire Acciole*, Regiis, quæ minimo pediculo sessilia, vulgo *Poire Carmagnole*, Patritiis, Voconis, Viridib<sup>9</sup>, vulgo *Poires d'hyuer*, oblongisque, vulgo, *Poires Certeau*, Prætera dixit volema Virgilius, à Catone sumpta, (quod volam impleant, vulgo libralia: *Poire de liure*,) qui & Sementiua, & Mustea nominat. Scripsit & paulo ante idem Plinius, nec non & quædam è Piris libralia appellata, amplitudinem sibi ponderis nomine asserunt. Multo plura sunt hodie, imò infinita in tota Europa Pirorū genera, quæ propterea sigillatim explicari non possunt. Ex quibus hæc apud Gallos magno habentur in honore. Omnium gratissima sunt *Bon Chrestien*, cognomine, non ob hoc solum quod in eximia suauitate librale pondus æquent, sed quia teneritudine tanta, vt à gustatu, vel in ipso ore statim eliquescant, & perennent, gestatumque tolerant, ad Neapolim vsque delata Carolo octauo ibi res gerente, & à felici illa Campania, àis dotibus adoptata. Proxima magnitudine iis Mariana, vulgo Diuæ Mariæ Pira dicta, *Poires de nostre Dame*, aquosa dulcedine suaui, mira teneritudine placent, sed fugaciora multo. Minima omnium sunt Moschata, *Poires Muscadelles*, quæ nomine alio Chia dicuntur, *Poires de Chio*, baccas corporis mole non excedentia, quina, senaue, sæpe plura ab vna origine longis pendula pediculis, odorata, moschi iucunditate & ob id nomen hoc adepta erunt. Condiuntur saccharo à Salgamariis, vt in sequentem annum durent. Media magnitudine sunt Calliona, *Poires de Cailloiau*, carne iucunda, dulci, odorata, friabili. A præstantia Piri Græcum nomen vulgus emendicauit, quasi dixeris meliora. Rosatis odor nomen dedit, quod Rosas oleant, *Poires d'eau Rose*. Bicipitia, quod gemino capite visuntur, *Poires à deux Testes*, singulari sunt commendatione, corpore suauis, non lapidoso, succi grati, palatum etiam morosum recreantis. Turbinatiora cæteris Certoliana, quæ Campanica alio nomine dicuntur. Ea in metâ speciem fastigiantur, hiemem tolerant, durioris corporis callo, mira suauitate, succo paucò. Prunis tosta fugacium ad veris exitum suppleant inopiam. Condiuntur & saccharo, adiecto Cinnamomi tantulo, vt cœnas claudant. Alia item Martiniana, *Poires de S. Martin*, quæ ad hiemem vsque in parente propendent, suauis gustu, firmisscula carne, quæ non nisi cocta ferè manduntur. Vbi gelicidia sensere teneriora multo: ea etiam hibernas menses finiunt. Quæ finora Gallicè vocantur, *Poires de fin or*, quod auri puti colorem referant, asperiores sunt carne, ac duriores, nec priusquam gelu experiantur, edomita duritie mitescunt. Ea diutissime durant, quamuis in eo genere æstiuâ inueniantur, & præcocia. Magnopere commendantur Bergamota, *Poires Bergamotes*, haud ita pridem seri cœpta in Gallia, & sapore, & succo præstantia. Non sunt omittenda Pira quæ tametsi pulchritudine, rubroque colore, aut luteo, quasi maturitatis indice, prætereuntes inuitent ad carptum, mansa tamen tanta displicent acerbitate, vt deuorari nequeant, sed demorsa protinus respuantur. Ob id strangulanea vulgo dicun-

Li. 15. ca. 11.

Ruel lib. 1.  
cap. 115.



tur, *Poires d'estrangillon*. Ex his, quamvis sapore adeo ingratis potus sit, paucis mensibus sic mitescens ut à nesciis pro albo vino bibatur, evanescente illa summa acerbitate brevi tēporis spatio, feròque & indomito succo in vini gustum dulcescente, quod certè mirum est. Singula quotidie novis insitionum adulteriis emergentia prosequi neminem posse iam diximus. Hetrusci quoque, inquit Matthio. antiquos secuti variis nominibus à diuersis causis inditis sua Pira vulgo appellant, *Moschatelle, Giugnole, Ciampoline, Roggie, Ghiaciule, Spinose, Quadrane, Carouelle, Papali, S. Nicolo, Durelle, Zuccaie, Capane, Vernareccie, Gentili, Porcine, Sementine*. Plura iidem alia habent suis nomen claturis appellata. Sunt etiam duo in vniuersum quidem Piri genera. Est enim Pirus satiuus, & pirus sylvestris, quæ ἀχρᾶς vocatur, & ὄχυν, idest Piraster. Dioscorides tamen cum scribit, ἡ δὲ ἀχρᾶς εἶδος ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ἀχρεῖς, βραδέως περναίνουμένη. Idest, Achras Piri sylvestris genus est, quod tardè maturefcit, Achradem Piri speciem quandam facit. At Theophrastus ceterique omnes Achradem simpliciter Pirastrum quamcūque accipiunt, cuius variæ sunt differentie. Quod per transennam supra nos diximus, Achras lirus est spinis quidem horrida, agrestis modo, sed pulcherrimo & optimo fructu, quod insitione factum arbitror: ὄχυν verò, spinis quoque armata, sylvestris omnino est, ac inculta, aliquando mediocris altitudinis, sapius humilis arbuscula, pusillo fructu, insuauissimo, nec homini eduli, Pirus arbor est Mali magnitudine, imo maior & procerior. Simplici crassòque caudice assurgit, plurimis ramis brachiato, rutila, crispàque materie trūci: foliis orbiculatis, superne

Lib. 1. Diosc.  
cap. 132.

Ibidem.

Forma.

P I R U S.



Tempus.

Li. 1. ca. 132.

Vires,

cataplasmata Decoctum è siccis, & cruda ipsa aluum sistunt: ieiunos elirata laxant. Achras nempe sylvestre Pyrum vim Piro urbano adstringentior habet, & ad eadem conuenit. Stringunt etiam eius folia. Ligni Pirorum cinis efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt fungos, si sylvestria Pira cum eis coquantur, innoxios fieri. Pirorum omnium cibus, teste Plinio, etiam valentibus onerosus, agris quoque vini modo negatur. Decocta eadem mirè salubria, & grata, præcipuè Crustamina. Quæcumque verò, cum melle decocta, stoma

Lib. 23. c. 7.



Stomachum adiuuant: fiunt cataplasmata è Piris, ad discutienda corporum vitia & decocto eorum ad duritias vtuntur. Ipsa aduersantur Boletis, atque fungis, pelluntque pondere, & pugnante succo. Pirum syluestre tardissimè maturefcit. Conciditur, suspensumque siccatur ad sistendam aluum: quod & decoctum eius præstat. Decoquuntur & folia cum pomo ad eosdem vsus. Pirorum ligni cinis contra fungos etiamnum efficacius proficit. Hæc Plinius. Caterum pirorum facultates ex saporibus, & gustu dignoscuntur, cū dulcia natura distent ab acerbis, austeris, acidis, & contrà. Rectè igitur Galenus, Quæ de Malis diximus, inquit, si omnia ad Pira transferantur, nihil nouo alio de his sermone opus erit. Nam in his quoque alia austerà tantum, vel acerba apparent, veluti quædā acida quædam dulcia, quædam ex horum mistione composita, quæ nullam penitus qualitatem exuperantem habeant. Quare cum aquea sint, nulla roborandi vi pollent. Talis igitur omnino Pirorum esus, qualis Malorum. Piri folia quod alio locoidem ait, pariter ac turiones, austerà sunt: fructus dulcedinis quiddam obtinet aqueæ, ex quibus clara quoque temperies est, inæqualis secundum partes. Nam pars vna terrea est, alia aquea, caterum vtraque frigida, tum alia temperata. Proinde Pira esu stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem desiccant, & modicè refrigerant. Nam ego iis illitis vulnus glutinasse memini, cum aliud ad manum non esset. Achrades magis quam Pira reliqua adstringunt, & desiccant, & proinde sanè maiora vulnera glutināt, fluxusque repellunt. Piri, inquit Matthioli, præfertim grandibus, quæ in Hetruria Menate vocantur, aliqua nutriendi facultas inest. Quare ea secta in tenues orbiculos, & siccata reponunt, quibus coctis per hiemem & ver, in aliorum ciborum penuria vescuntur. In furno siccata Pira Galli seruant, & vel ita dura, liquore nullo macerata edunt, vel cum Saccharo aquæ incoxa & emollita, in cibo sumunt, & ægris præbent, excitandæ appetentiæ.

Li. 2. Alim.

Lib. 6. sim.

Li. 1. Diosc. cap. 132.

CERASVS, CAP. VIII.

**C**ΕΡΑΣΟΣ Græcis, Cerasus Latinis, Gallis *Cerisier*, Germanis *Kirschenbaum*, dicitur, fructus *κεράσια*, Latinis *Cerasia*, & *Cerasa*, Arabibus *Sarasie*, Italis *Ciregie*, Germanis *Kirschen*, & *Chirschen*, Hispanis *Cerezas*, Gallis *Cerises*, & *Guines*. Angl. *Cheriff*: Belg. *Kricken*: Boëmis, *Vuisfne*: Athenæus memoriæ prodidit Lucullum Romanorum Imperatorem, posteaquam debellato Mithridate victus esset, primum arborem hanc à Cerasunte Pontico municipio in Italiam detulisse, fructumque gentilitio nomine Cerasium appellasse. Quibus subscribit Plinius. Cerasi, inquit, ante victoriam Mithridaticam L. Luculli non fuere in Italia. Ad vrbis annum Domin. lxxx. is primum vexit è Ponto, annisque, cxx. trans Oceanum in Britanniam peruenire. Genera eorum nominat Plinius Aproniana quæ maximè rubent: nigerriima sunt Aëtia, vt & Cæciliana, rotunda, Iulianis gratus sapor, sed penè tantum sub arbore sua, adeo teneris, vt gestatum non tolerant. Principatus Duracinis, quæ Pliniana Campania appellat: in Belgica verò Lusitanis, in ripis etiam Rhenni. Tertius iis color, è nigro ac rubente, viridique similis maturefcientibus semper. Minus quinquennio est quod prodiere quæ vocant Laurea, non ingrata amaritudinis, insitæ in Lauro. Sunt & Macedonica parua arboris raroque tria cubita excedentis: & minore etiam frutice Chamæcerasi. Gallis horum pomorum varia notantur discrimina. Quædam mediocri arbore, interdum pumila, & quasi frutice, pendent, pediculo breui, pomo rotundo, rubente, carne multa, molli, succosa, osse intus duro, nucleo dulci: quod genus maximè grato placet acore

Nomina

Lib. 2.

Li. 15. ca. 25.

Ibidem.

Genera.



acore, morosâque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malacii antequam maturescat, expetitur. Hoc Francis tantum Cerasij nomen meruit, reliqua varias fortiuntur appellationes. Vocant enim *Cerises*, alia vero Galliarum provincia, ab acore, *Griotes*, & arborem *Griotier*, Ruellius Chamæcerasum dici putat. Quædam Pomo prodeunt, superiori proximo, ex arbore gradiuscula, longiore petiolo, gustu multo acidior & acerbo, cætera simili. Ea nimio sui acore respuuntur, ut alia quæ nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, turbinatiore pomi figura, longioréque, pediculis longis, pluribus vna coeuntibus: baccis partim rubentibus, partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo non insuavi. Hoc malum acidis longe fugacius, primumque in Cerasorum genere maturitatem sentit, vulgus *Guines* & *Guindoules*, appellat. Sed inter ea habentur crassiora, multa carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo pertinacius hærete, qua de causa putat Ruellius Duracina nuncupari. Lugdunenses affini huic nomine vocant, *Duraines*, Quæ in totum rubent, mollicitia cedunt: quæ partim albicant, partim rubescunt, cum vtrisque societatem ineunt. Celerius maturescunt quæ molliore constant carne. Inveniuntur alia in nemoribus & sylvis, nonnunquam in dumetis & cultis, baccis parvis, multum infra supradictorum magnitudinem, callo carnis rotundiore, ossibus appresso, parte soli obversa rubescente, aversa cadicante, sapore dulci quidem, sed dilutiore: ruri familiaria, sponte, nullo humano cultu nascentia. Alia nigerrima quibus succus inest sanguineus. Ea vescentium manus & labra suo sanguine, modo Mororum inficiunt. Vtraque Sessiana rura vocant. Sed posterius hoc veteribus Actianum dici putat Ruellius, ut prius illud forsitam Cæcilianum, curtato (ut plerumque in Gallia fieri solet) vetere vocabulo, cæcilianum pro Cæciliano concisum proferente. Sic & sativarum Cerasorum fructus diuersorum esse generum in Italia, diuersisque nominibus nuncupari scribit Matthiolum, inter Cerasa, inquit, principem locum sibi vendicant, quæ Hetruscis vulgo *Marobiane*, & *Duracine*, vocantur: quorum alia maiora, alia minora, alia saturatè rubent, alia albicant. Quæ Plinio Iuliana, vulgo Hetruscis *Acquaiuolo*, hoc est aquea dicuntur, in nullo sunt pretio, adeo tenera & fragilia, ut nisi in ipsa arbore comedantur, facile gestatu collidantur, & marcescant. Præterea ob aquei succi redundantiam insipida sunt, orique ingrata. Quæ autem *Corbine*, quod coruorum modo nigricent, vulgo etiam vocantur, à Plinio Actia, & Ceciliana, cum sint duriuscula, & dulcia, gustui non sunt iniucunda, sed quia manus labraque atro colore inficiunt, mensis raro apponuntur. Sunt & Cerasia quæ ex vno petiolo terna, quaterna, quinæque dependent. Sunt & coaceruata in racemi modum. In cerasis habentur & illa, quæ Romæ *Visciolo*, Senis *Amarine*, in aliis Italiæ locis *Marasche*, vulgo nuncupantur, ab amarore non iniucundo sic dicta. Horum varia sunt genera, quæ & si omnia acida sunt, tamen quædam magis, quædam minus eo sapore linguâ imbuunt. Rura Tridentina *Marasche* vocant, quæ minus acida gustu deprehenduntur. In horum quodam genere dulce acido permistum est, & ob id palato gratum. Alia *Marine*, & *Marinelle* cognominantur, gustu quidem similia sed minora, rotundiora, & breui pediculo appensa. Est & eorum tertium genus, quæ vulgus *Verule*, vocat, longiore pediculo, bacca crassiore, gustu acerbo, & valde acido, colore perpetuò rufescente, nec unquam in atrum vergente, cum cætera prorsus matura in nigrum rubescant. De sylvestri paruoque admodum Cerasi genere, quod Chamæcerasum vocat Matthiolum, diximus in Dumeto. Sunt & sylvestria Cerasa, quibus montes & sylvæ scatent, auium cibis potius quam hominum, ob acerbum simul & amarum gustum. Hæ sunt igitur



igitur Cerasorum ex sapore, colore, locisque sumptæ differentiæ. Alterius Chamæcerasi meminit Asclepiades Myrleanus apud Athenæum, quæ in Bithynia nascitur, radice parua: neque arborest, neque arbusculis cerasorum impar: bacis cætera omnia consimilibus quæ copiosè vescentibus caput vini modo grauat, & dolores cient. Sed hæc Athenæus putat de Memacylis intelligi, quod huiusmodi fructum ex arbores edant. Cerasus, tradente Athenæo ex sententia Theophrasti, arbor est folio Mespili, præduro, latiore, cortice Tiliæ simili: flore albo, Piri, vel Mespili, pluribus flosculis racematim congesto, fauorū odore, fructu rubro, Diospyri figura, magnitudine fabæ: quamquam acinus Diospyro, mollis, Ceraso durus. Huic descriptioni multa alia addit Theophrastus, Cerasum scilicet ad viginti quatuor cubita proceritatis erigi, valde rectam esse, & à radice crassam, bicubitali crassamento. Plinius ramosam esse Cerasum prodit, & in quadraginta cubitorum trabes, æquali per totum duorum cubitorū crassitudine reperiri. Hæc de Ceraso potissimum paruula cerasa ferente, quæ Gallis, Guines, vocantur, intelligenda esse putat Dodon. Reliquæ enim Cerasi maiora Cerasia, siue acida, siue dulcia gignentes, humiliores sunt in Gallia, & in tantam proceritatem nō aceresunt. Apud Theophrastū multo plura sunt, quæ hīc referre superuacuum foret. Cerasus cuius Paulo ante meminim⁹ procera est, crassaque arbor, cortice læui, spisso, colore Castaneæ: foliis magnis, longis, crenatis: floribus albis, in quinque foliola diuisis: fructu paruo, dulci, modo rubro, modò in nigrum vergente, acino intus concluso, in quo nucleus. Cerasus quæ Maiora Cerasia fert, mediocris est arbor, superiori foliis floribusque similis: fructu longiusculo, rotundo, dulci, modò ex rubro albicante, modò nigricante. Quæ acida Cerasia profert, humilis est arbor, tenera, nec diu durans: folia superiori- bus similia habet, minora: flores item similes: fructum rotundum, acidum, modò rubentem, modò nigricantem, intus nucleum minorem, & rotundio- rem. Ex omnibus his, velut ex Persico Prunòque manat gummi siue lacryma, præsertim vulnerato cortice, ut etiam testatur Theophr. Quæ maiora Cerasia & acida edunt, in viridariis coluntur: reliqua ferè in planis campis, montibus, & syluis proueniunt. Septentrione frigidisque gaudent

Libr. 2.

CERASVS.



Libr. 2.

Lib. 3. Hist.

cap. 13.

Forma.

Ibidem.

Li. 16. c. 30.

Li. 6. ca. 50.

CERASA EX

uno pediculo plura.



Lib. 9. Hist.

cap. 1.

Locus.

Pli. libr. 15.

cap. 25.

Tempus.

gaudent




## CERASA AVSTERA

Matthioli.

## CERASA

Racemosa.



Forma  
Padi.

gaudent. Martio & Aprili mensibus florent, & inter primæ Pomis colono gratiam annuam referunt. Sylvestris Cerasi speciem quidam esse volunt plantam hîc depictam, quæ Theophrasti Padus Dalechampio esse videtur. Est ea sæpe humilis frutex, interdum iustæ magnitudinis arbor, cortice trunci cinereo, ramorum purpurascente: folio Cerasi acidi,

PADUS Theophr.



venoso, in ambitu tenuissimè inciso: flore albo, promisso, Laburnique instar Palmum ferè longo, qui ex flosculis albis constat, suavisimè redolentibus, nec minus olfacienti gratis, quàm Mali Citriæ flores, odoris suauitate alioqui præcellentes. Fructum fert rotundum, nigrum, magnitudine Pisi, gustanti acerbum, Mespilacèique saporis, graue quidpiam cum manditur, naribus afflâtem. Qua de causa Allobroges *Putier*, vocant, idest putidam arborem: Id quod magnam mihi admirationem mouet, Rarò enim accidere solet, vt suauissimum floris odorem fructuum molestus fœtor excipiat. Sequani vocant *Pudis*, quasi *Padis*, voce Pado corrupta. Quidam Cerasum sylvestrem esse putant, vt diximus, in eam sententiam foliorum fructumque inducti similitudine. Verùm à Ceraforum natura flos distat maximè, mea quidem sententia & formosus, & odoratus, adeo vt florem istum Laburnorumque, & structuræ elegantia, & odoris præ



ris præstantia, floribus aliis antepone non dubitem. In glareosis & arenosis locis prodit circa sepes, & dumeta. Nunc de Ceraforum facultatibus differamus. Cerasia, inquit Dioscorides, aluo vtilia sunt, si viridia sumantur: eadem siccata aluum sistunt. Gummi quod Cerasi refudarunt, cum vino diluto rufi verustæ medetur: colorem commendat, visum exacuit, appetentiam inuitat: idem ex vino potum calculosis auxilio est. Cerasa Plinio aluum molliunt, stomacho inutilia. Eadem siccata aluum sistunt, vrinam cient. Inuenio apud auctores, si quis maturino rosca cum suis nucleis deuoret, in tantum leuari aluum, vt pedes morbo liberentur. Cerasus arbor fructum fert, inquit Galenus, non paris adstrictionis in omnibus priuatim participem. Nam & in horum sicut in Malorum granatorum, & Malorum quibusdam, austera qualitas, in quibusdam dulcis, in nonnullis acida exuperat. Quinetiam ex dulcibus ea quæ nondum cocta sunt, ac matura, quædam admodum acerba sunt, quædam acida, similiter ac Mora. Sed in Moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in Cerasiis non semper. Ergo quæ dulciora sunt, magis quæ in intestinis sunt, subducunt, sed minus vtilia stomacho sunt: contrà austera. Quæcumque verò acida sunt, ea pituitosis, excrementosisque stomachis conueniunt: siquidem magis quàm austera deficcant, & nonnihil etiam incidunt. Porro arboris ipsius gummi cōmunem omnibus viscosis, & mordacitate carentibus medicamentis facultatem obtinet, quæ & ad arterias exasperatas commoda est. Propriè autem (si verum est quod quidam scribunt) calculis vexatos cum vino potum adiuuat.

Locus.

Li. 1. ca. 19.

Viresct.

Temper.

Lib. 2. c. 7.

Lib. 7. sim.

PRVNVS,

CAP. IX.



Κοκκυμυλῆα Græcè, Latinè Prunus dicitur, Gallis *Prunier*, Germanicè *Pflaumenbaum*. Fructus κοκκύμυλα, Latinè Pruna, Arabicè *Anas*, *Anas*, seu *Hagias*, Italicè *Prune*, & *Succine*, Germanicè *Praumen*, & *Pflaumen*, & *Pflaumenboen*, Hispanicè *Prunas*, *Andrinas*, & *Amexcas*, Gallicè *Prunes*, Belg. *Pruymboon*: Angl. *Plumtree*. Ingens turba Prunorum, inquit Plinius, versicolor, nigra, candicans. Hordearia appellata à comitatu frugis eius. Alia eodem colore, seriora, maioraque, Asinina cognominata à vilitate. Sunt & nigra, & laudatiora Cerina, atque purpurea. Nec non ab externa gente Armeniaca, quæ sola & odore commendantur. Peculiaris impudentia est nucibus infitorum, quæ faciem parentis, succumque adoptionis exhibent, appellata ab utroque Nucipruna. Nuper in Belgica Melina appellari cæperunt Malis insita, & Amygdalina Amygdalis. His intus in ligno nucleus Amygdalæ est: nec aliud Pomum ingeniosius geminatum est. In peregrinis arboribus dicta sunt Damasceana, à Syria Damasco cognominata, iam pridem in Italia nascentia, quamquam grandiore ligno, & exiliore carne, nec vnquam in rugas siccata, quoniam soles sui defunt. Sed Pruna omnia post Catonem cœpisse manifestum est. Hæc Plinius. Est & sua Prunus Ægypto, vt Theophr. placet. Ἄλλο δὲ τι δένδρον, inquit, ἢ κοκκυμυλῆα μέγα δὲ τὰς μεγέθει: χάρπον φέρει ὅμοιον τοῖς μεσπίλοις, καὶ τὸ μέγεθος παραπλήσιον, πλὴν ἔχον τὸν πυρήνα τροχίλον. Ἀρχὴ δ' αὖθις μινος πιανεψιδνος, τὸν ἰχθυὸν πεπαινέει περὶ τροπὰς χειμερινὰς, ἀείφωλον δ' ἐστὶ (sic enim legendum esse confirmant Plinius & Gaza, non φύλλον ἵεσθαι, vt in vulgatis exemplaribus legitur) οἱ δ' περὶ τὴν θησαυδα κατοικοῦντες διὰ τὴν ἀφθονίαν τῶ δένδρου ἐγχαίνουσι τὸν χάρπον, καὶ τὸν πυρήνα ἐξαίρωντες κόπτουσι, καὶ ποιεῖσι παλάσθας. Quæ Plinius interpretatus ea aliter quàm in exemplaribus nostris exarata sint, legisse videtur, aliter etiam Gaza. Sic enim Plinius. Ibi & Prunus Ægyptia non dissimilis Spinæ proximè dictæ, Pomo Mespili, maturescens bruma, nec folia dimittens. Lignum in Pomo

Nomina

Li. 15. c. 15.

Genera.

Li. 15. ca. 5.

Li. 4. Hist.

cap. 3.

Lib. 13. c. 10.

D



grande, sed corpus ipsum natura copiamque messium instar incolis: purgatum enim tundunt, servantque eius offas. Sic Gaza. Alia quædam arbor Prunus habetur insignis magnitudine, fructum ferens natura & magnitudine Mespilis proximum, nisi quod rotundum nucleum habet. Florere incipit mense Iulio, fructum circa brumam perficit, nec folia dimittit. Qui circa agrum Thebanum colunt, propter arboris copiam fructum siccant, lignoque exempto tundunt, offasque faciunt. Huic Pruno Ægyptiæ nullam similiorem esse arborem censet Cornarius ea quæ Pruna sylvestria profert. Alij verò arborem esse putant, quæ Myxa gignit. Prunorum apud Gallos innumera ferè differentia. Prima laus Damascenis tribuitur, nigra cute, carne suavi, rotundo ligno, exili nucleo. Secundas partes sibi vendicant Perdigona cognomine, Iberica, ut credit Ruellius, vocata, quoniam primum ex Hispania venerunt, ut inquit Ætius, succi dulcioris, duriorisque carnis, suavi gustu. Ea qua parte solem spectant, purpureo nitent colore, aduersa parte candicant, vel leuiter rubet. Vtraque pressa digitis internum os dimittit. Alia coloris ceræ ex candido in luteum pallescens, quæ Cereola, vel Cerea apud nos etiam vocitantur. Alia maiuscula, mollia, purpurea, pedicularia vulgò à vilitate dicta: iis sues rura saginant, Asinina non ab re fortasse dicenda. Commendantur maximè quoque quæ Pruni dactyla à longitudine digiti, ut putat Ruellius, dicta, purpurea, suavi colore, ouata Pomi specie, insitionis mangonio nusquam non nascentia. Alia Noberdiana, item Iuliana, aliquanto seriora, cæruleo colore, cumulatim in parente intorto furculo pendent, dum passa contrahantur in rugas. Ceteras differentias minimè persequi libet, à colore, succi sapore, magnitudine, figura, duritia, mollitie sumptas. Palma datur Damascenis, inquit Matthiolus, quæ sicca ex Syria Venerias importantur. Secundas tenent in Germania quæ ex Pannonia, & Transyluania conuehantur, in quorum genere quæ minuscula sunt, maiorem cum palato ineunt gratiam in vino decocta, & saccharo aspersa: hoc

## P R U N U S.

Forma.

Locus.

Tempus.

Vires.

Li. I. ca. 137.



enim modo parata, primisque mensis sumpta, & ori grata sunt, & aluum commodissimè citant: nam dulcia sunt, & sine adstrictione. Prunus procera fit arbor, si studiose colatur, radicibus summo cespite latè vagantibus, paucis caudice subrecto, scabro, multis brachiato ramis: folio ex oblongo ferè rotundo, per oras minutim serrato: flore candido, foliato, nempe in quina, senaue foliola diuiso, super fructum insidente: Pomo cute carneque vestito, ligno intus duro, longiusculo, in quo nucleus includitur amarus. Prunus sativa in omnibus feritur viridariis. Gaudet solo læto & humido: cælo tepido melius adolescit, cum tamen frigidum possit sustinere. Locis glareosis, & arenosis nisi iuuatur lætamine, caduca Poma, & vermiculosa non grandescunt. Aprili mense floret, aut citius. Æstate, maximè Augusto mense, fructus sunt maturi. Pruni Pomum estur, inquit Dioscorides, sed stomachum male habet, aluum mollit. Syriaca pruna, & præcipue quæ Damasci gignuntur, exsiccata stomacho utilia sunt



lia sunt: aluum astringunt. Folia Pruni in vino decocta, & gargarizata vuam, gingiuas, & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Gummi Prunorum agglutinat, potum in vino calculos comminuit: ex aceto quoque illitum lichenas infantium sanat. Pruni folia decocta, inquit Plinius, tonsillis, gingiuas, vuæ Lib. 23. c. 7.  
profunt in vino decocta, & subinde ore colluto. Ipsa Pruna aluum molliunt, stomacho verò vtilissima, sed breui momento. Apollonius apud Galenum fo- Lib. 6. cap. phar. par.  
liorum Pruni contusorum, decoctum lacte permisto ad aphthas colluere præcipit, pueris nimirum lactis vsu cum foliis contusis præscribens, sicut Dioscorid. & Plinius vini cum foliorum decocto, adultis, & in grauioribus affectionibus. Pruni fructus, ait Galenus, ventrem subducit, recens quidem plus, Lib. 7. sim.  
aridus verò minus. Cæterum Dioscorides, haud scio cur, Pruna Damascena siccata ventrem sistere ait, quum tamen & ipsa palam etiam subducant, minus tamen iis quæ importantur ex Iberia. Damascena quidem magis adstringunt, atquæ Iberia mittit, dulciora sunt. Quin & ipsæ arbores fructibus proportionem respondent: minus enim adstringunt quæ in Iberia nascuntur, magis verò quæ Damasci. Porro vt in summa dicam, quarum in foliis aut germenibus adstrictio quædam inesse apparet manifesta, eorum decocto phlegmonæ in columella, aut tonsillis genitæ colluuntur. Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum lapides confringere, cum aceto verò, puerorum sanare impetigines. At si id præstat, clarum est incidendi, tenuandique illi facultatem inesse. Dioscoridi Damascena sicca aluum adstringere scribenti refragatur Galenus, Galeno Brasauolus, quod non animaduertit Dioscoridem de Prunis Damascenis siccis loqui, quæ præterquam quod sicca sunt, gustu etiam acida, & adstringentia percipiuntur. Qua quidem in re Brasauolus sanè hallucinatur, inquit Matthiolus, non solum enim pruna Damascena sicca, sed plurima alia medicamenta simplicia & adstringendi, & deiciendæ alui viribus prædita sunt, vt puta Tamarindi, Myrobalanorum genera, Rhabarbarum, quæ primum aluum laxant, deinde adstrictam relinquunt, quam Prunorum facultatem Galenus etiam agnouit. Quare cum loco citato Pruna Damascena sicca aluum ciere tradiderit, eisdem etiam adstringendi vim inesse alio in loco testatur his verbis. Prunis æquè ac ficibus concessum est, vt vel exsiccata vtilia permaneant. Damascenis prima laus bonitatis magna hominum opinione defertur. Proxima iis quæ in Iberia proueniunt. Probatissima in Damascenis sunt, quæ cum mediocri adstrictione magna laxaque sunt. At parua, dura, acerbæque, & in cibo permolesta, & ventri subducendo minus idonea, cui rei Iberica maxime conueniunt. In melicrato plus mellis habente, abunde ventrem molliunt, etiam si sola comedantur, & multo magis si melicratum ipsum sorbeat. Ex his constat Brasauolum sine ratione à Galeno dissentire. Quibus accedit quotidiana medicorum experientia. Est enim compertissimum Pruna Damascena laudatissima ventrem soluere non ineffaciter. Quod si Dioscoridem quoque tueri oporteat, nihil aliud dicendum, inquit Matthiolus, quàm Pruna Damascena siccata adstringere, si cum aliis humidis conferantur, quæ minus adstringunt, non tamen illa esse deiectionis facultatis expertia. Porro Pruna, auctore Mesue, aluum subducunt, & alterant: sed alba, flaua, rubra minus sunt medicamentosa quàm nigra: quorum quæ μέλα, idest acido dulcia sunt, alterant magis, dulcia verò soluunt largius; tamen vtræque alterant, & soluunt magis scilicet, & minus. Damascena verò & Armenia vtrumque præter cætera præstant, humida tamen potius quàm sicca, quæ etiam in ventriculo potius quàm sicca corrumpuntur. Dulcia in calido & frigido temperata, aut paulo frigidiora, humida ordine secundo: τὰ μέλα, idest acidodulcia frigida principio secundi.



Omnia tamen lauant, leniunt, refrigerant, bilem educunt, propter quæ duo bilioſis, tum febribus, tum morbis aliis ſunt ſalubria: ſtomacho nocent, pauci ſunt alimenti. Quia imbecilliter Pruna ſoluunt, eis adduntur præſertim in inſuſione, Tamarindi, Caſſia fiſtula, Manna, Viola conditæ. Ex horum ſucco fit ſyrupus, & ex carnibus electarium ad eadem ſalubre. Armenij truncum Pruni arboris locis duobus vel tribus, palmæ vnus interuallo tenuiter perforant, immiſſioque Scammonio lutant: Pruna ea ratione valentius purgant. Datur eorum ſuccus ſeu decoctum cum Saccharo ad libram vnâ.

## AMYGDALVS,

## CAP. X.

## Nomina



MYGDALVS arbor Græcis ἀμυγδαλή vocatur, Gallis *Amandrier*, Germanis *Mandelbaum*. Fructus ἀμυγδάλη & ἀμυγδάρον, Latinis Amygdala & Amygdalium, Arabibus *lauz*, *Kauz*, *Lauzi*, Italis *Mandole*, Germanis *Mandelkern*, Gallis *Amandes*, Hiſpanis *Almendras*, Anglis *Almond-tree*: Amygdalam ideo Græcis nominari teſtis eſt Herodianus Alexandrinus,

Athen. li. 2.

Li. 25. ca. 22.

Herm. cor.

r. 8. lib. 1.

Lib. 2.

Li. de arb.

Athe. ibid.

## Genera.

Li. 17. c. 27.

Lib. 1. ca. 1.

cap. 21.

## Forma

## Locus.

Lib. 3. cauſ.

cap. 7.

Ibidem.

Li. 16. ca. 25.

## Tempus.

quod poſt viride putamen multos ſcarificatus oſtendat, & in rimulas dehifcat, quas τὰς ἀμυγδαλὰς vocant. Amygdalas nucibus adnumerarunt antiqui, quas & Cato Nuces Græcas vocauit. Plinius, cum de nuce Iuglandæ, & nuce Pōtica dixiſſet, ſubiicit. Tertia ab his natura Amygdalis, tenuiore, ſed ſimili Iuglandium operimento: item ſecundo puraminis. Nucleus diſſimilis latitudine, & acriore callo. Hæc arbor, an fuerit in Italia Catonis ætate, dubitatur: Græcas enim quas nominat, quidam reponunt in Iuglandium genere. Cloarius Amygdalas eaſdem eſſe cum illis putabat quas Græcas, & Thafias vocabant. Nuces vocabant etiam Amygdalas inquit Athenæus. Columella videtur diuerſa ſtauiſſe genera Nucis Græcæ, Iuglandis, & Amygdalæ, niſi Nucis Græcæ nomine tantum amaram intellexerit. Naxia Amygdala à Naxo inſula veteribus Græcis maximè commendabatur. Secundas partes ſibi vendicauerat Cypria, quæ præter morem cæterotum, alibi genitorum repando cacumine prodiit. Amygdalarum duo ſunt genera: aliæ enim amaræ, aliæ dulces, hæ ſuauioreſ, illæ ſalubrioreſ creduntur. Ex amariſ dulces, fiunt, ſi circum ſoſſo ſtipite, & ab ima parte circum ſorato deſluens pituita abſtergatur, vt ſcribit Plinius ex Theophrasto, cuius hæ ſunt verba. τῆς δὲ ἀμυγδαλῆς ἐάν τις ἐκκοψῇ τὸν πᾶν τῶν ἐπικύβητον τῆς ὑπερῆδος, ἐπὶ ἑτῇ δυνάμει, καὶ γλυκύτιαν ἐκ περὶ ἀσπιδίου φασί. Amygdalus ſingulari plurimùm robuſtâque radice firmatur, prægrandi altè deſixa, caudice procerò, craſſo, in ſummo compluribus ramis brachiato, recto, cortice aſpero: foliis Salicis, prælongis Perſico, proſuſ ſimilibus, cui tota quoque hæc arbor ſimilis eſt: flore foliato, candido, in quibuſdam ſubruſo. Fructus ſiue nuceſ edit cordis figura, gemino protectas operimento, quemadmodum nuceſ Iuglandes, puluinati primum calicis, mox lignei putaminis, cui ſoliduſ ſubest nucleuſ, acriore etiamnum obductuſ callo. Arbor ſucco pingui turget, lacrymamque rimofa plorat, ſtatim concreſcentem in gummi. Verum à nulla remedia vt pote inutiliſ, expetitur. Amygdaluſ cælo calidiore gaudet: quapropter in Apulia, Sicilia, & inſulis vberior adoleſcit. Huic tamen terra tenuiſ & aprica commodior eſt, teſte Theophrasto, ad caſtigandam eiſ attrahendi alimenti auiditatem, & frondeſcendi, luxuriam, quæ tanta eſt in hac arbore, vt cum de ea loquitur Theophr. verbum ἐξυβρίσκειν, uſurpet quod iniuriam petulanter facere ſignificat: quippe quæ ob fructum ſata, fructui faciat iniuriam. Cum enim largiuſ attrahat, & abſumat in frondeſ, intercipitur pars neceſſaria fructibus. Eandem, opinor, ob cauſam tam præcoci partu germinat. Ex his inquit



AMYGDALVS.



inquit Plinius, quæ hieme aquila exoriente concipiunt, floret prima omnium Amygdala mēse Ianuario: Martio verò Pomum maturat. Perdit etiam fructum facillimè ante maturitatem eodem teste. Locis frigidioribus Iunio & Iulio fructus perficit, qui antequam obdurefcant, integri cum putamine comeduntur à grauidis: sunt enim gustui non ingrati. Leguntur Augusto mēse, cum extima eorum tunica dehiscit. Amygdalæ amaræ radicū tritarum decoctum vitia cutis in facie corrigit, auctore Dioscoride. Illitæ nucs idem præstant: menses admotæ cient: capitis dolori auxiliantur, illitæ fronti aut temporibus cum aceto, vel rosaceo: epinyctidas sanāt ex vino: item putrescentia vlcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle. Earum autem esu dolores finiuntur: aluum molliunt somnum faciunt, vrinam cient: contra sanguinis reiectiones cum amylo & mentha assumuntur: renum vitiis, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur: calculosis

Li. 16. c. 26.

Vires & tempera.

Lib. 1. c. 193.

difficili quæ vrinæ in passo auxiliantur, & in linctu cum melle, ac lacte, hepaticis, & tussi inflationibus coli, nucis auellanæ magnitudine. Quinis septenisque præsumptis, ebrietatem non sentiunt potores. Vulpes si cum quadam esca eas vorauerint, moriuntur. Gummi eius excalfacit, & adstringit: reiicientibus sanguinem potum auxilio est: impetigines quæ summum corpus occupauerunt, illitum cum aceto tollit: tussi vetustæ cum diluto vino medetur: calculosis cum passo bibere prodest. Amygdalæ gummi vt & Pruni ad renum calculos minuēdos & pellendos valet, sed præterea in vsu multo est ad pannos sericeos, ob linendos (vulgo artifices id aiunt *donner l'eau*) firmiores vt sint, ac minus corrugati laciniarique minus obterantur. Dulces Amygdalæ & cibo idoneæ multo minus valent in remediis quàm amaræ, attramen extenuant, & vrinam cient. Quæ cum suo putamine eduntur virides Amygdalæ, humida stomachi vitia emendant. Vfus & effectus iidem habentur etiam apud Plinium, nisi quod diuersa quædam habet, quæ vel de suo, vel ex aliis auctoribus attexuit. Amygdalæ amaræ radicū decoctum, inquit, cutem in facie corrigit, colorēque hilariorē facit. Nucs ipsæ somnum faciunt, & auiditatem. Vrinam & menses cient. Capitis dolori illinuntur, maximèque in Febri: si ab ebrietate, ex aceto cum rosaceo, & aquæ sextario. Sanguinem sistunt cum amylo, & mentha lethargicis comitialibusque profunt capite peruncto: epinyctidas sanant è vino veterē vlcera putrescentia & canum morsus cum melle: & furfures in facie ante fotu præparata. Item iocinoris, & renum dolores ex aqua potæ: & tussim ex eclegmate cum resina terebinthina. Calculosis & difficili vrinæ in passo, & ad purgandam cutem in aqua mulsâ tritæ, sunt efficaces. Profunt eclegmate iocinori, tussi, & colo, cum Eleisphaco modicè addito. In melle sumitur nucis auellanæ magnitudo. Aiunt quinis fere præsumptis ebrietatem non sentire potores: vulpēque, si ederint eas, nec contingat è vicino aquam lambere, mori. Minus valent in remediis dulces, & hæ tamen purgant, & vrinam cient. Recen-

Li. 23. ca. 3.



Li. 1. Alim. tes stomachum implent: quarum rerum causas Galenus declarat de iisdem hæc scribens. Amygdalæ nihil prorsus habent facultatis adstringentis: sola enim tenuandi facultas, ac detergendi in eis præpollet, quæ tum viscera purgant, tum humores è pulmonibus ac thoracis spatiis educunt. Quædam autem ipsarum facultatem habent succos crassos ac lentos incidendi adeo exuperantem, ut mandi præ amarore nequeant. Oleosæ tamen ac pinguis qualitatis, ut nuces, sunt participes: cuius causa & ipsæ, procedente tempore fiunt, ut illæ, oleosæ minor tamen eis inest hæc qualitas quàm in Nucibus: quò fit ut tardius quàm nuces, oleosæ fieri cernantur. Ex iis sanè intelligi potest, quod neque ventri subducendo conferunt, neque corpus multum nutriunt. Quæ verò qualitatem amaram habent præpollentem, eæ ad pus, & ad succos crassos ac lentos ex thorace & pulmonibus expuèdos plurimùm idè alibi còferunt: Amygdalæ quæ palà amaræ sunt, omnino extenuandi vim habent, quod & qualitas ipsa indicat, & experientia comprobat: siquidem ephelin expurgant, & excreationibus ex pectore pulmonèque crassorum lentorùmque humorum plurimùm conferunt. Quin & quod per accidens facultatem habeat ab obstructione liberandi, id supra demonstratum est. Nam in iecore crassorum viscosorùmque humorum extremis vasis impactorum obstructiones abùde expurgant, expediuntque. Quin & laterum dolores ab huiusmodi causa natos, & lienis, & coli, & renum sanant. Porro & ipsa arbor similem vim sortita est. Nam huius radices coctæ atque illitæ ephellidas purgant. Quot Amygdalæ vero dulces leiculam & ipsæ amaritudinem habent, quæ tamen dulcedine superante occultatur: cæterum temporis spatio id clarum fit. Demonstratum est autem qualitatem dulcem modicè esse calidam. Hæc Galenus. Quod autem præsumptæ Amygdalæ ebrietatem prohibeant, meminit etiam Plutarchus, qui apud Drusum Tiberij Cæsaris filium, quemdam medicum comessari solitum retulit, omnes bibendi certamine prouocantem, neminiquè cedentem, vini potus tandè deprehensus est antequàm biberet, quina, senaue amara comessè Amygdala, quominus temulètia tètaretur. Porro cū deuorare vetuissent, ne paucillū quidè potū huiusmodi tolerare potuit. Hoc idè Athenæus retulit: Plutarch. hæc vim amaritudini adscripsit, quæ perficcat, & humores absumat. Oleū ex Amygdalis asperitatè gutturis, pulmonis, & partium cæterarum, etiam exteriorum, lenit: duritiemque omnem & siccitatem articulorum, & partium aliarum emendat: ob id pingues facit, hecticis confert, semen quoque auget, ardori vuluæ & vrinæ iniectum commodat. Oleum ex amygdalis amaris obstructa aperit, flatu resoluit & dissipat, etià in aurium tinnitu, & sono auditum afficiente obtusum: asperitates lenit, nervorum dolorem mulcet, duritiem mollit, ephelidas & macullas faciei delet. Fit autem utrūque hoc modo. Amygdalæ cortice lignoso, & cute membranosa purgatæ, plurimum teruntur, in offas coguntur: horis circiter quinque loco calido continentur, vel in vase duplici hora vna coquuntur. Postea rursus teruntur, & sacco conclusæ torculari premuntur: vel delibratæ tustæq; & positæ in vitreo vase vel stanneo merguntur in balneo calentis aquæ: tribus peractis horis eximuntur, & statim prælo calentes subiiciuntur.

Lib. 2.  
Mefu. lib. 3.  
Antid.



## CORYLVS SATIVA.

## CAP. XII.

**D**E Corylo sylvestri diximus in Sylua. Satiua de qua hîc agimus, etiam καρύα ποντική, & λεπτοκαρύα, id est, Nux Pontica dicitur, & Nomina Nux tenuis, siue parua, & Auellana, & Prenestina, & Heracleotica. Fructus iisdem nominibus appellatur, Arabicè *Agileuz*, seu *Bundurb*, Italicè *Nociuole*, *Auellane*, & *Nocelle*, Germanicè *Haselnusz*, Hispanicè *Auellanas*, Gallicè *Noisettes*, *Noisilles*, & *Auellaines*, Boemicè *Uuoredi Lijs komuy*, Anglicè *Hassel tree*. Plinius Auellanas Nuces, quas antea Abellinas patrio nomine vocabant, Lib. 15. c. 22. in Asiam, Graciàmque è Ponto venisse tradit, & ideo Ponticas Nuces vocatas. Tenues eadem seu parua Nuces dictæ sunt ad Regias videlicet collatæ: Heracleotica Theophr. quod ex Heraclea Ponti translata sint. Satiuarum alias oblongas, alias rotundas esse tradit Matthiolus. Oblongæ præstantiores, & gustui

## CORYLVS SATIVA,

siue Nux Auellana.



gratiores sunt, illæ præsertim quæ nuclei cortice vehemèter rubent, & fractu minimè sunt contumaces, quales sunt Vincentinæ, tam suaues, vt Pistaciis vix cedant. Neque enim omnibus Auellanis idem sapor, eadem pulpæ gratia. Oblongæ seriùs maturescunt, celerius rotundæ: quapropter vegetiore sunt nucleo, diùque perdurant Auellana Nux, seu Corylus radice est tenui, altissima, viuaci, & robusta, caudice multis infernè stolonibus frutescente, superne ramis brachiato, virgis breuibibus, sine alarum sinu enodibus, crassilq; nonnullis: foliis Alui, sed latioribus, per ambitum ferratis materiæ admodum lenta, cortice extimo tenui, pingui, maculis albis vario: medulla tenui & flaua, quæ demi possit. Satiua differt à sylvestri, quod satiua folium maius sit, caudex procerior, melior fructus, rubra in altero genere membrana inclusus. Seritur in hortis, & viridariis, locis vlginosis. Eius iuli hyeme emergunt, vere dehiscunt, & cum deciderint folia sese ostentant. Nuces Augusto mense sunt maturæ, quas mollis protegit barba, inquit Plinius, sed putamini nucleis que solida rotunditas inest. Umbilicus illis intus in ventre medio. Nuces Auellana, vt idem scripsit, capitis dolorem faciunt, inflationem stomachi: & pinguedini corporis conferunt plusquàm sit verisimile. Tostæ & destillationi medentur. Tussi quoque veteri trita, & in aqua mulsa potæ. Quidam adiciunt grana Piperis, alij è passio bibunt. Corylus nuptialibus facibus olim familiarissima fuit. Diocles apud Athenæum, inquit, Auellana Nucem minus Amygdalis alere, cibus supernatare, si largius estur, caput tentare innocentiorum esse viridem arida. Addidit vero Diphilus, Nucem Ponticam ciere capitis dolores, minus verò iuglande cibus innatare, si tamen ignem experiatur, innocentiorum reddi, quoniam in tostâ quæ noxia est pinguitudo, tollitur. De earum virtutibus & temperamento plura diximus in Corylo sylvestri.

Cap. 34.

Nomina

Lib. 15. c. 22.

Genera

Lib. 1. Dio-

scor. c. 142.

Forma.

Locus.

Tempus.

Lib. 15. c. 22.

Lib. 23. c. 8.

Vires.

Plin. lib. 16.

cap. 18.

Lib. 2.

In Syl. c. 34.



## Nomina



VEADMODVM τῆς βαλάνου, id est Glandis, ita τῆς καρπῆς, id est, Nucis nomine permulta fructuum genera comprehenduntur. Ac primum Attici, ut refert Athenæus, atque alij auctores in vniuersum quidem fructus omnes cortice lignoso conclusos *κάρυα* nominant. Quare Nux Amygdala dicitur, & Castanea Nux Euboica, Nux Heracleotica Auellana, Nux Myrsica, Nux Indica, Nux Syriaca, Nux Moschata, Nux Pineæ, Nux Cupressi, atque alia huiusmodi. Hic de Nuce agitur quæ Persica, atque Basilica nuncupatur, quod è Perside à Regibus sit translata, & Iuglans: sunt enim, inquit Plinius qui honoris nomen interpretentur, & Iouis Glandem esse dicunt. Cloatius referente Macrobio, Diuglâdem primo vocatam scribit, quasi διὸς βάλανον, postea detractiōe primæ literæ, Iuglandem. Nux simpliciter vulgo & Officinis dicitur tam arbor, quàm fructus. *Καρπία* arbor Græcis, fructus *κάρυον*, quod caput, nempe τὸ κεφαλήν, id est, τὴν κεφαλὴν, offendat propter odoris grauitatem, ut Plinius ait. Idem alibi. Nuces Iuglandes Græci à capitis grauedine sub vocarunt. Etenim arborū ipsarū foliorumq; virus in cerebrū penetrat. Idē rursum Iuglandis vmbra grauis & noxia etiā humano capiti, omnibuscq; iuxta satyris. Plutarchus sic dictam censet, quod spiritu graui quem exhalat capiti noxia sit, ac soporem sub ea recumbentibus conciliet. Arabibus *Ieuiz*, *Leuz*, aut *Gianzi*, Italīs *Nozi*, Germanis *Nussen*, *Nuß*, *Vuolschnusz*, & *Vuelschnusbaum*, Hispanis *Nuezes*, Belgis *Noeten*, *Ockernoetenboom*, & *Nottelaere*, Anglis *Vualnut tre*, Gallis *Noix*, arbor *Noyer* Sola differentia generum, inquit Plinius, in putamine duro, fragiliue, & tenui, crasso, loculoso, ac simplici. Quæ tenero fragiliq; est putamine, Mollusca dicitur, & Persica à Sueuio Poëta vetere, ac doctissimo apud Macrobiū, Iuglandis omnino genus, inquit Scaliger, aut cum Tarentino idem, aut proxima & congenerē natura, testa fragili, ac liberali. Nostri namque populares durius illud, quod inuitum amittit à se nucleum, Auaras nuncupant. Hermolaus à quibusdam à frangendi mora Moracias, & Moracillas appellari tradit. Macrobius Moluscam & Persicam. Malum Persicum interpretatus apertè hallucinatus est: diuersa enim sunt Malum Persicum, Nux Persica, Persea: Tarentina autem hæc Nux, vocatur, quod Tarentum Iuglandes Nuces, & Pineas molles habeat, ac similiter oues, vnde etiam quidam Tarentum appellatum putant, quod Sabinarum lingua molle significat, ad quod alludens Horatius Tarentum molle vocauit. Quæ verò arte cultūque Nux Tarentina fieri possit docet Columella. Huiusmodi Nuces in Germania nasci, ait Gesnerus, tum saporis præstantissimi, tum corticis adeo tenuis, ut leuissimo digitorum compressu frangantur. Eadem ferè de hac re literis mandauit Matthiolus. Genera Iuglandium plura, quæ tum forma, tum putaminis duritia, fragilitatēque dignoscuntur. Præstant oblonga, putamine albicante ac fragili, albo intus nucleo, putamini haud hærente, & gustu dulci. Nam & aliud Nucum genus est earum quæ à magnitudine Caballina nominantur. Hæ Malis sunt æquales, ex quarum cuppis marsupia pueris gestanda fiunt. In Heduarum oppidulo quod Solis Lucum vocant, vulgo *Solien*, manicarij opifices manicas ex aluta sic tenui conficiunt, ut eiusmodi Nucis lacunato putamine integro duas utrāque manum vestituras, adstrictas, & conuolutas ingeniosa plicatura, mirabili subtilitate includant, & recondant. His biferarum Iuglandium genus addit Hermolaus, quas in Syluaciano Patuini agri viculo prouenire satis constat, ut ait, & ante ipsum Plinius, Nuper consularem virum audiui, inquit, biferas Iuglandes Nuces habere se profitentē. His addam Tragum prodidisse Vasonia, qui locus ad Rhenum situs est, Iuglandem reper-

Plin. lib. 15.  
cap. 22. &  
Diosc. lib. 1.

Lib. 15. c. 22.

Lib. 23. c. 8.

Lib. 17. c. 12.

In Sympo.

Nomina

Genera.

Lib. 15. c. 22.

Lib. 3. c. 28.

In lib. 1. de  
pla.

Corol. 180.

lib. 1. Diosc.

Li. 1. Serm.

fat. 4.

Li. de arb.

cap. 22.

In Hort.

Germ.

In lib. 1. Dio-

scor. c. 147.

Corol. 180.

lib. 1. Diosc.

Lib. 15. c. 22.

Lib. 3. c. 66.



tam esse, quæ ante diem D. Ioanni sacrum, neque folia, neque Nuces ostenderet: cum vero id tempus adesset, par reliquis nucibus erat, quod ad fructum & folia attinebat: id quod singulari naturæ miraculo fieri credit, addita margini sui voluminis hac scriptura, eiusmodi arbores Gengébachi binas hodie etiamnum extare. Eiusmodi Iuglandes Io. Bauhinus Medicus perdoctus, & rei herbariæ peritissimus circa Tigurum etiam se vidisse affirmat. Dalechampius Nuces quæ antea velut aridæ, ac mortuæ, pridie D. Ioannis festum diem repente germinant, & folia mittunt, in agro Lugdunensi per quam multas reperiri asserit. Eas vulgus appellat, *Noix de la Saint Jean*. Sero fructum illæ perficiunt, nempe Octobri mense, & cum aliæ defecerunt, recentes mensis adhibentur. Earum putamen admodum durum est, nucleus verò tenacius affixus vix eximitur, gustu quàm in reliquis Nucibus magis fatuo & diluto. Indubitatum est sideris vi adeo celeriter germinationem elici, sole à statione sua iam ad æquinoctium descendente, quo tempore, ut ait Columella ingens calor fit, æstuosiusque cælum frigidior, & rardior naturam arboris stimulat. Nux arbor est prægrandis, multis prælongisque nixa radicibus, procero caudice, multis in summo ramis

**NUX IUGLANDIS.**



ingentibus brachiato, ad binum ternumue cubitorum amplexus sæpius crassescere: cortice hiulco, cinereo, & senescente arbore in rimas altas dehiscere: materia ampla, nigricante, undatim crispa: foliis primum teneris, rubescentibus, odoratis, cum adoleuerint, latis oblongisque, vtrinque ab eodem petiolo emergentibus, iucundè, sed grauiusculè subolentibus, patulam iactantibus umbram, & insalubrem, Autumno deciduis. Veris initio veluti quodam gestiente foliorum conceptu iulos seu paniculas edit, Salignis fere similes, longiores, callosquamatim compactili protractos, ordine Nucis Pinæ, qui dehiscunt flavescentesque, ac flaccescentes, statim atque oriri ceperint folia decidunt. Tum super horum iulorum petiolis flores erumpunt, totidemque caliculata tegumenta occlusa petiolis nixa gignuntur, quot flores, singulisque his singulæ Nuces includuntur, gemino protectæ operimento, puluinati primum & callosi calycis, mox lignei putaminis. Quæ causâ, ut scribit Plinius, eas nuptiis fecit religiosas, tot modis fœtum Lib. 15. c. 22. munito, quod est verisimilius, quam quod cadendo tripudium sonumue, aut, quemadmodum alij legunt, tripudium sonium faciant. Sic igitur Nuces inter folia proueniunt, multis occultæ inuolucris: calloso primum herbaceoque cortice, quam Guliocâ dicunt, Festus, culeolû, hinc compactili carinarum loculo, mox tenui tunica, quæ hauci, ut quidam volunt, nominatur. Crispi intus nuclei quadri partito digeruntur, lignea intercedente membrana. Sed Scaliger testatur In lib. 1. de plan. fructuum multiplicem rationem explicans Plinium erroris insinuat, quod scripserit solam hanc Nucem à natura compactili operimento clausam fuisse, lib. 15. c. 22. esseque bifidas putaminum carinas, quæ quamuis manifestæ sint Iuglandæ, & faciles aperiri, tamen in Persico altera tantum ex parte manifestissima; sed difficiliore ad separationem: in Pineis obscuriores: obscurissima in Auellanis: me-

dioces



diocres in Amygdalo: in Pistaciis, quæ per se ipsa hiant aliquando vetustate, earum tanquam vestigia. Aquas odere Iuglandes, frigoris sunt cupida, montibus quoque latantur. Nux Iuglans, ut scribit Palladius, amar loca montana, humida ac frigida, plerumque lapidosa. Potest tamen & locis temperatis iuvante humore nutriri. In Gallia & Italia frequentissima, & notissima secus vias, & in viridariis. Passim in omnibus ferè Germaniæ hortis provenit. Nuces in agro Tigurino abundant, hortis inutiles, tum quod sua magnitudine inumbrant cætera, tum quod profundissimæ radices exhauriunt, & emaciant solum, omni pinguiore succo ad se attracto. Germinat post afflatum Fauonij, non cacumine, ut maxima pars arborum, sed lateribus, impulso priore pullulo. Quæ forma & caudex totus, & prægrandes ramicrescunt. Fructificat Autumno. Paniculæ proveniunt mense Martio, tardissimè Aprili. Nuces maturæ sunt fine Augusti. Arborem, si bene defloruerit, rustici putant vinearum fecunditatem polliceri, nucum semper & vuarum pari ferè proventu. Leguntur Iuglandes, inquit Matthiolus, inchoante Autumno, pesticis excussæ, & siccantur in umbra exuto exteriori operimento. Virides Nuces Fuschio, primo ordine siccæ, secundo verò calidæ censentur: Dodonæo verò, Nux viridis, & recens adhuc, frigida est & humida. Nux sicca calida est & sicca, partesque tenues habet. Cortex multum desiccatur adstringitque. Folia eiusdem fere sunt temperamenti. Curtio recentes primo ordine exsiccant, aridæ secundo ordine, tenuiūque sunt partium, & exsiccantium. Nuces Iuglandes, inquit Dioscor. difficiles sunt concoctu, stomacho inutiles, biliosæ, capitis dolorem inferentes, tussientibus inimicæ: vomituris tamen ieiunis in cibo aptæ. Cum ruta & caricis præsumptæ, summo cibo, venenis resistunt, nec minus si à veneni haustu comedantur: largius esitæ tænas latas pellunt: illinuntur mamarum inflammationi, abscessibus, luxatissq, cū mellis exiguo & ruta: cum cepa autē, sale, & melle, canis hominisque mor sui proficiunt: tormina cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ sedant. Pietamē combustum tritumque in oleo, & vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, & alopecias replet. Siftunt menses nuclei vsti, si triti ex vino admoueantur, iidem è nucibus veteribus illiti, carbunculis, gangrænis, & ægilopiis medentur: alopeciis commanducati & impositi præsentis sunt remedio. Nucibus tussis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, utpote suaviore: itaque allio mixtæ eximunt acrimoniam. Liuores in corpore illitu tollunt.

In Annot. in Diofco. Quorum postrema paulo aliter vertenda esse censet Andr. Lacu. Recentes stomacho innocentiores sunt, dulciores quum sint: quapropter etiam aliis miscentur, ut eorum acrimoniam exoluant. Sic enim habent Græci: γλυκύτερα ὄντα, διὰ καὶ τοῖς σφοδρότεροις μίγνεται πρὸς τὴν δολιχὴν περὶ αὐτῶν. Eadem Plinius cum perscripisset, hæc post addidit: Nuces Iuglandes vomituris ieiunis aptæ in tensesmo solo: trahunt enim pituitam: anginam cum ruta & oleo hebetant. Item aduersantur capis, leniuntque eorum saporem. Aurium inflammationi imponuntur cum mellis exiguo. Putamine dens cauus inurit. Cortex lichenum vitio, & disentericis prodest. Folia trita cum aceto aurium dolori. In sanctuariis Mithridatis maximi Regis deuidti, Cn. Pompeius inuenit in peculiari cōmentario ipsius manu compositionem antidoti è duabus Nucibus siccis, item Ficis totidem, & rutæ foliis viginti simul tritis, addito salis grano: qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturū illo die. Contra rabiosi quoque canis morsus, nuclei à ieiuno homine commanducati, illiti que præsentis remedio esse dicuntur. Hæc antidotus cum verè sit Mithridatis Regis, tamen Galenus Apollonio Muri attribuit, & Aetius eandem penitus ex Struthone describit. Quod idem auctor alibi docet, tinguntur cortice earū lanæ, & rufatur capillus primum prodeunt

Locus.  
Cap. 16. Ia-  
pu,

Gefne. in  
Hort. Ger,

Tempus.

Ibidem.

Temper.  
& Vires.

In Annot.  
in Diofco.

Lib. 23. c. 8.

Lib. 2. An-  
tid.

Lib. 15. c. 22.



prodeuntibus nuculis. Id compertum infectis tractatu manibus. Pinguescunt vestustate. Nux arbor, inquit Galenus, tum in foliis, tum in germinibus adstrictio-  
 nem quandam habet, ceterum euidentem, multamque in Nucis putamine, re-  
 centi pariter, & sicco. Proinde eo tinctores quoque vtuntur. At nos eius expres-  
 si succo, similiter vt Mororum & Ruborum in melle decocto vice stomatici  
 medicaminis vtimur, & ad omnia reliqua adhibemus, ad quæ modo dicti succi  
 conuenire censentur. Porro Nucis ipsius, id quod edendo est, oleosum est, ac re-  
 nue: itaque ob id etiam facile exprimitur, & quo diutius recoditum fuerit, ma-  
 gis tale efficitur. Quamobrem si oleum ex eo inueterato exprimere liceat, id  
 sanè admodum potenter per halitum euaporat. Itaque quidam eo gangrænas,  
 & carbunculos, & ægilopas sanant, & nonnulli ad neruorum vulnera vtuntur.  
 Habet Iuglans, quod idem alibi tradit, & adstringentis qualitatis non parum,  
 quæ temporis processu marcescit, degenerante tota eius substantia in pinguem  
 succum, adeo vt cibo prorsus fiat parum idonea, quia veteri oleo sua pingui-  
 dine similis apparet. Viridis autem, atque etiamnum humida, neque adstringen-  
 tis qualitatis, neque oleosæ conspicuè est particeps, sed magis quodammodo est  
 ἀρωα, id est qualitatis expers. Iuglans facilius quam Auellana concoquitur, &  
 stomacho vtilior est, ac multo magis, si vnà cum caricis edatur. Proditum autem  
 est à plerisque medicis, si ambo hæc cum ruta ante alios cibos sumantur, homi-  
 nem non magnopere à letalibus pharmacis ledi posse. Constat præterea humi-  
 das deiectioni magis, aridas verò minùs conuenire. Non pauci quoque cum  
 garo Iuglandes præsumunt ventris subdurendi gratia. Ad hoc autem virides  
 aptiores sunt, vt pote adstringentis facultatis minus participes. Quin & arida-  
 darum quoque vbi prius in aqua fuerint macerata (vt nonnulli faciunt) similis  
 ac viridium facultas censetur. Idem alibi fufius explicat medicamentum sto-  
 maticum, summa cum ratione à se inuentum, & experientia longa comproba-  
 tum, id est medicamentum ex corticum exteriorum Iuglandium virentium ac  
 vigentium succo & melle ad oris phlegmonas efficacissimum ob essentia te-  
 nuitatem, suaue, paratu facillimum. Diphilus ita apud Athenæum proditum re-  
 liquit Nuces Iuglandes capitis dolorem ciere, & reliquis cibis emergentes in-  
 natate: recentes sic suis membranis exutas, vt candicent, suauioris esse succi, &  
 meliores: furno torrefactas parum suppeditare alimèti. Nux viridis Plinio Va-  
 leriano, vt pote aquatioris humoris, styptica & frigida virtute censetur. Potest  
 tamen stomacho aliquid vigoris aquirere, & ventrem cum garo sumpta molli-  
 re. Inter calendas & Idus Iulij centum numero Nuces statim, vt arbori demptæ  
 sunt, cortice adherente quassantur: his admiscuntur Aluminis scissi libræ tres,  
 & in nouo fictili vase ponuntur: super hæc infunduntur olei boni libræ tres, &  
 diligenter in loco, neque humido, neque nimium sicco obruuntur: post nona-  
 ginta dies dabunt oleum, quod fluentium capillorum damna restituit. Virides  
 Nuces Simeoni Sethi ventrem mouent, quamobrem quidam ante cibum cum  
 sapa comedunt. Facilius etiam quàm Amygdalæ concoquuntur. Arida in ore  
 inflammationes & plagas efficiunt. Stomacho meliores sunt, si cum caricis edan-  
 tur. Concoquuntur facile Nuces in frigidis ventriculis, calidis verò in bilem  
 magis mutant. Ad dentium pruritus viles sunt. Expertum tradunt, si virides  
 Nuces tantum putaminibus suis, id est carnofo & calloso exteriori cortice, li-  
 beræ demergantur melle, post annum virides inueniri: ipsumque mel ita medi-  
 cabile fieri, vt ex eo facta potio faucibus & arteriis medeatur, inserique Iuglan-  
 dem, vt plerique asserunt, mense Februario in Arbuto, sed melius in trunco, &  
 suo, & alieno, vt Pruni: sic enim legendum. Iuglandes virides decerptæ mense  
 Maio, vel Iunio appetente, antequam earum putamina obduruerint Saccharo  
 vel

Li. 7. simpl.

Li. 2. Alim.

Li. 6. c. ph.  
par. c. 1.

Athen. li. 2.

Pallad. Ia-  
nu. cap. 16.

Marthi. bi.



- vel melle asseruatæ, stomacho sunt vtilis, & ori non ingrata. Iuglandium iuli qui prima germinatione Martio erumpunt, sicci & in puluerem contriti, ac in vino albo poti drachmæ pondere, sceminis strangulatu vuluæ affectis mirificè profunt. Quidam guliocam arefaciunt, atque in puluerem redactam Piperis loco in condiendis cibis vsurpant. Quod si huic pulueri folia Saluæ siccata, ac tusa admisceas, sanè non contemnendi saporis condimentum habebis. Pari ratione prima ac tenera rubraq; foliola siccata, ac tusa vsurpari possunt. Iuglans, quod scribit Plinius, facillè pandatur, fiunt enim, & ex ea trabes: frangi q; se prænuntiat strepitu, quod in Antandro accidit, cum è balneis, territi sono profugerunt. Tamen hæc postrema Theophrastus: τῇ ἐν Κοκκῇ καρπῷ, id est Castano attribuit. Plinio Iuglans cariem verustatè que tardissimè sentit. Quare mensis & vten silibus lautis dicatur, vsusque ad testæ. Hic non omitam quod & in Quercuum Historia explicari poterat, quid scilicet sit in Nuce arbore. Isca. Quā rem sic declarat Paul. Aegin. Sunt Ἰσκαί, Iscæ, spongiosa quædam corpora in Quercubus & Nucum regiarum arboribus nascentia, quæ Barbari magis in vsu habent. His inter cætera cauteriorum genera vsos fuisse antiquos, idem Paul. testatur de stomachi vstione hæc scribens. In longis stomachi defluxionibus recentiores vsi sunt vstione. Alij ferramentis candentibus mucronatis tres crustas inurunt, vnam iuxta cartilaginem, quæ xiphoides vocatur, alias duas inferius, trianguli figura, tam altas vt cutem totam penetrent. Alij vnam duntaxat adhibent ampliorem, supra os ventriculi. Sunt qui ne ferro quidem vrant, sed
- Lib. 6. c. 49. Iscis appellatis. Idem de hydropicorum adustione, iam verò, inquit, vstione super stomachum, iecur, lienem, imum ventrem, & vmbilicum vsi sunt, quinque crustas adhibentes. Alij ferro tenui candente, alij Iscis nuncupatis. Quomodo autem Iscis ad vstionem vterentur sic demonstrat Cæl. Aurelianus. Alij fungos ligneos inferius ac superius angustos formantes, patientibus apponunt locis, quos summitate accensos sinunt concremari, donec cinerescant, atque sponte decidant. Id hodie imitantes Turcæ sarmentum vitis bene aridum parti malè affectæ applicant, & summitatè eius accendunt. Cornarius Iscas medullam Nucis arboris non satis rectè videtur vertisse, verba tamen hæc Aetij expressisse, τῇ ἐν τετραλὼν τῶν καρπῶν ἑλάνων, ἢ καλεῖσιν Ἰσκάς, quæ sic Cornarius interpretatus est, medulla lignorum Nucis Iuglandis, quam Iscas appellant. Hermolaus quoque Iscam medullam esse ait, scribit enim: medulla Nucis quæ in ligno ipso continetur, Isca dicitur Aetio. Forte, vt alia quoque multa, deprauatè à Latinis id acceptum, quasi esca, quoniam igniario & cauterio quoque sit medicis. Iscas Hippocrates, vel auctor lib. de internarum part. affectib. fungos fortè appellat: καὶ αὐτὸν, τὰ μὲν ὀστέα μυκῆσι, τὰ δὲ σαρκώδη σιδηροῖσι, πολλὰς ἐσχάρας καὶ βαθεῖας. Ipsum vrito. Osseas quidem partes fungis, carnosas verò ferramentis, & cætera. Sic verò verus interpres. Fungulis cantharidibusue ossea, carnea verò ferramentis multis ligneis altè perurito, hæsitans opinor in τῶν μυκῆτων vocabulo, quod pro Cantharidibus vsurpatum nusquam legi, sed pro terræ arborumque fungis, ac lucernarum. Item pro vermiculo, seu animalculo, quod ita depingit Aristophanis Scholiastes. Minutissimum est, inquit, Vespæ simillimum, quod ob minimam exilitatem cum à frigore facillè afficiatur, circa lucernas ignis appetens, volitat, & in eas impingens scintillas excitat, futuræ pluuiæ signum. Fit ex Nucibus Iuglandibus tuis, & expressis, aut post contusionem feruefactis, oleum quod Carynium vocatur. Eandem vim habet quam Balaninum, inquit Dioscorides, de quo hæc Matthiolus. Oleum quod è Iuglandibus Nucibus elicetur nullius in medicina vsus esse reperio, etsi lucernis qui parsimonix student, maxime expectant, quòd ignis funiculo non tam cito consumatur, quam id quod ex oliuis
- Trag. lib. 3. cap. 66.
- Lib. 16. c. 42.
- Lib. 5. Hist. cap. 7. Lib. 16. c. 40. Plin.
- Lib. 6. c. 49.
- Lib. 6. c. 50.
- Lib. 5. mor. diutur. c. 1.
- Lib. 3. scet. 2. ca. 89.
- Coroll. ca. 180. lib. 1. Dioscor.
- In Vespis.
- Lib. 1. c. 35.
- In comm. cap. 35. lib. 1. Dioscor.



oliuis paratur. Præfertur etiam à pictoribus ei quod è lini semine exprimitur. Siquidem hoc cerussæ admixtum tempore colorem mutat, illud verò incorruptum perpetuò seruat. Horum velut immemor comment.in cap.de Nuce Iuglande hæc tradit: Fit è Nucibus oleum quo ad lucernas vtuntur Insu-  
bres, præ-  
terea pictores & fabri lignarij, cum splendorem operibus suis addere volunt. Hau-  
stum hoc quinque, aut sex vnciarum pondere flatus potenter dissipat: quare in coli affectibus à flatu genitis plurimùm confert. Illitū tumores discuti-  
tit, & contractos neruos emollit, addita præsertim calce lota: antiquam scabiem sanat, quæ doctè ex Galeni & Mesues sententia scripta sunt. Id autem peculiare habet hoc oleum auctore Aetio, quod inaurantibus, & inurentibus conducit: siccant enim, & ad multum tempus inaurationes, & inustiones continet, & ad-  
feruat. Nucum Iuglandium immaturarum aqua, circa diem D. Ioanni sacrum  
parata, & foris impo-  
sita vulneribus, & vlceribus calidis prodest, & anthraci pestilenti. Pota etiam ad duas aut tres vncias refrigerat, & pestilentia resistit. Ex corticibus exterioribus Iuglandium (siue maturis, vt iam à Nuce soluantur, siue nondum omnino) mense Septembri aqua destillatur, nec refert nigra fuerint, nec ne, modo ne putredinem senserint, imo nigra præferuntur. Huius aquæ mediocris potio, cum tertia parte aceti, si cum calore morbus inuadat, vena prius secta aduersus pestem tanquam certum experimentum propinatur. Laudatur & ad aurium tinnitus, & audiendi difficultatem, & ad anginas gargarizata. Foliorum Iuglandis aqua circa finem Maij destillata, mirè commendatur ad siccanda & adstringenda vlcera, & inducendam eis cicatricem, si ea mane & vesperi lauentur, madidumque inde linteolum imponatur. Æstate feruidissima quod Æromeli rufum è cælo stillat, foliis & frõdibus Nucis Iuglandis magis insidere, quam vicinarum arborum, obseruauit Dalechampius, eoque melle irrorata Iuglandis folia, ori indita sitim sedare, foliis propinquare arborum exuccis, & aridis, quasi maior sit huius arboris cum cælo concordia, & cognatio.

Lib. 1. cap. 1.

Enuony. Thef.

Brunsvi- cent.

MORVS, CAP. XIIII.

**Q**VÆ arbor *μωρεα*, & *συκδμνος* Græcis, Latinis Morus dicitur, Italis *Moro*, Gallis *Meurier*, Germanis *Maulberbaum*. Fructus *μωρον* & *συκδμνον*, Latinis Morum, Arabibus *Tut*, siue *Thut*, Italis *Moro*, Gallis *Meure*, Germanis *Maulbeer*, & *Maulberbaum*, Hispanis *Moras del Moral*, Anglis *Mulberry tree*, Belgis *Moerbessenboom*. Mori duo sunt genera, nigra, & alba, à fructu colore, ita nuncupata. Sunt enim & alba & nigra Mora, quæ non solum colore & magnitudine, sed etiam sapore differunt. Minimum in hac arbore ingenia profecerunt, inquit Plinius, nec nominibus, nec insitis. Nec alio modo quam Pomi magnitudine differunt Mora Ostiensis, & Tusculana. Morus nigra, procera est arbor, ramos crassos in latum & longum protendens, caudice sæpius contorto, gibberoque, ac nodoso, cortice crasso, lento, & flexili, cui materia subest robusta, & medullitis flaua. Radicibus nititur magnis, ac robustis, non tamen altè descendantibus, sed summo cespite longissimè diuagantibus. Eæ flauescunt, præsertim cortices, qui & gustu sunt amaro. Folia rotunda forent, nisi in summo essent acuminata, in ambitu serrata, latiora, crassioraque: nonnulla vitiginea quandoque spectantur. Flos paruus, lanuginosus: fructus, veluti ex granulis congestus, Mororum Rubi modo, sed maior & longior. Ei trini colores, candidus primò, mox rubens, maturis niger: tunc succus in carne vinosus, qui ex acerbo, inquit Theophr. fit acidus, ex acido dulcis. Tinguunt manus succo matura, eluunt acerba. Albæ minora sunt folia, imbecilliora,

Nomina

Genera.

Li. 15. ca. 24.

Forma.

Plin. lib. 15. cap. 24. Li. 6. causs. cap. 7.





- Plin. ibid. tenuiora, sinuata, albæ Populi, aut Sambuci montanæ, albida, flaccida, fructus minores, ante maturitatem subvirides, austeriusculo sapore, perfectè maturi mellea prorsus sunt dulcedine, ad nauseam potius quàm ad alendum nati, tota arbore minore, quam pluris faciunt ad velleris sericei opus. Morus in hortis & viridariis crescit. Abundat albis Italia ad alendos bombyces sericeos. Amat imprimis loca plana, culta, amœna, calida, & sabulosa. Gaudet fœsione & stercore.
- Locus.
- Tempus. Nouissimè germinat, Plinio cum primis folia dimittit. Morus, vt idem ait, nouissima vrbana rum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Sed cum cœpit, in tantum vniuersa germinatio erumpit, vt nocte peragat, etiam cum strepitu. Idem alibi: Cùm germinare videris Morum, iniuriam postea frigoris timere nolito. Diuersarum Mori partium, eiusque maturæ & immaturæ has virtutes refert Dioscorides. Fructus aluum soluit, stomacho inutilis est, & faciliè corrumpitur. Hoc idem præstat eius succus: decoctus autem areo vase, atque insolatus, adstringentior redditur. Facit ad fluxiones, nomas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed augetur vis eius addito scissilli Alumine, Galla, Croco, & Myrrha: item Myricæ semine, Iri, & Thure. Immatura Mori Poma siccantur, tusaque acinorum Rhois vice, obsoniis miscentur, vt cœliacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua, & potus aluum resoluit: latas ventris ténias excutit: his quoque auxiliatur qui Aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur: tinguntque capillum, Vitis, & Fici nigræ frondibus simul coctis in aqua cælesti. Succus foliorum cyathi mensura potus, contra phalangiorum morsus auxilio est. Feruefacti corticis & foliorum iure dentes aptissimè in dolore colluuntur. Radix circiter mensem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Is in dolore dentium efficax est: tubercula discutit, & aluum purgat. Plin. 23. c. 7. nius cum de Ægyptia Moro dixisset, subiungit. Nec apud nos succo vsus minor. Aduersatur Aconito & Araneis in vino potus. Aluum soluit, pituitasque, ac ténias, & similia ventris animalia extrahit. Hoc idem præstat & cortex tritus. Folia



Folia tingunt capillum cum Fici nigræ, & Vitis corticibus, simul coctis in aqua cælesti. Pomi ipsius succus aluum soluit protinus. Ipsa Poma ad præsens stomacho vtilia, refrigerant, sitim faciunt. Si non superueniat alius cibus, intumescunt. Ex immaturis succus sistit aluum corticis, qui veluti animalium cutis est, in hac arbore obseruandis miraculis, quæ in natura eius diximus. Fit è Pomo panchrestos stomatice, aut arteriace appellata, hoc modo. Sextarij tres succi ex Pomo, leni vapore ad crassitudinem mellis rediguntur. Post additur Omphacij aridi pondus x. duorum, aut Myrrhæ x. vnius, Croci x. vnius. Hæc simul trita miscentur decocto. Neque est aliud oris, arteriæ, vix, stomachi iucundius remedium, quem locum aperte corruptum Cornarius ex vetustissimo exemplari sic emendauit. Post Omphacij aridi pondus denariorum duorum, Myrrhæ denarij vnius, Croci vnius, simul trita, &c. Huic apud Galenum Heræ similis est ex Moris compositio. Succum Mororum heminas sex ad strigmentitiam spissitudinem coquito. Deinde tritas Croci drach. j. Myrrhæ drach. ij. Omphacij drach. j. Aluminis scissi obolos iij. Mellis heminam vnam addito. Hæc ad vuas, tonsillas, ac omnes quæ repente oriuntur in ore inflammationes conueniunt. Aliam ex Morostomaticem Galenus ex Andromacho recenset. Mira sunt præterea quæ produntur, inquit Plinius. Mori germinatione, priusquam folia exeant, sinistra decerpi iubentur futura Poma, Ricinos Græci vocant (Hermolaus Cytinos legit: quamuis enim Cytini propriè sint Mali Punici flores, solet tamen appellatio hæc in alia quoque competere: nam Dioscorides Hyoscyami flores Cytinos vocat.) Hi terram si non attigere, sanguinem sistunt adalligati, siue ex vulnere fluat, siue ore, siue naribus, siue hæmorrhoidibus. Idem præstare & ramus dicitur, Luna plena defractus, incipiens fructum habere, si terram non attigerit: priuatim mulieribus, adalligatus lacerto, contra abundantiam mensium. Folia Mori trita, aut arida decocta, serpentium ictibus imponuntur. Ad idemque potu proficitur. Scorpionibus aduersatur è radice corticis succus ex vino, aut posca potus. Succum expressum maturi pomi immaturi quæ mistum, coquebant antiqui in vase æreo ad mellis crassitudinem. Aliqui Myrrha adiecta & Cupresso, vel, ut alij legunt, Passo, prædurantes, vas sole torrebant, permiscentes spatha ter die. Hæc erat stomatice, qua & vulnera ad cicatricem perducebant. Alia ratio: immaturi succum exprimebant, siccato Pomo multum saporis obsoniorum conferente. In medicina verò contra nomas, & pectoris pituitas, & ubicunque opus esset adstringi viscera. Dentes quoque colluebant eo. Tertium genus succi, foliis & radice decoctis, ad ambusta ex oleo illinenda: imponuntur & per se folia. Radix per menses incisa succum dat aptissimum dentium dolori, collectionibusque & suppurationibus. Aluum purgat. Folia Mori in vrina madefacta, pilum coriis detrahunt. In his Plinius quædam à Dioscoride diuersa refert, quædam etiam superstitiones. Cætera si quis cum Dioscoride conferat, eadem esse cõperiet, maximè id verò, quod de radice per menses incisa succo rectè scribitur, quod cum aliis in locis repeteret Plinius, oscitanter de Mori succo scripsit, quod de Sycomori succo scribere debuisset. Pro cute in animalibus, inquit, in arboribus cortex est. Mirum, hic in Moro medicis succum quærentibus, fere (alij, vere,) hora diei secunda, lapide incusso manat: altius fractus siccus videtur. Alibi non de nostratibus Moris, sed de Ægyptiis idem dixit. Mora in Ægypto & Cypro sui generis. Largo succo abundant, summo cortice desquamato: altiore plaga siccantur mirabili natura. At de Sycomoro hæc accipièda esse, idoneo loco dicemus ex Dioscoride. Eundem radicis circumfossæ & incisæ liquorem, Galenus γάλα id est, lac vocat. ἡ συκαμὶν τρεῖς μορέας γάλα εἰς οἶνον ἐγγέας ὁμοῖ δισπυρὰ ἔχει ἐναπύουσε χλαίνων, καὶ δι' ἐρίων ῥυπηρῶν ἔγχετ' τῇ μύλῃ ἀνασπᾷ καὶ φλέγμα, καὶ

In lib. 6. cap. par.

Ibidem.

Ibidem.  
Lib. 23. c. 7.

Lib. 16. c. 38.

Lib. 23. c. 7.

Lib. 5. c. ph. par. ca. de dent. dolo.



ἀπὸ τῆς ὁδοῦ. Id est, aut Sycamini, id est, Mori arboris lac in vinum infunde, simulque lanas succidas in ipsum exprime, tepefac, & per lanas sordidas denti molari infunde. Extrahit piritam, & dolorem tollit. Sycomori verò arboris succum, etsi συκάμινον etiam vocari testetur Dioscorides, hic non debere intelligi ex eo declaratur, quod συκάμινος, τὰ τέλει μωρὸς ipse Galenus exponit. Celsus hunc Mori succum, quem lacrymam vocat, ignorasse videtur: sic enim de som-

Lib. 3. ca. 18.

no in phrenetide cōciliando loquitur. Si nihilominus vigilant phrenitici, quidam somnū moluntur potui dando aquam, in qua Papauer, vel Hyoscyamus decocta sit: alij Mandragoræ Mala puluino subiiciunt, alij vel Amomum, vel Sycamini lacrymam fronti inducunt. Hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum Græci Morum Sycaminum appellent, Mori nulla lacryma est. Sic verò significatur lacryma arboris in Ægypto nascentis, quā ibi Morosycon appellat, quæ postrema verba supposititia videtur, ex cuiusdam glossemate qui Celsum vellet liberare, ab ea dubitatione, qua hæsitabat, incerta contextui. Mori fructus

Li. 7. simpl.

Galeno maturus quidem ventrem subducit, immaturus verò ubi aruerit, admodum restringit. Itaque ad dysenterias accommodus est, & affectiones celiacas, & quasunque alias fluxiones. Contunditur autem & obsoniis commiscetur, veluti Rhois fructus, aut si cui ita videatur, ex aqua, aut vino bibat. Porro quod maturorū succus ad stomatica multum sit utilis, propter eam quæ illi inest adstrictionem, neminem latet. Præterea ad plura alia quæ mediocrem poscunt adstrictionem competit. At immatura Mora præter acerbitatē, etiam aciditatem fortita sunt, & tota adeo arbor in omnibus suis partibus mistam aliquam vim obtinere videtur ex adstringente & purgante compositam. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo ut & latum lumbricum interficiat. In aliis autem partibus adstringens vincit: in foliis tamen & germinibus quodammodo media utriusque temperies est. Idem alibi, Mora celerimè pertranseunt, inquit, cibisque aliis præeunt, si in ventriculū purū inciderint, & sumpta primis epulis fuerint. At sumpta post alios cibos, vel si etiā prauum succum in ventriculo offenderint, celerrimè vna cum aliis cibis corrumpuntur, nouo quodam corruptionis genere, & quod verbis explicari nequeat, ut in cucurbitis accidit. Tempus eis vtendi ut Peponibus, cum corpus ventriculi squalore estuat, quo tempore necesse quodammodo est, hepatis quoque idem accidere. Cucurbitæ quidem, & Cucumeri tum maturo, tum ante maturitatem, adhuc & Melopeponi nulla adstringens qualitas inest, Moris verò, & potissimum cum nondum admodum maturuerint, qualitas eiusmodi conspicuè inest, immaturioribus autem, simul & acida. Proinde nonnulli ab arbore ipsa detrahentes ac sicantes reponunt, medicamentum ad dysenterię ac diuturnę diarrhę curationem utile futurum. Quod celeriter subducantur accidit propter solam substantię lubricantem humiditatem, fortè etiam propter admistam qualitatem quandam acriorem, quæ deiectioni excitandæ satis esse possit: quia qualitas adstringens non modò ad subductionem nihil confert, verum etiam suapte natura ventrem moratur. Coniecto igitur mora exiguam in seipsis habere facultatem eiusmodi, qualis magna medicamentis purgantibus inest, cuius beneficio non modò facillè secedunt, sed corrumpuntur etiam, si diu in ventre manserint. Quod si corrupta non fuerint, omnino quidem humectant, non tamen omnino refrigerant, nisi sumpta fuerint frigida. Alimentum autem corpori præbent minimum, quomodo Pepones, non tamen ut ij vomitum excitant, neque stomachum lædunt.

COR



## CORNVS MAS, CAP. XV.

**C**ORNVS MAS. VÆ Latinis Cornus, Græcis κρῶνιά vocatur, Gallis Cornouillier, Italis Corniolo, Germanis Cornelbaum, Kurberbaum, Thierlinbaum, & Dierlem, Belgis Cornoeliebaon, Hispanis Cerezo silvestre, Anglis Cornel tree, Boemis Drinkowry. Fructus Corna, Gallis Cornouilles, Italis Corniole, Germanis Vuelschkirschen, & Cornelein, Hispanis Cornizolos. Eius duo genera Theophrasto: alia enim mas, alia fœmina. De Corno fœmina iam diximus, nunc de mare, siue sativa. Cornus mas arbor est sæpe procera fatis, vulgarium arborum modo, interdum humilis & fruticosa, virgis numerosis, ex breui caudice nascentibns, nodosis, firmis, robustisque. Tota arbor scabro conregitur cortice, adstringenti admodum gustu: folia illi sunt virgæ sanguineæ, lævia, mediocriter crassa, ac venosa. Flores edit muscosos, aurei coloris, ex quibus bacca oriuntur, rubentes, oblongæ, oliuæ figura, præduro intus ossiculo. Cornus, inquit Dioscor. dura arbor est, baccas ferens oliuæ modo oblongas, quæ primum virent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ colorem referunt, interprete Ruellio vulgares Codices secuto. Vetus autem Codex sic habet, κρῶνιά δένδρον ἐστὶν ἄδρὸν, καρπὸν φέρον ὡς ἐλαίας, ἐπιμήκη, χλωρόν μὲν πρῶτον, ἔπειτα δὲ κηροειδῆ, καὶ τελευταίως πεπαινημύον ἐρυθρόν. Id est, Cornus arbor grandis & valida est, fructum ferens oblongum instar oliuæ, primum quidem viridem, deinde verò cæreo colore suffusum: denique cum perfectè maturus fuerit, rubentem. Cornus alia mas est Theophrasto, alia fœmina. Vtrique folium Malo (aut vulgari, aut Cydoniæ,) simile, nisi pinguius, crassiusque esset, cortex nervosus, tenuis, caudex, non valde crassus. Virgas vtraque, vt vitex profert: fœmina quamvis fruticosior, minores. Nodos habet vtraque Viticis modo geminos, ex aduerso collocatos. Materies maris excors, totaque solida, cornibus spissitate firmitatēque similis: fœminæ verò materies medullam continet, molliorque est, & cauatur, ad iacula ob id inutilis. Maris longitudo duodecim maxima cubitorum est, quanta sarissarum longissimarum. Nunquam enim totus caudex altius assurgit. Qui Idam Troianam incolunt, marem sterilem dicunt, fœminam fructiferam. Nucleum fructus habet similem Oliuæ, gustu dulcis, & gratus odoratu: flos Oleæ similis est. Floret fructumque fert simili modo, ex vno pediculo multa Corna præbens, & eodem sæpe tempore quo Oleæ. At Macedones fructiferas ambas affirmant, sed fœminæ fructum esculentum non esse. Radices, Viticis modo, validæ & incorruptæ. Nasceitur in locis humidis, & non in siccis.

## CORNVS MAS.



Prouenit semine, atque auulsione. Hæc Theophrastus, in quibus non abre miratur Matthiolus, Theophrastum Corni folia cum Amygdalæ foliis, vt vulgo legitur, multum diuersis conferre. Quapropter mendosos hoc loco Theophrasti Codices esse suspicatur. Cornus circa solstitia reddit fructum primo candidum, postea sanguineum, inquit Plinius. Ex eo genere fœmina post Autūnum fert baccas acerbæ, & ingustabiles cunctis animantibus: ligno quoque fungosa & inutilis, cum mas è fortissimis quoque sit: tanta differentia ab eodem genere

Nomina

Lib. 3. Hist.  
cap. 12.  
In Dumer.  
cap. 34.  
Matth. lib.  
Diosc. c. 35.

Lib. 4. Hist.  
cap. 12.

Locus.

Tempus.  
Li. 16. c. 26.



**Locus.**

Lib. 16. c. 25.

**Tempus.****Vires &****Temper.**

Lib. 1. c. 135.

Lib. 23. c. 8.

Li. 7. simpl.

Marthi. ibi.

Plin. lib. 21.

cap. 12.

Lib. 16. c. 25.

**Nomina****Genera.**

Lib. 3. Hist.

cap. 12.

**Forma**

fit. Cornus satiua in hortis & viridariis colitur, cito floret: primo enim fauonio germinat, vel teste Plinio, mense Augusto fructus maturus est. Corna in cibo valde adstringunt, vt rectè scribit Dioscorides, pro fluuiio alui, atque dysenteria salutaria, siue in edulo, siue in defruto exhibeantur. Muria vt diuæ conduntur. Sanies quam virentia folia torrendo defudarunt, impetigini conuenienter illinitur. Sudor virgæ Corni arboris lamina ferrea candente exceptus, inquit Plinius, non contingente ligno, illitæque inde ferrugo incipientes lichenas sanat, in quo certè medicamento maior vis ferruginis videri potest, quam vel faniei ex foliis, vel sudoris ex virgis, & ligno. Corni arboris fructus, inquit Galenus, admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet, ipsum valenter ventrem adstringere, sicut & Mespila. Folia quoque & germina gustu acerba sunt, valentèrque desiccant. Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimum durorum corporum. At paruis vulneribus, & mollioribus corporibus magis contraria sunt: nam nimium ea contendunt, ac plus satis desiccant. Fit ex Cornorum pulpa conditum diacydoniti non absimile. Ex eorundem decocto & Saccharo liquor igne concrefcit, qui præter quam quod gustui gratissimus sit, etiam datur vt iliter dysentericis, ac scæminis profluuiio mensium laborantibus. Corni arbores prope aluearia non conferendæ: nam Apes flore eius degustato aluo concita moriuntur, cum contrarium in homine effectum præstet. Corni masculæ nulla medulla, inquit Plinius: ac rursum: omnibus quæ diximus spissa firmitas. Ab his proxima est Cornus: quanquam non potest videri materies propter exilitatem, sed lignum non alio pene quàm ad radios rotarum utile: aut si quid cuneandum sit in ligno, clauisque figendum, ceu ferreis.

## SORBUS. CAP. XVI.



**ARBOR** Sorbus *δύη*, & *δύη* Græcis nuncupatur, Gallis *Cormier*, & *Sorbier*, Germanis *Speruerbaum*. Fructus *δύα*, & *δύα*, Latinis *Sorba*, Italis *Sorbe*, Gallis *Cormes*, & *Sorbes*, Germanis *Spererling*, *Sporoeßfel*, & *Sperbieren*, Hispanis *Sorbas*, Boemis *Kzerbiny*. Sorborum differentias aliquot nouit

## SORBUS.



Theophrastus, qui scripserit, Sorborum duo esse genera, scæminam fructiferam, marem sterilem. Caterum fructu differunt, quod aliæ orbiculatum, aliæ oblongum, aliæ ouatum ferunt. Distant etiã succis. Nam magna ex parte orbiculati odoratiores sunt & dulciores: ouati sæpe acidi, & minùs odorati. In vtraque folij totius pediculus longus, ac neruosus est: singula verò foliola ordine digesta pinnis similia, è lateribus exeunt, perinde ac si id vnicum folium sit, ad neruosum vsque pediculum, tanquam in lacinias diuisum. Caterum ea, quamuis densa, à sese tamen inuicem distant, deciduntq; non singillatim, sed simul tota illa pinnata congeries, minor, quidem in arbore vetustiore, & asperiore. (Gaza tamen pro *ωε* τὰ μὲν ἐπιπολαύτερα legit *ωε* τὰ μὲν παλαιότερα, id est, in vetustioribus) omnibus in summo petiolo folium est impar, vt etiam omnia sint imparia, figura Lauro tenuifoliae similia, verum serrata, quamuis haud multum, nec in extremo tam acutè mucronata, sed rotundiora. Florem



Florem habet racemosum ex vna veluti claua, (id est, fastigiato in thyrsum cacumine,) ex multis paruis, & albis constantem. Fructus quoque, cum magnus est eius prouectus, racematim coit: multis Sorbis eodem vertice pendulis, ita vt faui quodammodo speciem gerat. Eroditur à vermibus in arbore fructus immaturus adhuc, magis quam Mespila, pira, & Pirastris fructus, quamuis sit omnium 'acerbissimus (nam sic emendandi vulgati codices, σκωληρόβροτος ἐπὶ τῷ δένδρῳ ὁ χειρὶς ἀπεπλος ὢν ἔτι, γίνεσθαι μᾶλλον τῶν μεσπύλων, καὶ ἀπύλων, καὶ ἀχράδων & cætera.) Ipsa quoque arbor vermibus infestatur, atque ita senescens arefcit. Vermis ei peculiaris rubor est, & pilosus. Noua medio-criter fructificat: nam trima cōtinuo parit. Autumno cum folia deciderint protinus cachryos figuram ostēdit, pinguis, ac turgida quasi iam parturiat, & hie-me perdurantis: Caret aculeis Sorbus, nec vt Mespilus spinosa est: cortice leui & subpingui nouæ vestiuntur, colore in flauum albicante (reponendum enim, εἴπερ μὴ τὰ γεράνδρνα, pro ὥσπερ τὰ γεράνδρνα) in annosis scabro & nigro. Arbor ipsa procera est, recta, decora coma: quæ magna ex parte Nucis pineæ figuram pro-pemodum æmulatur, si nihil impediatur: materies solida, spissa, colorata, robusta. Radices non multas habet, neque altè descendentes, validas tamē, crassas & in-corrumpas. Nasctur radice, auulsione, semine. Solum frigidum amat & hume-ctum, in quo etsi viuacior sit, & difficile corrumpatur tamen etiam in monti-bus nascitur. Hactenus Theophrastus de Sorborum generibus, & forma. Sorbis Plinio quadruplex differentia. Alijs enim eorum rotunditas Mali, alijs turbina-tio Piri, alijs ouata species, ceu malorum aliquibus. Hæc obnoxia acori. Odore, & suauitate, rotunda præcellunt: cæteris vini sapor. Generosissima quibus circa pediculos tenera folia. Quartum genus torminale appellant. Matthiolus Sorba alia satiua esse tradit, alia siluestria. Satiuorum duo esse genera, marem, & fœmi-nam. Vtraque, inquit, caudice est longo, recto, ramis in altum assurgentibus: folio Fraxini, sed angustiore, auersa parte albicante, per ambitum serrato. Album edit florem, racematim prodeuntem, è quo fructus exeunt in racemi modum, ab vno tantum exortu pediculos ducentes, in altera quidem orbiculati, & succo odoratiore, ac mitiore, in altera verò ouati Piri faciem referentes, & gustu aspe-riores, insuauioresque, ac minùs odorati, colore sub pallido, & in latere rufe-scen-te. Decerpuntur immatura Autumno, & in manipulos colligata suspendun-tur, vel reponuntur substratis straminibus, vt mitescant, aliter præ nimia auste-ritate nec mandi, nec deglutiri possunt. Ligni materies solidissima, & valdè compacta. Cortice vestitur satis scabro, colore ex flauo albicante. Radix illi ra-ra, crassa, solida. Siluestris Sorbus, siue Torminalis à satiua facie ferè non differt, præterquam fructu, qui umbellatim vt in Sambuco prodit, crocantibus in ru-fum baccis, Oxyacanthæ similibus, magnitudine ferè paribus, sapore tamen à satiuis non parum diuerso, quæ per hiemem à rusticis ad aucupia asseruantur & sunt enim turdis gratissima. Huius descriptionem in Silua tradidimus, simul & Cratægi capitibus 32. & 33. cui folium Viti aut Platano simile, læue, firmū, bacce oblongæ, teretes, asperiusculæ, racematim coherentes, longo pediculo sub-nixæ, coloris ferruginei, acidæ, & austæræ: arboris satis proceræ, cortice læui, materia dura, & minimè fragili: libuit tamen hac narratiuncula velut: refricare memoriam lectoris, & vtriusque figuram accuratius expressam, ac venustius, hic addere. Sorbus satiua in hortis & viridariis colitur. Martio mense floret, Septembri fructum maturat. Sorba, inquit Dioscorides, dum luteus color est, priusquam maturescant dissecta, & sole siccata manduntur, vt aluum si-stant. Eadem est vis farinæ molitorum, si polentæ loco sumatur, quod & decoctum eorum in potu præstat. Sistūt aluum Sorba sicca, Plinio: nam recentia

Locus.

Lib. 15. c. 21.

Lib. 1. Diosc.  
cap. 136.Forma  
satiu. Sor.In syl. c. 32.  
Ibidem.

Locus.


Tempus.

vires &amp;

Temper.

Lib. 25. c. 7.



Matthioli, Torminalis  
vera.Sorbus Torminalis  
Matthioli.

Lib. 8. sim. stomacho, & alio citæ profunt. Sorbi fructus, autore Galeno adstringentem obtinet qualitatem, sed multo imbecillio rem quàm Mespilus, quare etiam esui iucundus est, minúsque quàm Mespilus ventrem constringit.

## MESPILVS,

## CAP. XVII.

## Nomina

Lib. 3. Hist.  
cap. 12.

Li. 15. ca. 20.



RBOR quæ Gæcis μέσπιλος & μεσπίλη dicitur, Latinis *Mespilus*, Gal-  
lis *Nesslier*, *Mesplier*, *Meslier*, Arabibus *Zarar*, seu *Zarur*, & *Alzarur*,  
Italibus *Nessoli*, Germanis *Nesselbaum*, Boëmis, *Nysspule*: Angl. *Meder-*  
re: & *Medeler*, fructus μέσπιλον, Latinis similiter *Mespilum*, Gallis  
*Nessie*, *Mesple*, *Messe*, Germanis *Nessel*, Hispanis *Nesperas*. Mespili genera hæc  
sunt ex Theophrasto, Anthedon, Satanius (Plinius Setanios legit) Anthede-  
næides, ut diuidunt Idæi. Satanius fructum fert maiorem, candidiorem, la-  
xio rem, & qui nucleos habet molliores. Reliquis minor est fructus, odoratior,  
ac & acerbior, ut diutius asseruari possit. Spissior etiam his materies, & flauior,  
cætera similis. Flos omnibus Amygdalæ, sed non rubens, ut illi, sed utcumque  
pallidus. Anthedon haud procera est arbor (legendum enim videtur, μεγέθες &  
μέγα τὸ δένδρον, quamuis scripserit Plinius, ut mox dicemus, arborem de amplif-  
simis esse, & Gaza verterit, magnitudine arbor ista excellit) in orbem comosa:  
folio valde fisso (Gaza perperam legit ἄχισον, & vertit infissum: exemplaria  
nostra habent ἐπιλυχιδές, legendum verò πολυχιδές) Apio in extrema parte simi-  
li, maioribus incisuris (non ut Gaza cum vulgatis exemplaribus legit, μερίζοι  
χίμασι, idest ampliore figura, cum legendum sit μερίζοι χίσμασι) rigido, neruo-  
so, Apij foliis asperiore, longiore (τέλειον, ἰσῶδες, λεπρότερον σελίνυ. Gaza, pro-  
missum




missum, neruosum, Apio tenuius, quia λεπτότερον σελίνος legit) atque vndique fissuris laciniato: fructu ex longo ac tenui pediculo pendulo, qui antequam folia decidant, vehementer rubet (quæ enim in libris excusis habentur, καὶ τὸ ὅλον καθαρίσματα περιελαβέντων ὃ ὅλον, μίχρον δὲ ἔχει λεπτόν, μακρόν, videntur sic emendanda, καὶ τὸ ὅλον κατὰ χρίσματα, vel καθαρίσμασι περιελαβέντων, μίχρον ὃ ὁ καρπὸς ἔχει λεπτόν, & cætera, quæ Gaza interpretatus est, totumque circumtunsum est, & pediculo tenui ac longo dependet, antequam decidat vehementer rubet, & Plinius, folia antequam decidant rubescunt) Arbor hæc radice numerosa & alta nititur, ideoque longæua, & mori contumax. Ligno est denso, solido, putredini minimè obnoxio. Seritur semine & auulsione. Morbus earum arborum in senecta, vt à vermibus erodantur, qui prægrandes eis & diuersi quàm in cæteris arboribus cernuntur. Hæc Theophrastus, ex quo Plinius sua mutuatus Mespilis inquit, tria genera, Anthedon, Setania: tertium degenerat, tamen Anthedoni similis est, quod Gallicum vocant. Setaniæ Maius Pomum, candidiusque, acini molliore ligno: cæteris minus Pomum, sed odore præstantius, & quod diutius seruetur. Arbor ipsa de amplissimis. Folia antequam decidant, rubescunt: radices multæ, atque altæ, & ideo inextirpabiles. Non fuit hæc arbor in Italia Catonis æuo. Dioscorides duo tantum constituit genera. Μεσπίλον τὸ δένδρον, inquit, ὃ παρ' ἐνίοις ἀρωνία καλεῖται, & cætera, Mespilus arbor quæ à nonnullis, Aronia vocatur: ac rursus, Μεσπίλος δὲ καὶ ἕτερον ἐστὶν εἶδος, ἐν ἰταλίᾳ γεννώμενον, ὅτι οἱ ἐπιμηλίδας καλεῖσι, οἱ δὲ σιτάνιον ὀνομάζουσιν. Alterum Mespili genus in Italia nascitur quod aliqui Epimelida, alij Setanion vocant. Quamquam in quibusdam manuscriptis exemplaribus legatur. Μεσπίλος δὲ ἕτερον ἐστὶν εἶδος ἐν ἰταλίᾳ γεννώμενον, ὃ ἐνίοις ἐπιμηλίδας καλεῖσι, καὶ ἕτερον δὲ σιτάνιον ὀνομάζουσιν, id est, Alterum genus Mespili in Italia nascitur, quod nonnulli Epimelida vocant, atque alterum quod Sitanion, vt tria sint etiam Dioscoridi Mespili genera. Aronia quæ Anthedon est Theophrasti, Epimelis quæ Anthenoides, & Setanios. At Mespilum Italicam

Li. 15. c. 20.

Lib. 15. c. 20.

Li. 1 ca. 133.

MESPILVS  
Aronia.



à Dioscoride Epimelida nuncupatam omnes fere herbarij Mespilum nostratem esse autumant, id quod etiam Matthioli existimat, sed Galenum Epimelidis appellatione aliam arborem à Mespilo nostrate diuersam intellexisse. Quibus refragatur Dalechampius, ex cuius sententia Epimelidem longe aliam, siue Anthedonoeidem Theophr. iam descripsimus. Mespilus Aronia siue Tricoccos, siue Anthedon Theophrasti, plurimum etiam à Mespilo nostrate differt, estque arbor Dodon. Cordi, Matthioli sententia quæ Azarolo, à Neapolitanis Arabes secutis vocatur, qui Mespilum Zaror, & Zarur, & Alzarur, nuncupant. Est enim arbor mediocris, proceritatis corticis materia Pruno non absimili, spinis horrida, non tamen admodum acutis: foliis laciniatis, Apij æmulis, floribus albicantibus, racematim coherentibus: fructu rotundo, rubente, vulgaribus Mespilis æquali, sed minore umbilico, tribus tantum intus ossiculis, adeo graphicè depicta à Theophrasto, vt fusius explicare nihil sit opus. Eius quoque præcipuas notas sic

Lib. 1. Diosc. cap. 133.

In Dume. cap. 35.

Nomina

Forma.  
Aronia.

Dioscori



Lib. I. c. 133. Dioscorides literis mandauit. Mespilus Aronia spinosa arbor, foliis Oxyacanthæ (sic enim legendum, non Pyracanthæ, nec Pyxacanthæ) fert Pomum suauē, exiguo Malo non dissimile, tribus intus ossiculis: qua ex causa id nonnulli Tricoccum appellauēre. Mespilus Setania, siue Setanios nostras est vulgaris Mespilus, quæ in syluis, dumetis, sepibus nata spinosa est, Malo inferior: folio Lauri, longiore, per ambitum nonnihil serrato: flore Amygdalæ, pallido, Pomo

## MESPILVS

Setania.

Locus.

Tempus.


Ibidem.

Vires.

Lib. 23. c. 7.

Lib. 6. c. 43.

Lib. 7. sim.



Li. 2. Alim. germinibus, & foliis acerba hæc qualitas non pauca reperitur. Idem alibi, Ambo adstringunt, inquit, sed multo fortius Mespila quam Sorba. Quamobrem aluo fluenti in cibo accommodatissimè exhibentur: Sorba tamen ipsis sunt suauiora. Prorsus namque nihil acerbi, vt Mespila obtinent, sed succus eorum citra acerbitem austerus est. Illud porrò neminem puto latere hæc omnia parcè nō affatim, vt ficus, vuāsque esse comedenda: nequaquam enim eis vt cibis, sed vt medicamentis potius indigemus. Mespila Aronia siue Azarola gustui placent, & Neapoli pro delitiis non solum cruda expetuntur in cibis teste Matthiolo, sed etiam saccharo mellèque condita eduntur, grauidis mulieribus gratissima, non solum quod sapore placeant, sed earum etiam malaciæ subueniant. Vulgaria nostra Mespila eodem auctore deuorata coeliacos, & diarrhæa laborantes iuuant: sistunt faucium, gutturis, dentium, & gingiuarum fluxiones, si eorum decocto os colluatur. In eo si insideant scæminæ, mensium abundantia sistitur, fit è siccis Mespilis Rosarum succo exceptis, additis Caryophyllis, & Coralli rubri, & Nucis muscatæ tantillo cataplasma ori ventriculi admouendum, ad compescendas vomitiones, in quibus præsertim cibus reiicitur. Sicca folia in puluillum trita, & aspersa, recentia vulnera glutinant, & sanguinis profluium sistunt. Dantur quoque vtiliter ad cruentas reiectiones, denique ad ea quæ adstrictionem corroboratiōemque desiderant, tum folia, tum fructus plurimum valent. Mespilorum ossicula in puluillum redacta, calculos ex renibus pellunt, si cochlea



fi cochlearis mensura ex vino in quo vulgaris Petroselini radices decocta fuerint, bibantur.

## FICVS, CAP. XVIII.

**F**ICVS arbor, συκη Græcis est, Gallis *Figui*, Germanis *Feighenbaum*, Belg. *Friguenbaum*, Angl. *Figge tree*, Boemis *Fikštepi*. Fici fructus σύκα, Latinis Fici, & Ficus, appellantur, Arabibus *Sin*, *fin*, seu *Tin*, Italis *Fichi*, Germanis *Feighen*, Hispanis *Higos*, Gallis *Figues*. Fici genera duo: est enim Ficus sylvestris, & sativa sylvestris συκη ἀγρία, & ἐπιπέδος à Galeno appellatur, à Latinis Capri ficus. Caprificus vocatur è sylvestris genere Ficus inquit Plinius, numquam maturefcēs. Fructus eius σύκον ἐπιπέδον: Satiua συκη, ἡμερος. Fructus σύκον, vt dictum est. Tam sylvestris fructus nunquam maturefcens, quàm sativæ nondum maturus δλωθος, nominatur, Latine Grossus. Dioscorides olynthos etiam erineos vocari scripsit, Macrobius, Grossos, Ficos quæ numquam maturefcunt. Sed Grossi propriè Olynthi sunt, hoc est primitivæ Ficus vtriusque generis. Sicca ἰχάδες, Latine Caricæ, non autem καρπὸς Græcè, vt quidam putant, quòd Carica peculiaris sit Ficus in Syria provenientis species. Syria peculiare habet arbores inquit Plinius. In Nucum genere Pistacia nota, in Ficorum autem, Caricas, & minores eius generis, quæ cottana vocant. Paulus tamē καρπὸν pro Ficu arida videtur vsurpasse, cum scribit, aut καρπὸν drach. octo, Sampfuchi drachma, tritis cum oleo, donec cerati fiat spissitudo vtitor. Hic καρπὸν nihil aliud esse videtur, quàm quæ ἰχὰς quoque Græcis dicitur. In auctione vitarum Luciani, de Epicuro quærit licitator, quibus eduliis delectetur, respondet Mercurius, dulcibus vescitur, & mellitis, καὶ μέλιτα, inquit, τὰς ἰχάδας. Subiicit licitator, χαλεπὸν μὲν ἔδεν, ὠνήσομαι δὲ ὡς παλῶν τῶν καρπῶν. Siue itaque à loco, siue aliunde nomen habet Carica, Græcis & Latinis vsurpatur. Habetur etiam apud Hippocratem Caricum medicamentum duplex, aridum, & liquidum, sed neutrum Caricas recipit, neque à Caricis nomen habet, sed à Carum gente, quibus erat in multo vsu, appellatum fuisse videtur. Ficus nostræ sativæ fructum figura coloræque differunt. Alij enim Piri speciem referunt, alij sessiles sunt, alij inter hos medij. Aliæ Ficus albæ, aliæ nigrae, aliæ purpureæ, aliæ virides, aliæ subrufæ, aliæ pallidæ, aliæ vario colore spectantur. Ad nos, inquit Plinius, ex alijs transiere gentibus, Chalcide, Chio, quarum plura genera. Si quidem & Lydiæ quæ sunt purpureæ, & Mamillanæ similitudinem earum habent: & Callistruthiæ parum sapore præstantiores, Ficorum omnium frigidissima. Alexandrina è nigris est, candicante, rima, cognomine delicata, vel vt in vetusto codice Parmenii legitur, Candicat Therina cognomine delicata. Nigra & Rhodia est, & Tiburtina de præcocius. Sunt & auctororum nomina iis, Liviæ, Pompeiæ. Siccandæ hæ sole, in annuos vsus aptissime, cum mariscis, quas harundinum folij macula variat. Est & Herculanea, & Albicerata, & Aratia vel Aritia, alba, pediculo minimo, latissima. Primo autem prouentu Porphyritis, longissimo pediculo. Comitatur eam è minimis, & vilissimis popularis dicta. Contra novissima sub hieme maturatur Chelidonia. Sunt præterea eadem, quæ tamen dictio in manuscripto non extat, serotina & præcoces, biferæ, alba & nigra, cum messe vindemiæque maturefcences. Serotina, & Duracina à corio appellata duro: ex Chalcidicis quarundam trifero prouentu. Tarenti tantum prædulces nascuntur, quas vocant Omas (in manuscripto Oenas, quidam Oenas à vini sapore.) Præterea Ficus Cypriæ meminit Theophrastus, item Indicæ, cuius etiam historia est apud Strabonem, & Plinium, quæ à nostratibus ficis diuersissima sunt. De ficu Ægyptia Plinij suo loco dicemus. De Ficu Idæa, iam diximus. Nunc de nostrate Fico sativa dicemus. Ficus arbor est caudice

Nomina

Genera.

Lib. 8. sim.  
Li. 15. ca. 19.

Li. 1. c. 145.

Hermol.  
coro. cap.  
185. lib. 1.  
Dodo. lib.  
6. cap. 46.  
Li. 13. ca. 5.

Lib. 4. c. 13.

Lib. de vlc.


Genera.

Marth lib.  
1. Dioscor.  
cap. 145.  
Li. 15. ca. 18.Li. 4. Hist.  
cap. 2. & 5.  
Li. 15. Geol.  
Lib. 12. c. 5.  
In Du. c. 37.  
In Silc. 43.  
Matt. lib. 2.



## FICVS.

Forma




Li. 15. ca. 19.

Locus.

Maturefcunt autumnno, Augufto, & Septembri mense Sed Groffi æftate perficiuntur. Decerpuntur maturi, & in fole ficcantur cratibus, non folum ad ciborũ, fed etiam ad medicamentorum vſum. Sicci in cadis ligneis aſſeruantur. Ficus arbor in Hiſpania, Italia, & Gallia Narbonenſi copioſe prouenit: in frigidiorebus regionibus, non niſi in hortis & viridariis, locis apricis, & à Septentrione

## CHAMAESYCE

Arbor.



Lib. 1. c. 145.  
Vires &  
Temper.

fæpius contorto & breui, ſubalbicante libro, lacteoque ſucco madente, guſtu adſtringente, acri & amaro, ita vt vlcerare poſſit. Ramos quos priuatim Cradas vocant plurimos emit- tit, medulla plenos, ramulorũ Sambuci mo- do, læui cortice contectos: folia vitiginea, am- pla, nigricantia, aſpera, firma, rotundis ac ro- buſtis pediculis nixa. Hæc arbor non floret, à foliorum exortu extremis tantũ ramis fru- ctus edit turbinatos, & varios, vt dictum eſt. Materies illi alba, & fungoſa, vt viti, tenax ta- men, & ad ſcura paranda peridonea. Radices multæ, ſed ſumma tellure vagantes, quam ob cauſam frigoris eſt impatiens. Fructibus im- maturis ſuccus lacteus, maturis & percoctis melleus eſt. Molli præterea iis pulpa eſt, cibo gratiſſima, granis multis reſerta, quæ ficaria grana, Græci *κρυφαιδας* vocant, Plinius frum- menta. Ficis mollis omnibus tactus, maturis frumenta intus. Cæteris præferuntur qui ma- turi rimofa ſunt cute, & qui pulpæ pinguedi- ne, dulcedine, atque ſapore alios antecellunt.

aueſſis. Ficum ſic inuerſo ramo ſerere, vt quod cælum aſpicit in arbore ſua humi deſigatur, nuper excogitarunt ſolertium hominũ curio- ſa ingenia: qua ratione factum eſt, vt in vaſis fictilibus depacta planta huc illuc transferri queat, & ſemper humilis atque pumila ſit, cu- bito vix vnquam maior, nec tamen fructuum minus præbens, quàm ſi arboreſceret: ſpecta- culo quidem in viridariis & hortis iucundiſſi- mo, cũ eo modo conſitæ multæ virent in am- bulationũ marginib⁹, quarum pomũ inclina- to corpore legatur, aut in cœnaculorum fene- ſtris, vestibuliſque palatiorum diſpoſitis vr- ceis nitent, & per aſperam hyemem in ſubter- raneis tepidiſque locis abdite, citius reliquis germinant, & fructũ edunt. Ficus maturæ re- centes, inquit Dioſcor. ſtomachum lædunt, aluum ſoluunt, ſed facilè contracta ab eis flu- xio ſiſtitur: ſudorem euocant, papulâſque, ſi- tim ſedant, calorem reſtingunt. Siccis natura excalfaciendi, vires alunt, ſed ſitim magis ſtimulant, aluo viles, rheumatismis ventris, & ſtomachi contrariæ: gutturi autem, arteriæ, renibus,



renibus, vesicæ, & iis quos longa valetudo decolorauit, anthelatoribus, hydropicis, comitialibus aptissimæ. Feruefactæ cum hyssopo, & potæ, thoracem purgant: tussi veteri, diuturnisque pulmonum vitiis conueniunt: aluum molliunt tussæ cum Nitro, & Cnico, deinde manducata. Decoctum arteriæ, & tonsillarum inflammationibus gargarizatu prodest. Cum Hordeacea farina cataplasmatibus miscentur, & in muliebres fœtus cum fœnogræco, & ptisana. Ceterum cum Ruta coctæ torminibus infunduntur: coctæ illitæque duritias discutunt: parotidas & furunculos emolliunt: panos ad maturitatem perducunt, maximè Nitro, Iri, aut Calce addita. Crudæ si cum antedictis tundantur, eadem efficiunt: cum Malicorio pterygia purgant: cum Atramento futorio, deploratis ferè tibiæ fluxionibus, & cacoethicis vlceribus medentur: quin & cum vino decoctæ addito Absinthio, & Hordeacea farina, vtilissimè hydropicis illinuntur. Crematæ cum cerato sanant perniones: pruriges, sonitusque, si crudæ terantur, & Sinapi, liquoræque aliquo exceptæ auribus instillantur. Tam sylvestris quàm satiuæ Fici lacteus succus coaguli modo lac contrahit, concretumque dissoluit, vt acetum: exulcerat corpora, meatus aperit, soluit aluum, vuluam recludit cum trito Amygdalo potus: menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut Tyrrenica cera: podagricorum cataplasmatibus cum farina fœnigræci & aceto vtilis: lepras, lichenas, vitilignes, vitia cutis in facie, psoras, vlcera in capite manantia, cum polenta ex purgat: instillatus plagæ percussis à scorpione, venenatorum ictibus, & rabiosi canis morsibus auxiliatur: prodest dentium dolori lana exceptus, & cauis eorum inditus: verrucarum formationes tollit cum adipe, circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramis sylvestris Fici, qui lacte prægnantes, silente adhuc oculo, tussim exprimuntur. Is siccatus in umbra reponitur. Et lac & succus adduntur exulceratoriis medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulnei facilem afferunt decoctionem. Lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo, spathæ loco moueatur. Grossi, quæ Erinei à nonnullis vocantur, coctæ, & illitæ, strumas nodosque omnes emolliunt. Crudæ formicas, verrucas, & thymia, nitro, farinaque additis tollunt. Folia eadem possunt. Illita cum sale & aceto, vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanant: iis ficosæ extuberationes, & palpebrarum scabritiæ, perfriantur. Nigræ Ficus foliis, cauliculisque candidæ vitilignes perunguntur, faciunt ad canum morsus, & vlcera quæ Ceria, idest fauos vocant. Grossi cum sylvestris papaueris foliis, ossa extrahunt: furunculos cum cera discutunt: contra muris aranei morsus, & scolopendræ venena, cum Eruo & vino illitæ auxiliantur. Fit ex cinere Ficus tam sylvestris quàm satiuæ lixiuium, crematis ramorum cauliculis, quod subinde macerari opus est, & inueterascere: siquidem inter caustica intelligitur. Gangrenis prodest: expurgat, & consumit quæ excrecant: eo verò sic vtendum. Spongia hoc lixiuio assidue imbuta superponitur. Interdum dysentericis, & in fluxiones vetustas, & sinus cuniculatim exedentes, magnosque, instillari conueniet. Etenim purgat, conglutinat, carne replet: & oras committit non secus atque emplastra quæ cruentis vulneribus admoventur. Bibitur ad discutendum sanguinem concretum, & contra præcipitationes, rupta, conuulsa cum Cyatho aquæ recentior colatum, addito olei exiguo: celiacis, dysentericis per se Cyathus prodest: neruorum vitiis, conuulsionibus commodè illinitur ex oleo, vt pote quod sudores moueat: aduersus gypsi potum, & phalangiorum morsus bibitur. Hæc eadem præstant reliqua lixiuia, præsertim quernum: omnia ramen adstringunt. Fici succus lacteus aceti naturam habet, inquit Plinius, itaque coaguli modo lac contrahit. Dioscorides id aliter scribit, ni-

Ibidem.



Embl. 142.  
Li. 1. Diosc.

Lib. 8. sim.  
de Cine.  
Li. 2. Alim.

mirū Fici tam sylvestris quàm sativæ succū lac coagulare, quemadmodum coagulum, & dissolvere coagulatum, quemadmodum acetum. Redeamus ad Plinium. Excipitur ante maturitatem Pomi, & siccatur in umbra ad aperienda vlcera, cienda menstrua appositus cum luteo oui, aut potus cum amylo. Dioscorides. Exulcerat corpora, meatus aperit, aluum soluit, vuluam recludit cum amygdalo potus: menstrua ciet cum luteo oui, & cætera. Quod Dioscorides dixit, panos ad maturationem perducunt, maximè Nitro, Iri, aut Calce addita, vulgata Plinij exemplaria habent, efficacius Calce, aut Nitro addito. Verus Cornarij manuscriptum, efficacius Calce, aut Nitro, aut Sinapi addito. Quod in Plinio legitur, Tibiarum vlceribus cum æris flore, pterygiis cum punico malo, vetus codex habet, Tibiarum vlceribus cum æris flore, & parotidi, ac pterygiis cum Punico malo. Quod igitur cum malicorio à Dioscoride dictum, cum malo punico Plinius legit, & quod Dioscorides ait μελά χαλκώθε, idest cum Atramento sutorio, Plinius videtur legisse μελά χαλκώθε άνθες, idest cum æris flore, vicinitate vocum deceptus. Quod autem sequitur in Plinio, aluum sistunt manducata, legendum, cient. Quod verò Dioscorides dixit, pruriges, sonitusque, si crudæ terantur, & sinapi, liquoréque aliquo exceptæ auribus instillantur, id Plinius non habet, & interpret Ruellius legit σην νάπτει καὶ ὕγρῳ τινι, non item Cornarius, qui sic conuertit: At crudæ trite sinapiliquido exceptæ, & auribus inditæ, sonitus, & pruritus curant: rectè enim dici censet, σην νάπτει ὑγρῶ excipiendas esse ficus, nec alio opus esse humore, quasi σην νάπτει καὶ ὑγρῶ τινι legendum minimè sit, aut etiam pro voce ὑγρῶ supponenda vox νίτρω, veluti quibusdam visum est. Quod deinde Plinius scripsit, cinis non ex alia arbore acrior, vlcera purgat, & cætera, cinerem hîc lixiuum intelligit, quod Dioscorides κοινόν appellat. Postremo quod omnia lixiuorum genera adstringendi vim habere Dioscorides dixit, hoc reprehendit Galenus. Omne enim lixiuum eius cineris per quem excolatur, naturam adipiscitur. Quum autem non idem temperamentum omnes cineres habeant, neque etiam lixiuum quod per illos perstillauit, habebit. Ficus tametsi minus prauis succi gignant, Galeno teste, quàm ceteri omnes non modò fugaces, sed etiam autumnales fructus, non tamen id vitium prorsus effugere potuerunt. Ceterum hæc ipsis insunt bona, nempe quod permeabiles sunt, & facillè in totum corpus peruadunt, penetrantque. Nam & abstergerendi vi pollent haud obscura, cuius gratia post ipsarum esum nephritici multas arenulas excernunt. Cum porro autumnales fructus exiguum corpori alimentum præbeant, minimè omnium ficubus id vsu venit. Carnem tamen non compactam, neque firmam generant ceu panis, & suilla caro, sed turgidulam, & subinamem, veluti fabæ. Quin ventrem flatibus implent & ipsæ, & non mediocrem huic profecto molestiam inferrent, ni etiam celerem descensum essent adeptæ, cuius beneficio cum celeriter peruadant, flatu quem excitant, non diu manet, atque ob id minùs cæteris fructibus autumnalibus lædere consueuerunt. Cæterum maturæ ficus immaturas non mediocriter antecellunt, quod & in aliis quidem omnibus cernitur fructibus: quamquam non tantum in illis discrimen est. Siquidem perfectè maturæ ficus paulo minus omni prorsus noxa vacant. Idem sequenti capite Vuarum facultates recensens, sic scribit. Ficus & Vuæ quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimùmque prauis succi habent, præsertim cum perfectam maturitatem fuerint adeptæ. Quod autem ipsæ nutrant, maximo argumento sunt ij qui vinearum fructum custodiunt: siquidem cum duos menses solis Vuis ac ficubus, quarum custodia



stodij præfunt, vefcantur (nifi fortè panis quidpiam cum illis edant) obefi ac pingues fiunt. At caro quæ ex ipsis gignitur, haud quaquam eft firma ac denfa, quemadmodum ea quæ ex carnibus fit, fed laxa, ac præhumida. Ob id celeriter etiam, cum vefci iis defierint, contrahitur, ac confidet. Idem etiam de ficubus ficcis differens fic fcripfit. Caricæ multiplicem quidem habent vtilitatem, fi quis tamen largius efitaue- rit, ab eis offendetur: non admodum enim probum fanguinem gignunt: quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi, extenuandique vim habent, qua & ventrem ad excretionem irritant, & renes expurgant. Iecori autem lienique inflammatio- ne obfeffis funt noxiæ, quemadmodum & ficus, non peculiari quadam ex- imia facultate, fed communi dulcium omnium ciborum, ac potuum. Ob- ftructis autem illis, aut fcirrho tentatis, ipfæ ex fele nihil profunt, aut obfunt, fed medicamentis incidentibus, ac extenuantibus, & abftergenti- bus miftæ non mediocriter auxiliantur. Itaque nonnulli medicorum in his hiemis ac hepatis affectibus exhibent ipfas longe ante cibum cum Thymo, aut Pipere, aut Zingibere, aut Pulegio, aut Satureia, aut Calamintha, aut Origano, aut Hyffopo. Ad eundem etiam modum fi Caricæ cum alio quo- piam eorum quæ facultatem habent acrem, aut omnino incidendi, ac ex- tenuandi affumantur, non folùm fic affectis, fed fanis quoque viles erunt. Siquidem iecoris meatus per quos fertur alimentum, apertos effe non ægro- tantibus modo, fed benevalentibus etiam tutiffimum eft. Proinde hoc pa- cto Ficus cum fale extenuante, aceto, & Garo præparatas vulgo comedunt, quod id vtile effe experientia didicerint. Qui verò cum cibo aliquo incref- fante Ficus ac Caricæ edunt, non mediocriter offenduntur. Earundem tem- peramenta & vires, idem alibi fic tradit. Ficus aridæ vim habent excalfa- ciendi ordine primo, etiam completo, aut fecundo incipiente. Habent ve- rò etiam partium tenuitatem quandam. Ex iſtis duobus idoneæ funt, quæ tumores du- ros concoquant: ftatim verò etiam difcutiunt. Atque ipfæ per fe illitæ eiufmodi vim obtinent. Verùm vbi magis concoquere confilium eft, mifcenda eft farina triticea: vbi verò plus difcutere hordeacea. Panis ho- rum in medio eft. Porro fcire oportet, quæ pinguioribus funt, eas magis po- fe concoquere: quæ verò gultu acrioribus, magis tum extergere, tum difcu- tere. Cæterum quod ex iis plurimum in aqua coctis efficitur, fimile eft mel- li, non folùm confiftentia, fed & facultate. Præterea Ficus virides come- fæ propter admiftam humiditatem facultatis funt imbecillioris: subducunt tamen aluum utræque tum humidæ, tum ficcæ. Ficus arbor calidæ tenui- umque partium temperaturæ eft, vt indicant, tum liquor eius, tum foliorum fuccus: valenter enim eorum vterque calidus eft. Itaque non mordet tan- tum, aut abftergit vehementer, fed & vlcerat, & ora vaforum referat, & Myrmecias eiicit: quinetiam purgare poteft. Porro Ficus agreftis, quam Erineum Græci, Latini Caprificum vocant, tum liquor, tum fuccus ad om- nia valentior quàm fatiua. Sed & Cradæ, hoc eft rami earum, adeo funt calido temperamento, tenui- umque partium, vt carnes bubulas duras, fi coquendis adiciantur, teneras, & laxas efficiant. Caricæ duæ aut tres no- cte vna in aqua vitæ maceratæ, Matthiolus fcribit afthmaticos iuuare, qui mane eas deuorauerint. Ficulneo lacte vermiculoſæ fanantur aures. Ficul- neorum foliorum affric- tu facilè citantur hæmorrhoides. Pani optimè matu- rantur illitis Caricis decoctis, additis Lilij, aut Iridis, aut Althææ radicibus. Democritus præcoces fieri pollicetur, fi oleo & columbino fimo arbor il-

Libr. 8. fm.

Ibidem.



linatur: contra ferotinas, si primæ Grosi cū fabæ magnitudinem excesse-  
re detrahantur. Ficus, vt parvæ admodum sint, & in vasculis super fenestris  
spectentur, ita docuere Mangones. Vere Fici surculum abscindito, paulo  
ante germinationem, prominente iam oculo, & manibus contorto cacu-  
mine in vase terra pleno ipsum serito, cacumine inuerso: circa Hordei Mi-  
lūque nonnihil aspergito, terræque obruito, extra eam relicta resecta parte,  
fit hac arte, vt ramuli enascantur paruuli, qui circum vas sese fundentes  
breui Ficus edunt, pumila perpetuo manente arbore. Ficum arborem vt lau-  
rum è caelo fulminibus non ici compertum est.

## SYCOMORVS,

(AP. XIX.

## Nomina

Lib. 4. Hist.

cap. 2.

Lib. 23. c. 7.

&amp; 13. cap. 7.



RBOR Græcis συκάμωρος, Latinis Sycomorus, & Ficus Ægyptia no-  
minatur, & Morus Ægyptia Theoph. & Plinio. Arabibus Mumeiz,  
Aliumeiz, seu Giumeizi, Italis Sycomoro, & Fico d' Egitto, Gallis Sycomore,  
Boëmis Moruse. Aliqui, teste Dioscoride, συκάμινον, etiam appellat.  
Vocatur & fructus ipsius Sycomorum. Sycomorum eam esse arborem quam hic  
depinximus, iudicant peritissimi herbarij, notis eius insignibus à veteribus au-

## Forma.

Lib. 4. Hist.

## SYCOMORVS.



Lib. 4. Hist.

cap. 2.

μίδας ὅλως σὺν ἑχονία, πλῆθει δὲ πολὺ. Καὶ πάλιν ἐν δυνάμει, ἀντὶ τῆς ἐπικινισθῆναι, ἀλλ' ἑχονίαις  
ὄνυχας σιδηρὰς ἐπικινίσσιν, ἃς ἀντὶ τῆς ἐπικινισθῆναι, τῆς αἰσθητικῆς πέτλης. τούτων δὲ ἀφαιρεθέντων, πάλιν  
ἄλλα φύει, καὶ ἐκ τῆς αὐτοῦ τόπῃ, μὴδὲν παραλφεσθῆναι, καὶ τοῦθ' ὁμοθυμῆτις, ὅδε πλεονάκει  
φασὶ γίνεσθαι, πολὺ οὖν διὰ τὸ δένδρον σφόδρα ἐστὶ, καὶ τὸ ξύλον ἀνίσταται εἰς πολλὰ χεῖρσιμον.  
ἴδιον δὲ ἔχειν δλοεῖ παρὰ τὰ ἄλλα. μὴδὲν δὲ ἐτιχλωρὸν, sic enim legendū, εὐθύς καταβαί-  
ναι εἰς βυθὸν, εἰς βοθυμῆς δὲ ἐμδάλλασθαι, καὶ εἰς τὰς λίμνας ἐντὺς, καὶ ταριχεύεσθαι, βρεχέμενον δὲ ἐν  
τῷ βυθῷ, ξηραίνεται. Καὶ ὅταν τελείως ξηρὸν γένῃται, τότε ἀναφέρειν, καὶ ἐκπνεῖ, καὶ δλο-  
εῖ καλῶς τότε τεταρίχευεσθαι γίνεσθαι καὶ καῦρον, καὶ μαρὸν, ἢ μὴ οὐ συκάμινος ἔχει ταυ-  
τας



τας τὰς ἰδιότητας. εἶκοι δὲ παραπλησία τις ἡ φύσις εἶναι καὶ τῆς ἐν κρήτῃ καλεσμένης κυ-  
πρίας συκῆς. Καὶ ὅτι ἐκείνη φέρει τὸν καρπὸν ἐκ τοῦ τελέχους, καὶ ἐν τῶν παχυλάτων ἀρε-  
μίων, πλὴν ὅτι βλαστὸν τινα ἀφίησι, μικρὸν, ἀφυλλόν, ὅσπερ ῥίζιον, πρὸς ᾧ, vel πρὸς ὃν  
ὁ καρπὸς: (non πρὸς ὧδε ὁ καρπὸς, vt in vulgatis legitur) τὸ δὲ τελέχος μέγα, καὶ πα-  
ρόμοιον τῇ λευκῇ, φύλλον δὲ τῇ ψιλέᾳ. πεπαίνει δὲ τέσσαρας καρπὸς, ὅσαι πρὸς αὐτοῦ καὶ αἱ  
βλαστῆσεις. ἔδνα δὲ πεπαίνει, μὴ ἐπιτηνθέντος τῷ ἐρινῷ, καὶ ἐκρυέντος τῷ ὀπῷ. ἢ ὅ γλυκύτης  
καὶ τὰ ἔσθωθεν προσεμπερὶ τοῖς συκῆς ἐρνοῖς, μέγεθος δὲ ἡλικὸν ὅς τις μῆλον. Sic enim legen-  
dum ē Plinio: μέγεθος ἡλικὸν κοκκυμῆλον: Quæ omnia ad verbum transtulit Plinius.

Lib. 13. c. 7.

Et in Ægypto multa genera quæ non alibi. Ante omnia Ficus, ob id Ægyptia  
cognominata. Arbor Moro similis folio, magnitudine, aspectu. Pomum fert  
non ramis, sed caudice ipso. Idque ipsum Ficus est prædulcis, sine granis in-  
terioribus, per quam sæcundo proventu, scalpendo tantum ferreis vngu-  
ibus: aliter non maturefcit. Id cum factum est, quarto die demetitur, alio  
subnascente: septeno ita numerosa partu, per singulas ætates multo lacte  
abundat. Subnascitur, etiam si non scalpatur, fœtus quater ætate, priorē-  
que expellit immaturum. Materies proprii generis inter vtilissimas. Cafa  
statim stagnis mergitur, hoc est ei siccari: & primo fidit, postea fluitare  
incipit, certoque fugit eam alienus humor, qui aliam omnem rigat. Cum  
innatare cæpit, tempestiuæ habet signum. Huic similis quadantenus quæ  
vocatur Cypria Ficus in Creta. Nam & illa in caudice ipso fert Pomum, &  
ramis, cum in crassitudinem adolevere. Sed hæc germina emittit sine vllis  
foliis radices, (nempe exilis radiculæ,) similia. Caudex arboris similis Popu-  
lo, folium Vlmo. Fructus quaternos fundit: toties & germinat. Sed grossus  
eius non maturefcit, nisi incisura emissio lacte. Suauitas, & interiora Fici,  
magnitudo Sorbi. Hæc Plinius. In eo verò quod Dioscorides dixit Sycomō-  
ri fructum, Sycomorum etiam διὰ τὸ ἀποτονον τῆς γένεσεως appellari, idest, propter  
fatuum gustum, siue ob saporis ignauiam; in quo nulla acrimonia est, per-  
spicuum est à Galeno notari, scribente ridiculos esse eos qui Sycomora  
aiunt nominata, quod τοῖς μαρτοῖς σύκοις, idest fatuis ficibus similia sint, cum  
à similitudine quam cum Moro & Ficu habent, nomen eis sit inditum. Quod  
idem de Sycomoro ait, πολύκομον σφόδρα, idest admodum frondosam esse,  
dubitandi occasionem multis præbuit, sit ne legendum, vt Theophrastus  
habet, πολύστον δὲ τὸ διέδρον. σφόδρα ἐστὶ, vt multo liquore ac lacte abundare ac-  
cipiamus. Ruellius in conuersione sua vtrumque posuit, frondosa, multo  
lacte abundans, etiam si illud postremum in omnibus exemplaribus desit.  
Præterea quod Dioscorides scripsit fructum Sycomori non maturefcere διὰ τὴν  
ἐπικνιδίαν ὄνυχι, ἢ σιδηρῷ, nisi vngue aut ferro scalpatur, hoc Theophra-  
stus, & Plinius vnguibus ferreis fieri aiunt. Causam reddit idem Theophrastus.  
Morus Ægyptia fructum caudice fert, quia vegeta est, & sæcunda. Cuius rei  
argumentum illud est, quod sæpius ex eodem loco ferat, fructu priore dem-  
pto. Rectè autem non percoquit, nisi scalpatur, perungaturque oleo, propter  
alimonia, & influentis succi copiam. Scalptu enim aliquid detrahitur, &  
oleum vna cum sole calefaciens apertum pomum celeriter coquit. Idem  
alibi. Morus Ægyptia propter alimenti vbertatem, & humoris copiam fru-  
ctus concoquere non potest, nisi iis scalptis, & oleo delibutis. Iam verò in  
hoc etiam à Theophrasto disidet Dioscorides, cum scribit, γίνεται δὲ καὶ ἐν κύ-  
πρῳ εἶδος διὰφορον, ψιλέα καὶ ἔσα, συκαμίνω τὰ φύλλα εἶκοι, & cætera. Theophra-  
stus verò, Huic similis quæ vocatur Cypria Ficus in Creta, &c. Deinde: cau-  
dex arboris similis Populo, folium Vlmo: at Sorbi magnitudinem Plinius

Lib. 2. Alim.

Lib. 5. cauf.  
cap. 2.

Lib. 1. cauf.  
cap. 27.

Ibidem.



tribuit. Est & apud Theophrastum μέγεθος ἡλικον κοκκυμῆδον, & apud Dioscoridem, fructus pruni magnitudine. Ex tam grauium scriptorum testimoniis perspicuum est, errare eos, qui Sycomorum putant esse arborem, quæ plerumque visitur in cœnobiis, templorum plateis, & Sepulchretis, ex cuius baccis monachi spherulas faciunt, quibus mulierculæ suas numerant preces. Eius historia post hac fusè tradetur cap. 24. nomine Zizyphi albae. Sycomorus Ægypti peculiaris est arbor, teste Theophrasto. Nascitur etiam plurima in Caria & Rhodo, locisque nonnullis tritici multi non feracibus: vbi prouentu fecundo restibilique iuuamentum adfert, cum annonæ caritas premit. Perpetuo viret, & sapius æstate fructus fert. Sycomori pomum, auctore Dioscoride, aluo vtile est, sed per quam exilem præbet alimoniam: stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, antequam fructum ferat eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluit. Spongia aut vellere lacryma excipitur, quæ siccata, & in pastillos coacta fictili vase reponitur. Vis succi emollit, vulnera conglutinat, discutit collectiones coctioni repugnantes: bibitur etiam, aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes stomachi, dolores, & perfrictiones, celerrimè teredinem sentit. Plinius. Mora in Ægypto & Cypro quod ait Plinius sui generis sunt, largo succo abundant summo cortice desquamato, altiore plaga siccantur, mirabili natura. Succus aduersatur venenis serpentium, prodest dysentericis, discutit panos, omnesque collectiones, vulnera conglutinat, capitis dolores sedat, item aurium: spleneticis bibitur. Illinitur & contra perfrictiones. Celerrime teredinem sentit. Hæc eadem Plinius alio in loco non de Sycomoro, sed de Moro nostrate perperam scripsit, vt iam annotauimus. Galenus plantam Sycomori vidisse se ait in Alexandria vnà cum fructu, paruae ficui albae adsimili. Is fructus, inquit, nullam habet acrimoniam, exigua tamen dulcedinis est particeps, est que facultate, vt Mora, humidior quodammodo ac frigidior. Quin potius in medio Mororum ac Ficuum iure quis ipsum collocarit, indèque nomen ipsi arbitror esse positum, ridiculi enim sunt, qui fructum hunc ob id aiunt Sycomora fuisse nominatum, quod fatuis Ficubus sit adsimilis. Ipsius autem generatio ab aliis arborum fructibus quodammodo est diuersa: non enim ex furculis ac germinibus, sed ex ipsis ramis magnis, ac caudice nascitur. Hoc enim loco ad finem ἀκρεμῶν vox pro ἀκρεμῶν falso legitur.

Locus.

Tempus.

Li. 1. c. 144.

Vires &amp;

tempera.

Li. 13. ca. 7.

Li. 16. c. 28

Cap. de

Moro.

Li. 2. Alim.

## OLEA SATIVA,

## CAP. XX.

Nomina



LEA sativa ἑλαια ἡμερος Græcis est, Arabicè Zaiton, seu Cajon, Italicè Oliuo domestico, Germanicè Oelbaum, & Olinebaum: Hispanicè Oliuo, & Azeyuno, Gallicè Olivier, Belg. Olineboom: Anglicè Oliuete, De syluestri Olea iam diximus, nunc de sativa. Olea sativa arbor est magna, procera, ramosa: foliis longis, ferè saligneis, sed angustioribus, & minoribus, in acutum desinentibus, crassis, pinguibus, breui admodum pediculo subnixis, superne virentibus, inferne albicantibus, nunquam decidentibus, sapore amaro, & acriusculo: floribus albis, racematim congestis, ex quibus baccæ prodeunt, primum virides, deinde pallescentes, tum purpureæ, postremò saturatæ nigredinis. Arboris nomine ἑλαια vocantur, Latine Oliuæ, Gallicè Oliues, cum incipiunt nigrescere, nostri vocant Drupas, inquit Plinius. Græci verò Drypetas. Idem alibi. Druppa vocatur priusquam cibo matura sit, iam tamen colorem mutans. Ligni materies pulchra, solida, venosa, crispa, quæ ardet viridis perinde ac sicca. Genera Oliuarum tria recenset Virgilius, Orchites, Rhadios, & Pausias.

In Dume.

cap. 12.

Forma.

Lib. 15. c. 1.

Li. 12. c. 27.

Genera.

Nec



Nec pingues unam in faciem vertuntur Oliua,

Georg. 1.

Orchites, & Radij, & amara Pausia bacca.


Præterea, non desiderare rastros, aut falcem, vllamue curam.

Non ulla est Oleis cultura, neque illa

Procuruam expectant falcem, rastrosque tenaces,

Cum semel haferunt aruis, aurâsque tulerunt.

# OLEA SATIVA.



Nec plura genera hodie agnoscit Hetruria, inquit Matthiolus. Primum genus est earum, quas minores quidem Oleæ proferunt, sed spectatæ formæ, & Bononiensibus magnitudine non inferiores. His muria conditis in cibis vtuntur tantum: fundendo enim oleo minus aptæ sunt, quod multo plus amurcæ quâ olei contineant. Proximæ, tum calore, tum magnitudine præstantes, superioribus tamen minores ad conficiendum Oleum optimæ, quod non modò flauum, dulce, pellucidum, ac cæteris præstantius, sed etiam copiosum ex iis exprimitur. Has ferunt valde proceræ, & prægrandes Iuglandium Nucum modo arbores, quas Oliuastræ rura Senensia vocant. Tertij generis eæ sunt, quæ passim nascuntur, & omnium sunt maximè vulgares. Hodie omnium laudatissimæ, & crassissimæ Muria conditæ ex Hispania afferuntur. Plinius multò plura recenset genera, Licinianam, siue Liciniam (hæc optimum fundit Oleum; maximè agri Venafrani parte. Est autè Venafrum

In lib. Dio-  
scor. c. 18.

Lib. 15. ca. 3.

Minturnis, & Fregellis, & Liri fluuii vicinum, in Campaniæ litore situm: ὀδὲν, inquit Strabo, καλλιστὸν ἐλαίου) Cominiam, Contiam, Sergiam. Sunt & purpureæ, & Superbæ, Regiæ, quæ & Maiorinæ, & Phanliæ, Picenæ, Sidicina. Sunt & prædulces per se tantum siccata, vniq; passis dulciores, admodum rarè in Africa, & circa Emeritam Lusitanicæ. Non aliâ maior in Betica arbor quàm Olea, vt scribit idè Plinius. In Africa verò (fides penes auctores erit) Miliarias vocatas multas narrat à pondere olei, quòd ferant annuo prouentu. Olearū sicut Vitium, inquit Columella, plura genera esse arbitror, sed in meam notitiam decem modo peruenerūt. Pausia, Algiana, Liciniana, Sergia, Neuia, Culminia, Orchis, Regia, Circites, Murtea: ex quibus bacca iucundissima est Pausiæ, speciosissima Regiæ, quæ potius escæ, quàm oleo est idonea. Pausiæ tamen oleum saporis egregij dum viride est, vetustate corrumpitur. Orchis quoque & Radius melius ad escam quàm in liquorem stringitur. Oleum optimū Licinia dat, plurimum Sergia: omnisque Olea maior fere ad escam, minor oleo est aptior. Hactenus Columella. Orchites & Radij à figurâ nomen habent. Orchites quidem à testiculis quasi testiculares Oliuæ. Radij à longitudine radiorum metaphoricè dicuntur. Pausiæ quorundam sententia à sapore appellantur, quòd fiat πάλιστον: sunt enim bacca amarâ, ideo eas comedere cessant: Aliorum sententia, inter quos est Seruius, à pauendo dicuntur, id est rontendo, quòd nisi tundantur, oleum non reddunt. Priori etymo repugnat Columella, qui Pausiæ iucundissimam esse baccam, & eius oleum egregij esse saporis dum viride est, contra Virgilium scribit: posterius omnibus oliuis competit. Nulla Olea ex tot generibus,

Lib. 17. ca. 12.

Lib. 5. ca. 8.

Ibidem.



- Locus.* auctore eodem Columella, aut per frigidum, aut gelidum statum cæli patitur.
- Ibidem.* Itaque æstuosis locis Septentrionali colle, frigidis Meridiano gaudet. Sed neque depressis locis gaudet, magisque mediocres cliuos amat. In iis enim excellens solis ardor ventorum perflatu refrigeratur, quare optimum exhibent oleum. Planis verò & campestribus locis Oleæ minus impetu ventorum agitata, atque torrentis æstu solis ambustæ crassius oleum mittunt. Amat, inquit Matthioli. apricos tractus, & colles, calidæque regiones, nec in frigidis provenit, quare oleis Hispania, Italia, Gallia Narbonensis abundant. Oleam Theophrastus è celeberrimis Græcorum auctoribus, inquit Plinius, Urbis Romæ anno circiter quadringentesimo quadregesimo, negavit nisi intra XL millia passuum à mari nasci. Idem alibi: Tunc Oleam non putabant gigni nisi intra CCC. stadia à mari. Hanc arborem plerique existimant, inquit Columella, ultra milliarium sexagesimum à mari, aut non vivere, aut non esse feracem. Tradit idem, Quercu excisa radices noxias Oliueto relinqui, quarum virus enecat Oleam:
- Lib. 15. ca. 1.* Quercus & Olea tam pertinaci odio disident, auctore Plinio, ut altera in alterius scrobe depactæ moriantur. Idem alibi: Olea ubi Quercus effosa sit male ponitur, quoniam vermes qui Raucae vocantur (Erucae, apud Theophrastum, *καρχαί* pro *καρχαί*), in radice Quercus nascuntur, & transeunt. Florent omnes
- Tempus.* Olea mense Iulio. Fructus mense Nouembri & Decembri decerpuntur. Prima ergo, sic enim legendum, ab Autumni colligitur initio, operæ pretio, non natura, Pausia, (quoniam tum cõditur, cui plurimum carnis: mox Orchites, cui olei: post Radius. Has enim ocysimè occupat ætas, quia sunt tenerrimæ, & amurca cogit decidere, sic enim legendum. Differuntur verò etiam in Martium mensem callosæ, contra humorem pugnaces, ob idque minimæ, Licinia, Cominia, Contia, Sergia, quam Sabini Regiam vocant, non ante Fauonij afflatum nigrescentes, hoc est usque ad v. Idus Februarias. Omnino in vita error est publicus, rumore Oliuæ crescere oleum existimantium, præsertim cum magnitudine copiam olei non constare, indicio sint quæ Regiæ vocantur, ab aliis Maiorinæ, ab aliis Phauliæ, grandissimæ alioqui, minimo succo. Est & in Ægypto carnosissimis olei exiguum. Decapoli verò Syriæ perquam parvæ, nec cappari maiores carne, oleo tamen commendantur. Quam ob causam Italicis transmarinæ præferuntur in cibis, cum oleo vincantur. Fiunt & præcoces feruenti aqua perfusæ, quamlibet immaturæ. Oliuæ constant nucleo, oleo, carne, amurca. Sanies hæc est eius amara. Fit ex aquis, ideo siccitatibus minima, riguis copiosa. Oliua
- Vires & Temper.* flaua & recens stomacho utilior est, ventri difficilis: nigra autem & matura corruptioni oportuna est, stomacho aduersatur, oculis non conuenit, capitis dolorem mouet, arefacta illitu depascentia vlcera sistit, & carbunculos emarginat. Oliuæ sale condiuntur; vnde Colymbades appellatæ, quasi natatrices, eo quod
- Lib. 15. ca. 3.* Muria veluti innatant. A Muria verò eadem Halmades dictæ sunt. Plinius. Sale illæ priuatim condiuntur, inquit Plinius, & ut reliquæ Muria, sapæue (perperâ in publicis libris legitur, amurca sapæue.) Nec non aliquæ oleo suo, sine accersita commendatione, Muria innatant Colymbades. Franguntur eadem, herbarumque viridum sapore condiuntur. Quia verò etiam incisæ in Muriâ mittebantur, succum ipsarum ex Muria collectum vtendum præscribit his verbis
- Lib. 2. c. 18.* Dioscorides. Colymbades trite, & ambustæ, illitæ pustulas gigni prohibent, fordidâ vlcera purgant, succus ipsarum ex Muria gingiuas cõtrahit, & motus dentium firmat. Nunc de Oliuæ partibus dicendum, ac primum de Oleo. Suus quidem Oliuæ succus oleum est, ex Oliuis primum in pauimeto relictis, quoad rugosæ factæ fuerint, deinde molæ suppositis, postremo torculari expressis, vel immaturis, quod Omphacinum ob id, & Omotribes, id est acerbum & crudum est



est appellatum, idemque refrigerans & adstringens: vel maturis, quod oleum commune dicitur: ac vtrumque vel insulsum, vel salsum, & illotum, vel lotum, idque ad salem tollendum, vel vt fiat candidius, aut morfus expers. Vtrumque rursus, vel recens est, vel antiquatum, & ex hoc, vel illo agro, quæ olei communis differentiæ diligenter sunt obseruandæ, vt medicamentorum ex iis iustior fiat compositio. Nam facultatibus secundum has differentias multum variant, ac composita quibus miscentur plurimum immutant. Oleum Galeno ex oliuis confectum, quod sane verissimo & maxime proprio nomine oleum appellatur, humectat, & modice calfacit, cuiusmodi est dulcissimum, factum potissimum ex oliuis, quas Græci *διρρηρεῖς* vocant, nos Drupas. Omotribes & Omphacinum, quantum in se habet adstrictionis, tantum etiam illi inest frigiditatis. Porro oleum vetus, quod quidam ex dulci inueterato efficitur, calidius est, & potentioribus ad discutiendum viribus. Quod verò crudum, inueterascit, id dum adstrictionis reliquum quippiam seruat, miste permanet facultatis: vbi vero illam prorsus abiecerit, reliquo fit simile. Quinetiam quicumque in preparando ramos iniiciunt, ij & ipsi Omphacino simile oleum efficiunt. Ceterum rogandum non est quomodo sit preparatum, sed gustandum potius, ac si præ se ferat adstrictionis quippiam, eatenus etiam frigidum est existimandum, ceu illud quod ex Hispania defertur. Quod si nequaquam gustantibus adstringere appareat, sed perfecte videatur dulce, id modice esse calidum putandum. Præterea si tenue quoque cernatur (tale est quod purum est, quodque intuenti translucidum videatur) modicum eius latissime percutem extensum sibi maneat continuum, celeriterque à cute combibatur, id vtiq; pro optimo ducendum, ac virtute quam maximè pollere, quale est Sabinum. Porro oleum lotum minimè omnium mordacitatem continet. Oleum Omphacinum ad multos vsus rectè valentibus accommodatissimum Dioscoridi. Præstat recens, odoratum) quod non mordeat: stomacho vile est, quod adstringat gingiuas contrahit, dentes firmat, si contineatur in ore: sudores cohibet. Oleum comune quo vetustius ac pinguius, eo ad medicamenta magis est idoneum. Omne oleum calfacit, emollit ventrem (alij legunt *μαλακτικὸν τῆς σάρκος*, id est molliat carnes) à perfrictionibus corpus tuetur, ipsumque promptius ad munera obeunda reddit, aluum emollit vlcerantium venenorum vires permistum hebetat, contra venena datur assidue potum, redditumque vomitionibus, soluit aluum hemina mensura cum pari ptisanæ succo, aut aqua potum: ad tormina calidum, simul decocta ruta, tribus sextariis in potu datur: ventris animalia pellit: idem maximè ilei intestini morbo laborantibus infunditur. Vetus magis calfacit, & vehementius discutit, oculorum claritati subditum confert. Si vetusti non sit copia, in vase decoquitur ad mellis crassitudinem, & vetustate representet. Hæc sic Græcè cum legantur, *εἰ δὲ μὴ παρὲν παλαιὸν ἔλαιον ὄντω, κατακεράσας εἰς ἀγρίον τοῦ παρόντος τὸ κρεῖττον, ἔψε, ἕως ἔχῃ μέλιτος πᾶχος, καὶ χρεῖ. Τὴν δὲ αὐτὴν τῶ προσημύμῳ εἰσφέρει*) *διήναμιν*, ita videntur Latine reddenda. Si verò adeo antiquum oleum non adsit, ex eo quod suppetit, præstantissimum in vas coniicito, coquiturque ad mellis crassitudinem, eoque vtere: nam eandem cum supradicto obtinet facultatē. Scribit & idem auctor foliorum fatiæ Oleæ vim adstringentem esse, sed aliquanto inferiorē quàm in Oleastro, ideoque ocularibus medicamentis ob suam mitiorē vim magis conuenire. Sudorem ligno viridi accenso manantē, illitu sanare lichenas, furfures, & scabiem. Oleaginum semē (Græca τὸν καρπὸν habent, id est fructum ipsarum Olearum) illitu mederi furfuribus, & vlceribus quæ vorant & depascunt: quod autem intra nucleum est, ex adipe & farina scabros ungues excutere. Hippocrates nuclei quoque huius vsus ad ocularia medicamenta adhibere videtur, neque de alio nucleo intelligere

Lib. 6. simpl

Lib. 7. c. 28.

Lib. 1. c. 118.



Li.2. Epid.  
Sect.5.

Lib.1. c.20.

Embl.13.  
lib.1. Dios.

Lib.25. ca.5.

Lib.15. ca.8.

gere, cum scribit: *οφθαλμῶν, αποδίδει δωδέκατον, κρόκος πέμπτον, πυρρήνος ἐν, ψιμυθίς ἐν, σμύρνης ἐν τὸ ὕδωρ, κατὰ τῆς κεφαλῆς καθαίνει, καὶ διδόναι σκόρυδα συνμάζειν* Quæ sic interpretatur Cornarius. Ad oculos Spodij partem duodecimam, Croci quintam, Nuclei Oliuæ vnam, Cerussæ vnam, Myrrhæ vnam. Aquam frigidam super caput fundito, & Allia cum Maxa edenda dato. Quidam tamen Punici Mali *πυρρήνα*, id est, nucleū intelligi non absurdè posse arbitrantur. De Oliua, ipsius succo, & nucleo dictum est, nunc de amurca. Hæc, vt affirmat Dioscorides, decocta in cupreo vase ad mellis crassitudinem adstringit, ceteros præbens Lycij effectus. Insuper dentium dolori, & vulneribus cū aceto, vino, aut mulso commodè illinitur: additur in medicamenta ocularia, & meatus obstruentia inductu suo. Vetustate meliorem fieri constat. Vtiliter infunditur sedis, genitalium, ac vuluæ exulcerationi. Si verò cū Omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit: iumetorum scabiem cū decocto Lupini, & Chamæleone illitu sanat. Cruda, & recente Amurca podagras, articulariōsque dolores foueri vtilissimū: peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposita, tumoris molem reprimat. Eundem Amurcæ in medicina vsum Plinius similiter fere tradidit, nisi quod vbi Græca exemplaria quæ habent *ἐκβάλλει δὲ καὶ τὰς ἐφθαρμένους ὀδόντας συνὸμφακίνω*, & cætera, secutus Ruellius vertit, si verò cū Omphacino recoquatur, & cætera, Plinius legit, si verò cū Omphacio decoquatur ad mellis crassitudinem casuros dentes extrahit, quam Plinij lectionē magis probans Cornarius, locum Dioscoridis sic interpretatus est. Eiicit etiam corruptos dentes cum Omphacio ad mellis spissitudinē cocta, & oblita. Nam Omphacinum gingiuas constringit, & dentes corroborat, vt modò diximus, non eiicit. Sed & illum ipsum Plinij locum deprauatū ex manuscripto Codice sic integritati restituit. Si vero decoquatur ad mellis crassitudinem, causarios dentes extrahit, non casuros, vt habent vulgata exemplaria: casuri enim extractione nihil opus habent, inquit Cornarius. Causarij verò dentes sunt ex causa aliqua affecti, & vt Dioscorides ait, *ἐφθαρμένοι*, id est corrupti. Eadē voce vsus est Plinius, vbi veratrum dari vetat causariis, vel latere, vel faucibus, id est iis qui locis istis male affecti sunt. Super omnia celebrauit Amurcam laudibus Caro, quas apud eum, & Plinium legere potes. Illud tantum dicam eam Apothecarum, & Officinarum fabricis, in quibus lanei, sericeæue panni reconduntur, per vtilem esse: si enim ex ea calci permista parietes incrustentur, item laquearia, & pauimēta, non modò parietes aliunde contractum humorem non resudabunt, neque situm contrahent, sed nec blattas, nec teredines, nec araneas, nec alia noxia animalia gignēt.

# LOTUS ARBOR, CAP. XXI.

Nomina



OTI nomen multis stirpibus commune est, sed de Loto arbore hic agimus, quæ vt *λωτὸς δένδρον* Græcis, ita Latinis Lotus arbor dicitur, Arabibus *Sadar*, *Sedar*, siue *Alfadar*, Italis *Loto albero*, In Tridentino & Goritiensi agro *Bagolaro*, in Veronenſi *Perlaro*, Hispanis *Almez*, Gallis *Micoconlier*, qui & fructum *Micoconles* appellant, nomine proculdubio ex Loto deflexo, quasi *μικρὸν λωτὸν καρπὸν*. Loti arboris genera tria apud auctores reperiuntur. Est enim Lotus Celtis à Plinio appellata, in Africa, & Lotophagia insula frequens, cuius historiam ille ex Theophrasto literis mandauit: eaq; duplex: altera nucleum habens, altera sine nucleo interiore. Secunda Lotus eiusdem Theophrasti, à Lotophagorum Loto differt. Tertia, Lotus etiam à Plinio dicta (etsi improprie) à fructus suauitate superioribus simili, & Faba Græca, quæ & *λεβανύρος* est Theophrasti. Primi generis Lotus Dioscoridis, siue Celtis, ea est, quam primam hic depinximus, Gallorum *Micoconlier*, Italoꝝ *Bagolaro*, Matthi

Genera.

Lib.13. c.17.  
Lib.4. Hist.  
cap.4.

Lib.3. Hist.  
cap.13.



Matthioli, Dodonæi, Dalechampij, aliorumque doctissimorum herbariorum sententia. Loti apud Theophrastum historia est eiusmodi: ἔστι δὲ τὸ λωτοῦ τὸ μὲν Lib. 4. Hist. cap. 4. ἴδιον γένος, ὁμιέγεθες, ἡλικὸν ἄπιος, ἢ μικρὸν ἔλαττον. φύλλον δὲ ἐντομάς ἔχον, καὶ περνωδες. τὸ μὲν ζῶν μέλαν, γένη δὲ αὐτοῦ παλαιοῦ, διυαφορὰς ἔχοντα τοῖς καρποῖς. ὁ δὲ καρπὸς ἡλικὸς κύματος. πεπαινέ) δὲ ὡπερ οἱ βοτρύες, μεταβάλλων τὰς χροιάς. φύεται δὲ καθάπερ τὰ μύρτα, παρὰ ἄλλα. πυκνὸς ἐστὶ τῶν βλαστῶν. ἐσθιόμενος δὲ ἐν τοῖς λατοφάγοις καλεσμένοις, γλυκύς, ἡδύς, καὶ ἄσυνης, καὶ ἐτι πρὸς τὴν κοιλίαν ἀγαθόν. ἡδίων δὲ ὁ ἀπυρηνος (sic enim ex Plinio legendum, non ut in vulgatis exemplaribus scriptum reperitur, ἡδίων δὲ ὁ πύρηνος) ἐστὶ καὶ τοῖς τὸν γένος. ποιεῖσι δὲ καὶ οἶνον ἐξ αὐτοῦ. πολὺ δὲ τὸ δένδρον, καὶ ὁ πάλυκαρπον. τὸ οὖν ὠφέλεια τραπεζίδον, ἡνίκα ἐσάδιζεν εἰς καρχιδόνα, καὶ τῶτα φασὶ πολλοὺς ἡμέρας ἀπολαττόντων τῶν ἐπιηδείων κεχρησθῆ. ἐστὶ μὲν οὖν ἐν τῇ νήσῳ τῇ λατοφαγίτῃ, φασὶ καλεσμένῳ πολλοῖς. ἀντὶ δὲ ἀπὸ αὐτοῦ καὶ ἀπὸ αὐτοῦ μικρὸν. ἢ μὴν ἐν ταῦθα μόνον, ἀλλὰ πολλὰ παλαιοὶ ἐν τῇ ἡπείρῳ: πολλοὶ δὲ ἐν τῇ λιβύῃ, καθάπερ εἴρηται τῶτο, καὶ ὁ παλαιοὶς ἔστιν. Id est, Est autem Loti proprium genus, procerum, magnitudine Piri, aut

## LOTUS CELTIS

Arbor.



paulo minus: folio inciso, Ilcis specie (Cornarius non περνωδες, sed περνωδες, id est, serrato legendum suspicatur) ligno nigro. Genera eius plura, fructibus distincta. Fructui magnitudo Fabæ, qui velut vuarū botri maturefcit, colores mutans. Nascitur alternatim, exaduerso, veluti Myrtorum bacca, super germinibus spissus. In cibo est Lotophagis dictis, dulcis, iucundus, & innoxius, atq; etiam aluo ciendæ utilis. Suauior autem qui nucleo caret: ex quo etiam vinum conficiunt. Copiosa illic est hæc arbor, multumq; fructifera. Quare Ophelli exercitum cum Carthaginem proficisceretur, in commeatus penuria, eo fructu multos dies victitasse ferunt. Est igitur in Insula Lotophagite, quam Pharidem vocant, (ea nunc Gerbi dicitur,) Lotus frequens. Ea verò à continente parum disita est, disiunctaque insula. Caterum non illic tantum, sed etiam in continente multo copiosior provenit. Nam in Africa, quod diximus, Loti, ut & Paliuri, maxima copia est. Hæc dum transcribit Plinius, quedam etiam de suo adiecit. Eadem Africa qua vergit ad

Embl. 13.  
li. 1. Diosc.

Supra ca. 3.

Lib. 13. c. 17.

nos, insignem arborem Loton gignit, quam vocant Celtin, & ipsam Italiæ familiarem, sed terra mutatam. Præcipua est circa Syrtes (vulgo hodie *Les Baxes*, ou *Secagnes de Barbarie*,) atque Nasanconas. Magnitudo quæ Piro: quamquam Nepos Cornelius breuem tradat. Incisuræ folio crebriores: alioquin Ilcis viderentur. Differentiæ plures, exq; maximè fructibus fiunt. Magnitudo huic Fabæ, color croci, sed ante maturitatem alius, atque alius, sicut in vis. Nascitur densus in ramis, Myrti modo, non ut in Italia, Cerasi: tam dulci ibi cibo, ut nomen etiam genti terræq; dederit, nimis hospitali aduenarum obliuione patriæ. Ferunt ventris non sentire morbos, qui eum mandant. Melior sine interiore nucleo, qui in altero genere osseus videtur. Vinum quoque exprimitur illo, simile mulso, quod ultra denos dies durare negat idem Nepos: baccasque contusas cum alica ad cibos doliis condi. Quin & exercitus pastos eo accepimus, vltro



ultra citroque commeantes per Africam. Ligno color niger. Ad tibiærum cantus expetitur. E radice cultellis capulos, breuesque alios vsus excogitant. Hæc ibi natura arboris. In his Plinius vinum ex Loto exosse expressum denos dies durare negat, Theophrastus ex quo totam historiam exscripsit, id omittit, sed vinum ex Loto secundi generis confectum post biduum, triduūmue corrumpi

Lib. 14.

tradidit. Polybio verò apud Athenæum Plinius assentitur, ait enim Polybius ex Loto sua vinum simile esse mulso, nec ultra denos dies perdurare. Plinius eiusdem Loti lignum ad tibiærum cantus expeti, è radice cultellis capullos, breuesque alios vsus excogitari scripsit, quæ Theophrastus de ligno & radice Loti secunda prodidit, vt dicitur. Eandem Loton Plinius arborem Syrticam rectè appellat,

Lib. 24. c. 2.

Lib. 13. c. 17.

Li. 1. Diosc. cap. 134.

Forma.

Loti 1.

sed mox velut immemor eius historiam à seipso descriptæ, Fabam Græcam vocat, eiq; vires eas tribuit, quas Loto sue Dioscorides, qui Loton arborem esse tradit, vastæ magnitudinis, bacca Pipere maiore, dulci, cibus grata, stomacho facili. Hæc Loto nostræbellè conuenire faciliè is rectè iudicabit, qui eam diligenter

Forma.

Loti 1.

contemplatus fuerit. Est enim procera, magnæque arbor, Piro quidem sepe magnitudine par, nonnunquam etiam procerior, caudice crassissimo, cortice leui, colore in cæruleum nigrescente, ramis vastis, latè protensis: cui folia lata, aspera, crenata: fructus rotundi, Pipere maiores, ex longis petiolis penduli, primum vi-

Li. 9. Odyf.

rides, deinde flauī, postremò nigri, grati saporis. Apud Lotophagos fructus Loti si tanta fuit dulcedo, vt eo gustato socij Vlysis, narrante Homero, ad naues redire noluerint, nisi verberibus adacti, atque inde orto proverbio Loton gustasse dicantur ij, qui delitiis quibusdam deliniti, diutius in iis herent, neque ab iis ad solita studia reuocari possunt, si, inquam, ob tantam fructus suauitatem, quæ in nostra Loto desideratur, neget quis nos veram Loton hîc representasse, meminerit Plinium dixisse, in Africa insignem arborem Loton gigni, & ipsam Italiæ familiarem, sed terra mutatam, quod mutato solo, caloq; à grata illa fructuum dulcedine degenerauerit. Lotus hæc nostra in multis etiam Galliæ Nar-

Locus.

Tempus.

Ibidem.

bonensis locis nascitur, sed præcipuè in agro Monspelienfi, tam vasta & procera, vt alias quasuis arbores illic magnitudine superet, vel saltè æquet. Fructus eius Septembri mense sunt maturi: quo tempore folia decidere incipiunt, vèrè vna cum floribus renascentia. Secundum Loti speciem Theophrastus scribit esse.


Δένδρον θαμνώδες, καὶ πολὺ κλάδων, τῷ στελέχει δὲ ὀστᾶθες. Τὸν δὲ καρπὸν μετὰ τὸ κάρυον ἔχειν, τὰ δὲ ὀστᾶθες σαρκώδες, ἀλλὰ δερματοειδέσπερον. ἐσθιόμενον δὲ ἔχει τὸ γλυκὺ, ὡς ὄψομον, καὶ τὸν οἶνον ὃν ἐξ αὐτοῦ ποιεῖσιν, ἐδιαμύρνει, ἀλλὰ ἢ διόο, ἢ τρεῖς ἡμέρας, εἴτ' ὀξυνεῖ. ἡ δὲ οὐ μὴ οὐ τὸν καρπὸν ἐν τοῖς λωσοφάγοις, ξύλον δὲ κάλλιπον τῷ ἐν κυρηναίᾳ. θερμότερον δὲ εἶναι τὴν χώραν τῶν λωσοφάγων, τῷ δὲ ξύλῳ τὴν ῥίζαν εἶναι μελανίτερον μὴ πολὺ, πύκνῃ δὲ ἡττον, καὶ εἰς ἐλάτῳ χρησιμηνεῖς γὰρ τὰ ἐγχέδρια, καὶ τὰ ἐπικολλήματα χρῆσθαι. τῷ ξύλῳ δὲ εἰς τετὸς αὐλῆς (non vt in excusis legitur, αὐτῆς) καὶ εἰς ἄλλα πλεῖον. Id est, Lotus secunda, arbor est fruticosa, ramosa, caudice firmo, semine incluso nucleo, extrinsecus non carnosio operimento, sed velut cute cōtectō, in cibo non tam dulci, quā ori grato, & suauī, ex quo vinum fit non perdurans, sed duos trēsue dies tantum, dein acefcens. Fructus apud Lotophagōs iucundior est: materies optima in Cyrenæa regione, feruidiore Lotophagorum tractu. Radix arboris, multo ligno nigrior, minus densa, & ad pauca commoda, nimirum ad pugiones, & ad glutinandas assulas, ligno ad tibias, & ad alia plerāque vtili. Hanc secundam Loton Theophrasti eam esse iudicauit Dalechampius, cuius ramulus hic depictus exhibetur. Nonnulli docti Herbarij Laurocerasum, à foliis Lauro, & nucleis Cerafo similibus nominant. In hortis Principis Doriæ Genuæ luxuriat, aduecta ex Africa, fruticosa, ramosa, caudice firmo; semine nucleo abditō, qui valde tener est: pulpa non carnosā extrinsecus, vt in Amygdala, sed

Forma.

Loti 2.

potius





potius cutis instar molli, vt in Ceraso: fructu oblongo, è cæruleo rubescente, minùs dulci quam superioris, sed gratiore & suauiore gustu. Hæc Lotus Plinio, & Matthiolo incognita fuit. Sed quænam sit Lotus illa, quam apud Athenæum memorat Polybius, inter Herbarios controuersia est. Dalechamptius primæ Loti Theophrasti secūdā speciem esse existimat, cuius fructus nucleo caret, aut quam minimum complectitur, vt fere nullus esse videri queat. Demōstrat id descriptio. Arbor est, inquit, haud procera, aspera, non spinosa (legendum enim *ὅτι ἀκανθώδης*) foliis virentibus, ilici similibus (ex Theophrasto enim legendum *παρὰ πλείστον τῇ πικρίδι, non ῥάμνῳ*) paulo spissioribus, & latioribus: fructu per initia colore & magnitudine Myrti baccis candidis simili, cum iam perfectæ sunt. Augescens colore phœniceus est, rotundus, Oliuæ magnitudine (Theophrastus Fabæ magnitudine) nucleo perquam exiguo. Maturus colligitur, & seruis alendis cum Alica in vasis stipatis reconditur. Ingenuis autem ac liberis domesticis exemptis nucleis asseruant, & in cibo dant. Gustus est Ficuum, & Palmularum, sed odor præstantior. Ex eo in aqua macerato & trito vinum fit, grati iucundique saporis, optimo

Lib. 4.

**DIOSPYROS, SIVE**

*Faba Græca, Latifolia, Pseudo  
 Lotus Matthioli.*

**DIOSPYROS, SIVE**

*Faba Græca, angustifolia,  
 seu Lotus Africana.*





mulso simile, quod merum bibunt. Verum non longius quàm decem dies durat. Quamobrem ad vsum quotidianum paulatim conficitur: Acetum quoque ex eo conficitur. Hactenus Polybius. Aspera Loti folia sunt tangenti, aculeata esse nullus vnquam scripsit. Folium Ilici proximum esse, fructus colorem mutari dum maturescit, Myrtorum modo nasci, ex eo vinum exprimi, dixit Theophrastus, quæ in Loto supradicta comperiuntur: cetera omnia congruunt. Tertia Loti species hic exhibetur, quæ etsi Lotus non esset, tamen in Loti generibus numerata est, eoque nomine celebrata, à Plinio Lotus, & Faba Græca dicta, quam Romæ, inquit, à suauitate fructus sylvestris quidem, sed Cerasorum pene natura, Loto appellat. In Italia frequens est arbor, & ab Hetruscis hodie vocatur *Vna d'India*, præsertim Florentiæ, vnde aduehendæ curauit Dalecham-pius. In quibusdam etiam hortis Lugduni visitur, breui caudice, ramis plurimis, longissimis, validissimis, vt totidem arbores dicere liceat, petulanter vmbra latissima ex patiantibus, in vicinas domos sæpe transilientibus opacitate breuissima: foliis Corno ferè similibus, longioribus, angustioribus, pallidioribus, venosis: flore in medio purpurascens, quatuor foliolis distincto, herbaceis, ramis sic incumbens, vt petiolo carere videatur: fructu Cerasorum figura, antequam maturuerit cædido, cum maturuit, rufo, prominente è medio tenui quodam velut aculeo, ramis & furculis sine pediculo adhærente, gustu dulci, palato non insuauis. Hanc esse quam dixi Fabam Græcam Plinij notæ omnes demonstrant. Nam, vt ille scribit, cacumine ramosa est, caudice breui, ramis pro arboris magnitudine prælongis, validis, multis, & cum hyeme folia deciderint, ob furculorum paucitatem solem non auferentibus: fructu Cerasis non absimili, nucleo duro, qui in Ceraso tener est, ac fragilis, quod Theophrastus adnotauit, cortice diluto, rubore iucundo, blandissime oculos excipiente, & quo verisimile est pelles tingi posse, radice lanas, vt mirum sit Matthiolum suæ Loti corticis tristissimo tribuisse, quod Plinius de huius corticeliteris prodiderat, cuius tinctura colorem rufum fieri ipsemet alibi scripsit. Ramenta ligni decocta in vino prosunt dysentericis, & cetera: deinde, Rufant & capillum, defluentemque cohibent. Sic enim locum hunc in nostris exemplaribus mutilum ope melioris Codicis integrum & restitutum citauit Ruellius. Sunt qui nec vana quidem ducti coniectura hanc arborem Theophrasti *διδασκαλον* esse censent, fructu Ceraso simili, duro intus & solido nucleo, non, vt in Ceraso fragili: maxime cum Plinius Theophrasti verba singula Latine exprimere solitus, Faba Græca descripta, nusquam alibi Diospyrimeminerit. Guaiacum Patavinum Fallopius, Pena & Lobellius, vera Lotus Theophrasti, nominarunt. Hæc est Faba Græca quam Bellonius à Constantinopolitanis Cerasum Trapezuntiam vocari scribit. Ea etiam cuius figuram Augerius de Busbecke ad Matthiolum misit, cui subscriptum erat, Dactyli ex Trapezonda dulces, & gustu delectabiles. Huius Pseudo Loti, siue Fabæ Græcæ, picturas duas Matthiolus exhibet, foliorum tantum longitudine breuitate, angustia, latitudine distantes, quæ pro ætate & proprietate loci in quo stirpes aluntur, varietas facile contingit. Loti suæ baccas aluum adstringere scripsit Dioscorides Ramentorum ligni decoctum siue potu, siue infusione dysentericis, ac scæminis fluxione vuluæ laborantibus auxilio esse, rufare capillos, citam aluum cohibere. Plinius Fabam Græcam cum Loto primi generis confundens, quod indicauimus, eadem & quæ Dioscorides, Loto suæ tribuit. Hæc Loros, inquit, quæ Faba Græca appellatur à nostris, aluum baccis sistit. Ramenta ligni decocta in vino (hoc Dioscorides tacet) prosunt dysentericis, menstruis (*γυναικῶν ποικίλης* Dioscorides, id est mulieribus fluxione vuluæ vexatis) vertigini, comitialibus (hæc Dioscorides non habet) Cohibent & capillum. Quæ

verò



verò sequuntur, nec in Dioscoride extant. Mirum his ramentis nihil esse amarum, fructuq; dulcius. Fit & è scobe eius medicamentū, ex aqua Myrti decocta, subacta, & diuisa in pastillos, dysentericis vtilissimū, pondere victoriati, cum aque cyathis tribus. Galenus dilucidius Loti vires explicat his verbis. Lotus arbor non multæ adstrictoriæ facultatis est particeps, sed & tenuium est partium, & exsiccatoria. Itaque lignorum assulæ derafæ muliebri accommodantur profluuiō, & dysenteris, & cæliacis affectibus. Decoquantur verò interdum in aqua, interdum in vino, nimirum prout vsus poposcerit, nec infunduntur tantum, sed & bibuntur. Quinetiam quod pilos defluentes cohibeat, non mediocriter signum est ipsam adstringentis esse cuiusdam, ac mediocriter desiccantis facultatis. In his cum Plinius & Galenus ramentorum Loti decocto cohiberi capillos dicant, locus Dioscoridis in quo legitur, ξανθίζει δὲ καὶ τὰς τεύχας, καὶ ἐπέχει γὰρ ἐν αὐτῇ, id est, flauos facit capillos, & citam aluum cohibet, corruptus esse videtur, & ita legendus. ξανθίζει δὲ καὶ τὰς τεύχας, καὶ ἐπέχει τὰς βέβας, id est, flauos efficit capillos, & defluentes cohibet. Nam cum baccis ventrem fisti antea dixerit, & ramentorum decoctum dysentericis prodesse, quid attinebat quod de ventre sistendo dictum iam fuit, statim repetere?

Li. 7. simpl.

## L A V R V S, CAP. XXII.

**Q**VÆ Latine Laurus dicitur, Græcè δάφνη, Arabibus Gaur, vel Gar, Gallis Laurier, Italis Lauro, Germanis Lorbeerbaum, & Loorbeer, Hispanis Laurel, seu Laureiro, Boemis Bobek, Anglis Laureorbay tree, Belgis Laurusboon, Lusitanis Laureiro. Baccæ eius δαφνίδες. Laurus duum est generum. Vna tenui folio constat, altera latiore. Vtraque odoratissima, omnibus, præsertim in Italia cognita, quod nō solum in hortis, viridariis, vineisque sata virescat, sed etiam in syluis, maximè locis maritimis, ac etiam in

Nomina

Genera.

## L A V R V S.



montibus & collibus apricis, qui lacus & maria respiciunt, sponte nascatur. Folia habet oblonga, in exortu lata, in acutum desinentia, crassa, solida, odorata, in vno genere latiora, in altero angustiora & tenuiora, ex qua foliorum differentia alteram marem, alteram fœminam esse iudicant. Flores emittit paruos, muscosos, Oleæ fere similes, in luteo albicantes, ex quibus baccæ prodeunt Oleis similes, primum virides, cum maturuerunt nigra, crasso intus nucleo, qualis est in Rusci baccis. Laurus frequentissima in Italia, ut dictum est provenit, in Hispania, in Gallia Narbonensi, aliisque calidioribus regionibus, in quibus in proceram arborem assurgit, cortice crasso duroque. Frigidioribus locis in hortis serunt, & summa adhibita diligentia curaque à frigoris iniuria vix tuentur: Lauro enim inimicum frigus in Olympo tamen copiosorem nullam esse tradit Plinius: quin & in Lexobiis, ac Bellocasiis Neustriæ, hortos maris afflatu tepentes non dedignatur. Folia Lauri perpetuo virent. Mensibus Martio &

Forma

Locus.

Lib. 10. c. 32.



Lib. I. c. 90.  
Vires.

Cap. 8. 23.

Li. 6. simpl.

Aprili germinat. Baccæ Autumni fine decerpuntur, vel hyemis initio, vt Oliuæ, Laurus vtraque, vt docet Dioscorides, ex calfactoriam naturam habet, & emollientem. Quamobrem decoctum earum in muliebres infessus additum vuluæ & vesicæ vitii conuenit. Virentia folia (alij τὰ χλωρὰ τῶν ξύλων legunt, id est, virentia ligna) sensim substringunt: illita quoque ac trita vel parum, & apum ictibus auxiliantur: eadem cum polenta, & pane illita inflammationem omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & vomitus mouent. Græcè habetur, ποθὲν δὲ παύειν τὸν εἶμαχον, καὶ ἐμεῖς κινεῖ. Cornarius autem pro παύειν, id est mitigant βαρύνει legit, id est, grauant. Plinius priore membro omisso, simpliciter dixit, folia pota vomitiones mouent. Lauri baccæ magis quàm folia calfaciunt. Ergo in eclegmate tritæ cum melle, vel passò, profunt tibi, orthopnœæ, & omnibus thoracis rheumatismis: contra ictus scorpionum ex vino bibuntur: vitiligines emaculant. Succus baccarum vtilissimè aurium dolori & grauitati (Πυσσηκώδης, sic etiam Plinius habet, Codex antiquus ἥχως, id est sonis) instillatur cum vino vetere & rosaceo. In medicamenta autem adiiciuntur, quæ neruorum lassitudines resciant, & ad vnguenta quæ calfaciunt & discutiunt. Cortex radicis calculos rumpit, parvus necat, hepaticis prodest tribus obolis in vino odorato potus. Eadem Plinius tradidit. Hæc autem adiunxit. Profunt folia sceminarum mensibus cum oleo cocta. Cum polenta, quæ tenera sunt trita, ad inflammationes, vel, vt in manuscripto legitur inflationes oculorum, cum ruta, testium, cum rosaceo, ad capitis dolores, aut cum irino. Quin & commanducata, atque deuorata per triduum terna, liberant à tussi. Eadem profunt suspiriis, trita cum melle. Cortex radicis cauendus grauidis. Ipsa radix calculos rumpit: iocinori prodest, tribus obolis in vino odorato pota. Baccæ menses trahunt appositæ, tritæ, vel potæ. Aduersus scorpiones quaternæ ex vino bibuntur. Perunctos succo baccarum fugiunt venenata omnia. Prodest contra ictus & potus, maximè autem eius Laurus quæ tenuia habet folia. Baccæ cum vino serpentibus, scorpionibus & araneis resistunt. Ex oleo & aceto illinuntur & leni, & iocinori: gangranis cum melle. Et in fatigatione etiam, aut perfrictione succo perungi, nitro adiecto, prodest. Sunt qui celeritati partus multum conferre putent radicem, acetabuli mensura in aqua potam: efficacius recentem, quam aridam. Item & in remedio vuæ iacentis, quadrantem pondo baccarum foliorumque decoqui in aquæ sextariis tribus ad tertias, eamque calidam gargarizare: & in capitis dolore impari numero baccas cum oleo conterere, & calefacere. Lauri arboris, folia & cortex, Galeno teste, desiccant & calefaciunt vehementer, magis etiam fructus quàm folia. At radicis cortex minus quidem acris est, & calidus, magis tamen amarus: habet etiam adstrictionis nonnihil: quamobrem & calculos confringit, & iccori prodest. Bibitur ex vino fragrante trium obolorum pondere. Lauri tenerimas summitates cum nardo in vino decoctas aurium grauitati & sonis mederi, scribit Matthiolus, si eius decocti calentis vapor infundibulo in aures recipiatur. Lauri baccis laxatam Columellam ad locum reduci, si cum æquali pondere Cymini, Hyssopi, Origani, Euphorbij, melle excipiantur, & summo capiti calidæ applicentur. Easdem cum tritici fursure, Iuniperi baccis & Allio contritas, & vino sæpius super calente regula asperfas, pubique admotas suppressam vrinam citare. Septem Lauri baccas à prægnantibus, quibus instat partus, cum dormitum eunt deuoratas, vt facilem felicemque partum edant efficere. Tenerimas Lauri cymas cum Calamintha & sale contritas, ex tepida aqua sumptas aluum ciere, pituitamque & lumbricos



bricos celeriter expellere. Ex iisdem baccis cum maturæ sunt, in aqua decoctis fit oleum Laurinum Dioscoridi: siquidem ex obducto cortice quandam pinguitudinem reddunt, quæ manibus distracta concha excipitur. Mesuæ vero baccæ Lauri maturæ, & recentes teruntur in pila, ex aqua in lebetes coquuntur, post torculari plano exprimuntur in vas subiectum, in quo aqua supernatans oleum colligitur. Simplex vtilius, & quo recentius & viridius colore: amarissimum est & acre. Ex Gallia Narbonensi vtribus, vt commune, aduehitur, vnguento similis quàm oleo. Id calidum est, essentia tenuis, aperit, mollit, discutit. Ob hæc intemperantiam omnem frigidam solam, & cum pituita, vel flatibus sanat, & ab his colo dolenti clystere infusum mirè prodest, vt partibus omnibus cerebri illitum, articulis, ventriculo, spinæ dorsæ, paralyti, horrore febrili: denique omnibus neruorum vitiis, algoribus, lassisudinibus, catarrhis, aurium doloribus, hepatis, lienis, renum, vteri frigidis affectibus. Ex iisdem conficitur emplastrum, quod de baccis Lauri cognominatur, Mesuæ auctore. Recipit autem Thuris, Mastiches, Myrrhæ, singulorum vnciam vnam, baccarum Lauri vncias duas, Cyperi, Costi, singulorum semunciam: mellis colati quantum ad ea comprehendenda sufficit. Si autem Cyperi fescunciam misceas, & sterces capræ, aut vaccæ siccum ad pondus omnium, ad hydropem fit mirabile. Alioqui ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem, à flatibus, aut intemperie frigida ortum placat. Quare in colico dolore, à flatu & pituita salubriter calidum ventri imponitur, vacuata plenitudine: in clystere quoque iniicitur vncia vna, vel fescuncia, cum cæteris eodem pertinentibus. Inflationem quamuis, id est à flatu tensionem, & tumorem, eadem ratione iuuat. Diuersum ab hoc emplastro Malagma *Μαλμα* apud Galenum, id est, ex baccis Lauri, Nitro rubro, Ammoniaco, Cera, Resina Picea, Pice Bruttia. Quidam seniles, pulchros, & valde leues baculos ex Lauro parant. Fabulantur Poëtæ Daphnē formosissimam Ladonis filiam fuisse, quam cum deperiret Apollo, & vt potiretur, celeri cursu instaret fugienti, ab eo tandem capta matrem precatur tellurem, vt in sinum se suum reciperet. Votis ac precibus excitata tellus, confestim arborem edidit. Re conspecta deterritus Apollo, cum arborem gentili virginis nomine donasset, vulso ramo sese coronauit: quo verborum inuolucro nonnihil veri significatur: nempe Laurum vaticiniij symbolum, Apollini sacrum esse, vaticiniij Deo. Puellam quidem sapientiam appellant: at vaticinandi facultas à sapientia proficiscitur. Tum etiam plena ignis arbor, Apollini, siue Soli qui ignis est, placet. Lemures & Larnæ Sol odit, itaque si Laurus adest, statim abiguntur, & fugantur. Est igitur Laurus *μαυριδὸν φυτόν*, vt veteres dixerunt, id est diuinatrix arbor, Apollini sacra, vnde Delphica nominatur. Quin & vates responsa daturi Laurum edebant, eaque sese coronabant, vt Apollo cui gratissima est hæc arbor, eorum habitu aspectuque delectatus, libentius diuino afflatu moueret eorum animos. Tibullus.

*Vera cano, sic usque sacras innoxia Lauros*

*Vescar, & æternum sit mihi virginitas.* Claudianus. *Venturi præscia Laurus.*

Eandem ob causam vates à Lycophrone *Λαφροφάτος* dicitur. Musas Heliado Laurum gustandam dedisse ferunt, quod eius vis esset, vt qui eam manderent, vaticinarentur. Eadem victores Delphis coronabantur, vt triumphantes Romæ, inquit Plinius. Laurus triumphis propriè dicatur, vel gratissima ianitrix Cæsarum, Pontificumque: quæ sola & domos exornat, & ante limina excubat. Ipsa pacifera, vt quæ prætendi etiam inter armatos hostes quietis sit indicium. Romanis præcipuè lætitiæ victoriarumque nuntia, additur literis, & militum

Oleum  
Lauri-  
num.

Lib. 15. c. 30.



Laureis, pilis que fascies Imperatorum decorat. Hac corona gremio Iouis Opti-  
 mi Max. deponitur, quoties lætitiā noua victoriā attulit. Ouidius:

*Arbos eris certe, dixit, mea, semper habebunt  
 Te Coma, te Cythara, te nostra Laure pharetra.  
 Tu ducibus latis aderis, cum lata triumphum  
 Vox canet, & longas visent Capitolia pompas.  
 Postibus augustis eadem fidiſſima custos  
 Ante fores stabis, mediūque tuebere Quercum.  
 Vtque meum intonsis caput est iuuenile capillis,  
 Tu quoque perpetua semper gere frondis honorem.*

Quia spectatissima in monte Parnasso Laurus esset, ideo grata fuit Apollini, magis quā, vel quia esset pacifera, aut perpetuū vireret, aſſuetis iam eo dona mittere etiam Romanis regibus, teste L. Bruto. Sunt & circa D. Augustum euenta Lauri digna memoratu. Nāque Liuiæ Drusillæ, quæ postea Augustæ matrimonij nomē accepit, cum pacta esset illa Cæsari, gallinam conspicui candoris, sedenti Aquila ex alto abiecit in gremium illāsam: intrepidēque miranti accessit miraculum, quoniam teneret rostro Laureum ramum onustum suis bac- cis. Conseruari alitem & sobolem iussere Aruspices, ramūque eam feri, ac ritē custodiri. Quod factum est in Villa Cæsarum, fluuio Tiberi imposita, iuxta nonum lapidem, Flaminia via, quæ ob id vocatur, Ad Gallinas, mirēque sylvā prouenit. Ex ea triumphans postea Cæsar Laurum in manu tenuit, coronamq; capite gessit: ac deinde Cæsares Imperatores cuncti. Traditūque mos est ramos quos tenuerunt, ferendi. Manu satarum arborum, receptorūq; in domos fulmine sola Laurus nō icitur, nisi futuræ calamitatis prodigio, ac ne domus quidem in quibus sint eius rami, de cælo tanguntur. Quare Tiberium Principem, tonante cælo coronari ea solitum ferunt contra fulminum metus. Laurus, vt ait Plinius, manifesto abdicat ignes crepitu: quapropter fortasse dixit Maro:

*Et fragiles incende bitumine Lauros.*

Id est, inter vrendum fragores & crepitū edentes. Nihil enim æque magno sonitu crematur, ac Laurus. In ea verō significatione fragilis interdum vsurpatur, vt à Lucretio.

*Et fragiles sonitus chartarum commeditatur.*

Li. 16. c. 40.

Nam quoniam crepant quæ franguntur, sit vt fragor interdū sit sonus, & fragilis, sonans. Laurus ex sese ignē emittit: nam si exsiccata ramus ramo frequentius confricetur, asperso sulphuris puluere, ignis exiliet. Teritur lignū ligno, inquit Plinius, excipiente materia aridi fomitis, fungi vel foliorū facillimè cōcipientium, vel, vt legitur in manuscripto, facillimo conceptu. Sed nihil Hedera præstantius, quæ teratur, Lauro quæ terat, vel, vt est in manuscripto, quæ teratur Lauro, Laurumq; terat. Ex quibus hæc Theophr. de eadem re verba sic explicāda & legenda videntur: Δεί δὲ τὴν ἐχάραν ἐν τέτρων ποιεῖν, τὸ δὲ τελευτὸν ἐν δάφνης, non τρύπανον, vt habent exemplaria. Id est, materiam aridi sonitus ex hac, id quod teritur ex Lauro, facere oportet, vt τελευτὸν sit à τελεῖν, id est à terendo. Eliditur enim ignis atterendo, & collidendo, non terebrando: ἐχάρα verò materia est aridi fomitis ex Plinio, non conceptaculū, vt Gaza reddidit. Rubigo maxima segetum pestis Lauri ramis in aruo defixis, transit in earū folia ex aruis, vel, vt alij legūt, ex herbis, vt scribit Plinius. Palumbes, gracculi, merula, perdices Lauri folio annuum fastidiū purgāt eodē teste. Coruus occiso Chamæleonte, qui etiā victori nocet, Lauro infestum virus extinguit. Narret Theophrastus in sinu Heroo, ad quem descendunt Ægyptij, Laurum esse & Oleam, & Thymū, non viridia, sed lapidea, parte à mari eminente, similia tamen viridibus, tum foliis, tum germi- nibus, longitudinēque earum arbuscularum esse ternū cubitorum.

Lib. 18. c. 17.

Lib. 4. Hist.  
cap. 8.

STR/N





ULTIS nunc in hortis Italiæ, præsertim Florentiæ ac Pisarum, frequens hæc arbor, quæ vulgo *Syringa*, nuncupatur, Africo fortasse vocabulo. Mediocris est arbor magnitudinis, cortice rufescente, furculosa, folio Tiliæ, acutiore & interdum angustiore, per am-

Nomen

Forma

SYRINGA flore albo Clusij.



SYRINGA CAERULEO  
flore, Lilac Matthioli.



bitum valde dissecto, nisi admodum tenellum sit: flore candido, suauiter olente, cuius rei gratia in hortis colitur, pallidis intus apicibus, semine paruulo, nigro in loculis oblongis, Ordei grano similibus, superne denticulatis. Ostryon Theophrasti multi esse volunt, & reliqua historia cõsentiente, & ea nota præcipue quæ peculiaris est, nempe quod Ordei grano fructus similis sit. An veteribus cognita fuerit nec nec, nõdum statuere possumus, inquit Clusius: passim verò ab Herbariis & frutex coronarius, quoniam eius flos odoratus in coronas interdum addatur, & Syringa appellatur, fortasse à virgarum rectitudine longitudinéque, & fungosæ interioris medullæ copia. Est aliàs planta quam Belgæ etiam Syringam vocant, à superiori tamen dissimilem. Nam quamuis à radice virgas multas edat, nodosas, multo tamen breuiiores sunt, & Fraxini tenellis virgis similiores, quàm Syringæ superioris: rariores in eis ramuli, in quibus bina ad singulos nodos aduerso situ nascuntur folia, latiora quàm in præcedente, ex longiore pediculo prodeũtia, crassiora, duriora, nigriora, & ad Populi nigre siue potius Hedere foliorum formam accedentia. Summis ramis oblongos veluti furculos fert, ex quibus multi flores dependent, minores quàm in superiore, colore caeruleo obsoleto, odorati quidem, sed minus quàm candidi. Subsequitur fructus oblongus, duabus veluti valuis constans, quo bina oblonga, & compressa semina continentur, colore ex atro rufescẽte. Alitur etiam in hortis, florẽtque simul cum alia, tum etiam citius. Lilac nomine hunc fruticem monstrauit Matthioli, & Glandem vnguentariam existimauit: verum huius fructus à Pistaciis multum differt. Folio Tiliæ, acutiore, & interdum angustiore, per ambitum valde dissecto, nisi admodum tenellum sit: flore candido, suauiter olente, cuius rei gratia in hortis & viridariis colitur, pallidis intus apicibus: semine paruulo, nigro, hordei grano simili, in siliquis oblongis, superne denticulatis.



Sunt qui Ostryam Theophrasti esse volunt, tum eius historia consentiente, tum ea præsertim peculiari nota, quod scilicet hordei grano fructus eius similis sit. Theophrastus. Est Ostrya, quam nonnulli Ostryam vocant, vnica species, Oxya (Plinius τῆ μελίζ, idest fraxino, legit,) tum satum, tum cortice similis: folio Piri, non multo oblongiore, in acutum contractiore, & maiore, fibris multis & crassis à medio dorsi in modum costarum recta secundum magnam fibram porrectis, in fibris ipsis rugato, & in ambitu leuiter serrato: materie dura, decolore, albida: fructu paruo, oblongo, hordeo simili, flauo. Radices sublimes habet. Amat aquosa loca, & prærupta. Domos eam inferri infaustum esse volunt: acerbæ enim inuehere mortes, & partus, vbicumque fuerit difficiles reddere. Hæc Theophrastus, quæ sic exscripsit Plinius. Gignit Græcia arborem Ostrya, quam & Ostryam vocant, solitariam circa saxa aquosa, similem Fraxino cortice & ramis, foliis Piri, paulo tamen longioribus, crassioribusque, ac rugosis incisuris, quæ per tota discurrent: semine hordeo figura simili, & colore. Materies est dura atque firma. Hac sub Ostrya, in domum illata, difficiles partus fieri produnt, mortēsque miseras.

## ZIZYPHVS PVNICEA, CAP. XXIIII.

Lib. 9. c. 4.  
Nomina

Genera.  
Ibidem.

Forma.  
Matth lib.  
1. Dioscor.  
cap. 137.

**A**RBOR Zizyphus Columella dicitur, Gallis *Iuibier*. Fructus Græcis ζίζυφα, ζιζύφα, & ζιζύφα, Latinis similiter Zizypha, Arabibus *Hunen*, *Zufalzel*, seu *Hanab*, Officinis *Iuibæ*, Gallis *Iuibes*, Italis *Guggiolo*, Hispanis *Azufcifa*, & *Acofeyfo*, Germanis *Rotbustbeerle*, *Brustbeerlin*. Zizyphi genera duo statuit Columella, rutilam, & albam. Zizyphus rutila, siue phœnicea, siue punicea, arbor est, Pruno humilior, caudice contorto, cortice scabro, vitis vinifera fere simili: materie Oxyacanthæ proxima, radicibus firmis, ac solidis. Spinis tota fere riget, longis, firmis acutissimis, colore ex nigro rufescente. Ex ramis iuncea, & renues quidam processus exeunt, colore pallido, lenti, spithama longiores, ex quibus vtrinque per intervalla folia exeunt, vt in Fraxino & Sorbo, impari tamen exortu oblonga, non magna, firma, vt in Vincaperuina, leuissimè per ambitum serrata. Flores ex foliorum exortu prodeunt, pallidi, ac muscosi, ex quibus bacca oriūtur Oliuarū instar, primum virides, deinde subalbicantes, postea, aureo colore, & cum ad perfectam maturitatem peruenierint rufescentes, siue phœniceæ, in quibus osseus est nucleus, Oliuæ nucleo similis. Pulpa ante maturitatem viret, sapore austeriorisculo, post maturitatem dulcis, & gustui non ingrata flauescit. Zizyphus in calidis regionibus, & in Italia, & Gallia Narbonensi prouenit. Leguntur Zizypha Septembris fine vnà cum iuncea ramusculis, & in manipulos colligata laquearibus suspenduntur, prius diebus aliquot insolata. Postremo decerpuntur, & in capsulis asseruantur ad medicos vsus. Sūt etiam qui decerpta, & cratibus regetibusque instrata, tam diu insolant, quousque rugosa ibidem fiant. Zizypha in humiditate & calidi-

ZIZYPHVS  
Punicea.

Locus.

tate rem



tate temperata habentur, inquit Matthiolus, de quibus hæc apud Auicennam *Temper.*  
leguntur. De Iuibis, id est, Sericis. Iuibæ meliores sunt quæ maiores. *¶ Vires*  
Frigidæ quidem hæ in siccitate & humiditate temperatæ sunt, parum ad humiditatem *Ibidem.*  
declinantes. Aduersus sanguinem acrem, & calidum conferunt, quia, vt opi- *Li. 2. c. 369.*  
nor, ipsum incrassant, & viscidum reddunt. Qui verò ab ipsis sanguinem ex-  
purgari & detergeri aiunt, non rectè illi quidem sentiunt, nec illis assentior. *Li. 2. Alim.*  
Parum illa nutriunt, & difficilè concoquuntur. Serica quid ad tuendam sanita-  
tem, morbosue profligandos valeant, testis esse non possum, inquit Galenus.  
Exiguum præbent alimentum, difficilè concoquuntur, ideo stomacho non  
sunt vtilia, conferunt pectori & pulmone. Existimant quidam dolori renum, &  
vesicæ conferre. Actuarius meminit Zulapij è Zizyphis ad ardentem Febrem,  
quod purgat sanguinem, & tussim, ac ex calore destillationi succurrit. Simeon *Serap. c. 77.*  
Sethi Zizypha, inquit, humido, calidòque esse temperata, isque propriam *Li. 5. meth.*  
vim inesse sanguinis acrimoniam reprimendi: bonum succum creare: & san-  
guinis serum vacuare. Horum decoctum tussim, & spirandi difficultati conferre,  
item pectori, renibus, & vesicæ. Præstantiora esse maiora, qualia Edeffina. Vo-  
mitionem acri humore concitatam sedare. Verum ægrè concoqui, & lienem  
lædere. Quare eorum decoctum salubrius propinari. Hæ sunt variæ auctorum  
de Zizyphis sententiæ. Auicenna, frigida esse, sed in sicco humidòque tem-  
perata, Simeon in humido calidòque temperata esse tradit. Auicenna ab ipsis  
sanguinem purum reddi, & abstergeri negat, Actuarius Zulapio ex sericis scri-  
bit sanguinem expurgari, Simeon sanguinis serum euacuari, bonumque suc-  
cum gigni omnes difficile concoqui, ad tussim, pectoris, pulmonum vitia,  
valere, sanguinem acrem domare consentiunt. Galenus nonnullorum senten- *Li. 2. Alim.*  
tia Zizypha Serica vocat, nullamque in iis se inuenisse facultatem scripsit ad  
valetudinis conseruationem, aut ad morborum curationem, sed ab effrenatis  
tantum pueris, & à mulierculis in cibo expeti: vnde capta occasione Fuchsius  
Auicennam, atque cæteros omnes Arabicæ familiæ auctores reprehendit, af-  
ferens omnia quæ de Zizyphorum viribus literis mandarunt, falsa esse, in quo  
non Arabas scriptores solum, sed Græcos recentiores damnat. Nam Actuarius,  
vt dictum est, Zizypha ad pectoris morbos ex calidis humoribus natos, com-  
positis medicamentis admiscuit: item iis quæ bilem deiciunt, quibus adstipu-  
lantur ea quæ ex Simeone Sethi supra memorauimus. Eadem per sæpe in suis  
compositis medicamentis Nicolaus Alexandrinus vsurpat. Præterea hæc ita ex-  
perientia comprobata sunt, vt iam rectè Auicennam scripsisse constet, à Zizy-  
phis sanguinis feruorem, & acrimoniam reprimi, atque ideo pectoris & pul-  
monum vitiis prodesse, à calidis humoribus ortis, quod sanguinem incrassent.  
Quod si quis eos damnauerit, qui temerè & sine diorismo Zizyphi ad tussim,  
aliæque pectoris vitia, ex quauis causa etiam frigida, suborta, rectè ille quidem,  
& cum Mauritanis auctoribus senserit. Sed Galeni Serica an Zizypha sint du-  
bitant etiam docti medici, cum Plinius diuersa esse statuere videatur. Æquè pe- *Matt. Ibid.*  
regrina sunt, inquit, Zizypha & Tuberes, quæ & ipsa non pridem venere in *Li. 15. ca. 14.*  
Italiam. Hæc ex Africa, illa ex Syria. Sextus Papinius quem consulem vidimus,  
primus utique attulit, Diui Angusti nouissimis temporibus, in castrorum ag-  
geribus sata, baccis similia quàm Malis: sed aggeribus præcipuè decora, quo-  
niam & tecta iam syluæ scandunt. Tuberum duo genera, candidum, & à colo-  
re fericum dictum. Idem rursum: ab Amygdala proximè florent Armeniacæ,  
dein Tuberes, & præcoces: illæ peregrinæ, hæ coactæ: Zizypha grano serun- *Li. 16. ca. 25.*  
tur, mense Aprili. Tuberes melius inferuntur in Pruno syluestri, & Malo Coto- *Li. 17. ca. 10.*  
nea, & in Calabrice. At Columella Tuberum nusquam meminit, sed Zizypho-  
rum



In li. i. Pau.  
cap. 81.

rum duo tradidit genera vt diximus. Quare Plinij codices deprauatos esse suspicatur Matthiolus, in quibus Zizyphis adscribendum esset, quod de tuberibus deprauatè legitur; maximè cum non solùm Columella, sed inter Arabas Auicenna, inter recentiores Græcos Simeon Sethi, duas Zizyphi species fecerint, Plinius vnā duntaxat. Denique cum Auicennæ & Serapioni Galeni Serica eadem sint quæ Zizypha, Matthiolus eadem quoque esse statuit. Cui sententiæ aduersatur Cornarius, qui Plinio referente tuberum duo genera esse credit, alterum candidum, alterum Sericum à colore dictum, idest, inquit, sub flauum qui serici natiui puri, & adhuc crudi color est. Ab hoc colore Serica non alia esse quàm quæ Galen. *σφικα* dixit, quæ à Zizyphis perspicuè Plinius distinxit. Tuberum, quos Nucipersica vulgus appellat, duo genera cunctis fere nota sunt: alterum, etiam cum maturuit, ex albo subuirescens, eodem in toto pomo colore; alterū, toto fructu rubro, vel qua parte solè spectat, rubescens, altera sub flauo, quem esse credunt suauioris ac delicatioris gustus. Hoc videlicet esse putatur Sericū Plinij. Tuberis huius meminit Petronius his lepidissimis versiculis:

*Infelix modo crimibus nitebas,  
Phæbo pulchrior & sorore Phæbi,  
At nunc leuior are, vel rotundo  
Horti Tubere, quam rigauit vnda,  
Ridentes fugis, & times puellas.*

### ZIZYPHVS ALBA NOSTRA, CAP. XXV.

Nomina



ZIZYPHVS alba, ab Arabibus auctore Andrea Bellunensi in expositionibus nominum Arabicorum Auicennæ, nuncupatur *Azad-racht*, à Damascenis *Zaizalacht*, ab Italis quibusdam sine vlla ratione Sycomorus, à mulierculis *Albero da le patenostri*, à Turcis *Thepic*.

Forma

Arbor est iustæ magnitudinis, foliis ferè Fraxini, minoribus, obscurius viren-

ZIZYPHVS  
Alba Dalech,

ZIZYPHVS ALBA  
Matth. siue Pseudosycomorus.



tibus:



tibus: flore caruleo, quinque foliolis constante, è cuius medio eminet apex niger, purpurascens, Caryophyllis nostris valde similis. Fructum fert rotundum, Cerasi figura, gustanti initio dulcem, tandem amarissimi, ingratisimique saporis, nucleis natura eleganter striatis, & quos adacta acicula facillè perfores. Quamobrem mulierculæ & monachi precarios globulos ex iis conficiunt. Reperitur, inquit Bellunensis, Venetiis, & Patauij in claustris monachorū. Colitur in quibusdam etiam hortis ciuitatis Monspelienfis. Auicennas Sectione sexta, libr. 4. fructum ac lignum huius arboris occidere tradit ea ipsa animalia quæ Rhododendro necantur, remedióque esse tum quod in vniuersum traditur de venenis omnibus, tum etiam priuatim, quod Rhododendri maleficæ vi resistit.

MYXOS ARBOR, CAP. XXVI.

**M**YXOS ARBORIS à Dioscoride & Galeno nulla, à posterioribus Græcis Li. 15. ca. 13. Paulo, Aetio, Psello, Actuário frequens fit mentio, quæ Plinij æta- **Nomina** te nasci Romæ cœpta est, insita Sorbis. Μύξος nuncupatur, fructus μύξα, μύξα, μύξα, Plinio Myxæ, ab aliis Myxa, & Myxaria, à mucoso pomi lentore: μύξον enim Græci muccum vocant, Officinis Arabas secutis **Sebesten**, qui etiam *Motheica*, *Mukeita*, & *Mokaita* vocant, Galli *Sebestes*. Syros conicit Ruellius ab Augusti honore Myxa Sebastas appellasse, vnde Arabum, Li. 1. ca. 127. & Officinarum *Sebesten*, nomen deductum. Myxos arbor est Pruno non dissimi- **Forma.** lis, sed minor. Caudici cortex candidus: ramos fundit viridi colore nitentes: Marth. li. 1. Diosc. c. 137. folia in rotundum circinata, rotundioraque quàm Pruni, ac firmiora: flores albicant, racematim prodeuntes, ex quibus fructus oriuntur paruis Prunis similes, caliculo orbiculato, vt glandes, ima parte adnexi, nucleo intus triquetro, qui satis baccae suæ proportionem respondet. Ii fructus maturi in atrum vi-

PRUNVS  
*Sebestena Matth.*



MYXOS ARBOR,  
*sive Sebestena nostra.*



rescunt,



rescunt, gustu prædulci, ac lenta, viscidâque pulpa. Maturi leguntur in solan-  
 Li. 3. c. 5. & tûrque ut pasci, & in rugas contracti recondantur. Myxa, Plinio auctore, in  
 lib. 15. ca. 13. *Locus.* Damasco Syriæ, & in Ægypto primum nascentia, deinde Italiæ familiaria fue-  
*Temper.* re. Nunc in locis calidis, & in Italiæ viridariis quibusdam virent. Temperamē-  
 Uires to sunt æquali, neque frigida, neque calida. Deiectoria vis inest, ut & Prunis,  
 Matt. Ibid. tam Græcorum scriptorum quam Arabum testimonio, tametsi aliter senserit  
 In parad. Fuchsius, qui ea potius adstringendi vi prædita esse ait, à quo tum veteres, re-  
 Libr. 7. centiorésque medici, tum quotidiana experientia dissentiant. Myxa Paulo, fru-  
 Lib. 7. sim. ctus arboris est, minor quidem Prunis, facultate verò consimilis. Vêrrem mol-  
 liunt Myxa ut & Pruna, de quibus Galenus dixit, Pruni fructus ventrem subdu-  
 cit, recens quidem magis, aridus verò minùs. Actuarius Myxa medicamentis  
 multis commiscet quæ bilem deiiciunt. Myxorum pulpa drachmarum decem,  
 aut summum duodecim pondere sumpta, eisdem fere prebet effectus, quos  
 Ægyptia Siliqua, improbanda Fuchsi sententia, qui Electarium è Myxis, quod  
 Officinæ Diahebesten vocant, non Myxorum, sed aliorum medicamentorum  
 deiectoria vi, quæ Myxis adduntur, aluum purgare arbitratur. Nam si id per se  
 præstant, ut ostendimus, idem etiam aliis admitta præstarent. Myxa etiam uti-  
 liter dantur ex bile febricitantibus, atque Paulo, Aetio, Psello, Actuario aucto-  
 ribus, linguæ asperitatem mirificè leniunt. Adhæc pectori & tussi opitulatur,  
 ventris tæniæ pellunt: urinæ ardoribus à bile ortis aut salsa pituita, maximam  
 opem præstant, deuorata triginta, aut quadraginta. Ex iure carniū macerata,  
 prima statim mensa sumpta, aluum commodissimè citant. Præstantiora sunt  
 plena, pingua, carnosâ, quæque situm non redolent, teredine non arrosæ.

## PISTACIORVM ARBOR, CAP. XXVII.

Nomina



ISTACIORVM arboris fructus *πιστάκια* Græcis vocantur, Nicandro  
*πιστάκια*, Posidonio *βιστάκια*, Latinis etiam Pistacia, & Pistacea, &  
 Pistaciæ fœminino genere, Arabibus *Pustech*, aut *Festuh*, Officinis &  
 Barbaris *Fistici* dicuntur, Italis *Pistacchi*, Hispanis *Albocigos*, Germanis  
*Vuelfch* *Impernuszlin*, Gallis *Pistaches*, Boëmis *Pistacya*: Anglis *Pistakes*, & *Fistikes*.  
 Forma. Tota arbor Terebintho similis est, foliis ex viridi colore in luteum inclinanti-  
 bus, utrinque è ramusculis, velut in Terebintho emergentibus. Nuces racema-  
 tim prodeunt ex ramorum summitatibus Amygdalinis fructibus minores, Pi-  
 neis nucleis paulo maiores, duplici cortice & nucleo constantes, figura oblon-  
 gâ, acuminatâ supra, infra pediculi, cui adhæserunt vestigium seruantes, ab  
 vna parte tumidiore, & in angulum desinente ventre protuberantes, vna com-  
 missura per mediam anguli longitudinem transeunte, cum maturuerunt dehi-  
 scente. Exterior cortex carnosus, modicè rugosus est, supremo Amygdalæ pu-  
 tamini substantia, & colore similis, qui faciliè à maturis fructibus recedens, in-  
 teriorem ostendit corticem, colore candidum, superficie glabrum, substantia  
 durum, lentum, fractu contumacem, & veluti osseum, qui intus barbata, ru-  
 fæque Auellanæ nucleo, similem, & æqualem nucleum continet, substantia te-  
 nerum, pinguem, colore in flauo virescentem, rubente cuticula velatum, gu-  
 stu dulcem, valde suauem, tenuem, oris que halitum commendantem. Eligito  
 maximas nuces, ponderosissimas, candidissimas, sponte sua modicè dehiscen-  
 te commissura plenum, recentem, neque raucidum, neque rugosum, neque  
 situ oblitum nucleum ostendentes. Quæ autem ab his notis, vel ab aliquibus  
 earum recedunt & discrepant, inutiles sunt, neque medicamentis intra cor-  
 pus sumendis miscendæ: sed Liuires ex ictu suggillatæ curantibus cōfectio-  
 nibus



PISTACIORVM

Arbor.



nibus relinquenda. Ex his tam perspicuis notis colligit Matthiolus, Indicam Terebinthum Theophrasti proculdubio esse Pistaciourum arborem. Sic enim eam descripsit ille. Ferunt & in India Terebinthum esse, arborem alteri similem Terebintho, cui folia & rami, & reliqua omnia Terebintho similia, fructus autem diuersus, similis enim Amygdalis. Nam & in Baetris Terebinthum hanc esse, ferrèque nuces Amygdalarum magnitudine, non enim magnas, sed aspectu similes, & suauitate Amygdalis præstantiores, ideòque loci illius homines his potiùs vesci. His accedit Athenæi testimonium. Possidonius Stoicus tertio historiarum libro sic scripsit. Fert & Persion Arabia, atque Syria, & quod Bistacium vocatur, cui fructus racematim congestus albo cortice, longus, nucibus similis, τοῖς ἀμυγδαλοῖς non ἁλκυροῖς, quæ Vuarum modo aliæ aliis incumbunt. Interior pulpa viret, & minùs boni succi est, quàm Strobili, sed odoratior. Fratres qui Georgica conscripserunt, libro tertio sic habent, & Fraxinum, & Terebinthum: Syri

In li. i. Dioscor. ca. 140.

Libr. 14.

nunc Pistacia vocant. Hæc ex Athenæo. Syria, inquit Plinius peculiares habet arbores. In Nucum genere Pistacia nota. L. Vitellius qui censor fuit, & hæc in Italiam primus intulit ex Syria, cum legatus in ea prouincia fuisset, nouissimis Tiberij Cæsaris temporibus. Mox & in Hispaniam qui cum eo militauerat Flaccus Pompeius Eques Romanus. Venetiis hæc, inquit Hermolaus, Iudaico vico satum feminis enata vidi. Nunc etiam Caietæ, Neapoli, & in aliis Italiæ viridariis visuntur. Iam in Parisiensi agro in ædibus sacris Diuæ Mariæ è semine nata vidit Ruellius. Adoleuit fructumque tulit & hæc arbor Lugduni. Ea quorum communis est in Officinis vsus, ex Syria adferuntur. Pistacia, quæ constat in Syria gigni autore Dioscoride Pineis nucibus similia sunt, & stomacho amica. Trita cum vino contra serpentium morsus profunt, siue edantur, siue bibantur. Pistacia prodesse aduersus serpentium morsus tradit Plinius, & potu & cibo, eòsdemque vsus & effectus habere, quos Pinei nuclei, prætereaque ad serpentium ictus, siue edantur, siue bibantur. Galenus in magna Alexandrina nasci tradidit, sed multo vberius in Berrhœa, vrbe Syriæ, parum quidem nutritia, verum ad hepar roborandum, & succos in ipsius viis infarctos purgandos, utilia: qualitatem enim habent aromaticam, subamaram, & subadstringentem. Porro an stomacho noxia sint, an utilia, an aluum molliant, an adstringant, non ausim affirmare. Et alio in loco. Pistacrum in Syria copiose prouenire idem rursum scribit, fructumque eius esse quodammodo tenuioris essentia, & subamarum quidpiam ac odoratum habere: obstructions itaque liberare, sed maxime iecoris, verumtamen etiam thoracis pulmonisque. Auicennæ Pistacium calidum est in fine ordinis secundi, & humidum. Qui frigidum esse putant, vehementer errant. Aperit obstructions hepatis qualitate amara & aromatica, inest & in eo vis adstringens: parum admodum nutrit, stomacho vtile est, id propriè quod in Syria prouenit, Pineo nucleo simile, ob amaritudinem cum

Lib. 13. ca. 5.

Cor. c. 179. libr. 1.

Locus.

Lib. 1. c. 116.

Li. 1. c. 140.

Vires &

Temper.

Lib. 13. ca. 5.

Lib. 23. c. 8.

Li. 2. Alim.

Libr. 8. sim.

Li. 2. c. 276.

H



quadam adstringendi facultate. Scribit quidam sese non comperisse, stomacho ne multum noceat, an profit. Ego verò eo corroborari os ventriculi, prohiberi que nauseam ac vomitionem cenfeo. Neque lenit ventrem, neque adstringit. Decoctum eius cum vino optimo moribus venenatorum vermium confert. In quibus Auicenna cum nominatim Galenum vellet reprehendere scribit quidam, inquit, & cætera: neque id sine ratione: nam ori ventriculi robur addi à subamara, sub adstringentēque facultate, quæ in pistaciis deprehenditur, nullus est qui negare possit. Qua ratione freti medicorum nonnulli non modo ad iocinoris infarctus Galenum secuti, sed ad iecur ipsum ventriculumque roborandum, ea tam cibis quàm medicamentis commiscunt. Quin & ad excitandam venerem, & ad restituendum bonum corporis habitum maciæ, & marcore affectis commendant.

## PALMA, CAP. XXVIII.

Nomina



Rbor quæ φοῖνῖς Græcis, Latinis Palma dicitur, Arabibus Machla, aut Nachal, Gallis Palme & Palmier, & Daëtier, Italis Palma, Germanis Dattelbaum, Hispanis Palmeira, Anglis Daets tre, Belg. Dayboom: Boëmis Dakyle: fructus δάκτυλοι, & φοῖνικες Græcis, Latinis Palmula, & Dactyli, Arabibus Tamar, Italis Dattoli, Gallis Daëtes, Hispanis Tamaras,

Forma.

& Dattiles. Palma arbor aspectu pulchra, & procera, recto ac terete quidem trunco, verum densis gradatūque corticum pollicibus salebroso potius, quàm scabro, quibus, vt gradibus facilem se ad scandendum Orientis populis præbet. Ramos cacumine tantum in orbem spargit, suo vertice terram spectantes, foliis longissimis, duplicibus, gladij figura, siue arundinaceis quæ, vt ait Plinius, vt primum novellas ostendere gemmas, tunc ad funes, vitiliūque nexus, & capitum leuia vmbacula finduntur. Sic enim legendum. Nascitur inter primos fere ramos ex ipso caudice corticosus locus, duarum spithamarum longitudine, latiusculus, gladij videlicet latioris specie, quod palmam totius stirpis nomine, & Elaten, & Spathen appellari Dioscorides tradidit, inuolucrum floris & fructus Palmarum. Non enim solum fructus tegumentum, Elate nominatur à Græcis, sed etiam fructus qui sub ipsa continetur, inquit Dioscorides, ab aliquibus autem Borassus. Quare Galenus cum scripsit, ὃ ὁ καλῶσιν ἐλάτην, τὸ ἀπαλὸν ἐκβλάστημα τῶ φοίνικος, τὴν αὐτὴν τῶ καὶ αὐτὴν ἐγκεφαλῶ διώματι ἔχει. τὸ δ' οἶον ἀμφίσημα αὐτῆς, συμπικνὴν μὲν ἔχει, & cætera, Elaten fructus Palmæ germen vocat, ipsum verò tegumentum quod Dioscorides περιγλυμμα dixit, ἀμφίσημα, nominat, ita enim legendum, non vt

## PALMA

Arbor.



Lib. t. c. 126.

Ibidem.

Lib. 8. sim.

exemplaria nostra habent ἀφ' ἑσῆμα. Ex Elate floris ac fructus inuolucro dehiscente, atque in longum sese pendente, flores prodeunt numerosi, tenuibus villis



PALMA

Elate.



villis appensi, instar racemi magni coaceruati, facie Crocinis similes, sed multo minores, & candidi. Ex his enascuntur Dactyli, fructus teretes, & oblongi, nucleo intus durissimo, oblongo, & canaliculato. In trūci superna parte cerebrum includitur, ἐγκέφαλον Theophrast. Galenus, atque alij Græci vocāt, quod Dioscorides ἐγκάρδιον τῶ περιμνῃ, idest medullam trunci appellat improprie, cum ἐγκάρδιον Theophrastus vbique pro medulla vsurpet, quam & καρδίαν, & μήτρην, & μέelon, appellari tradit, & quod medium est in ligno, tertium à cortice, exponit. At cerebrum Galenus etiam verticem & summitatem Palmæ dixit, καθάπερ ἐνιοί, inquit, ἐοικῶσι τὴν κορυφὴν τῶ φοίνικος, ἣν ὀνομάζουσιν ἐγκέφαλον αἰῶλοι. Plinius idem & medullam & cerebrum vocauit. Dulcis medullæ earum, inquit, in cacumine, quod cerebrum appellant, exemptæque ea viuunt, quod non aliæ. Palmarum multa sunt genera Theophrasto. Aliæ enim fructiferæ, aliæ steriles: & fructiferarum aliæ mares, aliæ fœminæ. Sed hoc inter eas interest, quod mas pri-

Lib. 1. Hist.  
cap. 4.

Li. 2. Alim.

Li. 13. ca. 4.

Lib. 2. Hist.  
cap. 8.

Genera.

um florem in spatha profert, fœmina fructum ilico longum. Fructuum differentia multæ. Alij enim nucleo carent, alij nucleum habent: quidam durum, nonnulli mollem (sic enim Gaza legit. οἱ μὲν ἄπτερινοι, οἱ δὲ πτερίνα ἔχοντες, καὶ τινὲς σκληροπτερίνοι, οἱ δὲ μαλακοπτερίνοι. Plinius vero, οἱ μὲν ἄβραχυπτερινοί, οἱ δὲ μακροπτερινοί, & cætera: sic enim conuertisse videtur. Fructiferarum aliis breuius lignum in pomo, aliis longius, his mollius, illis durius) Præterea colore à sese fructus differunt. Alijenim candidi sunt, alij nigri, alij flauī. Denique non pauciores quàm in ficis traduntur esse colores, neque plura genera. Discrepant etiam magnitudine, figuræque. Quidam enim rotundi sunt, veluti. Mala, & magnitudine tanti, vt quatuor in spica vna sint, alij parui Cicerum magnitudine. Succis quoque à sese distant, sed optimum tam inter nigros, quàm inter candidos genus esse aiunt, quod Regium vocant, tum magnitudine, tum viribus, rarum autem id esse, fere enim in solo horto Bati (βάτης habent nostra exemplaria, Gaza βάτων, legit, Plinius βαγών, alij βήλας) apud Babylonem reperiri. In Cypro peculiare est Palmarum genus, cuius fructus non maturefcit, crudus tamen valde suauis, dulcisque est, peculiarémque dulcedinem sortitur. Palmæ quædam non fructu tantum, sed & arbore ipsa à sese distant, nimirum proceritate, reliquæque forma. Sunt enim quædam nec magnæ, nec longæ, sed breues, etiam fœcundiores aliis, & in trimatu statim feraces. Cuiusmodi multæ sunt in Cypro. In Syria & Ægypto Palmæ proueniunt, hominis altitudine quæ quadrimæ, & quinquennes fructum edunt. Cuidam in Cypro generi folium latius est, & fructus multò maior, peculiarisque formæ, magnitudine Mali Punici figura oblongus, succo minus grato quàm in cæteris sed Punico simili: ὁ μάλιστα τοῖς ποδῶς, non ῥιζῶς, itaque non deuoratur, sed commanducatus expuitur. Lib. 13. c. 4.

Li. 13. ca. 4.

Li. 13. ca. 4.

H 2



Babylone natæ, vno tantum in horto *Bagou*. Ita enim vocant Spadones: qui apud eos etiam regnauere. Hortus ille nunquam nisi dominantis in aula fuit. At in meridiano orbe præcipuam obtinent nobilitatem Syagri, proximamque *Margarides*. Ex breues, candidæ, rotundæ, acinis quàm balanis similiores. Quare & nomen à margaritis accepere. Vna earum arbor in Chora esse traditur, vna & Syagrorum. Mirumque de ea accepimus, inquit Plinius, eam cum Phœnice aue, quæ putatur ex huiusce Palmæ argumento nomen accepisse, emori, ac renasci ex seipsa: eratque cum hæc proderem, fertilis. Ipsum pomum grande, durum, horridum, & à cæteris generibus distans sapore ferino, quem ferme in apris nouimus, quæ euidentissima causa est nominis. Quarta auctoritas Sandalidum, à similitudine appellatarum. Iam in Æthiopiæ fine quinque earum, nec plures arbores tradunt, non raritate magis, quàm suauitate mirabiles. Ab his Caryotæ maximè celebrantur, & in cibo quidem, sed & succo vberimæ, ex quibus præcipua vina Orienti, iniqua capiti, vnde pomo nomen. Sed vt copia ibi atque fertilitas, ita nobilitas in Iudæa, nec in tota, sed in Hiericunthe maximè. Quamquam laudatæ, & ex Archelaide, & Phaselide, atque Liuiade, gentis eiusdem conuallibus. Dos his præcipua succo pingui lactentibus, quodamque vini sapore, vt in melle prædulci. Sicciores in hoc genere Nicolai, sed amplitudinis præcipuæ: quaterni cubitorum longitudinem efficiunt. (Quidam legunt quaternum cubitorum lōgitudinem efficiunt, ad miraculum vsque Nicolaos euehentes) Minus speciosæ, sed sapore Caryotarum Sorores, ob hoc Adelphides dictæ, proximam suauitatem habent, non tamen eandem. Tertium ex his genus Pateton, nimio liquore abundat: rumpitque se pomi ipsius, etiam in sua matre ebrietas, calcato simile (nempe ruptum & velut obtritum calcatu.) Suum genus è sicciore turba Dactylis, prælonga gracilitate, curuatis interim. In totum arentes Thebaides, atque Arabicæ, macróque corpore exiles, & assiduo vapore torrente, crustam verius quàm cutem obducunt. In ipsa quidem Æthiopia friatur (tanta est siccitas) & farinæ modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice ramis cubitalibus, folio latiore, pomo rotundo, sed maiore quàm Mali, amplitudine, Cycas vocant. (Coicas Theophrastus, cap. 16. lib. 1. historia: hodie Coccus, qui in Æthiopiam nauigant: officinæ, Nucem Indicam, de qua post hac seorsim tractabimus.) Triennio maturescunt. Sempërque frutici pomum est, subnascente alio. Thebaidis fructus ex templo in cados conditur, cum sui ardoris anima: ni ita fiat, celeriter expirat, marcescitque non retostus furnis. Ex reliquo genere Plebeia videntur. Syri & Iuba tragemata appellant. Nam in aliqua parte Phœnices, Ciliciæque, populari etiam nomine à nobis appellantur Balani. Earum quoque plura genera. Differunt figura proceritate, ac fructus, rotunditate, Differunt & colore, nigriores ac rubentes. Nec pauciores ficu traduntur colores. Maxime tamen placent candidi. Distant & magnitudine, pro vt multi cubitum effecere. Quidam sunt non ampliores Faba. Quas Plinius in Caryotarum genere Nicolaos vocat insigni amplitudinis, ab Augusto ita primum nominatas fuisse, in honorem Nicolai, Peripaterici Philosophi, crebro eas ad illum misitantis auctor est Athenæus. Plutarchus Augustum tradit Nicolaum Peripateticæ familiæ Philosophū amore singulari profecutū fuisse, claris moribus, & egregia indole præditū quidē, sed strigosa corporis proceritate, rubicundo vultu, à quo maximas, pulcherri-  
māsque Phœnico balanos siue Palmulas Nicolaos appellauit. Eorundem Paulus meminit, quo loco in epithema ex vinaceis *φαίνις νικολάου δάχα* conicere iubet. Visuntur Palmæ arbores in multis Italiae, & Galliae Narbonensis hortis, & viri

Cor. Emb.  
122. libr. 1.  
Dioscor.

Lib. 14.  
in questio.  
Conuual.

Lib. 7.  
Locus.



& viridariis, eximia magnitudine, ac speciosa proceritate, sed vel steriles, vel fructum non percoquentes. Non enim nisi in calida regione proueniunt, quæ vero fructum maturent, nusquam nisi in feruida. Ferunt in Hispaniæ maritimis fructum, vt ait Plinius, verum immitem: dulcem in Africa, sed statim euanescentem. Nascuntur & in Creta, Cyp̄o, Africa, Ægypto, Phœnice, Syria. Iudæa verò incl̄yta est Palmis. Venetias Palmarum fructus ex Syria, & Alexandria Ægypti aduehuntur, atque etiam ex Neapoli, illuc prius ex Numidia importati. Arbor hæc, vt scribit Theophrastus, solum arenosum amat, & falsum (*ἄλιυρόν*, vox deest in nostris exemplaribus) Quare vbi tale non sit agricolæ salem aspergunt. Quod autem tali loco delectentur, illud argumento est, quod vbiunque Palmarum copia sit, arenosa est terra. Huiusmodi enim in Babylone esse dicitur, in qua Palmæ proueniunt, in Libya, Ægypto, Phœnice, & Syria Caua, quæque regionis suæ parte Indi plurimas habent, in arenosis tantum locis nascuntur quæ conseruari possunt, in aliis seruari non possunt, sed putrescunt (Nam sic emendanda Græca exemplaria, *ἡ φοινίκη, ἡ τῇ συρίᾳ τῇ κοίλῃ, ἡ καθ' τῶν ἰνδῶν πλεῖστας τυγχάνουσιν ἔχοντες, ἐν μόνοις τόποις ἀμμιώδεσιν εἶναι, τὸς διωσμένους θησαυρίζουσι. τὸς δ' ἐν τοῖς ἄλλοις δ' διαμένειν, ἀλλὰ σήπεοι*: quorum nonnulla Gaza omisit, qui sic conuertit, Syriæ quoque Cauæ cognominatæ, tribus tantum in locis arenaceis eas gigni, quæ condi referuarique possunt: reliquas autem quæ cæteris in locis proueniunt, minimè durare, sed protinus putrescere) virides autem suaves esse, atque ita consumi. Amant etiam maximè rigationem. Palma perpetuò viret, florétque vèrè, autumno vnà cum Ficibus fructus maturefcit. Decerpitur maturus, & immaturus, Dioscoride auctore. Medio, inquit, maturitatis vigore autumno decerpi solet, Arabicæ Myrobalani similis, Pomatiscognomine, colore viridi, & odore Mali cotonei, quod si ad maturitatem peruenire sinatur, Phœnicobalanus fiet. Sed quod Palmæ fructum medio maturitatis vigore decerpi Ruellius in sua versione dixit, in Græcis ita habetur. *Τρυγᾶται ὅ μέρους τῆς κατὰ τὴν ὁ πῶραν ἀμμῆς* sic enim legendum, & id vidit Lacuna, cum scriberet, iudicent eruditi, an sic potius sint vertenda, Decerpitur autem in medio vigore autumn̄i. Cornarius sic interpretatus est. Decerpitur ex Palma fructus in medio vigore, sub, caniculæ. Est enim *ὁ πῶρα*, inquit, exortus Canis principium, secunda videlicet pars æstatis, vt Galenus in Apho. Hippocratis scripsit, quo tempore immaturus adhuc ille Palmæ fructus decerpitur. De hoc immaturo & maturo Palmæ fructus, eadem quæ Dioscorides, Plinius tradit his verbis. Myrobalano in vnguentis similem proximùmque vsum habet Palmæ in Ægypto, quæ vocatur Adip̄os, viridis, odore Mali Cotonei, nullo intus ligno. Nam quod idem alibi scripsit, in huius arboris fructu prima nascitur Pom̄i caro, postea lignum intus, hoc est semen eius: Argumentum quod parua sine hoc reperiuntur in eodem palmite.) Colligitur autem paulo antequam incipiat maturefcere. Quod relinquitur Phœnicobalanus vocatur, & nigrescit, vefcentésque inebriat. Dixit autem præcedenti capite Troglodytis, & Thebaidi, & Arabiæ, quæ Iudæam Ab Ægypto disternat, communis est, nascens vnguento, vt ipso nomine apparet. Quo item indicatur, & glandem esse arboris, Heliotropio, quam dicemus inter herbas, simili folio, fructus magnitudine Auellanæ nucis. Hæc cum de Myrobalano quæ Dioscoridi est *βάλανος μυροβαλάνη*, idest glans vnguentaria, & *μυροβάλανον ἀραβικὴν*, Myrobalanum Arabicam, dici inter omnes constet, ipsam tamen Plinium vix nouisse ex eo perspicuum esse potest, quod Myrobalano in vnguentis similem proximùmque vsum habere Palmam quæ in Ægypto vocatur Adip̄os, & cætera, scripserit. Non

Li. 13. ca. 4.

Li. 2. Hist. cap. 8.

Tempus.

Lib. 1. c. 125.

Embl. 122. Li. 1. Diosc.

Li. 3. aph. 14

Li. 12. ca. 22.

Li. 4. ca. 154.



enim ille Palmæ fructus Myrobalano similem in vnguentis vsum habet, sed similis est, ut Dioscorides ait, Arabica Myrobalano, figura videlicet, & magnitudine, quæ nucem Pōnticam refert, velut etiam Plinius testatur, & Dioscorides libro quarto asserit, ubi Balanum Myrepficam vocat, quam hoc loco Arabicam Myrobalanum. Gulielmus tamen Rōndeletius olim præceptor meus, in examinandis his rebus perspicacissimus Arabicam Myrobalanum cum quæ immaturum Palmæ fructum Dioscorides comparat, vnguentariam esse non arbitrabatur, sed flauam catharticam, citrinam officinarum, in iis Ægypti locis frequentem, in quibus gignuntur Phœnicobalani. Qui Plinium à calumnia defendere conantur aiunt, cum scripsit Ægyptiæ Palmæ similem Myrobalano & proximum vsum esse in vnguentis, de Elate Palmarum hoc intellexisse, quæ in spissamenta vtuntur vnguentarij. Nisi codex mendosus esset, in quo pro Phœnicobalano Myrobalanum legimus, vehementer errasse Plinius videretur, libro vigesimotertio cap. quinto, ac fructus illos confudisse, quo loco scribit, Palma, quæ fert Myrobalanum, probatissima in Ægypto: Ossa non habet reliquarum modo in balanjs (colliguntur enim immaturæ priusquam nucleus intus gignatur.) Aluum & menses sistit in vino austero, & vulnera conglutinat. Non enim Palma fert Myrobalanum, sed alia arbor quam Dioscorides Myricæ similem dixit, Theophrastus Myrto, Plinius folio simili. Heliotropio, & medicas vires hoc loco Myrobalano à Plinio attributas, Dioscorides palam immaturo Palmæ fructui adscribit, ut dicemus. Palmæ fructus immaturus, à Dioscoride vocatur *πάλμα*, quæ vox potionem significat, Plinio Adipfos dicitur, quod sitim eximat. Quum autem sint qui peculiare quoddam Palmæ genus Adipson vocatum, à Plinio Myrobalanum officinarum esse volunt, hi perspicue refelluntur à Dioscoride, qui eidem Palmæ & Poma immaturum, & Phœnicobalanum maturum fructum tribuit: & ab ipso etiam Plinio, qui quæ Dioscorides de Pomate immaturo, eadem aperte de Adipso transcripsit, idque quod Adipso maturum succedit Phœnicobalanum vocari scripsit. Quare in his Plinij verbis, Palma in Ægypto quæ vocatur Adipfos, & cetera. Palma pro fructu, non pro arbore vsurpatur. Palmæ Ægyptiæ viridem ac immaturum fructum Plinius nullo intus ligno esse dicit, quod tamen de eodem scribens Dioscorides omisit. At Aristoteles etiam in libris de plantis, citante Athenæo *πολίνας ἀνόρχους* habet, quos quidem *ἐνδόχους* vocant, alij *ἀπυρρήνους*. Meminit & *ἀπυρρήνων* Theophrastus, ut diximus, atque etiā Aëtius, *θηβαιανὴν ὃν πολίνα*, inquit, *καρυώτας, ὃ μὴ ἔχων ὄστέον, εἴτε φύσιν τοῖς τοῖς ἐστὶν, εἴτε ἐκτεχνήσῃ τινὶ γερονός*. Quibus verbis indicat non omnes id genus Palmas natura posse carere, sed arte sic parari. *Καρυώτιον* autem dixit, Caryotam Varro-  
**Vires &**  
**Temper.**  
 lib. 1. ca. 125.  
 ni, itémque Plinio appellatam. Nondum maturus Palmæ fructus auctore Dioscoride, acerbus est, & adstringens: contra alui scæminarumque profluuiâ in vino austero bibitur: hæmorrhoidas sistit: vulnera glutinat illitu. Phœnicobalani recentes plus siccis adstringunt: capitis dolorem afferunt: copiosiores in cibo inebriant. Sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis & dysentericis vtilis in cibo: illinuntur cum cotoneo, & cerato cœnanthino vesicæ vitii. Caryota præsertim esu, faucium asperitati medentur: Thebaicarum decoctum potu æstuationem sedat (sic Ruellius, sed cum Græcè legatur *πάλμα καύσωνα*, rectius interpretari videtur Lacuna, Sedat febrem cansonem, & Cornarius sedat febrem ardentem) vires recreat cum hydromelite veteri sumptum: cibo idem faciunt, sit ex eis vinum ad eadem conueniens: Decoctum per se potu, & gargarizatione magnopere adstringit, & cohibet, Nuclei Palmarum  
 cætero



caterorum more cremati in crudo fictili, & vino restincti, cinere loto spodij vicem efficiunt, miscenturque in Calliblephara. Vim adstringendi habent, spiracula cutis obductu suo claudunt: contra oculorum vnam, & pustulas, palpebrarumque defluuia, cum nardo effectum præbent: corporis excrescentias cum vino reprimunt: vlcera ad cicatricem perducunt. A vitibus oleisque proxima nobilitas palmis, inquit Plinius, inebriant recentes: capitis dolorem afferunt, minus sicca, nec, quantum videtur, utiles stomacho: tussim exasperant: corpus augment. Succum decoctarum antiqui pro hydromelite dabant ægris ad vires recreandas, sitim sedandam, in quem usum præferebant Thebaicas. Sanguinem quoque excreantibus utiles, in cibo maximè. Illinuntur Caryotæ stomacho, vesicæ, ventri, intestinis. Cum cotoneis, cera, & croco suggillata emendant. Nuclei Palmarum cremati in fictili nouo, cinere loto, spodij vicem efficiunt, miscenturque collyriis, & Calliblephara faciunt addito Nardo. Idem mox de Palma Ægyptia. Aluū & menses (Dioscorides *ῥευμῆμα* habet, id est profluuium muliebri) sistit in vino austero, & vulnera conglutinat. Elate siue Spathæ, inquit Dioscorides, in spissa menta vnguentarij vtuntur. Vis ei adstrictoria, sistit vlcera quæ depascunt: laxatos artus committit: tota miscetur cataplasmatibus, & malagmatis: prodest præcordiis, imbecilli stomacho, & iocinori affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. Eius decoctum denigrat capillos, si assiduè affricetur: datur bibendum congruè renum, vesicæ, & viscerum vitiis: vuluæ ac ventris fluxiones sistit: scabiem cum Resina & Cera sanat, si viginti diebus recens apponatur. Inuolutus in Elate fructus Elate etiam appellatus, ab aliquibus Borassus, adstringit, & Spathæ effectus præbet, non sic vnguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta, eadem facit quæ Borassus. Hæc in re Plinius valde hallucinatus est. Cum enim Elaten, siue Spathen etiam Palmam totius arboris nomine appellatam legisset, ea re fortasse deceptus, peculiarem arborem Palmam Elaten, siue Spathen constituit, ipsamque medicinæ conferre germina, folia, corticem scripsit: quum tamen omnem medicinam ab ipso traditam vnica pars quæ fructus Palmarum inuolucrum est, præstet, vt ex Dioscoride diximus. Quidam tamen Plinij causam tuerentur, rectèque ab eo dictum volunt, Palmæ Elaten, siue Spathen, sic enim legunt, conferre medicinæ germina, nempe furculos quibus inhaerent flores, & fructus: Folia, nimirum florum quos obtegunt, & corticem suum, extimum, qui floris ac fructus inuolucrum est. Plinij hæc verba sunt. Palma, siue Elate, siue Spathæ medicinæ confert germina, folia, corticem. Folia imponuntur præcordiis, stomacho, iocinori, vlceribus quæ serpunt, cicatrici repugnantia: Psoras cortex eius tener cum Resina & Cera sanat diebus viginti. Decoquitur & ad testium vitia. Capillum denigrat suffitu, partus extrahit. Datur bibendus renum vitiis & vesicæ, & præcordiorum, & capiti, & neruis inimicus. Vuluæ ac ventris fluxionem sistit decoctum eius. Item cinis ad tormina potus in vino albo, in vuluarum vitiis, vel, vt aliqui legunt, in Vuarum vitiis, efficacissimus. Vuas enim iacentes, & laxiores insigni vi siccandi quam habet, reprimunt, & adstringunt. Idem antea de ipsa arbore longè grauiore errore dixit, Elaten cum Abiete, quæ etiam Elate Græcis dicitur, confundens. Est præterea arbor ad eadem vnguenta pertinet, quam alij Elaten vocant, quod nos Abietem, alij Palmam Spathen: sic enim legendum. Non parua est Galeno in Palmis differentia. Quædam enim sunt sicca, & adstringentes, vt Ægyptiæ, aliæ molles, humidae & dulces, vt quæ Caryotæ appellantur. Præstantissimæ autem hæc in Syria & Palestina nascuntur, in Hierichunte. Reliquæ omnes Palmulæ inter hæc duo

Lib. 24. c. 4.

Cap. 5.

Lib. 1. c. 14.

Cornar.  
Embl. 123.  
li. 1. Diosc.

Lib. 23. c. 5.

Cap. vlt. 12.

li. 1. Alim.



genera sunt mediæ. Difficiles autem sunt concoctu, capitique dolorem inferunt: verum ex his aliæ magis, aliæ minus sunt humidæ ac dulces, siccæ atque adstringentes. Verum constitutis extremis iam omne quod in medio est, facillimè cognosces. Nulla certe ex ipsis est, quæ non dulcedinem quandam & adstrictionem habeat. Siquidem Caryotæ exiguæ adstrictionis, Thebaicæ obscuræ dulcedinis sunt participes. At succum quidem dulcem nutrire, austerum autem gratum esse stomacho, & ventrem sistere ostensum est. Palmulæ si largius sumantur, omnes concoctu sunt difficiles, & capiti dolorem afferunt: quædam autem & morsus cuiusdam sensum ori ventriculi inducunt. Succus autem qui ab ipsis in corpus distribuitur, crassus quidem omnino est, habet autem & lentoris copiam, cum Palmulæ ipsa pinguis fuerit, sicut Caryotæ. Quum autem dulcedo tali succo mista fuerit, celerrimè quidem hepar ab ipsa obstruitur. Læditur autem maximè ab ipsarum esu, quod aut inflammetur, aut scirrhus obsideatur: post hepar autem & lien obstruitur, ac læditur. Multò autem maximè Palmulæ virides, si paulo largius sumantur, ad omnia sunt noxiæ, ac dulces quidem succum habent calidiorem, adstringentes frigidiorum. Quin & Palmulæ virides sicut Ficus statim gignunt. In regionibus autem non admodum calidis Palmulæ haud perfectè maturescunt, adeo ut reponi queant: quo fit ut cum homines cogantur ipsis viridibus vesci, crudis succis impleantur, & rigoribus qui ægrè calefiant, & hepatis obstructionibus prehendantur. Declarat hoc Historia cuiusdam Galeni Coætanei, qui Alexandriæ Palmulis immaturis per complures dies ante & post balneum satiatus, absque febre sæpius horruit, ac riguit. Phoenix arbor, eodem auctore, adstrictoriæ facultatibus omnibus suis partibus est particeps. Igitur ramorum succus austerus est, ex aquea substantia tepida, & terrea frigida constans. Similis facultatis est Encephalos, hoc est cerebrum esui aptum. (Serapio Bdelij secundum genus id esse tradit.) At fructus eius & maximè dulcis non paucam habet caliditatem. Cæterum cum edendo sit, multo est vsui, non tantum foris impositus, ubi quid roborare & desiccare, contrahere, stipare densareque consilium est, sed etiam tanquam cibus sumptus & simul cum aliis, & per se. Porro quod Elaten vocant, tenerum illud Palmæ germen, eandem cum cerebro eius facultatem obtinet. Quod verò velut integumentum eius est, adstringentem etiam qualitatem habet. Verum plus quam dicta omnia exsiccat, utpote quod essentia consistentia illis siccior est, & minimum habet humiditatis. Itaque iure utuntur illo ad vlcera putrescentia, miscetque medicamentis articulos plus iusto laxatos contrahentibus, Ad hæc medicamentis hepaticis & stomachicis, seu intro sumantur, seu foris admoueantur. Sed & radix plantæ desiccatoriæ citra morsum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam. Peruenerant iam ad eos vicos, inquit Xenophon, è quibus iussu ducum suorum commeatus capfandi erant. Plurimum illic & frumentum, & vinum è Palmulis erat, potu quidem suaue, sed graue capiti, acerrimumque ex elixis Palmulis paratum. Palmarum fructus quales in Græcia videre non licet, famulis apponebantur: Seligebantur, quas seruarent dominis, magnitudine & pulchritudine admirabiles, aspectu prorsus electro similes. Eas quidem arefactas in bellariorum vsum reponebant. Milites eo primum in loco Palmarum cerebrum esitarunt, omnibus cui detractum id fuisset, exarescentibus, admirantibus multis eius cibi speciem, ac suauitatem quandam peculiarem, quæ tamen valde caput tentat. Nicander in Georgico. Pullulantes in Palma stolonas excindunt, Cerebrumque afferunt expetitur cibum adolescenti

Li.8. simpl.

Athenæus  
lib.14.



fcentibus. Diphilus Siphnius tradit Palmæ cerebrum implere, alimentiq; mul-  
tum præbere, grauare, difficile in corpus distribui, siti excruiare, ventrem  
fistere. Alexandri milites, ait Plinius, Palmis viridibus strangulati sunt. In  
Gedrosis id factum est Pomi genere: alibi copia euenit. Est enim tanta mu-  
steis suauitas, vt finis mandendi non nisi periculo fiat. Palma victoriæ sym-  
bolum est, quod vt Aristoteles & Plutarchus explicant, non cedit oneri quam-  
libet ingenti, nec infra flectitur, pandaturue, sed contra pondus resurgit.  
Ideoque ferè in coronariis certaminibus aliud præmium quàm Palma non  
dabatur, vt refert Pausanias. In Oriente funes validos è Palmæ foliis fieri  
scripsit Plinius, eosque in humore vtiliores esse. Inter permulta Palmarum  
genera idem Plinius Chamaeropas recenset, eas Theophrastus *χαμαίριπες*  
vocat, copiosas in Creta, sed magis in Sicilia, folio latiore ac molli, ad vi-  
tilia vtilissimo, dulci medulla in cacumine, quod cerebrum vocant: exem-  
pta illa viuunt, quod non aliæ: cædua illarum sylua, germinat rursus, etiam  
si ab radice succisæ sint. Eius generis putat illam esse Dalechampius, quæ  
hic appicta est. Nascitur in maritimis, cubiti ferè altitudine, aliquando  
etiam grandior, in teneri germinis conceptu abdito, veluti cerebri globo,  
suauissimi gustus, multis tunicarum inuolucris operto, quæ partim sunt  
corticosa & coriacea, partim capillacea, quædam rufa, alia aliis superposita,  
& densius stipata. Ex horum medio contextu folia erumpunt cubitum lon-  
ga, angusta, dura & coriacea. Cerebrum id Tuberibus, & Carduis, Cinaræq;  
echinis, & aliis id genus delitiis saporis suauitate præfertur. Cerebrum id  
Græci vocant *ἐνέφαλον*, vt diximus, Serapio corrupta voce Cefilionem, Itali  
*Cefaglione*. Ex foliis colligatis scopæ fiunt, excutiendo pulueri qui mensis, &  
scamnis insidet. Texuntur & ex iis sportæ & canistra, Matthiolus etiam hoc

Athen. lib.  
14.  
Lib. 13. c. 4.

Li. 16. c. 24.

Lib. 12. c. 4.  
Cap. 8. 2.  
Hist.

Forma

PALMA CHA-  
meropas Plinij.

CHAMAERIPHES, SEV  
Palma humilis Matthioli.



Palma



Palma genus humile pumilumque depinxit, quod in Silicia copiosissimum  
prouenit, & in maritimis Senensibus, cubiti altitudinem parum excedens, fo-  
lio cæteris simili, sed minore, breuioréque: flores edit ex obliquo, è capillacea  
quadam coma emergentes, è quibus bacca racematim prodeunt. Pars  
radici propinquior in globosum extuberat germen, quod cere-  
brum vocant, innumeris ferè inuolucris circumseptum,  
tenerrimum, lapidum, & ori gratissimum. Estur id se-  
cundis mensis cum pipere & salis momento Ci-  
naræ modo, & maximè gustui arridet.

Fiunt ex hoc Palma genere

sportulæ, tegetes, &  
scopæ.





# HISTORIAE

## OMNIVM PLANTARVM

LIBER QVARTVS,

(643)

*Quo describuntur, atque picta ostenduntur segetes, & legumina,  
ac quæ cum iis in Agris nascuntur.*

TRITICVM, CAP. I.



PACA viridarij iam satis vmbra delectati, fructuumq; pulcherrimorum & suauissimorum aspectu gustuque satiati, & recreati, hinc in Agrum trāseamus, & in eo liberiùs diuagemur, nō minora in eo quàm quouis alio in loco naturæ rerum miracula contemplaturi. Agrum quod in eo aliquid agatur Varro dictum putat, vel, vt Donatus, inquit, quod in eo multa sint agenda. Contra Quintilianus ex Græco nomine ἀγρός deductum esse scribit. Agrum hīc intelligimus, qui hominū opera, atque

Lib. I. ca. 10.

industria ad permagnas in vita vtilitates colitur, quique plerūque compendium, vrait Columella, nunquam nisi si celi maior vis, aut prædonis incescit, detrimentum adfert. In eo igitur potissimū natura indicabitur frugum, quæ sunt Segetes & Legumina: de quorum vitiis quoque dicetur: sunt enim nimis multa, in quæ fruges degenerant. Sunt & quamplurimæ plantæ, quæ in agris sponte nascuntur, de quibus etiam hīc agetur: quibus nonnullas adiungimus, quæ etiam in incultis & cessantibus Agris proueniūt. Horum omnium, siue ad hominum cæterarūque animantium alimenta, & voluptates, siue ad salutem & morborum remedia procreata sint, natura diligenter hīc explicabitur. Ac primū de frumentaceis dicemus. Sunt autem frumentacea quæcunque geniculato culmo, & arundinaceis constant foliis, semēque panificio & panibus aptum in spicis, aut iubis producant. A Tritico ordiemur omnibus notissimo atque vtilissimo. Græcis τριπλός, Latinis Triticum dicitur, quod tritum ex spicis sit, auctore Varrone, Arabibus Henta, Hencia, Hantha, Italis Fourmento, & Grano, Germanis Vuesßen, Hispanis Trigo, Anglis Vuet, Belgis Teruue, Gallis Froument: voce ex frumento Latino deflexa. Sed frumentum apud Latinos Tritico, & frugis nomen frumento latiùs patet, quod his verbis docet Plinius. Sunt autem duo, prima earum (Frugum) genera, Frumēta, vt Triticum, Hordeum, & Legumina, vt Faba, Cicer. Est enim Fruges quicquid ex fructu terræ sato in alimontiam nostram vertimus. Frumentum à fruendo, id est vescendo dictum, quod culmus

Nomina

Lib. 18. c. 7.



Dere rust.  
cap. 48.  
Genera  
Lib. 8. Hist.  
cap. 4.

culmus extulit, inquit Varro, vel quicquid ex se aristas emittit, auctore Seruio, Græcè σῖτος. Theophrastus differentias multas à regionibus, viribus, sætus temporibus, ex eo quod largius, aut parcius fructificet, ex diuersarum partium varietate, & diuerso habitu, ex crescendi celeritate, & tarditate, atque ex aliis sumptis enumerat his verbis: Πολλὰ δὲ γένη καὶ τῶν πυρῶν διθύς ἐστιν, ἀπὸ τῶν χωρῶν ἔχοντα τὰς ἐπωνυμίας: οἷον λιβυκοί, πόντιοι, θράκες, αἰγύπτιοι, σικελοί. Διαφέροντες δὲ καὶ ταῖς χροιαῖς, καὶ τοῖς μεγέθεσι, καὶ τοῖς εἶδεσι, καὶ ταῖς ἰδιότησιν. ἔχουσι δὲ ἐν ταῖς διυνάμεσι, ταῖς τὲ ἀλλαις, καὶ μάλιστα ταῖς πρὸς τὴν σίτησιν, τινες καὶ ἀπ' ἄλλων τὰς προσήγορίας, οἷον καρχυδίας, φλεγύς, ἀλεξάνδρεος ὡν ἀπάντων ἐν τοῖς εἰρημίοις τὰς διαφορὰς ληπλέον. ἔχ' ἡμέτερον δὲ οὐκ εἶον, εἴ τις λαμβάνοι τὰς τοιαύτας οἷον εἰσιν οἱ μὲν πρῶτοι, οἱ δὲ ὀψιοί. Καὶ διαξεῖς, καὶ πολύχοι, οἱ δὲ καὶ ὀλιγόχοι ( qui locus, cum apertè mendosus sit & mutilus, ex ipso contextu, & Gazæ interpretatione sic planè restituendus est. Καὶ διαξεῖς καὶ πολύχοι. οἱ δὲ ἀναυξεῖς καὶ ὀλιγόχοι ) καὶ μεγαλοστάχυες, οἱ δὲ μικροστάχυες. Καὶ οἱ μὲν ἐν κάλυκι παλλήν χρόνον, οἱ δὲ ὀλίγον ἐχόμενοι, ὥσπερ ὀλιβυκοί. Καὶ κάλυμον οἱ μὲν λεπτόν, οἱ δὲ παχύ. Καὶ λεπτόν δὲ λιβυκὸς ἔχει, παχύ δὲ ὁ καρχυδίας. ἔτι δὲ, χιτώνας οἱ μὲν ὀλίγους ἔχουσιν, οἱ δὲ πολλὰς, ὥσπερ ὁ θράκιος. Καὶ ὁ μὲν μονοκάλαμος, ὁ δὲ πολυκάλαμος, καὶ μᾶλλον δὲ καὶ ἡπτόν, ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τι παρὰ πλῆθον τέτοις, ἢ τοῖς πρότερον εἰρημίοις, καὶ τὰς διυνάμεσι. αὐτὰς τοιαύταις φυσικώτερον διόξαεν ἂν εἶναι τῶν διαφορῶν. ἐν αἷς καὶ τὸ τῶν τεμνῶν, καὶ τῶν διμῶν, καὶ εἴ τι γένος ἐν ἐλάττωσιν ἡμέραις τελέσται, καθάπερ φασὶν εἶναι περὶ τὴν ὕβριον, οἱ τετράρακοντα ἡμέραις ἀπὸ τῆς σπορᾶς ἀδρυνόνται, καὶ τέλος ἔχουσι. εἶναι δὲ ἰσχυρὸν τέτον καὶ βαρὺ, ἔχ' ὥσπερ τὸν τεμνῶν καὶ φρον. Διὸ καὶ τοῖς οὐκ εἰσὶν ἀνέχοντες. Καὶ καὶ ἔδδ' αὐτὸν ἔχειν πολλὴν ἀναισθησίαν καὶ οὐκ ἔχειν τὰς τελεῖσιν ἔτος. εἰσὶ δὲ διμῶν τινες, οἵπερ καὶ ὅς σικελίας ἐνομιμάσθην εἰς ἀχαιῶν, ὀλιγόχοι δὲ, καὶ ὀλιγόχοι, καὶ κοῦφοι καὶ τὴν προσφορὰν, καὶ ἡδείς. Καὶ ἄλλοι δὲ τινες οἱ περὶ ἔυβοιαν εἰσι, καὶ μάλιστα ἐν τῇ καρυφῇ τεμνῶν δὲ πολλοί, καὶ παλαιοί. καὶ οἱ εἰσὶν ὀλιγόχοι, καὶ μονοκάλαμοι καὶ τὴν ἐκφυσιν, καὶ τὸ ὅλον ἀσθενεῖς. κοῦφοι δὲ καὶ οὐκ ἔχουσιν, ὡς ἀπλῶς ἐπεῖν, πρὸς τὸ πονηρὸν. Βαρύτερος δὲ τῶν εἰς τὴν ἑλλάδα παρὰ γνομῶν, ὁ σικελός. τέλει δὲ εἴ τι βαρύτερος ὁ βαρὺς. σημειῖον δὲ λέγουσιν, ὅτι οἱ μὲν ἀθληταὶ ἐν τῇ βοιωτίᾳ τεμνῶν καὶ μάλιστα ἀναλίσκουσιν: ἀθλητὰς δὲ ὅταν ἔλθωσι, πρὸς τὴν τεμνῶν καὶ φιδίως. κοῦφος δὲ καὶ ἐν τῇ λακωνικῇ. τέλει δὲ καὶ οὐκ ἔχουσιν ταῖς χώραις, καὶ τῶν ἀέρι τὸ αἶσιον. ἐπεὶ δὲ περὶ τὴν ἀσίαν πρὸς τὴν βάρβαρον, ἐν μὲν τινὶ τῶν ὅπου εἰσὶν ἀδρὸν εἶναι φασὶν τὸν σῖτον, ὥστε πυρρὸς ἐλαίας μέγεθος λαμβάνειν, ἐν δὲ τοῖς πρὸς τὴν ἀσίαν, καλὸν καὶ εἰς ἰσχυρὸν, ὥστε εἰς τὴν περὶ τὸν ποταμὸν ὀλιβυκοῖς. Id est, Triticum quoque genera sunt multa quæ à regionibus cognominantur, ut Libycum, Ponticum, Thracium, Assyrium, Ægyptium, Siculum, quæ & colore, & magnitudine, & specie, & proprietate à sese differunt. Quibusdam etiam ex viribus tum aliis, tum iis maxime quæ ad cibum pertinent, quibusdam, & ab aliis differentiis nomina sunt indita: ut Carchydia, Stelengydi, Alexandreo, quorum omnium differentiæ ex supradictis accipiendæ. Nec absurdum fuerit, si hinc differentiæ sumantur, ut aliud precox sit, aliud serum: & aliud quod multum augetur, largèque fructificat: aliud quod parum augetur, parèque fructificat: aliud spicam magnam, aliud paruam emittat: aliud in folliculo diu, aliud breui maneat, ut Libycum: aliud Calamo tenui, ut Libycum, aliud crasso constet, ut Carchydia. Præterea aliud tunicis paucis, aliud multis vestiatur, ut Thracium. Item aliud vnicalamum sit, aliud multi calamum, & hoc quod plures paucioresue calamos edat. Similiter si quid aliud his, aut illis quæ prius diximus simile sit. Etenim eæ magis esse naturæ consentaneæ videntur, quàm vllæ aliæ. In quibus est & trimestrium & bimestrium genus, & si quod aliud paucioribus diebus perficitur: quemadmodum genus quoddam esse aiunt in Eubœa, quod quadraginta diebus à sattu augefcit, & perficitur, esseq; id firmum ac graue, nec trimestris modo leue: quare seruis id præberi, & fursuris multum non habere. Id quidem rarissimum est, & celerrimè maturatur.

Sunt



Sunt quædam bimestria, quæ ex Sicilia in Achaiam aduecta sunt, quæ parum fructificant, parumque fecunda sunt, sed in cibo leuia & iucunda. Alia quædam sunt in Eubœa, & maximè in Carysto. Trimestria verò multa, & vbique. Leuia hæc, & parum fecunda, & vnicalama sunt in ipso exortu, atque in totum infirma. Leuissimum igitur, vt semel dicam, Triticum Ponticum. Grauiissimum eorum quæ in Græciam transuehuntur, Siculum. Sed eo grauius est Bœoticum. Indicum esse asserunt, quod Athletæ, qui in Bœotia ternos semisextarios vix consumunt, cum Athenis fuerint, facile quinos consumunt. Leue etiam est, quod in agro Laconico prouenit. Horum causa, & regionibus, & aëri adscribenda. Nam & in Asia trans Bactra quodam in loco, adeò grande frumentum esse aiunt, vt nuclei Oliuæ magnitudine granum sit. In Pissotis adeo firmum, vt si quis plurimum comederit, disrumpatur. Hæc Theophrastus: quorum multa transcripsit Plinius, rectèque dixit Tritici plura esse genera quæ fecere gentes: nullumque Italico comparandum esse candore, ac pondere, citata etiam & ad verbum translata Sophoclis Poëtæ sententia in fabula Triptolemo, Frumentum Italicum ante cuncta laudante.

*Et fortunatam Italiam Frumento canere candido.*

Montanis modo, inquit Plinius, comparetur Italiæ Agris externum, in quo principatum tenuit Bœotia, deinde Sicilia, mox Africa. Tertium pondus erat Thracio, Syrioque, deinde Ægyptio. Græcia & Ponticum laudauit. Plurimis tunicis Thracium Triticum vestitur, ob nimia frigora illi plagæ exquisitum. Quod verò dixit, Est & bimestre circa Thracium sinum, quod quadragesimo die quàm satum est maturescit: mirumque nulli frumento plus esse ponderis, & furfuribus carere. Vtitur eo & Sicilia, & Achaia, montosis vtrâque partibus. Eubœa quoque circa Carystum, Theophrastus aliter habet. Scribit enim, vt diximus, esse Tritici genus bimestri celerius maturescens, vt in Eubœa, quod intra quadraginta dies perficitur. Esse & Bimestria, quæ ex Sicilia in Achaiam transportantur. Esse & eiusmodi in Eubœa, maximè in Carysto. Præterea à Theophrasto dissidet, cum ait. Tradunt in Bactris grana tanta magnitudine fieri, vt singula spicas nostras æquent, cum scribat Theophrastus *περὶ τὴν ἀσίαν τὸν βακτρὴν Βάκτρων ὅτις εἶναι ἀδρὸν τὸν σίτρον, ὥς τε πυρρὸς ἐλαίας μέγεθος λαμβάνειν*. Id est, in Asia trans Bactra adeo grande gigni frumentum, vt nucleo Oliuæ par sit magnitudine. Dioscorides duo duntaxat Tritici genera proponit: alterum recens, perfectè maturum, & colore luteo: alterum *τεμνηδιόν*, id est Trimestre, quod ab aliquibus *σιλάνιον* appellari dixit: hac voce etiam Trimestre significante. *Τῆλες* enim significat *ἐν τῷδε τῷ ἔτει*, id est, hoc ipso anno, quod Dores *σῆλες* dicunt, unde *σιλάνιος* *παρὸς* est, vt exponit Galenus, *ὁ ἐκ τῆ ἐνετηχίος ἔλης, τῆς ἔτης, ὁ καὶ τὸ ἔαρ ἐκπαριδνός*, hoc est Triticum huius præsentis anni, nempe vèrè satum. Plinius à Græcis Trimenon vocari scripsit. Hoc igitur vt vèrè satum æstate colligitur, ita prius illud superiore anno in Autumno seminatum, sequentis æstate demetitur: quod quidam cæteris præfert Columella, cum ait. Si verò locorū & cæli conditio patietur, quāto maturius seuerimus, tanto cōmodius proueniet. Neque enim est vllum, sicut multi crediderunt, natura Trimestre semen: quippe idem iactum Autumno melius responderet. Hoc autem reprehendit Plinius his verbis. Est & Bimestre circa Thracium sinum, quod quadragesimo die quàm satum est maturescit, mirumque nulli frumento plus esse ponderis, & furfuribus carere. Vtitur eo & Sicilia, & Achaia, montosis vtrâque partibus. Eubœa quoque circa Carystum. In tantum fallitur Columella, qui ne Trimestris quidem proprium genus existimauerit esse, cum sit antiquissimum. Verum non satis id videtur Plinius expendisse, quod mox subiungit Columella. Sed sunt nihilominus



- quedam, inquit, aliis potiora, quæ sustinent veris tepores, ut Siligo, & Hordeum Galaticum, & Halicstrum, granumque Fabæ Mariscæ. Nam cætera robusta frumenta semper ante hyemem feri debent in regionibus temperatis, nec quod antea tertium Triticici genus Trimestre appellavit, & Siliginis genus esse dixit.
- Cap. 6. li. 1. Verba eius hæc sunt. Triticici genera complura cognouimus. Verum ex his maximè ferendum est, quod Robus dicitur, quoniam & pondere & nitore præstet. Secunda conditio est habenda Siliginis, cuius species in pane præcipua, pondere deficitur. Tertium erit Trimestre, cuius usus agricolis gratissimus. Nam ubi propter aquas, aliâque causam matura satio est ommissa, præsidium ab hoc petitur. Id genus est Siliginis. Triticum aliter ex Dalechampi sententia diuidemus, ut eius duo summa sint genera usu frequentiora. Vnum candidum, vulgo nostro *Blé blanc* nuncupatum, alterum rufum, veterum *αυρός*, quasi *αυρός*, vulgo *Blé rouge*, Columellæ Robus à flauo colore quem Rubeum prima syllaba producta & Robeum veteres appellauerunt, Græci *ξανθόν*, vnde Seruio Nitela, mus agrestis, robeus, & in illud Vergilij, *Sanguineis frontem moris*, &c. Robeus color Diis attributus, & in veteri inscriptione, Ut Prætor cui hæc regio sorti obuenit, litaturum se sciat, aliâque quis magistratus, Volcanalibus. x. Cal. Septemb. omnibus annis, vitulo robeo, & verre. Rursus Triticici candidi rufiq; duæ sunt nobis notæ species. Vna cuius spica aristas habet, altera cuius spica mutica est, id est aristis caret, auctore Varrone. Priorem nulla peculiari appellatione nostri designarunt: posteriorem *Blé motet* vocant, quasi Triticum muticum. Quod autem spica aristis vallata sit, vel iisdem careat, quidam frugis & naturæ proprietati, quidam agri conditioni macri, pinguis, tenuis, crassus, stercoreati, minimè latificati tribuunt. Triticum enim candidum aiunt in pingui, crasso, & stercoreato agro spicam muticam ferre, in macro, tenui, & non latificato aristis horridam. Adiciunt quidam celi statum quo seges adolescit: humidior enim spicam aristis carere, sicciore aristis muniri. Addunt alij & ventorum flatus, quoniam si vehementiores irruant, aristas decutiunt: si leniores spirauerint, aristas spicarum collisu non frangunt. Sunt & qui segetis densitatem raritatemq; non nihil ad id valere putant. Nam densiore segere, spicas muticas, rariore, cum aristis prodire. Ex candido Triticico panem lautiorum, quàm ex rufo pistores fieri asserunt, sed leniorem, & qui minùs alat: atque in hoc genere muticum aristato præferunt, etiamsi mutici granum gracilius sit, & minus: plus enim farinæ à mutico reddi, & furfuris parû: farinæ verò minus ab aristato, & furfuris plurimum. Præterea mutici farinam candidissimam esse, ac niueam, aristati nigriorem, ac fordidiorem. Candidum Triticum. Latinorum Siliginem frugem esse, veterum scriptorum testimoniis confirmari potest, qui Siliginem Triticici genus faciunt, & ut Triticum nostrum candidum, candore ac leuitate cæteris generibus præstare literis prodiderunt. Plinius frumenti genera esse tradit, non eadem ubique: neque ubi eadem sunt iisdem nominibus non appellari. Vulgarissima, Far quod Adoreum veteres appellauerunt, Siligo, Triticum. Siliginem propriè dixerim, inquit, Triticici delicias: candor est, & sine virtute, & sine pondere, conueniens humidis tractibus, quales Italiæ sunt, & Galliæ comatæ. E Siligine laudatissimus panis, pistinarumq; opera laudatissima: (quanquam hic Siligo tam pro candidissima Triticici farina, quàm pro Triticici genere accipi possit.) Siligo nunquam maturefcit pariter, & cætera. Columella Triticici genera complura cognouimus. Verum ex his maximè ferendum est quod Robus dicitur, quoniam & pondere & nitore præstat. Secunda conditio est habenda Siliginis, cuius species in pane præcipua, pondere deficitur, &c. Sed sunt nihilominus quædam aliis potiora, quæ sustinent veris tepores, ut Siligo, & Hordeum,



deum, & cætera. Cato è Siligine Amylum fieri docuit. Plinius Amylum ex omni Tritico, ac Siligine, sed optimum è Trimestri. Caterum Siligo non solum frugem Italicam, hoc est Triticum delicatissimum, & candidissimum, leuissimumque, sed etiam medullam grani, id est farinam puriorem à furfure secretam, ac castratam significat. Iustum est, inquit Plinius, è grano Campanæ quam vocant castratam, è modio redire sextarios quatuor Siliginis, & mox: è Pisana autem Siliginis sextarios quinque. Clusina Aretinæque etiânum sextarios Siliginis assument. Idem fortasse Celsus his verbis significat. Ex Tritico firmissima Siligo, deinde Simila, deinde cui nihil ademptum est, quod ἀντὶ πύρου Græci vocant: infirmior est ex polline, infirmissimus cibarius panis. Iuuenalis.

De re rust.  
cap. 73.  
Lib. 18. c. 7.

Lib. 18. c. 9.

Lib. 2. ca. 18.

Satyr. 5.

*Sed tener & niueus, mollique Siligine factus*

*Seruat domino.*

Præterea Siligo pro Tritici vitio à veteribus videtur vsurpari, vt à Columella, cum scribit. Nec nos tanquam optabilis agricolis fallat Siligo. Nam hoc Tritici vitium est, & quamuis candore præstet, pondere tamen vincitur. Et mox. Nec tamen ea longè nobis, aut magna difficultate requirenda est. Nam omne Triticum solo vliginoso post tertiam sationem conuertitur in Siliginem. Olyram Græcorum Siliginem Latinorum esse, Plinio auctore, scripserunt Hermolaus, Budæus, Ruellius. Sed id apud Plinium non reperio: scribit enim. Vulgarissima Far, quod Adoreum veteres appellauere, Siligo, Triticum. Hæc plurimis terris communia. Arinca Galliarum propria, copiosa, & Italis est. Aegypto autem ac Syria, Ciliciæq; & Asiæ, ac Græciæ peculiaris Zea, Olyra, Tiphe. Et paulo post. Ex Arinca dulcissimus panis, ipsa spissior quàm Far, & maiore spica, eadem & ponderosior. Raro modius grani non xvi libras implet. Exeritur in Græcia difficulter: ob id iumentis dari ab Homero dicta. Hæc enim est quam Olyram vocat. Et satis multo post. Olyram Arincam diximus vocari. Ex quibus perspicuum est Plinio Arincam Gallorum, & Græcorum Olyram eandem esse, à quibus Siliginem semper disiunxit. Hæc de candido Tritico, ac Siligine. Nunc de Tritico rufo dicamus. Huius præter Aristatum & muticum multa alia sunt genera, pro diuersa locorum natura, sitûque. Haud procul Lugduno in pagis monti alto, siue Aureo propinquis, Tritici genus colitur, quod incolæ vocant *Blé rume*, & *Gros Blé*. Spicam fert muticam, granum maximum, & amplissimum, sed ad conficiendum panem minùs vtile. Ex eo decorticato puls fit cum lacte, in cibo rusticis gratissima: quamobrem illud ad eas delicias non segniter colunt. Sunt qui Far, siue Adoreum veterû esse putant, ex cuius pulte Romanos diu victitasse Plinius literis sic prodidit. Ex omni genere durissimum Far, & contra hyemes firmissimum. Patitur frigidissimos locos, & minùs subactos, vel æstuosos, sitientésque. Primus antiquis Latio cibus, magno argumento in Adoreæ donis, sicuti diximus. Pulte autem, non pane vixisse longo tempore Romanos manifestum, quoniam inde & pulmentaria hodièque dicuntur. Far Clusinum aduectum ex Italia, & in agro pingui satum, creuit ad hominis altitudinem, vel etiam procerius: caule sex geniculis distincto: foliis totidem radiculis quinque vel sex, fibrosis: spica palmum longa, prælongis aristis horrida, folliculis amplis, densis, multiplicibus, granum ambientibus longum, exile, profundius lacunatum, aridum, quod vix exculpitur, ac euoluitur, vt non immerito dixerit Plinius in Area non exteri, vt Triticum, Hordeum, Siliginem, sed tostum purgari vt Panicum, Milium, quæ cum folliculis cruda seruntur: ac ideo Far minime tostum cum vaginulis ad satum seruari. Sed & Far pro omni Frumenti genere à veteribus vsupatum fuit. Hinc Far Triticeum pro Tritico, & Far Hordeaceum pro Hordeo, & Far Adoreum, Columellæ. Post hæc cauea

Lib. 2. ca. 9.

Corol. 101.  
lib. 2. Diof.  
Li. 5. de Alf.  
Lib. 2. c. 21.  
Lib. 18. c. 8.  
Cap. 10.

Li. 22. c. 25.

Lib. 18. c. 8.

Lib. 8. ca. 5.



## FAR CLVSINVM

Dalechampij.

Lib. 18. c. 7.

Lib. 2. c. 83  
& 84.

Lib. 18. c. 10.

Lib. 2. c. 9.

ses rustici appellant *Blé qui truche*, quoniam eius spica in alias finditur, & spicas minores adnatas veluti ramos spargit: *trucher* enim in ramos diuidi Lugdunenses Coloni dicunt. Plinius ramosum Triticum vocat. Fertilissima, inquit, Triticum genera, Ramosum, aut quod Centigranum vocant. Contrà circa Matisconem in humidissimis Sebusianorum tractibus deterrimum & strigosissimum Triticum genus provenit, grano longo, exili, subatro, multis glumis vestito. Rustici vocant *Long gran*, id est longum granum, faméque vel egestate compulsi panem ex eo conficiunt. Alij suis & gallinis edendum obiciunt. Ad Brizam Thraciam fruges hæc videtur accedere, de qua suo loco dicetur. Quare rectè scriptum Columella Triticum solo vliginoso conuerti in Siliginem: maximè si idem solum macrum sit & exile. Triticum enim candidum nostras idoneis locis genitum rufo præfertur: humida & macra terra satum granum reddit exile, ex quo panis sit niueus, ad delicias quàm ad corporis firmitatem aptior: quoniam parum admodum nutrit. Idem granum pinguioribus agris redditum pristinam naturam recuperat. Nec in hoc solum Tritico, sed etiam in rufo siue Robo, mutatio huiusmodi deprehenditur. Nam in humido, nebuloso, tenuique solo, quale est in montibus Segusianorum, vulgo *De Forestz*, Robus nascitur deterior, subater, in panificio minùs gratus, adeo ut panem ex Secale ibidem genito, pani ex eo Tritico parato multi anteponant. Idem in Allobrogibus euenit, cum Robi præstantissimum genus, quod *Tousselle* vocant, in montanis agris ferunt. In Sebusianis, vulgo *Bugey*, (Allobrogum Sabaudianorum gens est, nunc Oeno ac Rhodano fluminibus clausa, olim longius patens) Tragus frequentissimus est: incolæ seruatis prisca nominis vestigijs *Blé Turguet* vocant. In montosis aridis, & ventosis locis nascitur, & absque noxa nebulas, pruinas, gelicidia, aliàsque cæli iniurias in montosis locis frequentes tolerat, ventisque agitarus firmissimè granum retinet. Spica cum maturuit, aristis densis horret, & caruleo colore nitet, contrà quàm in alijs frugum generibus, quarum spicae flavescent.

cum matre claudendi sunt, inquit hic scriptor, & farre Hordeaceo cum aqua incocto, vel adreo farre vino asperfo modicè alendi. Et paulo post. Vualabrusca de vepribus immatura lecta, cum farre Triticeo minuto cocto obicitur esurientibus. Videtur & Plinius Far pro farris farina, siue pulte, siue grano decorticato accepisse, cum scribit. Populum Romanum farre tantum è Frumento ccc. annis vsum Verrius tradidit. Porro decorticati farris grani crassior farina ex qua pultes fiunt, Græcis *κέλευρον* dicitur, Latinis Simila. Gallis *Froumentee*, quibusdam Italico nomine vsurpato *Semoule*, quasi Simila. Dioscorides tamè ex Zea, sicut ex Tritico Crimnon fieri testatur, atque etiam ex Olyra. Aliud Triticum rufi genus est *ἐξέζνον*, Galli vocant, *Froument à six quarres*. Quidam, ut circa pagum Erium in Allobrogibus, *Blé rignet*, quasi rigidum Triticum, quod rigidissima firmissimæque spica sit, sex ordinibus distincta, cum in alijs quatuor tantum reperiantur. Item aliud Triticum rufi genus est, quod Lugdunen-



genus Spica carulea.



TRITICVM.



vagina esse scribit, quindecim florere, quindecim arescere. Post florem crassescit, inquit Theophrastus, maturaturque intra quadagesimum diem: cum tardidissimè octauo à satù mense plurima parte meritur, Ægyptiis, vr scribunt, septimo. Nobis hybernum Triticum Septembri, aut Octobri mense

uescunt. Haud multum alimenti præbet. Est apud varias gentes multiplex varietas frugum, quarum numerum, nominumque anticipem significationem persequi difficilimum foret. Triticum omne radicibus multis, ac prætenuibus exit. Ex his virescens herba elicitur, quæ suis nixa fibris sensim adulescit, culmosque ex vna stirpe rotundos, sæpe plures erigit, in quibusdam generibus ternis, in aliis quaternis, in farre senis, vt ait Plinius, geniculis distinctos, qui primum vaginis iam quasi pubescentes includuntur, ex quibus cum emerferint, fundunt frugem in spica, quæ si mutica non est, in Hordeo ac Tritico, tria habet contentia, granum, glumam, aristam. Spica quam rustici antiquitus vocabant Specam, à spe videtur nominata, auctore Varrone: eam enim quod sperant, ferè serunt. Granum dictum, quod est intimum solidum à gerendo: id enim seritur, vt spica gerat Frumentum, non vt glumam, aut aristam. Gluma folliculus est grani, à glubendo, quod eo folliculo deglubitur granum. Aristam, quæ vt acus tenuis, longa, eminet è gluma, quoniam arescit prima, tanquam grani theca sit gluma, & apex arista. Sed est Triticum tum candidum, tum rufum, quod aristas nullas habet. Candidum Triticum crassiore, firmiore, ac solidiore culmo semper assurgit; spicamque rectam, nec pendulam gerit: quare rubigini minùs obnoxium est, quod & de Siligine tradit Plinius. Sed minùs Siligo quàm cætera Frumenta, in stipula periclitatur, quoniam semper rectam habet spicam: nec rorem continet qui rubiginem faciat. Candidum Triticum gaudet solo crasso, pingui, humido, stagnis vicino, vt eorum nebuloso vapore perpetuò humescat. Gaudet & conuallibus montium, in quas imbribus aucti torrentes pinguiorem terræ partem ex montibus deuehant: macrum, frigidum, & perflatum solum respuit. Triticum rufum, pingue, crassum, non humidum solum desiderat. Varro quindecim diebus Frumentum in

Forma.

Lib. 18. c. 7.

Lib. 1. c. 48.

Tempus.



## TRITICVM SPICA

*Mutica.*Vfus.  
Lib. 2. c. 78.

Li. 1. Alim.



feritur, trimestre Martio. Florent Maio & Iunio: iulio demetuntur. Sed trimestre dictum, quod tertio fere à satumense maturascit, nostro in orbe, quinto tandem, hoc est Iulio mense legitur. Quare illa citius, vel ferius pro varia regionum temperie maturari necesse est. Nunc de frequentissimo Tritici, tum in alimentis, tum in medicina vsu differendum. E Tritici generibus ad secundæ valetudinis vsu optima Dioscoridi sunt recentia, & perfectè matura, colore luteo, deinde trimestria. Galenus inter Tritica plurimum habere alimenti scripsit, quæ densa sunt, totamque substantiam habent adeo compactam, ut dentibus vix diuidi queant. Talia enim exigua mole, corpora plurimum nutriunt. Quæ verò dentibus facile franguntur, fractaque rara & laxa apparent, magna mole exiguum reddunt alimentum. Quod si utrorumque parem modum pendere libuerit, quæ densa sunt, multo grauiora esse comperies. Hæc autem sunt, colore etiam, laxis flauiora. Explorare autem horum naturam non simpliciter oportet, superficiem exter-

nam duntaxat contemplando, sed diuidendo quoque, ut dictum est, ac frangendo: multa enim quæ extrinsecus flaua ac densa videntur, rara intus, laxa, albæque spectantur. Ex horum similitudine confectus panis, in-

Lib. 2. c. 78.

quit Dioscorides, plus alit quàm cibarius. E trimestrium farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facile in membra digeratur. In hac Dioscoridis oratione Ruellius τὸν συγκομιστὸν panem non rectè cibarium conuertit. Est enim panis συγκομιστὸς, idem qui ἀντοπυρος, cui nihil furfuris decessit, quem ex toto comportatum expressit ad verbum Cornarius. Id declarat

Li. 1. Alim.

Galenus cum ait. Est autem & alia panum species, inter has planè media, quos ἀντοπύρους appellant, medici autem veteres ipsos nominabant συγκομιστὸς. Cæterum quod hi fiant ex farina à furfure non separata, furfurisque à pura farina non separato, omnibus est perspicuum: hinc enim nomina ipsis indiderunt: ἀντοπυρος quidem, quod ἀντὸς ὁ πυρὸς, id est totum ipsum Triticum in panificium cedat: συγκομιστὸς autem, quod ad ipsos cōficiendos tota farina nusquam à furfure seiuncta συγκομιζέται, id est comportatur. Cibarium verò

Lib. 2. c. 18.

Lib. 6.

panem Celsus quasi plebeium in quinto genere firmitudinis alimentorum ponit, ἀντοπυρον autem in tertio, ut ex loco ante à nobis citato intelligere licet. Apuleius sordidum panem & cibarium pro eodem posuit, de descensu Psyche ad inferos loquens. Panis purissimus Galeno filignites, id est filigineus dicitur.

Li. 1. Alim.

Huic proximus est semidalites, id est, similaceus. Verum σεμιδαλις Græcum nomen est, & antiquum, σιλήνης verò, neque Græcum est, neque ipsum aliter possum exprimere. Inter panes igitur filigineus plurimum alimentum præstat, post ipsum autem similaceus. Tertio loco medius, qui & συγκομιστὸς, & ἀντοπυρος dicitur. Quartum post hunc est sordidorum genus: in quibus furfuraceus est potestremus: minimumque omnium nutrit, & omnium maximè per aluum sub-

det.



det. Quinque igitur panis genera Galenus facit. Primum Siligniten, idest Siligineum, ex filigine: Secundum semidalitem, idest Similagineum, ex similagine tritici farina, expositisque mox vocabulis, *σεμιδαλιν* quidem vocem esse Græcam asserit, ex qua similago à Latinis accepta, quæ & simila dicitur, *σιμάλιν* verò non item, sed Romanam vt & ipse alibi testatur. Tertium genus est medium syncomistum siue autopyrum. Quartum sordidum magna ex parte ex furfuribus constans. Quintum furfuraceum. Quantum autem ad alimenti rationem attinet, idem planè Celsus his verbis exposuit. Ex tritico firmissima filigo, deinde simila, deinde cui nihil ademptum est, quod autopyrum Græci vocant. Infirmior est ex polline, velut alij legunt, deinde, simila: infirmior est ex polline: deinde cui nihil ademptum est, quem Græci *ἀντόπυρον* vocant, infirmissimus cibarius panis. Celsus igitur, nisi mendosus locus est, quantum panis genus infirmius in alimenti ratione esse tradit, ex polline confecti, quod Galenus τὸ πρῶν πυτάρων εἶδος, appellat, crassiore, opinor, siue secundarium pollinem intelligens, filigine iam ab eo, tenuissimo cribro secreta. Hefychius γυρτήν ἀρτον, idest ex polline, quod γύρος dicitur, *ἀντόπυρον* interpretatus est. Sed quid sit pollen tritici siue pollin ex Plinio intelligere licet sic scribente. Similago ex Tritico fit laudatissima. Ex Africo iustum est ex modis redire semodios, & pollinis (primarij) sextarios quinque. Ita autem appellant in Tritico, quod florem in filigine. Præterea secundarii (sub. pollinis,) sextarios quatuor, furrumque tantundem. Panes verò è modio similaginis cxxii. è floris (pollinis) modio cxviii. Pretium huic (sub. Africano Tritico,) annona media in modios farinæ (à furfure non purgata) xli. asses, similaginis castrata, (ab omni forde pura) octonis assibus amplius, filiginis castrata duplum. Est & alia distinctio. Similago Tritici xvi. pondo panis reddere visa, (sub. eius modius,) pollin autem xxx. cum triente, & secundarij panis quinas selibras, totidem cibarij, & furrum sextarios sex. Ex quibus Plinij verbis colligit Budæus Africum Triticum præstantissimum fuisse, ex cuius farina primum similago, quæ & simila dicitur, cribro tenuissimo à polline cernebatur, ita vt ex polline restante secundariam rursus veluti simillam separarent, & crassiore rursus pollinem à furfuribus laxiore incerniculo succernerent, quem vt diximus, Celsus intellexit, quantum genus panis ex polline statuens. Turnebus cap. 18. lib. 30. Animaduert. in exemplari manuscripto illa Plinij verba sic legi docet. Est & alia distinctio semel tempore L. Pauli nata, Pondo panis reddere visa xvi. tertia xix. cum triente: quam lectionem & in meo codice manu exarato reperi, sed, vt arbitror, vitiosam. Similam quidem, siue Similaginem, id esse si nos credimus, quod vulgus nuncupat *Simoule*, nimirum Triticum mola versatili decorticatum, & in minutula grana confractum, vt fieri solet in æstuosis prouincijs, Aphrica, Sardinia, Balearibus insulis, & eiusmodi reliquis, non minus frequenter aut libenter eo cibo cum iusculis parato quàm pane victitantibus regionum illarum populis, à farina certè differt Simila, rectèque Plinius expendit, quantum pollinis siue farinæ, quantum Similæ Triticum reddat, & quot primarij aut secundarij panes è Simila pollinéue fiant. Est autem pollen, siue pollin, interdum à furfure purgata farina, cuius tenuiorem partem pollinem primum vocant: crassiusculam autem Pollinem secundarium, & cibarium. Aliquādo vero pollen dicitur leuissima farina è pistrinis ac moletrinis ob suam leuitatem tanquam euolans, & parietibus adhærescens, è qua fit tenacissimum gluten. Galli vocant *Fole farine*, quasi *voles*, à volando. Ex hoc polline fieri panem nusquam meminime legisse. Harum dictionum τῶν πολυσήμων intellectus multiplex valde profecto moratur lectorem, vt & filiginis nomen, quod nunc

Libr. 7. ph.  
loca. ca. 1.

Lib. 2. ca. 8.

Li. 8. ca. 10.

Li. 5. de Af.



frumenti genus significat leuissimi, ac delicatissimi, nunc farinam purissimam, & tenuissimam, excussorio lineo spississimo transmissam. Similam siue similaginem cum siligine farina videtur confudisse Budæus, Galliæ nostræ decus, & clarissimum lumen, quod inter eas differentiam non didicisset, similaginis vsu fere Gallis Celtis ignoto. Nostri pistorum panificium venale in tria fere genera diuidunt; in primum panem, qui candidus dicitur, Gallicè *Pain blanc*, & *Pain de bouche*, Lugdunensibus *De la miche*, in secundæ notæ panem, qui Ciuilis dicitur, *Pain bourgeois*, & *Pain de mesnage*, Lugdunensibus *Pain farin*, fit is è farina, pura quidem, & quæ nihil furfuris habeat, sed crassiore quàm Primarius: Tertium genus panis cibarius est, nostris, postremæ notæ Græcis Syncomistos, vel Autopycos, Plinio militaris, Lugdunensibus *Pain à tout*, in quo nihil furfuris, nihil farinæ detractum est. Farina ad Panificium præstantissima ea est, quæ non nimis molita, neque recens, neque vetus, neque crassi furfuris fuerit. Nam, quæ nimis molita est, furfuraceos Panes facit: quæ recentior, adscititiam molæ caliditatem retinet: vetus puluere, situ, carie, aut viroso aliquo odore labefactatur. Hæc deinde optimæ aquæ permiscenda, quæ ex laudatissimo fonte fluxerit, quæ pellucida sit, quæ neque cœnum, neque limum redoleat. Præterea fermentum triticeum addendum, non vetus, mediocris quantitatis, ne ex eius copia Panis acefcat. Iniiciendum & salis albi parum, vt Panis gustui gratior reddatur. Concoctu inter Panes sunt facillimi, inquit Galenus, qui plurimum sunt fermentati, & pulcherrimè subacti, quique in clibano igne moderato fuerint assati. Nam ignis ardentior primo statim occursum superficiem externam circumurens in testæ modum indurat: acciditque duplici nomine prauum panem fieri, priore quidem quod partem internam habeat crudam atque illaboratam, posteriore verò quod externam siccam habeat, ac præassatam, & testaceâ. Porro ignis moderato remissior panem minus bene elaborat, sed ipsum crudiorum relinquit, & maximè partem omnem eius internam. Qui autem igne moderato longiore spatio per totos se ipsos æquabiliter assati fuerint, ijtù bellissimè in ventriculo concoquuntur, tum ad cæteras actiones quæ coctionem consequuntur, erunt aptissimi. Pessimi autem ijt Panes sunt habendi, quibus nihil adest ante memoratorum. Puri panes fermento copiosiore indigent, omniumque maximè subigere eos oportet, nec statim post fermentum & subactum assare: diuturniorem iidem assationem postulant. Contrà furfuraceis paucum fermentum, levis subactio, breue interuallum, breuiorque assatio sufficit. His adiiciendæ aliæ ex coquendi ratione panum differentiæ. Omnium optimi sunt, inquit Galenus, panes Clibanitæ, siue Cribanitæ, ad eum quem præscripsi modum, tum assati, tum ad assationem præparati. Cocturæ id genus Galli vocant *Cuire en laterrasse*, proximi ipsis sunt Ignitæ, Furnacei, Gallis, *Cuicts au four*, eodem quo prædicti modo præparati. Sed quia in profundo panis hîc non æquabiliter assatur, ob id à Clibanite bonitate vincitur. At qui in craticula, aut sub cinere calido, aut in foci pavimento super pruna assantur, prauis omnes sunt, quoniam inæqualiter cocti sunt, partibus ipsorum extimis supramodum assatis, intimis autem crudis. Cæterum quoniam subcinericiis cineres prauitatem aliquam aspergunt, hos panum omnium (si ipsis etiam cætera omnia ante pariter adfuerint) quod ad cocturæ saltem modum attinet, propemodum dixerim esse deterrimos. Panes κλιβανίται siue κριβανίται dicuntur Galeno, & aliis veteribus, qui in clibano coquuntur. Est enim Græcis κλίβανος, vel Atticè κρίβανος, Latinis Clibanus & Testus, tegmen testaceum nobis hodie æneum, sub quocalidi panes, placenta, spiræ, & huiusmodi cætera prunis suppositis coquuntur. Panes ἰνῆται, furnacei, aut in furno cocti. Quare non recte Linacer panem

Li. I. Alim.

Li. I. Alim.



panem clibaniten apud Galenum in furno coctum interpretatus est, qui ipnites est, & clibanite deterior. Ante omnia panis bene fermentatus, & probe coctus erit inquit rursus Galenus cribanites, non ipnites. Hanc differentiam Plinius obseruauit de scilla loquens. Coquitur pluribus modis in olla, quæ coniciatur in clibanum aut furnum. Qui in craticula assatur panis, ἐξαρήτης Græcis nominatur nobis, seruata propemodum Græca voce, *Eschalete*, & *Gauffre*, Parisiensibus. Est autem Eschara ferreum instrumentum duabus veluti plagulis constans, craticulæ figura latius & altius incisus, quæ disparari, & rursus adduci proximè possunt, vt se contingant. Hæ cum igne propemodum candent, inferiori panis materia statim iniicitur, & admota appressaque superiore coquitur quod satis est, vtrâque sapius ad ignem obuersando. Eo cocturæ modo fit & panis Obelias, quem vulgus eodem fere nomine vocat, *des Oblies*. Qui in foci pauimento super Prunis, ἐπάνθραξ, Athenæo. Qui sub cinere calido ἐγχευφίας siue ἐγχευπλος. Triticum Galeno primi est ordinis excalfacientium; sed neque humectare, neque siccare euidenter potest: habet etiam quiddam lentoris obstruentisque naturæ. Quod ex pane fit cataplasma vim habet magis digerentem, quàm quod ex tritico: nimirum cum & sale & fermentum panis adiuncta habeat. Fermentum enim vim habet attrahendi & digerendi ea quæ in alto resident. Plinius tamen historia citata triticum siccare ostendit. Sextus Pompeius, inquit, Hispaniæ citerioris princeps, Prætorij viri pater, cum horreis suis ventilandis præsideret, correptus dolore podagræ, misit in Triticum sese super genua: leuatúsque siccatis pedibus mirabilem in modum, hoc postea remedio vsus est. Vis tanta est, vt cados plenos siccet. Scribit idem Plinius grana tritici ferro combusta, iis quæ frigus vsserit præsentaneo esse remedio. Farinam ex aceto coctam neruorum contractionibus auxiliari: cum rosâ verò & fico sicca, myxíque decoctos furfures tonsillis faucibusque gargarizatione prodesse. Paleam quoque tritici vel hordei calidam imponi ramicum incommodis experti iubent, quaque decocta sunt aqua foueri. Refert Galenus Crispi ad recentes in mento, siue alia faciei parte lichenas ex tritico medicamentum his verbis. Tritici grana multa in incudem imponito, deinde laminam æris igne candefactam tritico super ponito, & resolutú ab eo liquorem calidum adhuc auferto, ac super lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus. Fit & auctore Matthiolo è tritici granis inter ferri laminas igne calefacti compressis oleum, quod ad vlcerum sinus commendant. Sunt etiam qui eo vtantur ad pedum & manuum rimas, quas frigus excitauerit: item ad asperam cutim lauigandam. Sed de tritici viribus fusiùs hæc Dioscorides. Tritici genera cruda, inquit, in cibis teretes tineas gignunt: canum morsibus profunt mansa & imposita. Farina eorum cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorum fluxiones. Item contra interaneorum inflationes: lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autem in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant. Græcè legitur, Τό δ' αἰττυρον συνδύεται διρμύτι, λέπρας ἀρίστησι καὶ ἀπλοσύνδρον θερμὸν, καὶ πάσης φλεγμονῆς ἐν ἀρχῇ καὶ ἰσχυρῶς συμφορον. μετὰ πηγάνων ἀφεψήματος ἐψηθὲν, μάτους σπαργώντας πάντας. Id est, furfures autem cum acri aceto calidi admoti lepras eximunt. Incipientes etiam omnes inflammationes illiti leniunt. In rutæ verò decocto elixi, mammas turgentes sedant. Quo loco vetus codex habet non σπαργώντας, vt omnes vulgares, quod significat turgentes & luxuriantes, sed χονδριώντας, id est, instar cartilaginis induratas) viperarum ictibus auxiliantur, & torminosis profunt. Farinaceum fermentum calfaciendi extrahendique vim habet. Priuatim callos pedum, clauósque extenuat, & cætera tubercula furunculósque ex sale concoquit, & aperit. Sitaniorum farina contra venenatos ictus cum aceto aut vino commodissi

Lib.4.fani.  
tuen. &  
Li.8.meth.  
Li.1.Antid.

Lib.10.c.9.

Lib.8. sim.  
*Vires &*  
*tempera.*

Li.22.ca.25.

Ibidem.

Li.5.ph.10.

In lib. 2.  
c.78. Diosc.

Li.2.ca.78.

*Lacu.*



modissimè illinitur: eadem si decocta in glutinis modum delingatur, cruentis excreationibus proderit: contra tussim & exasperatas arterias cum mentha & butyro decocta, efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsâ, aut hydrelæo decoquatur, omnem discutit inflammationem. Panis & crudus & coctus cum aqua mulsâ inflammationes omnes illitu mulcet, quoniam emollit, & quadantenus refrigerat, sed herbis succisve huic rei accommodatis admiscendus. Vetus panis aridus per se, & adiectis convenientibus, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus illitu vetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & pol-line, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidum ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum. Satis de tritico dixisse videri poteramus, nisi eius genera aliquot peregrina superioribus adiungenda essent.

## TRITICVM INDICVM, CAP. II.

Hist. pla.  
ca. 318.

In ca. 78. li.  
2. Dioscor.

Forma  
Indici.

**T**RICICVM Triticum hodie appellatur perperam, quod Indicum appellari debet. Nam ex Occidentis Indiis primum ad nos translatum est, non ex Turcia & Asia, ut credidit Fuchsius. Huius Matthiolo quatuor sunt genera, quæ granorum & spicarum duntaxat colore differunt. Aut enim rufescunt grana, aut nigricant, aut crocea sunt, aut subalbicant. In quibus hoc permirum videri debet, quod alia parte florem, alia fructum proferunt, cum stirpes omnes ibi fructum producant, unde flos emicat. Triticum hoc radicibus firmatur multis, duris ac nervosis, sed minimè crassis, ex quibus calamus assurgit arundinaceus, inferiore parte crassus, ac purpureus, superiore paulatim extenuatus, rotundus, procerus, geniculatus, alba & fungosa medulla farctus. Folia sunt longa, lata, venosa, arundinacea. In calami summitate spicas fundit dodrantes, iube ferè modo multiplices, procumbentes, muticas, & granis vacuas, flores tantum gerentes fecales modo, nunc

TRITICVM INDICVM,  
Fuchsi Turcicum.



TRITICVM INDICVM  
Matthioli.





luteo, nunc candido, nunc purpureo colore, vt fructus quem profert, siue frugifera spica colorata sunt. Culmi geniculis prægrandes veluti spica exeunt, multis foliaceis & membranosis tunicis velut vagina quadam obuoluta, ex qua longi tenuésque capilli prominent. Spica iam adultæ Piceæ arboris conum tum longitudine, tum crassitudine æquant, circa quas totas coaceruantur grana nuda, arctissimè sese stipantia, læuia, subrotunda, Pisi magnitudine, & in octonos aut denos versus ordine digesta. Hoc triticum Dodonæus Milium Indicum à Plinio appellari scribit. Indi hodie *Maliiz* vocant, seruntque hoc modo. In Agrum eunt aliquot simul recta linea dispositi, æqualitèrque distantes, acuto palo terram perforant dextra manu, & quatuor quinquèue grana, sinistra manu in vnum quodque foramen iniiciunt, pede altero foramina occludentes, ne psittaci semen depascantur. Atque ita ordinum passu distantias metientes, Agrum totum serunt retrocedentes. Verum ante sationem semen biduo aqua macerant, nec serunt nisi prius terra pluua maduerit. Citò nascitur, & quarto in India mense demeritur. Est etiam huiusce frumenti peculiare genus, quod

Li. 4. ca. 10.  
Li. 18. ca. 7.

Genera.

Usus &  
Temper.

# FRUMENTVM SARACENICVM,

*Erysimum Theophr. & Irio Plinij, CAP. III.*



LIVD frumentum Saracenicum, vocatur, quoniam ex Africa primum delatum sit, à Gallis *Blé Sarazin*, ab Italis quibusdam *Saracino*, ab aliis *Formentone*, quasi vile frumentum. Germani superiores *Heydenkorn*, inferiores *Bockvneydt*, siue *Buckvneydt*, idest hirci aut fagi triticum appellant, Græcè *τραγότριπον* & *φρυγώτριπον* dixeris, Latine *Hircotriticum*, & *fagotriticum*, quod faginam glâdem forma triquetra & colore sordido quodammodo referat, licet multo minus sit. Peritiores ac diligentiores herbarij frugem hanc *Erysimum* esse volunt Theophrasti, Plinij vero, Latinorumque, *Irionem*. *Erisimi* semen Theophrasto cap. 17. 2. histor. feracissimum est, vt & *Milij*, *Papaueris*, *Cymini*, quamuis minutum. Eodem libr. capit. 19. *Erysimum* & *Sesamum*, nullum animal, dum virent, attingit, propter amarorem, qui in ficcis deponitur, & sic euanesceat, vt tum vesca sint. *Erysimum* frugi, nam oleris genus est alterum *Erysimum*, ac *Sesamo*, calamus ferulaceus est Theophrasto, lib. 9. hist. Plinio vero cap. 7. 18. *Sesamo* tantum.

Matth. in  
cap. 78.  
lib. 2. Dios.



tum. Eodem loco Plinius Irionis & Sefami sanguineum esse folium tradit. Huius quidem plantæ caules & furculi rubent, non folia. Erysimum fruges folio primum est subrotundo, quod tempore hederaceum euadit, verum acutius & mollius. Caulem edit fragilem, rotundum, inanem, bicubitalem, rubentem, foliosum. Florem edit paruum, candidum, racemosum, è quo semen triangulum, sordido colore nigricans, alba intus medulla. Seritur Aprili mense, Iulio metitur in calidioribus locis, adeo ut in iis bis anno proueniat. Id quod in multis Italiæ locis euenit. Rustici ex eius farina non solum panes conficiunt, sed etiam pulmenta, quibus hyeme victitant. Pinsunt quoque idem in pila, & prisanam inde conficiunt, qua nonnulli vescuntur è carniū iure decocta: est enim cibus non ingratus, si rectè coquatur, nec adeo ut grana dissiliant in pultem, sed integra remaneant. Rustici qui circa Italiæ & Germaniæ fines degunt, pultem ex eo quam vulgari idiomate appellant *Polenta*, conficiunt: deinde massam in laticas & tenues portiones secant, & caseo butyroque conspersas in cibum sumunt. qui nec ingratus est, nec adeo ventriculum grauat, ut puls illa quæ ex Milij farina à siluicolis paratur, & quamuis flatu expers non sit, tamen non tam inflat quàm Phaselus, Faba, atque Pisum. Ex his perspicuum est eos valde hallucinari, qui id frumenti genus Ocymum vel Ocynum antiquorum esse putauerunt, pabulum iumentis purgandis aptissimum. In quibus est Tragus, qui non solum id Ocymum esse credit, quod seri consuevit pabulis pecorum, quia eo ita nutriantur, ut breui tempore hoc pastu mirum in modum saginentur, sed etiam huic frumento omnes tribuat vires, quas in Ocymo odorato inesse veteres tradiderunt.

Z E A,

CAP. IIII.

Li. 1. Alim.  
Nomina  
Li. 18. ca. 8.



Lib. 2. c. 81.  
Genera.

Fuc. c. 108.  
Ruel. lib. 2.  
cap. 19.  
Dodo. libr.  
4. cap. 2.

Lib. 18. c. 8.

**Z**EA & ZETA Græcis, auctore Galeno, Zea & semen Latinis, vulgo & Italis *Spelta*, & *Pirra*, dicitur. Zea, inquit Plinius, est Zea Italiæ copiosa in Campania maximè Semenque appellatur. Hoc habet nomen res præclara, propter quam Homerus Ζεῖδος ἀρούρα, dixit, non ut arbitrantur aliqui, quoniam vitæ donaret: quibus verbis Plin. vult Seminis appellationem ob excellentiam frugis datam esse, & Homerum Ζεῖδος ἀρούραν dixisse, quod Zeam ferret, non quod τὸ ζῆν donaret. Arabes *Hais*, Galli *Espeante*, Hispani *Spelta*, Germani *Speltz*, nonnulli *Tinkel*, & *Dinkelkern*, nominant. Zea duum est generum auctore Dioscoride. Vna simplex: altera διόκοκος καλεῖται ἐν διυσίν ἐλύτροις ἔχουσα συνεζευγμένον τὸ σπέρμα, id est, quæ dicoccos appellatur, quod in duobus folliculis coniunctum semen habeat, vel, ut vertit Ruellius, quæ in geminis putaminibus grana bina iuncta gerit, ob id dicoccos appellatur. Ex quo perspicuum est falli eos, qui dicoccon interpretantur, cuius grana in singulis tunicis seu glumis gemina sunt, simplicem quæ in singulis tunicis singula grana habet. Zea veterum, inquit Matthiolus, illud est frugis genus, quod vulgo Italis *Spelta*, & *Pirra* dicitur. *Spelta* enim quod de Zea traditur, duum generum est: vna spicas profert simplicibus granorum versibus: altera duplicibus: Præterea quidam, ut Foroiulienfes, *Speltam Pirra farra* vulgo appellant, quod ex ipsius deglubitis granis, ut veteres, ex Farre, halicam conficiant. Sunt & apud Insubres qui *Speltam Algam* nominant, quasi Alicam, sicut & veteres decorticatam Zeam alicam vocauerunt. Adhæc Plinius Zeam Italiæ esse copiosam tradit, in Campaniam maximè, & Semen vocari. Cuius tempore cum fruges hæc copiosa in Italia fuerit, eius quoque prouentus ad hunc usque diem perdurare potuit. Hetrusci, veteres imitati, *Speltam* vulgo *Biada*, appellant. Nam ut ab antiquis Semen omnibus est feminibus commune nomen,



men, ita apud Hetruscos *Biada* segetum omnium nomen, Zea ob frugis præstantiam inditum est. Zea itaque quæ vulgo Spelta dicitur, Triticum haud absimilis provenit, tenuiore tamen stipula, firmioréque. Verùm spica à Triticum differt, quod compressa planaque sit, granis tantum ex utroque latere prodeuntibus, aristis longis, ac tenuibus vallata. Maior Zea siue dicoccos, firmiore grandioréque culmo, & altiore spica provenit, gignitque bina duobus folliculis simul iunctis grana. Minor altera & monococcos, minore tum culmo, tum spica spectatur, in qua grana singula singulis includuntur folliculis. Zea in multis Italia, Gallia, & Germaniæ locis provenit.

## ZEA DVPLEX.



Nascitur qualicumque solo, etiam humidior, quoniam folliculum, ut ait Columella, quo continetur firmum ac durabilem, aduersus longioris temporis humorem habet. Læto tamen pinguique melius proficit. Seritur, ut Triticum, Septembri vel Octobri mense: Iulio demetitur. Tradunt Zeam, inquit Plinius, cum sit degener, redire ad frumentum, nec protinus, sed tertio anno. Zea, inquit Dioscorides, plus quam hordeum alit, ori grata, digeritur in panificia, & minus quam Triticum nutrit, in quibus verbis pro *ἔσθως*, idest ori grata, ex fide veteris & inculpatissimi codicis *ἐσθῆτος*, idest stomacho utilis, siue commoda, legendum, sicuti etiam legit Galenus hunc Dio-

Forma.  
Matt. in 7.  
8. li. 2. Diosc.

Locus.

Tempus.

Li. 18. c. 10.

Lib. 2. c. 82.

Vires &

Temper.

scoridis locum citans, qui & de Zea hæc scripsit. Zea vniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici, & hordei. Itaque ex illis cognosci debet. Olim ut ex Triticum Crimnon, ita ex Zea Chondrus siue Alica fiebat. Græcorum *χόνδρον*. Latinorum alicam esse declarant tum viri docti, qui conuertendis in Latinam linguam Græcis medicis *χόνδρον* Latine alicam semper reddiderunt, tum posteriores Græci qui Latina voce *ἀλικος* vsurpata, sæpe coniunctim *χόνδρον ἀλικος*, dicunt. Aetius. *τροφήν δ' αὖ δίδοναι χόνδρον ἀλικος μέλι δίνω λευκοῦ*, & cæ. ac rursum: *ἐνθρύνει δ' ἐν αὐτῇ ψυχας*, ἢ *χόνδρον ἀλικος ἐν αὐτῇ ἐμβλυσέον*. Item alibi: *τακῆναι δ' χόνδρον ἀλικος μεθ' ὕδατος θερμῆς ἐψημένον*, & cætera. Sed id postea ex rei ipsius natura certius ostendimus. Videtur autem alica Latinis ab alendo appellata esse, sicut *χόνδρος* Græcis ob excellentiam, idest granum dicitur. Deinde *χόνδρος* & alica tum pro frugis specie, tum pro re factita, siue cibo, Alica ex Zea, chondrus è tritico composito à veteribus vsurpatur. Paulus. Chondrus tritico persimilis est, nisi quod glutinosior. Suidas. *χόνδρος: πυρὶ παραπλήσιος: γλίχρος δ' ὡλέον ἐκείνῃ*. Galenus, *χόνδρος ἐστὶ μὲν δλίπης καὶ τροφῇ βελτίστη, καὶ ἀπὲρ καὶ πυρὸς*. Et mox, *καὶ διὰ τοῦτο τινὲς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ξηρῶν ὀντων ἐνόμισαν εἶναι καὶ τοῦτο τὸ σπέρμα*. Plinius de frugum generibus. Aliqui verna, milium, panicum, lentem, cicer, alicam appellant. Et paulo post, Tunicæ frumento plures, hordeum maximè nudum & alica, arinca, vetustus codex habet, sed præcipuè auena. Nunc ex quibus frugibus, & quomodo fieret chondrus siue alica explicandum. Alica fit ex Zea quæ dicoccos appellatur, inquit Dioscorides. Plus alit quam Oryza, alium magis cohibet, stomacho longè utilior. Alica ex genere est Tritici, inquit Galenus, valenter nutrit,

Li. 1. Alim.

Lib. 6. sim.

Chondrus

& alica.

Lib. 9. c. 10.

Ibid. ca. 12.

Ibid. ca. 29.

Libr. 7.

Libr. 8. sim.

Li. 18. ca. 7.

Lib. 2. c. 89.

Li. 1. Alim.



fuccumque lentum habet, siue in aqua duntaxat coctam cum mulso, aut vino dulci, aut etiam adstringente (nam singulis horum suo proprio tempore utimur) siue oleo saloq; conditam sumas. Nonnumquam autem illi & acetum iniicitur. Præparatam eodem modo alicam medici chondroptisanæ cōfectio- nem appellant: quidam autem dicunt ex *χόνδρον πρίσανης*, idest ex alicæ prissana ægrotum fuisse cibatum. Veterum nonnulli, ut Diocles & Philotimus, *πρίσανη* *πυρίνη*, idest prissanam triticeam, alicam è Tritico confectam nominant. Qua propter eius nomen apud antiquos est rarum. Sunt autem & alia permulta semina prædictis quidem similia, non tamen eadem protinus specie, quæ partim in Hordei ac Zyp hæ, partim in Zyp hæ, olyraque, aut Olyra & Tritici medio sunt loco: quædam vero ad Olyra; alia ad Hordei aut Zyp hæ, alia ad Tritici, ceu alia ad Panici, alia ad Milij naturam proximè accedunt, quæ nomina habent alia simplicia, *ὡς περ ἐν ἰταλίᾳ ἐξ οὗ τὸν χόνδρον ποίσει*, idest, ut in Italia ex quo Alicam faciunt. Quibus verbis nihil aliud quam simpliciter Zeam appellatam indicat, ex qua chondrum in Italia faciebant. Sed inter prima dicatur & alicæ ratio inquit Plinius, præstantissimæ saluberrimæque: quæ palma frugum indubitanter Italiam contingit vel, ut alij legunt, Italiæ contigit. Fit sine dubio & in Ægypto, sed admodum spernenda. In Italia verò pluribus locis, sicut Veronensi Pisanóque agro, in Campania tamen laudatissima, idem rum. *Alica fit ex Zea, quam Semen appellauimus. Et alibi. Alica res Romana est, non pridem excogitata. Ex his intelligere licet alicam latinorum, χόνδρον, esse Græcorum, & eam non ex vno frugum genere paratam fuisse, sed quæ ex Zea & tritico fieret, peculiariter chondrum siue alicam appellatam. Cum enim chondrum, chondroptisanam, & prissanam pyrinen, idest triticeam à veteribus dictam fuisse scribit Galenus, nihil aliud intelligit, quam quod chondrus instar prissanæ decorticaretur, & comminueretur, atque postea eodem quo prissana modo condiretur. Est autem prissana propriè hordei decorticati appellatio, ut suo loco dicemus, qua cum aliis frugum generibus copulata, alia atque alia prissanæ genera significantur: velut *χόνδρον πρίσανης* significat ex Zea decorticata prissanam: *πρίσανη πυρίνη*, prissanam ex tritico decorticato, ita ut tum chondrus, tum prissana generalia nomina esse videantur frugum omnium siccatarum, & decorticatarum, quo sane modo alica quoque apud Plinium generale vocabulum videtur esse, quemadmodum apud Græcos chondrus, quo loco ille alicæ conficiendæ modum ostendit. Alica fit ex Zea, quam semen appellauimus, inquit. Tunditur granum eius in pila lignea: nam lapidis duritia conteritur. Nobilius, ut notum est, pilo vinctorum pœnali opera. Primori inest Pyxis ferrea: excussis inde tunicis, iterum iisdem armamentis nudata conciditur medulla. Ita sunt alicæ tria genera, minimum, ac secundarium: grandissimum verò aphærema appellant. His Plinius alicæ parandæ modum docet, & tria eius ex Zea facta genera ex contusionis magnitudine distinguit, minimum idque primarium, in minutissima grana rufum. Secundarium quod crassiusculè contusum est: grandissimum, maximæ inter ea molis, grano fere tantum exuto sua tunica, nec minutius trito, unde etiam *ἀπο- πελα* à corrice videlicet, siue tunicis ablatis est appellatum, vel quod tertium hoc genus sit tanquam reiectum purgamentum superiorum, quæ longe præstantiora sunt. Alia alicæ genera materiæ ex qua fit, diuersitate Plinius statuit his verbis. Alica adulterina maximè quidam fit ex Zea, quæ in Africa degenerat. Latiores eius spicæ nigriorésque, & breuis stipula. Et paullo post: Alia ratio ubique adulterandi. Ex tritico candidissima & grandissima eligunt grana, ac*

Li. 18. ca. II.

Li. 22. c. 25.

Li. 18. ca. II.

Ibidem.



Lib. 1 c. 78.

Li. 1. Alum.

Lib. 18. c. 14.

Lib. 3. ca. 7.



μέρεσι καὶ ὀλίγον μικρόν, ἐπιπλισσομένη τῇ ζεῖα αὐθις. σκευαζέσθω ὃ ἐν ταῖς ὑπὸ κινύα ἡμέραις, ἵνα μὴ ὀξύσῃ ἐπὶ τὴν ἄπας ἐπιπλίσθη, κοσκύνῃ κοσκινεύσθω ἀδροτέρῳ. χαλκίτος ὃ ὁ πρότερος σηοθῆς γίνεται χόνδρος, δεύτερος ὃ ὁ ἐπὶ τοῦ τριτοῦ καὶ ἐλάττω ὁ τρίτος. Idest, Chondri confectio. Zea tundenda, & in feruentem aquam iniicienda, atque exprimenda. Deinde tundendum gypsum album, & in tenuem pollinem redigendum, atque arenæ albissimæ & tenuissimæ quarta pars cum gypsi portione paulatim miscenda Zeæ, quæ iterum tunditur. Præparetur autem canicularibus diebus ne acefcat. Tusa autem tota Zea cribro incernatur densiore. Chondrus is optimus qui primo succretus fuerit, secundus qui post hunc, deterior tertius. Cum verò creta gypsumque citra periculum ac noxam in corpus assumi non possent, vt ea ab alica separarent, diligentissimè priusquam coquerent, lauabant, baculo variè in aqua agitantes, deinde quod in aqua supernatauerat residere sinentes, coquebant, vt apertè declarat Galenus in lib. Li. 1. Alim. Hippoc. Dearticulis, fracturæ narium curationem docentis. Idem innuit & Galenus, cum ait. Cæterum diligentissimè dum ex alica elota sorbitiones parantur, animaduertere oportet, & cætera. De Alica verò vtilitate hæc Plinius Li. 22. c. 25. tradidit. Alica res Romana est, & non pridem excogitata, alioqui non ptissanæ potius laudes scripsissent Græci. Nondum arbitror Pompeij Magni ætate in vsu fuisse, & ideo vix quicquam de ea re scriptum ab Asclepiadis schola. Esse quidem eximiè vtilem nemo dubitat, siue eluta detur ex aqua mulsa, siue in sorbitiones decocta, siue in pultem. Et paullo post. Ptissanæ quæ ex hordeo fit laudes vno volumine edidit Hippocrates, quæ nunc omnes in alicam transeunt. Nec ab iis discrepant, quæ supra ex Galeno protulimus, vbi & variè ipsam per cocturam parari tradit, ex aqua sola nonnunquam coqui, ac ex vino mulso sumi. Id quod etiam testatur Martialis his versibus.

In Xen.

*Nos alicam, mulsum poterit tibi mittere diues.  
Si tibi noluerit mittere diues, eme.*

Lib. 8. sim.

Aut vino dulci, siue adstringente, aliquando oleo & sale condiri, aceto infuso, quod etiam alio in loco declarat his verbis. Alica est alimentum optimum, quemadmodum etiam triticum. Sed non est huius loci de alimento distinguere. Verum vt medicamentum, obstruendi meatus vim habet. In temperamento verò similis est tritico, plus viscosi quàm illud habens, quo etiam magis quam illud alit. Est & velut materia quædam idonea ad suscipiendum acetum, aquam marinam, & muriam, & alia huiusmodi quæ vehementer siccant. Qua propter quidam ex his quæ multum siccant, ipsam esse putauerunt. Est autem ex his quæ magis concoquere possunt, & minus siccant, quemadmodum & triticum. Verum ob siccantium pharmacorum mixturam, id quod ex ipsis est compositum, siccandi vi præditum, multos medicos fallit, vt ad ipsam alicam referant siccandi causam, omisis iis quæ sunt admixta. Scribit Dioscorides decoctam in aceto alicam, illitâque lepras tollere vnguium scabritias extricare: incipientibus argilopiis mederi: decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum esse. Fir hodie in Italia ac Sicilia alica ex Zea, quam tam ad sanorum quam ægrorum vsus valde commendant, eamque non alicam, sed farro, idest Far falso appellant. Hac appellatione moti quidam Zeam nihil aliud quàm Far esse putauerunt. Faris nomine Zeam ab antiquissimis Latinorum nuncupatam fuisse testis est Dionys. Halicarnass. Nominabant, inquit prisca Romani sacras nuptias vocabulo suo φαῖρα, quia coniuges vescerentur eodem φαῖρῳ, quod nos Græci ζῆαν dicimus. Item Asclepiades apud Galenum, φαῖρα, ὁ χαλκίτος ζῆαν. Idest, Farris quod

*Vires &  
Temper.  
Alica.*

Lib. 2. c. 89.

Lib. 9. ph.  
loc. cap. 3.

lære vnguium scabritias extricare: incipientibus argilopiis mederi: decoctum dysentericis, quos excruciat dolor, infusum, idoneum esse. Fir hodie in Italia ac Sicilia alica ex Zea, quam tam ad sanorum quam ægrorum vsus valde commendant, eamque non alicam, sed farro, idest Far falso appellant. Hac appellatione moti quidam Zeam nihil aliud quàm Far esse putauerunt. Faris nomine Zeam ab antiquissimis Latinorum nuncupatam fuisse testis est Dionys. Halicarnass. Nominabant, inquit prisca Romani sacras nuptias vocabulo suo φαῖρα, quia coniuges vescerentur eodem φαῖρῳ, quod nos Græci ζῆαν dicimus. Item Asclepiades apud Galenum, φαῖρα, ὁ χαλκίτος ζῆαν. Idest, Farris quod



quod Zeam vocant. alibi nos fufius expofuimus, quæ matrimonia fierent vfu, coemptione, confarratione. Sed his refragatur Plinius, qui vt diximus, capite de tritico, Far aliud à Zea tritici genus effe perfpicuè fcribit, Adoreum dictum & eodem in loco, Qui Zea vtuntur, inquit, Far non habent. Ex eo frumenti genere factitiam rem Far etiam nuncupatam, diuerfam effe à chondro fiue alicadem Plinius aperte declarat, cum ait, Populum Romanum Farre tantum è frumento trecentis annis vsum Verrius tradidit: quo tempore Romanis nullus fuit alicæ vſus, id quod ipſe alio in loco teſtatur ſcribens Pompeij magni etate alicam Romanis in vſu non fuiſſe. His ſubſcribit Archigenes apud Aetium. Quod verò Latine, inquit, in regionibus Romæ vicinis Far appellatur, hoc modo paratur. Frumentum modico tempore aqua madefacito, indeque extractum, ac in pilam coniectum veluti priſſanam à cortice expurgato. Vbi vero corticem exuerit, tollito, atque in ſole ſiccato: deinde manibus tritum, donec penitus à cortice fuerit mundatum, craſſiſſimè molito, ita vt granum unum in quatuor aut quinque partes redigatur, & ſiccum aſſeruato. Vſus autem tempore alicæ modo coquitur, & à ſanis in cibo ſumitur. Pro agris verò variè apparatur, & epithematis quoque admifcetur. Quidam ſpicas frumenti adhuc virides tollunt, ex ipſiſque Far concinnant, quo modo, & ſuavius & iucundius redditur. Ex iis conſtat Far pro re factitia, ſiue pulte farracea, & ab antiquis pro alio atque alio frumento vſurpatum, quod etiam de Zea dicere poſſumus, vel auctore Galeno, apud quem Mneſitheus panem ex Zea neminem affatim comefſe citra ſanitatis diſpendium poſſe tradit. Quod ſi quis, ait, ei pani non aſſueuerit, etiam ſi minimum ſumpſerit, ægrotabit. Eſt enim gravis, & concoctu difficilis. Qui verò regionem incolunt vehementer frigidam, eo ſemine coguntur nutriri, ipſumque ſerere, quod frigore perſtrennuè reſiſtat. Hæc Zea de qua ex Dioſcoride & Plinio diximus, conuenire non poſſunt, neque Zea Theophrati, qui eandem quam Dioſcorides Zeam intellexiſſe videtur: ſic enim ſcribit. Inter ea quæ Tritico hordeoque ſunt ſimilia, vt Zea, Olyra, Tipha, Auena, & Aegilops, Zea eſt firmiſſima, copioſiſſimèque fructificat, multiplicem altamque radicem effundit, calamo multiplici craſſoque aſſurgens. Fructus autem eſt leuiſſimus, & cunctis animalibus admodum iucundus. Deinde ſubiungit. Sunt autem hæc duo, Zea ſcilicet, & Tipha Tritico ſimillima. Herodotus verò, alius Zea meminiffe videtur, cum ſcribit: Tritico hordeoque plerique victitant. Apud Aegyptios autem his in victu vti ſummum dedecus putatur. Vtuntur autem Olyris, quas alij Zeias cum, Z. nominant.

Lib. 18. c. 8.

Li. 18. ca. 7.

Lib. 22. c. 25.

Lib. 9. c. 45.

Li. 1. Alim.

Li. 8. Hiſt. cap. 9.

Lib. 1.

OLYRA. CAP. V.

**V**T Græcis ολύρα, ita Latinis Olyra dicitur, & Gallis *Arinca*, Plinio auctore, vt iam diximus. Olyra, inquit Dioſcorides εκ του αλωου γένους, id eſt, ex eodem eſt Zea genere: quod ita docti viri accipiendum eſſe cenſent, non vt Olyra Zea ſpecies ſit, cuius duo tantum à veteribus poſita ſunt genera, nempe monococcos & dicoccos, ſed eiſdem eſſe generis, id eſt naturæ, & facultatis cum Zea. Verum Olyra minus aliquanto nutrit: in panes tamen, vt Zea, cogitur. Fit quoque ex Olyra craſſior farina quàm Græci crimon vocant. Mneſitheus, auctore Galeno, vno ſemine duo nomina ſcribit contineri, his verbis. Ex ſeminibus ad

Nomina

Lib. 18. ca.

10. & 22.

cap. 25.

Lib. 2. c. 84.

Li. 1. Alim.



nutritionem sunt appositissima Triticum, & Hordeum. Quod autem hæc deinceps sequitur, duplici quidem nomine nuncupatur, eadem tamen res est: alij enim Tipham, alij Olyram nominant. Diocles autem apud eundem Galenum, Tiphas ab Olyris distinguit, ut & Theophrastus. Quorum sententiam approbat Galenus, Mnesitheum verò reprehendit his verbis. Mnesitheum iure quis demiretur, quod inter Olyram & Tipham discrimen non nouerit. Vtrumque enim in Asia frequens est, & potissimum in regione quæ est supra Pergamum, adeo ut rustici ipsi panibus ex ipsis factis semper utantur: propterea quod triticum omne in oppida comportent. Olyrini quidem pans, si modo ex bona Olyra fiant, post triticeos sunt præstantissimi: secundi autem ab his sunt Tiphini. Quod si Olyrini ex vitioso semine sint facti, Tiphini non erunt inferiores. Plinius Olyram inter frumenti genera recenset, & à Tiphâ discernit. Arinca, inquit Galliarum propria, copiosa & Italiæ est. Aegypto autem, ac Syriæ, Ciliciæque, & Asiæ, ac Græciæ peculiare Zea, Olyra, tÿphe. Et aliquando post: Ex Arinca dulcissimus panis: ipsa spissior quàm Far, & maiore spica, eadem & ponderosior. Rarò modius grani non sexdecim libras implet. Exeritur in Græcia difficulter, ob id iumentis dari ab Homero

## OLYRA DODON.

Lib. 4. ca. 3.  
Nomina


Forma

Locus.  
Tempus.  
Ufus.  
Temper.

Ibidem.

In ca. 101. li.  
2. Dioscor.

Li. 18. c. 16.



dicta. Hæc enim est quam Olyram vocat. Eadem in Aegypto facilis fertilisque. Hanc Olyram non serî in Italia scripsit Matthiolus, in capitul. octuagesimo quarto libr. secundo Dioscorid. eamque nec descripsit, nec depinxit. Dodonæus pro Olyra exhibet frugis genus hic appictum, quod vocari ait in Germania, *Amelkorn*, Zeæque esse speciem, calamo, geniculis, magnitudine Tritico similem, spica non mutica sed aristis multis vallata, ut hordeum, grano folliculis concluso, Zeæ modo quod spoliaturum Tritici granis est simile. Multis Germaniæ locis prouenit, & ante æstatem feritur, metiturque Iulio mense. Ut Zeæ speciem esse, ita temperamento viribûsque illi respondere scribit Dodonæus, & inter triticum & hordeum mediam, eadem omnia præstare quæ Zea: panes ex eadem confectos quodammodo triticeis esse similes. Quæ Theophrastus & Plinius de Olyra scripserunt Marcellus, Virgilius, putat indicare frugem quam nostra tempora Secale vocant, non tamen id pro comperto affirmat. At omnem dubitandi occasionem sustulit Plinius, qui multum diuersam Olyram à Secale facit.

Cum enim de Olyra quæ citauimus, scripsisset, alio loco de Secale hæc tradit. Id autem quod Secale, & farrago appellatur, occari tantum desiderat. Secale Taurini sub Alpibus Asiam vocant, deterrimum, & tantum ad arcedam famem utile, fœcunda, sed gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præcipuum. Admiscetur huic Far, ut mitiget amaritudinem eius, atramen sic quoque ingratisimum ventri est: Contra ex Olyra dulcissimus panis, ut ex eodem Plinio diximus. Præterea Galenus, quod nuper citauimus, o'yrinos panes,

Li. 1. Alim.



panes, si ex bona Olyra fiant, post Triticeos esse præstantissimos scripsit. Quod verò Hermolaus, Manardus, Ruellius Olyram Latinorum Siliginem esse dixerunt Plinio auctore, id iam capite de Tritico falsum esse ex ipso met Plinio demonstrauius. Cæterum quemadmodum chondrus, & chondroptissana, & ptissana Triticea ex Zea & Tritico fiebant, ita ex Olyra Tragus parabatur. Tragum quidem pro frumenti specie usurpari diximus cap. de Tritico, sicut & usurpare videtur Galenus, lib. i. Aliment. Dioscoridem citans his verbis: ὁ δὲ τράγος τὸ σπέρμα μὲν παραπλήσιον χόνδρῳ, ἀτροφώτερος μὲν πολὺ ξῆος, διὰ τὸ πολὺ ἔχει τὸ ἀχυρώδες. διὰ δὲ δυσκατέργατος ἐστὶ, καὶ κοιλίας μεγαλύτερος. Id est, Tragi semen chondro est simile, nutrit tamen multo minus quàm Zea, quod multum acris habeat: ob id concoctu est difficilior, & aluum magis mollit. In nostris tamen Dioscoridis exemplaribus hæc aliter leguntur: Τράγος τὸ σπέρμα μὲν παραπλήσιον τῷ χόνδρῳ ἔοικεν. ἀτροφώτερος δὲ παραπολύ ξῆος, διὰ τὸ πολὺ ἔχει τὸ ἀχυρώδες, & cætera. Id est, Tragus figura quidem Alicæ similis est, sed multo minus nutrit quàm Zea, quod multum acris habeat: quare ægriùs conficitur, & cætera, quibus verbis Tragi nomine rem facticiam Alicæ similem significari quidam malunt, quàm frugis speciem. Quod autem ex Olyra Tragus fieret, testis est Galenus, lib. i. Alim. cum scribit. Ex nobilissima autem Olyra, cum, ut decet fuerit decorticata, Tragum conficiunt quo plerique vtuntur, primum in aqua decoquentes, deinde ea effusa sapam, aut vinum dulce, aut multum infundentes superiniiciunt, & pineas nuces aqua præmaceras, donec plurimum intumuerint. Idem in libro primo Hipp. de rat. vict. in morb. acut. ex Zea Tragum fieri dixit. Ptissanam igitur rectè præferri ait Frumentaceis eduliis, panis scilicet, chondro, & Zea, ex qua fit Tragus. Ex Tritico ptissanæ conficiendæ, vulgata ratio est, inquit Plinius, lib. 18. cap. 7. Simili modo ex Tritici semine Tragus fit, in Campania duntaxat, & Aegypto. In Geoponicis Cassianus Bassus, cap. 13. lib. 3. Tragum ex frumento Alexandrino conficit: Τράγος ποιήσας τὸν ἀλεξάνδρινον λεγόμενον σίτον βρεκλέον, & πλιστέον, καὶ ξηραντέον ἐν ἡλίῳ θερμῷ. εἴτα αὖθις τὰ αὐτὰ ποιήσας, ἄρχεις ὅτε ὑμένες τῷ σίτῳ, & τὸ ἰνώδες ἀποπέσῃ. ἔτω τε ξηραντέον, & ἀποθετέον τὸν τράγον ἐν τῇς ἐυγενέος ὀλύρας. Id est, Frumentum Alexandrinum maceratur, decorticaturque & in sole calido siccatur. Deinde rursus eadem facienda, donec & folliculi, & quicquid fibrosum est delabatur. Sic & siccandus & reponendus Tragus ex probata Olyra. Ex quibus perspicitur omnia Frumentorum genera ptissanæ modo decorticari & præparari solita, eorundemque atque rerum quæ ex ipsis conficiuntur ad alendum corpus nomina inter sese confundi.



Nomina

Lii. Alim.

**T**IPHA Latinè etiam Tiphe, seu Tipha dicitur à Ruellio Tipha ce-  
realis: quoniam planta alia inter arundines locis humidis proue-  
nit, quæ Tipha nominatur. Theophrastus inter ea quæ Triticum &  
Hordeo similia sunt numerat Zeam, Tipham, Olyram, &c. mox  
subiungit Tipham omnium leuissimam esse, simplici culmo assurgere, solo te-  
nui contentam, nec, vt Zeam, pingue & latum desiderare. Mnesitheus, auctore  
Galeno Tiphas tertio loco post Triticum & Hordeum numerat. Diocles post

TIPHA DODONÆI.

TIPHA FVSCHII.



Hordeum, ac Triticum facultatibus sequi omnium maximè Olyras, ac Tiphas  
dixit. Sed Mnesitheus Olyram & Tipham eandem rem esse putat, quem ob id  
reprehendit Galenus, vt capite superiore declarauimus. Galeni hæc de Tiph-  
inis panibus & Tipha oratio est, aliquoties repetita. Olyrini panes si modo ex  
bona Olyra fiant, post Triticæos saltem sunt præstantissimi. Secundi autem ab  
his sunt Tiphini. Quod si Olyrini ex vitioso semine sint facti, Tiphini non  
erunt eis inferiores. Calidi verò panes ex laudatissima Tipha facti, Olyrinis  
longe sunt præstantiores, asseruati verò deteriores seipsis euadunt. Cum enim  
massa illorum sit tenax, ac ductilis, densatur maiorem in modum, & maximè  
cum negligenter parati fuerint, adeo vt qui panem huiusmodi post vnum, aut  
duos dies, ac multo magis sequentes aliquot comederit, putaturus sit lutum  
ventriculo suo inesse: at cum verò calidus adhuc est, ab ipsis etiam vrbani-  
petitur, ipsumq; cum caseo quodam mandunt, quem vernaculo nomine *Oxy-  
galapimon* vocant. Porro hunc quoque tenerum esse oportet, & ipsum panem  
calorem clibani adhuc retinere. Qui certe in hunc modum est assatus, non ru-  
sticis modò, sed vrbani quoq; hominibus in deliciis habetur. Qui verò trium  
quatuorue dierum est, vel ipsis rusticis qui mandunt, in suauis est. Præterea con-  
coctus est difficilior, ac tardius per aluum subducitur, quæ calido minimè acci-  
dunt, qui tamen Hordeaceo, quod ad deiectiones pertinet, multum vincitur,  
non



non tamen propter id, adeo vt miliaceus, est vituperandus. Quinetiam corpus admodum nutrit, dum calidus est, vt pene Triticeo syncomisto par sit. Habet autem Tiphæ semen extrinsecus corticem velut Olyra, & Hordeum: verum decorticatum in panes congeritur, vsuiq; omnino est accommodatum. Nam & ex aqua manditur elixum, haud aliter ac vocatus à rusticis apothermus, sapa iniecta: nōnunquam etiam cū sale esitatur. Hæc de Tiphæ Galenus, quæ quānam nostrarum frugum speciem referat, ignorant plerique docti Herbarij. Dodonæus Tipham appellat eam frugem quam Gallis *Meteil*, vocari putat, Germanis *Uvelsche Wyssen*, & *Roomscheteruue*, id est Triticum Italicum, aut Romanum. Fuschius eam pro tertio Tritici genere depinxit. Sed fallit Dodon. neq; enim Gallorum *Meteil*, non vbique noti, seu peregrini Tritici species est, sed partim ex Tritico, partim ex secale miscellanea seges, quam Lugdunenses vocant *De la Mescla*. Calamo, geniculis, spica aristis vallata Olyram ea refert, nisi quod Tiphæ spicas habet longiores & asperiores, rotundioresque & in vnum magis coactas. Semen folliculo vnico includitur, grano Tritici simile. Fruges hæc cortice & acerbis purgata Zeæ modo in triticum redit, quod & de Tiphæ Plinius his verbis scripsit. Tradunt Zeam, ac Tiphæ cum sint degeneres redire ad Frumentum, si pistæ serantur, nec protinus, sed tertio anno. Seritur frequentius, inquit Tragus, in Alsatia, rariùs in aliis Germaniæ regionibus, idq; locis potissimum montosis, præsertim vbi apri fruges depascuntur. Nam ab hoc vno ferè abstinet, quod durioribus eius aristis offendantur. Ad Olyræ temperamentum & vires Tiphæ accedit, sed Olyra deterior est, vt ex Galeno diximus.

Lib. 4. ca. 4.

Nomina

In hist. Pl. cap. 150.

Forma

Lib. 18. c. 10.

Locus.

Vires.

TRITICVM TIPHINVM,

CAP. VII.



**T**RITICVM TIPHINVM, Tritico nostrati Calamis & grano vtrumque simile, tenuiores ac breuiiores stipulas habet, spicam horridam duris & longis aristis, instar Hordei, granum durum, densum, fuluum, quod facile glumis suis exteritur. Reperitur huius frugis granum cum semine Phalaridis aduecti ex Hispania, & insulis fortunatis. Huic Frumento cum Tiphæ conuenit, quod Calamo surgit tenui ac simplici: quod semen gignit leuissimum, exile, paruum, densum tamen, & coactum, Tritico magis rufum: quod aristæ duræ, ac longæ spicam muniant: differt autem, quod Tiphæ granum inclusum multiplici folliculo difficulter decorticetur, huius autem minus tectum semen eximatur facilius. Triticum in Tiphæ mutatum soli vitio, quidam esse putant.

ZEOPY



I.i. Alim.  
Nomina



ZEOPYRON in frugum generibus recenset Galenus his verbis. Est in frigidissimis Bithyniæ locis semen quoddam, quod Zeopyrum nominant, prima syllaba, i. non habente, ut apud Homerum habet cum ait, Et Zeia, & Triticum, cum secundo Hordeo & albo. Ex eo autem panis fit præstantior, quam qui in Macedonia, aut Thracia ex Briza conficitur. Ac ferè quædammodo nomen ipsum Zeopyrū ex utroq; nomine, Zea scilicet & pyro, idest tritico componitur, sic & substantia eadem inter utrumque media quodammodo est, ut si ex utraque esset commista. Proinde quando tritico est deterius, tanto Thracia Briza est præstantius: Porro urbium nomina in quibus semen id provenit, sunt Nicea, Prusa, Crassopolis, Claudiopolis, Heliopolis, & Dorile, quod quidem extremum est Phrygiæ Asiaticæ oppidum. Habet autem & Phrygia ipsa semen eiusmodi in agro proveniens, quemadmodum & aliæ quædam vrbes finitimæ. Videre autem est panem qui ex hoc semine conficitur, tanto eo qui ex Briza in Thracia & Macedonia fit, esse meliorem, quanto triticeo est deterior.


Lib. 4. ca. 5.  
& Hist. fru-  
ment. ca. 8.

Forma.

Locus.

Dodonæus Zeopyrum id esse putat, quod Germanis *Kern*, & *Drinkelkern*, & *Kernsamen*, vocatur. Zea culmo, geniculis, & spica proximum: semen eius naturæ Tritici non absimile, sed non tamen perinde ac Zea, glumis, siue folliculis involutum, in area facile exteritur, sublutei coloris, ut Triticum. In quibusdam Germaniæ locis seritur ad pistrinarum & culinarum opera, in quibus Hordei usum præbet. Huius frumenti figura Dodonæo eadem prorsus est quæ Zea, ut inde suspicemur Dodonæum existimasse à Zea, vel nihil, vel parum admodum differe. Huic congener esset, non solum cognatum, Frumentum quod Ruellius Scourgeon vocat, tanquam, ut interpretatur, Succursum, vel Subsidiū gentium, grano tristi, & macro, Hordeo simili, quod premente annonæ penuria serunt agricolæ, cum aliis frumentaceis Autumno, si granum quod Zea modo vix deglubitur, folliculo suo facile absolueretur, ut in Triticum.

#### ZEOPYRON GYMNOCRITHON, CAP. IX.



ZEOPYRON GYMNOCRITHON, nudum Hordeum vocat Lobelius, frugis speciem nomine solo indicatam, non autem priuatim dicata historia explicatam. Exutum cortice Hordeum si seritur, tale provenit, ut ad pristinam conficiendam non sit præterea tundendum. Seminis gustus non minus suavis est ad omnia cibariorum genera, quàm Hordei spoliati. Facies tota Hordei vulgaris: nihilque diversum aliud quam quod granum nullo cortice amictum in folliculis aristatæ spicæ nascitur, quod ipsum & in aliis Frumentorum generibus fieri aiunt si detracto pariter cortice terræ mandentur. Ad auxilia cuncta medicinæ, vis eadem quæ Prisanæ Hordeaceæ.

BRIZA



## CAP. X.

Nomina  
Li. 1. Alim.

tia. Quod si panem qui ex Zea fit, nigrum



Lib. 4. ca. 6.

Lib. 2. c. 17.

*Locus.*

Ibidem.

Lib.2. c.24

SECA



Nomina



SECALE Gallis extrita vna tantum litera ad hoc vsque tempus *Seale*, vel potius *Seale* nominatur, Germanis *Rocken*, Belgis *Rogghe*, Italis *Segala*, Hispanis *Centeno*, nonnullis Asia, à Plinio etiam *Farrago* eadem ratione qua *Far*, *Hordeum*, *Auena*, *Triticum* *Farragines* nominantur, quando videlicet iumentorum pecudumq; pabulo seruntur, vt *Farrago*, quam Græci *ῥεῖς* iv, & *ῥεῖς* iv vocant, generale nomen sit, omnem viridem segetum herbam comprehendens, qua pabuli causa seminatur. Plinius. Seritur ea ex recremento *Farris* prædensa, admixta aliquando & *Vicia*. Eadem in Africa fit ex *Hordeo*. Quod *Far* ferro cæsum, *Farrago* dicta est, aut quod primum cæsum *Farris* segete *Farrago* seri cepta, inquit Varro. *Farraginem* ex *Hordeo* facere docet Columella. Plinius ex *Tritico* *Farraginem* fieri testatur his verbis. Et in *Tritici* genere pars aliqua pabuli est, quadrupedum causa sati, vt *Farrago*. Absyrtus etiam *ῥεῖς* iv, id est triticeam *Farraginem* equulis maximè probat, & ea si non adsit, *κεῖθιν*, quam Eumelus iis refert post trimatum dari solitam. Sic *Secale* *Farraginis* genus est. quando videlicet pecudum iumentorumque in herba feritur, nunc solum & simplex, nunc *Tritico*, aut *Farre* mixto, æquis fere partibus. Miscellaneam hanc segetem Galli *Meteil*, quasi Miscellam vocant: conditionem eandem, excussis etiam granis, *Farraginem* rustici nostrates appellant, quemadmodum & fascies, & manipulos inde compositos *Farreum*, *Fouarre*. Ea per hyemem iumentorum, pecudumque pabulo cedit, quibus etiam pro *Stramine* est. Id causa fuit, cur *Secale* Plinio *Farraginis* genus fuerit. Vt *Triticum*, ita *Secale* duplex est, vnum enim Autumno solum per hyemem in terra nutritur: alterum vèrè seritur. *Secale* folio quam primum prodit rubescit, dein, vt reliqua *Frumenta*, virescit: ex vna radice senos, septenosue, aliquando etiam plures calamos gignit, longos, graciles, quaternis aut quinis geniculis distinctos, Triticeis similes, graciliores tamen, & proceriores. In horum fastigiis spica, quum florent erecta, semine gravida procumbunt, ac deorsum nutant, ideo rubigini, quoniam imbres retineant, oportuna, breuib; & innocentioribus aristis cincta. Granum oblongum, triste, strigosius & nigrius *Tritico*, glumis non opertum, atq; ideo caducum, & sæpenumero spontè exiliens. Calami lenti, flexiles, quibus aqua madefactis vitulum vice vtuntur. Hybernium lætius, æstivum gracilius, paucioribus culmis, spica brevior ac tenuior, granoque levior. Id est Plinij *Secale* de quo sic scribit. Rarum dictu esse aliquid cui prodest negligentia. Id autem quod *Secale*, atque *Farrago* appellatur, occari tantum desiderat. *Secale* Taurini sub Alpibus Asiam vocant, deterrimum (aliq; aterrimum legunt) & tantum ad arcendam famem utile, fœcunda, sed gracili stipula, nigritia triste, sed

Farrago.

Lib. 18. c. 16.

Lib. 1. ca. 31.

Lib. 2. ca. 11.

Lib. 18. c. 16.

Lib. 2. c. 23.

Genera.

Forma.

## SECALE.



Lib. 18. c. 16.

pondere præcipuum. Admiscetur huic *Far*, vt mitiget amaritudinem eius: & tamen sic quoque ingratissimum ventri est. Nascitur quâlicunque solo cum centesi



centesimo grano, ipsumque pro latamine est. Ex quibus illud etiam perspicuum est Secale à Siligine plurimum differre. Nam ut ex Plinio diximus, E siligine lautissimus panis, pistorum opera lautissima: ac rursus Siliginem proprie dixerim Triticis delicias. Candor est, &c. at Secale nigrum est, & ex eo panis ater, pauperumque non lautiorum mensis, ac cibis dicatus. Præterea Siligo eodem Plinio auctore, semper rectam habet spicam, nec rorem continet qui rubiginem facit: contra Secale inclinatam, & deorsum vergentem spicam habet, atque ob id rubigini obnoxiam, ut diximus. In Germaniæ & Galliæ, aliarumque regionum locis plurimis, præsertim Septentrioni subiectis nascitur, qualicumque solo, etiam gracili, macro, & arido, in fecundiore tamen, & lætiore melius, præstantiusque. Secale proximum inter Frumenta à Tritico Triticeisque seminibus locum habet. Panis ex eo factus lentoris atque obstruentis naturæ nonnihil habet: difficile concoquitur: ventriculo grauis est, præsertim si fursurum expers fuerit. Nam Secalinus syncomistos, si probe coctus, benèque fermentatus fuerit, minus lentus est, non admodum agrè conficitur, citòque per aluum labitur, nondum tamen Triticeo syncomisto par, quia eo grauior, & còcoctu difficilior est. Alimentum corpori solidum, ac firmum præbet, nec mali succi, si ex bono Frumento coctus fueit: ex malo verò Frumento & corrupto paratus, prauos & corruptos succos generat. Admiscetur huic non rarò Triticum, ut leuiorem gratioremque panem efficiat, qui Secalino puro minus grauis est, ac lentus, & teneritudinem suam Triticeo diutius seruat. Porro Secale ut medicamentum, Tritico in calefaciendo ac digerendo potentius est. Panis ex hoc ac fermentum, promptius ac citius abscessus maturant ac rumpunt, quam ex Tritico facta. Farina illius confusanea diurnos capitis dolores lenit, in linteo capiti circumligata. Secalis peregrini genera duo sunt Nachani, & Mugo. Nachani mentionem facit Garcias ab horto Capite de Lycio. Frumentaceum id granum est, Sinapi simile, nigrum, minutum, sapore Secalis. Conficiuntur ex huius farina rotundi panes, quibus vescuntur Æthiopes oræ maritimæ accolæ, quæ inter fluuios diui Christophori, & diuæ Luciæ sita est. Ex eadem farina permixta cum ramis tuis Lycij, & scobe nigri cuiusdam Indici ligni, fortassis Ebeni, paratur medicamentum siccans & adstringens, vtile doloribus oculorum leniendis, confirmandis gingiuis laxioribus, & alui pro fluuiio sistendo. Quidam Pollucis cap. 11. lib. 6. *δελνδιον* esse putant, vernaculum semen Æthiopibus, Sefamo simile, è quo factus panis, *δελνδης* nomine, iis cibus familiaris est. Mungo Frumentaceum quoque granum est, Coriandri magnitudine, ante maturitatem viride, nigrum postquam maturuit. Auicennas, cap. 489. lib. 2. & cap. 7. Sectionis 3. lib. 1. *Alex*, sic Arabes pronuntiant, vocat. Integrum, paululum siccatur, cortice detracto in siccitate humiditateque temperatū, cætera proximū naturæ Fabæ. Minus inflat & deterget quàm Fabæ: citius per aluū descendit: minus refrigerat quàm Lenticula: & addito Cardamo in cibo salubrius est. Bonum succum gignit, præcipuè decorticatum, & coctum cum oleo Amygdalarum dulcium. Abiecto priore decocto iterum elixum aluum cohibet, & valentius, adiecto Rhoe, cum acidi Punici succo. Iusculum ex eo paratum cum Oryza incolæ Guzarate & Decan regionum Indiæ, sorbendum agris dant in febribus, post longam inediam, priusquam vsum Triticeï panis concedant, quemadmodum nos Hordei ptisanam. Cum vino, aut Sapa & croco leuat cruciatus articulorum, & tuis vulsis ruptisque auxiliatur.

Lib. 18. c. 9.

Cap. 8.

Lib. 18. c. 10.

Locus.

Vfus.

Vires &amp;

Temper.



Nomina  
Genera  
Theoph. c.  
4. li. 8. Hist.



PIΘH Græcis, Latinis Hordeum dicitur, Arabibus Xahaer, aut Shair, Italis Orzo, Germanis Gersten, Hispanis Cenada, Gallis Orge. Hordei multa esse genera Theophrastus prodidit. Ex Hordei generibus quoddam binos, quoddam ternos, aliud quaternos, aliud quinos, aliud etia cum plurimum senos habet versus: est enim huiusmodi quoddam genus. Quæ pluribus constant versibus, omnino arctiora densioraque posita sunt. Magna est Indici ab aliis differentia, quod in ramos brachietur. Spicæ aliis magnæ & rariores, aliis minores & densiores: & in quibusdam à foliis distantes magis, in aliis minus. Hordei ipsius aliud rotundius & minus, aliud oblongius maiusque, & in spica rarius. Præterea aliud candicat, aliud vergit in purpuram, copiosius farina, & contra hyemem statiusque, ac omnino aërem candido validius. Spicæ Hordei quædam binos ordines habent, inquit Plinius, quædam plures usque ad senos. Grano ipsi aliquot differentia, longius, leuiusque aut breuius, aut rotundius, candidius, nigrius, vel cui purpura est. Ultimo ad polentam, contra tempestates candido maxima infirmitas. Hordeum Columella scribit esse, quod rustici hexastichum, quidam etiam Cantherinum appellant, quoniam & alia animalia, quæ ruri sunt, melius quam Triticum, & hominem salubrius quam malum Triticum pascit. Hoc nullum aliud in egenis rebus magis inopiam defendit. Alterum genus esse, idem scribit, quod alij distichum, Galaticum nonnulli vocant, ponderis & candoris eximij, adeo ut Tritico mistum egregia cibaria familiæ præbeat. Duo nobis hodie nota sunt Hordei genera. Polystichum quod ante hyemem feritur, Gros Orge Galli nominant, Germani Grosz Gersten. Distichum quod vère, nunc Orge simpliciter Galli vocant, nunc Pomole. Ruellius Cantherinum Hordeum dici putat, quod folliculo castratum enascitur. Galli qui ferunt, mundum vocant Hordeum. Huius sponte granum gluma excidit, in reliquis verò generibus non nisi ægrè deglubitur, alioquin

Li. i. Alim.

HORDEVM  
Distichum.

Forma.



Locus.  
Lib. 2. ca. 9.

Tempus.

Li. i. Alim.  
Vfus &  
Vires.

hoc illis simile est. A Galeno Gymnocrithon hoc nuncupatum fuisse, id est nudum Hordeum, quidam arbitrantur. Prodit Hordeum folio in stipula simplici, quam Triticum latiore, scabrioreque: culmo humiliore, ac fragiliore: pluribus articulis, senis, scilicet, aliquando etia octonis, geniculato: spica variè in versum striata, ut dictum est: grana oblonga tenuique gluma inclusa ei firmitus inhaerent: glumæ fastigio arista eminet, ita ut tota spica longioribus, firmitioribus, mordacioribusque aristis quam Triticum rigeat. Radice fibrata firmatur. Nascitur passim in vniuersa ferè Europa. Seritur Polystichum soluta, siccaque terra, auctore Columella, & vel præualida, vel exili, quia constat arua segetibus eius macescere: ideoque vel pinguisimo agro mandant, cuius nimis viribus noceri non possit, aut macro, cui nihil aliud committitur. Distichum seritur quam pinguisimis, sed frigidis locis, circa Martium menssem. Melius tamen respondet, si clementia hyemis permittit, cum seminatur circa Idus Ianuarias. Polystichum ante hyemem ferendum. Hordeum Galeno, non eandem cum Tritico facultatem habet. Siquidem hoc palam calefacit, illud verò non modò non calefacit, sed quoquo modo ipso vtare, siue panes ex ipso feceris, siue



## HORDEVM

Polystichum.



ris, siue ptisanam coxeris, siue polëtam, vim quandam refrigerandi habere videtur. Dissidet præterea à Tritici natura succi specie, quem vtrumque ipsorum gignere consuevit. Siquidem Triticū crassum ac lentum, Hordeum tenuē, & nonnihil detergentem succū in nobis creat. Panes omnes Hordeacei Triticeis minùs alunt: qui tamen ex præstantissimo Hordeo conficiuntur, minus à Triticeis in eo superantur, qui verò ex laxo ac leui, panibus furfuraceis respondent. Panes quidem ex Hordeo sic laxo citissimè per aluū subeunt, quod reliquis etiam manifestum est, si cum Triticeis eos contuleris. Sunt autem non modò Triticeis, verum etiam Olyrinis, & multo adhuc magis Tiphinis friabiliore, nihil in se lentoris, vt illi, habentes. Ex quo perspicuum est, exiguum corpori præbere alimentum, & potissimum si facti ex peiore Hordeo fuerint. Idem rursum: Hordeum primi est ordinis in refrigerando & exsiccando: habet etiā paululū abstersionis, Hordeum quod ait Dioscorides minus quam Triticum alit, absterget, vrinam ciet, inflationem parit, stomacho aduersatur: œdemata cōcoquit. Farina Hordeacea decoquitur in mulsā aqua cum fico, vt in-

Li. 7, simpl.

Lib. 2. c. 79.

flammationes, œdematæque discutiat: duricias cum pice, recina, & fimo columbarum concoquit: cum meliloto autem & Papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intestinorū inflationes cum Lini semine, Fœnogræco, & Ruta imposta iuuat: strumas cum Pice liquida, Cera, Oleo, & impubis pueri vrina, ad coctionem perducit: & cum Myrto aut vino, aut malicorio, aut sylvestribus Piris, aut rubo alui profluuiā sistit: podagricis inflammationibus cum cotoneis, aut aceto prodest: decocta in acri aceto, quo modo Hordeaceum cataplasma, & calida imposta, lepris medetur. Cremor verò farinæ ex aqua, cum pice & oleo decoctus, puri mouendo est: cum aceto subactus, & cum pice, contra articulorum fluxiones prodest. Hæc de Hordeo, & eius farina Dioscorides. Fuit & ptisanæ ex Hordeo & polentæ vsus celeberrimus, ac frequentissimus apud veteres, de quibus nunc differendum. Ptisana à verbo Græco πτισάνη nomen accepit, quod tundere & decorticare significat. Hoc primū quidem generale nomen est frugum omnium decorticatarum, tularumq; & cum diuersarū frugum generibus copulatū, alia atque alia ptisanæ genera significat, id quod iam monuimus, vt χονδροντισάνη ex Zea decorticata ptisanam, & πτισάνη τριτοῦν Triticeā ptisanam. Hippocr. εὖν δὲ τὴν διδόναι γέλης κομίδης ἐνεκα, διδόναι χόνδρον, ἢ πτισάνην τριτοῦν. Dioscorides: πρὸς αὐτὴν καὶ τὴν τριτοῦν πτισάνην ἀρμύζει. Plinius. Italia maximè quidem Oryza gaudet, ex qua ptisanam conficiunt, quam reliqui mortales ex Hordeo. At ptisana simpliciter, & sine adiectione posita, Hordeum excorticatum, ob eius præstantiam tantum significat. Hæc autem, vt ex variis Galeni locis, quorum nonnullos ponemus, colligi potest, hoc modo fiebat, Hordeum in aqua maceratum dum extumescat, in sole siccatur: mox in pila ligneo pistillo tantisper tunditur, dum corticem exuat. Hoc in aqua lento igne coquitur, donec succulentum reddatur. Galenus, quod sciam, aquæ & Hordei mensuram non exprimit. Oribasius vni parti Hordei decem partes aquæ miscet. Paulus vni parti ptisanæ quindecim partes aquæ. Eius parandæ modum tradit Didymus

Ptisana.

Lib. de Af-

fectib.

Lib. 2. c. 79.

Lib. 18. c. 7.

Lib. 1. c. 78.

Lib. 3. ca. 9.



in Geoponicis Calsiani: *πρωσάνης ποίησις, κριθὴν βραχεῖα (πρωσάνη), & ἡλίω ξηραίνε*, εἴτ' ἀποθίβειαι ἔτω, παρεμπάττειαι δὲ αὐτῇ τὸ λεπτόν αὐτῆς. τηρεῖ δὲ αὐτὴν. ἔτι ἡ πρωσάνη ὑγροτέρα λαμβανόμενη, τροφικωτάτη ἔστιν. ἔτω δὲ τὸ ὕδωρ διεκχυλάσιον τῶν κριθῶν μέρσις. Κόπτεται δὲ ἅλῶν ἀκριπῶν εἰς αὐτὴν ἐμπατισμένων, γίνεται δὲ ἐκ σίτης πρωσάνη ὁμοίως. Id est, Ptissanæ cōfectio. Hordeum maceratum tunditur, & in sole siccatur, sicq; reponitur: inspergitur deinde quod ex ipsa est tenuius, quoniam eam conseruat. Ea humidior sumpta maximè nutrit. Vni parti Hordei decem partes aquæ iniiciuntur, & sal friatus ipsi inspergitur. Fit etiam ex Tritico ptissana eodem modo, de qua pauca hæc Plinius. Ptissanæ ex Hordeo vsus vtilissimus saluberrimûsque tantopere probatur. Vnum laudibus eius volumen dicauit Hippocrates clarissimus medicinæ scientia. Ptissanæ bonitas præcipua Vticensi. Eius conficiendæ vulgata ratio est. Multo plura Hippocrates, quem citat Plinius in libro de ratione victus in morbis acutis, qui liber etiam de Ptissana inscribitur, velut ipse Hippocrates in libello de Veratri vsu citat, ac testatur, prodidit his verbis. Ptissana igitur recte omnibus frumentaceis eduleis præfertur in morbis acutis. Laudo sane eos qui ipsam prætulerunt. Nam lentor ipsius lenis est, & continuus, & iucundus, & lubricus: ea verò moderatè humida sitim adimit, & faciliè eluitur, si forte & hoc opus sit: & neque adstrictionem habet, neque malam turbationem, neq; in ventre intumescit. Intumuit enim in coctura, quam maximè tumescere solet. Quicumque igitur Ptissana in his morbis vtuntur, nulla die vasa vacua fieri permittant, vt ita dicam, sed vtantur, & intermittant, si non ob medicamenti, aut infusi per Clysterem vsu, intermittere oporteat. Et qui bis quidem in die cibum capere soliti sunt, eis bis danda est: qui verò semel edere consueuerunt, his semel primo die danda est. Verùm sensim progressu facto, si fieri poterit etiam his bis detur, si sanè opus habere visum fuerit. Ptissanam porro ex optimo Hordeo factam esse oportet, & quàm optimè coctam, & præsertim, si non solo succo vti velis. Nam vna cum reliqua ptissanæ virtute, lubricus lentor facit vt Hordeum decorticatum non lædat. Nusquā enim adheret, neque secundum thoracis rectitudinem moram trahit. Lubrica vero maximè est, promptissime sitim eximit, facillimè concoquitur: & debilissima est optimè cocta, quibus omnibus opus est. Hæc Hippocrates. Quoquomodo Hordeum paraueris, inquit Galenus, nunquam corpus calefacit, sed variè pro modo præparationis humectat, ac siccatur quandoquidem olenta ex frixo Hordeo facta, siccare perspicuè cernitur, Ptissana verò humectat præcipuè quum, vt decet, parata fuerit, hoc est, cum in coctione quamplurimum intumuerit: postea igne lento per multum otium in Chylum, siue cremorem fuerit redacta. Acetum ei tum admiscetur, cum plane intumuerit. Cum verò cocta exactè fuerit, sub edendi tempus salem tenuem iniicere oportet. Oleum autem si initio statim inieceris, coctioni nihil nocueris. Aliud tamen nihil est miscendum, nisi velis anethi, aut porri quippiam, idq; initio statim immiscere. Video autem Ptissanam à coctis omnibus pessimè præparari: In mortario namque crudam ipsam tundentes, non ad ignem coquentes dissoluunt. Sunt qui Amylum etiam iniiciunt, vt per coctionem in cremorem copiosum videatur esse redacta. Talis certè Ptissana meritò maximè est flatuosa, & concoctu admodum difficilis. Quæ verò in ptissana rectè præparanda prætermisi, ea nunc adiciere oportet. Crudam ptissanam aliquandiu in aqua præmaceratam, deinde in mortarium iniectam, manibus, terere conuenit, asperum quidpiam manu tenentibus. Vsq; eo autem terenda, dum qui in superficie est cortex, sit abiectus: is enim quo vestitur, ceu tenui tunica, non totus inter pinsendum abiicitur. Quapropter & præmaceratur, & in mortario tunditur. Quod si nō quicquid est acris deciderit, elixa ptissana magis

Lib. 8. c. 7.

Li. I. Alim.



magis quidem deterget, nullam autem aliam noxam accipit. Pessima est ptissana præparatio, cum vbi coci crudam ipsam in mortario cum aqua contuderint, deinde parū coxerint, sapā iniiciunt. Quidam cum his mel quoq; & cuminum iniiciunt, cinnum quendam veriùs quam ptissanam parantes. Verùm quæ rectè præparata est, vtilitates quas memorat Hippocrates tum sanis, tum ægrotis præstabit. Hæc Galenus de ptissanæ facultate tradidit. Ptissana Dioscoridi, ob cremorem in decoctione redditum plus alimenti præbet, quàm polenta ex Hordeo facta contra acrimonias, & gutturi scabritias, exulcerationesq; pollet. Hodie medici Hippocratis Galenique ptissana non vtuntur, sed eius vice Hordeum integrum suspensa mola decortatum, quod Hordeum mundum vocant, tantisper in aqua decoquunt, dum pultis speciem referat: deinde tundunt, & tenui in cerniculo percolant saccharum addentes, & modo cum saccharo Amygdalarum dulcium cremorem, aut feminis Melopeponum, aut feminis Papaueris, modo aquam ex rosis stillatitiam pro variis scopis, & varia morborum ratione. Fit & hodie à pharmacopæis potio, quam ptissanam *μαλαχυντικός* vocant, Galli *Tisane*, cum nec ptissana sit, nec ptissanæ cremor, sed eius tantum tenuius decoctum, ipsius substantiæ parum, aut nihil retinens. Fit enim ex Hordeo mūdato, Glycyrrhiza, & vuis pæsis. Qua ratione parata potio utilis est iis qui inflammatione pulmonis, partiūque respirationi seruientium, vel renum vesicæq; exulceratione laborant. Nunc de polenta dicendum. Eam propriè Græci *ἀλφίον* vocant: quanquam *ἀλφίον* etiam de omni alia præsertim rudiore farina impropriè dicatur. Quid autem sit, & quomodo fiat, Plinius declarat his verbis. Antiquissimum in cibis Hordeum, sicut Atheniensium ritu Menandro auctore apparet, & gladiatorum cognomine, qui Hordearij vocabantur. Polentam quoque Græci nō aliunde præferunt. Pluribus fit hæc modis. Græci perfusum aqua Hordeum siccant nocte vna, ac postero die frigunt, deinde molis frangunt. Sunt qui vehementius tostum rursus exigua aqua aspergunt, siccantque priùs quàm molant. Alij verò virentibus spicis decussum Hordeum recens purgant, madidumque in pila tundunt, atque in corbibus eluunt, ac siccatum sole rursus tundunt, & purgatum molunt. Galenus ex recenti Hordeo mediocriter frixo laudatissimam fieri polentam scripsit, cuius si copia non sit, & ex alio ipsam confici. Cum autem polenta omnis rectè facta boni sit odoris, eam esse suauè olentissimam, quæ ex optimo ac recenti Hordeo, & quod aristam non admodum siccam habeat, est confecta. Compluribus autè per sanitatē morem esse eam sapa & vino dulci mulsoque commistis, nonnunquam sola etiam aqua conspersam, æstate duabus, tribusue ante balneum horis bibere, dicerèque sentire se hoc potu siti liberari: si autem cum vino austero fuerit pota, ventrem deficcare. Polenta gentes quasdam pro pane vti, idque rusticos in Cypro facere, tamen si frumenti plurimum metant. Veteres militibus polentam præbuisse. Romanos: tamen milites ipsius imbecillitatem damnantes, ea non amplius nunc vti. Exiguum enim corpori alimentum dare, priuatis quidem, & omni exercitatione abstinentibus, satis multum: iis autem qui quoquo modo exercentur, minùs quam satis est. Cæterum cum polenta Hordei frixi farina sit, vt ex Plinio & Galeno diximus, Aetius non dissimilem huic rem descripsit, sed *βρώνη* appellari ait, quod nomen à nullo alio vsurpatum fuisse memini: τὸν *φελόντων*, inquit, τὰς δὲ διήματα ἔστι καὶ τὸ λεγόμενον βρώνη. ἔστι δὲ κεβὴ βεβρεγμένη καὶ βλαστῆσα, καὶ πεφλεγμένη μετὰ τῶν γλαυοειδῶν, ἢ χαλαροειδῶν. Id est, ex eorum quæ tumores cohibent numero, est & id quod Byne appellatur. Est autem Hordeum madefactum quod germinet, vna cum enatis ligulis tostum, si tritum pro cataplasmate imponatur. Hoc nomine Aetius indicat Hordeum ad

Polenta.

L.I. Alim.

L.II. c. 29.



- Cervisiam conficiendam præparatum, quod Maltum vulgo appellant; Germani *Maltz*. Cervisia autem ad cuius decoctionem illud conficitur, Germanis *Byre*, Gallis *Biere* dicta, parum à Byne distat. Laudatissimum fit Maltum mense Martio, & Aprili. Qualitate sicca præditum est, maiore quàm in Hordeo, frigida multò remissiore. Nam empyreuma quod illi ab assatione diutinaque coctione accedit, siccitatem eius auget, frigiditatem verò non solum minuit, sed & caliditatem quandam ei imprimit. Quate Galenus cum scribit Hordeum, quoquo modo quis eo vtatur, siue ptisanam coxerit, siue polentam fecerit, vim quãdam refrigerantem retinere, id de Malto intelligere non potuit, quod partim ipsa germinatione, partim longiore tostione magis à natura sua recessit quàm polenta, quæ vel ex crudo nondumque maturo Hordeo, vel in aqua macerato tantum conficitur. Absterget præterea Maltum Hordeo vehementius, tum quia farinæ minus, glumarum plus habeat, tum ob empyreuma, quod absterfionem coniunctam habet. Ventris torminibus, aliisque similibus ex frigida causa doloribus Maltum subuenit, tostum, feruensque in sacculo appositum. Polenta multo plus Hordeo desiccatur, inquit Galenus, aluum etiam cohibet auctore Dioscoride, & inflammationes mitigat. Tamen in vulgaris Dioscoridis exemplaribus legimus, τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀλευρον κοιλίας καλτικόν, & φλεγμονῶν πρᾶνόν τινόν. Id est, farina ex his aluum sistit, inflammationes mitigat, vt de farina Hordei de qua multa prius dixerat, hæc etiam intelligantur. Sed exemplaria falsò ἀλευρον pro ἀλφίτον habere contendit Cornarius, vt ex Plinio intelligere licet sic scribente. De polentæ generibus in frugum loco satis diximus, locorum ratione, quæ à farina Hordei distat, eo quod torretur. Ad stomachum utilis, aluum sistit, impetûsque rubicundi tumoris, (nempe erysipelatis) Galenus quoque scribit polentam multo magis quàm Hordeum siccare. Sed quoniam ad τὸ ἀλφίτον, id est, polentæ discrimen ὡμὴ λύσις, & composita voce ὡμὴ λυσις dicta esse videtur, quid ea sit etiam hic explicandum. Polenta igitur Hordei tosti farina est. ὡμὴ λύσις Galeno, & reliquis medicis Græcis, cruda Hordeacea farina est: ideoque Plinius ait, Polentam à farina Hordei distare, quia torretur. ὡμὴ λυσις cruda Hordeacea farina est nulla alia re admixta. Id ex eo perspicuum fit, quod ubique in eius usu res & liquores exprimuntur, quibus ea farina excipi, & cum quibus subigi, parari, & coqui debeat. Quare falsum est ὡμὴ λυσις semper significare crudam Hordeaceam farinam aqua & oleo subactam, quod in ἐπιγυγῆς libello Galeno falsò attributo legitur. Neque solum cruda Hordeacea farina per ὡμὴ λυσις significatur, sed etiam Triticea. Quapropter nonnunquam ei vocem adiiciunt, quæ certam farinæ speciem indicet. Galenus: καταπλάσσαι δὲ χρὴ κεβνὴν ὡμὴ λύσιν. In Cataplasmate verò vtere Hordeacea cruda farina. Quin & sola hæc vox ὡμὴ λύσις Hordeaceam crudam farinam significat, vt paulo post, ἢ τῇ ὡμὴ λύσιν δὲ ὀξύμενδος γενομένη. Aut cruda Hordeacea farina cum Oxymelite apparata. Idem alibi ἢ τῇ ὡμὴ λύσιν κεβνὴν, ἢ πυρενὴν ἐν γλυκεῖ ἐφομένη. Aut cruda Hordeacea farina, aut Triticea, in passo cocta. Neque solum ὡμὴ λυσις, de cruda Hordeacea farina, aut Triticea vsurpatur, sed vniuersè de omni cruda farina. Galenus. Καὶ ὡμὴν λύσιν ἐπιθέον, τὴν διαλυμένην κεβνὴν ἀλεύρι, ἢ διαλινωσάμεν, ἢ τήλεος, ἢ καὶ μέγμα ἐκ τούτων. Quin & omelysis ex cruda Hordeacea farina imponenda, aut ex farina seminis lini, aut farnigraci.

AVENA



## A V E N A . C A P . X I I I .

**B**ΡΩΜΟΣ & βρόμος Græcis, Avena Latinis dicitur, Arabibus Chur-  
 tal, Italis Vena, Germanis Habern, Hispanis Avena & Auea, Gallis  
 Avoine, Angl. Oetes, Etes, & Hauer. De Avena satiua hîc agimus. Est  
 & sponte proueniens, ex hordeo degenerante, Ægilops nuncu-  
 para, de qua postea dicemus. Est etiam βρόμος herba. Avena culmo est genicu-  
 lato, folio Tritico ac Zeæ simili, in cacuminibus pendulas veluti paruas bipe-  
 des locustas gerit, quibus semen oblongum, superiore parte exiguis capillis  
 hirsutum, ac glumis inuolutum continetur. Radices habet copiosas, ex quibus

## A V E N A



multi enascuntur culmi. Passim nascitur Aue-  
 na & vère sata, ætatis fine demetitur. Dio-  
 scorides de Bromo hæc scripsit. Bromus cul-  
 mus est Tritico similis etiam foliis, sed geni-  
 culis distinctis. Fructum autem habet in sum-  
 mo, velut paruas locustas bipedes, in quibus  
 semen est vtile ad cataplasmata, quæadmodû  
 hordeum. Sed & pultem ex ipso faciunt, quæ  
 aluum sistit. Cremor autem ex ipso à tussien-  
 tibus commodè sorbetur. Quæ herbarij, opi-  
 nor, omnes de Avena nostra satiua scripta es-  
 se intelligunt. Verùm Plinius de Bromo quâ-  
 uis ita scribat, vt & ipsum inter vitia segetis  
 ponat, & cum Ægilope confundat, tamen  
 eadem quæ Dioscorides de ipso tradit. Sic  
 enim ait: Nascitur inter vitia segetis, Avena  
 genus: folio & stipula triticum imitatur. In  
 cacuminibus dependentes paruulas veluti lo-  
 custas habet. Semen vtile ad cataplasmata,  
 æquæ vt hordeum, & similia. Prodest tussien-  
 tibus succus. Theophrastus Bromû & Ægi-  
 lopa velut syluestria & immitia eo loco pro-  
 pônit, quo rê hanc frumentaceâ multum illu-  
 strat. Τῶν δὲ ὁμοιοτύπων καὶ ὁμοιοκρίτων, οἷον ζείας τίφης, ὀλύρας, βρόμου, ἀγίλωπος, ἰχυρό-  
 τερον ἐν μάλιστ' αὐτοῖς ἐστὶν ἡ ζεία, καὶ ὁ πολὺ ῥιζόν, καὶ βαθύ ῥιζόν, καὶ πολυχάλαμον. ὁ δὲ  
 χαρπύς κουφότατος καὶ προσφιλέστ' αὖτις τοῖς ζώοις. τῶν δὲ ἄλλων ὁ βρόμος πολὺ ῥιζός. καὶ ὁ  
 πολυχάλαμος. ἡ δὲ ὀλύρα μαλακώτερον καὶ ἀσθενέστερον τούτων. ἡ δὲ τίφης πάντων κουφότατος, καὶ  
 καὶ ἡ μονοχάλαμος. διὸ καὶ χάραν ζῆται λεπτὴν, ὥς ὅτι ὡς περὶ ἡ ζεία πείθειται καὶ ἀγαθὴν. ἔστι δὲ δύο  
 ταῦτα καὶ ὁμοιοτάτα τοῖς πυραῖς: ὁ τ' ἀγίλωψ καὶ ὁ βρόμος, ὡς περὶ ἀγρί' ἀπὸ καὶ ἀνήμερα· ἐπιχαρ-  
 πίζεται δὲ καὶ ὁ ἀγίλωψ σφόδρα τὴν γῆν. καὶ ἔστι πολὺ ῥιζόν καὶ πολυχάλαμος. ἡ δὲ αἶρα παυελῶς  
 ἀπὸ γῆνιόν. Id est, inter ea que Tritico & Hordeo similia sunt, velut est Zea, Ti-  
 pha, Olyra, Bromus, Ægilops, robustissima est Zea, & maximè terram ex-  
 haurit: nam & multas & profundas radices habet, & culmum, multum verùm  
 fructus leuissimus est, & omnibus animalibus gratus. Inter reliqua verò Bromus  
 multas radices agit: etenim multos etiam hic culmos habet. At Olyra mollior  
 & imbecillior his est. Tiphæ verò omnium leuissima est: vnumque tantum calamum  
 habet. Quare etiam terram desiderat tenuem, non quemadmodum Zea pin-  
 guem, & bonam. Sunt autem duo hæc etiam Tritico similia Ægilops & Bro-  
 mus, veluti syluestria quædam, & immitia. Exhaurit autem Ægilops vehemen-  
 ter terram, multasque radices, & multos culmos habet. Lolium verò penitus  
 syluestre est. Hæc Theophrastus. Caterum quemadmodum χόνδρος & χονδροπύριον

Nomina

Genera.

Forma.

Locus.

Tempus.

Corn. Em-  
bl. 82. lib. 2.  
Li. 22. fine.Lib. 8. Hist.  
cap. 9.



- σάνη, & πυρίνη πλιωσάνη ex Zea & tritico fiebant, & πλιωσάνη ex hordeo, & πράγος ex olbyra, sic βρόμος ex Avena paratum edulium, veteribus videtur fuisse, id quod Paulus ostendit. Cum enim ptissanæ coquendæ modum declarasset, subiungit, παραπλησίως ὅ τῇ πλιωσάνῃ & ὁ βρόμος & ὁ χόνδρος ἐψείλει. Id est, eodem autem modo quo ptissana Bromus & Chondrus decoquuntur. Quare βρόμος vtralia segetum genera quæ diximus, & frugis speciem quam Auenam nominamus, & rem ex ipsa factitiam significabit. Galenus Bromum iumentorum alimentum & pabulum esse scripsit, non hominum, nisi aliquando extrema fame ad panes ex eo quoque semine conficiendos compellantur. Citra famem autem coctus Bromus ex aqua manditur cum vino dulci, aut sapa, aut mulso, non aliter quam Typha. Caliditatis autem satis particeps est ut illa, quamquam non æquæ est durum: ex quo minus quoque corpus nutrit. Panis qui ex Avena fit alioqui est insuavis, non tamen aluum aut sistit, aut proritat, sed quod ad id saltem attinet, medium locum obtinet. De eodem ut medicamento hæc etiam Galenus. Bromus vnum est ex leguminibus, quod ut medicamentum, similem hordeo vim obtinet: nam illitum deficcat, & digerit mediocriter, & sine morfu. Temperiem autem habet paulò frigidior, non nihil etiam adstrictionis obtinet, ut ventris profluvia iuuet. Quo Galeni loco, legitur, βρόμος ἐστὶ μὲν ἐν τῶν ὀσπρίων, cum σιτηρῶν pro ὀσπρίων legendum videatur. Id est, Bromus est quidem vnum ex frumentaceis, ut frumentaceorum à leguminibus distinctio obseruetur, nisi quis dicat Galenum aliquando sine discrimine his vocibus usum fuisse, cum & Panicum legumen appellet, & Alicam, & ptissanam. Quod Dioscori. pultem è Bromo fieri tradit, idem Plinius scripsit. Primum omnium, inquit, frumenti vitium auena est, & hordeum in eam degenerat, sicut ipsa frumenti fit instar, quippe cum Germaniæ populi edant eam, neque alia pulte viuant. Quod Plinius ait Germanos auenaceam pultem edere, etiam hodie verum est, sed quod non alia pulte viuant falsum. Nam & crassiore tum Zeæ, tum tritici farina quam crimnon vocant, Germani vtuntur, & ex ea pultem modo crassiorem, modo tenuiorem ac sorbilem faciunt. Sic etiam ex Avena crassiorem farinam instar crimni faciunt, quam cum aqua coctam addito butyro edunt, aut sorbēt, & ex eiusdem farina tenui pultem parant. Quin & in Saxonia magna, farina auenæ crassior, quam ipsi Gorte vocant omnibus fere obsoniis aspergitur vnà cum sale, & sic simul coquitur. Auenæ farina, ut Plinius ait, decocta in aceto nauos tollit.

## BROMVS,

## CAP. XIII.



B Avena sativa vsu tantum Bromus differt, quæ inculta est & neglecta, non genere, nec figura, nec nomine: dicitur enim etiā βρώμος, & βρόμος. Herba Dodo. Histor. stirp. lib. 4. cap. 46. & in frument. ca. 63. Sed ut ab Auenâ discernatur, βρώμος πόνος vocatur, id est Bromus herba, siue Avena herba, Gallis *Aueron*, vel *Aueneron*, Italis *Vena-vana*, id est *Auena cassâ*. Tota natura habitûque ipso sylvestris quædam Avena est, multiplicibus, & geniculatis culmis, foliisque eam referens; vtrisque tamen tenuioribus: spicæ à sese magis dissitæ aristas asperiores longioresque habent: semen euavidum in tuniculis fermè vacuis, quare steriles Auenas dixit Virgilius. Radix copiosa est, ac tenuis. Aestate secus vias & agrorum margines reperitur. Huic valde affinem Bromum sterilem alteram Lobellius facit, quam Dodonæus Aegilopem, seu festucam alteram, Germani *Dort*, & *Lulch*, Belgæ *Draulich* appellant. Culmis foliisque Secale refert: ex culmorum vertice pendulæ conspiciuntur spicæ, Auenæ propemodum similitudine, sed breuiores, & arctius coniunctæ. Semina oblonga sunt





ga sunt, longitudine graui secalini, sed angustiora, tenuiora, leuioraque multo, quæ vtriculis paruis continentur. Proprie secalis est vitium: neque enim cum aliis frugibus, aut rarissimè reperitur. Crescit, veluti alia eius generis per imbres frequentes, hiemis annique constitutionem clementem, & tepidam. In Secali & agrorum marginibus reperitur apud Belgas. Matthiolus Aegylopi primæ nomine depinxit. Bromus herba, auctore Dioscoride, exiccatoriam vim habet: decoquitur cum sua radice ad terrias, & iuri colato par modus mellis addiicitur: rursus incoquitur, dum liquidi mellis crassitudo fiat. Linteum ex eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam vlcerum efficax est. Aliqui tritam Aloen addunt, & eo modo vtuntur. Cum siccis rosis cocta in vino grauem oris halitum emendat.

Li. 4. c. 126

ÆGILOPS, CAP. XV.



ΑΓΓΙΛΩΨ Græcè, & Latinè Aegilops dicitur, à Plinio festuca, Arabicè *Dausir*, *Dalifir*, *Desana*, *Dausir*, siue *Dasser*, Italicè *Egilopo* Aegilops inquit Dodon. folio est tritici, sed culmo tenui spicaque siue iuba Auenæ similis est: grana eius oblonga sunt, hirsuta, subrubra, folliculo inclusa, ac tenuem capillaceam, longamque aristam habent. Brabant *Ghebaerde euene* vocant, quasi dicas auenam aristas aut barbula donatam, quæ cum Dioscoridis descriptioni consentire videntur, sic enim ille. Aegilops herbula est folia tritici similia habens, sed molliora, in summo capite semina bina, ternæue rubra, in quibus aristæ veluti capilli exeunt. Lobellio non Aegilops, simpliciter, sed Aegilops Bromoides Belgarum dicitur inter Aegilopem & Bromum media, priori Bromo aut Aegilopi similis. In Anglia, Belgio & Gallia inter Hordeum & Secale frequēs occurrit. Num eadem quæ Aegilops præster, hætenus incompertum. Aegilopem aliam Narbonensem pictam ostendunt

Nomina

Forma

Li. 4. c. 134

Lobel



*ÆGILOPS* Dodon.

L. 18. ca. 17.



Li. 1. Alim.

Lobellius & Matthiolus, quæ nascitur inter triticum & hordeum agri Narbonensis & Galloprovinciæ, æstuosis & glareosis marginibus qualem Dioscorides delineat, herbulam sesquipalmum aut duos palmos altam, foliis triticeis, exilibus, spica exigua, breui, duo plurimum, interdum tria grana ferente, glumis conclusa striatis, & aristis ex singulorum granorum apice, non ex spica emergentibus: grana hordeacea sunt, radix triticea, pusilla. Adicit Pena se nō semel expertum agilopi morbo potius cæpto quàm iam longius professo profuisse. Exicat enim adstringendo citra calorem multum. Semina potui cereali indita remulentos homines faciunt. Est autē veterū Aegilops auena quæ sua sponte provenit & ex hordeo in eam degenerante fit, atque ob id frumenti vitium à Plinio dicitur, vbi etiam non aliter hordeū à festuca quæ vocatur Aegilops enecari dicit, quàm triticum ab Aera, id est lolio, & cicer & eruum ab herba quæ inde orabanche appellatur. Galenus quoque in Tritico frequens lolium inueniri scribit, in hordeo vero reperiri sed parum, Aegilopem autem in hordeo frequentem esse, cum prima generatio vel incrementum ipsis non rectè successerit. Porro patrem suum arate iam declinante cum agricultura delectaretur, Triticum ac Hordeum aliquando seminasse omnibus diuersi generis seminibus, quæ ipsi erant admista, diligenter selectis, quò certo

*ÆGILOPS* LOBELLII,

&amp; Pena.

*ÆGILOPS* SECUNDA

Matth. radice &amp; foliis diuersa.



cogno



cognosceret, num ex ipforum mutatione lolium & Ægilops nascerentur, an propriam hæc quoque semina naturam haberent. Cum autem fortè vna cum puris seminibus in Triticum quidem frequens Lolium, in hordeo autem parum, sed magnam Ægilops vim natam conspiceret, in aliis quoque seminibus idem experiri esse aggressum. Ægilops discutiendi vim habet auctore Galeno, id quod ex gustu cognoscitur: leuiter enim acris est. Verùm & ex eo liquet, phlegmonas induratas & Ægilops eam sanare. Est autem Ægilops abscessus inter magni oculi angulum & nasum, qui si neglectus fuerit in fistulam abit, vsque ad os progredientem. Archigenes apud Galenum, ad ægilopa succum herbarum Ægilops cum melle illinit. Item Dioscorides illitram cum farina herbam Ægilops mederi scripsit, duritiâque discutere. Succum farinæ admistum siccari, & eorundem gratia reponi. Ægilops, inquit Plinius, sanat herba eodem nomine, quæ in hordeo nascitur Triticifolio, semine contrito cum farina permixto impositoque, vel succo. Exprimitur hic è caule, foliisque prægnantibus, dempta spica, & cum trimestris farina digeritur in pastillos.

Lib. 6. sim.  
Vires &  
Temper.

Li. 5. ph. lo.  
cap. 2.

Li. 25. c. 13.

ORIZA.

CAP. XVI.

**O**RYZAM τῶν σιτηρῶν εἶδος εἶναι, id est frumentaceorum generis esse scribit Dioscorides. Galenus inter legumina recenset. Legumina, inquit, appellant ea cerealium semina ex quibus panis non fit, ut puta, fabas, pisas, ciceras, lentas, lupinos, Oryzam, & cætera. Vt ὀρυζα Græcis, ita Latinis Oryza nominatur, Theophrasto ὀρυζον neutro genere, Arabibus Arz, seu Arzi, Gallis Rys, Italis Rizo, Germanis Rheisz, Hispanis Arroz, Anglis Rist. Oryza foliū profert arūdinaceū, carnosum, porraceo haud absimile: culmum cubitalem & sæpe maiorem, geniculatum, Triticum crassius, firmiusque, in cuius fastigio iuba oritur, siue spica in ramulos diuisa, in quibus semen vtriusque impari exortu prouenit, cortice subflauo, tectum, aspero, veluti striato, cui figura, quod gluma excussa candidum est. Plinius similiter Oryzam describit. Oryza quidem folia carnosæ, Porro similia, sed latiora: altitudo cubitalis: flos purpureus: radix gemmæ rotunditatis. In palustribus riguiisque nascitur, inquit Dioscorides. Peregrinum initio semen, ex Indiâque allatum. In Bactrianis quoque ac Babylonia & Suside, atque Syria inferiore nascitur. Nunc in Italiâ & Pedemontanæ provincie multis, & in quibusdam Gallie locis gignitur, sed copiosissima in Asia, Syria, & Egypto. Oryza auctore Dioscoride, mediciter alit, sed alium supprimit. Semine hoc, inquit Galen. omnes in sistenda aluo vtuntur, ipsum eodem modo quo Alicam coquentes: difficilius tamen quàm alica conficitur, & minus alit, & vtrique in edendi suauitate ab ea quamplurimum vincitur. Idem alibi. Oryza habet adstrictorium quidpiam: quare mediciter ventrem sistit. Italici maximè Oryza gaudent, inquit Plinius, ex qua ptisanam

Lib. 2. c. 88.  
Li. 1. Alim.

Nomina  
Lib. 4. Hist.  
cap. 5.

Forma  
Matthi. in  
c. 88. lib. 2.  
Diosc.

Lib. 18. c. 7.

Locus.

Lib. 2. c. 88.  
Vires &  
Vires.  
Li. 1. Alim.

Lib. 8. sim.  
Lib. 18. c. 7.



crater ventrem sistit. Italici maximè Oryza gaudent, inquit Plinius, ex qua ptisanam



Lib. 2. Ser.  
fat. 3.

Li. 4. Hist.  
cap. 5.

Matt. in c.  
88. l. 2. Dio.

fanam conficiunt, quam reliqui mortales ex hordeo. Vnde apud Horatium medicus ait, Agedum sume hoc ptisanarium Oryzæ, quod videlicet ptisana modo præpararetur. Hodie verò ex Oryza puls fit, in qua solidæ ipsius partes manent, eaque datur in cibum, non autem eius succus, cuiusmodi hodie fieri consuevit hordeacea ptisana in qua nihil inest præter aquam, & hordei cremorem. Theophrastus hæc de Oryza tradidit. μάλλον ὃ σπείρουσι τὸ καλὸν ὄρυζον, ἐξ ὃ τὸ ἐψιμα. τοῦτο ὃ ὁμοιον τῇ ζείᾳ, καὶ περιπλισθὲν ὅσον χόνδρος, εὐπεπτον διη, τὴν ὄψιν πεφυκὸς ὁμοιον ταῖς ἀίραις, καὶ μένει τὸν πολὺν χρόνον ἐν ὕδατι. ἀποχέεται ὃ οὐκ εἰς τράχυν, ἀλλ' ὅσον φάβην, ὥσπερ ὁ κέγχρος, καὶ ὁ ἔλυμος. Id est, serunt potissimum Oryzon ex quo iuscula parant. Hæc Zeæ similis est, tusaque veluti Alica facilè concoquitur, aspectu lolio similis. Diu in aqua manet, effunditur non in spicam, sed veluti in iubam, Milij, aut panici modo. Oryza in lacte bubulo, aut amygdalarum cremore, aut carniū pingui iure decocta, concoctu facilior est, & ori gravior. Vtilis cibus est dysentericis, celiacis, & diarrhœa affectis, præsertim si prius torrefacta, lacti in quo igniti calculi fuerint extincti, incoquatur. Sunt qui Oryzam quoque dicant genitale semen augere, in bubulo lacte decoctam, addito saccharo, & cinnamomo. Oryzæ decoctum vtiliter dysentericis infunditur, ac etiam potandum datur. Farina cataplasmatibus repellentibus rectè admiscetur: mammarum incipientes inflammationes arcet.

## MILIVM,

## CAP. XVII.

Nomina



ΕΓΧΡΟΣ Græcis, & Straboni κέγχρος, Hippocrati πασάλη, ut vult Hermolaus, Galeno πάσπαλος non πασάλη, nam in Glossis Hippo. πασπαλέτης exponit κέγχραλέτης, & addit, πάσπαλος ὃ κέγχρος. Latine Milium dicitur, Arabicè *Ieuers*, *Geguers*, siue *Giauers*, Italicè *Miglio*, Germanicè *Hwfe*, Hispanicè *Milho*, & *Mijo*, Gallicè, *Mil*, & *Miller*, Milium à Miliaria summa deriuatum Festus existimat, non à Græcis. Contra Varro à Græco deducit, nam id Melinen, inquit vocant: cum tamen Dioscorides & Galenus Melinen Panicum intelligant. Farinam miliaceam, seu fractum Milium, inquit Herimolaus, sunt qui scrutū vocari putent in Horatij versu illo.

Carol. 107.  
libr. 2.  
Libr. 1. Epi.  
7. Epist.

*Vilia vendentem tunicato scruta popello.*

In Persa.  
Scena ter-  
tia, quo in  
loco pletti-  
que omnes  
legūt: Cō-  
misce mul-  
sum: stru-  
thea, colli-  
biaque  
appara.  
Li. 3. ca. 14.

Sunt quibus vasis appellatio ea potius esse videatur, ex scroto id est corio confuti, vel esculenti quoddam genus lecytho contrarium, ut Plautus quoque scrutea & Collubia in hunc fortè sensum appellauerit: vel in Horatio fortè non scruta, sed scruta legas pro vasculo rustico, vnde Scutriscum Catoni sæpe numero dictum. Sed nihil horum scruti nomine significari, imo vetera & fracta ferra-menta, pannos veteres, vasa dimidiata, & cætera Lucillius apud Gellium demonstrat his verbis. Quidni? & scruta quidem, ut vendat scrutarium laudat. Præfractam strigilem, soleam improbum dimidiatam. *χρύτη* & *χρύδρια* nominant Græci. Vnde *χρύστρωτης* qui vasa fracta & similia vendit. A Milio quoque miliaria aues dictæ, ut Varroni placet, quòd ad hanc frugem turmatim se conferant, eaque vefcentes saginantur. Vulgus nostrum Hortulanos appellat, obiecto Milio in caueis sic pinguescentes, ut vel obefiore corpore suffocata moriantur, vel in necatis nihil aliud spectetur quam adipis moles. Lugduni aucupes ad epularum delicias alunt, magnòque vendunt: & quamvis cenchridi aui nomen videatur Milium indidisse, eam tamen miliariam non esse certum est, cum cenchridem, ut refert Plinius, accipitrum generis Græci faciant, quàm Latini Tinnunculum à voce & sono, vocant: Galli vero. *Quercerelle*, vulgo bene cognitam, quòd in altis vrbiū turribus nidificet. Sed ad rem redeamus. Milij nostratis historiam primū ponemus: deinde Milij Indici, cuius genera duo.

Milium



*MILIVM nostras.*



Milium nostras in frumentaceis, iis que frugibus ex quibus panes fiunt, à Galeno & Dioscoride numeratur. Radicem numerosam habet, altam & duram: multiplici culmo fruticat, cubitali, crasso, geniculato, lanuginoso. Folia gerit ampla ac arundinacea. E summis caulibus nō spicas, sed effusas pmit iubas, seu paniculas lōgas, diuulsasque, & in terram pronas, ac reflexas. Milij comæ, inquit Plinius, granum complexæ fimbriato capillo curuantur. Theophrastus iubam siue comam *ποσην* appellat. *ἡ δὲ χαλαρώδης ἀπόφυσις*, inquit, *ποσην*. In iubis illis copiosum gignitur semen, paruum, rotundum, durum, splendens, & subflauum, tenui tunica vestitum. Milium leuē solutāque terram desiderat, nec in sabuloso solum, sed & in arenoso quoque prouenit, modo vel humido cælo, vel riguo solo: nam siccum cretulosumque reformidat, vt ait Columella. Ante ver commodē feri non potest: quoniam temporibus maximē lætatur. Vltima tamen parte mensis Martij commodissimē terræ commit-

*Forma.*

Li. 18. ca. 7.  
Lib. 8. Hist.  
cap. 3.

*Locus.*

Li. 2. ca. 9.  
*Tempus.*

Li. 18. ca. 7.

lib. 1. ca. 57.  
Li. 1. Alim.

*Ufus.*

Li. 18. ca. 10.

Li. 18. ca. 7.

Lib. 2. ca. 9.

In ca. 90. li.  
2. Dioscor.

Lib. 2. c. 90.

*Vires &*

*tempera.*

Lib. 7. sim.

tur. Plinius Miliū inter frumenti quoque genera verna connumerat. Milium Theophrastus refert siccitate sua diuturnum esse: idem plus annos centum durare, si quō ventus & aer non perueniant, condatur, auctor est Varro. Milio nōnumquam in panē vtuntur, urgente frugum penuria, inquit Galenus, panis tamen ex eo exigui estimenti, & refrigerans. Constat insuper præaridum, & instar arenæ friabilem esse: nihil enim in se habet pinguitudinis, & lentoris. Iure ergo aluum humidiorē exiccat. Agricola, huius farina cocta, admisto adipe suillo, & oleo vescuntur. Panem etiam & pultem ex Milio fieri testatur Plinius, cū scribit. Milio Campania præcipuē gaudet, pultrēque candidam ex eo facit. Fit & panis prædulcis. Sarmatarum quoque gētes hac maximē pultrē aluntur: & cruda etiam farina equino lacte, vel sanguine ē cruris venis admixto. Hæc puls etiam Germanis hodie in vsu est, cum lacte cocta butyro addito, & saccharo plerumque asperso. Alibi Plinius panis, inquit, multifariē & ē Milio fit, ē panico rariū. Sed nullum frumentum ponderosius est, aut quod coquendo magis crescat. 1 x. pondo panis ē modio redeunt, modiusque pultrē ex tribus sextariis madidis. Panis ex Milio conficitur, inquit Columella, qui antequam refrigescat, sine fastidio absumi potest. Sed quamuis panis ex Milio nisi in magna reliqui frumenti penuria non fiat, ait Galenus, tamen is dum recens est, vt scribit Matthiolus, & à pistore recte paratus, vt Veronæ fit, & ita calidus vt ē furno excipitur, deuoratus sua quadam suauitate placet, & à multis expetitur. Cum verò obduruit, planē ingratus est. Siluicola Tridentini sola pultrē miliacea quam vulgō polēnta vocant, aluntur, eam cum lacte edentes. Milium inquit Dioscori, in panes coctum minus ceteris frugibus alit: sistit pultrē sua aluum: vrinam cit. Torretur Milium, seruēnsque in sacco ponitur, vt torminibus reliquisque doloribus, si ægra pars foueatur, auxilio sit. Milium Galeno primo ordine refrigerat, exsiccat verò tertio exoluto, aut certē secundo intenso: habet etiam paululum tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura instar edulij comestum, plane inter omnia frumentacea minimū confert nutri-

M



Li. 2. ph. 10.

Libr. 2. de  
victus rat.  
morb. acu.


Li. 22. c. 25.

menti, sed & ventrem siccatur. Porro foris impositum in sacculis, idoneum est fomentum iis quæ citra morsum exsiccari postulant & cataplasmatibus modo illitum exsiccare potest. Attamen admodum friabile est. Proinde difficilis est eius in cataplasmatibus usus. Idem alio in loco fomēta ex Milio in capitis dolore laudat, quod ut ait Hippocrates, leue ac lenē sit Milium. Sic enim ille scribit: Πυρήν ὀξυρρὴν, ἄλες, κέγχροι ἀεφρυγμένοι ἐν ἐπίοις μάρου πύλοιω ἐπὶ τῇ δεινύτῃ: καὶ ὁ κοῦρον καὶ ἀφροσύνης ὁ κέγχρος. Id est, fomentum siccum ex sale ac Milio torrefactis, ac laneo marsupio exceptis accommodatissimum. Etenim leue ac lenē Milium est, quod Plinius leuissimum ac mollissimum esse dixit. Milio sistitur aluus, discutuntur tormina, in quē usum torretur ante. Nēruorum doloribus, & aliis feruens in sacco imponitur, neque aliud vtilius, quoniam leuissimum mollissimumque est, & caloris capacissimum. Itaque talis usus eius est ad omnia quibus calor profuturus est, farina eius cum pice liquida serpentium, & millepedæ plagis imponitur. Hæc Plinius. Milium igitur ad flatus repellendos fomentum est optimum, præsertim si cum sale commixtum fuerit. Quin & præstantius redditur additis chamæmeli floribus. Milium medicamenta & carnes, si in eius aceruo sepeliuntur, à carie & putredine diutius vindicat.

## MILIVM INDICVM, sive MELICA. (AP. XVIII.)

In c. 91. lib.  
2. Dioscor.

**S**UNT alia quoque Milij genera peregrina, Indici meminit Plinius his verbis. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam inuectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolefcit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis, Phobas vocant, omnium frugum fertilissimum. Matthiolum istud frugis genus esse existimat quod vulgo Melica dicitur, Insulribus *Meleca*, Hetruscis *Sagina* aliis Italiæ populis *Sorgo*, aperteque hallucinarum fuisse Ruellium, cum feri-

MILIVM INDICVM,  
sive Melica Matthio.MILIVM INDICVM,  
sive Melica Dodon.

bit



bit Panicum in Italia Melicam appellari, cùm hæc appellatio nusquam in Italia panico sit indita. Ei fortasse errandi occasionem præbuit nominis Melicæ & *μελις* siue *μελις* vicinitas, quæ fecit vt Panicum cum *Sorgo*, & huius descriptionem cum illius descriptione confuderit. Germani *Sorgsamen*, vocant, Luitani *Milium Saburum*, Dodonæus Panicum Indicum, alij Panicum peregrinum, id ex Panici genere esse existimantes, quorum certè probabilior est opinio, quàm Fuchsj, qui Farris genus facit, cum quo similitudinem nullam habet, cum Panico verò aliquam: sed illi cum Milio magis conuenit: quam ob causam Milium Indicum Plinij Matthiolus esse putat, vt diximus. Est autem Melica, vt vulgari vtar nomine, frugis genus tribus, quatuor, aut pluribus asurgens culmis, arundinaceis, præaltis, septem octo nonnumquam decem pedum altitudine, vel maiore, nouem articulis plurimum distinctis, medulla candida farctis. Folia è singulis geniculis exeunt cubito longiora, tres quatuorve digitos lata. Panículas in summis culmis profert, dodrantaes aut longiores, rectas, non inclinatis, granis multis confertas, Milio maioribus, ac Lenti ferè paribus, alias minus, alias magis in rufo nigricantibus. Radicibus firmatur multis, validis ac fibratis. Tota planta arundinem prorsus refert, adeo vt agri in quibus ad maturitatem vsque Melica adoleuit arundineta procul esse videantur. Culmi & spicæ semine maturescence rubescunt. Solum amat pingue & humidum. Gignitur in Italia, Hispania, & aliis calidioribus regionibus. Ex æstiuis fementibus est: Autumno maturescit. Legitur granum à rusticis, moliturque in farinam, ex qua panem faciunt. Hetruria tamen potius ad columbarum gallinarumque saginam serit, quàm ad hominum alimentum. Ex huius Milij Indici culmorum medulla fit medicamentum ad strumas præstantissimum hoc modo. Ex decem culmorum huius internodiis extrahitur medulla, quæ cum spongia noua, integra, rubentéque comburitur. Hæc in puluerem, teruntur additis piperis nigri granis duodecim. Huic pulueri admiscetur triticæ farinæ vncia. Deinde omnia ouo recente excepta in placentam conformantur, quæ sub feruentibus cineribus coquitur. Ea in sex partes diuiditur, quæ Luna decresciente alternis diebus strumoso dormitum ituro edendæ præbentur, nullo addito potu. Idem altera & tertia Luna repetitur. Hoc medicamento multos curatos esse scripsit Matthiolus. Idem auctor est flores qui ex rubris huius milij Indici paniculis excutiantur, drachmæ pondere ex rubro vino haustros rubra sceminarum profluvia sistere, quemadmodum albos flores ex paniculis albis exceptos albos vteri fluores cohibere. Item dari vtiliter dysentericis, & aliis fluxionibus alui affectis. Idem quoque præstare granorum putamen, oui vitello probè decocto exceptum, & à ieiunis deuoratum. Aliud Milij Indici genus à Iacobo Antonio Cortuso nobili Parauino ad se missum scribit Matth. quod culmis, foliis, paniculis superiori simile est, sed eo pulchrius, & præstantius, glumâ faciliè exuit, meliorq; ex eo fit panis. Milij generibus Dodonæus adscribit plantam quam recentiores Lacrymam Iob seu Christi nominât, de qua cum Lithospermis dicemus.

Lib. 2. c. 28.

Nomina

Lib. 4. c. 12.  
In Histo.  
plant. 295.

Forma  
Melica.

Locus.

Tempus.

Vsus &  
Vires.

Ibidem.

In ca. 91. li.  
2. Dioscor.  
Histo. fru.  
cap. 24.

PANICVM, CAP. XIX.

**P**ANICVM Græcis, Latinis Panicum appellatur, Arabibus *Dochon*, Italis *Panico*, Germanis *Pfenich*, & *Heydelpfenich*, Hispanis *Panizo*, & *Paniso*, Gallis *Panis*, & *Panic*. Dicitur etiam *μελις* testibus Dioscoride & Galeno, *μελις* Diocli, Plinio *Melfrugum*, quæ vox è Meline sumpta melleum quidpiam significat non autem, nigrum & πρὸ τῆς μέλιτος, quidam enim Melinen Panteum nigrum esse volût, ab aliis generibus colore distinctum. Elymum certè ac Melinen tanquam diuersa, Theophr. locis aliquot memorat

Nomina

Lib. 22. c. 25.



*PANICVM Satiuum.*

Lib. 18. c. 7.

Lib. 2. ca. 9.  
Lib. 6. sim.

Genera.  
Li. 18. ca. 7.

Forma.



*PANICVM SYLVEST.*

Matthiol.

Locus.

Tempus.  
Lib. 2. c. 9.  
In capi. 91.  
li. 2. Diosc.

Forma.  
Sylvestr.



Li. 18. ca. 17.

Lib. 2. c. 91.

separatim, Panicum Latinis à paniculis dictū esse scribit idem Plin. qui inter æstiva frumēta panicum recenset, non ut quidam, inter verna Diosc. τῶν σιτηρῶν εἶναι σπερματῶν αἰτ, idest frumētaceis seminibus annumerari. Colum. inter frumēta Panicum & Miliū reponit. Gal. ἐκ τῶν ὀσπρίων, idest ex leguminib⁹ esse tradit, ut citra discrimē Galen. τὰ σιτηρὰ ἐτιὰ ὀσπρία. vocet, cū tamē ὀσπρία sint cerealia illa ex quib⁹ panis nō fit. Sūt & Panico genera, inquit Plin. māmofo, pano ē parvis racemato paniculis, & cacumine gemino. Quin & colore distinguuntur, candido, nigro, rufo, etiā purpureo. Sunt etiā Panici genera satiuū & sylvestre. Panicū satiuū quod ex Matth. hic appinxi⁹, radice, culmo, folio, Milio simile est. Culmis enim multis prodit intus farctis, geniculatis, ac sensim extenuatis. Folia ei arundinacea sunt, multo quā in Tritico latiora. Paniculis differt: sunt enim in Panico oblonge & pedales, crasse, prædensæ, nō ut in Milio diuulsæ, sed racemi instar ex numerosis granis cōpactæ, hirsutis, rotundis, duris, splendētib⁹ folliculis quibusdam intectis, colore subluteis, Milio similibus, sed minoribus. Radice nititur valida & fibrata. Eamdem quā Miliū terrā, idēq; solum desiderat, eodēq; tempore feritur, auctore Colu. Reperitur & Panicū sylvestre, inquit Matth. sed cibis inutile, & alendis solū anibus idoneū, satiuo longē minus gracili admodum stipula, cubitali longitudine, aut maiore, foliis angustioribus, brevioribus, asperisque panicullæ in cacumine hirsutæ, subrubentes, pertinaciter vestibus inhærent, sed multo minores quā in Panico satiuo. Vis illi Panico adsimilis, nisi quod magis adstringit ac refrigerat.

Aliud sylvestre Panicū ex Dalechamptio hīc proponimus, quod radice est breui, cādida, in multas particulas scissa, fibrata: culmis multis, cubitalibus, geniculatis foliis graminis, longioribus, latioribus, ex singulis geniculorū nodis exeūtib⁹. In summis culmis veluti spicæ sunt, rotundæ, villosæ, asperæ, vestibus prætereuntū adhærentes tam firmiter, ut vix reuellantur. In

areis hortorū, maceriis, & incultis locis nascitur. Hæc fortasse fuerit herba alba Plinij, de qua hæc scribit. Nascitur & herba alba Panico similis, occupans arua, pecori quoq; mortifera. Quidā esse volunt eiusdem scriptoris cap. 25. lib. 2. Miliariam herbam, quæ Miliū necat, & trita cornūque infusā podagras iumentorum sanare dicitur. Magis placet eorū sententia qui Albam herbā esse putant. Panicū inquit Diosc. Milio simile est, eodēque modo in panes subigitur. Eosdem habet



## PANICVM SYLVEST.

Aliud Dalechamp.



habet vsus: minùs tamē & nutrit, & adstringit. *Ufus & vires.*  
 Miliū ad omnia Panico esse præstantius Galenus tradit, suauiusque edi, facile concoqui, ventrem minùs sistere, magis nutrire. Nonnūquam autem, inquit, Rustici farinam, ipsorum lacti incoctā mandunt, nō aliter quā Tritici. Vnde liquet id edulium tanto esse præstantius quā si per se sumatur, quāto lac vtriusq; seminis naturæ ad boni succi pcreationē, aliāq; omnia excellit. Nihil enim suauitatis seminibus iis inest, præsertim Panico, quod saltē in nostra Asia nascitur. Nam apud alias gētes, vt in Italia, multo melius prouenit. Idē alibi Panicū Miliō specie simile, facultate certē pauci est nutrimentū, & exsiccatoria. Sistit quoq; nonnihil vētris fluxus, vt & ipsum etiā Miliū. Si verò foris illinatur, exsiccatur, atque refrigeratur. Panicum, inquit Plin. effectus habet quos Miliū. In vino potū pdest dyentericis. Similiter his quæ vaporāda sunt, excofactū imponitur. Sistit alium in lacte caprino decoctū, & bis die haustum: sic prodest & ad tormina. Colum. Panicum pinsitū, & euolutū fursure, sed & Miliū quoq; pultem panis inopia, maximē cum lacte non fastidiendam præbet. Nullus hodie eius vsus nec Officinis, nec Panificio, quia cum siccū admodum & macilentum sit semen, parū admodū præbet alimentū: quare auiculis obiicitur.

Lib. 6. sim.

Li. 22. c. 25.

Lib. 2. ca. 9.

## PANICVM INDICVM, CAP. XX.



**I**s addendū Panicū Indicū aliud, siue Peregrinū, à Dodonæo depictū, & descriptum. Culmo prouenit crasso, octo aut nouē pedes alto, crebris nodis geniculato, foliis ex singulis articulis prodeūtib; arūdinaceis magnis, lōgis, latis: spicas profert seu verius paniculas crassas, dēse cōpactas, aliquantū hirsutas, breuiore quidē quā Panici nostri satiui, quæ nō ex vertice tātū culmorū, sed & ex sinu foliorū, breuioribus ac tenuioribus veluti culmis insidentes exeūt. Semē oblōgū capillaceis glumis implicatur. Radices validæ ac fibrosæ. Panici speciem esse ipsæ dēse cōpactæ paniculæ demonstrāt. Eiusdē panici semē recēs ex Indiis delatū Pena se in hortis Monsp. seuisse ait, Martio mēse, ante augustū arūdinaceos culmos hominis proceritate erexisse digito crassiores, medulla fungosa pallēte farctos, rectos, geniculatos, qui proxime radicē colore cæruleo, elegātī & nitido purpurascētes: in summo spicæ specie Cylindri, seu coni, cui fastigiū retusum est, stamineas apices florum ostēdunt, coloris cærulei, diluti: semina dēse elegātēque stipata, oblōga, teretia, cærulea, auenæ nudatæ quadantenus similia, minora, copiosissima. Folia arūdinacea, medio secundū longitudinem nervo percurrente, lata, medio tenus internodia obuoluunt. Gustus miliaceus, vsus nullus.



Li. 17. ta. 8.

**M**

LI. II generibus quidam, alij Panici, adscribunt plantam quam Germani vocant Gramen Mannæ. Huius duæ sunt species. Alteram priuatim capriolam, & Sanguinellâ nominant, quidam Ischæmon Plinij esse volunt, de quo postea nos agemus. Gignitur sponte in

GRAMEN MANNAE  
prius Matthioli.



GRAMEN MANNAE  
prius Dodonæi.



plerisque Italiæ, Germaniæ, Boëmici locis incultis. Goritienfes tamen & Carinthij ferunt. Fibrosa radix est, crassa, in transuersum porrecta, stipulæ cubitales, ac nonnunquam proceriores: crebro geniculatæ, cum maturuerint, subrubentes: Arundinacea sunt, aut Gramini similia, & villosa folia, præsertim quæ culmos ambiunt, & amplectuntur. Iuba, vt Milij, effusa, minus tamen densa, nigricans, in spicas dissecta, longas, & tenues, semen ferentes ab vna tantum parte, Milio minus, oblongum, quod in pilis à glumarum & vtricolorum inuolucro purgatum, candidum est Oryzæ modo. Eo Bohemicocto cum iure pinguis carnis vescuntur, & sic paratum, suauiter gratumque edulium esse prædicant. Sclauj vocant Cornicis pedem, quia nomenclatura deceptus Leoniceus Coronopum Dioscoridis esse credidit. Alterum Mannæ gramen in agrorum aggeribus, Germaniæ, Belgij, Galliæ, cæterarumque regionum Europæ, nullo satù gignitur: quidam tamen & in hortis colunt. Arundinacea huic quoque natura est. Radix multas fibras spargit. Arun-

GRAMEN MANNAE  
secundum Dodonæi.



dinifo



dini folium simile. Culmi plures: & hi partim recti, partim in latus, & terram versus inclinati: pro coma iuba non est, sicuti superiori, sed veluti spica, asperiuscula, panicula quidem Panici breuior, rarior, tenuior, aliquando singularis, & simplex: interdum multiplex, ac velut ex pluribus composita: nonnunquam herbacei coloris, aliquando ex rubro nigricans. Semine gallinas, columbos, & auiculas: sicut & superioris, alunt.

## PHALARIS, CAP. XXII.

**V**T Græcis & Latinis Phalaris dicitur, Galeno φαλῆις, Germanis *Spenschaet*, & *Canariensaet*, hoc est Hispaniense semen, & Canariense, à Canaria Insula. Melitenses apud quos vt diligenter feritur, *Cuneno* vocant, & ad conficiendum panem cum Tritico miscent. Phalaris, vt describit Dioscorides, cauliculos emittit ex radicibus tenuibus & inutilibus multos, duum palmorum altitudine, geniculatos, Arundini similes, culmis Zeæ similes. Semen in iis est Milij magnitudine, subalbum, oblongum.

Nomina

Lib. 3. c. 142.

Forma.

## PHALARIS.



Ex qua historia veram Phalarim esse colligunt docti Herbarij, Matthiolus, Dodonæus, Cordus, quæ hîc expressa est. Nam tres aut quatuor culmos erigit, cubitales, & nonnunquam proceriores, geniculatos, Zeæ aut Tritici culmis non dissimiles. Folia ex geniculis singula exeunt, acuminata, parua Arundini, aut Tritico similia. Ex iisdem geniculis quidam etiam culmi ramulorum vice emergunt, quos folia circum amplectuntur. Spicas in summis culmis, & ramulis illis fert rectas, digitali crassitudine, teretes, in summo turbinatas, exiguis squamis candicantibus compactas, è quibus flores candiduli, exigui à breuibus staminibus dependent. Semen deinde inter squamas gignitur, Milio non dissimile, splendidum, candicans, aut subnigrum, oblongum, in mucrone acuminatum, gustu Milio simile. Radix eius est multifida & fibrata. Herbæ tusæ succus, cum vino, aut aqua expressus ad vesicæ cruciatus vtilissimè bibitur. Semen cochlearis mensura potum ad eadem efficax est. Non adeo his à

In cap. 142.  
lib. 3. Diosc.  
Lib. 4. cap. 11.  
Lib. 1. plan.  
cap. 45.  
Dodon. de  
frug. ca. 29.

Ibidem.  
Vires.

Li. 27. c. 12.

Li. 8. simpl.

Dioscoride traditis consentiunt quæ de eadem stirpe prodidit Plinius his verbis. Phalaris thyrsus habet longum, tenuem, ceu Arundo, in summo florem inclinat, semen simile Sefamæ. Et hoc calculos frangit potum ex vino, vel aceto, & melle, & lacte. Idem & vesicæ vitia sanat. Galeno Phalaridis herbæ tum semen, tum succus, tum folia potu auxiliari creduntur vesicæ doloribus, seu in se habeant quidpiam tenuium partium, seu calidum. Pharmacopœi quidam in Milij penuria eo in fomentis non infeliciter vtuntur: in siccis enim fomentis Milij vsum præbet. Peregrinum est semen hoc: adfertur autem ex Hispania, & Canariis insulis: Malsiliæ frumentum Canariense dicitur, quia eius copiam infitores ex Canariis secum deferunt, & vnà cum passerulis Canariensibus vendunt, quod eo maximè delectentur, sitq; eis cibis saluberrimus. At non solum hic, vt ait Pena, sed etiam Narbonensi agro, via ad Magalonem, prope segetes,



ad Pontem Phalaridem veram reperiri, eiusque enatum semen feliciter in Belgio & Anglia habuisse.

PHŒNIX, CAP. XXIII.

Nomina  
Li. 22. ca. 25.



PHŒNIX Græcis, Phœnix similiter Latinis dicitur, à Phœniceo colore. Plinius Hordeum murinum appellari scripsit, si eadem sit illi herba Phœnicea, quæ Dioscoridi & Galeno Phœnix. Latini recentiores Lolium rubrum, & Lolium murinum vocant, Hetrusci Lolium sylvestre, *Gioglio saluatico*. Galli *Iuraye sauvage*, Germani *Bintzen helmer*, & *Mald trohor*, Belgi *Muyse koren*, quod spicas profert Lolio similes. Planta hæc culmis, foliis, spica, Lolio similis est, singula tamen minora habet: culmos enim multos profert, breues, geniculatos, folia Hordei, minora, angustioraq;

Forma

PHŒNIX.

Locus.

Lib. 4. c. 39.

Vires.

Lib. 22. c. 25.

Lib. 7.



lus, quam alij Rhun vocant, Herba est Lolio similis. Vim habet adstringentem. Pota in vino austero omnes fluidos affectus sistit.

LOLIUM, CAP. XXIIII.

Nomina



Græcis ἄλφα & ῥάπος, Latinis Lolium dicitur, Arabibus *Sceylem*, seu *Zeuen*, Italis *Loglio*, & *Gioglio*, Germanis *Tunalch*, *Kuenueysen*, & *Lulch*, Hispanis *Yoio*, & *Zizania*, Gallis *Iuraye*, ab inebriando, quod admixtum pani, vini modo temulentiam concitet. Lolium folio

Forma

Locus.

Lib. 8. Hist.  
cap. 7.

Li. 1. Alim.

Lib. 18. c. 17.

est longo, pingui, hirsuto: culmo Tritici, graciliore, in cuius summo spica est, longa veluti ex multis paruulis alterno ordine digestis composita: in singulis terna quaternaque grana continentur, Triticeis minora. Nascitur in aruis, è Tritico & Hordeo, corruptis vligine seminibus, aut per hyemem imbre nimio madefactis. Negat vernam esse frugem, inquit, Theophrastus, quamvis id nonnulli conentur asserere. Nam hyeme statim ineunte profilit è terra, folio angusto, pingui, hirsuto. In Tritico quidem frequens Lolium, inquit Galenus, sæpe inuenitur, in Hordeo verò paucum. Plinius Lolium inter frugum morbos potius,



## LOLIUM.



potius, quàm inter ipsius terræ pestes numerat. Fuschius Pseudomelanthium quod non solum in Triticea & Hordeacea, sed in omni ferè alia segete per se prouenit, Lolium esse putat: quod non solum peritissimorum huius temporis Herbariorum sententiæ refragatur, ait Matthiolus, sed & veterum scriptis, qui Lolium in spica, non in calyce, nec in capitulis Melanthij, vel Papaueris modo, inclusum semen proferre tradiderunt. Dioscorides Phœnicem herbam Lolio similem spicam ferre prodidit. Is etiam error ex vulgata Lolij facultate, vt mox dicemus, facile deprehendi potest. Lolium teste Dioscoride, molitum nomas, putrescentia vlcera, gangrænâque emarginat, cum raphanis & sale illitum: ex aceto & sulphure viuo feros lichenas, & lepras sanat: strumas quoque discutit cum fimo columbino, & lini semine, decoctum in vino: rumpit quæ ægrius ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua mulsa vtilissimè ischiadicis illinitur: si cum polenta,

In Hist. pl.  
cap. 44.

In ca. 93. li.  
2. Dioscor.

Lib. 4. c. 39.

Lib. 2. c. 93.  
*Vires &  
Temper.*

ta, thure, myrrha, aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat. Quæ postrema Cornarius aliter distinxit, vt ischiadicis cum aqua mulsa coctum, & addita polenta, aut myrrha, aut croco, aut thure impositum Lolium multum prodesse velit: deinde ipsum solum suffiri, & non cum aliquo ex præcedentibus, quæ concoquendæ coxendicum affectionis gratia commodè in cataplasma Loliaceum admiscuntur, ineptè verò ad suffitus adhibeantur. Sic enim vertit. Cum aqua mulsa coctum & impositum, coxendicum morbo laborantibus prodest, addita polenta, aut myrrha, aut croco, aut thura. Idem suffitum conceptus adiuuat. Plinius de Aera & Lolio diuersis locis, tanquam de diuersis rebus agit: si quis tamen quæ de Aera & Lolio tradidit, cum Dioscoride conferat, comperiet ipsum de eadem re loqui. Lolium, inquit, & Tribulum, & carduum, Lappamque non minus quàm Rubum, inter frugum morbos potius, quàm inter ipsius terræ pestes numerauerim: Et paulo post. Aera granum minimum est in cortice aculeato. Quum est in pane, celerrimè vertigines facit. Aiuntque in Græcia & Asia balneatores, cum velint turbam pellere, carbonibus id semen iniicere. Idem alibi. Aerina farina magis cæteris purgat vlcera vetera, & gangrænas: cum raphano & sale & aceto lichenas: lepras cum sulphure viuo: & capitis dolores, cum adipe anserino imposita fronti. Strumas & panos concoquit cum fimo columbino, & lini semine decocta in vino. Et paulo post. Quin & ipsæ frugum pestes in aliquo sunt vsu. Infelix dictum est à Vergilio Lolium. Hoc tamen molitum, ex aceto coctum impositumque sanat impetigines, celerius quo sæpius mutatum est. Medetur & podagræ, aliisque doloribus cum Oxymelite (quæ sequitur mendosa sunt in vulgatis codicibus.) Curatio hæc à cæteris differt. Aceti sextario vno dilui mellis vncias duas iustum est: ita temperatis sextariis tribus, decocta farina Loliis sextariis duobus vsque ad crassitudinem, calidumque ipsum imponi dolentibus membris. Eadem farina extrahit ossa fracta: quæ sic emendat Cornarius ex vetere Codice. Ratio hæc. Aceti sextario vno diluuntur mellis vnciæ duæ. Iustum est ita temperatis sextariis tribus, decocta farina Lolij addere vsque

Lib. 8. c. 17.

Li. 22. c. 25.



vsque ad crassitudinem, calidumque ipsum imponi dolentibus mēbris, & cætera. Ex his perspicuum est Plinium *Æræ* & *Lolio* eadem tribuere, quæ Dioscorides *Lolio*, quamvis Plinius neque integrè, neque distinctè medicamenta à Dioscoride præscripta expresserit. Galeno *Lolium* desiccatur & calfacit efficaciter, ut propinquum sit acribus magis quàm *Iris*, sed non est perinde ut illa subtilis essentia. Verum in hoc multum deficit. Hoc statuto ponat quispiam ipsum in principio tertij ordinis exalfacientium, secundo verò extremo desiccantium. Panis in quo *Lolium* fuerit, stuporem quendam, & veluti temulentiam esitantibus parit cum inexpugnabili ferè somno. Quare incerniculis diligenter à *Tritico*, alijsque cerealibus seminibus separandum esse præcepit Galenus iis qui alijs seminibus salubriter uti volunt. Etenim, inquit, cum anni constitutio prava aliquando fuisset, *Lolium Tritico* affatim innasce contigit, quod neque agricolæ accommodatis ad eam rem cribris, accuratè purgassent, neque pistores, quod paucus esset *Tritici* proventus, statim quidem multis caput dolere cœpit: ineunte verò æstate, in cute multorum qui comederant, vlcera, aut aliud quoddam symptoma quod succorum prauitatem indicaret, est subsecutum. Dicitur & *Lolium* oculis officere. Vnde enigmate prouerbiali *Lolio* vititare dicuntur lusciosi, & cæcutientes, quos Græci, teste Nonio, *Myopas* vocant. Plautus. A. Mirum est *Lolio* vititare te, tam vili *Tritico* (cum tam vile sit *Triticum*). Lib. i. Fast. B. Quid iam? A. Quia lusciosus. Item Ouidius, Et careant *Lolius* oculos vitiantibus agri.

## VSTILAGO. CAP. XXV.

Nomina

Lib. 4. c. 17.

Lib. 2. c. 37.



RECENTIORIBVS Herbariis, ut Dodonæo, & Trago, vocatur *Vstilago* quæ ab agricolis Gallis *Brulure* dicitur, Germanis *Brant*. *ἔρυσση* Theophrasto, lib. 8. Hist. cap. 10. rubigo. Alij *Carbunculationem* vocant ex Plinio lib. 17. cap. 24. Est autem *Vstilago* frugū præsertim spicatarum, morbus, & vitium, seu potius pestis, præsertim *Auena*. Hæc

## VSTILAGO.



Ibidem.  
Cap. 17. lib.  
18.

antequam spicam proferat, *Auena* maximè similis est, sed cum spica prodire incipit, frugifera loco spica nigra, rectorrida, & veluti tota puluere obsita apparet. Sæpius in *Auena* reperitur, nonnunquam etiam in *Tritico*, Aprili maximè & Maio mensibus, quando solem ardentem improuisa & subita excipiunt pluuiæ, sole continuo ardentiores radios spargente, cæliq; tempestas incōstans, modò nimbofa, modò serena feruensq; fuerit, qua cæli mutatione teneræ & lactentes adhuc spicæ humore madidæ à solis feruore corripuntur, & ita aduruntur, ut nigrescant, ac inarescant, nec ad frugem peruenire possint. Eius frugum vitij, inquit Tragus, Plinius meminisse videtur his verbis. Est & aliud ex vicino *Auena* vitium, cum amplitudine inchoata granum, sed nondum matura, priusquam roboretur corpus, afflatu noxio cassum, vel, ut Turnebus legit, cascum, & inane in spica evanescit quodam abortu. Alij putant hoc segetum vitium nomine *Rubiginis* potius explicari. Cæleste frugum vinearumque malum, nullo minus noxium, est *Rubigo*, inquit Plinius. Frequentissima hæc in roscido tractu, conuallibus, ac perflatum non habentibus. Contra carent ea ventrosa, & excelsa. Gignit plenilunio. Theophrastus scribit, qui



qui eundem morbum in Cicere peculiari vocabulo Sphacclisum nominat. Nullius est in medicina usus, ad nocendum tantum nata.

TRITICUM VACCINUM, SIVE MELAMPYRUM, CAP. XXVI.

**P**LANTA hæc hodie Triticum Vaccinum, & Triticum Bouinum vocatur, quia Vaccis pabulo grata & innoxia, Gallis *Blé de Vache*, ou *Blé de Beuf*, Germanis similiter *Knueysen*, à nonnullis *Braunfleischblumen*. Id videtur esse quod Galenus Melampyrum vocari ait, id est nigrum Triticum, *Blé noir*, quod ex Tritici quoque mutatione generatur, sed prauitate quamplurimum à Lolio relinquitur. Theophrastus Siculo Frumento Melampyrum proprium esse tradit, sed id esse innoxium, nec sicut Lolium graue, neque caput tentare. A Melampyro vero Dioscoridis, quod etiā Myagrum appellatur, multum differt. Quibusdam Stelephuros Plinij videtur esse Melampyrum de quo hic agimus. Aliud rursus spicatarū genus, inquit, ex quo est Cynops, Alopecuros, Stelephuros, & Plantago quā quidā Ortyga vocant, sic enim legendum. Hæc Plinius ex Theophrasto transtulit, cuius locus in publicis exemplaribus mendosus, sic corrigendus est: *παχυώδη μὲν οὐκ ἔστιν ὁ, τε κίωσι καλὸν μῆκος, καὶ ἄλωπιόν τε, καὶ ἑλεφερίον, καὶ ἀρνυγλωσσόν, ὑπὲρ ἐνίων καλὸν μῆκος ὅπως πολλοὶς ἔχων ἰδέας αὐτοῦ*. Id est, Spicata igitur sunt, ea quam Cynopa nominant Alopecuros, Stelephurus, Plantago, quam Ortyga quidam vocant. Eius multæ sunt species. Istud

*Nomina*

Li. I. Alim.

Lib. 8. Hist. cap. 5.

Stelephuros. Lib. 21. c. 17.

Cap. 10. lib. 7. Hist.

TRITICUM  
Vaccinum.



Tritici vitium caulem gerit cubitalem, aut minorem, tres aut quatuor ramulos à lateribus prodeuntes, in quibus folia oblonga, angusta, acuminata, nigricantia, spicas in summis caulibus latas, crassas, aspectu pulchras, florum & foliorum profundius incisuram plenas, quæ ab imo paulatim ad summum flores emittunt, antequam dehiscant, una cum foliolis purpureo colore, eoque venusto nitentes, qui cum emerferint & aperti fuerint, coloris fiunt lutei, purpureo variati: iisdem dilapsis foliola colore purpureum in viridem mutant, & florum loco folliculi proueniunt lati, in quibus plurimum semina Triticeis similia, sed minora, nigrioraque. Exit in aruis una cum Tritico & Secale, lato potissimum, pingui, ac restibili agro. Una cum frugibus florer, & ad maturitatem peruenit. Theophrasto, Stelephuros similis est Alopecuro, nempe similiter spicata: verum particulatim florer, non ut Alopecuros, & Triticum, tota simul spica. Vtrique, sicut & Tritico, flos lanuginosus. Melampyri species alia hic addenda ex Pena, quod perpusillum luteum vocat, familiare Gallo prouinciæ Tegetibus. Dodrantem, aut sesquiunciam vix

*Locus.*

*Tempus.*


superat: tota facies superius refert, sed flos illi luteus, foliaque altius diuisa, Coronopo similia. Nec absurda hic appingemus plantam quam recetiores Melampyrum alterum vocant propter similitudinem. Pena & Lobellius Cratægonon (Herbam cerealem Melampyro affinem hic intelligimus, non arborem, quæ Cratægos, Cratægon, & Cratægonon, siue Cratægonum dicitur, de qua in Sylua



## MELAMPYRVM

perpusillum luteum.

## CRATAEOGONVM.



Sylva tractauimus) quod in syluosis collibus, decliuibus & vmbrosis Narbonæ, Angliæ, Sabaudia, Pedemontij passim occurrit, ramis aliquot cubitu & sesquicubitu altis, geniculatis, in alas multas diuisis, Euphrasia modo, sed crassioribus & maioribus, quas totas ab imo ambiunt folia Melampyri, aut Linariæ. Flores in cacumine ex luteo herbacei, florum Melampyri figura, similiter vt in lutea Digitali digesti. Semen folliculo exiguo continetur, Milio simile, gustu acre, vt & folia siccata. Nulli quam huic conueniunt magis notæ Cratægoni à Dioscoride scriptæ. Traditum est à quibusdam, inquit, hoc si bibat, ieiuno ore, ter die, post menses purgatos, tribus obolis, in cyathis aquæ duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus, & vir similiter totidem diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum. Cratægoni herba fructus, inquit Galenus, & acris est gustanti, & videnti, admodum similis Milio.

## GRAMEN, T. III. CAP. XXVII.

## Nomina



## Lib. 4. c. 28.

## Genera

## Li. 24. c. 19.

ΓΡΑΣΤΙΣ Græcis, Gramen Latinis appellatur: ἀγρως ab agris qui Græcis ἀγροι nominantur. Gramen quod geniculatis internodiis mirifice serpat, à gradiendo, vel à gignendi fecunditate. Siquidem crebro ab iis nouas spargit radices. Arabes Vagem, Negen, seu Negien, & Negil vocat, Itali Gramigna, Galli Grame, & Dent de chien. Dioscorides tria Graminis genera facit. Gramen quod ἀγρως dicitur: id pro vulgari omnes accipiunt: Gramen arundinaceū: ἄλυστος ille vocat, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, præsertim circa Babylonem, idque iuxta vias nascens, tertium, Gramen Parnasiacum. Ad finem eius capitis addit nasci in Cilicia Gramen, quod incolæ Cinnam appellant. Plinius primum Grame inter herbas vulgarissimum ponit: secundum Gramen Parnasi: deinde aculeatum Grame, trium generum. Primum cuius in cacumine aculei sunt plurimum quini, Pantedactylon vocant. Alterum quod est Aizoo simile. Tertium genus, quod tenuius est, nascitur



GRAMEN VVLGARE

Matthioli.



GRAMEN VVLGARE

Dalechampij.



nascitur in parietinis, & tegulis. Tandem addit. Camelos autem necare traditur in Babylonis regione, id quod iuxta vias nascitur. Hoc autem est quod *καμυλός* Dioscorides vocavit. Gramen inquit Dioscorides, geniculatis serpit ramulis, à quibus radices spargit dulces, articulis præcinctas: folia acuminata, du-

Lib. 4. c. 18.  
Forma.

GRAMEN VVLGARE

Dodonæi.



ra, & vt arundinis parvæ lata, eaque iumenta & boues pascunt. Id Gramen esse putat Matthiolus, cuius picturam hîc damus. Periti tamen herbarij, aliud atque aliud Gramen pro vulgari exhibent. Primo igitur loco, vt dixi, Gramen Matthioli hîc positum est. Secundo Gramen Dalechampij, quod per terram serpit viticulis gracilibus, longis, geniculatis, ex articulorum nodis radículas quæ terræ inherent protrudentibus: folio herbaceo, longo, angusto: caulibus multis, dodrâte non altioribus, internodiis distinctis: spicato flore, rotundo, nigricante, quinque aut quatuor spicarum torulis constante. Dodonæi Gramen, Gallis *Dent de chien*, foliis, culmis, ac iuba parvæ Arundini haud multû absimile est. Folia ei sunt angusta, in acumen fastigiata, Arundinis quidem foliis longe minora, pratensis tamen Graminis duriora, ac maiora: culmi rotundi, sesquipediales, aut paulò longiores, quatuor aut quinque geniculis intercepti: iubam potius quàm spicam fert Milij, aut Arundinis similitudine, minorem tamen, ac

Lib. 4. ca. 44.



rariorem. Radicibus serpit longis, candidis, geniculatis, nodosis, gustu non ingrata dulcedinis, sibi inuicem implicatis, quæ plurimis locis emicantes progerminant, foliaq; & caules proferunt. Nascitur potissimum in aruis & agris frumentariis, tam frugum quàm agrorum vitium, ac pestis, agricolis ingratum:

GRAMEN LEV-  
canthemum.

Tempus.  
3. Gram.  
Fusch.  
In Hist. pl.  
cap. 48.



Locus.  
Tempus.

GRAMEN PRA-  
tense vulgatum.

Lib. 4. c. 47.  
De frug. c.  
83.



nam agro proscisso radices rastris eruant, ac collectas exurunt: facile enim, licet semiarida, terra obruta reuiuiscunt, adeo pertinacis sunt vita. Floret id Gramen æstate cum frugibus: Autumno radices leguntur. Aliud vulgaris Graminis genus depinxit Fuschius, quod cauliculos è radicibus multos emittit, tenues, teretes, crebris geniculis cinctos, facile in terram, nisi vicinis fruticibus fulciantur, procumbentes: folia ex singulis geniculis bina, ex aduerso sita, angusta, oblonga, duriuscula, Graminis tamen breuiora. Floresculi è summis caulibus emicant plurimi, singuli suis pediculis insidentes, candidi, ex aliquot exiguis & angustis foliolis congesti, Leucosii floribus minores, quibus folliculi succedunt oblongi, in quibus semen paruum, Milio simile: radices tenues, & geniculatae, veluti Agrosteos serpunt. Dodonæus in frumentorum Historia Gramen Leucanthemum appellat. Holostium est Ruellij, & Luterianorum, fortasse etiam Lacunæ, Eufrasia Gramen, Tragi, Gramen alterum Matthioli, Chamæcissos Orbasij Italici. Passim nascitur in umbrosis locis, & dumeris, secus scrobes, & agrorum aggeres. Floret Maio, Iunio mensibus, interdum serius. Plantam istam Dodonæus in Hist. Stirp. Cratægonum, siue Cratæonum, siue Cratæum esse suspicatur, quod illi sit cum Cratægono similitudo quadam, & à Germanis *Augentroff gras* vocari ait, id est Gramen corroborans oculos.

VVLGATVM GRAMEN  
Pratense, CAP. XXVIII.

**G**ALLI peruulgatum, & vbiuis obuium, Gramen Pratense vocat, *Herbe des Prés*, & absolute *De l'herbe*, quasi omnium herbarum vulgarissima, exilioribus radicum cirris, seu capillamentis & creberrimis cespitem summum regens, & per humum perreptans, numerofo & densissimo foliorum Triticeorum stipatu, culmos pedem & cubitum altos erigens, tenues, geniculatos, laues, & spicas lanosas, sparsas, Arundinem vallatoriam imitantes. Eius semine vtuntur medici multi ad obstructions



ctiones viscerum, & calculum, potu, admovent ad discufsionem pertinacium tumorum & flatuum. Gramen Arundinaceum, siue Calamagrostis, inquit Dioscorides, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, præsertim in Babylonie, iuxta vias nascitur. Gramen istud fortasse nobis incognitum est: verum tamen de Calamagrosti inter palustres plantas dicetur.

Gramen  
Arund.

GRAMEN PARNASI, CAP. XXX.

**G**RAMEN quod in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: foliis Hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutili: radicibus quinis aut senis, digitali crassitudine, cãdidis, mollibus, & admodum dulcibus. Hanc Graminis speciem à Iacobo Antonio Cortuso ad se missam sic expressit Matthiolus. Sed de eodem Gramine Parnasi etiam vna cum palustribus aliis agemus. Cæterum primùm trium aculeati Graminis generum, cuius in cacumine aculei sunt plurimùm quini, quos conuolutos naribus inferunt, extrahuntque sanguinis ciendi gratia, Pentedaetylon herbarij vocat, Matthiolus esse putat Capriolam, supra descriptam, vel Sanguinellam, sic dictam, quod eam pueri ludentes æstate in nares immittant, vt sanguinem eliciant. Nunc Graminis vulgaris vires haud vulgares explicemus. Trita radix illitu vulnera cõglutinat, inquit Dioscorides. Decoctum eius in potu torminibus medetur, & vrinae difficultatibus, & dysenteria: calculosa etiam vesicæ excrementa comminuit. Radix Graminis Galeno modicè est tum frigida, tum sicca, ac proinde cruenta vlcera cõglutinat. At herba ipsa primo excessu refrigerat, in humiditate verò & siccitate moderata. Porrò mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua quidem est, sed interdum tamen lapides frangere solet, si quis eam decoctam bibat. Semen imbecillum quidem est, eius verò quod in Parnaso nascitur, vrinam ciet, & fluxus ventris ac stomachi reficcat: vis enim eius est exsiccatoria, tenuium partiũ, & subacerba. Idem Paulus scribit Gramẽ Parnasi, teste Paulo, admodum vtile est. Siccat & modice refrigerat, estq; tenuium partium, & subacerbum: ideoq; cruenta vulnera glutinat. Decoctum eius calculos confringit. Succus radicis Graminis Parnasi, autore Dioscoride, si in vino cum melle pari, & myrrhæ dimidio decoquatur, adicianturque piperis & thuris tertie portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in area pixide reconditur. Decoctum radicis idem quod herba præstat. Semen vehementius vrinam impellit: aluum vomitionesque sistit. Eadem propemodũ omnia Plinius tradit, in quibusdam dissentiens. Gramine Parnasi iumentis herba non alia gravior, inquit, siue viridis, siue in fœnum siccata, cum datur aspersa aqua, vel, vt in manuscripto legimus, tunditur aspersa aqua. Succum quoque eius in Parnaso excipi tradunt propter vbertatem. Dulcis enim hic est. In vicem eius in reliqua parte terrarum succedit decoctum ad vulnera cõglutinanda, quod & ipsa herba tusa præstat, tueriturque ab inflammationibus plagas. Decocto

Gramen  
Parnasi.

In ca. 28. li.  
4. Dioscor.

GRAMEN  
Parnasi.



Vires &  
Temper.  
Graminis  
Vulgaris.  
Lib. 4. c. 28.

Li. 6. simpl.

Lib. 7.  
Vires  
Gram.  
Parnasi.

Li. 24. c. 19.



adiicitur vinum ac mel: ab aliquibus & thuris & piperis, myrrhæq; tertiæ portiones. Rursusq; coquitur in æreo vase ad dentium dolores, & epiphoras. Radix decocta in vino torminibus medetur, & urinæ difficultatibus, ac vlceribus vesicæ. Calculos frangit. Semen vehementius urinam impellit. Aluū vomitionesq; sistit. Priuatim autem draconum moribus auxiliatur. Quod ē graminum genere septem internodia habet, efficacissimè capiti contra dolores adalligatur. Quidam propter vesicæ cruciatus decoctum ex vino gramen ad dimidias, à balneis bibi iubent. Adiicit in sine Dioscorides, natum in Cilicia Gramen, quod incolæ Cinnam appellant, Boues inflammat, si eo virente sæpe pascantur: quæ aliter leguntur in vetusto quodam Codice: γεννᾶται δὲ ἐν κιλικίᾳ εἶδος ἕτερον, ἣν κιννὰν ἐπιχωρίως καλεῖσιν, ἥτις ὑγρὰ βρωθεῖται πολλὰκις πικρὰ πλεονεκτήσει. Id est, Gignitur in Cilicia etiam species alia, quam vernaculo sermone appellant Cinnā, quæq; vorata crebro, atque viridis Boues replet: nato alterutris errore, quod illi πικρὰ πλεονεκτήσει, id est, inflammat, hi πικρὰ πλεονεκτήσει legant sensu longe diuerso. In Sebusianoꝝ lacunis, stagnis, & pigris aquis Gramen nascitur, longissimis foliis, subrubris, innatantibus aquæ, quorum tam auidi sunt Boues, vt dum ea persequuntur, ad ventrem vsque se immergant, & toto capite sub aquam deiecto, ea depascantur: quo pabulo eximie saginantur Boues, Vacca verò, lacte multo fœcundiore sunt, quam in finitimis locis, extra regionis illius palustrem situm. Gramen id Cili-  
ciam Cinnam esse quidam putant.

## GRAMINA ALIA, CAP. XXX.

**D**ERMULTA sunt & alia Graminum genera, quæ foliis angustis, longis, & gracilibus inter sese similia sunt, sed spicis siue iubis differunt. Radices omnibus fere tenues, plurimis fibratæ, capillamentis similes, paucissimis longæ, & serpentes. Nec omnia locis iisdem proueniunt. Quare nec eodem tractatu describi possunt. Quædam igitur aliis magis idoneis locis explicabuntur. Hic multa tamen potissimum ex Dalechampi sententia, & obseruatione describentur, quæ etsi non omnia in Agris inter segetes nascantur, cognatione tamen quadam inter sese coniuncta, aptè disiungi non possunt.

## GRAMEN MINIMUM Dalechampi.

Forma  
Graminis  
minimi.Forma Gr.  
Lanati.Tempus.  
Locus.  
Forma Gr.  
Iuncea.

eam ob causam lanatus appellatur. In montium editorum & asperorum vdis & riguis pratis gignitur. Floret Maio mense.

Gramen Iunceum radice est candida, dodrantali, ex innumeris tenuissimisq; fibris contexta, reticulum implicatum esse dixeris: foliis quamplurimis virentibus, rotundis Iunci modo quæ nominis imponendi causa fuit: culmis seu caulibus

Primum erit Gramen minimum, quod est veluti gleba ampliuscula, rotunda, radiculis plurimis, breuibus, candidis: foliis digito non longioribus, teretibus, spica valde gracili, parua: flosculis rubris, Februario statim ad primam aëris temperiem exorientibus, sapore initio dulci, deinde amaro. Nascitur in aruis.

Gramen Lanatum radiculis est satis multis, albis, superuacuis, gracilibus, breuibus: foliis quoque multis, herbaceis, culmo cubitali, sapore subdulci: flore Panico simili, rubente. Tota planta molli lanugine pubescit: quare manibus contrectantium blanditur, atque





caulibus multis, tenuibus, geniculatis, pauca folia emittentibus: flore Arundinaceo in paniculis purpurascens, gustu subdulci. In frigidis & aridis provenit. Floret Maio.

*Locus.*  
*Tempus.*

GRAMEN PRATENSE  
*Dalechampij.*



Gramen Pratense radiculis abundat candidis, in unum veluti cespitem coeuntibus, culmis multis, dodrantalibus, binis ternisve geniculis distinctis, folio graminis, angustiore, molliore, viridior: spica crassiuscula purpureis floribus eleganter ornata: folio quod ex ultimo geniculo prodit sic caulē obvolvēte, ut nō aperiatur, & vesicę specię ostēdat. In humidis Pratis nascitur. Totius plantę sapor dulcis est, & aquosus. Ad eadē valere aiunt, ad quę Gramē officinarū cōmēdatur, sed inefficacius.

Forma Gr.  
 Pratens.

*Locus.*  
*Vires.*

Gramini Anthoxantho eadem foliorum radicūque species, quę Gramini Pratensi, idem sapor, eadem facultas, ut non sine ratione quidam censuerint alterum mare esse, alterū fœminam. Sed his differūt, quod in hoc flos ex pallido flavescit, in altero rubet: in hoc flos glisceus nō obvolvitur folliculo vesicę simili, ut in Gramine Pratensi, sed nudus emicat: huius spica gracilior est & longior, in illo brevior, crassior, magis compressa. Cum gramine Pratensi in humidis pratis nascitur.

Forma  
 Antho.

*Locus.*

Gramen Leucæthemum: radibus multis nititur, valde exilibus, brevissimis, nigris: foliis multis, longis herbaceis, hispidis, latiusculis: caulibus cubitalibus:

Forma Gr.  
 Leucæth.



GRAMEN Anthoxanthum  
Dalechampij.GRAMEN Leucanthemum  
Dalechampij.

flore albo, copioso, acervatim congesto, in paniculis tremulo, gustu subdulci:  
*Locus.* Dumetis ac montosis locis familiare, in muscoso solo crescit.

GRAMEN Ischamom  
Plinij, sive Daëtylon.

*Forma*  
*Ischam.*  
*Lib. 25. c. 8.*



*Locus.*  
*Vires.*

*Lib. 25. c. 8.*

Gramē Ischamō à sistēdo sanguine nomen  
 inuenit: radicibus multis prodit tenuibus, cā-  
 dicantibus, in orbem reptatu sese diffunden-  
 tibus: foliis Milij, vt scripsit Plinius, asperis,  
 nonnihil lanuginosis: caulibus multis, rotun-  
 dis, geniculatis: flore in longis spicis, colore  
 herbaceis, plerumq; quinis, aut septenis, raro  
 quaternis. Vbiuis gignitur, præsertim in hor-  
 torum areis cū alijs plerisq; inutilibus herbis.  
 Herba trita & admota efficacissimè profluen-  
 tem sanguinē sistit, siue farciatur in nares, siue  
 imponatur vulneribus. Floris asperas spicas &  
 in globū cōuolutas pueri naribus indentes, &  
 circūagentes, aliquāto post vellicatis naribus  
 sanguinē eliciūt, vt pro diuerso vtendi modo  
 herba hæc sanguinē cohibeat & euocet. Id Gra-  
 men Plinij Ischamomē esse, tū forma, tū vires  
 ipsius indicare videntur. Sic enim scribit Pli-  
 nius. Ischamomē Thracia inuenit, qua ferunt  
 sanguinē sisti, non aperta modò vena, sed etiā  
 præcisa. Serpit è terra Milio similis, folijs aspe-  
 ris & lanuginosis, farcitur in nares. Quæ in  
 Italia nascitur, & sanguinē eadē adalligata si-  
 stit. Hæc Plinius. Anguillare, Canaria est Pli-  
 nij. Galli crus Apuleio, cuius cacumen instar pedis galli diuiditur.

GRAM



GRAMEN Bulbosum  
Dalechampij.

GRAMEN Spicatum  
Dalechampij.



GRAMEN Hordeaceum,  
Holcus Plinij.



Gramē Bulbosum nascitur ex radice plurimis bulbis coagmetata, subrubro cortice operis, Ascalonia cepæ bulbis exiguis non dissimilibus, gustu dulci & suavi, ex quibus innumeræ radiculæ valde tenues dependent reticulato penè textu. Folia huic sunt Graminis, cauliculi dodrâtales: flores subrubri, valde parui, in densis, & tanquam villosis spicis. In parietum superciliis, & aridorum locorum muscosis cespitibus prouenit. Eisdē viribus prædictum esse aiunt, quibus & gramen quotidianis medicorum remediis notum.

Forma bulbosi.

Locus.

Vires.

Gramini spicato radix est parua, tenuibus fibris capillata, candicans: folia graminis, longiora, tactu duriuscula, & quod mirum est, ac in aliis id genus plantis haud sæpe reperitur, sic nonnunquam articulata, vt alterum alteri insertum esse videatur. Hæc quoque lineis in longum ductis virgata sunt. In summo caule spicarum densius quàm in villo alio graminis genere congestarum magnus numerus conspicitur, quæ flosculos subrubros edunt. Quâ ob causam Gramen appellauerunt.

Forma spicati.

Locus.

In frigidorum montium pratis prouenit.

Hordeaceum Gramen dictū fuit, quod spicam gerat hordei spicæ similem: est enim tanquam hordeū syluestre, radice parua, cādida, fibrata, foliis graminis, eorū etiam articulo coalitu, qualem in spicato Gramine suprà declarauimus,

Forma hordeacei.



GRAMEN Murorum,  
Dalechamp.GRAMEN Polyanthes,  
Aegilops Plinij.Li. 27. c. 10.  
Locus.GRAMEN Filiceum,  
seu Polyanthes.

Vires.

Forma  
Gra. muro.

Locus.

Forma  
Gra. Polya.

Locus.

Forma  
Gra. Filic.

insigne. Holcum esse Plinij quidem censent. Holcus, inquit, aristas habet in cacumine re-  
nues, culmo, quale hordeum restibile. In agris  
sponte provenit: Plinio vero Holcus in faxis  
nascitur siccis. Hæc, inquit Plinius, circa caput  
alligata, vel circa lacertū, elicit è corpore ari-  
stas. Quidā ob id Aristidiam vocāt. Lobellius  
Hordei spōtanei spurij nomine pictum dedit.


Rustici Gramen Murorum pro vitio segetū  
agnoscunt, quod circa Lugdunū *Rue* vocant,  
alibi verò vt in agro Segusianorū *Gurguet*. Re-  
liquis supra descriptis simile est radice ac fo-  
liis, spicis diuersum, quas hordeo similes pro-  
fert, multas, breues, ac velut in angustum con-  
tractas, aristis que breuissimis munitas, subfla-  
uas, florem pallidū. Gramen hoc in parietinis,  
muroꝝ superciliis, ac tegulis nascitur, plerū-  
que in segetibus.

Gramē Polyantes radice est sub nigra, bre-  
ui, fibrata, foliis Graminis: flore in cacumine  
caulis copiosissimo, vnde ei nomen inditum,  
in iubam expāso, quæ plurimis laminulis len-  
ticulæ similibus, squamatis, & tenui filo ap-  
pensis coagmentatur: tā eleganti specie, vt ob eam pendulā & stridulā, cū agita-  
tur, flosculorum congeriem, puellæ, adolescentulæque libenter decerpant, &  
in fertorum delicias cogant, ac nectant. In siccaneis montium pratis gignitur.  
Gramen sequens in asperis nascitur, radicularum fibris multis, tenuibus,  
candidis



candidis : caulibus ex vno cespite plurimis, nodosis, angulosis, pedē non altioribus folio Graminis : flore in summis caulibus densissimo, imparibus spatiis prodeunte, herbaceo, oblongo, acuminato, foliolis maris filicis omnino simili, ut si quis seorsum à planta videat, foliola filicis nuper nata esse putet. Quam ob causam alij filiceū, alij à florum copia Polyāthes secundum vocauerunt.

GRAMEN  
Nodosum.



Diuersum ab hoc est, tametsi cognatū videatur Gramen nodosum, in vlginis & pinguibus agris nascens, radice geniculatis flagellis latè dispersa, radiculis multis fibrata: foliis Graminis vulgaris: Caulibus multis, flore in panicula comosa. Caules quā è radice prodeunt, nodis sunt multis tuberosi, aliis super alios positis, hiemis initio grandioribus postquam flos emarcuit, & incipiunt arefcere folia: carnosā pulpa bulbosis, rotundis, cōpressis, stipatis. Aratro profcissa terra in agris ea iacent, vel rostro suffossa terra, à porcis eruuntur, & manduntur, illis mirificè expetita: saporis amari, & acerbi, qualis est in glandibus. Valentius obstructiones expedire, & vrinam ciere aiunt, quā vulgare.

Gramen  
nodosum.

Gramen nemorū radice est innumeris fibris contexta, candicantibus, tenuissimis: foliis graminis circa radicem multis, in caulibus, paucis, & qua ex caulibus oriūtur densius villosis. Caules multi eriguntur dodrātales: flos

Forma  
Graminis  
nemorum.

GRAMEN Nemorum  
Dalechamp.



GRAMEN Glumosum  
Dalechamp.



paruus



*Locus.* parvus est, copiosus, è flauo nigrescens, & ex longiusculis pediculis dependens. Holortio Matthioli planta hæc absimilis non est. In aridis, perflatis, & apricis nemoribus nascitur.

*Forma Glumosi.* Gramen Glumofum radice, foliisque multis graminum generibus non est dissimile: sed hac peculiari nota discrepat, quod spicas densissimis glumarum grandium ordinibus stipatas edat, quâ ob causam glumofum nominatum est. In agris latis nascitur.

*Locus.* GRAMEN Aureum  
Dalechamp.

*Forma Gramin. Aurei.*

*Locus.*

*Forma Gram. Tement.*

*Alopecur.*



*Lagopyrus In h. devlc.*

GRAMEN Tomentosum,  
Alopecuros, vera Plinij,  
& Theophr.

*In Histor. Frugum.*

*Locus.*

*Forma graminis Trigloc.*



Gramen Aureum radicibus multis nititur, nigricantibus, huc illuc vagis. Folia huic sunt plurima, Gramini similia, valde longa: caulibus cubitalis, geniculatis: flos in spicis pendulus, plane aureus, vnde aureum cognominarunt. In sitientibus & squallidis locis provenit.

Gramen Tomentosum radice nititur brachiali, candida, fibratâque. Culmus huic est pedalis, geniculatus: folium Graminis, longius aliquantulo, & latius: spica densa in cacumine, oblonga, coloris candidissimi, tomento lanuginosa, ad contactum mollissimo, suavisimoque, rufis punctis maculosa. Alopecuros vera Plinij esse videtur, quæ ex spicatarum, inquit, est genere: habet enim spicam mollem & lanugine densam, non dissimilem vulpium caudis, vnde ei nomen: quæ cui plantæ aptius quàm isti possunt competere. Quod si & λεγώπυρος Hippocratis esse dicatur? Sic enim scribit. Πληροὶ δὲ μέλιτα τὰ κοίλα τὰ χεῖρα, ποτὶ ἢ λεγώπυρος οὐνομα. ἔστι δὲ πύροιςιν ὁμοίη ὅταν ἀναίνηται. μικρὸν τὸ φύλλον ὥσπερ καὶ τὸ τῆς ἐλαίας, καὶ μακρότερον. Id est maxime autem replet caua pura herba Lagopyrus nomine. Est autem Triticum similis cum arefcit, folio paruo velut olea, sed longiore. In vulgaris tamen codicibus πύροιςιν ὁμοίη, id est furturibus similis legitur.

Alopecuros Alia à Dodon. ponitur, geniculatis culmis, foliisque, frumentaceis similis, nisi quod culmos breuiiores habet, foliaque minora & angustiora. Spicæ eius nec acutæ, nec aristatæ sunt, sed molles, hirsutæ, lanugine obductæ, haud dissimiles vulpium caudis. Nascitur in aruis vnâ cum frugibus.

Gramen Trigloch in hæc depictum in aridis provenit: radiculis tenuibus fibratum, multis, breuib: folio graminis numerofo, palmum longo, angusto, gracili: caule pedali, nonnunquam proceriore, virgato, enodi, minimè folioso: flore sublueto, inæqualiter per superiorem caulis partem disposito: fructu telum figura imitante, inuersis & deorsum spectantibus cuspidi




*ALOPECVROS*

*Dodonæi.*



*GRAMEN Pinnatum*  
*Dalechampij.*



lo, rubro, copioso : sapor qualis graminis. In maritimis nascitur.

*Gramen Echinatum* radicibus multis nritur, gracilibus candicantibus cauliculis ex vno cespite multis, huc illuc diffusis : folio arundinaceo, minore : capitulis in summo caule oblongis, tactu sic asperis vt echinati videantur : semine minutu

*GRAMEN Triglochin, seu*  
*Vermiculatum Dalech.*



cuspidibus duabus, tertia sursum erecta minax. Qua de causa Triglochina cognominarunt.

*Gramen Pinnatum* radices multas habet, tenues, candidas, folia graminis, longa, tenuia, in acutum desinentia, numerosa : caules quoque multos, nullum edentes florem, sed cum ad iustam magnitudinem creuerint, & solis ardore exarescere cœperint, in Pinnas sese illi diuidunt longas, subtilissimis hinc inde villis capillatas plumarum instar, quas ex ardeolis vulsas ornatus gratia, galeis suis cristacum vice milites affigunt, durante etiam per hiemem totam ea venustate, vt propterea quidam compositos ex iis fasciculos reponant, domique seruent. In aridissimis tumulis, apricis, lapidosisque prouenit.

Form. gra.  
Pinnati.

*Locus.*


Est & *Graminibus* & *Alopecuro Dodonæi* nuper descriptæ affinis herba hîc depicta *Alopecuros graminea*, radice tenui, exiles fibras huc illuc mittente, subalba : cauliculis multis, dodrantalibus : folio graminis longiusculo, acuminato : spica caudæ vulpis simili in summis cauliculis emicante, turbinata : flore pusillo, rubro, copioso : sapor qualis graminis. In maritimis nascitur.

*Alope u.*  
*Graminea.*

*Locus.*

Form. gra.  
Echinati.





*Locus.* minutulo, candido, gluma obuoluto. Sapor totius plantæ ex fatuo subdulcis. Nascitur ad ripas Arares. Omnia hæc graminum genera iisdem fere viribus pollere videntur. Hoc gustus in omnibus idem indicare videri potest. Tamen vnus tantum quod Dentem caninum vocant, superiore capite descripti, in officinis vsus est.

*GRAMEN Exile.*



Tot Graminibus quædam alia adnumerabimus à Lobellio & Pena obseruata, & picta. Primum est vulgarius Pratense, de quo diximus capite superiore. Alterum exile durius, foliis iuncis vnciam & sesquunciam altis, ex pusilla radice, capillamentis crebris compacta, panicula & semine acerosis, durioribus, pecori minus gratis. Oritur in sabuletis, ericetis, & squallido aridiorique agro Gallia, Anglia, Germaniæ & Belgij. Aliud minimum quod in sabuletis squallidis, & vinetis glareosis Narbonæ sæpius visitur, perpusilla radice, capillacea, alba: calamis paruis, etiam capillamento similibus, eleganti purpura nitentibus, vt in Ischamo, sed spica molliore, latiore, sericea, speciosa. Est & aliud Typhinum: iisdem quibus exile durius, natalibus gaudet, sed maritimis; radix pusilla, capillacea; caulis dodrantalis, & pedalis. Aliud etiam Cyperoides sic cognominatum à radice mutuo cohasu sibi ipsi implicata, & longius protensa, cyperi longi modo, vt ab aliis seceratur. Folia habet pedem longa, Alga marina quadam



GRAMEN Minimum.

GRAMEN Typhinum.



quadantenus similia, in cauliculo dodrantali aut pedali, fastigia exigua, vñciam & sesquiunciam longa, acerosa Graminis Typhini ritu. Addit his Lobellius perelegans Graminis genus Clusij quod is in nonnullis Hispaniæ locis aridis & fabulosis Mompelique vidit, atque etiam in Luteriano agro, vbi à rusticis non *Dent de Chien*, vt vulgatum Gramen, sed *Amourettes*, nominatur, fortasse ob pa-

GRAMEN Cyperoides.



ricularum elegantiam: Lobellius Panniculosum Phalarioides appellat. Id supra descripsi-  
mus ex Dalechampio, qui Gramen Filiceum  
seu Polyanthes secundum nuncupauit. Gramen  
caninum medicatum quod vocant, ex Dodo-  
nao descripsi, cum aliquot aliorum Gra-  
minibus vulgatoribus. Id quod in magna Eu-  
ropæ parte vsitatum, præsertim per Hispanias,  
& Gallias, ex Clusio depinxit Lobellius, supe-  
riore capite expressimus, suntque elapsi decem  
& plures anni, ex quo à Dalechampio Grami-  
nis vulgaris nomine pictum, latius serpendo  
propagatum, representauimus. Hoc Gramine  
nihil vulgatus per Hispaniam & Galliam, in  
agris, vinetis, atque etià in maritimis, vbi mul-  
to lætius atque vegetius prouenit, adeò vt ma-  
ximo Gramini marino arudinaceo planta con-  
gener esse videatur. Itaque perappositè dixit  
Lobellius Gramen hoc medium quiddam esse  
& cognatum cum *Ischamo* vulgari, & canino  
Gramine. Hoc enim effigie & forma cum radi-  
ce, tum foliis refert, illud comosa digitatim  
sparsa florū iuba. Eiusdem cū canino Gramine



generis, facultatis, & vsus, Hispanis, Gallis, Narbonensibus, & cæteris francigenis, à quibus *Dent de Chien* appellatur. Semen acerosum, scabrum. In Narbonæ maritimis radicum formâ & magnitudine adeo ad Harundinem vallatoriam accedit, vt eadem videatur. Canino gramini in omnibus prorsus simile est Gramen bullosum, nodosum, nisi quod rotunda tubercula, veluti Glandulas teretes, gustu dulces, radicum anfractibus hærentes habet, quibus illud caret. Iisdem temperamento & viribus, quibus Caninum officinarum, pollet. Rarius est, & plerisque Europæ regionibus minus vsitatum, in Lusitanæ finitimis aruis & segetibus, atque etiam in Sabaudia & Anglia copiosissimum, vbi idem efficacissimum experiantur medici. Id ex Pena hîc appinimus. Idem Calamagrostim descripsit, idest Harundinaceum Gramen, sic dictum quod mediæ sit inter Harundinem & Gramen figuræ, & nature, Lobellius verò pinxit. Canino gramine Maius idest, calamis & foliis rigidiorib<sup>9</sup>, scabris, quibus ad Harundinem vallatoriam non parum accedit, radice geniculata, alba, proluxiore, & longius serpente, compressiore tamè, & crassiore, Canino Gramini simili, sed vallatoriæ radicem æquante: spicata Melicæ & comosa lanugine: à nobis *Leche* dicitur. Aptè Babylonio quadrare videtur Penæ: neque enim veterina,

GRAMEN Bullosum,  
nodosum.



CALAMAGROSTIS  
Lobellij, vulgo *Leche*.



GRAMEN  
Sulcatum.



neque



neque greges aliæ eo vescuntur, nisi multū esuriant, & magna melioris alimēti penuria laborēt, non solum quod ingratisimum sit & aridum, sed etiam quod sitim, tabem & maciem inuehere credatur, linguam & œsophagum vulneret, & constringat, sanguinem in ventriculum eliciat, vnde tumor, inflammatio, & mors plerumque. Quod si Babylone fuit enatum, vbi hanc perniciem adferre creditur, siccius ac rigidius, grex verò imbecillior, & aluo durior, nihil mirum illius esu pecora enecari. Sic enim videas nonnunquam animalium labra, & fauces cruore manantia, & sauciata, quæ cum alio pabulo per scenifecia, huius aut similis harundinacea folia esitarint. Aliud præterea Gramen exhibuit Pena, quod sulcatum vel striatum album nuncupat. In syluosis & montosis Sabaudia

GRAMEN *Aculeatum*  
*Matthioli.*



& Allobrogum sponte nascitur, colitur aut in Belgio & Anglia, Milij potius foliis, sed ut Arundinis vallatoria, rigidis, mucronatis: longitudinē mediam glaucā multæ candidæ venæ, vel lineæ argenteæ insigniunt: culmos panici sylvestris, vel canini graminis erigit. Radix pusilla est, fibrata, alba, Pratenfis graminis.

Inter palustres de Gramine Aculeato nos agemus, cuius historia Plinij verbis apprimè cōuenit: hoc autem loco Graminis historiam, quod aculeatum esse putat vir dignus omni laude Matthioli, explicabimus. Eius radix oblique progreditur, crassiuscula, villosa fibris, non altè defixa: caules multi, virgati, dodrantes, aliquando proceriores, è quibus furculi multi nascuntur, in dextram ac sinistram protensi, folio, tanquam glumo quodam obuoluti vsque ad aculeorum exortum vbi à pediculo diuariantur. In summis furculis extant aculei tres, instar foliorum Trifolij diuisi, ima parte crassiusculi, acuminati summa quorum in medio flosculi emergunt, numerosi, velut in globulum stipati.

Form. gra.  
Aculeati.

BUPLEVRON, [AP. XXXI.]

**B**upleuro plantam istam depinxit Dodonæus, foliis longis, angustis, maioribus & latioribus folio graminis, cæterum haud ablimilibus. Caules ternos, quaternosue pedes alti sunt, aut maiores, rotundi, recti, spissi, frequētibz geniculis distincti, furculosi multis ramulis, in quorum fastigio muscaria luteis floribus ornantur: his semen oblongum succrescit. Floret, & semen profert Iulio & Augusto mēibus. Olim in herbarum sponte nascentium numero habebatur, nunc in hortis colitur ab herbariis Bupleuron inquit Plinius, in sponte nascentium Olerum numero Græci habent, caule cubitali, foliis multis, longisque, capite anethi, laudatum in cibis ab Hippocrate, in medicina à Glaucōne, & Nicandro. Semen contra serpentes valet. Folia ad secundas sceminarum, vel succum ex vino illinunt, & strumis folia cum sale ex vino. Radix contra serpentes datur in vino, & vrinæ ciendæ. Bupleuri semen ad ictus serpentium dari reperio, fouerique plagas decocta ea herba adiectis foliis Mori, aut Origani. Quidam ammi vulgare Bu-

Lib. 4. c. 48.

Forma.

Locus &


Temper.

Li. 22. c. 22.

Usus

& Vires





pleuron esse volunt Officinæ Monspelienses Auriculam leporis vocant hanc, vel eam quæ non procul Gramuntia silua prope Monspelium frequentior reperitur, planèque eadem est cum superiore natalibus, figura, viribus, umbellis & floribus: folio alioqui latiore, rigidiorè, latiusculo in medio, & superne in angustum desinente, nonnihil concauo aut inflexo. Vnde auriculam leporinam vocarunt: Lutetiæ nunc Gratiam Dei, nunc Elaphoboscum. Quidam Buprestin Plinij.

CYANVS, CAP. XXXII.

*Nomina*

Lib. 21. cap.  
8. & 11.

Ibidem.

Li. 22. c. 125.

*Genera.*

*Forma*

**C**YANVS Plinio dicitur, qui à recentioribus Baptifecula, vel Blaptifecula, vel Batisfocele. Cyanus à flore cæruleo. In nomine est Cyanus color, inquit Plinius, qui honorem, noménque dederit Cæruleo. Blaptifecula, inquit Ruellius, quoniam secantibus & metentibus officiat, retusa in occurfu eius falce: nam & Seculam veteres falcem dixerunt. Galli *Aubisoin* appellant, *Blauer* & *Bluet*, à summa cærulei coloris gratia quem *Bleu*, appellant, Itali *Fior Campefe*, Germani *kornblumen*. Cyani duo reperiuntur genera, Maius & minus. Cyanus minor caules edit bicubitales, lanuginosos, angulosos, in quibus folia angusta, villosa, in cinereo albicantia, rarioribus incisuris veluti dentibus, siue barbulis quibusdam diuisa. Caules in cacumine calices siue capitula quædam rotunda, scabra, & squamosa proferunt, ex quibus venusti flores cærulei emicant, quinis sensus foliolis in ambitu crenatis constantes, quibus pereuntibus semen oblongum veluti lana obuolutum prouenit, radicem vnicam habet, sed fibratam. Cyanus maior latioribus prouenit foliis, candidioribus, villosioribus, non infectis. Vegetiores quoque caules edit, ac candidiores sed minores: in vertice flores quoque ex scabris calicibus, sed maiores





iores, & parentiores: semen etiam simile. Cyanus minor in campis inter segetes Maio & Iunio mensibus copiosè provenit. Aliquando tamen in hortis colitur ob coloris venustatem. Floréque interdum niueo, & in rubro purpureo reperitur: fortasse cultus adulterio colorem permutante, alioqui flos caruleo semper nitet conspectu. Cyanus maior in montibus frequentius nascitur quàm in

*Locus.*

CYANVS SUPINVS.

CYANVS REPENS.





Matthi. in  
ca. 125. li. 2.  
Dioscori.  
Vires.

Li. 2. ca. 11.

campestribus. In hortis etiam feritur, & in cæruleo rubros, nonnunquam purpureos fert flores. Cyani vires nullus veterum literis mandavit. Tamen Placentinus ex quorundam opinione, qui Cyanum propria facultate pestilentibus morbis aduersari prodiderunt, suo de Cichorea serapio, quod ad febres pestilentes maximè commendauit, Cyanum admiscuit. Maioris Cyani puluis datur vtiliter ab alto deuolutis, & sanguinem reiicientibus, ex aqua plantaginis, aut equiseti, aut maioris synphyti. Succus illitus recētia vulnera glutinat, & oris ulcera sanat, vtriusque folia, siue semē ex vino decocta & hausta auxiliātur à scorpione phalangiōq; ictis, quinetiā venenis omnibus resistūt. Succus illitus oculorum inflammationes tollit. Idem præstat aqua ex herba destillata. Est enim Cyanus auctore Dodonæo, temperamento frigido ac sicco. Flos rusticorum coronis quamquam inodorus inseritur, tum ob speciei formam, tum ob coloris gratiā. Ad Cyanū plantas duas refert Lobellius hic appictas. Prior sub Seseleos pratēsis ramulis ad Sellā nouā, & in aliis agri Monspelienſis locis reptando latitat, foliolis oblongis, angustis, Lauandulæ, rigidis, in cauliculis gracilibus, samentosis, palmaribus, pedalibus & sesquipedalibus, quorum singulis fastigiis singuli flores laxeæ, obsoleta purpura, ex capitulis squamosis. Radix digitum paruum æquat. Tota planta gustu est amarissimo, & ingrato. Hæc ex Pena. Alter est Cyanus repens, superiori non abſimilis, sed exilioribus multo foliolis, & candicantibus capitulis argentei nitoris.

## PSEUDOMELANTIVM,

## CAP. XXXIII.

Nomina  
Lib. 2. c. 121.  
Lib. 7. Hist.  
cap. 9.

Forma.



**P**LANTA hîc depicta quæ sponte inter segetes passim nascitur, Ruellio ἀνθεμον φυλλῶδες dicitur, idest Anthemum foliosum Theophr. Theodorus foliosam Nigellam vocat. A quibusdā Gitthago, & Nigellastrum nominatur, ab aliis Pseudomelanthium, ab Italis Gittone, à Gallis Nîelle vulgaire, à Germanis Raden, & Graſraden. Caules emittit rectos, graciles, villosos: folia longa, angusta, hirsuta, cinerea: flores è rubro purpurascētes, in quinque foliola diuisos, quibus in coronamentis vtimur: deinde siliquas, in quibus semen. Æstate floret. Alij plantam istam Melanthium syluestre, alij syluestrem Lychnidem coronariam esse putant, quibus assentiendum non est, vt suis locis diceretur: multo minus Fuchſio, qui pro Lolio eādā depinxit, ac descripsit. Quare vehementer errant qui Lolij vice ea vtuntur. Recentiores, vt testatur Fuchſius, Pseudomelanthium mirificè in sanandis impetiginibus, alijsque scabiei generibus commendant. Item in vulneribus glutinandis, ac fistulis curandis compescendōque sanguine eius vsum esse tradunt.

PAPA



PAPAVER RHOEAS, CAP. XXXIIII.



RACIS *μυκρον ποιδας*, id est, fluidum Papauer, à flore qui protinus ei decidit, Plinio erraticum dicitur, Officinis Papauer rubrum, Gallis *Nomina* *Confanons*, *Ponceau*, & *Coqueliquoc*, Germanis *Klappenrosen*, Hispanis *Amapolas*, *Rosella*, *Papolas*, Italis *Papauero saluatico rosso*. Folia habet, au-

PAPAVER  
Rhoeas prius.



PAPAVER  
Rhoeas minus.



ctore Dioscoride, Erucæ aut Cichorio similia, incisa, sed longiora & aspera: caulem lanuginosum, rectum, asperum, cubitalem: florem Puniceum, quandoque etiam album, sylvestris Anemones, caput oblongum, minus tamen quàm Anemone: semen rufum, radicem oblongam, subalbam, minoris digiti crassitudine, amaram. Nascitur in aruis & segetibus *Locus.* passim. Vere & æstate dum frumento rû melsis appetit, floret, quo etiam tempore decerpitur. Tertiû Papaueris genus Rhoeam Græci vocant, inquit Plinius, id nostri erraticum. *Tempus.* Sponte quidem, sed in aruis cum Hordeo nascitur, Erucæ simile, cubitali altitudine, flore rufo & protinus deciduo, vnde & nomen à Græcis accepit. Idem rursus, inter fatiua (Papauera, sub.) & sylvestria mediû genus, quoniam in aruis, sed sponte nasceretur, Rhoeam vocauimus, & erraticum. Hic pro Rhoeada Rhoeam dixit. Dodonæus & Fuschius duplex *Lib. 19. c. 8.* huius pinxerunt genus. Vnum maius, foliis Erucæ, aut Burfæ pastoris, alterum minus, foliis Cichorij, toto ambitu crenatis, alioqui caulibus, floribus & cauliculis priori simillimis. Nihil istis frequentius in segetibus. Papaueris Rhoeadis quinque, sexue capita, inquit Dioscorides, cum tribus vini cyathis decocta, donec ad duos reducantur, potui dabis quibus somnum accersere volueris. Semen acetabuli mensura cum aqua mulsa potum aluum leniter emollit. Ad idem præstandum mellitis & dulciariis immiscetur. Folia cum calicibus illita inflammationes sanant. Eorundem perfusione & fotu somnus allicitur. Aluum, inquit Plinius, exinaniunt capita quinque, decocta in vini tribus heminis, pota, & somnum faciunt. Galenus *Lib. 3. ca. 31. Cap. 194.* semen validius refrigerare scribit, ita vt nequaquam eo quis innoxie solo vti possit, veluti fatiuo, melli admiscens. Admodum vero si ita sumptum sit, somnum conciliat. Sed & pusillum eius inspergunt iis, quæ ex melle conficiuntur bellariis, placentis, & panibus. His addunt recentiores sacro igni mederi, mulierum menstrua profluvia compescere, *Vires.* *Lib. 4. c. 59.* *Li. 7. simpl.*



sanguinem è naribus fluentem vlceri impositum sistere : lingua ex decocta eius lota ardorem faucium sanari : pudendorum tumores eodem detumescere : temporibus illitum phreniticis somnum conciliare : dolores oculorum à caliditate, linteo impositum mitigare.

## ARGEMONE,

## CAP. XXXV.

## Nomina

Lib. 2. c. 173.

Forma.

## Locus.

Li. 6. simpl.

Vires.

Lib. 1. c. 38.

Argemone Tragi.



ARGEMONE

Capitulo longiore.



ARGEMONE MINOR

Capitulis brevioribus.



quaternis



Væ Græcis ἀργεμόνη, Latinis Argemone, & Plinio Argemonia dicitur, quòd argema & nubes oculos dissipet, planta, auctore Dioscoride, in totum Papaveri sylvestri similis. Folia habet Anemones, diuisa, florem puniceum, caput simile Papaveri Rhoeadis, sed oblongius, & latum summis partibus, radicem rotundam. Succum emittit crocei coloris, acrem, & acutum. Nascitur in aruis apud nos. Nostri tria genera eius faciunt, & id demum probant, cuius radix thus redolet. Galenus huius herbae facultatem absterforiam esse tradit, & digentem. Tragus pro Argemone pinxit, quod Papaver Rhoeadis minus, Fuschius & Dodonaus vocarunt, & maiorem Argemonem nuncupauit ille, minorem verò maiori con similem esse ait, sed caule, radice, herba, flore, capitulo per omnia exilioribus, foliis admodum laciniatis. Flos illius exiguus




quaternis quoque foliolis constat, capitulum habet longius quàm prior. Principio Maij semper floret, nec facile ubiuis locorum inuenitur. Gaudet segetibus Triticeis, Siligineis & Hordeaceis. Hanc Hypocoum esse Matthioli non sine ratione quidam suspicantur. Argemones sane duplex est ex capitulis differentia. Vtrâque Papaueris Rhoeadis primo intuitu figuram præ se fert: in Angliæ Sommerfeti & Gallobelgij segetibus radicem, florem, & folia hirsuta in caule pedali & sesquipedali gignit: flores punicei sunt, flore Papaueris Rhoeadis minores, decidui. Sed minori, quæ perperam Anemone minor à Pena dicitur, capitula Rhoeadis angustiora, longiora & hispida, sine codio. Maiori verò echinata & hispida, sed glomerata, & torulis canulata, in cuius vertice specimen quoddam capituli aut codij relinquit. Vtriq; semen Papaueris Rhoeadis minus.

LAGOPVS, CAP. XXXVI.

**L**AGOPVS Historiam tam paucis perstrinxit Dioscorides, vt ex eius verbis quisnam verus sit veterum Lagopus intelligere vix quifquam possit. Tamen Dodonæus, Fuschius, Germanorum vulgus, & tota propemodum herbariorum familia plantam hîc depictam pro Lagopo proponunt, ab hirsuta spica Leporino pedi, haud absimili sic nuncupatam. Latine Pes Leporis dicitur, à nonnullis Leporis cuminum, & Trifoliû humile, Gallicè *Pied de Lieure*, Germanicè *Hasenfichz*, siue *Katzenkler*. Lagopyron vocauit Hippocrates, vt diximus cap. de Gramine, quod inter Triticeas se-

Lib. 4. c. 42.  
In Hist. pl.  
cap. 187.

LAGOPVS VVL-  
garis Matthioli.



LAGOPVS VVL-  
garis Fuschij.



getes nasceretur, quasi Leporinum Triticum. Lagopus iste caules habet rotundos, hirsutos: folia Trifolio vulgari similia, oblonga: semen in Paniculis paruis, muscosis lanuginosisq; Leporino pedi similibus admodum, cui non obscura adstringendi vis inest. Nascitur Lagopus in segetibus, etiam Plinio auctore, *in rarijs*, inquit Dioscorides, id est, in Hortorû areis, vt quidâ interpretantur, *Corna*

Forma.

Locus.

Lib. 26. c. 8.



*Tempus.* Cornarius vertit in fulcis. Nec dissensio in eo est, inquit, quod hic in fulcis, ille in segetibus nasci dixit, cum sint fulci, id est *αμφοριαι* ipsius segetis. Iulio & Augusto mensibus potissimum apparet. Ex his facile est coniectari plantam istam in aruis inter segetes frequentem vniuersæ Europæ vulgatam, esse genuinū Lagopum antiquorum. Huic opinioni suffragatur & facultas. Lagopus herba, vt scribit Dioscorides, sistit aluum in vino pota: aut in febre ex aqua. Eadem inguini alligatur in inflammatione: ita fere ad verbum. Lagopus Plinio sistit aluum è vino pota, aut in febre ex aqua. Eadem inguini alligatur in tumore: quæ ex Dioscoride ad verbum ferè citantur. Galenus Lagopum facultatis esse desiccantis tradit, adeo vt fluxus alui probè exsiccat. Ex his constat, inquit Fuschius, herbam hîc depictam esse Lagopum, siquidem, & nomen & forma aptissimè illi respondent. Locus etiam conuenit, nec facultas abhorret, quod illi est adstrictoria, & exsiccans. His omnibus accedunt vires: vulgo enim omnes hac planta in dysenteria & alui profluuiio vtuntur. Eadem de herbæ huius viribus prædicat etiam Matthiolus. Dantur, inquit, Lagopi huiusce folia, quinetiam Paniculæ & semen in farinam trita contra dysenteriam, & cæteras alui fluxiones, contra biliosas reiectiones, & celiacos affectus ex vino austero, aut succo Punici mali. Totius plantæ decoctū additis Maluæ foliis, è dulci vino paratum, datur vtiliter ad vesicæ morbos, præsertim ad vrinæ ardores. Semen auxiliatur cruenta expuentibus: Picularum cinis illitus hæmorrhoidas fluentes sistit. Sunt qui iisdem vtantur ad abstergendam dysentericorum sedem, putantes inde fluxionem cohiberi. Hanc tamen herbam legitimum esse Dioscoridis Lagopū Matth. non affirmat. Pena non parū adstrictionis semini inesse ait, siccitatis verò tantum, vt mirū seminis profluuiio laborantibus præstet præsidium. Quare in vlceribus cauis, sed iam deterfis & mundatis, non dubium quin carnem gignat, & cicatricem acceleret, vt vult Hippocrates: tumoribus verò inguinum, & laxis herniis cohibendis peropportuna hæc planta est. Idem Pena non perinde fre-

In ca. 17. li.  
4. Dioscor.

## LAGOPVS

Maxima.



## LAGOPVS ALTERA

Angusti folia.



quentem,



quentem, sed tamen inter easdem segetes nascentem geminam huius differentiam obseruauit: Vnam cuius folia planè eadem quæ superioris, minùs tamen acuta, & Trifolij Pratenfis foliis propiora, caules ambiunt simpliciore, enodes, ferè rectos, cubitales, spicas in vertice proferentes, binos pollices longas, crassiores, pilis & lanugine hispidiore, villosis floribus Trifolij Pratenfis in purpura rubentibus, Fuscis phœniceis, pallentibus. Hanc Veganij se in pratis, & ad fontem publicum elegantissimo aspectu florentem collegisse ait Iunio & Iulio mensibus. Alteram idem Lagopum Angustifoliam vocat, iuxta agrorum & viarum margines Sellenouæ Monspelij exorientem, in Delphinatu, & non procul à Rhodano, & ponte quem S. Spiritus dicunt, alibiq; passim, angustioribus & longioribus multo foliis, ternis, inter Peucedanum & Trifolium ambigentibus, virentibus, pedali caule, aliquot geniculis distincto, ex quibus nonnullæ alæ in summo itidem caudatas spicas edunt, isti proximè descripto pares: quarum flores purpurascens per menses caduci, relinquunt aristas horrentes, & spicas aridiore, acutis glumis pungentes, quibus exiguum continetur & rotundum semen, Sefamo simile. Omnium horum partes, spicæ præsertim, deficiant & adstringunt, sed prioris potissimum. Lobellius Lagopum etiam folio pinnato appellat, quem Tragus Cytisum, Cordus Trifolium magnum. Huius perspicua in folio varietas, quod Marcescens in calidioribus potissimum & Pedemontanis regionibus nitore, læuore & striis elegantissimis auium pennas imitatur, filicis Osmundæ par, terno positu è petiolo pendente. Flos item sanguineus Lagopo maximo persimilis. Hanc plantam pictam dedimus in Dume-to cap. de Cytiso.

LADANVM SEGETVM, CAP. XXXVII.



Æc herba à foliorum cum Ladanum similitudine & natalibus à Plinio Ladanum Segetum dicitur, ab aliis Terrahit Angustifolium. Plinius duplex hoc Ladanum esse ait, quod Herbarij sic interpretantur, vt aliud sit album, aliud rubrum. Vtrumque foliis est Ledii, angustis, oblongis, per interualla geminis: caule vnico, pedali, ima parte rubente, ramulis furculisque multis fruticante: flore Marrubij modo verticillatim caulem ambiente, eidem simili, nunc rubro, nunc albo, gustus subausteri: radice multiplici. Vtrumque nascitur in aruis lapidosis, & inter segetes. Ladanum, inquit Plinius, sistitur alius vtroque, quod in segetibus nascitur, contuso & cribrato: bibitur ex aqua mulsâ: item ad bilem, (id est choleram) è vino. idem alibi febres frigidas leuiore facit Ladanum quod in segetibus nascitur contusum.

Nomina  
Lib. 26. c. 8.

Forma.

Lib. 29. c. 8.  
Vires.

Lib. 26. c. 11.


POLYC



HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
POLYCARPVM, CAP. XXXVIII.

Locus.  
Nomen.  
Forma

Lib. I. ca. 65.



**P**OLYCARPVM etiam sponte in agris, & in agrorum marginibus, humida præsertim anni tēpestare hac planta à seminum magna copia Polycarpum nominata. Palmum vnū alta est, cauliculos multos profert teneros, geniculatos, inter sese implicatos: folia parua, angusta, Iuniperi minoris foliis satis similia, nisi quod minora sunt, & minimè pungentia, inter quæ flosculi exoriuntur stellati, eiusdem quo caules foliaq; coloris, id est cinerei. Radix digitū lōga est, & fibrata. Dodonæus tertiā Polygoni speciem esse putat, eisdemque ferè quibus Polygonum viribus præstare ait. Polyfpori mentio fit in Geoponicis Cassiani. Quidam in Pliniani Polygoni primo genere femi-

nam esse putant, minorem, minúsque nigram, geniculis densiorem, femine sub singulis foliis turgescem.

HEDYSARVM CAP. XXXIX.

Nomina  
Genera.  
In cap. 129.  
lib. 3. Dios.  
In hist. fru.  
cap. 70.  
Lib. 3. c. 129.  
Forma.


Li. 27. ca. 12.



**G**RÆCI ἡδύσαρον & πελεκύον vocant, quam Latini à seminis figura Securidacam, vel, vt Turnebus legendum censet, Securiclarā. Vnius tantum Hedysari meminit Dioscorides. Matthiolus duo facit eius genera, Hedysarū maius, & minus, duo itē Dodonæus. His Dalechampiū tertiū adiecit. Hedysarū, inquit Dioscorides, frutex est foliis Ciceris: semen rufum in siliquis fert, corniculorū modo aduncis, quod ancipitem securim æmulatur, vnde nomē accepit, amarū gustu: stomacho vtile in potu: additur in antidota. Idem ferè Plinius habet. Pelecinū in segetibus diximus nasci, fruticosum cauliculis, foliis Ciceris. Semen in siliquis fert corniculorum modo aduncis, ternis, quaternisue, quale Gith nouimus, amarum, stomacho vtile. Additur in antidotis.

HEDYSARVM maius,  
sive Securidaca Matthioli.

Forma.



Hedysarum Matthioli maius, cauliculos à radice profert multos, tenues, rotundos, lentos, cubitales: folia oblonga, Ciceri proxima: flores diluto purpuræ colore rufescentes, vt in piso, sed minores: siliquas compressas, corniculatas, aduncis cacumine, in quibus rufum semē, amarum, securis effigie. Radix est vnica, albāque, non sine adnatis fibris.


Hedysarum minus maiori ferè simile est, nisi quod folia minora habet, in cacumine retusa: & numerosiora: præterea caules & ramos atque adeo partes omnes minores. Flores edit superiori haud absimiles, sed pusillos, ex quibus cornicula oriuntur rotunda, incurua, acuminato cacumine, quæ per maturitatem rufescunt



fescunt, in quibus semen alteri simile, sed minus ac tenuius. Radix est gracilis, alba, longa, altè descendens.

Dodonæus aliud Hedy sarum primum depinxit & descripsit. Caules promit à radice multos, cubitales, rotundos, folia oblonga ex multis, Lentis foliolis, ro- In hist. fru. cap. 70.

*HEDYSARUM*  
*minus Matthioli.*



*HEDYSARUM*  
*Dodonai I.*



*HEDYSARUM*  
*alterum Dodonai.*



*HEDYSARUM*  
*Dodonai III.*





tundioribus, vt Araci, Viciæ, & similibus cōgesta: flores in corymbis luteos: siliquas deinde oblongas, planas nonnihil recuruas, in quibus semina complura, angulosa, rufa & amara securis effigie. Est huius & alterū genus, superiori caule foliisq; simile, vtriusq; tantū minoribus: siliquæ huic breuiores sunt & magis recurua, in quibus & semina quadrangularia, ancipitē quoq; securim æmulantia.

**HEDYSARVM***minimum.*

Forma Hedysari minimum.



Cap. 17. lib. 18.

11. Hist. & cap. 8.

**HEDYSARVM alterum,**  
*Clypeatum Lobellij.*

Lib. 1. Alim.

11. 6. simpl. Vires & Temper.

In cap. 129. 11. 3. Diosc.



Hedysarum minimum hoc dicitur, quod si cum reliquis comparatur, minimas omnium siliquas edit. Radice est tenui, breui, candida, caulibus fere pedalis, per humum sparsis: foliis Trifolij pratensis, in vno pediculo multis, sed in extremo semper ternis: flore luteo, circa caulem copioso: semine rufo, bipenni simili, in siliquis falcatis, transuersim virgatis, breuibus. In agro Montpelienfi, & nemore Gramuntio crescit. Aliud superioribus multo speciosius acceptum referimus Lobellio, quod in Hortis Belgicis alitur. Ægyptium Helenium, eiusue speciem quidam dixere, alij verò apposite Hedysarum censuere: foliis enim, & procumbentibus cauliculis est Securidacæ simile floribus venustis, Genistæ, sed rubentibus in cauliculis summis: è quibus postea siliquæ compressæ, spectantur complures, hirsutæ, ternis, quaternis, & quinis orbiculatis clypeoli effigie loculis, semine intus Genistæ, minore. Hedysarum nasci in segetibus & Hordeis, scribit Dioscorides, itémque Plinius, loco iam citato. Sed antea dixit. Est herba quæ Cicer enecat, & Eruium circunligando se: vocatur Orobanche: Triticum simili modo Æra: Hordeū festuca quæ vocatur Ægilops: Lentem herba Securidaca, quam Græci à similitudine Pelecinon vocant. Theophrastus tamen Securidacam in

Aphaca gigni, & Aphacam à Securidaca strangulari prodidit, vt Plinius perperam apud Theophrastum φάρδον, id est Lentem pro ἀφάκην, quæ Viciæ genus est, legerit. Quin & Theophrastus etiam hac in re Plinio refragatur, qui Aracum rem duram & scabram in Lente nasci tradidit, non Securidacam. Galenus in Lente ex mutatione ipsius, durum rotundumque Aracum, & Securidacam, semina non vesca gigni dixit. Hedysari semen, quod idem ait, colore rufum, vtrinque anceps, vt securis, amarū & subacerbum apparet: quamobrem potum gratum est stomacho, & viscerum obstructions expurgat. Idem præstant totius fructus ramuli. Bibitur vtriusque semen auctore Matthiolo contra venenatorum animalium morsum. Eiusdem farina vulnera & putrida vlcera absterget, quemadmodum & Lentigines, & Alphos cutisque maculas omnes, si frequenter melle optimo excepta illinatur. Pectus quoque expurgat à crassis, pituitosisq; excrementis, ex melle aut de fruto delincta



delinēta. Necat eadem intestinorum vermes ex dulci lixiuio pota, aut ex vino, aut ex muliebri lacte, addito croci momento.

## ONONIS, CAP. XL.

**ΟΝΟΝΙΣ** & **ὄνωις** Græcis, similiter Anonis & Ononis Latinis appellatur, vt Binominis antiquis sit hæc planta, vna tantum litera mutata, rem tamen eandem semper intuentibus. Ononida Theophrastus & Galenus vocant, Anonida Dioscorides & Plinius. Anonisa non iuuando, quod nullam vtilitatem præbeat, dici videtur. Siquidem aratoribus inimica est, viuaxque nimis fruges opprimit, & suis aculeis nocet, nisi quis ex aduerso nomen inditum putauerit: Ononis quod **ὄνωις**, id est asinos sese terētes ad illam scabientesq; iuuat, vel quod in ea se volutantes spinis eius dorsum libenter affricent, & scabant. Vulgus Herbariorum Arrestam Bouis, vel Restam Bouis, quod in opere arantes Boues sistat, nominare solet. Nonnulli Remoram aratri, quod altis & duris radicibus in agris aratrum remoretur, appellant. Sunt qui Acutellam, quod suis spinis ingredientium pedes pungat. Galli *Arrestebus*, Germani *Hauhechel*, & *Ochsenbrech*, quia crebris inter folia aculeis, haud secus quam instrumentum hoc quo mulieres linum carminant, & à crassiore purgant stuppa, horreat: vel quod ligone ad aculeatam hanc herbam eruendam & extirpandam cum in altum acta, sese propagauit, opus sit. Equites Germani *Stalkrantz*, quod decoctum eius meiere nequeuntibus equis offeratur. Ononis, inquit Dioscorides, ramos fruticosos habet, dodrantales, aut maiores frequentibus geniculis cinctos, cauis alarum multis, capitibus rotundis: foliis Lenticulæ, tenuibus, pusillis, ad Rutæ aut Pratenfis Loti folia accedentibus, subhirsutis, odoratis, non iniucundè olentibus. Rami acutioribus spinis, & veluti spiculis firmiter horrent. Radicem mittit candidam. Spinorum etiamnum aliud genus Ononis, inquit Plinius. In ramis enim spinas habet appositas: folio Rutæ simili: toto caule foliato in modum coronæ. Secatur aratro, frugibus inimica: vel, vt legendum censet Turnebus, sequitur arata, frugibus inimica: viuaxq; præcipue: Idem multo post. Anonin quidam Ononida malunt vocare, ramosam, similem scæno-græco, nisi fruticosior hirsutiorq; esset, odore iucundo, post ver spinosa. Hæc Plinius, cuius postremam sententiam reprehendit Matthiolus. Etenim non post ver Anonin spinosa redditur, sed in Autumno, id quod experientia ipsa comprobat, cui etiam Theophrasti auctoritas adstipulatur, de Ononide sic scribentis: ἡ δὲ ὄνωις ἐστὶν ὡς ῥόσθακανθον, ἐπέτρετον δὲ φύλλον ἔχει πηγανῶδες, παραπεφυκὸς πᾶρ' ὅλον τὸν καυλόν, διαλαμβανόμενον ὑπαλλήλως, ὥς τε φανὴν τὴν ὅλην εἶναι μορφήν. Κολλοῦσάνθη δὲ, ἐλαιοῦσάνθη ἀδιαφράκτως. Φύεται δὲ ἐν τῇ γλίσσει, ἔχει γὰρ ἐν τῇ μέλει ἐν τῇ σπορέμῳ, καὶ γεωργούμενῳ. Διὸ καὶ πολέμιον τοῖς γεωργοῖς. ἔστι δὲ δυσόλεθρος. ὅταν γὰρ λαβὴ χώρας βάθος, ὅθι τὰ κάτω ἔσθυσ, ἔχει ἔχαστον ἑτος ἀποφύσας ἀφεμένη εἰς τὰ πλάγια, πάλιν εἰς τὸ ἕτερον ὀθείται κάτω, καθεῖσθαι μὲν ἄνω ὅλην. τὸ δὲ βραχείσης γίνεται τῆς γῆς, καὶ ἀπολλυται ῥῶν. εἰ δὲ μικρὸν ἀπολεσθῇ, ἀπὸ τούτου πάλιν βλαστάνει. ἀρχεῖται δὲ τῆς βλαστήσεως γέρως, τελευτᾷ δὲ μεσοπάρῳ. Id est, Anonis ramis aculeata est, annuo folio, Rutæ simili, iuxta totum caulem, alternato foliorum exortu interceptum, vt veluti coronam ea tota figura representet: flore tanquam mutilo, qui siliquis insidet, & nullo interstitio discepiunt. Nascitur in glutinoso pinguiq; solo, & præcipue in segetibus atque cultis: quare agricolis inimica est. Præterea viuax admodum est. Cum enim altam tellurem occupauerit, recta deorsum sese impellit, singulis annis furculos è lateribus fundens, rursus sequente anno in profundum agitur. Effodienda ideo tota est, quod madefacta terra faciendum: sic enim facilius interit. Nam si paruum quid relinquatur, ex eo rursus succrescere potest. Estate autem

Nomina

Ruel. lib. 1. cap. 20.

Lib. 3. c. 18.

Forma.

Lib. 21. c. 16.

Lib. 27. c. 4.

In ca. 18. li. 3. Dioscor.


Lib. 6. Hist. cap. 5.

Locus.



germinare incipit, perficitur autem Autumno. Hæc Theophrast. Ex quibus perspicuum est Plinium, quæ de Anonide scripsit, partim ex Dioscoride, partim ex Theophrasto transcripsisse, si hoc excipias, quod ille Anonida post ver spinosam esse dixerit, hic æstate tantum germinare, & Autumno perfici. Quidam eum locum Plinij sic legunt, ac distinguunt, conueniente sensu. Anonim quidam Ononida malunt vocare, ramosam, similem Fœnogræco, nisi fruticosior hirsutiorq; esset, ac spinosa, odore iucundo. Estur etiam, muria post ver condita, nimirum æstatis initio, quo tempore tenella germina conditura apta sunt. Præterea hæ

## ONONIS.



Locus.  
Tempus.

Lib. 3. ca. 18.  
Vires &  
Temper.

Lib. 27. c. 4.

Li. 8. simpl.

In ca. 18. li.  
3. Dioscor.

Vires.

historiæ apertè indicant, Anonida eam esse plantam quam hic depinximus. Ramos enim spargit graciles, lentos, foliis vestitos, in viridi nigricantibus, rotundis, Rutæ vel Loti Prætenfis foliis similibus, inter quæ nocentiores, & mucronatæ spinæ, quasi spicula subriguntur. Flos ferè Pisi dilutiore micat purpura, interdum niueo colore nitet: siliquæ parua: lato semine refertæ. Radix in nigro candicat, valde lenta, ramis longè lateq; expatiâtibus, ob id rusticis notissima, quod non modò ramorum radicumq; implexu aratra in mediis fulcis sæpius remoretur, sed etiam quod melsoribus acutis spinis sit infesta. Nascitur præcipuè in segetibus. Floret Iulio mense & Augusto, Autumno sui incremèti finem faciens. Muria conditur, inquit Dioscorides, antequàm spinosa fiat, cibis gratissima. Radix exalfacit & extenuat. Eius cortex è vino potus vrinam ciet, calculos comminuit, margines vlcærum erodit. Radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collutione mitigat. Decoctum eius in potu, hæmorrhoidas sanare creditur.

Quæ postrema, decoctum eius & cætera Oribasius non habet, neque Plinius, qui ex Dioscoride hæc apertè transcripsit. Estur etiam muria condita. Recens verò margines vlcærum erodit. Radix decoquitur in posca dolori dentiū. Eadem cum melle pota calculos pellit. Comitialibus datur in Oxymelite decocta ad dimidias. Ononis, auctore Galeno, radicem habet quadamtenus, tertio ordine exalfacientem. Ea est maximè utilis, habens quippiam & abstersoriū & incisorium. Itaque non tantum vrinam prouocat, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas detrahit. Utuntur porro ea quoque & ad dentium dolores, collui videlicet eam in Oxycrato coctam præcipientes. Tradit Matthioli Anonidis radicis vim maximam inesse ad renum calculos comminuendos, expellendosque, præsertim obstructis vrinæ mearibus, multorum testimonio iam comprobatum esse, qui calculo laborantes, cum corticis radicis puluerem tantum è vino diutius bibissent, pristinam sanitatem recuperarunt: nouisseq; sese ait, qui huiusce radicis puluere diutaxat multis mēsis sumpto, carnosum ramicè absumpsit, & sanatus est, cum à medicis sola sectione vltioneq; curari posse decretū esset. Eroduntur huius radicis puluere callosi ac indurati vlcærum margines. Decocta in posca dentium dolores mulcet, si decocto os colluatur, præsertim cum pituita redundat. Eiusdem decocto solo, putant quidam sanari hæmorrhoidas. Id verò certū est idem decoctum potū summopere ad iocinoris & vasorum infarctus valere



valere. Corticum recentium eiusdem radice libræ quatuor minutim cōcise in vini Cretici libris octo macerantur: deinde in vitreâ metam cōiiciuntur, ex qua

**ONONIS LVTEA**

non spinosa, Natix Plinij  
Herbariorum.



in calentis aquæ balneo collocata elicitur aqua, quæ epota semilibræ pondere non solum renes à calculis liberat, & vrinam prouocat, sed etiam vesicam, & eius ceruicem à glutinosis excrementis obsessam expedit. Quidam herbam aliam hîc depictam Ononida non spinosam vocant, alij Melilotum maiorem, alij Melilotum sylvestrem pingue. Sunt qui Natricæ Plinij esse arbitrêtur, quod non solum radix euulsâ, sed & herba tota virus hirci, aut, vt aliqui exponunt, bituminosum, & grauem fœtorem redoleat. Radice est nigra, crassa, in multos lignosos surculos diuisa: caulibus multis fruticat, cortice subrubro amictis: foliis Pratenſe Triphyllû amulatur, si quis digitis terat, ingratum & iniucundum odorem spirantibus: florem edit luteum, lineis subrubris virgatû, Pîso similem. Semen filiquis includitur. Gignitur in aridis, glareolis, & sabulosis. Aduersus omnia venena prodesse & admotam & sumptâ experientia compertû est. Natrice in Piceno à fœminis abigunt, quos mira persuasione Fatuos, (Faunos) vocant, inquit Plinius, ego species limphantiû hoc modo animorû esse crediderim, qui tali medicamêto iuuentur.

Li. 27. ca. 12.

Forma

Locus.

**PISUM, CAP. XLI.**

**D**E FRUGIBVS, earum vitiis siue morbis, aliisque herbis quæ inter has nascuntur diximus, nunc de Leguminibus tractandum. Legumina quidem dicta putat Varro à legendo, quoniâ ea nō secantur, sed vellendo leguntur. Legumenta etiam Gellius appellat. Græci δασυα vocant, Theophrastus χέδρωπα. Inter ea notissimum omnibus est Pisum, à quo exordiemur. Græcis όπίσος vocatur, plerique etiam λέκυθον dici putant, sed impropriè. Nam ex farina Leguminum pulmentarium λέκυθον à Græcis dici testatur Galenus his verbis: έτνος όνομάζω τὸ εκ τῶν έρεχθέντων όπείων τε ή χεδρόπων στεναζόμενον, λέκυθον διετὸ εκ τῶν αλεαθέντων αλευρον έφ όρμημον εν ύδατι, προσεμβαλλόμενε τῶ λήπυς. Id est, Et nos appello pulciculam quæ ex decorticatis & frefis Leguminibus fit. Lecythum verò, ex molitorum farina, in aqua cum aliquo pingui decocta. Vnde λεκυθοπῶλα Græcis dicuntur, qui eiusmodi pulmentaria, farinas videlicet Leguminû elixatas, & pinguedine aliqua conditas vendunt. Tamen λέκυθος alia sunt apud Græcos significata, hoc loco non declaranda. Pisum à Pîsa loco in quo olim copiosissimè nascebatur nominatum dicunt. Galli *Pois* appellant, Germani *Erbfe*. Eius duo apud nos reperiuntur genera. Vnum in aruis caudum, humi serpens, alterum in altum scandens, arboris ramis quibus accubet adfixis, & sese, capreolis vinciens, illiget. Ramulare solemus appellare, *Pois ramé*. Caulibus exit fistulosis, ramosis, per terrâ sparsis, nisi ramulos inueniat quibus fulciatur, rotundis, fragilibus: folio frequente, amplo, & longo, crassiusculo ac sub pingui: capreolis multis, quibus admotis adminiculis sese implicat: flos est

Lib. 1. ca. 23. & 24.

Nomina

Inli. de bono & malo. suc.

Genera.

Marth. in cap. 101. lib. 2. Dioscor. Ruell. lib. 2. cap. 34.

Forma.





*Locus.*  
Lib.1. c.10.  
Lib.18. c.16.

*Tempus.*


Lib.8. Hist.  
cap.3.

*Vires.*  
Lib.1. Alim.

Lib.1. c.79.  
Matth. in  
cap.101. lib.  
2. Dioscor.

καθαπερ ὡς ὁς, πῖς, ἀθύρος. Id est, Alia autem humi procumbentē caule habent, vt Ochrus, Pisum, Lathyrus. Pīsa Hippocrati minus inflant, sed magis per aluū secedunt. Pīsa Galeno tota substantia cum Fabis quandā habent similitudinem, eodemq; cum Fabis modo sumuntur, His duabus tamen rebus ab eis discrepāt, tum quod non æquē ac Fabæ sunt flatuosa, tum etiam quod detergendi facultatem non habent, ideoq; segnius quā illæ per aluum secedunt. Pisum Paulo, laxum quidem est, non tamē adeo flatuosum, ac Fabæ. Ex quibus perspicitur permultum falli eos qui scribunt Pisorum iure hausto purgari puerperas, lactis copiam augeri, ictericos sanari, & aquæ intercuti succurri. Quo enim pacto præstare ea possit medicamentum quod refrigerat, & siccāt? Sed his errandi occasionem præbuit Tragus, qui perperam putarit Pisum Cicer esse Arietinum, cui supradictæ insint facultates. At quantum Cicer à Pīso distet, suo loco dicetur. Quare cum nulla Pīsis abstergendi vis insit, Galeno auctore, nec puerperis Pīforū ius propinandum, nec eorum decoctorum cremore aluum cieri verum est. Recentia Pīsa quæ cum siliquis manduntur ructus mouent. Rura nostra nullum Legumen magis nouere, quæ ad anni totius vsum diligenter siccata, & siliquis suis explicita recondunt: ita enim exhausto solibus humore diutius à putredine vindicantur. Diuites quoque cum pernīs salis, aut suillis succidiis incoquant, non ingrato cibo, qui in oppiparis cœnis sese offerre sapius audeat.

*P I S V M Americum.*



Hic non omittendum Pisum coccineum Americum ex Legumine Pīso simili vel Eruo natum: folliculo Pīso sylvestri ferè pari semina clauduntur: medullofa, durissima, teretia, oblonga, Pæoniæ æmula, sed minora rubro miniata, rutila, ad basim vbi germen, ornata nigris maculis, rotundis, conspicuis, gustu amaro, vt in quibusdam Leguminibus.

*FABA*



FABA,

CAP. XLII.

**F**ABOS Græcis à feracitate dicta Faba Latinis vocatur, & κύβητος Nomina  
ἑλληνικὰς, id est, Faba Græca, ad differentiam Ægyptiæ. Eadem nomi-  
natur & Fabulum auctoribus Gellio & Festo, Arabibus *Hachille*, *Ha-*  
*balte*, siue *Buchale*, Italis *Fava*, Germanis *Bonen*, Gallis *Fève*. Fabarum *Genera.*  
genera duo nobis sunt coloribus distantia. Sunt enim Fabæ candidæ, siue in  
candido pallentes: sunt & aliæ nigrae, aut in nigro purpurascentes. Nascitur  
quoque Faba sua sponte, plerisque in locis, inquit Plinius, sicut Septentriona-  
lis Oceani insulis, quas ob id nostri Fabarias appellant. Item in Mauritania syl-  
vestris passim, sed prædura, & quæ percoqui non possit. Faba caulem profert *Forma*  
longum, quadrangulum, rectum, glabrum, ex quo ramuli exeunt inæquali exor-  
tu: in quibus folia sub pinguis, glabra, sub rotunda, portulacæ similia. Ex ra-  
mulum cacuminibus capreoli exoriuntur singulares, sed adeo tenues, ut faci-  
lè depereant: at ex caulium alis flores multi ex vno pediculo racematim exeunt,  
vno duntaxat latere, ordine appensi, versicolores, hirti, & cristati. Siliquæ gi-  
gnuntur primùm iis è floribus qui in inferiore caulis parte sunt, aliorum legu-  
minum siliquis maiores, crassiores, carnosioresque, apice in acutum desinen-  
te, in quibus Fabæ concluduntur, forma & magnitudine differentes: nam aliæ  
magnæ, aliæ parvæ, aliæ subrotundæ, aliæ compressæ, aliæ albicantes, aliæ sub  
nigrae, aliæ subrutilæ. Radix est singularis, lignosa, capillata fibris. Fabam sylue-  
stem scribit Matthiolus passim in campestribus humi repere, caulibus qua-  
drangulis, sese inuicem implicantibus, folio Fabæ sativæ, floribus in purpura  
albicantibus, è quibus siliquæ oriuntur, compressæ, Fabarum siliquis longè  
minores, in quibus semen continetur rotundum, Fabarum sapore. Sunt, inquit,  
qui hanc plantam velint Galeni Aracum esse, κύβητος ὁ, inquit Theophrastus,  
μέγιστα τῶν χερσῶν ὀρθόγων ὁ κύβητος. Id est, ex leguminibus sola maximè Faba,  
recto caule surgit: & paulo post ἐχέει δὲ τὰ ἀνθη διαφορὰν, καὶ τῇ φύσει, καὶ τῇ θέσει.


Li. 18. c. 12.

Forma

Lib. 8. Hist.  
cap. 3.  
Ibidem.

FABA sativa.

FABA sylvestris.





- Id est, est & florum eius à reliquis differentia, tum natura, tum positu. Idem,
- Ibid. cap. 1. τῶν ὃ χεδρόπων μάλιτα κύαμος, καὶ κένχρεος πρῶτισπορα, ταῦτα καὶ τὴν ἀπορῶσαν πρῶτα βῆν τῇ ρίζῳσι βούλεται τοῦ χειμῶνος. Id est, ex leguminibus Faba & Milium maturè ferenda. Ea enim propter imbecillitatem, radicatione hiemem anticipare
- Lib. 18. c. 21. volunt. Faba feritur Plinio ante vergiliarum occasum, leguminum prima, ut antecedit hiemem: & paulo post: Vergilius eam per ver feri iubet, circumpadanæ Italiæ ritu: sed maior pars malunt Fabalia (purgamenta, siue stipulas & culmos Fabarum) maturæ sationis, quàm trimestrem fructum eius. Idem scribit
- Cap. 2. libr. 8. Hist. Theophrastus. τὰ μὲν χεδρόπα μονόριζα εἰσὶ πολλὰς ἀνωθεν ἀπὸ τῶν χαυλῶν ἀπορῶσις ἔχοντα, πολλὴν κυάμον. τὰ δὲ σιτηρὰ πολύριζα. Id est, legumina singulas habent radices
- Ibid. cap. 7. & surculos multos superne ex caulibus mittunt, dempta Faba. Frumenta multis radicanter fibris. Leguminum vnicaulis Faba sola inquit Plinius: vnus & lupinis: cæteris ramosus, prætenui surculo: omnibus verò fistulosus. Idem rursum: Fabæ in folia exeunt, ac deinde caulē emittunt, nullis distinctū internodiis. Reliqua legumina surculosa sunt. Βλεψάνει τὰ μὲν θάπτον, inquit Theophrastus, τὰ δὲ βραδύτερον. καὶ κριθὴ μὲν, καὶ πυρὸς ἐβδομαῖα μάλιτα. πρῶτερες δὲ ἡ κριθὴ μάλλον, τὰ δὲ σιτηρὰ τέταρτα, ἢ πεμπταῖα. πολλὴν κυάμον, κύαμος δὲ καὶ τῶν σιτωδῶν ἐν πλείωσιν. ἐναχὺς δὲ σιτηρῶν δεκάτιος, ὅτε δὲ καὶ εἰκοσῆτος: at Plinius: Erumpunt à primo satū, Hordeum die septimo, legumina quarto, vel cum tardissimè septimo: Faba à x v. ad x x.
- Li. 8. Hist. cap. 2. Quot verò diebus floreat, sic declarat Theophrastus. Ἀλλὰ τῶν χεδρόπων χρόνιος ἡ ἀνθῆσις. χρόνιος δὲ τῶν μὲν ἄλλων, ὁρόος, καὶ ἐρεβίνθος, τούτων δὲ ἀπάντων τοῦ κύαμου, καὶ ἐν μεγίστῃ διαφορᾷ: τετραράκουσι καὶ ἡ μέρων ἀνθῆσις λέγουσι. πολλὴν οἱ μὲν ἀεὶ οἱ μὲν ἀεὶ παρὰνθῆσιν, ἕτερον καὶ ἕτερον λέγουσι: κατὰ μέρος καὶ ἀνθῆσιν, οἱ δὲ ἀπλῶς. ἡ καὶ ἀνθῆσις τῶν μὲν ταχυερῶν, ἀθρόα, τῶν δὲ ἐλαιοβωδῶν, καὶ χεδρόπων πάνταν κατὰ μέρος. πρῶτα καὶ ἀνθῆσιν τὰ χυτῶ, καὶ ὅταν πάντα ἀπαυθῆσιν, τὰ ἐχόμενα. καὶ οὕτως ἀεὶ βαδίζει πρὸς τὰ ἀνω, quæ Plinius expressit his verbis. Legumina diutius florent, & ex his Bruum ac Cicer, sed diutissime Fabæ x l. diebus, non autem singuli scapi tamdiu, quoniam alio desinente alius incipit: nec tota seges sicut frumenti, pariter. Siliquantur verò omnia diuersis diebus, & ab ima primum parte, paulatim flore subeunte. Præterea scribit idem Theophrastus. Κύαμος δὲ ἀνθῶν μάλιτα φύει βρέχεσθαι. διὸ καὶ ἐνι ἐθέλεισιν ὀψιπορεῖν, ὥσπερ εἰπομεν, ὅτι πολὺ ἀνθῆσιν, μετὰ δὲ τὴν ἀπάνθισιν ὀλιγον πάλιν ὑδατος δέεται συνέγγυς καὶ τελείωσις. Quæ Plin. sic interpretat<sup>9</sup> est. Faba aquas in flore maximè concupiscit: cum verò defloruit, exiguas desiderat. Et, ὁ δὲ κύαμος, ὥσπερ ἐλέχθη, καὶ ἄλλως οὐβαρύς, καὶ ἐτι κοπρίξιν δλοεῖ τὴν γῆν διὰ μακρότητα, καὶ εὐσηφίαν. διὸ καὶ οἱ περὶ μακεδονίαν καὶ θετταλίαν, ὅταν ἀνθῶσιν, ἀνατρέψουσιν τὰς ἀρούρας. Id est, eodem Plinio interprete, Solum in quo nata est, lætificat, stercoreis vice. Ideo circa Macedoniam Thessaliám que cum florere incipit, verrunt arua. Hæc & plura alia, quæ potest, atque nostræ vulgari Fabæ ita conuenire, ut eorum plane reiicienda sit opinio, qui Fabam vulgarem veterum Fabam non esse, sed alterius nominis legumen, nimirum Phaselum esse prodiderunt. Dicat mihi quæso aliquis, paruum, illud nigrum, quod summæ Fabæ adhæret, & quod hilum dicitur, in quo alio legumine, quàm in Faba nostra reperitur? Nam quod in Americo Pisco Indicouæ nigrum spectatur circa germinis exituri cauum, atra nota est impressa cortici, non verò laciniosum Hilum, quod integro cortice auelli queat, ut in Faba. Quæ verò de Fabarum forma, & magnitudine sparsim apud auctores leguntur, & quibus illæ à Fabis nostris differunt, tanti non sunt momenti, ut sententiam nostram possint conuellere. Nam diuersis in terris maiores & minores producantur, & alia atque alia forma, & magnitudine etiam in iisdem siliquis reperiuntur, & cum crescere incipiunt, & cum perfectæ sunt. Præterea veterum

Faba



Faba pusilla tantum fuit, & veluti par, Loto ac Terebintho comparatur, Taxique bacca maior Faba asseritur, nostras verò cultu maior, pinguior, grandiorque facta, illa contempta nomen retinuit, non specie diuersa, sed potius fructus magnitudine & figura, quam plantæ natura, temperamento, aut lineamentis distat. Faba hæc minor Italici, Sebusiani, Alpinique gentibus Belgio frequentissima est, ad veterina alenda, sed nuspiam vsus frequentior quàm in Anglia, vbi panes fabaceos veterinis dant, non triticeos. Sed est & syluestris Faba, vtrique etiam minor. Sebusiani quidem rustici non alio pane vescuntur, quam confecto ex paululo tritici, Secale, & rotunda minutulaque Faba. Iam verò præter notas, etiam facultates quas fabæ veteres tribuerunt nostris optimè competere, siue illas ut cibum, siue ut medicamentum consideres, longa experientia comprobauit. Faba pro cibo sumpta inflationem excitat, Dioscoridi, ægrè cōcoquitur, tumultuosa somnia facit, tussi confert, carnem gignit, media calidi frigidique natura. Decocta in posca, & cum cortice suo esitata, dysenterias, & cœliacorum profluvia sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatio leuior sequitur, si aqua prior, inter coquendum abiiciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremque flatum parit. Inflat is cibus, Galeno, etiam si coctus diutissimè fuerit, ac quouis modo paratus, cum tamen ptissana tempore quo coquitur flatum omnem deponat. Qui autem animum attendunt, eosque affectus, qui cibos singulos manent, animo adsequuntur, sentiunt in toto corpore velut à spiritu flatulento tensionem quandam: potissimum si quis huic cibo non est assuetus, aut ipsum non bellè percoctum sumpserit. Habent autem Fabæ substantiam non densam, nec grauem, sed fungosam, ac leuem, quæ vim quandam, quomodo ptissana, habet detergendi. Apparet enim perspicuè ipsarum farina sordes à cute detergere: quod mangones ac mulieres intelligentes, in balneis quotidie Fabarum farina vtuntur, quemadmodum alij nitro, atque aphronitro, & in summa detergentibus. Hac præterea & faciem inungunt: tollit enim lentes quæ in summa cute apparent: ob quam facultatem ventrem non cunctanter permeat, ut quæ crassi sunt succi & lenti, quæque nullam detergendi habent facultatem. Cum autem Fabarum puls sit flatulenta, multo adhuc magis erunt flatulentæ, si quis integris ipsis coctis vtatur. Si tamen fixæ fuerint, flatum quidem deponunt, sed concoctu sunt difficillimæ, tardèque prætereunt, & crassi succi alimentum corpori exhibent. Quod si virides priusquam maturæ sint, atque exsiccata edantur, idem eis accidet quod fructibus omnibus, quos ante perfectam maturitatem mandimus: humidius scilicet alimentum corpori præbebunt, ob idque excrementosius, non in intestinis modò, sed in toto etiam habitu. Merito igitur Fabæ eiusmodi, minùs quidem nutriunt, sed promptius deiciuntur. Plerique autem hominum non crudas modò Fabas virides comedunt, verum etiam cum suilla eas coquunt, veluti olera, ruri verò cum caprina, & ouilla. Alij Fabas inflare sentientes cepas admiscunt, cum pulcem in patinis ex ipsis struunt. Sunt qui cepas crudas, nec simul elixas cum ipsa comedunt. Pulcem siue edulium ex leguminibus fractis, siue frefis Græci, auctore Galeno, εἶνος vocant, ut capite de Piso diximus. Sic εἶνος κυάμινον puls erit ex Fabis frefis, quæ variè paratur, ut ait idem Galenus, siue liquida in ollis, siue spissior in patinis. Tertiùs est Fabæ præparandæ modus qui fit cum ptissana. Vt autem κυάμινον εἶνος nihil aliud est quam Faba fresa elixata, ita κυάμινον λεύκος nihil aliud est quàm Fabæ lomentum elixatum. Paulus Aeg. ad clauos & callos. ποῖον τὴν ἢ λεύκος κυάμινον μετ' ὄξους ἐψηθείτω. Id est, facit & Fabæ lomentum cum aceto coctum. Inter legumina maximus honos Fabæ, inquit Plinius, quippe ex qua tentatus sit etiam panis. Lomentum appellatur farina eius, aggregaturque Tritici pondus illa, ex omni

Lib. 2. c. 98.

Vfus

et Vires

Li. 1. Alina.

Li. 1. Alim.

Cornar. in  
libr. 5. pha.

Li. 18. ca. 12.



omni legumine. Iumentorum verò & pabulo venalis. Fabæ multiplex vsus omnium quadrupedum generi, præcipuè homini. Frumento etiam miscetur apud plerâsque gentes, & maximè panico, solida, aut delicatius fracta. Quin & præscito ritu Fabacia puls, (Fabata puls Turnebo,) religione Diis in sacro est, prævalens pulmentari cibo, & hebetare sensus existimata, in somnia quoque facere. Ob hæc Pythagorica sententia damnata: vt alij tradidère, quoniam mortuorum animæ sint in ea. Qua de causa parentando vtique assumitur. Varro & ob hæc Flaminem ea non vesci tradit, & quoniam in flore eius literæ lugubres reperiuntur. Plutarchus in problematis aliam causam affert, cur Pythagoras à Fabis abstinendum iusserit nempe quod omnia legumina spiritum & humorem impurum ingenerent corporibus, atque hanc ob causam ad venerem incitent. In eadem sententia Cicero fuisse videtur, cum scribit adhunc modum. Iubet igitur Plato sic ad somnum proficisci corporibus affectis, vt nihil sit quod errore animis perturbationemque adferat. Ex quo etiam Pythagoreis interdictum putatur, ne Faba vescerentur, quod habet inflationem magnam in cibis, tranquillitati mentis quærenti vera contrariam. Aristoxenus tamen apud Gellium refellit hanc opinionem, affirmans Pythagoram nullo legumine sapius vsum quam Faba, quod is cibus sensim aluum subduceret, & læuigaret. Porro Gellius quod in cibis Cyamos repudiaretur, causam erroris fuisse putat, Empedoclis carmina qui disciplinas Pythagoricas sectatus est, inter quæ versus hic inuenitur.

Δεινὸς πῶς δεινοὶ κυάμων ἀπὸ χεῖρας ἔλεον.

*Ah miseri à Cyamo miseri subducite dextas.*

Opinati enim sunt plerique κυάμων legumentum vulgo dici. Sed qui diligentius scitiúsque carmina Empedoclis arbitrati sunt, vtat enim Gellij verbis, κυάμους hoc in loco testiculos significare aiunt, eosque more Pythagoræ opertè atque symbolicè κυάμους, appellatos, quia sint eis τὸ κύειν δεινοί, ἢ ἀλλοι τὸν κύειν, id est, ad conceptum efficaces, causæque grauiditatis, & geniturae humanæ vim præbentes. Idcirco Empedoclem versu isto non à Fabulo edendo, sed à rei veneræ proluvio voluisse homines deducere. Empedoclis carmini similes eodémque sensu Orphei versus hos Cassianus in Geoponicis recitat: δεινὸς πῶς, δεινοὶ, κυάμων ἀπὸ χεῖρας ἔχοντες, ἴσον δὲ κυάμους φαγέειν κεφαλῆς τε τοιχίων. Sed de his satis. Nunc de Fabæ in medicamentis vsu dicendum κυάμινον ἄλευρον, id est lomentum Fabaceum (quod & ἄλευρον ἐρέγγινον dicitur) & per se & cum polenta illitum, inflammationes quas vulnus excitauit, mitigat; autore Dioscoride: cicatrices concolores facit: turgentes grumoso lacte mammas, etiam si inflammatione tententur, adiuuat: lac restinguit: furunculos, sugillata, parotidasque cum fanigra: ci farina & melle discutit: cum Rosa autem, thure, & ouicandido præcidentes oculos, tumores, vuâsque reprimat: subactum vino suffusiones, & ictus oculorum recreat: manducata sine cortice Faba, ad auertendas fluxiones frontis illinitur: decocta in vino testium collectiones sanat: quo tardius pubes erumpat pueris, imo ventri illinitur: vitiliginem purgat: Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascuntur, gracilescent, & minùsimenti capessunt: cum polenta, scisso alumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas discutiunt. Decocto earum lanæ inficiuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis: namque eas supprimit, si semisecta apprimatur: quæ postrema sic Græcè leguntur. Ἐπιθεταὶ δὲ πρὸς τὰς ἀπὸ τῶν βδελλῶν ἀμορφογίας λελεπισμένους, εἰς δύο διαμεθεῖς, καὶ ὁ πρὸς τὴν φυκὴν, ἐπὶ χεῖρ δὲ πρὸς τυττῆμινος καὶ τὸ ἡμισθίον. Quorum verborum hunc sensum esse Lacuna existimat. Excorticatæ autem Fabæ, atque in duas partes diuisæ (in tot enim singulæ natura diuidi consueuerunt) applicari



applicari solet dimidia pars contra effusiones sanguinis ab hirudinibus excitatas: eas siquidem supprimit, appressa qua parte alteri cohærebat. Sed breuius & melius, opinor sic Cornarius vertit. Faba decorticata in duas partes diuisa, qua parte ex natura coaluit, ad sanguinis ab hirudinibus eruptiones imponitur, ipsasque cohibet, si secundum semisectam partem apponatur. Auxiliatur & morbis Faba, inquit Plinius, Namque solida fracta feruensque in acre acetum coniecta torminibus medetur. In cibo fresa, & cum allio cocta contra deploratas tusses suppurationesque pectorum quotidiano cibo sumitur: commanducata ieiuno ore, etiam ad furunculos maturandos discutiendosue imponitur: in vino decocta, ad testium tumores & genitalium lomento quoque ex aceto decocto tumores maturat, atque aperit. Item liuoribus, & combustis medetur. Voci eam prodesse auctor est M. Varro. Fabalium etiam siliquarumque cinis ad coxendices, & ad neruorum veteres dolores, cum adipis suilli vetustate prodest, per se cortices decocti ad tertias sistunt aluum. Hæc Plinius, quibus assentitur Galenus his verbis. Faba medio temperamento proxima est, in exsiccando, & refrigerando. Caro eius paulum quoque abstergentis facultatis continet, sicut putamen nonnihil adstringentis. Idcirco medicorum nonnulli totam Fabam cum Oxycrato decoctam dysentericis, celiacis, vomentibus exhibuerunt. Porro vt edulium, flatuosa est, ac coctu difficilis, si quid aliud, sed excreationibus ex pectore & pulmone idonea: eadem, vt medicamentum, foris imposita, desiccet innoxie. In podagricis ea sæpenumero vsi sumus ex aqua decocta, & ita adipi suillo admista. Ad neruorum tum cōtusiones, tum vulnerationes farinam eius cum Oxymelite imposuimus ad eos quos ex ictu iam phlegmone occupauerat cum polenta. Sed & testium & vberum aptum est cataplasma. Nam hæ partes cum phlegmone tenentur, moderate refrigerari volunt, maximè cum vbera ex lacte in ipsis concreto phlegmonen patiantur. Quin lac quoque ab ipso cataplasmate exstinguitur, sicut puerorum pubes farina Fabacea illita, plurimo tempore glabra permanet. Quod Dioscorides dicit, *Κύαμος μέσος θερμὸς καὶ ψυχρὸς*, id est Faba medium inter caliditatem & frigiditatem obtinet, Galenus habet *Κύαμος καὶ ἐγγύς τῆς μέσης κράσεως ἐστὶν ἐγγυιάτω καὶ τὸ θερμαίνει, καὶ καὶ τὸ ψύχειν*. Ita & Paulus qui ex Galeno transcripsit. *Κύαμος οὐ πολὺ τῆς μέσης ἀρέτης καὶ κράσεως καὶ τὸ ψύχειν καὶ θερμαίνει*. Id est, Faba non multum à medio temperamento abest, tum refrigerando, tum siccando. Similiter etiam Ætius. *Κύαμος καὶ τὸ ψύχειν καὶ θερμαίνει τῆς μέσης ἐστὶν ἐγγυιάτω κράσεως*. Id est, Faba frige faciendo ac siccando ad medium temperamentum propinquissimè accedit. Merito igitur dubitari potest, quod sit medium temperamentum Fabæ tum refrigerando, tum siccando, cum medium inter opposita ac contraria intercedere videatur, & id sit quod ab extremis æqualiter distet. Cum verò frigidum & siccum non sint opposita, quæ inter ipsa medium erit temperamentum? Quare pro *ξηραίνει* in tribus supra citatis auctoribus legendum esse censet Cornarius, vt inter calefaciendi & refrigerandi vim Faba medio sit temperamento, quemadmodum dixit Dioscorides Fabam inter calidum & frigidum media esse natura. Archigenes apud Galenum inter reliqua auxilia ad sugillatos, Fabæ fresa aliquoties meminit. *καὶ ἀπλοστέ ὁ ἐρεγμὸς λείψω, ἀψινθίω, & cætera*. Id est cataplasmate autem vere. Faba fresa contrita, absinthio, & cætera: ac rursum, *ἐρεγμὸν μασησάμενος ἐπιθεῖς σὺν μέλιτι, & χωρὶς τοῦ μασησάμενος κυάμινον ἀλευρον*. Id est, Fabam fresam commanducatam imposito cum melle. Quin & Fabæ lomentum etiam non mansam. Item Appollonius, *ἀψινθίω λείψω μέλι καὶ μέλιτος, ἐρεγμὸς παραπλησίως*. Id est, absinthio trito cum melle, & Faba fresa eodem modo. In quibus & omnibus aliis huiusmodi, Faba fresa quæ etiam à Plinio fracta dicitur, ea est quam Græci *ἐρεγμὸν*

Li. 22. c. 25.

Lib. 7. sim.

Lib. 7. ca. 3.

Emb. 93. li. 2.

Li. 5. ph. 10.

Ibidem.

Corn. Ibid.



ἐρεγγμόν simpliciter vocant, ἀπὸ τοῦ ἐρεχθῆναι, quod videlicet in minutas partes sit fracta, vt sit ἐρεγγμός in Faba, quod χόνδρος & πρῖσανη in frumentis. Quæ verò molita est, & in farinam redacta, lomentum Fabaceum dicitur, vt ex Plinio iam diximus, Græcis κυάμινον ἄλευρον, & ἄλευρον ἐρεγγμῖνον, quod etiam cum melle subactum hoc loco commodè sugillatis imponitur. At ἐρεγγμός pro lomento & farina Fabarum etiam nonnumquam vsurpatur, sicut hoc loco sumi videtur. ψιμυθίς, & λυθαργύρον ἴσα μελὶ μέλιτος λεάνας ἐρεγγμόν, μίσγε. ὡς εκηρω τῶδες γενέσθ. Id est, Cerusæ & spumæ argenti æquales partes cum melle terito, & admixta Faba fresca, ad cerati formam reducito. Non possit enim ἐρεγγμός in cerati formam commodè admisceri, nisi in farinam redactus. Præterea ἐρεγγμός non de Faba solum dicitur, sed & de aliis leguminibus, itémque radicibus eodem modo fractis. Paulus. ἵρεως & πρῖσανης ἐρεγγμῖ ἀνὰ ξ. α. s. Hoc est, iridis & ptissanæ fractæ, seu fresæ vtriusque sesquiseptarium. Hippocrates, & κριθὰς παρωσμέναις & ἐρηγεγμέναις, Id est, hordeum tostum ac fresum. Galenus Cicer fractum non valde in cibo familiare esse scribit, sed magis farinam ipsius in lacte coctam, cùm non possit eodem modo quo Fabæ & Pisæ frangi, vt ex ipso ἐρεγγμός fiat. Sed Pauli locum supra positum cum Cornarius citasset, vt ἐρεγγμόν non solum de Faba, sed de aliis etiam fractis dici ostenderet, idem alio in loco Græcos Pauli codices falso habere tradit, ἵρεως, πρῖσανης, ἐρεγγμοῦ ἀνὰ ξ. α. s. vt ἐρεγγμός ptissanæ non attribuitur, sed tria distincta sint medicamenta, iris, ptissana, Faba fresca, siue lomentum Fabaceum. Id quod ex Ætio probat, qui idem medicamentum his verbis habet. ἵρεως λεάνας, πρῖσανης ἄλευρον, κυάμινος ἄλευρον. Ex quo loco id etiam intelligatur ἐρεγγμόν, Paulo significare, id quod Æti<sup>9</sup> dixit κυάμινον ἄλευρον, vt non solum pro Faba fresca, sed etiam pro lomento Fabaceo ἐρεγγμός accipiatur, quemadmodum iam diximus. Sicut Plinius ex Faba tentatum fuisse panem scribit, & eam frumētō misceri, ita hodie quidam eius farinam fecali miscent, ac panem cōficiunt solidum, & multi nutrimenti. Phrysi etiam hodie magna ex parte Fabarum farina hordei farinæ aut auenæ admixta panes faciunt in illis præsertim insulis, quas ex Plinio Fabarias appellatas fuisse memorauimus. His subiungemus Fabaginem Belgarum, quam alij Leguminosam Capparim vocant, Parisienses Peplum: folia Capparis habet, longiora, & gemina, Fabæ similitudine, ex atro virentia, minora tamen & ad Rutam accedentia: flores geminos, Capparibus conditis similes, expansi candidi, foris herbidi, è quorum medio fibræ crocææ stamina educuntur. Vniuersa planta gustu est amaro, Salicis, aut Capparis. Gallis & Belgis, nisi rarò in hortis occurrit. Hæc Lobellius.

Gal. Ibid.

Lib. 3. c. 25.

De mu. na.

Li. 1. Alim.

In com. lib.

s. i. h. loc.


In Dalub.

in Paul.

Lib. 8. ca. 5.

**FAGABO BELGARVM,**  
siue *Peplus Parisiensium.*

Li. 18. ca. 11.



FABA



**F**ABAMOS ἀγυπτιος, Latine Faba Ægyptia, Gallicè *Feue d'Egypte*. Qui- **Nomina**  
 dam, inquit Diosc. Ponticam vocant, Herodorus Liliū Ægyptium. **Lib. 2. c. 99.**  
 Appellatur etiam à Plinio Colocasía. In Ægypto nobilissima est, **Lib. 21. c. 15.**  
 inquit, Colocasía, quam Cyamum vocant aliqui, & cætera. Sed **Ibidem.**  
 Dioscorides radicem Fabæ Ægyptiæ Colocasiam appellari ait, Athenæus neu- **Lib. 1.**  
 tro genere Colocasíon. *ρίζας λέγει Νίκανδρος, τὰ ὑπ' ἀλεξανδρέων κολοκασία καλεῖσθαι.*  
 Et paulo post, *ἢ τὸ κυάμους τοῦ ἀγυπτιῆος ῥίζα, ἢ τις λέγεται κολοκασίον.* Id est, Fabæ  
 Ægyptiæ radix, quæ Colocasíon dicitur. Et Virgilius. **Eclog. 4.**

*Mixtaque ridenti Colocasía fundit acantho.*

Ætius Colocasíon Manzizanion etiam appellat. Faba Ægyptia Dioscoridi, fo- **Lib. 1.**  
 lia habet ampla, etiam si ad arborum frondes comparentur (Græcè legitur *ἔχει* **Lib. 2. c. 99.**  
*φύλλον μέγα, ὡς πέλτασιν*: id est, folium habet magnū instar galeri. Ruellius au- **Forma.**  
 tem Plinij verbis hîc vsus est, qui melius personatæ foliis Fabæ Ægyptiæ folia  
 comparasset, quod etiam Plinius fecit, ut dicitur) caulem cubitalem, digiti cras-  
 situdine: florem roseum, dupla papaveris amplitudine: vbi flore exuitur, fert

## FABA ÆGYPTIA



folliculos vesparū fauis similes, in quibus Faba  
 supra operculum bullatis ampullæ modo pro-  
 minet. Ciborium, aut Ciborium idest arculam  
 ideo nominant, quoniam seratur ipsa humen-  
 ti glebæ mandata, & in aquam demissa. Radice  
 firmatur arundinis, crassiore. Fabā Ægyptiam  
 Tridenti sibi ab Odoardo Polono demonstra-  
 tam scribit Matthiolus, qui alias quoque plan-  
 tas, & eas quidem raras ex Syria, & Ægypto  
 detulerat. Eius Fabæ imaginem hîc ad viuum  
 expressam habetis quam plerique suspectam  
 habent. Clusius pro Colocasía pinxit plantam  
 quam Matthiolus & Dodonæus Arum Ægy-  
 ptium esse putant. Illa quaterna aut quina folia  
 habet, carnosâ nymphææ foliorum modo, sed  
 nervosa admodum, & multis venis, seu fibris  
 eminentioribus exteriorē parte contexta, in-  
 canaque, & amplissima, ut interdū personatæ  
 folia magnitudine superet, nunquam maden-  
 tia, etiam si aquis immergantur, oblongis, crassis, firmis que pediculis enascētia,  
 radice crassa, magna, duplici plerumque, & ad lagenæ modum efformata, eduli,  
 qua aliis ad latera adnatis se propagat: fibris aliquot nritur. Frequentem esse  
 multis Lusitaniæ locis ait Clusius circa riuos, ex Africa delatam: se vidisse om-  
 nium maximam, & amplissimis foliis Hispali, in horto arcis Regiæ: vbi que ta-  
 men & florem & fructum ferre negabant, Lusitanis Mauritanos secutis Igname  
 dicitur, Beticis Alcolcaz, quæ vox à Colocasía proculdubio deducta est. Cum  
 verò hæc planta plerâsque notas cum veterum Colocasía communes habeat, fe-  
 rè sibi persuadet Clusius hîc depictam eam ipsam esse quæ Græcis: *κολοκασία*, ἢ  
*ἀγυπτιῆος κυάμιος*, ἢ *πόντιος* dicitur. Expetitur hæc admodum mancipiis Æthiopi-  
 bus per Lusitaniam, à quibus & cruda & cocta estur. Bellonius lib. Obseruatio-  
 num refert Colocasiam Alexandriæ, vrbibusque & pagis vicinis frequentissi- **Cap. 19.**  
 mam in foris venalem reperiri, Ægyptiosque vix cibum sumere, quin Coloca- **Cap. 28.**  
 sia apponatur cum carnibus cocta: & aliquanto post negat florem aut fructum  
 ferre. Eius verba subiicienda, quoniam veterum de Faba Ægyptia sententiam



## COLOCASIA Clusij.

Arum Aegyptium Matth.



**Locus.** tia colere. Sed quæ veteres illi de ea literis mandarunt persequamur. In Aegypto copiosissima nascitur, teste Dioscoride. In Asia etiam Ciliciæq; lacubus inuenitur. Theophrastus eandem sic descripsit: ὁ ὅ κύματος φύλαι μὲν ἐν τοῖς ἔλεσι τῶν λίμναις. χαυλὸς ὁ αὐτοῦ μήκος μὲν ὁ μακρότατος εἰς τέσσαρας πῆχας. πᾶχος ὁ διακλυλῆτος, ὅμοιος ὁ χαλῆμος, μαλακὸς μακρὸς. Athen. ἀγρότατος διαφύσεις ὁ ἐνδοθεν ἔχει διόλῳ λῆθι διελθιμῆτος, ὅμοιος ὁμοῖος. Athen. τοῖς κρίνοις, κηρίοις. Athen. ἐπὶ τοῦτο ὁ ἡ κωδία παρομοία σφηκίῳ περιφερῆς, ὅ ἐν ἑκάστῳ τῶν κυττάρων κύματος, μικρὸν ὑπεραίρων αὐτῶ. πλῆθος ὁ οἱ πλεῖστοι τριάνοις. τὸ δὲ ἄνθος διπλοῦσιον ἡ μήκωνος. χεῖμα δὲ ὅμοιον ῥοδῶ, χαλῆμο-ρῆς. ἐπάνω δὲ τῶ ὕδατος ἡ κωδία. παραφύλαι δὲ φύλλα μεγάλα παρ' ἑκάστῳ τῶν κύματων, ὧν τὰ μεγέθη πᾶσι θεοσαλκῶ, τὸν αὐτὸν ἔχουσα χαυλὸν τῶ τῶν κύματων. σιωπρὶ λανθι δὲ ἔχουσι τῶν κύματων, φανερόν ἐστι τὸ μικρὸν συνεστραμμένον, ἐξ ὧ γίνεαι ὁ χαυλὸς. τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν χαυλὸν τοιαῦτα. ἡ δὲ ῥίζα παχυλὴ τοῦ χαλῆμου τῶ παχυλῆτος, ὅ διαφύσεις ὁμοῖος ἔχουσα τῶ χαυλῶ. ἐσθίεισι δὲ αὐτὴν ὁ ὦμην, ὅ ἐφθην, ὅ πλῆν. καὶ οἱ περὶ τὰ ἔλη τούτω σίτω χεῖνται. φύλαι μὲν οὖν καὶ πολὺς αὐτοῖς. ὅ μὴν ἄλλῳ χαλῆβάλλουσι ἐν πηλῶ, ἀχυρῶσαις εὐ μάλα, πρὸς τὸ χαλῆνεχθῆναι γέ, καὶ μῆσαι, καὶ μὴ διαφθαρνῆναι, καὶ οὕτω χαλῆσκουάζουσι τοῖς κύμασι. ἂν δὲ ἀπαξ ἀνιλεθῆναι, μὴ εἰς διὰ τέλως. ἰσχυρὰ καὶ ἡ ῥίζα, καὶ οὐ πόρρω τῆς τῶν χαλῆμων, πλῆν ἐπαχυνθίζουσα. διὸ καὶ ὁ κροκόδειλος φεύγει, μὴ προσκόψῃ τῶ ὀφθαλμῶ, τῶ μὴ ὄξυ χαθορα. γίνεαι ὁ οὖτος καὶ ἐν συρία, καὶ χαλῆ κηλίκαι. ἀλλ' ὅ ἐκ ἐκπέπλουσι αἱ χώραι, καὶ περὶ τορῶν τῆς χαλῆκιδικῆς, ἐν λίμνῃ τινὶ μετρία τῶ μεγέθει. καὶ αὐτὴ πᾶσι, καὶ τελεστοῖ, ὅ τελεοχαρῆς: Latine hæc sic vertenda. Faba in paludibus stagnisq; exit. Caulis eius qui longissimus, ad quatuor cubitos erigitur, crassitudine digitali, similis calamo molli. (Athenæus qui hunc Theophrasti locum exscripsit, sed non integrum, legit μακρὰ, id est longo) non geniculatus. Totus rimis intrinsecus distinctus est, Lilij modo (Hermolaus vertit, rimæ intrus per totum ut Lilio: Athenæus legit κηρίοις, id est Fauis modo, non Lilij.) Huic insidet caput, rotundis fauis vesparum simile. In singulis veluti Loculis, ac pertusis cauis singulæ Fabæ continentur, & parum super eminent, multitudine plurimum triginta. In his

Cor. c. 116.  
lib. 2. Diosc.



his pro σφοκίῳ corrupta in exemplaribus voce, legit Theodorus σφηκίῳ. Fauum vesparū orbicularum interpretatus, deinde pro κηλάρων legit κυτάρων, & ἐν ἐκάστῳ τῶν κυτάρων reddidit in singulis cellis: Sunt enim κύτταροι, τῶν σφηκίων κηλάρησεις, & τῶν κηρίων κοιλότητις, id est fauorum vesparum foramina, & fauorum cavitates. Sunt qui pro κηλάρων legant κισσάρων. Theodorum secutus Hermolaus vertit, calix in cacumine rotūdus, vesparum Fauo similis: triginta plurimum loculis, qui singulas singuli continēt, non quidem omnino tectas, sed paulo extantes. Hos imitati Dioscoridis interpretes, quod dixit, ὅπερ ἀπανθίσαν φέρει φυσκία παραπλήσια θυλακίσκοις, ἐν οἷς κύματος μέγρον ὑπεραίρων τὸ πῶμα, ὡς πομφόλυξ, interpretati sunt, vbi flore exiit, fert folliculos vesparum fauis similes, cū non σφηκία, sed φυσκία habeat, id est, folliculos capsulis similes, in quibus Faba supra operculum veluti bulla parum prominet. Hic opérculum πῶμα dictum, ἡ κωδία est Theophrasti quam, caput & calicem illi verterunt. Flos duplo maior quàm Papaueris, rosei coloris, faturi: caput extra aquam attollitur: Plantis huius Fabæ singulis adnascūt folia. Hermolaus sic reddidit. Ipsi quoque calices aquis extant, latissimis circa foliis, quæ singulas Fabas obire videantur. Ea verò quæ sequuntur prætermisit Theodorus. ὧν καὶ τὰ μεγέθη πάλῳ θέλλαικῃ, & cætera. Id est magnitudine paria pileis Thessalicis: eorum pediculus cauli similis est, qui Fabas profert: Hermolaus aliter expressit, magnitudo iis, inquit, ad similitudinem eorum, quæ ut Plinius ait, personatæ in nostris fluminibus vocantur. Prosequitur Theodorus, ob tritis sigillatim Fabis amarum illud ex quo caulis prodit, καυλὸς, non πῖλος, intortum spectatur. Eiusmodi caulis ac fructus est. In his mirū cur Theodorus πῖλον pilulam verterit, qua de re hæc est Cornarij sententia. Si verò quis contriuerit singulas Fabas, inquit, manifestum fit amarum illud compactum, ex quo pileus prodit: πῖλον enim nunc folia dicit, quæ pilei magnitudinem habent. Id quod cum Theodorus in suo codice Græco non haberet, in eam hæsitacionem delapsus est, ut quod pro πῖλῳ verteret non habens, pilulam ex pileo faceret. Quod Theophrastus πῖλον dixit, πείτασον appellat Dioscor. his verbis: ἔχει ὃ φύλλον μέγα ὡς πείτασον, id est folium habet magnum velut galerum. Hermolaus πῖλον, hic caulem siue thyrsū interpretatur. Eius hæc sunt verba. Thyrsus inter folia emicat spectabilis, à Theophrasto πῖλος ut arbitrantur, vocatus: quamquam Theodorus pilulas interpretari videretur. Alij calicem rotundum eo vocabulo significari voluerunt. Hæc Hermolaus: ex quibus intelligimus, viros alioqui doctissimos, eius loci vitio hæsitasse, multum anxios cum res intellectu facilis esset, ex illo amaro quod in medio Fabæ abstrusum, loco germinis est, nasci primum caulem deinde illo gliscente per ambitum folia. Sed id peritis accuratius disquirendum relinquatur. Persequamur iam cætera. Radix quavis arundine crassior: caulis modò etiam rimosa manditur & cruda, & elixa, & assa: eo cibo qui accolunt stagna vescuntur. Nascitur sponte multa, tum etiam in lutum deiecto semine, diligenter palea stipato, ut sicut, maneâtque in vado, nec corrumpatur. Sic instituuntur Fabalia. Semen vbi semel comprehenderit, planta nunquam interit: radix enim valida est, nec dissimilis arundini, verum spinosa: quamobrem Crocodilus eam refugit, ne impingat, & oculos lædat, quoniam eius visus sit obusior. Nascitur hæc etiam in Syria, Ciliciâque, sed tractus ij non perficiunt. Circa Toronen agri Chalcidici quodam in lacu modico etiam gignitur, magnitudine mediocri, vbi & percoquitur, & perficitur, καὶ τελετοῖ, quod verbum otiosum ac superuacuum esse multi arbitrantur, & fructum absoluit. His Fabam Ægyptiam graphicè depinxit Theophrastus, & eandem planè quam Dioscorides. Plinius seorsum de Faba, seorsum de Colocasia agit, ex oratione Theophrasti, quibusdam mutatis, qui-

Emble. 94.  
li. 1. Diosc.



- Li. 8. ca. 11. buſdam etiam omiſſis. Ac de Fabâ quidem ſic. Nascitur & in Ægypto ſpinofa caule: quâ de cauſa crocodili oculis timentes refugiunt. Longitudo ſcapo quatuor cubitorum eſt ampliſſima: digiti craſſitudo: in genicula abeſſent, molli Calamo ſimilis, ſic legit Turnebus: Caput Papaueri, colore roſeo. In eo Fabę non ſupra tricenâ (triginta.) folia ampla, fructus ipſe amarus & inodorus. Sed radix perquam lauta incolarum cibis, cruda, & omnino decocta, harundinum radicibus ſimilis. Nascitur & in Syria, Ciliciâque, & in Torone Chalcidis lacu. De Colocaſia verò ſcribit, ſed verbis deprauatis, quæ legenda ſic quidam putant. In Ægypto nobiliſſima eſt Colocaſia, quam Cyamon vocant aliqui. Hanc è Nilo merunt: nos nuſquam ex noſtris amnibus: caule araneoſo, qui coctus mandendo eſt. Thyſo autem qui inter folia emicat ſpectabili, foliis latiſſimis, etiamſi arboreis comparentur, ad ſimilitudinem eorū quæ perſonate vocamus. Adeoque Nili ſui dotibus gaudent Ægyptij, vt implexis Colocaſiæ foliis in variam ſpeciem vaſorum, potare gratiſſimum habeant. Seritur iam hæc in Italia. De iſſdem vaſis idem habet Strabo, & teſtatur adeo magna eſſe illa, vt poculorum, & catinorum uſum præbeant, aptam ad id habentia cavitatem, vt Alexandrinæ officinæ his plenæ ſint, & non aliter quàm vaſis vtantur. Appellantur autem hæc vaſa *κιβώρια*, & *κιβώτια*, auctore eodem Strabone, *ἴδιος ἀργυπλίων ἐφ' ἡνίκας ἀργυπλίων, ἐξ ἧς κιβώριον γίνεται*. Id Athenæus confirmat his verbis. *τὸ ὃ κώβωνος ἐν μάλα παροβελήκτος, λαβὼν ἐν τῶν κιβωρίων, ὡς ἐξοινῶν καὶ μεθύων ἐνέργησε. διδύμος ὃ φασι πολλοὶς εἶδος εἶναι, καὶ τὰ χαλὰν εἶη τὰ λεγομένα σκυφία, διὰ τὸ χέθωθεν εἶς τὸν σκυφίαν, ὡς τὰ ἀργυπλίων κιβώρια*. Id eſt, cum potus liberalior quem Græci *κώβωνα* appellant, procederet, ille capto poculo quodam, quod Ciborium nominant Græci, eo imminxit, tanquam baccans & ebrius. Didymus ait hoc eſſe poculi genus. Et fortasſe ſunt ea quæ Scyphia appellantur, propterea quod in anguſtum pars infima contracta eſt, vt ciboria Ægyptia. In eo ſignificatu uſurpauit Horatius, obliuiſo leuiâ maſſico ciboria exple. Dioſcorides tamen Fabam ipſam, *κιβώριον*, & *κιβώλιον* nominari tradit: item Galen. *διδοῖται ὃ ἐπὶ τούτων διὰ γλυκίος ἢ μελικράτους παροβελήκτος διελόμενος ἢ πηγάνης, καὶ αὐτὸς ἀργυπλίων τὸ μέγεθος, ὅτινες ἐπιχωρίως κιβώτιον & κιβώριον καλεῖται*. Id eſt, Datur his ex paſſo, aut aqua mulſa, in quibus Dictamnium aut Ruta incocta ſint, Fabæ Ægyptiæ magnitudine, quam quidam vernacula lingua cibotium & ciborium appellant. Ætius etiam viridem Fabarum Ægyptiarum fructum ciborium appellari ait. Dioſcorides Fabæ Ægyptiæ uſum tum in cibis tum in medicamentis declarat his verbis. Radix cruda coctâue eſtur. Fabâ virens manditur, & exſiccata nigreſcit: vulgarem magnitudine ſuperat. Adſtringendi facultatem habet, & ſtomacho vtilem: dyſentericis, cœliacifque prodeſt, inſparſo polentæ vice lomento, datur quoque in pulte. Cortices in vino mulſo decocti, ſi terni inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad aurium dolorem quod in earum medio viride ſpectatur, guſtu amarum, ſi tritum & cum roſaceo coctum inſtilletur. Galenus tradit Fabam Ægyptiam ſicut noſtram magnitudine ſuperare, ita & naturam habere humidiores, magiſque excrementitiâ. Alio in loco aurium doloribus prodeſſe Fabam Ægyptiam viridem, internam amaram, hoc eſt, quod in medio eius viride & amarum eſt, quod Dioſcorides declarauit his verbis. *καὶ πρὸς ὠταλγίαν ὃ ποιεῖ τὸ ἐν μέσῳ χλωρὸν αἰσῶν, πικρὸν ὃ κατὰ τὴν γεῦσιν*. Hoc ipſum modo pul-pam, modo interiora Fabæ Marcellus appellat. Et Corn. Celfus Ægyptiæ Fabæ amarum cum roſis contritum, oculorum cum dolore inflammationibus adhibet. Colocaſij radicis ſimilis viſus eſt, inquit, Ætius, rapis ac cepis, viſcoſum autem corpus ipſius eſt. Vnde exterſoriæ facultatis particeps eſt, & ventri in cibo ſumpta commodat. Plinius ſcribit Colocaſiæ caulẽm araneofum



neofum esse in mandendo, vt diximus, quod & testatur Martialis his versibus.

*Niliacum ridebis olus lanâsque sequaces,*

*Improba cum morfu filia manique trahes.*

Colocasia Glaucias, inquit idem Plinius, acria corpora leniri putauit, & stomachum iuuari. Fabæ Ægyptiæ radix quæ Colocasion dicitur, vt ait apud Athenæum Diphilus, stomacho utilis est, & corpus alit, sed difficilè excernitur, quia constringit, melius autem in ea fuerit, quod minimè lanosam refert naturam. Fabæ quæ ex ciboriis nascuntur virides quidem, difficilè coquuntur, parum nutriunt, difficile excernuntur, maximè sunt flatulentæ, siccatae minùs flatuum mouent. Prouenit etiam ex ciboriis flos coronamentis dicatus.

Li.21.ca.28.

Libr.3.

CICER, CAP. XLIIII.

**C**ICERINTHOS Græcis, Cicer Latinis dicitur, Arabibus *Chemps*, *Hamos*, seu *Athamos*, Italis *Ceci*, Germanis *Kichem*, *Kicherebs*, Hispanis *Grauanços*, Gallis *Ciche*, & *Pois ciche*, & *Pois bechu*. Ciceris genera duo sunt Dioscoridi, Galeno, Plinio, satium scilicet, & sylvestre. Satiui differentiæ aliquot. Dioscorides satiui alterum genus esse dicit, quod Arietinum nominat. Theophrastus aliter distinxit his verbis, *οἱ δ' ἐρεβινθοί, ἔ τοῖς μετέθεσι, καὶ τοῖς χυλῶς, ἔ τοῖς χρώμασι, ἔ τοῖς μορφαῖς διαφέρουσιν, οἷον κρύοι, ὀροβίσχοι, καὶ οἱ ἀνὰ μέσον. ἐπὶ πᾶσι δ' τὰ λευκὰ γλυκύτερα*. Quæ sic conuertit Theodorus. Ergo Cicer & magnitudine, & sapore, & colore, & forma plerâque differentias ostendit, vt Arietinum & Columbinum, candida inter omnia dulcedine præstant. Sed hæc sane exprimere voluit Plinius his verbis. Differentiæ Ciceris plures, magnitudine, figura, colore, sapore. Est enim

Nomina

Genera.

Lib.2.c.97.

Lib.6.sim.

Li.18.ca.12.

Lib.3.Hist.

cap.5.

Lib.18.c.12.

CICER SATIIVM.



arietino capiti simile, vnde ita appellatur, album nigrumque. Est & columbinum, quod alij venereum vocant, candidum, leue, arietino minus, quod religio peruigiliis adhibet. Est & Cicercula minuti Ciceris, inæqualis, angulosi, velut Pisum. Dulcissimum autem id quod Eruo simillimum est: firmitusque quod nigrum, & rufum, quam quod album. Plinius duo hîc facit Ciceris genera, Arietinum, & alterum columbinum, quod & Venereum dicitur: *ὀροβίσχον*, id, nempe Eruium Theophrastus vocat, quod mox declarat, cum ait, dulcissimum autem id quod Eruo simillimum. Columella hoc Punicum appellauit, qui & duo Ciceris genera tradit. Cicer, inquit, quod Arietinum vocatur, itémque alterius generis quod Punicum, feri mense Martio toto potest. Galenus quoque duorum generum meminit, eius videlicet quod Arietinum, & eius quod *ὀροβίσχον*, id est Eruium appellari ait. Quod verò Plinius de Cicercula, velut de tertia Ciceris specie inferuit, id non ex Theophrasto mutuatus est, sed de suo adiecit: Cicercula enim,

Li.2.ca.10.

Lib.6.sim.



Forma  
Matt. Ibid.

& re & nomine à Cicere differt, de qua suo loco dicitur. Matthiolus Ciceris genera scribit esse candidum, quod & Columbinum vocatur, & rubrum venereum appellatum, quod ad incitandam venerem mirificè valeat, postremum nigrum cæteris minus, Arietinum dictum. Ciceris satiui planta in cubitalem altitudinem adolefcit, paulo proceriorem, foliis oblongis, denticulatis, albicantibus, pilosis: caule lignoso, modicè hirsuto, in latus declinante, ramis multis brachiato: floribus subpurpureis, ex quibus siliquæ prodeunt breues, fæctæ, in mucronem tenuem desinentes, in quibus ad summum Ciceræ duo, vel tria, angulosa, turbinata, vnóque angulo acuto donata includuntur, ex subrubente purpura nigra: radix est lignosa & fibrata, altè descendit. Hoc est verum Cicer satium, quod hîc depictum datur, vel

Li. 18. c. 12.

Forma  
Cicer. Eru.

Plinio teste, cum scribit. Siliquæ rotundæ Ciceri, cæteris leguminum longæ, & ad figuram seminis latæ. Dodonæus pro Cicere satiui & vulgari depinxit verum orobum officinis Omnibus iam receptum.

Cicer Eruinum id quibusdam esse videtur, quod hîc pictum ostenditur, cauliculis latis, siue compressis, foliis longis, in extremo capreolos emittentibus ad imam plantam integris, per summos caules in bina ternæue foliola angusta diuisis. Flores candicant, ex quibus tandem nascuntur siliquæ rotundæ, Pisi siliquis minores, in quibus semina rotunda, Pisis similia, sed minora, gustu amaro, cum viridia sunt. Hanc plantam Erui- liæ sylvestris nomine exhibuit Dodonæus, Matthiolus, nomine Araci nigri.

Li. 4. ca. 10.

CICER ERVINVM  
quorundam.



CICER ORO-  
bium.



Cicer aliud Eruinum siue Orobianum Theophr, Pena exhibuit, quod tantopere Narbonensi Orobo, siliqua præsertim simile est, vt certū sit illud esse, quod dulcissi



dulcissimum, & Eruo simillimum à Plinio dicitur. Narbonæ ac Galloprovinciæ plerisque locis per messes flavescit, culmo assurgens sesquipedali, geniculato, in latus quasi in obliquum flexo, leuiter striato, fistuloso, foliis in longiusculis neruulo ordine digestis, Lentis, aut Araci. E calami variis locis hi ramuli prodeunt: iuxta summos geniculorum nodos cōplures siliquæ, vno ferè exortu sese

**CICER SYLVESTRE**  
*Matthioli.*



**CICER SYLVESTRE**  
*Pena.*



contingētes emicant, cylindri figura, vnciam longæ, rectæ, teretes, paruis interuallis articulatim distinctæ in exigua tubercula, tria vel quatuor: clausa intus semina nulla membranula diuisa Pisum Arietinu ferme æquant, obrusè triangula; Orobo duplo maiora, colore albido pallentia, aut subfulua, non ingrati saporis, Ciceris, aut Pisi.

Cicer sylvestre auctore Dioscoride, foliis fatiuo simile est, odore acri, sed semine discrepat. Cicer sylvestre Plinio, foliis est fatiuo simile, odore graui. Matthioli Cicer sylvestre, & Herbariorū hīc pictum damus. Huic aliud dissimile nescio an verius, proferunt Pena & Lobellius ex Sabaudia & Heluetiæ finibus, latius sparsis, ramosis caulibus, cubitalibus & sesquicubitalibus, foliis Loto sylvestri ferme æqualibus, Ciceris Arietini, maioribus, crassioribus, rotundioribus, & modice crenatis: flores purpurascunt: siliqua Ciceris Arietini, breuis, foliosa, compressior paulo, imam eius partem vestientibus, quibusdam veluti foliolis: semina multo minora, compressa, & potius Cicerculae similia. Quare non absurde quis coniiciat, inquit Pena, istud Dioscoridis sylvestre esse Cicer. Alia duo Ciceris sylvestris genera hīc ex Dalechāpio proponimus. Primum radicibus longis huc & illuc euagatur, lignosis, multiplicibus, nodosis, subrubris. Fruticosa planta est, ramis fere pedalis, humi propemodum iacentibus: foliis fatiui Ciceris, minimè per ambitū infectis, quamplurimis vno in pediculo, rotundioribus: flore pallido, paruo, veluti in spicam coaceruato: siliquis multis, fatiuo similibus, acervatim coherentibus: semine paruo, nigro, compresso, nec ita caluam arietis exprimente, fatiui modo. Gignitur hoc Cicer in saluoso salicto, quod Rhodanus alluit prope Lugdunum.

Cicer sylvestre alterum in aridis crescit, radice crassa, longa, ramosa, cortice nigro tecta, intus candida, scapis multis, surculosis: foliis Ciceris, ternis simul vt in Loto: flore Pisi, rubro: siliquis Ciceri similibus, hirsutis, rubris maculis punctis. Ciceris natura est,

Ibidem.  
Forma Cicer. sylue.  
Li. 22. ca. 25.



Lib. 18. c. 12.

Locus.

Lib. 2. c. 10.

Temper.

**CICER SYLVESTRE**

I. Dalechampij.

Li. 1. Alim.

Vires &amp;

Temper.



Li. 6. simpl.

**CICER SYLVESTRE,**

II. Dalechampij.



Lib. 2. c. 97.

inquit Plin. gigni cum Salsilagine: ideo solum vrit. Nec nisi madefactum pridie feri debet. Cicer feri mense Martio toto prodest, (vel potest,) inquit Columella, cælo humido, loco quàm latissimo: nam etiam id terram lædit: atq; etiam improbat a callidioribus agricolis: quod tamē si feri debeat, pridie macerandū erit, vt celerius nascatur. Iunio & Iulio mensibus floret, deinde semen in siliquis profert. Cicer tum vt edulium, tum vt medicamentum consideramus. Eduliū est, inquit Galen. non minùs quàm Faba flatulentū, sed valentius nutrit quàm illa: ad venerem autem incitat, creditūque etiam est semen generare: vnde quidam equis admissariis ipsum exhibent. Inest præterea Ciceribus facultas adstringendi maior quàm Fabis, adeo vt quædā Cicera calculos in renibus concretos manifestè comminuāt. Nigra autem sunt ea, ac exigua, in Bithynia maximè prouenientia, quæ Arietina nuncupant. Satius tamen est cremorē ipsorum in aqua coctum bibere. Vtūtur homines & Ciceribus adhuc virentibus, antequā sint matura, quomodo & Fabis. Idem alibi. Cicer Legumen est flatulentū, copiosi nutrimenti, aluo mouendæ idoneū, citadē

vrinæ efficac, lacti & semini generando aptum: prolicit verò & menses. Porro Arietinū cæteris efficacius vrinam impellit. Decoctum eius calculos renum confringit. Alterum Ciceris genus Orobiaum, eadem vi pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, abstergerendi: est enim calidū & moderatè humidum, ac particeps amaritudinis: cuius vi & lienē, & iecur, & renes expurgat, psorāsque & lepras, & lichenes extergit, parotidas, & testes induratos discutit. Tum etiam vlcera quæ cacoethe vocant, cum melle sanat. Cicer sylvestre ad omnia efficacius satiuū est, hoc est tum calidius, tum siccus, quanto & acrius, & amarius. Cicer satiuū Dioscoridi aluo idoneum est, vrinam ciet, inflationē parit, colorem commendat, menses ac partus expellit, lac auget. Cum Eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium, verrucosas informicationes: ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetiginēsque: item contra carcinomata, & vlcera quæ cacoethe vocantur, cum melle &

Hordeo prodest. Alterum genus Arietinum nominatur: vtrumque cit vrinam, dato cum Roremarino hydropicis, aut regio morbo laborantibus, eorum decocto. Lædunt ea vlceratam vesicam, & renes. In verrucarum formicantium pensiliūque genere, prima Luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana linteolo deligata abiici post se præcipiunt, ita decidere eas arbitrantur. Sylvestre Cicer idem quod satiuum præstat. Plinius qui cum Cicere Cicerculari



lam oscitanter confundit, hæc de Ciceris facultatibus prodidit. Cicer sylvestre si largius sumatur, aluus soluitur, & inflatio contrahitur & tormina. Tostum salubrius habetur. Cicerula etiãnum magis in aluo proficit. Farina vtriusque vlcera manãtia capitis sanat, efficacius sylvestris. Item comitiales, & iocinorum tumores, & serpentium ictus. Ciet menses, & yrinas, grano maximè. Emendat & lichenas, & testium inflammationes, regium morbum, hydropicos. Lædunt omnia hæc genera exulceratam vesicam & renes. Gangranis vtiliora cum melle, & his quæ cacoethe vocantur. Verrucarum in omni genere prima Luna singulis granis singulas tangunt, eaq; grana in linteolo deligata post se abiiciunt, ita fugari vitium arbitrantur. Nostri præcipiunt Arietinum in aqua, cum sale, (in manuscripto hæc duo verba non leguntur,) discoquere, ex eo bibere cyathos binos in difficultatibus vrinæ. Sic & calculos pellit, morbumq; regium. Eiusdem foliis sarmentisque decoctis, aqua quàm maximè calida morbos pedum tollit, (alij mollit,) & ipsum calidum tritumq; illitum. Columbini decocti aqua, horrorem tertianæ & quartanæ minuere creditur. Nigrum cum gallæ dimidio tritum oculorum vlceribus ex passo medetur. Ciceris farina auctore Matthiolo, ex intubi stillatitia aqua decocta, & iocinori illita, tumores illius resoluit, & serpentium moribus medetur, præsertim si cum Hyperici decocto misceatur. Columbinum aqua maceratum, contusum & illitum putrescentes gingiuas sanat. Ex Cicerum rubrorum decocto remedium præstans ad vrinæ ardores, conficitur hoc modo. Eorum sesquilibram in libris decem aquæ die vna maceratam ad tertias decoquito. Excolato decocto addito Glycyrrhizæ vnciam, Maluæ & radicis eiusdem, Althææ, Graminis, Agrimoniz, & Cassuthæ manipulum, Myxa & Zizypha decem: præterea seminis Melopeponis delibrati vncias duas, baccarum Halicacabi, Solani hortensis, Lithospermi, singulorum drachmas quatuor, ossium dactylorum contritorum drachmas tres, quæ omnia simul ferueant ad tertias. Propinato quotidie mane vncias quatuor.

Li. 12. ca. 25.

In ca. 97. li. 1. Dioscor.

ERVILIA, sive OCHRVS, CAP. XLV.



QVÆ Plinio & aliis Latinis scriptoribus Ervilia, ὠχρὸς Græcis nominatur, à luteo videlicet Ochra colore, quem interior medulla fructus refert, recentioribus & Officinis Pisum minus, Italis *Rouiglione*, Tridentinis *Arabeia*, Germanis *Erucyssen* ea dicitur. Ervilia caule est inani, foliis, capreolis, siliquisque Piso similis, singulis tamen minoribus. Flores fert plurimum candidos, aliquando tamen ex purpura obscuros, siliquas rotundas ac longas, in quibus semina rotunda, Pisis minora, colore sæpius luteo, aliquando virente. In agris & hortis provenit: vberius loco aprico, & cæli statu calido siccoque ac fœlicius provenit: vliginosis parum proficit, & frigoribus vt Pisum facillè offenditur. Seritur vèrè, Julio mense ad maturitatem peruenit. Ervilia auctore Galeno, medium quodammodo locum obtinet inter ea quæ succum bonum & prauum generat,

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.  
Li. 1. Alim.  
Vires &  
Temper.

inter concoctu facilia & difficilia, tardè & celeriter transeuntia, flatulenta & flatu



flatus expertia, parum & multum nutrientia: nullam enim effectricem habent qualitatem, instar quorundam quæ acres, & austeros, acerbos, falsos, amaros, vel dulces habent sâpores. Aliam Eruiam sylvestrem, siue Ochrum, statuit Do donæus in frument. Historia, quam antea Eruium Cicer appellauimus.

## LUPINVS,

## CAP. XLVI.

Nomina

Li. 18. ca. 14.

Ibidem.

Lib. 2. c. 103.  
Ibidem.

**Q**UÆPUS Græcis, Latinis Lupinus, Mauritanis *Tarinus*, seu *Tormus* dicitur, Italis *Lupino*, Germanis *Feighonen*, Hispanis *Entramocos*, Gallis *Lupin*. Lupinorum appellatio non aliunde ducta videtur, quàm quod sicut Lupus terram appetit, & in fame terra vescitur, ita Lupinus tellurem, vt Plinius ait, adeo amat, vt quamuis frutetoso solo coniectum inter folia veprêsq̃ue, ad terram tamen radice perueniat. Lupinus etiam, velut Lupis expositus & relictus, dictus videri potest, ex eo quod, vt idem Plinius ait, impune iacet, vel derelictus, si non protinus secuti obruant imbres, ab omnibus animalibus amaritudine sua tutus. Duo sunt Lupini genera Dioscoridi, Galeno, Plinio. Est enim Lupinus satiuus, & Lupinus sylvestris. Lupinus satiuus vnico assurgit caule, rotundo, intus cauo, firmo, qui sine adminiculo rectus consistit, & parum lanuginosus est. Folia ex quinis, senis, septenisue foliolis coherentibus constant, vitici similia, superiore parte virentia, inferiore candicantia, hirsutaq̃: quæ sub vesperam, solis occasum veluti præsentientia, flaccida facta deorsum vergunt. Flores in summis caulibus candidi sunt: siliquæ compressæ, crassæ, in ambitu crenatæ, duræ, foris leuiter hirsutæ, intus glabræ, in quibus semina quina, senaue membranis dissepta, orbiculata, compressa, qua parte siliquæ adhærent cavitatem quandam veluti vmbilicum exiguum habentia, foris alba, intus lutea, sapore amarissima. Radix eius est singularis, sublutea, lignosa, fibrata. Lupinus sylvestris satiuo similis est, inquit Dioscorides, sed omnino minor. Huius innumeræ plantæ, inquit Matthiolus, in Hetruriæ campestribus

## LUPINVS SATIIVS

Matthioli.



## LUPINVS SYLVESTRIS

Dodonæi.



Maio



Maio mense visuntur, floribus roseo colore rufescentibus. Lupinus solum arenosum & vitiosum potius desiderat, inquit Theophrastus, atque omnino in cultis prouenire non vult. In solo rubricoso, vel pullo, vel arenoso, si non sit aquosum Lupinum ferendum ex Catonis sententia tradit Plinius. Idem ter Lupinum florere scribit. Primum quidem sub finem Maij, deinde Iunio, aut initio Iulij, tertio Iulio, aut Augusto mensibus, si anni tempestas calida siccaq; fuerit. Fructus duo priores saepe ad maturitatem perueniunt, tertius raro non nisi in regione calida. Lupini semen *ωαλύχρυσον* est, inquit Galenus, id est, frequentis ac multiplicis vsus. Elixus enim, deinde in aqua dulci maceratus, tantisper dum in ea omnem sibi ingenitam exuerit insuauitatem ita demum manditur cum Garo, ac Oxygaro, vel etiã sine his, sale mediocri cõditus, non quomodo Hordeum, & alia quæ variè apparantur. Lupini dura ac terrestris est substantia: quocirca ipse concoctu difficilis est, succumque crassum gignit, ex quo non probè in venis cofecto succus quem crudum vocant, procreatur. Cæterum cum inter parandum quicquid habeat amaritudinis deponat, *τοῖς ἀπολοις*, id est, qualitatibus quæ sensu deprehendatur, expertibus similis euadit. Par igitur est ipsum neque ad deiectionem, neque vt adstringentia ad fluxum ventris cohibendum esse accommodum, sed tardè descendere, & difficilè deiici, ac pertransire. Idem alibi Lupinus edi potest coctus, multis ante diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita, sitq; tunc nutrimentum succi crassi. Cæterum vt medicamentum ita præparatus, ex genere est emplasticorum. At vbi natia etiam dum manet amaritudo, extergendi digerendiq; vim obtinet: interficit lumbricos tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex posca potus. Quin & decoctum eius lumbricos eiicere potest: tum etiam foris idemtidem perfusum, vitilignes, achoras, pustulas, pforas, gangrænas, vlcera maligna iuuat, partim extergedo, partim citra mordacitatem digerendo, siccandoq; expurgat iecur & lienem, cum Ruta & Pipere suauitatis gratia, assumptum. Elicit menses, ac fetum cum myrrha & melle impositum. Porro Lupinorum farina sine mordicatione digerit. Nec enim liuida tantum, sed & choeradas & phymata curat: sed tunc in aceto, aut Oxymelite, aut posca coquatur oportet, idq; pro agrorum temperamento, & affectus diuersitate, quod ex vsu est eligendo. Digerit item quæ liuida sunt: & quæcumque modo diximus præstare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt verò etiam qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt. Lupinus agrestis amarior est, & ad omnia valentior satiuo, eiusdemq; facultatis, sed valentioris. Commune quadrupedum hominumq; vsui Lupinum esse, Plinius tradit, & maceratum calida aqua homini quoque in cibo esse: impositum etiam puerorum ventribus esse pro remedio. Lupini farina, Dioscoridi, cum melle delincta, aut cum aceto pota ventris animalia expellit. Ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine esitati eadem efficiunt. Decoctum eorum idem præstat cum Ruta & Pipere potum: quare lienosis prodest. Eodem vlcera tetra theriomata appellata, gangrænas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, vlcera in capite manantia, vitilignes, maculasque fouere vtilissimum. Menses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditum in vellere. Eorum farina cutem liuoresque corrigit: inflammationes cum polenta & aqua mitigat: tubercula & coxendicum cruciatus ex aceto lenit: strumas in aceto cocta, illitaq; dissipat: carbunculos rumpit. Decocti in caelesti aqua, donec in cremorem lentescant, faciem abstergunt: medentur pecorum scabiei decocti cum radice nigri Chamæleontis, ita vt repente decocto abluantur. Ciet vrinam radix cum aqua cocta, & pota. Lupini triti vbi macerati dulcescere cœperint, cum aceto poti fastidium detrahunt, & cibi auiditatē faciunt. Sylvestris Lupinus eadem quæ satiuus præstat

*Locus.*  
Lib. 8. Hist.  
cap. 11.  
Lib. 18. c. 17.  
Ibid. ca. 14.  
*Tempus.*

Li. 1. Alim.

*Vires &*  
*Temper.*

Li. 6. simpl.

Li. 18. ca. 14.

Li. 2. c. 103.



præstat. Galenus dixit Lupinum sylvestrem esse *πικρότερον*, id est amariorem. Dioscorides omnino *μικρότερον*, id est minorem. Plinius hanc rem declarat his verbis. Lupini sylvestres omni modo minores sativis, præterquam amaritudine. Idem medicamenta ex Dioscoride multa recitat, & præcipue ad expellendos lumbricos. Succus decoctorum, inquit, cum Ruta & Pipere, vel in febre datur ad ventris animalia pellenda, minoribus triginta annorum: pueris verò impositi in ventrem ieiunis profunt. Si verò cælesti aqua decoquantur, succus ille smegma fit, quo fovere gangrenas, eruptiones pituitæ, vlcera manantia vtilissimum: smegma hic dixit quod Dioscorides *ἐπαντλημα*. Sequuntur reliqua à Dioscoride tradita, & quædam alia. Sed quod Dioscorides de ouium scabie sananda tradit, ipse aliter refert: nempe sic. Medetur pecori, cum Chamæleonte herba decocti, aqua in potum collata. Sanant & scabiem quadrupedum omnium in Amurca decocti, vel utroque liquore, postea misto. Fumus crematorum culices necat. Horatius virum bonum & sapientem opponens stulto, ostendit stultum & prodigum dare indignis, virum bonum probatos nummos referuare dignis hominibus, & sui similibus: versus hic est:

*Nec tamen ignorat quid distent æra Lupinis.*

Id est, non nescit quid intersit inter bonos & malos nummos: quod natum est à consuetudine Comicorum, qui in scena Lupinis, seu nummis ex Lupino factis utebatur pro veris & aureis, seu æreis. Idcirco Plautus Lupinos aurum Comicum appellat. Quinetiam hodie pueri in Italia ex Lupinis nummos imitari solent.


## ERUUM, CAP. XLVII.

**Nomina** *POBOΣ* Græcis, Eruum Latinis nominatur, Arabibus *Erbum*, *Keisene*, siue *kersene*, Italis *Erno*, Germanis *Ernen*, Hispanis *Servos*, Gallis *Ers*. Duo Erui genera reperiuntur, sativum & sylvestre. Sativum

**Genera.**  
In cap. 102.  
li. 2. Diosc.  
li. 1. Al m.  
Ibidem.

**Forma.**  
Lib. 8. Hist.  
cap. 3.

Ibidem.



duum est generum, candidum & rufum auctore Matthiolo. Galenus tertium addidit, nempe pallidum, inter priora medium. Aliud quoque vidisse sese ait Matthiolus Erui genus, quod Creticum vocant, nostrati fere simile, sed minutiore semine, & siliquis gracilioribus. Eruum sativum planta est foliosa, cauliculis ac ramis multis, in latus expansis, ut ait Theophrastus, sese implicantibus: foliis parvis, longiusculis, lente minoribus, plurimis ex vno pediculo, utrimque pari exortu per intervalla prodeuntibus, vnicò in cacumine permanente. Flores edit parvos subpurpureascentes, aliquando candicantes: siliquam Piso fere similem, sed breviorē, & graciliorem; pressis constrictisve inter semina rotunda spatiis. Hoc est Dioscoridis Eruum, parvus frutex, ut inquit, angusto folio, tenuis, semina in valvulis habens. Non ita pridem, inquit Matthiolus, legitimum Eruum in Italia feri coeptum est, hic depictum, ex secunda eiusdem in Dioscoridem commentariorum editione: priore etenim Lathyrum sativum nomine Erui depinxit



## OROBVS Creticus.



depinerat. Dodonæus Eruum nomine Ciceris satiui descripsit, vt diximus. Fuchsius Cicerulam nomine Erui. Brasauolus credidit Eruiliam quæ Theophrasto, Galeno, Paulo Ochros dicitur, verum esse Eruum nominis affinitate deceptus. Eruum syluestre Dodonæo, Lobellio, & Herbariis dicitur ea planta, quæ à nobis descripta est libro de Maritimis nomine Catanauces. Eruum auctore Columella latatur loco macro nec humido, quia luxuria plerumque corrumpitur. Potest & autumno feri, nec minùs post brumam Ianuarij parte nouissima, vel toto Februario, dum ante Calendas Martias, quem mensem vniuersum negant agricolæ huic Legumini conuenire, quod eo tempore satum, pecori sit noxium, & præcipuè bubus, quos pabulo fixo cerebrosos reddat. Eruum feritur in agris. Quod sponte nascitur, inter segetes frequens oritur: verum cum à paucis cognoscatur, illud inter Viciæ species numerant. Eruum Plinius cum Viciâ coniunxit: mox enim cum de Viciâ egisset, subiunxit. Nec Erui operosa cura est: hoc amplius quàm Viciâ runcatur, & ipsum medicaminis vim obtinens: quippe per Eruum D. Augustum curatum, in epistolis ipsius memoria extat. Boues apud nos, inquit Galenus, tum apud alias plerâsque gentes Eruo prius in aqua dulcorata pascuntur: homines verò ab hoc semine prorsus abstinent: est enim insuauissimum & prauus succi. In magna tamen fame quemadmodum Hippocrates quoque scripsit, necessitate coacti ad ipsum nonnunquam accedunt. Nos verò ad eundem modum quo Lupinos præparantes, Eruo cum melle vtimur, ceu medicamentum crassos thoracis ac pulmonis humores expurgante. Porro inter Erui genera album minùs est medicamentosum eo quod ad flauitiem aut pallorem recedit. Si verò coctum bis fuerit, & in aqua idemtidem edulcatum, insuauitatem quidem deponunt, sed vna etiam cum ea abstergendi & incidendi facultatem, vt sola in eo relinquatur terrestris substantia, quæ in alimentum vertitur citra insignem amarorem desiccandi facultate præditum. Idem alibi Eruum desiccatur quidem excessu secundo intenso, calfacit verò primo. Porro quatenus amaritudinis est particeps, eatenus incidit, exterget, atque obstructions expedit. Caterum si sumatur copiose, sanguinem per vrinas euocat. Eruum teste Dioscoride, capiti onerosum est: aluum esu turbat, sanguinem per vrinas extrahit: elixo boues saginantur. Paranda farina ratio hæc est. Vberiora grana candida; deliguntur, ac permiscendo resperguntur aqua, donec quod satis est combibant: postea torrentur, vsque dum hians cortex disrumpatur, molita; farinario cribro incernuntur: postremo farina reconditur. Hæc aluo utilis est, vrinam ciet, meliorem colorem efficit: sanguinem per vesicam, aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera cum melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie, & maculas totumque corpus emendat: nomas, gangranas, duritiâsque serpere non patitur: mammarum duritias emollit: tetra vlcera quæ theriomata vocant, fauosque emarginat: carbunculos rumpit: cum vino subacta illitu moribus viperarum, canum, hominumque medetur: vrinæ difficultates, tenesinôsque ex

Lib. 4. c. 22.  
In Hist. pl.  
cap. 215.

Lib. 2. ca. 11.  
Locus.

Lib. 18. c. 15.

Li. 1. Alim.  
Vfus.

Li. 8. simpl.  
Vires &  
Temper.

Li. 2. c. 102.



Li. 22. c. 25.

aceto mitigat. Eruum tabidis qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum sumptumque conuenit. Eius cremor perniones, & pruritus in toto corpore sanat fouendo. Hic animaduertendum ad Erui nam farinam conficiendam candidius Erui semen à Dioscoride eligi: à Galeno verò id minùs medicamentosum haberi. De Eruo quidem in mentione eius diximus, inquit Plinius, nec potentiam ei minorem veteres quàm Brassicæ tribuere, contra serpentium ictus, ex aceto, & ad crocodilorum hominùmque morsum. Si quis Eruum quotidie ieiunus edat, lienem eius absumi certissimi auctores affirmant. Farina eius varos, & maculas cutis toto corpore emendat, (sic enim legendum, non vt vulgata habent exemplaria, farina eius, vt ait Varro, maculas toto, & cætera.) Serpere vlcera non patitur: in mammis efficacissimum. Carbunculos rumpit ex vino: vrinæ difficultates, inflationem, vitia iocinoris, tenesimum, & quæ cibum non sentiunt, atropa appellata, tostum, & in nucis auellanæ magnitudinem melle collectum deuoratumque corrigit: item impetigines ex aceto coctum, & quarto die solutum. Panos in melle suppurare prohibet impositum. Aqua decocti perniones & pruritus sanat fouendo. Quin & vniuerso corporis, si quis quotidie ieiunus bibat, meliorem fieri colorem existimant. Cibus idem hominis alienum. Vomitiones mouet, aluum turbat, capiti & stomacho onerosum. Genua quoque degrauat. Sed madefactum pluribus diebus mitescit, bubus iumentisq; vtilissimum. Siliquæ eius virides priusquam indurescant, cū suo caule foliisq; cōtritæ, capillos nigro colore inficiunt.

## LATHYRVS, CAP. XLVIII.

Nomina  
Genera.  
Forma.



Vob Legumen Græci λathyρον appellant, à Latinis vt Columella & Palladio Cicercula dicitur: à Gallis des Gesses. Eius duo sunt genera: nempe Lathyrus satiuus, & sylvestris. Lathyrus satiuus caules habet angulosos, compressos: folia oblonga, angusta, acuminata, bina

## LATHYRVS SATIVS

Angustifolius.



## LATHYRVS SATIVS

Latifolius: Clymenum Matth.




semper




semper eidem apta pediculo, inter quæ medius prominet capreolus, quo adminicula & cauliculos propinquos apprehendit: flores candidi, Pisi floribus similes: siliquæ non Cylindri figura, sed latæ & compressæ, quibus semen includitur

**LATHYRVS** *Sylvestris* Dodon.

*Eruum satium* Fuchsj.



**CICERA.**



album, latum, compressum, ac inæqualiter angulosum, sapore ferè Pisi: radix tenuis est, ac fibrata. Hunc Erui nomine depinxerat Matthiolus priore commentariorum in Dioscoridæ editione, vt diximus, id est, in hoc genere quod latioribus est foliis Matthiolus Clymenum esse vult. Cordus satium Eruum: Tragus, Pisum Græcorum. Lathyrus sylvestris superiori caulibus, foliis, siliquis proximus est, sed flores rubescunt: semen tamen vt in supradictò compressum, inæquales angulos habet, verum minus est, durius, & colore in atrum degenerante. Hunc Lathyrū Fuchsij nomine Erui satiui depinxit. Cicercula vt scribit Columella, feri debet lato solo, caloque humido. Lathyrus, inquit Galenus, substantia quidem Eruiiis & Phaselis est adsimilis. Vtuntur eo plurimum in nostra Asia rustici, & potissimum in Mysia, & Phrygia, non solum quemadmodum Phaselis & Eruiiis in Alexandria, & plerisque aliis vrbus, sed etiam vt phacoptisanam ipsum parantes. Succum porro habet facultatibus quidem Eruiiis & Phaselis consimilem, sed consistentia crassiore: ac ideo magis quam illa nutrit. Lathyro similis est Cicera caule & foliis. Flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinantes, siliquas paulo minores, atque in his grana angulosa quæque & Lathyro similia, sed minora durioraque & minus compressa, colore nigro proxima. Rarum est hoc Legumen, nec nisi à rei herbariæ studiosis feritur. Latini Ciceram vocant, quod Cicercula similis sit, atque solo potissimum colore ab eo dissideat. Cicera, inquit Columella, sapore nihil à Cicercula differt, colore tantum discernitur: nam est obsoletior & nigro prior. Palladius in Martio. Nunc Cicera feritur. Ea distat à Cicercula solo colore, qui sordet, & nigrior est. Vfus autem Cicera & facultas, inquit Galenus, Lathyri facultati est similis, nisi quod Cicera semina sunt duriora, minusque faciliè elixantur: quæ causa est cur Cicerculis sint concoctu difficiliora.

Lib. 4. c. 21.

*Forma*  
*Sylvest.*

Cap. 215.  
Lib. 2. c. 10.

*Locus.*  
Li. 1. Alim.  
*Vfus.*



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,  
PHASIOLVS, CAP. XLIX.

Nomina

Genera

Forma



ANC Leguminis speciem Græci pariter ac Latini Phasiolos vocant, Itali *Fagioli*, Galli *Phasiols*. Galeno vox Phasiolus quatuor syllabis prolata, diuersa est à Phafelo tribus syllabis pronuntiato, de quo cum Eruiilis simul tractauit. De Phasiolo ex ipsius sententia isto capite nos agemus. Phasioli genera tria hîc exhibemus, Phasiolum satium siue candidum, Phasiolum syluestrem, & Phasiolum syluarum. Phasiolus satius, siue albus, & vulgaris, foliis est Hederaceis, maioribus tamen, & mollioribus, ve-

PHASIOLVS ALBVS.



PHASIOLVS Syluestris.



PHASIOLVS Syluarum.



Forma  
Syluest.

nos, ternis ex vno pediculo prodeuntibus: flores edit cādidos, Pisi minores, è quibus rādem palmum longa cornicula exoriuntur, rotunda, in acutū desinentia, primū quidem viridia, deinde per maturitatē candicātia, quibus semina, quos Phasiolos appellamus, continentur, figura renibus quadrupedū similia, alba, dēpto vmbilico, qui tātū in his nigricat. Phasiolus agrestis est, quem hîc appinximus, cauliculis latis, inanibus: foliis superiori similibus, nō ita tamen ad Hederaceorū formā accedentibus, quorū pediculi in capreolos exeūt: florib⁹ purpureis: siliq⁹ cōpressis, semine intus rotūdo, nigro, vulgaris Pisi magnitudine, saporis ingratissimi. Phasioli tertiū hoc genus in Syluis, mōtosis saltibus, & desertis nasci cōperit Dalech. radice nigra, lōga, crassa, in radícula innumeras densalq;



denſaſq; fiſſa. Caules hæc planta multos profert, pede altiores, folia Phaſioli, aut Smilacis hortenſis, in ſingulis pediculis ferè ſena: florem Piſi, ex puniceo purpureſcentem: ſemen Lentis, paruulum, nigrum, in ſiliquis ruſis. Phaſioli albi, ſeu vulgares, in aruiſ ſeruntur, & ſine adminiculis conſiſtunt quidem, ſed in latum ſeſe diffundunt. Phaſioli auctore Dioſcoride, inſtant, ſtatuſ mouent, ægrè coquantur. Virides cocti ſi edantur, aluum emolliunt, ad vomitiones idonei. Pauluſ in medicamentum nephriticum ex cicadis nominatum, Phaſiolum album recipit. Excalfaciunt Phaſioli, inquit Matthioluſ, & humectant ordine primo. In cibum ſumpti non ſolùm inſtant, ſed & ventriculum grauunt. Præterea ſemen generant, & venerem excitant, præſertim ſi Pipere longo, Galanga, & ſaccharo aſpergantur. Sed id efficacius præſtant, ſi lacte bubulo pingui decoquantur, quoad diſſiliant. Redduntur in cibis innocentiores, ſi cum ſinapi, vel Cari ſemine edantur. Tumultuoſa ac terribilia ſomnia inducunt, vt Lentæ. Cornicula cum tenerrima ſunt elixantur, & in acetariis eduntur, addito Pipere, guſtu non ingrato. Eadem elixa, farina oblita, ac in oleo ſeruente, aut butyro frixa, Pipere, ſuccoq; vix acerbæ condita, ab Italiſ expetuntur in cibum. Peculiari naturæ vi ſanant equorum morſuſ, ſi crudi dentibus atterantur, imponanturq; vulneri. Ex iſſdem muliebris fucus paratur hoc modo. Phaſiolorum alborum, micæ panis Triticeï albiſſimi ſingulorum libram, cucurbitam vnâ longam, teneram, virentemq; ac diſſectam nocte vnâ in lacte caprino macerant. Hiſ addunt ſeminum Melopeponum vncias quinque, nucleorum perſicorum mundatorum vncias tres, nucleorum pineorum delibratoꝝ ſelibram. Conterunt ſeorſum omnia in lapideo mortario, adiiciuntq; pullum columbinum domeſticum vnâ cum plumis in particulas diſſectum, abiectiſ tantùm inteſtinis: omniâq; ſimul mixta in vitreum vaſ ad id paratum coniiciunt, ex quo in vaſe alio ſeruente aqua pleno collocato aquam eliciunt, diligentérq; cuſtodiunt. Ea enim nitorem faciei conciliat, & cuti molliſſimum addit læuorem.

Locus.

Lib. 2. c. 101.

Vires &amp;

Temper.

Lib. 7. ca. 11.

In cap. 101.

li. 2. Dioſc.

## SMILAX HORTENSIS, ſeu DOLICHVS,

## CAP. L.

**P**LANTA quæ *σμίλαξ ἡρτενσίς* à Dioſcoride dicitur, quòd Smilacis modo conſcendat, in propinqua, & vicina adminiculaprehendat, ab Hippocrate, Diocle, Theophrasto, & plerisque aliis *δολίκος* vocatur, à nonnullis propter ſiliquarum magnitudinem *λόκος*, & *λόκος*, id eſt ſiliqua, ab aliis *Φασιόλος*, Phaſioluſ, quem à Phaſelo triſyllabo diſſerre diximus, Arabibuſ *Lubia*, Italiſ *Smilace de gli horti*, & *Fagiuolo Turcheſco*, Germaniſ *Velchbaonen*, quaſi dicant Fabas Italicas, Hiſpaniſ *Feyones*, Galliſ *Phaſiols*, & *Fenes peintes*. Huiuſ genera ſeminum coloribuſ diſtinguntur. Alia enim lutea ſunt, alia rubent, alia varij ſunt coloribuſ picta. Smilax hortenſis, folia habet Hederæ, molliora tamen: tenues cauleſ cum capreoloſ viciniſ fruticibuſ ſe circumuoluentes, qui eouſq; adoleſcunt, vt topiariuſ ſcenas contexant: ſiliq; Fænograciſ ſimileſ, longioreſ, toroſioreſ, quibuſ abduntur ſemina, renuſ figura, ſed in æquali colore, quadam ex parte fulueſcentia. Hiſ notis omnibuſ ita Phaſiolorum genus hic depictum expreſſit Dioſcorideſ, vt nulla proriuſ repugnet: cauleſ enim ei ſunt tenues, longi, ramoſi, capreoliſ ſuiſ pedamentis viciniſ non modo ſeſe circumuoluentes, ſed etiam pergulaſ & atregiaſ in hortiſ opacanteſ: folia Hederacea, fruſtuſ renuſ figura, in ſiliquiſ longiſ, modo rubenteſ, modo verſicoloreſ. Id genus Phaſioloſ dolichoſ eſſe Galenuſ perſpicuè declarat, atq; etiam Theophrasti auctoritate confirmat hiſ verbis. Dolichorum nomen

Nomina

Genera


Forma.

Li. 2. c. 140.

Li. 1. Alim.



*SMILAX Hortensis,*  
*sive Dolichus.*



Lib. 8. Hist.  
cap. 3.

Lib. 1.

Lib. 1. c. 79.

*Vires &*  
*Temper.*  
Lib. de diet.  
ta.  
Lib. 1. Alim.

à Diocle quidem scriptum est, vna cum aliorum quoque seminum nos alentium nominibus. Scriptum etiam est in libro Hippocratis de ratione victus. Existimo autem ipsos sic appellare semen plantæ hortensis, quam nunc vulgo bifariam nominant: quidam *Νέες*, id est siliquas, alij *φασιόλες*. Hos Dolichos esse hortenses conicere quis possit, vel ex his quæ Theophrastus scripsit his verbis: *Καὶ τὰ μὲν ἔστιν ὀρθόκτυλα, καὶ θάπερ πωρὸς, καὶ κεκοῖν, καὶ ὅλως τὰ σιτάδην, καὶ ἑρηνά: τὰ δὲ πλεονέκτυλα, πάλλον, οἷον ἐρέβινθος, ὀρεός, φακός. τὰ δὲ ἐπικύβητα, καὶ θάπερ ὠχρὸς, πικρὸς, λάθυρος. ὁ δὲ Δολιχὸς ἐὰν παραματαιήσῃ τις ξυλὴ μακρὰ, ἀναβαίνει, ἢ γίνεται χάρις. ἐὰν δὲ μὴ, φαῦλος ἔρυσιν ὠδῆς.* Id est, Aliis quidem caulis est rectus, vt Triticum, Hordeum, & omnibus frumentaceis, atque æstiuis: aliis verò in latus potius inclinatur, vt Ciceri, Eruo, Lenti: aliis humi procubens, vt Eruiiæ, Piso, Cicerculæ. Dolichus verò si ligna longa affixeris, in ea conscendet, & fructum feret: alioqui rubiginis vitio corrumpitur. Ex eo certe, inquit Galenus, quod ligna

longa Theophrastus iubet affigi, affirmatque nisi id fiat Dolichos rubigine vitari, potest quivis conicere ipsum verba facere de iis quos nunc Phasiolos, seu *Νέες*, id est siliquas appellamus. Smilacem hortensem Dolichos esse & Phasioli genus Aetius aperte docet. Qui nunc, inquit, ab omnibus Lobi nominantur, apud omnes veteres Dolichi & Phasioli appellabantur, à nonnullis Smilax hortensis. Nutriunt quidem non minùs quàm Pifa, similiterque flatus expertes sunt: verum iucunditate & alui deiectione illis cedunt. Appellantur autem Lobi, id est, Siliquæ præcipue, quoniam ex omni genere Leguminum quorum semen tegitur siliqua hoc solum vna cum siliquarum operimento vt plurimum estur. Hæc Aetius. At Phasioli, qui etiam Dolichi appellantur, inquit Paulus, integri cum siliquis viridibus comesti, excrementorum plus gignunt. Sed cur Dioscorides de Phasiolo primum tractavit, deinde aliquanto post de Smilace hortensi seorsum, si Smilax hortensis etiam Phasiolus est? Quia Phasioli diuersa sunt genera, candidum, & vulgare quod in aruis nascitur: aliud sub fuluum, & variis coloribus pictum, quod in hortis colitur, de quo posteriore loco sermonem fecit. De Dolichis hæc scripsit Hippocrates. Pifa minus quidem inflant, sed magis per aluum secedunt. Eruiiæ autem & Dolichi iis quidem secedunt celerius, verum minus sunt flatulenti, & nutriunt copiosius. Diocles in Leguminum catalogo vt Fabas primas recensuit, inquit Galenus, mox Pifa, deinceps ad verbum sic scribit. Dolichi verò non minùs quàm Pifa nutriunt: præterea flatu similiter carent: quod verò ad suauitatem pertinet ac deiectionem, vincuntur. Siliqua cocta, inquit Dioscorides, cum semine, inter olera Asparagi modo estur: vrinam ciet, & tumultuosa somnia facit.

LEN 5



LENS, CAP. LI.

ΑΚΟΣ & φακὶ Græcis legumen dicitur, Latinis Lens, & Lenticula, *Nomina*  
 Arabibus Hades, Italis Lenticchia, Germanis Linsen, Hispanis Lenteias,  
 Gallis Lentille. Inuenio apud auctores, inquit Plinius, æquanimitem *Li. 18. ca. 12.*  
 fieri vescentibus ea quod ex Etymi vi dictum esse videtur, vt Lens quasi lenis  
 dicta sit, lenitatisque significationem habeat. Genera lentis sunt duo. Album *Genera.*  
 minus, & in cibis gratus: alterum cinereum, paulo maius. Plinius etiam duo *Matth. in c.*  
 Lentis genera in Aegypto esse dicit, alterum rotundius, nigriusque, alterum sua *100. libr. 2.*  
 figura, vnde vario vsu translatum esse in lenticulas nomen. Lens tenuibus exit *Li. 18. ca. 12.*  
 cauliculis, cubitalibus: foliis ab vtraque pediculi parte multis & angustis, *Forma*

LENS MAIOR.



LENS MINOR.



ciæ similibus, sed angustioribus, & minoribus: flores item Viciæ haud dissimi-  
 les, minores, cinereo generi purpurascences, albo, candidi: siliquæ parvæ com-  
 pressæ, molliter in latitudinem planæ, quibus semina terna quaternæue cōdun-  
 tur, parvæ, rotunda, lata, compressa, amictæque læui cuticula. Est & Lens minor,  
 in qua flos siliqua, seminis figura, omniæque similia priori, sed minora. A rei  
 herbariæ studiosis feritur in hortis. Lens amat solum tenue, inquit Plinius, ma-  
 gis quàm pingue: cælum vtrique siccum. Lentis, ait Galenus, contrariæ sunt fa-  
 cultates. Cortex eius adstringit, corpus siue ipsius veluti caro, desiccatur, & sistit  
 ventrem, austera sua qualitate, cuius cortex multæ est particeps. Decoctum  
 siue cremor ipsius adstringenti facultatem contrariam obtinet: alui enim pro-  
 uocat: quare prior aqua abiicitur cum ea sistenda est. Hac de re Galeni verba sunt  
 accuratius expendenda, vt an Dioscoridi repugnet, perspiciatur. Lentis in-  
 quit Galenus, valenter astringunt (Ætius tamen & Paulus, qui ex Galeno trans-  
 scribere, legisse videntur, τὸ φασὶν οὐκ ἰσχυρῶς, id est, non valenter adstringunt)  
 medium tenent caliditatis & frigiditatis, desiccant tamen in secundo ordine.  
 Ipsum itaque eorum corpus desiccatur, & sistit ventrem, cæterum decoctum mo-  
 uet: proinde etiam prior aqua abiicitur, vbi retinendæ alui causâ adhibetur. *Li. 1. Alim.*

*Locus.*  
*Lib. 18. c. 12.*  
*Vires &*  
*tempera.*

*Lib. 8. sim.*



Idem rursus: Nemo ex Lentibus panem facit: aridæ enim sunt, ac friabiles, corticemque habent adstringentem, & quæ ipsorum est veluti caro crassi est succi ac terrei, austeram qualitatem habens exiguam, cuius cortex multæ est participes. Succus porro in ipsis est adstringenti contrarius. Quocirca si quis in aqua Lentem coxerit, deinde aquam sale, aut garo, aut cum ipsis oleo conditam sumperit, potus is aluum deiicit. At ex his coctis Lentibus, ad eum modum quem diximus paratus cibus facultatem habet succo contrariam, ut quæ ventris fluxus siccet, stomachum, intestina, & totum denique ventrem corroboret. Quamobrem celiacis & dysentericis cibus est accommodus. Lens vero decorticata, ut illam adstringendi vehementiam, & ea quæ ipsam consequuntur, amittit, ita magis nutrit, quam quæ cortice spoliata non est: verum succum crassum ac prauum gignit, tardèque comseat, non tamen alui fluxus desiccatur, uti ea cui

Libr. 7. cortex non est ademptus. Lentem Æginetæ, secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamento, sed adstrictionis quoque non nihil habent. Totum verò Lentis corpus siccatur, aluumque sistit, quam decoctum ipsius prorat, ideoque prior aqua abiicitur, cum ventris sistendi gratia Lentem assumentur. Lentem Aetio teste, non valide adstringunt, in caliditatis autem & frigiditatis medio consistunt. Siccant ordine secundo. Itaque corpus ipsarum siccatur, ac sistit ventrem: decoctum autem promouet. Quapropter ubi sistendi ventris gratia sumuntur, prima aqua effunditur. Consideremus nunc num his

Li. 2. c. 100. aliqua ex parte Dioscorides, refragetur. Lens, inquit, frequenti cibo aciem oculorum obtundit, ægrè concoquitur, stomachum vexat, eumque & intestina inflat: sed aluum cum cortice cocta sistit. (Galenus quidem ait corticem eius adstringere, ut potè multæ austere qualitatis participem) præstat in cibo, quæ facillimè coquitur, & nihil atri in maceratione reddit. Vim habet adstringendi: (sic Galenus, Lentem valenter adstringunt:) quapropter aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primaque aqua inter coquendum effundatur. Id enim primum decoctum aluum ducit. In hoc quidem nihil Dioscorides à Galeno dissentit, quoniam Lens decorticata Galeno, illam adstringendi vehementiam, ea quæ ipsam consequuntur, amittit. Nam quod Dioscorides dixit Κοιλίαν ἱσῆσαι προ απολεπισθεῖς, καὶ ἐνθῆς ἐπιμελῶς, idem est quod Galenus habet, ὅτι ἐνθῆτων τῶν φακῶν, & cætera. Id est, ex his coctis lentibus facultatem cibus habet succo contrariam, ut qui ventris fluxus siccet. Hoc tantum interest, quod Galenus corticem non detrahit, Dioscorides detrahit, qui paulo ante dixerat Lentem cum cortice coctam aluum sistere. Galeni verò sententiæ consentaneum esse, Lentem etiam detracto cortice bis coctam, siue, ut ait Dioscorides, diligenter & accuratè discoctam, ventrem cohibere, ex ipsomet Galeno licet intelligere, cum scribit. Non Lens sola, sed & Brassica, atque adeo omnia ostracoderma, compositam ex pugnantibus facultatibus naturam sortita sunt: Nam solidum cuiusque corpus tardè permeat, aliumque sistit: humor verò stimulat ad excretionem. Huius porro rei ex coctione manifesta sumitur demonstratio. Nam aqua in qua dictorum quodque fuerit decoctum, aluum subducit, ipsa verò corpora retinent. Hinc nonnullos audias dicentes. Si Brassica leuiter cocta, & vniuersim ac repente ex lebere in vas aliquod, in quo sit oleum & garum, transfusa ante alios cibos sumatur, aluum subducere: alios autem sentias Brassicam quæ δισπεσθος, id est biscocta dicitur, ad ventrem moradum, hoc modo præparare, cum ipsam aqua prius incocerint, aquam quidem totam ex lebere effundunt, aliam autem affundunt puram & calidam, in qua rursus Brassicam secundo coquant. Idem de Lente biscocta censendum. Pergit Galenus Lenticulæ in cibis facultates explicare. Iure igitur qui largius hoc edulio utitur

elephan



elephātiāsi & cancris sunt obnoxij. Siquidem crassa siccaque cibaria succo melancholico generando sunt idonea. Quare iis duntaxat quibus aquea in carnibus est *καρχέλια*, Lenticula in cibo vtiliter præbetur, ceu aridis & squallentibus admodum damnosè. Eandem ob causam visum integrum & inculpatum hebetat, ipsum immoderatè exsiccans ei verò qui contrario modo se habet confert. Menstruis autem purgationibus non est accommoda: crassum enim & tardius fluentem sanguinem reddit: at muliebri profluio est utilissima. Cum autem Ptissana in eo saltem contrariam ipsi habeat facultatem, ex amborum mistione præstantissimum componitur eduliū, quod Phacoptissanam appellant: vtrumque haud æquali portione miscentes, sed Ptissanæ minus iniicientes, ut quæ in cremorem vertatur, & in magnam molem attollatur: Lens autem cocta parum quidem extumescit. Hoc autem edulium eodem quo Ptissana modo præparatur, præterquam quod satureia, aut pulegium adiicitur: quo fit ut suavius simul & concoctu facilius reddatur, cum Ptissana illis minimè gaudeat, sed solo anetho porròque sit contenta. Pessimè autem cocci diuitibus lentè parant cum sapa, quandoquidem Lens haud quaquam eorumque incrassant mixtionem postulat, sed humidorum potius, & quæ suam ipsius crassitiem incidant. Cum verò sapa commiscetur, hepatis obstructions solet gignere, visceris huius ac lienis inflammationes auget, nisi melle addito melior fiat. Hæc & alia plura Galenus tradit. Dioscorides alias etiam facultates Lentis exponit. Somnia tumultuosa, inquit, excitat: capiti, neruis, pulmōni inutilis: valentior eius facultas contra alui fluxiones, addito cum aceto Intybo, aut Portulaca, aut Beta nigra, aut baccis Myrti, aut putamine Punici, aut aridis rosis, aut mespilis, forbisue, Piri Thebanis (Cornarius vocem vnam hîc excidisse putat, *ἢ ῥωσ, ἢ ἀπύωσ, ἢ φοινικῶν θηβαϊκῶν*, id est, aut sorbis, aut piri, aut palmulis thebaicis, cum nulla sint pira Thebaica ab auctoribus memorata, sed palmulæ Thebaicæ ab aliis, & ab ipso Dioscoride nominatæ, quarum decoctum magnopere adstringit, & reprimat,) aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut Punici granis integris, quæ post decoctionem abiiciuntur, vel Rhoe quæ obsoniis aspergitur. Verum acetum cum ea diligenter percoqui debet, aliàs aluum conturbat. Contra subuersionem stomachi triginta grana Lētis adempto cortice deuorari proderit. Decocta cum polenta & illita podagras lenit: sinus cum melle glutinat: crustas rumpit: vlcera purgat. Decocta in aceto duritias & strumas discutit: cum cotoneo aut meliloto medetur inflammationibus oculorum, sedisque; addito rosaceo: sed in amplosinu, aut inflammationibus sedis, quæ maius remedium exigunt, cum putamine punici & siccis rosis, adiecto melle decoquitur: nomis quæ in gangranam euaserunt, adiuncta maris aqua: pustulis, & iis quæ serpunt, igni sacro, perniciōibusque, ut ante dictum est: (cum aceto) contra mammas in quibus lac in grumos coit, & præ nimia sui copia profunditur, cocta in aqua maris, & illita auxiliatur. Lens optima Plinio, quæ facillimè coquitur, eaque, quæ maximè aquam absorbet. Aciem quidē oculorum obrundit, & stomachum inflat: sed aluum sistit in cibo, magisque discocta cælesti aqua: eadem soluit minus percocta. Crustulas vlcera rumpit, eaque quæ intra os sunt purgat, & adstringit. Collectiones omnes imposita sedat, maximèque exulceratas, & rimosas. Oculorum autem epiphoras cum meliloto aut cotoneo, contra suppurationia cum polenta imponitur. Decoctæ succus ad oris exulcerationes, & genitaliū adhibetur: ad sedem cum Rosaceo & cotoneo. In his quæ acius remedium exigunt cum putamine Punici, melle modico adiecto. Ad id demū ne celeriter inarescat, adiiciūt & Betæ folia. Imponitur & strumis, panisque vel maturis vel maturefcentibus, ex aceto discocta. Rimis ex aqua multa, & gangrenis cū Punici tegmine.

Lib. I. c. 125.

Li. 22. c. 25.



regmine. Item podagris cum polenta, & vuluis, & renibus, pernionibus, vlceribus difficile cicatricem contrahentibus. Propter dissolutionem stomachi triginta grana lentis deuorantur. In choleris quoque & dysenteria efficacior est in tribus aquis cocta: in quo vsu melius semper eam torrere, aut tundere, vt quàm tenuissima detur, vel per se, vel cum cotoneo malo, aut piris, aut myrto, aut intubo erratico, aut beta nigra, aut plantagine. Pulmoni est inutilis, & capitis dolori, neruosisque omnibus, & felli: nec somno facilis: ad pustulas vtilis, ignique sacro, & mammis in aqua marina decocta, in aceto autem duritias & strumas discutit. Stomachi quidem causa, polentæ modo portionibus inspergitur. Quæ sunt ambusta aqua semicocta curat, postea trita, & per cribrum effuso furfure, mox procedente curatione addito melle. Ex posca coquitur ad guttura. Est Lens etiam hodie notum legumen, & editur parata ex ipsa pulcicula, quæ Græcis *φασίη* dicitur, & Lens integra cocta, quam *ὀνόμαρον* dicunt. Nouerat & Martialis Ægyptiam Lentem, scribit enim.

*Accipe Niliacam pelusia munera Lentem,  
Viliorest Alica, cavior illa Faba.*

VICIA, APHACA, (AP. LII.

Li. i. Alum.  
Nomina



B Asianis suis Galenus ait *βίσιον*, dici legumen, eoque solo nomine id vocari: Atticis verò *σάρακον*, aut *κύαμον*. Latinis Vicia id nominatur à vinciendo, vt Varroni placet, quòd item capreolos habet vt Vitis, quibus sursum versum serpit ad scapum lupini, aliūmue calamum, ad quem, vt hæreat, eum vincire solet, Gallis *Vesce*, Germanis *Vueicken*, Anglis *Fiche*. Est vicia quæ sponte nascitur, est & quæ caterorum leguminum modo in aruis seritur. Hæc caules habet tenues, quadrangulares, ternūm fere

Genera.

Forma

VICIA VERA,  
*Aphaca Matth.*



APHACA VERA,  
*Vicia Matthiolo.*



pedum



pedum altitudine: folia longa, Lenti similia, ex pluribus vni pediculo adnexis composita: quorum singula maiora, latiora, crassioraque sunt quàm Lentis: flores subrubri, siue in purpura nigricantes: siliquæ latæ, quarum singulis grana includuntur quina senaue, non globosa, sed Lentis instar propemodū compressa, nigra, gustu insuaui. Seritur quocumque solo, cultu facillimo, & solū in quo satum fuerit lætificans. Hic veram Viciam expressimus, Matthiolus nomine aphaces depinxit, quam Galenus cum Vicia coniunxit. Dioscorid. Aphacam, quæ ἀφάκης Græcis nominatur in aruis nasci dixit, altiorem Lente, tenuibus foliis, siliquis Lente maioribus, in quibus terna quaternaque semina nigra, Lente minora. Theophrastus Aphaces oleris meminit inter intubacea de quo postea nos agemus, & Aphaces leguminis, eam cum Lente & Piso in leguminum genere ponens, quorum sera satio. Idem alio loco scribit quorundam leguminum siliquas esse ἐπιπλάγεις, vel ὑποπλάγεις, vt legisse Gaza videtur, id est, interprete Gaza nonnihil latas, vt Lentis & Aphaces, Aphacesque fructum celeriter perire. Idem frugum & leguminum pestes recensens tradit Aphacen à Securidaca strangulari. Plinius Theophrastum secutus, vno loco Aphacen in cichoriaceis numerat, alibi vero Dioscoridis Aphacam ita exprimit, vt ex eo transcripsisse videatur, vel certe ex eo auctore ex quo Dioscorides ipse descripsit. Aphace, inquit, tenuia admodum folia habet: pusillo altior Lenticula est, siliquas maiores fert, in quibus terna aut quaterna semina sunt, nigriora, & madiora, & minora Lenticula. Nascitur in aruis. Itaque Aphace rectè fortasse dicitur legumen hic depictum, quod Matthiolus nomine Viciæ exhibuit. Aphaces, & Viciæ semina figura non esse rotunda, veluti Fabarum Galenus scribit, sed aliquanto latiora quomodo lentium. Hac cum siliquis atque integra planta rustici reponunt, vt brutis pecudibus sint pabulo. Per famem tamen quosdam sibi cognitos, qui hæc quoque comederint, potissimum vère, cum adhuc virent, quemadmodum Fabas, & Cicer edere consueuerunt. Sunt autem non insuaui modo, sed concoctu etiam difficilia, aluūque inhihent. Perspicuum ergo est cum sint eiusmodi, alimentum quod ex ipsis distribuitur, esse haud quaquā boni succi, sed crassum, atque ad succum melancholicum gignendum idoneum, vt de Lente diximus. Verum Lenti quidem multa bona insunt, his autem nihil bonorum illius adest. Aphacæ semen, auctore Dioscoride, adstringendi vim habet, quare torrefactum stomachi aluique fluxiones sistit, si fresum lentis modo decoquatur. Natura Aphacæ ad spissandum efficacior inquit Plinius quàm Lenti: reliquo vsu eosdem effectus habet. Stomachi aluique fluxiones sistit semen decoctum. Vicia sylvestris caulibus, foliis, siliquis satiæ similis est, nisi quod omnia hæc minora habet, caules teneri sunt, graciles, angulosi folia in pediculis eodem modo quo in satiæ disposita, quorum extrema in binos ternosue capreolos desinunt: flores parui in ipso caule: siliquæ item parue longiusculæ, angustæ, in quibus sena septenque grana, nigricantia, dura, viciæ seminibus minora. In agris cum segetibus prouenit. Hanc sylvestrem Viciam Dodonæus Arachum nominat, tertia syllaba per, ch, scripta, & Craccam, Galli *Vesce sauvage* & *veseron*, Germani *Vuilde Vuicrem*, & *Sant Christoffelskran*, Brabanti *Crok*. Ruellius etiam Craccā appellari refert. Fuchsius Aphacen vocat, Matthiolus, Viciam. Quorum sententiam improbat Dodonæus, quod seminis Craccæ figura exquisitè rotunda est, seminum vero Viciæ & Aphaces, forma rotunda non est, sed aliquanto latior, veluti Lentium, vt ex Galeno modo diximus. Viciæ sylvestris figura qualis sit, ex imagine satiæ intelligi potest.

*Locus.*

In cap. 142.

li. 2. Diolc.

li. 2. c. 142.

*Locus*

*Forma*

Lib. 7. Hist.

cap. 7. & 11.

Ibid. ca. 5.

Cap. 8.

Lib. 27. c. 5.

Li. 1. Alim.

*Vsus*

Li. 2. ca. 142.

*Vires.*

Lib. 27. c. 5.

*Locus.*

ARA



Forma.

Locus.

Li. 1. Alim.



**A**racidis leguminis sylvestris genus Vicię sylvestri planę simile est cauliculis, foliolis, capreolis: floribus dissimile, nam acervatim in longis pediculis oriuntur, ferę in spicę formam, ex cęruleo purpurei: deinde siliquę compressę, in quibus semina Vicię sylvestri similia, Vellaunij & Aruerni etiamnum hodie vocant *Arousses*, quasi *Arachum*, corrupto quidem, sed adhuc servato veteri nomine. Inter segetes crescit, & in agrorū marginibus ἀραχὼν Gręci vocant, Latini similiter *Arachum*, de quo sic Galenus. Apud nos sylvestre quoddam rotundum ac durum, Eruoq; exilius, in fructibus cerealibus reperiunt, quod *Arachum* nominant, non per c, sed per ch, ultimam syllabam proferentes quod selectum proiciunt, uti & semen *Securidacę*. Hęc *Dodonęus* in frumentorum Historia.

## FOENVMGRÆCVM, CAP. LIIII.

Nomina



ΗΛΙΣ, κεραιτῆς, ἀρυβέρος, βένερος Gręcis, Latinis fœnumgræcum. Maior Gręcarum appellationum pars à siliquarum est similitudine sumpta: hæ enim corniculis similes sunt. Hinc ceraitis simpliciter à cornu dicitur: κέρως enim Cornu significat. Aigoceros à caprini cornu similitudine, quemadmodum à bubuli Buceros, quod nomen Theophrastus huic plantę indidit. Columella simpliciter Siliquam à rusticis vocari scripsit. Varro Siliculam, Plinius. Siliciam, Arabes *Olba*, *Helbe*, seu *Hebbe*, Itali *Fiengreco*, Germani *Bockshorn*, Hispani *Alfornas*, & *Alhouas*, Galli *Fenugrec*, & *Senegre*, Angli. *Fenugreek*, Belg. *Fenigrec*. Fœnigræci genera sunt duo, sativum, & sylvestre. Fœnumgræcum sativum caules multos ab vna radice profert teneros, rotundos, nigricantes, inanes, ramosos: folia pratensis Trifolij modo, in ambitu serrata: flores candidos, paruos, ex quibus siliquę prodeunt longę, corniculorum figura, incurvę, & acuminatę, in quibus semen sub fulvum, pingue, gravis odoris. Radice firmatur multiplici, tenuique. Fœnumgræcum sylvestre radice est longa, lignosa, furculosa: caule simplici dodrantali, ima parte corticoso: foliis paucis, satiui foliis similibus: siliquis quàm in sativo latioribus, quę in tenue veluti filū desinūt, & curvorum instar cornuū arcuantur: semine quàm in sativo minore. In aridis provenit. Sylvestre aliud fœnumgræcum Tragi & recentiorū multis rotundis & longis repit caulibus.

Li. 2. ca. 11.

FOENVMGRÆCVM  
sativum Matthioli.

Genera.

Forma.

Locus.



Folia



FOENUGRÆCUM FOENUGRÆCUM

foenugræcū alterum Dodonæ.



Folia oblonga sunt, veluti Vicia, singula tamen maiora, latiora & rotundiora; flores ex foliorum sinibus prodeunt, albicantes: filique oblongæ & aliquantulum hinc ciliatæ; Foenograceo, similes, sed minores; in quibus semen angulosum; sapore Vicia. Radix longa & sæpè tricubitalis; quæ non facile intermorigitur, verum singulis annis primo vere regerminat. Reperitur in vtraque Germania, locis siluosis, opacis & incultis. Nullius in medicina aut cibo, quod sciat, usus. Sæpius Septembri mense, vel circa æquinoctium seritur, cum pabuli causa seritur, & mensis Ianuarij ultimo, vel primo Februarij cum in messem seminatur. Silicia hoc est Foenugracum, inquit Plinius, scarificatione seritur, quatuor digitorum sulco, non altiore, quantoque peius tractatur, tanto prouenit melius. Rarum & elatum, esse aliquid cui prodest negligentia. Iunio & Iulio mensibus flores, dein filiquas producit, Augusto maturum semen legitur. Foenugracum veteres in cibis recipiebant, nec non in medicos usus. Foenugraci semen Galenio in et manifestè calfacientia censetur, eundemque hominibus in cibo usum prestat, quem Lupini. Sumitur enim cum Garo alui subducenda gratia, et quæ huius rei multo quam Lupini accommodatius, cum nihil ex propria substantia habeat, quod transiit in semoretur. Manditur autem & cum aceto & Garo sicut Lupini. Multi præterea & Foenugracum & Lupinos ex vino, garo, & oleo sumunt, alij etiam panem addunt, eoque obsono sunt contenti, quod ut ventrem minus subducatur, caput certe non tentat, quod nonnullis Foenugracum ex Garo facere solet. Præterea stomachum non subvertit, nam id quod quæ Foenugracum in quibusdam efficit. Succus ipsius cum melle sumptus ad omnes prauos humores qui in intestinis habentur subducendos est accommodatus suo quidem lentore leniens, calore autem dolorem mitigans. Quod autem absterforia facultas sit particeps, intestina etiam ad excretionem instigat, sed parcius ei mel est admiscendum, ne mordacitas exuperet. In diuturnis vero

Lib. 18. c. 16.

Tempus.

Lib. 18. c. 16.

Tempus.

Lib. 18. c. 16.

Tempus.

Li. 1. Alim.

Vsus &

vires.

Lib. 18. c. 16.

Forma.



thoracis citra Febrem affectibus, pingues cum eo palmulas elixare oportet, vbi autem succū ipsum expressum copioso melli miscueris, ac rursus super carbones ad mediocrem crassitiem coxeris, tum demum longe ante cibum vti. Hodie Fœnogræco in cibis non vtimur, sed in medicos vsus sapissimè, præsertim à chirurgis, admittitur. Farina enim eius, vt rectè tradit Dioscorides, vim habet molliendi, discutiendique: in aqua mulsa decocta aduersus tam internas quàm externas inflammationes efficaciter illinitur: lienem cum aceto & nitro trita extenuat. Succus decocti eius fœminarum malis subuenit, & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur & insident. Fœnigræci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat: locos dilatat, & emollit, si cum anserino adipe pessi vice subiiciatur. Viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vlcera sentientibus Decoctum eius prodest aduersus tenesmos, fœtidamque dysentericorum proluuiem. Oleum quod ex eo exprimitur, & myrto, capillos, & genitalium cicatrices absterget. Nec Fœnogræco minor est auctoritas, inquit Plinius, quod Telin vocant, alij Carphos, alij Buceras, alij Ægoceras, quoniam corniculis semen est simile, nos Siliciam. Vis eius siccare, mollire, dissoluere. Succus decocti fœminarum pluribus malis subuenit, siue duritia, siue tumor, siue contractio sit vuluæ, fouentur, & insident: infusum quoque prodest. Furfures in facie extenuat. Spleni addito nitro decoctum & impositum medetur: item ex aceto. Sic & iocinori decoctum. Subiiciuntur & alia plura ad vsum medicū pertinentia, de quibus & iis quæ Dioscorides tradidit, iudicium ferri potest ex iis quæ Galenus scribit: nempe Fœnumgræcum calefacere secundo ordine, desiccare primo: quare feruentes phlegmonas irritare, exacerbareque, quæ verò minùs sunt calidæ & duræ, eas digerendo curare. Sicci seminis farina, inquit Matthiolus, cum sulphure & nitro lentigines delet. Medetur vlcerosæ scabiei, si cum quarta parte seminis Nasturtij excipiat aceto, & subinde illinatur. Eadem in hydromelite decocta, addita auxungia auxiliatur genitalium tumoribus: parotidas etiam iuuat, chiragram, podagram, & articulorum luxationes. Ex vino subacta carcinomata purgat. Datur vtiliter potandum Fœnigræci decoctum diuturna tussi laborantibus, & cum pectus fuerit exulceratum. Seminis decoctum maceratis in eo Linteolis, & fronti adhibitis, oculorum fluxiones auertit.

## S E S A M V M

## CAP. LV.

## Nomina

ἩΣΑΜΟΝ dicitur Græcè, similiter Latine Sefamum, & Sefama, Arabicè *Semsem*, & *Sensera*, Italicè *Sesamo*, *Sosmano*, & *Ingiolina*, Hispanicè *Iorgilin*, & *Alegria*, Gallicè *Iugioline*. Sesami quidem semen in officinis satis protritum est, ex quo videlicet copiosum exprimitur oleum, ipsa verò Sefami planta non æquè nota, vt pote quæ numquam vel rarissimè in Italia & Gallia seratur. Semen autem quo Officinæ vtuntur, ex Græcia & Peloponneso ad nos conuehitur. Sefamum Theophrasto auctore, caule est ferulaceo, magis quàm arundinaceo, Milio simili, crassiore tamen ac magis multiplici, radice numerosiore: foliis rubentibus: flore viridi, herbaceo: semine vasculis incluso Papaueris modo. Plantâ nomine Sefamilis hîc pictâ à Luca Ghino ad se misisse ait Matthiolus, sed legitimum Sefamum esse non affirmat, quod culmum non ferat Milio crassiore, altiore, numerosiorémque, nec radices plures, sed scapum Fabacæ æmulū, in quo vt in Faba, siliquæ triangulares, aut quadrangulares, in quibus semen. Deinde folia eius non rubent, nec flos herbaceus est. Ex quibus tam leuibus coniecturis statuere aduersus omnium iudicia non debuit Matthiolus postremam plantam non esse Sefamum, vt ait Pena, quantum

Lib. 8. Hist.  
cap. 3. & 9.  
Forma



SESAMVM *verum.*



tum enim feminis Sesamini ex Alexandria & Creta defertur, huius plantæ est. Sesama, inquit Plinius, ab Indis venit, ex ea & oleum faciunt, color eius candidus. Omnium quæ ex æstivis sementibus ager recipit, Sesamam terræ molestissimam esse scribit Theophrastus, plurimumque posse eam emaciare, utpote quæ multiplici magis, crassioréque calamo, & numerosiore radice sit quàm Milium. Sesamo, ut cæteris leguminibus vesciebantur antiqui Galeno teste, qui ob id leguminib<sup>9</sup> subiunxit. Plinius æstivis frumentis annumerat. Sesami semen, inquit Galenus, pingue est, ideoque repositum celerrimè fit oleosum: quamobrem eos qui ipso vescuntur celeriter implet, stomachumque subvertit, ac tardè concoquitur, pingueque corpori præbet alimentum. Liqueat ergo quod ventriculi partibus vigorem ac robur addere nequit, quemadmodum neque aliud quodvis pingue. Est autem crassi succi, ideoque non propere pervadit. Ipso autem solo non admodum vescun-

Lib. 8. Hist. cap. 2.

Li. 1. Alim. Lib. 18. c. 10.

Usus  
& Vires

tur, sed cum melle crudo Sesamidas, quas vocant, (nimirum Placentas) effingentes. Panibus etiam inspargitur. Sesamum Dioscoridi stomacho inutilis cibus, halitus gravitatem facit, quoties inter mandendum commissuris dentium inhæsit. Nervorum crassitiem illitu discutit. Medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, coli doloribus, & cerasæ morfib<sup>9</sup>, capitis dolores qui æstuatione concitantur, ex rosaceo lenit. Eadem efficit herba decocta in vino: præferim inflammationibus oculorum, doloribusque prodest. Ex eo fit oleum quo Aegyptij utuntur. Quæ verò Ruellius vertit, medetur auribus fractis, & cætera, Græcè sic leguntur. Καὶ τὰ ἐν ὠτὶ θλάσματα, καὶ φλεγμονὰς, καὶ πυρίχυλα, καὶ κώλων ἀλγῆματα, καὶ κεράτου διήγημα θεραπεύει. Id est, Aurium contusiones, inflammationes igne ambusta, coli dolores, atque cerasæ morsum sanat. Cornarius tamen κώλων ἀλγῆματα artuum dolores interpretatur, legendumque censet κώλων per o, non κώλων per o. quod intestinum crassum significat. Lacuna verò in nonnullis manuscriptis codicibus legi tradit, ἀσχηλεύματα καὶ κεράτου διήγημα, id est, stellionis & cerasæ morsus in quibusdam tantum κωνοπέων διήγημα θεραπεύει, id est morfib<sup>9</sup> culicum medetur. Sesama trita in vino sumpta inhibet vomitiones inquit Plinius. Aurium inflammationi illinitur, & ambustis. Eadem efficit & dum in herba est. Hoc amplius oculis imponitur decocta in vino, Stomacho inutilis cibus, & animæ gravitatem facit: stellionum morfib<sup>9</sup> resistit: item vlceribus quæ cacoethe vocant. Et auribus oleum quod ex ea fit prodesse diximus. Hæc sic legimus in vulgatis nostris exemplariis, Cornarius verò in vetere suo codice pro vino legit ovo, idque verisimilius. Sesama trita in ovo sumpta inhibet vomitiones. Deinde pro hoc amplius, habet, Hæc amplius, ut de herba accipiamus. Sesamum, Galeno, non parum in se continet viscosum & pingue, quare emplasticum est, & molliens, ac modicè calidum. Eiusdem facultatis est quod ex eo conficitur oleum, herbæ quoque decoctum similem vim obtinet. Oleum Sesaminum, ut tradit Mesues, impingat, semen auget, asperam arteriam lenit, & vocem ob id claram reddit.

Lib. 2. c. 92.

Li. 22. c. 25.

Embl. 87. libr. 2.

Lib. 8. sim.

Li. 3. Antid.



Nomina

Genera.



ΠΥΒΑΓΧΗ Græcè sic & Latinè Orobanche nominatur, & Erui angina, à Theodoro Eruanga. Nam Orobanchè ab Erui strangulatu nomen adepta est, nempe quod ὀροβον ἀγγχεῖ, id est, quod Orobium siue Eruum strangulat. Duplicem esse Orobanchen ex Theophrasto, Galeno, Dioscoride colligere licet. Vnam quæ legumen sit, aut leguminum Erui præsertim vitium, & pestis: alteram quæ cauliculus tantum sit subruber. Theophrastus de seminibus quæ inter alia nascuntur loquens, vt de Ægilope qui in Hordeo magis oritur, de Aracho qui in Lête, de Securidaca quæ in Aphaca, subiicit. Ἐνια δὲ φανερώς ἐστὶ κοινὰ παλαιοῶν, ἀλλὰ διὰ τὸ μέγιστα ἐν τισὶν ἐυαθύνεσθαι (sic enim legendum sensu ita postulante, & Gaza versione subscribente, non ἀσθενεῖν, vt in publicis exemplaribus legitur) ἰδία τοῦτων φαίνεσθαι. καθάπερ ἡ ὀροβάγχη τῶν ὀρόβων, ἢ ἡ ἀπαρίνη τῶν φακῶν. ἀλλ' ἡ μὲν ἐπικρατεῖ τῶν ὀρόβων διὰ τὴν ἀσθενεῖσθαι. ἡ δὲ ἀπαρίνη μέγιστα ἐν τοῖς φακοῖς εὐτροφεῖται. τρόπον δὲ τινὰ παραπλήσιος ἐστὶ τῇ ὀροβάγχῃ, διὰ τὸ ἐπιβάλλειν ἐκ γαστέρης ὅλον ὥσπερ παλαιάν: ἀποπνίγεται δὲ ἔτος, ὅθεν ἢ τὸ ὄνομα εἰληφέε. Id est, Quædam autē sunt perspicuè multorū communia. Sed quia in quibusdā maiore vim habent, horū propria existimantur, veluti Orobanche Orobi, Aparine Lentis. Sed Orobanche quidem Eruum vincit propter imbecillitatem, Aparine autem inter Lentē bene nutritur: & ea quidē Orobāche quoddammodo similis est, quia totam plantam aggreditur, & veluti brachiis amplexatur: sic enim strangulat, vnde ei nomen. Idem alio in loco de iis scribens quæ vicinas plantas interimunt. Καὶ δὲ ἡ ὀροβάγχη καὶ λαμβάνει τὸν ὀροβον τὰς περιπλακεῖ καὶ καὶ ἀσθενεῖσθαι: καὶ τὸ λεμιόδαρον τὸ βύκερας εὐθὺς τῇ ρίζῃ περιφυλάττει. Id est: Etenim Orobanche Eruum necat amplexu compressūque suo, & Limodorum fanumgræcum interimit protinus radici adnascens. Orobanches leguminis sic quoque meminit Galenus. Reperit igitur in Lente quoque ex mutatione ipsius enatum durum rotundūq; Arachum, & Pelecynum seu Securidacam semina

Li. 5. causs. cap. 22.

Li. 1. Alim.

OROBANCHE Legumen,  
Aphaca Dod.

Li. 18. c. 17.

Lib. 4. c. 18.

Forma

Li. 1. ca. 136.



non vesca: præterea Aparinen, quæ non modò non esculenta est, sed plantæ lentis dum assurgit, vndique implexa, ipsam strangulat, suffocat, & detrahit, non aliter quàm Orobanche Eruum. Plinius & illius mentionem facit his verbis. Est & herba quæ Cicer enecat, & Eruum circumligando se, vocatur Orobanche. Orobanchen legumen putant esse docti herbarij quæ hîc depicta est, indicatā pro Rphace à Dodonæo. Tenuibus, angulosis, geniculatis, longis, Lentēque altioribus cauliculis assurgit. Folia sunt ei parua, tenuia, latiuscula, in acutum desinentia, in singulis geniculis bina, inter sese opposita, circa quæ tenues viticulæ, & graciles pediculi, flores ferunt paruos, ac luteolos, quos siliquæ sequuntur latæ, Lentis siliquis longiores, in quibus semina quaternaria quinquæ, lata, nigra, dura, Lente minora: radices parvæ sunt & fibratæ. Alteram Orobanchen Dioscorides describit his verbis. Orobanche cauliculus est sesquipedalis, & interdum maior, subruber, hirsutus, tener, sine folio, pinguis: flore subalbido, aut in luteum vergen



vergente: radice digiti crassitudine, & cum ariditate flaccescit caulis, fistulosa. In hac historia quæ Ruellius vertit, sine folio, pinguis, Græcè legimus φύλας ὑπολίπαρας, id est, foliis sub pinguibus: neque enim prorsus foliis caret hæc Orobanche, sed in summo foliola habet, inter quæ flores prodeunt. Plinium

Li. 22. c. 25.

## OROBANCHE

altera Matthi.



Ruellius quidem securus est, qui Orobanchen sic descripsit, ita tamē vt cum superiore Orobanche hanc confundat. Orobanchen, inquit, appellauimus necantem Eruum & legumina: alij Cynomorion eam appellant, à similitudine canini genitalis. Cauliculus est sine foliis, pinguis, rubens. Legitimam hanc Orobanchen alteram esse quæ hic depicta est, quæque notis omnibus historiæ Dioscoridis respondeat, Matthiolus, & plerique docti herbarij existimant. Ananienſes, teste eodem Matthiolo Herba lupæ vocant, quod vicinas herbas deuoret, nonnulli *Coda dileone*, alij *Herba tora*, quod vaccæ ea deuorata (vt pastores facto periculo testantur) statim taurum adeant. Cynomorion etiam appellatam à similitudine canini genitalis Plinius dixit, non inconcinna representatione: nam si quis eam contempletur glabro, singularique caule proſilientem, confarctos inter se flores, & quasi in glomum collectos monstrantem, genitalis canini effigiem referre perspicier, quod in summo crassius, &

In cap. 136.  
li. 2. Diosc.

veluti galericulo contextum cernitur. Recentioribus Græcis ὀσπριολών, & λεονοβόλον dicitur, hoc est, legumen Leoninum, & Leonina herba. Eiusdem meminit auctor libri de plantis Aristoteli inscripti. Est quæ caulem habeat, inquit, sed absque fructus, & foliis, vt quam appellant Chrysocomen aut Chryſiti. Quibus verbis Orobanchen Dioscoridis, Hæmoderon Theophrasti perspicue intellexit, Chryſitidis nomine conuenientes à fuluo colore Sciolus quidam exposuit Chrysocomen. Dodonæus hanc Dioscoridis Orobanchen, Theophrasti λιμόδωρον esse putat, de quo sic Theophrastus. Τὸ δὲ ὑποφύλον ἐν τῇς ρίζῃς τῶς κυμίνου, καὶ τῶς βραχέως τὸ λιμόδωρον (non λιμόδωρον, sed ἀμώδερον legendum, à cūte tanquam cruore infecta, puto, μονόχυλον, ἢ ἀπέμπερες τῶς χυλῆς, πλὴν βραχυτέρων τι πολὺ, καὶ ἀνωθεν τὴν κεφαλῶδες ἔχει, ρίζαν δὲ ὑποφύλον. Id est, Quod autem statim ab radice cumino, & Fœnogræco subnascitur Hæmoderon, vnicaule est, nec dissimili caule, verum breuiore multo, & superne quoddam veluti caput habet, radicem autem subrotundam. Idem alibi ait Hæmoderon radici pròruius adnascens Fœnumgræcum necare. Interim ex emendato Theophrasto, insigne in Plinio mendum corrigendum. Legimus enim lib. 20. cap. 10. Et necatur cuminum ab imo dorso, cum legendum sit, Et necatur cuminum ab hæmodero, ex Theophrast. lib. 8. histor. cap. 8. Cæterum Dioscoridis Orobanchen à Theophrasti Orobanche prorsus diuersam esse ex vtriusque historia perspicere licet: cum enim Dioscoridis Orobanche vnico constet caule, quæ Eruum, vel quamuis aliam segetem sic apprehendere, & veluti brachiis amplecti possit, vt strangulet, quod de sua Orobanche tradidit Theophrastus, cauliculis repentibus & viticulis suis phantas vicinas complecti, non interimere singulari caule

In hist. fru.

Lib. 8. Hist.  
cap. 8.

Li. 5. caus. 2.



Ibidem.

diuersum est. Tamen Dioscorides Orobanchen suam inter quædam legumina nasci scribit, & ea strangulare, atque inde Orobanches nomen inditum. Quare dicendum, quod censet Matthiolus, hanc nullo sane amplexu, sed præsentia tantum sua, legumina, segetes, cannabim & linum interimere, quæ iuxta ipsam oriuntur: vel dicendum, Dioscoridem Orobanchen quæ duplex sit, pro vna duntaxat accepisse, quod à Plinio etiam factum, diximus. In agro Cannabe confito effossa multoties est Hemoderos, tam prope nascens sub radice Cannabis, vt eam amplecteretur, ac sustolleret, velut impacta, & agglutinata: qua vicinia, & adhæsu, multum alimenti Cannabi adimebatur, quoniam Hemoderos planta succosa & per humida multo succo egeret, quo intercepto frandabatur propinqua Cannabis. Priorem Orobanchen dicit Galenus sicca frigida: que temperaturæ esse in primo ordine. Alteram Dioscorides tradit oleris modo æsitari crudam, & in patinis Asparagi modo decoctam: legumentis additam concoctionem eorum accelerare.

Lib. 8. sim.  
Vires &  
tempera.

## ORNITHOPODIUM, CAP. LVII.

Nomina



LANTAM istam Ornithopodium, id est auis pedem, Gallicè *Pied d'oiseau*, appellare voluerunt herbarij. Est enim veteribus Græcis & Latinis, quod sciam anonymos, nisi sit Polygalon Dioscoridis, de quo mox dicemus. Ornithopodium autem non sine ratione dicitur, nempe à similitudine pedum paruarum auiculæ, siliquæ vni pediculo nixæ, quaternæ aut quinæ, expansæ, mucronatæ, quasi stylis aduncis, articulatis, curuatæ referunt. Paruulis multis, tenuibus, ac gracilibus exit cauliculis per terram stratis, folia in his plurima, rotunda, parua, Lentis foliis minora & tenuiora: flosculi exigui, lutei, in paruis pediculis densè coaceruati: siliquæ parue, tenues, quales diximus, in quibus sena, septenarius minuta & rotunda semina, Napi aut Rapi seminibus similia. Nascitur in aruis inter segetes. Reperitur & in locis incultis, veluti in collibus, pratis siccis & apricis, ac secus vias.

Forma

ORNITHOPODIUM Dod.



Ornithopodium aliud ex Dalechampio, pictum damus, quod in aridis & sabulosis nascitur, radice multiplici huc illuc fusa,


ORNITHOPODIUM  
tuberosum Dalech.

tenui



PUSILLUM

*Ornithopodium Pena.*



tenuibus fibris capillata, crebris tuberculis nodosa duris, rotundis: cauliculis multis, humi ferè sparsis, aut paululū extantibus: foliis Vicæ, minoribus, in singulis ramulis ex aduerso dispositis numero imparibus: flore in summis ramulis ex albo rubescente: siliquis exilibus, curuis, ferè ternis, velut articulis quibusdam distinctis: minuto semine. Herniariam quidam vocant, quia omenti & intestini prolapsui mirè auxilietur sumpta & admota. Item experimentis constat totius plantæ decoctum ac puluerem renum calculos frangere ac eiicere. Aliud perpusillum & elegans Ornithopodium pictum monstrat Pena. Oritur in marginibus herbidis Grinuincij Regiæ ad Tamesin flumē, non procul Londino. Vix binos aut ternos superat pollices: ramulis in terram sparsis, exilioribus & crebrioribus, venustius ordine positus quam in superiore: non aliis natalibus gaudet.

GLAUX, CAP. LVIII.



UPERIORI similes præsertim foliis plantas aliquot adiungemus, primum eam quæ, si Dodonæo credimus, γλαύξ Græcis, & γλαξ, & γλαξ, Latinis similiter Glaux nominatur, Gallicè *Herbe au lait*, Germanicè *Milchkrant*. Cauliculos multos ex eadem radice mittit, teneros, dimidium pedem altos, in quibus vtrimque ordine digesta folia parua, longiuscula, minoribus Lentis foliis proxima, infernè candidiora quàm super-

Lib. I. c. 32.  
Nomina.  
Forma.

GLAUX

*Dodonæi.*



nè: inter quæ flores prodeunt, Violis similes, minores & purpurei. Radix gracilis & fibrata per terram serpit, Locis saluginosis & vliginosis maritimis prouenit, in tota Zelandia: quæ satis Glauci a Dioscoride descriptæ conueniunt. Glaux, inquit, Cytiso & Lenticulæ foliis similis, quæ supernè virent, auersaq; candidiora spectantur: ramuli à terra exiliunt quini, seniue, tenues ab radice, dodrantem alti: flores Leucoij, purpurei, minores tamen. Nascitur iuxta mare. Glaux antiquitus Galacton vocabatur, inquit Plinius, Cytiso & Lenticulæ foliis similis: auersa cādidiora. Rami in terrā serpunt, quini seniue, admodum tenues ab radice: flosculi purpurei exeunt. Inuenitur iuxta mare. Coquitur in sorbitione similaginis ad excitādam vbertatem lactis. Eam qui hauserint, balneis vti conuenit. Dioscorides eandem ei vim tribuit. Coquitur, inquit, cum Hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, adreuocandam

Li. 4. ca. 136.

Lib. 27. c. 9.

Vfus &  
Vires.



## GLAUX CLUSIA

Li. 6. simpl.



extincti lactis vbertatem. Idem & Gale-  
nus habet. Glaux herba & ipsa lactis ge-  
nerandi vim obtinere videtur. Quod si ita  
sit, calida quodammodo humidâque fue-  
rit temperamento. Glaucem aliam propo-  
suit Clusius qua nullam magis ad amulsum  
Dioscoridis descriptioni quadrare ait. Ter-  
nis aut quaternis à radice caudiculis asur-  
git, dodrantalibus, gracilibus, incanis: foliis  
ordine vtrinque digestis secundum costâ lon-  
gitudinē, lentis modo, mollioribus, superne  
virētibz, inferne cana lanugine obsitis, gu-  
stu nonnihil amaro: flos extremis caudiculis  
confertus, & capituli spicæ ue obtusæ & bre-  
uioris modo innascitur, G'ycirrhizæ vulga-  
ris forma & colore perquam similis, radice  
exili, candicâte. Nusquam alibi se vidisse ait  
quàm ad ripas Thormis fluminis, quod Sa-  
lamanticam alluit, paulo infra urbem nomi-  
ne carentem, menſe Iunio. Verùm is locus  
procul à mari distat, iuxta quod Dioscori-  
des nasci tradit.

## POLYGALON,

## CAP. LIX.

Nomina

Lib. 4. c. 137.

Forma



OMEN ab affectu sibi vendicauit πολύγαλον, siue πολύγαλα, quod  
potum, inquit Dioscorides, lactis abundantiam faciat. Frutex est  
paruus, palmi altitudine, folio Lentis, gustu subacerbus. Po-  
lygala Plinio palmi altitudinem petit, in caule summo foliis Len-

## POLYGALON Matthioli,

Astragaloides Lobellij.

## POLYGALA multorum:

quibusdam Onobrychis.



ticula



ticulæ, gustu adstricto, quæ pota lactis abundantiam facit. Polygalon Matthioli hic appinximus, quod tamen verum esse is non affirmat. Palmarem, inquit, altitudinem non excedit, folia Lenticulæ habet, & gustu est adstricto. Præterea Carzolarius scripsit experientia sibi compertum esse, eius usu lac copiosum in mulieribus prouenire. Lobellius esse vult Astragaloides Herbariorum, quam circa arcem dirutam oppidumq; *Trenon*, Lugdunensis Gallia in collibus sæpe legit. Quia vero ad Astragalon accederet, Astragaloidem cum Valerando rei herbariæ peritissimo nominauit. Cauliculis est palmum altis, aut pedalibus, foliis Ciceris, aut Galegæ, sed minoribus, in pediculis vtrinque ordine sitis. Flosculi sunt in pallido puniceo, aspectu venusti. Radix crassitudine digiti.

Polygalon verum multorum est Dodonæi in Histor. Stirpium Viciæ alterius secunda species, in Frument. Histor. Onobrychis, Lobellio, Caput Gallinaceum Belgarum. Caules profert à radice multos, cubitales, procumbentes, & per terram reptantes: folia Galegæ similia, tenuiora tamen subtus albicantia, ex pluribus angustis in acutum desinentibus coaceruata. Flores in longiusculis spicis rubent. Fructus echinati sunt, asperi, plani ac subrotundi. Diensibus Allobrogibus *Sparse* dicitur. Vbi pratorum copia non est, in asperis & lapidosis locis, paucula terra tectis, bidente tantum scalptis, iniecto fimo diligenter comminuto ea gens ferit, humoque ac insperso stercore operit. A satum imber si subsequitur, facilius comprehendit, & optime proficit, disiectis huc illuc, cauliculis sic vestiens solum, ut in squallidissimo solo latissimi prati speciem ostendat. Sequatur anno ter cum adoleuit & corroborata est, pecorique gratissimum est pabulum. Gaudet præcipue locis aridis, & sabulosis. Abundare lacte pecudes quæ illa viridi & sicca pascuntur, certissimum est.

Polygalam aliam ex Clusio hic pictam damus, nusquam alibi quam in Hispaniis ab eo repertam, & obseruatam. Est quidem illa fruticosa, binos palmos alta, multas ferens virgulas lentas, Sparti aut Iunci modo: folia singulis oblongis costis inhaerent, impari plerumque numero, quina, septena, aut plura,

Forma.

Locus.

Tempus.

Lib. 2. ca. 13.

POLYGALA Valentina.



POLYGALA repens.



Lenticu



*Tempus.* Lenticulæ similia, magis tamen carnosâ, & ad Rutæ colorem accedentia, gustu adstringente, & ingrato: flores Meliloto similes, colore luteo, coronæ in modum summis virgulis (quæ magna ex parte nudæ sunt, & maturo semine arescunt) insident: incurvæ, longæ & teretes succedunt siliquæ, ternis aut quaternis internodiis distinctæ, quæ semen continent durum, oblongum, nigrum, ingrati saporis: radix longa, dura, lenta, satis crassa. Perpetuò viret, floret Aprili, Maio & Iunio: semen Iulio maturum est. Apes ex eius flore mel plurimum colligere creduntur. Agro Salmaticensi frequens secus vias: inuenitur etiam in Granatensi, Murciano, & Valentino regno, locis arenosis, & collium decliuibus. Salmaticenses *Coronilla de Rey* vulgo appellant, quasi Sertulam Regiam, & istic Officinæ Meliloti vice vtiuntur, Granatenses & Murciani *Lenteiucla*, id est Lenticulam, Valentini Poligalam. Ad Ornithopodium Dodonæi accedere videtur.

Apud nonnullos Herbarios etiam Polygalæ nomen adepta est, plantula hæc multis densissimisq; ramulis palmum longis, reptantibus foliolis Herniariæ per intervalla distinctis, è quibus florum, veluti candicantes globuli verticillatim oriuntur. In scrobibus sabulosis, fossarum & agrorum marginibus, Antuerpiæ & Gandauo conterminis luxuriat.

## ONOBRYCHIS, CAP. LX.

*Nomina  
Genera.*

**O**NOBRYCHIS ab Asini ruditu nomen adepta, Latinis similiter Onobrychis dicitur. Eius genera aliquot florum colore distincta. Prima Dodonæi herbula est tenera, palmum vnum, aut duos alta, caulibus gracilibus & teneris, in quibus foliola viridia, ferè Lentis: flores secus cauliculos, & in summo exeunt, cærulei, Violæ purpureæ quadamtenus similes, sed inodori, tintinabuli quinquanguli ferè figura, è cuius medio

## ONOBRYCHIS

*Prima Dodonæi.*

*Forma.*

*Locus,  
Lib. 3. c. 152.*

*Li. 24. c. 16.*



pistillum exeritur, in summo tripartitum. Flores Oriente sole panduntur, Occidente occluduntur. Onobrychis secunda Dodonæi Polygala esse. Cauliculos profert graciles, lentos, lignosos, palmum vnum longos, humi repentibus: folia parua, angusta, Lentis foliis similia: flores in summis cauliculis fumariæ floribus haud absimiles figura & magnitudine, aliquando rubentes, aliquando niuei candoris: folliculos paruulos, vtraque parte foliolis, veluti alis paruis contextos. Radix tenuis est & lignosa. Prima in fecundis agris inter Triticum prouenit. Secunda in aridis montibus, & secus vias. Maio mense floret: Illa Iunio & Iulio. Onobrychis tertia, purpurea, radice est parua, candida, inutiles: caulibus multis, pedalibus, rectis, non vt in aliis Onobrychidis generibus, per humum repentibus: foliis Lentis, per caules nullo ordine dispositis: flore puniceo, in summis caulibus denso & copioso: semine minutulo, in folliculis, seu Vesicis angulosis. In Siccaneis montium pratis profilit. Hanc esse Dioscoridis Onobrychida declarat ipsius Historia. Onobrychis, inquit, folia habet Lentis, longiora paulo, caulem dodrantalem: florem puniceum, radicem paruam. Nascitur in viginosis & incultis. Quibus subscripsit Plinius his verbis. Onobrychis folia habet Lentis, longiora paulo: florem rubentem: radicem exigua & gracilem. Nascitur



ONOBRYCHIS

Secunda.



ONOBRYCHIS TERTIA,

purpurea Dalechampij.



ONOBRYCHIS IIII.

Lutea Dalechampij.



Nascitur circa fontes. Onobrychis quarta, lutea, in niuosis Iuræ montis cacuminibus profilit, radice crassa, lignosa breui, candicante: cauliculis perquam multis, pedalibus: folio Lini, angustiore, longiore, inæquali posito è cauliculis prodeunte: flore luteo, copioso, paruo, in summis cauliculis nitente. Herba rara, & vix alibi visa. Onobrychis Galeno auctore, rarefaciendi digerendique vim obtinet. Quare folia eius etiánum virentis, illita ad morem cataplasmatís, tubercula discutunt: arefacta verò si cum vino bibantur, strangurias sanant. Quinetiam sudores elicit cum oleo inuncta. Herba suapte vi si trita illinatur, Dioscoridi, tubercula dissipat, cum vino pota strangurias sanat: illita ex oleo sudores mouet: at Plinio, siccata in farinæ modum, & inspersa vino albo, strangurias finit. Aluum sistit. Succus perunctis cum oleo sudores mouet.

Li. 8. simpl.  
Vires &  
Temper.

Lib. 3. c. 152.

Li. 24. c. 16.

ANTHY



Forma.



Nomina

**A**nthyllidis genus radicem edit nigram, lignosam, fibratam, dimidium pedem longam, superne in multa veluti caulium principia diffusam, crassiuscula, laminulis corticosa, ex quibus folia multa exeunt, humi strata, longa, ex foliolis composita, lenticulatis, utrinque ordine ex aduerso digestis. Flores in cacumine nudarum virgularum emicant, oblongi, lutei: deinde liquor lenticulatus, niger, ex quarum vertice tenuis villus oritur, capitulo clauiculæ ue similis. In macris et salinis apricis gignitur.

## SOLEA EQUINA CAP. XVII.

**S**olea Equina, huc Ferru Equinum nominatur, ab Italis Perro di Cavallo, à quibusdam Sfera C-

uallo ab effectu, quod equi, qui diu plantam hanc virentem calcauerint, ferreis soleis exuantur. Chymici inter Lunaria genera recensent. Securidacam montanam Marthiolus appellat, quod non parum videatur habere cognationem cum minore Securidaca, tu figura, tum viribus. Radix eius est longiuscula, candida,

In l. r. Dioscor. ca. 135.

## SOLEA EQUINA

Dalechampi.



Tinctura

## SOLEA EQUINA

Securidaca montana Mart.



modice



modicè fibrata: cauliculi in orbem multi, tenues, humi procumbētes, sūrculosi: folia Lentis: flos Genistæ luteus: semen Lunæ crescentis instar excavatum in siliquis, non continuo tractu porrectis, & æqualibus, vt in reliquis siliquatis, sed flexuosis crenis per ambitum lunatis, & intercisis, Solearum equi figuram huic Legumini peculiarem propemodum referentibus: quam ob causam quidam Lunariam siliquatam vocant. In saxosis & macris locis Monspeliensis agri crescit. Floret Maio mense. Tota amara est, & Hedyfaro natura as similis. Quod calcatu Soleas equorum frangat, fabulosum esse Pena asserit, seq; sapius eius rei frustra periculum fecisse. Huic aliam idem subiungit, non minus venustam, aut raram in Narbonensium segetibus nascentem, quam Scorpoidem Leguminosam vocat. Radice nititur fibrata: cauliculos rectos, graciles, binos aut ternos, pedales & sesquipalmares erigit, in quorum fastigio admodum incuruis mu-

Forma.

Locus.

Vires.

SCORPIOIDES

Leguminosa.



STELLA Leguminosa

Lobellij.



cronibus adunca cornicula, Fœnogræco rotundiora, graciliora insunt, quæ in-  
trorsum flexas Scorpionum caudas transuersis articulis, ac pulchris aspectu,  
lineis virgata, imitatur. Flosculi lutei, pusilli. Folia Ornithopodij, au Tribuli exi-  
liora, ab imo statim cespite in neruulis vtrinque sita. Securidacæ esse credunt  
genus. Huic ob similitudinem iungenda. Stella Leguminosa, quam Arturo Cor-  
tusio rarissimam plantam debemus: foliis exit Leguminosæ Scorpoidis, flo-  
sculis Lampsanæ. Semen exile, pullum in corniculis tantulum falcatis, ex vno  
pediculo aptis, & radiatim congestis, Stellam exprimentibus, gustu Legumi-  
noso & glutinoso. Ad amatoria summis laudibus celebratur.

LINVM, CAP. LXIII.

**N**ON vt Græcis, ita etiam Latinis, & Officinis Linum dicitur, Nomina  
Arabibus Bazari chichen, siue Bezerchetan, Italis Lino, Germanis Lein, Genera.  
& Flachis, Hispanis Lino, Gallis Lin. Lini genera duo facit Matthio-  
lus, Linum satium, & Linum sylvestre. Linum satium tenuibus, In ca. 95. li.  
ac rotundis cuius, seu virgis assurgit. Folia oblonga, angusta, acuminata: flores 2. Dioscor.  
Forma.

T



## LINUM.

In cap. 96.  
li. 2. Diosc.



LINUM Sylvestre  
primum.



LINUM Sylvestre  
secundum, flore albo.



Frontignanum itur, in agrorum siccis marginibus, & cautibus nonnunquam obuium, teretibus, nitidis, dodrantalibus virgultis. Flores albi, quam in luteo Lino maritimo maiores. Foliola Scopariæ, longe angustiora, exilitate Asparagi aut Fœniculi caules ambiunt.

Huic

in summis virgis diuisis in breues & paruulos ramulos, venusti, colore cærulei, quibus parua & orbiculata lara capitula succedunt, in quibus semen oblongum, læue, glabrū, splendens, ex fuluo colore puniceum, quod λινὸν σπέρμα, & composita voce λινόσπερμα, & λινόσπερμον vocant. Radix est exilis.

Linum sylvestre vocatur planta secundo loco hîc depicta, non solum quod Linum facie referat, sed quod Lini modo in stamina duci possit.

Hanc Pena Linum marinum vocat, inter prata & littora herbida Narbonensis maris, ac inter stagnum & mare frutica, pedalibus & sesquipedalibus ramulis, rectis, numerosis gracilioribus, lentis, cortice ad nendum comodo, in quibus pauciora quàm in Lino folia: flores non dissimiles, sed aurei, siue lutei, minores, Iunio & Iulio emergentes, semen & Pericarpia multo minora. Hoc reliquæ Gallia, Germaniæ, Angliæ ignotum est. Est & Linum sylvestre floribus albis, via qua Monspelio



Huic quadrare videtur Lini sylvestris tertij apud Clusium Historia. Aliud Linum sylvestre est tenuifolium, dense fruticās, satiuo simile, nisi totum gracilius multo esset. Flosculi quinis foliolis cæruleis, fugacibus caducis constant, satiuo pares copiosis pedalis & cubitalibus virgultis, exilioribûsque Lini, aut Linariæ purpureæ foliolis, è longiuscula radice. Est eiusdem generis Latifolium, foliis Hirsutis Tithymali Helioscopij paribus.

Chamelinum, siue sylvestre Linum perpusillum vix palmum æquat, foliolis pusillis, flosculis ex luteo pallentibus, cauliculis Lini, cæterisque omnibus quadruplo minoribus. In glareosis Gallobelgii, & Louanienfibus pomæriis oritur.

L I N U M Sylvestre  
Tertium, marinum.



C H A M A E L I N U M,  
siue Linum perpusillum.



Pingui lætoq; solo, locis humidioribus, non sitientibus Linū scilicet prouenit. Lini semen, inquit Columella, nisi magnus est eius in ea regione quā colis prouentus, & pretium proritat, serendū non est: Agris enim præcipue noxium est. Itaque pinguisimum locum, & modicè humidum poscit. Palludius Lini semen pro malitia sui serendū non esse scribit, quoniā terræ vber exhaurit. Sed si velimus, loco pinguisimo, & modicè humido serendum. Plinio feri debet in sabulosis maximè, vnoque sulco. Eo nihil magis festinat: vrit agrum, deteriorè que etiam terrā facit, quod & Vergilius testatur. *Vrit enim campum Lini seges, vrit Avena.* Seritur vèrè, Maio & Iunio mensibus floret. Post messem Triticeam, virgæ Lini merguntur in aquam solibus tepcfactam, pondere aliquo depressæ. Satis maceratas indicio est membrana laxior. Iterumq; vt prius sole siccantur: mox arefactæ in saxo tunduntur stupario malleo. Lino in cibis vtebantur veteres Galeno teste, qui sic scribit. Nonnulli friso quidem Lini semine vt obsonio, cum garo, non secus ac factitio sale vtuntur. Vtuntur autem & melli permiscen- tes: quidam panibus quoque ipsum aspergunt. Stomacho autem noxium est, & coctu difficile, exiguumque alimentum corpori exhibet. Quod verò ad ventris deiectionem attinet, ipsum nec probaueris, nec vituperaris: exiguum tamen vri- næ mouendæ habet facultatem, quæ magis apparet, cum frixum sumitur. Tunc

Locus.

Lib. 2. c. 10.

Lib. 11. ca. 1.

Tempus.

Li. 19. ca. 1.

Usus &

Vires.

Li. 1. Alim.



Li. 7. simpl. alium quoque magis sistit. Rustici autem homines eo vtuntur sæpenumero, frixo tusq; mel admiscentes. Idem alibi. Lini semen flatuosum est, etiamsi frigatur, & multa sanè recrementitia humiditate plenum. Est verò etiam in primo ordine quodammodo calidum, ac humiditatis & siccitatis, velut in medio situm. Sed nunc nullus eius in cibis vsus est, in medicamentis frequens. Lini semen Diofcoridi easdem quas Fœnumgræcum vires habet. Discutit, & emollit omnem intus forisq; inflammationem cum melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut melle cocto exceptum. Vitia cutis in facie varisq; crudum tollit: illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas, duritiâsque discutit: vlcerâ quæ serpunt, fauorq; cum vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis: vitia pectoris extrahit, si ex melle in eclegmatis vicem substituatur: tusim lenit, venerem stimulat, si farina Piperis & melle exceptum pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum, vuluâq; erosionibus immititur, alui excrementa euocat, ad vuluâ inflammationes in defensionibus perquam vtile. Lini semen inquit Plinius, cum aliis in vsu est, & per se mulierum cutis vitia emendat in facie. Oculorum aciem succo adiuuat. Epiphoras cum thure & aqua, aut cum myrrha ac vino sedat: parotidas cum melle, aut adipe, aut cera: stomachi exsolutiones, vel dissolutiones, inspersum potentia modo: anginas in aqua & oleo decoctum, & cum aniso illitum. Torretur vt aluum sistat. Cœliacis ac dysentericis imponitur ex aceto. Ad iocinoris dolores estur cum vua passa. At phthisin vtilissimè ex semine sunt ecligmata. Musculorum, neruorum, articulorum, ceruicis duritias, cerebri membranas mitigat farina feminis, nitro aut sale, aut cinere additis. Eadem cum fico item concoquit & maturat: cum radice verò Cucumeris sylvestris extrahit quæcumque corpori inhærent. Sic & fracta ossa. Serpere vlcus in vino decocta prohibet, eruptiones pituitæ cum melle: emendat vngues scabros cum pari modo nasturtij: & testium vitia & ramices cum resina, & myrrha, & gangranas ex aqua. Stomachi dolores cum Fœnogræco sextariis vtriusque decoctis in aqua mulsâ. Intestinorum & thoracis perniciofa vitia, clystere in oleo & melle. Hactenus Plinius. Exprimitur è Lini semine oleum multiplicis vsus: neque enim à pictoribus tantum & statuariis, aliisq; artificibus expetitur, nec ad lucernas solum vtile est, sed & ad medicos vsus frequenter vsurpatur. Neruorum conuulsionibus perutile est: duritias omnes mollit, neruorum tensiones contractionesque laxat: dolores illitum sedat. Omnibus sedis affectibus commodum est, hæmorrhoidibus, condylomatibus rimis, ac doloribus, sceminarum induratos locos mollit. Nymphææ aut Rosæfarum stillatitia aqua ablutum, ambustis auxiliatur. Sunt & qui bibendo maximo successu iis exhibeant, qui lateris dolore vexantur, sed recens sit oportere: nam inueteratum contracto rancore non modò excalfacit plusquam pat sit, sed etiam nauseam mouet. Linum sylvestre cum floribus decoctum & illitum, tumores resoluit, & inflammationes lenit: præterea induratos articulos mollit, panosque in inguinibus sanat.

Marth. ibi.

#### CANNABIS, CAP. LXIIII.

Nomina

Genera

Forma

**C**ANNABIS Græcis, & ῥέρον, & ῥονερρόρον, Cannabis Latinis, Arabibus Schehedene, & Canab, Italis Canape, Germanis Zamer Hanff, Belgis Kemp, Anglis Himp, & Hemp, Hispanis Cannamo, Gallis Chanvre, & Cheneue dicitur. Cannabis Diofcoridi duum est generum. Est enim Cannabis sativa, & sylvestris. Sativa item duplex, mas, & fœmina. Cannabis sativa mas caules edit rotundos, rectos, inanes, quinque aut sex pedes altos, ramosos, ita vt aliquando arbusculæ speciem referat, in quorum fastigiis folliculi parui



CANNABIS Mas.



parui, rotundi oriuntur, nullo precedente flore conspicuo, in quibus semen rotundum, duriusculum, medulla refertum candida. Folia dura sunt, aspera, subnigra, & si confringuntur graueolentia, ex sex, septemue, aut pluribus aliis simul coherentibus coaceruata, quorum singula angusta sunt, oblonga, acuminata, & per oras serrata. Radix fibras multas habet. Hanc descripsit Dioscorides foliis Fraxini, graui odore, caulibus proceris & inanibus, semine rotundo. Cannabis satiuæ fœmina superiori similis est, sed foliis minoribus, & tenuioribus, caule graciliore, simpliciore, sine ramulis adnatis, sine fructu & semine, flores tantum proferens paruos, albos, sed inutiles & vanescentes. Cannabim syluestrem hanc agnoscit Dalechampius. Radicem illa habet multis fibris capillatâ, caules multos, cubito proceriores, geniculatos, furculosos: folia satiuæ, tactu aspera, quæ ad singula genicula caulis & furculorum bina æqualibus interuallis exeunt: florem puniceum ex hirsutis vaginis prodeuntem, caulem Prasij modo verticillatim amplectentem. Hanc sic Dioscorides delineat. Syluestris Cannabis virgas fert Althææ similes, mi-

Li. 2. c. 148.

Ibidem.

CANNABIS Fœmina.



CANNABIS Syluestris Dalechampi.



niores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio satiuæ, nigriore, & asperiore: flore Lychnidis, subrubro: semine & radice Althææ. Cannabis in syluis primum nata est, inquit Plinius, nigriore folio & asperiore. Sunt qui syluestrem Cannabim Alceam Officinarum, siue Herbam Hungaricam

Li. 10. c. 23.



esse cõtendant. Aliam Cannabim syluestrem pictam ostendit Lobellius, & eam scribit esse Alceam maiorem Mutoni, flore Lychnidis, subrubro, semine & radice Althææ, sed Althæa fruticosiorem, de qua nos agemus in Horto, capite

*Locus.* de Alcea. Satiua mas & fœmina in agris feruntur, & (quod mirum videri debet) tam fœcunda quàm sterilis ex eodem prouenit semine. Syluestris in pinguibus

*Lib. 2. c. 10.* & vmbrosis gignitur. Cannabis, teste Columella solum pingue stercoratumque & riguum, vel planum, humidum, & altè subactum deposcit. Seritur Cannabis

*Tempus.* vere passim. Fœmina matura Iulio vellitur. Maris semen fine Augusti, vel

*Lib. 20. c. 9.* Septembri mense, maturum legitur. Vtilissima, inquit Plinius, funibus Cannabis feritur à Fauonio. Quo densior est, eo tenerior. Semen eius cum est maturum, ab æquinoctio Autumni distringitur, & sole, aut vento, aut fumo siccatur. Ipsa Cannabis vellitur post vindemiam, ac lucubrationibus decorticata purgatur.

*Li. 1. Alim.* Cannabis semen olim in cibo homini fuit, quod Galenus docet his verbis. Non, quemadmodum planta ipsa Cannabis Vitici quodammodo est similis, ita semen

*Vsus & Vires.* femini facultate est simile, sed plurimum ab eo dissidet, vt quod concoctu sit difficile, stomachoq; ac capiti noceat, prauiq; sit succi. Sunt tamen qui eo quoq; frixo cum aliis tragematibus vescuntur. Tragemata autem voco ea quæ post cœnam voluptatis inter bibendum excitandæ gratia manduntur. Multum autem calfacit, ideoq; sumptum paulò largius caput ferit, vaporem sursum ad ipsum mittens calidum simul ac medicamentosum. Nunc ab hoc cibo omnes abstinent. Sed aliis iisque magnis hominum vñibus Cannabis peridonea est. Hæc etenim & Linum tunduntur in lanæ mollitiem ad linteorū texturas, & funes intorquendos. Vtraque enim decorticata purgatur, sed prius ex passa. Deinde in pensa cogitur, quæ particulatim tracta digeritur in glomos, quibus telas plurimum generi humano commodas ordiuntur, ac texunt. Semen auctore Dioscoride latiore cibo genituram extinguit. Succus ex ea recente conuenienter aurium doloribus instillatur. Syluestris Cannabis decocta radix illitu inflamationes mulcet, tumores discutit, tophos articulorum dissipat. Huius cortex torquendis funibus accommodatur. Cannabis semen Galeno status extinguit, adeoq; dissipat, vt si plusculum edatur, genituram exsiccat. Sunt qui viridem succum exprimentes, ad aurium dolores ab obstructione, opinor, natos illo vtantur. Semen Cannabis Plinio extinguere genituram virorum dicitur. Succus ex eo vermiculos aurium, & quodcumque animal intrauerit, eiicit, sed cum dolore capitis. Tantaq; vis ei est, vt aquæ infusa coagulare eam dicatur, & ideo iumentorum aluo succurrit pota in aqua. Radix contractos articulos emollit in aqua cocta: itè podagras, & similes impetus. Ambustis cruda illinitur, sed sapius mutatur priusquam arefcat. Cannabis semen cõtrarium in gallinis efficere ac in nobis tradit Matthiolus, siquidem gallinas ouorum feraciores reddit, experientiaq; sese cõperisse ait gallinas quæ hyeme sæuiente, quo tempore oua rarius pariunt, Cannabis semine vescantur, oua frequentius multo ponere. Cannabis recentis decoctum expressa validè herba, terrestriū lumbricorū cauernulis inspersum, statim eos euocare idem affirmat, quod Piscatoribus acceptum referendū est, qui hac arte vermiculos capiunt suis hamis affigendos, vt rectè scripserit Plinius succū eius vermiculos ex auribus eiicere. Ex his etiam colligi potest eius vires ad interaneorū vermes haud imbecilles fore. Equorum etiam sedi hærentes tænias, succus aut decoctū eiicit. Quod vero Plinius dixit Cannabim iumentorū aluo succurrere, id de soluta intelligendū. Sunt etiā qui foliorū puluerem dysentericis propinent. Quod postremo de radice dixit ambustis sapius admouenda, & amouenda, commodius præstabitur, si recens in mortario tundatur cū recente butyro, & subinde applicetur. Non est silentio prætereundum quod Symeon Sethi



Sethi prodidit, semen Cannabis comestum idem nocumentum quod Coriandrum afferre: immodicè enim si estur, vt illud delirium facere: folia verò arida in potu sumpta farinæ modo, aut potius ad eam potionem illorum exsiccatum farinam ebrietatem quandam hospitalem & innoxiam facere quæ ab hauriente non sentiatur. Apud Arabas pinfitur subigiturque pro vino, & inebriat. Desiccatur verò semen genitale, vt caphura. Rustici Belgæ seminis contusi medullam liquore aliquo expressam ictero laborantibus initio ipsius mali exhibent, & sæpe non sine successu, si quando ex sola obstructione, & citra febrem exoritur. Aperit enim fellis meatum, & bilis per corpus digestionem promouet. Empirici quidam afferunt sanguinem ex quacumque parte corporis fluentem sisti, si qui exit sanguis cum foliis Cannabis minutim concisis, frigatur, & ægro pro cibo detur.

In hist. fru.

ISATIS,

CAP. LXV.

**I**ΣΑΤΙΣ Græcis, Latinis Isatis etiam dicitur, Gallis auctore in Commentariis Cæsare Glastum, nunc Guadum, Guède, & Pastel, Arabibus Dili, Dileg, Vesme, Chate, Chatis, Alchat, Adlen, aut Adhlen, & Nil, Italis Guado, Germanis Uneydt, Anglis Vuode & Vuade, & Belgis Vuetdt & Vuoid, & Vuoid, Hispanis Pastel. Duo eius genera. Isatis hyemalis, Glastum satium, isatis ægæa, Glastum sylvestre. Hæc duo genera Plinius tertium & quartum Lactuæ genus facit. Tertium, inquit, genus est in syluis nascens, Isatin vocant. Huius folia trita cum polenta, vulneribus profunt. Quarto infectores lanarum vtuntur, quod Glastum vocant simile erat Lapathum sylvestri foliis, nisi quod plura habet & nigriora. Glastum satium, inquit Dioscorides, folium habet Plantagini simile, verum pinguius nigriusque. Eius caulis duorum cubitorum altitudinem excedit. Sylvestre Glastum satiuo simile est. Vtrūque glastum id est sine vlla controuersia, quod hîc proponitur, omnibus notissimum, quo

Nomina

Genera.

Lib. 20. c. 7.

Forma.

Lib. 2. c. 80.

ISATIS satium.

ISATIS sylvest. Matth.



T 4



etiam hodie, vt olim, infectores lanarum vtuntur. Satiuum foliis est primum longis, latis, in viridi nigricantibus, per terram sparsis, foliis Plantagini haud ab similibus, sed nigrioribus, & magis carnosius, è quorum medio caulis exurgit bicubitalis, foliis obductus minoribus, & magis acuminatis, qui ad verticem in multos ramulos finditur, flosculis exiguis, & luteis onustos, deinde, siliquis longiusculis, latiusculisque paruarum linguarum effigiem referentibus, initio viridibus, deinde nigricantibus, in quibus semen includitur: radix est simplex, candida, parum fibrata. Huic proxima est sylvestris foliis, caule, figura: sed

### ISATIS SYLVESTRIS

Lobelij: *Vaccaria pallida*.

Locus.

Tempus.  
vſus



caule teneriore, minore, nigriore, & angustioribus siliquis. Alia est Isatis à Lobellio depicta, quam Vaccariā dicunt Narbonenses, & Ocimoides. Folia hæc profert, angustiora quàm superior Isatis sylvestris, Ocimastro, siue Polenio Dodonæi similia, rariora caule cubitali, in alas diuiso, & ornato floribus exiguis, pallidis, Ocimastro, siue Pseudomelanthio similibus, ex alabastris paruis, albidis, & pallentibus, nec semine dispari. Seritur Glaſtum in latis & pinguibus agris, copiosissimum in Gallia Narbonensi, & in Italia, vt in Vmbria, circa Noceram, vbi oppidum est Guadam ideo appellatum, quod ibi Isatis copiosissima feratur sicut, & in Germaniæ agro Erphordiano. Ea permagnum quæstum iis regionibus adfert. Sylvestre Glaſtum locis incultis & pinguibus prouenit. Maio & Iunio mensibus ambo florent. Vt olim, ita & nunc Glaſto satiui infectores lanarum vtuntur. In Neustria quoque Galliæ, & apud eius provincie Bellocasios Glaſtum seritur, & colitur, dilutius quidem in pannistingedis quàm quod prouenit apud Tectosages, vulgo, (*en loregois*,) indigenis tamen valde fructuosum, & vile. Quo anno primum terræ mandatur, præsertim si tempestiuus sequatur imber, quater excinditur, sarculo duobus sub terra digitis adactò, quo tempore foliis nascitur Plantagini similibus, partim supra terram nonnihil extantibus, partim humi procumbentibus. Excisa folia & in acervos congesta post biduum aut triduum, in rotundo pavimento, quadratis strato lapidibus, dentatæ molæ lignæ subduntur, quam oculis panno tectis versat equus: Sequitur equum circumeuntem villicas, qui palam herbam à mola dissectam in lapides referat, & conuerſat, vt à prætereunte denovo mola frangatur. Vbi satis obtritum Glaſtum videtur, rustici manibus comprimentes, sanies succosa vt eliciatur, quæ principio nigra atramenti ferè modo in cœruleum post colorem abit, globos ex herba tusa conficiunt, quantum capere & amplecti vtrique manu possunt, & eos partim in solatu, si cœlum sudum est, siccant, prope molam, & arcam vicinam, partim si pluit, aut obstat tempestas humidior, in perticis sub tecto ædibus rusticorum affixis, & ad Oriëntem vel Septentrionem versis, ordine dispositos, quos duratos & exiccatos cōdunt saccis, & ad vsum eius tincturæ seruant, quæ nigro colore pannos inficit. Anno deinde proximo triticum eidem agro mandatur, qui Glaſtum aluit: non enim Glaſti prouentu is emaciatur, sed lætificatur potius: & ex radicibus, quas firmas & altius



& alius impactas aratri culter nequit proscindere, ac extirpare, cū segete pululant Glasti caules, qui in alteram sationem semen præbent, maioris quàm triticum pretij, quo manso vel aliàs trito, & salua vel alio liquore madido, apparet statim color è cæruleo purpurascens quo indigenæ manicarū corium nondum sordidum tingunt. Est enim illis vt & olim Britannis, gratissimus eius coloris aspectus. Cæruleam spumam innatantem, quam igni feruescentes eructant cortinæ, Indum nostri vocant infectores, & ad pictorum vsus siccant. Simile, inquit Plin. Glastum in Gallia vocatur, quo Britannorum coniuges nurusque toto corpore oblitæ, quibusdam in sacris & nudæ incedebant, Æthiopum colorem imitantes. Omnes verò, Cæsar inquit, se Britanni Glasto inficiunt, quod cæruleum efficit colorem, atque hoc horribiliore sunt in pugna aspectu. Illita folia Ifatidis, teste Dioscoride, tumores omnes discutiunt, cruenta vulnera glutinât, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, phagedænas, putrescentia vlcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre Glastum eadem præstat: potu & illitu lienosis auxiliatur. Glastum inquit Plinius sanguinem sistit: phagedænas, & putrescentia vlcera quæ serpunt sanat: item tumores ante suppurationem. Contra ignem sacrum radice vel foliis prodest, vel ad lienes potu. Ifatis sativa Galeno, qua vtuntur tinctorum, facultatis est valenter exsiccantis, nondum tamen mordentis. Est enim simul amara atque adstringens Proinde magna vulnera corporum durorum glutinat, etiam si in capitibus musculorum fuerint: vel sanguinis profluvio laborantibus partibus vtiliter illinitur: tumores œdematodes mirificè digerit, simul ac reprimat, & aduersus omnia vlcera maligna, & cacoethe mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si exedantur ac erodantur. At si non unquā pro agri natura valentior appareat, foliis eius tritis miscere oportet, aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticum, aut polentam, pro vincente nimirū in vnoquoque effectu. Valentiùs enim quàm sativa siccatur, Valentiùsque humidis etiam

Li. 22. ca. 1.

Li. 5. Bel. 3.

Li. 2. c. 180.

Vires &

Temper.

Lib. 20. c. 7.

Lib. 6. sim.

HERBA  
Lutea.



putredinibus resistit, ad cætera iam dicta deterior, quoniā moderatius & minus mordaciter siccatur. Vlceram namque talia irritatur his remediis, & phlegmone inflāmatur. Cæterum ob potentiorē facultatē lienosis quoque utilis fuerit, cum altera imbecillior tantum prodesse nō possit.

HERBA LVTEA, CAP. LXVI.



ERBA Lutea & Luteola ab effectu nūcupata, foliis est prælongis, pinguibus, & arctis: cubitali caule, interdum altiore, toroso: flore luteo, frequentibus in cacumine folliculis, decussatis, asperis, sed tā denso stipatu fastigij, vt ij quamdam spicarum imaginem monstrent, iis semen includitur: radice nititur longa, singulari, crassa. Multis locis quauis sponte nascatur, magno tamen compendio serūt in agris, & nisi fortuna domino decoquat, magnum rusticus ex ea sentit prouentum, quoniam eruta solo radicitus, in fascies magnos cogitur, vsurpaturque ad infectus. Siccata in luteum colorem pallescit, aut certè languet in pallidū. Cortinis infectoriis indita, luteo quoque colore pannos tingit, cuius apud nos maximus increbuit vsus. Præterea infectores colori cæruleo, quem Glastum excitauit, superinducunt, & viridem efficiunt colorem.

Nomen.

Forma.

Locus.

Vsus.

MEDI



Nomina

Li. 18. c. 16.

Genera

Forma.



ΜΑΙΚΗ Græcis, similiter Medica Latinis dicitur, Arabibus *Cot*, & *Alfasat*, Hispanis *Alfalfa*, & *Alfafa*, & *Eruaye*, nomine ab Arabibus mutuo, Gallis *Saintfoin*, & *Foin de Bourgogne*. Medica natales suos ipso nomine fatetur, locumque vnde venerit, vocabulum indicat. Externa olim Græciæ, inquit Plinius, à Medis est aduecta, per bella Persarum, quæ Darius intulit. Hinc gentile nomen retinuit. Medica duplex est, sati-

MEDICA *satiua* Dodo.

Li. 2. c. 141.



Emb. 133. li. 2. Diosco.

## MEDICA SYLVEST.

prior, fructu triplici,  
& diuerso.

Li. 18. ca. 16.



ua, & sylvestris. Satiua multos edit cauliculos, teneros, rotundos, in altum non assurgentes, sed per humum sparsos, ut in Trifolio vulgari: folia trifolio eidem similia: flores parui, purpurei, siliquæ compressæ, instar testæ cochlearum intortæ, in quibus semen. Hæc est Dioscoridis Medica, quæ, ut describit, cum receter prodit, foliis & caule, Trifolio pratensi similis est, augescens verò folia contrahit, & caules edit Trifolij ac siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen Lentis magnitudine dependet. Græca verò ita habent, ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα προσπέφυκε φακὲ τὸ μέγεθος, ἐπε-τραμμένον ὡς κεράτιον. Id est, in quibus semine nascitur Lentis magnitudine, corniculi modo intortum. Cornarius κεράτιον hic siliquam paruum significare dicit, & siliquæ modo intortum vertit, suspicaturque hoc loco Dioscoridis lectionem corruptam esse in seminis & siliquæ descriptione. Sed multo verisimilius est Dioscoridæ hic ut sæpe alibi τοῦ σπέρματος nomine abusum fuisse, ut semen pro seminis conceptaculo, siue siliqua usurpauerit quam corniculi modo intortam esse, ipsius rei inspectio aperte demonstrat. Plinius Dioscoridi de caule ac foliis consentit, semen omittit. Similis est Trifolio, inquit caule, foliisque geniculata. Ea cum in caulem assurgit, sic enim legendum, folia contrahuntur, id est ut ait Dioscorides, angustiora fiunt. Est & huius Medicæ e floribus colore differentia: caruleo violaceo, & luteo. Medicam folliculo spinoso, Trifolium cochleatum vocant. Galli *L'herbe aux limassons*, Præter has Lunaria sylvestris altera est, Lunato folliculo ab aliis diuersa, quam ideo Lunatam seu falcatam vocant. Medica sylvestris caule & foliis Trifolio pratensi similis est, foliis in ambitu serratis: flore sub-luteo, claviculis exilibus: seminis conceptaculo triplicis differentia. Aut enim Latius est, & cochlearum more flexuose intortum, aut oblongum, angustum, compressum, & turbinum terrestrium modo, qui cochlearum generi



**MEDICA SYLVEST.**

*altera Luneta.*



generibus adscribuntur, obliquis voluminibus sinuosum, ac tuberculis inæqualibus velut nodosum: aut iisdem volutis tortile, sed veluti festucaceis, superioréque longè crassius & amplius, & in summo obtusius, insigni varietate. Medica sativa in usu plurimo est quibusdam Romanæ provinciæ gentibus, præsertim Sæteriensibus, qui rigua prata eius semine conferunt, ter secantes, restibili & in exhausta fertilitate. *Lucerne*, ij vocant, & *Lucert.* Medica sylvestris passim in agro Monspelienfi & Turnonio gignitur in cultis, & sepibus. In Hispaniæ plerisque locis, præsertim in Regno Valentino, ubi feritur quoque diligenter: ea iumenta saginant. Tanta dos eius est, inquit Plinius, ut vno satum amplius quam tricenis annis duret. Medica semel sata, auctore Palladio, decem annis permanet, ita ut quater, vel sexies possit per annum recidi. Agrum stercoreat, maiora animalia reficit, curat ægrota. Ad maciem mularum, ut Columella prodidit, nulla res tantum, quantum Medica prodest. Ea herba viridis, nec tardè tamè arida

*Locus.*

Li. 18. ca. 16.  
Lib. 5. ca. 10.

*Vsus.*

Lib. 7. c. 38.

Fœni vice saginat iumenta. Verùm modicè danda, ne nimia sagina stranguletur pecus. Semen Medicæ, ut tradit Dioscorides, siccatum iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Viride quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro Gramine utuntur qui pecora alunt.

Li. 2. ca. 141.

**TRIFOLIUM, CAP. LXVIII.**

**T**ΡΙΦΥΛΛΟΝ Græci vocant, quod Latini Trifolium, Galli *Trefle*, Nomina Itali *Trifoglio*, Germani *Vuyfenkle*, Hispani *Treuol*, Anglis *Clauer*. Trifolij non recentiores modò, sed & veteres multa fecerunt genera. *Genera.* Dioscorides enim & si proprio capite Trifolium Asphaltites tantum descripserit, tamen Trifolij alterius, nimirum pratensis aliquoties meminit, cum ait Medicam caule & foliis Trifolio pratensi proximam esse. Plinius tria Trifolij genera memorat. Folio coronat & Trifolium, inquit, Tria eius genera. Menianthes vocant Græci, alij Asphaltion, maiore folio, quo non utuntur coronarij, nimirum propter grauem & fœtidum odorem: alterum acuto, Oxytriphyllum cognominatum. Tertium ex omnibus minutissimum. Recentiores multo plura genera numerant, de quibus simul omnibus eodem loco minime dicendum. Primum igitur de Trifolio Asphaltite Dioscoridis agitur. Id Tripyllon Græci, inquit alij Oxytriphyllum, alij Menyanthes, alij Asphaltion vocant. Frutex supra cubiti altitudinē attollitur, virgas habens tenues, iunceas & nigras: ex his tanquam ramulis enascuntur exiles appendices, in quibus ter singulis germinationibus exeunt folia, Loto herbae similia. His recenter natis Ruta odor inest, adulta verò, Bitumen olent. Florem edit purpureum: semen quadantenus latum, subhirsutum, extrema parte altera exertum, antennæ modo corniculatū radix tenuis, longa, valida, & *ὀξυτρίφυλλον* plurimum in Sicilia nasci Dodon. in histo. fr. Scribonius tradit, in Italiæ regionib⁹ nusquā sibi visum, nisi in Lunæ portu, Britanniam petenti cum diuo Claudio Casare, & copiosissimum super circūdati monti Cap. 163.

*Forma.*





In c. 106. li.  
2. Dioscor.

Lib. 2. sim.

Vires &  
Temper.

Li. 2. c. 106.

montibus: (esse autem foliis specie, ac numero similibus communi Trifolio, nisi quod huius crassiora folia quasi lanuginem quandam super se habent, & in extrema parte velut aculeum eminentem, eumque fruticem bipedalē, aut etiam ampliorem conspici, ac odorem grauem emittere, quorum nihil in pratensi Trifolio inuenitur. Matthiolus Scribonij hoc Oxytriphylon, non Asphaltites esse putat, sed secundum genus à Plinio memoratum & ob acutum foliū Oxytriphylum cognominatum Officinarum Alleluia. Tragus Cytisum esse credit. Eius figuram inter Cytisos supra nos exhibuimus. Triphyllum, quidam Asphaltion, inquit Galenus, quidam Oxytriphylum, nonnulli Menyanthes, sunt & qui Cnicinum vocant, prima quidem tria ab accidentibus frutici, reliqua duo nomina haud scio vnde (libro de Theriaca ad Pisonem, Trifolium semen habet Cnico sylvestri simile: cognomē inde fortassis Cnicini, *μηνάνθες*, non *μίσκάνθες*, quidam vocatum putant, quod diutissime flos permaneat.) Vis ei calida & sicca vt Bitumini, cui odore quoque simile est, vtrunque tertio ordine. Proinde potum laterum dolores ab obstructione natos iuuat, & vrinam, mensesque prouocat. Hippocrates Trifolium non solum menses prouocare, sed & fœtus cum sumptum, tum appositum educere tradit. Mulier, inquit, si ex partu non fuerit purgata, Trifolium in vino albo bibendum dato: hoc etiam menses educit & fœtus. Idem alibi. Trifolium appositum menses erumpere facit, & fœtum elicit. Semen & folia, Dioscoridi, in aqua pota pleuriticis, vrinæ difficultati, comitialibus, & iis qui aquæ inter cutem principia sentiunt, fœminis quoque vuluæ vitiis oportunis auxiliantur: menses ciunt ternæ drachmæ seminis danda: foliorum quaternæ. Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota præsidio sunt. Tradunt aliqui totius fruticis, radicis, foliorumque decoctum, foru dolores eorum finire quos serpentes percusserint: quæ autem a qua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vlcus habuerit, perinde



perinde afficitur, vt à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum vino potui dēdere, & in quartanis quaterna, vt quæ Febrium circuitus discuterent. Radix antidotis miscetur, vt Dioscorides ait. At veteres alij non radicem modò, sed & semen ipsis admiscuerūt, vt in multis compositionibus apud Galenum videre licet, Theriacis videlicet Ælij Galli, Zenonis, Laodicensis. Claudij Apollonij, Eudemi, Heraclidis, Dorothei, & Heræ. Plinius Dioscoridis sententiæ repugnare videtur, & eum reprehendere, cum hæc scribit. Trifolium scio credi præualere contra serpentium ictus, & scorpionum, ex vino aut posca, seminis granis viginti potis: vel foliis & tota herba decocta: serpētēque numquam in Trifolio aspici: Præterea à celebratis auctoribus contra omnia venena pro antidoto sufficere xxv. grana eius quod Menyanthes appellauimus, tradi. Multa alia præterea in remediis eius adscribi. Sed me contra sententias eorum grauissimi viri auctoritas mouet. Sophocles enim Poëta venenatum id dicit. Simus quoque medicus decocti aut contriti succum infusum corpori, easdem vredines facere, quas si percussis à serpente imponatur. Ergo non aliter vtendū eo quàm contra venena censuerim. Fortassis enim & his venenis inter se contraria sit natura, sicut multis aliis. Item animaduerto semen eius cuius minima sunt folia vtile esse ad custodiēdam mulierum cutis gratiam, in facie illitum. Eandem Simi medici sententiam Galenus etiam habet in libro de Theriaca ad Pisonem. Trifolium, inquit, herba quæ Hyacintho similis est, veris tempore pragnans cū semē agresti Cnico simile habet, si quis tunc ipsam validè decoquat, deinde morsum phalangij aut etiam viperæ ea aqua perfundat, sanat ipsum, & statim doloris exortem efficit: Si verò quis in alio non commorso sanum locum eodem fomento perfundat, eundem sensum, & eosdem dolores omnes commorso similes inducet, vt hīc effectus reuera admiratione dignus sit, eandem herbam & morsum sanare, & sanum locum bestiarum venenatarum modo malè afficere. Hæc porro Galeni sententia à Dioscoride dissidere videtur, aut certè, quod parum verecundè quidam dicunt, Dioscoridis sententiam Galenus non intellexit. Alij Galeno patrocinant librum hunc inter spurios referunt. Dioscoridis hæc sunt verba, ἱεροῦσι δ' ἐνιοι ὅτι τὸ ἀπὲρ ἡμα ὄλου τοῦ θάμνου, καὶ τῆς ρίζης, καὶ τῶν φύλλων χαλκάνθημιμον ἐπὶ τῶν ἐρπετοδίκων παρὰ τρεῖται τὸς πόνας. ὃ δ' ἂν θεραπευθῇ τις ὕδατι, ἂν ἕτερος ἔλκος ἔχων χαλκάνθημι, τὰ αὐτὰ πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις. Id est, Quidam narrant totum decoctum fruticis, & radice, & foliorum, si commorsis à serpentibus affundatur, dolores eximere. Verum si ea aqua qua quis curatus fuerit, alij qui vlcus habeat affundatur, ipsum eadem pati quæ illi qui commorsus fuere. At si de eadem numero aqua Dioscoridis verba non accipiantur (nam miri nihil in ea re inesset) verum de ea quæ eadem specie est, quæ contrariam vim in commorsis quos sanat, & non commorsis quos lædit, non sine admiratione ostendit, si etiam negatio quæ apertè deesse videtur, inferatur, ἂν ἕτερος ἔλκος μὴ ἔχων, & cætera, eadem planè erit Simi Medici, & Galeni, & Dioscoridis sententia. Nam ita sanè Galenus habet, ἐπ' ἄλλῃ μὴ δεδηγμένῃ. Trifolio huic bituminoso aliud quoddam simile reperitur peregrinum ex America trifolium Caules hoc profert ab radice complures, rotundos, ramosos, in latus declinantes: folia in singulis pediculis terna, in viridi sub nigra, figura rotundiuscula, primis è radice exeuntibus bituminosi Trifolij forma, colore & odore quoque quadantenus similia, latiora tamen, & per ambitus magis creata: flores in summo ramulorum exeunt, exigui, subcandidi, spicatim digesti, fructus inde rotundi, aliquantulum plani. Radix in plures diuiditur. Ex America in Belgium delatum semē Iulio & Augusto floret. Trifolij bituminosi speciem esse odor grauis, & illius odori haud multum absimilis, ostendere

Li. 2. Antid.

Li. 21. ca. 21.





Li. 4. ca. 37.  
Cap. 314.

Forma

Tempus.

Vires &

tempera.

Li. 4. ca. 37.

Cap. 314.

videtur. His subiungemus aliud Trifolium, quod Lotus urbana Dodonæo Asphaltaū vel Trifolium odoratum alterum dicitur, Gallicè *Treffe odorifera*, Germanicè *Sibengezil*, propterea quod singulis diebus septies odorem suum habeat, & toties etiam amittat, quamdiu in horto creuerit: decerptum enim & exsiccatum odorem suum perpetuò retinet, qui certe instante pluuiosa temporis constitutione ac tempestate multò vehementior est, vt nonnunquam totas eges in quibus hæc herba reposita est odore suo compleat. Potest & dici Trifolium satium. Cauliculos habet erectos, rotundos, inanes, cubitales aut longiores, ramulos multos, folia in singulis germinationibus terna, Trifolio similia, leuiter serrata, flores in exiguis veluti spicis, pallidos ex cæruleo albicantes, quos aspera sequuntur capitula, in quibus semen Fœnogræco minus. Radix fibrata est. Semel satum facile prouenit, & ex semine deciduo quotannis reuiuiscit. Iulio mense floret, deinde semen producit. In calido frigidòque temperatum esse scribit Dodonæus, & siccitatis quadantenus particeps: œdemata ad suppurationem perducere appositum: succum eius cum melle mistum, oculorum caligines discutere. Tradūt quidam Oleum in quo huius Trifolij flores maduerint, vulnera recentia conglutinare, item fracturas. Fuchsius perperā Trifolij Asphal- titis vires omnes à Dioscoride assignatas huic Trifolio attribuit.

LOTVS,

CAP. LXIX.

Nomina

Genera


Li. 4. c. 107.

**L**OTUS arbor de qua diximus: est & Lotus herba de qua nūc agendum post Trifolia. *Λωσος* hæc Græcis dicitur, Latinisq; pariter *Lotus*, Arabibus *Handachocha*, *Garch*, *Thus*, Italis *Loto domestico*. Loti genera multa. Dioscoridi duo, *λωσος ἡμερος*, Lotus urbana, & *λωσος ἄγριος* Lotus sylvestris. Alij plura recensent, vt dicemus. Quæ legitima Lotus sit, siue urbana, siue sylvestris ambigūt adhuc herbarij, & fortasse ignorant. Certe



Matthioli.


altera Matth. Melilotus  
 Officinarum.



Certè eas veteres Trifolij generibus adscripsisse videtur. Sed Loti urbanæ histo-  
 riam ita prætermisit Dioscorides, ut ne vnâ quidem ex illo notâ eius colligere  
 possimus. Sunt qui Trifolium illud quod in pratis passim atque etiam alibi pro-

Li. 4. c. 106.

LOTVS SYLVESTRIS  
 Matthioli.



uenit, Lotum satiuam esse putant, ea fortè ra-  
 tione ducti, quod scribat Dioscorides Lotum  
 hanc Trifoliū vocari. At eam in hortis nasci  
 non in pratis idem Diosc. subiungit. Alij cre-  
 dunt Lotū satiuam esse eam plantā quam vul-  
 gares herbarij, & Officinæ Italicæ Melilotum  
 falsò appellant, utpote quæ foliis constet, Tri-  
 folij effigie, nascaturque nō in pratis tantum,  
 sed etiam in hortis ac viridariis. Verum nihil  
 causæ est cur quis huic sententiæ certò assen-  
 tiatur, quæ opinione duntaxat, nō rationibus,  
 neque auctoritatibus nixa sit. Matthi. prima  
 commentariorū Latinorum in Diosc. editio-  
 ne Lotum satiuam quæ hic picta est exhibuit.  
 Dodon. eandem pri⁹ quidē pro Loto sylvestri  
 deinde in frumēt. Historia p Trifolio cornicu-  
 lato, siue Trifolio sylvestri luteo, Multos edit  
 tenues & infirmos cauliculos, humi procubē-  
 tes, folia incana, Trifolij, minora, & angustio-  
 ra, flores splendentes auri penè colore in sum-  
 mis virgulis, veluti exiguas spicas sequuntur  
 siliquæ ternæ aut quaternæ, oblongæ, tenues,  
 teretes, & angustæ, in quibus semina parua &

Ibidem.

Ibidem.

Lib. 4. c. 38.

Forma.



rotunda. Radix dura, lignosa. Nascitur multis Germaniæ locis, in Belgio familiarius, ubi secus vias & agrorū margines passim reperitur. Floret æstate. Astringit, refrigerat & siccatur. Incipientibus inflammationibus vtilis, & omnibus quæ reprimi ac refrigerari desiderant. Melilotum Coronatā Pena & Lobellius vocant:

**LOTVS SYLVESTRIS**  
*altera Matthioli.*



Ibidem.

Locus &  
forma loti  
sylvest.

Lib. 4. c. 38.  
Forma loti  
sylvest. mino.

**LOTVS SYLVESTRIS**  
*minor Dodonæi.*



Cap. 35.

Forma  
alius syl.

Forma  
Lybici.

Melilotum Germanicā Fuchsius Idem Marth. secunda & tertia commentariorum in Diosc. editione Lotum vrbana esse censet, Trifoliū illud odoratū quod aliās pro Cytiso vsurpauerat. Id Romæ vulgo *Tribolo*, dicitur, & alibi in Italia *Trifoglio Canallino*, quod eius pabulo maximè delectetur equi, Officinis Melilotus. Est enim omnino Trifolij genus odore eximio ac suavi. Quare vnguentarij, & qui odoratis aquis conficiendis dant operam, ex hac quoque planta stillatitiam aquā eliciunt. Præterea affirmat Matthiolus eius succo oculorum nubeculas deleri De Loto vrbana Dodonæi, quæ est hortorū sativa Lotus, diximus superiore capite. De Loto sylvestri primū nihil certi scripsit Matthiolus, herbam tamen ait, quæ hîc picta ostenditur, sæpius se vidisse ac legisse in incultis ac pratis nascentē, foliis Trifolio æmulis, bicubitali caule, quam plurimis adnatis, luteis floribus, è quibus cornicula prodeunt, semine plena, Fœnogræco similis, odore non ingrato. Sed an sit vera Lotus sylvestris nondum sibi compertum esse fateretur. Aliam Lotum sylvestrē proposuit Dodonæus quæ & minor dici potest. Cauliculos habet valde tenues, rotundos folia Trifolij, flores Luteos in capitulis rotundis, in quibus tandem semen oritur nigrum, incuruum, folliculo nigro contextum, circa capitula ordine dispositum. Fuchsius Trifolij pratensis genus esse putat, & Luteum appellat. Matthiolus pro Loto sylvestri exhibuit secunda & tertia commentariorum in Dioscoridem editione alterum corniculatum Trifolium nuper descriptum, in Bohemia copiosum, foliis Trifolij, caule cubitali, ramoso, alis multis flore in capitulis cæruleis: semine Fœnigræci, sed paruo & odorato. Aliam Dalechampius Lotum sylvestrem siue Lybicum hîc depingendam curauit, radice crassā, valde fibrata: caule procero, duobus cubitis altiore, ramoso, vastis ramis huc illuc diffusis, foliis Loti pratensis, geminis, caulem & ramos ex intervallis alarum modo vestientibus, & iis proximè adhærescentibus pediculo verò ex alā cuiusque sinu emergente, longiusculo, cui terna folia insident, simul iuncta,



QVÆ IN AGRIS NASCVNTVR. LIB. IIII. 509  
 LOTVS LIBYCA LOTVS LATIFOLIA  
 Dalechampij. Dalechampij.



iuncta, & vt in omnibus Trifoliis disposita: flore in ramorū vertice denso & co-  
 ceruato, penē vmbellæ specie, ex albo subrubente. Ad ripam Ladi amnis haud  
 procul Monspelio in stagnum marinum defluentis provenit. Hæc planta cum  
 Loto sylvestri Dioscoridis maximè congruere videtur, ita scribentis. Sylvestris  
 Lotus quam aliqui Lybicam appellant, plurima quidem in Lybia gignitur. (Sic

Locus.

LOTVS PRATENSIS  
 purpurea.



enim ex Græco legendum. Λωτός ἄγριος, ὃς ἔστι  
 λιβύων χαλῶσι, φύεται μὲν παλαιότερος ἐν λιβύῃ, non  
 vt vertit Ruellius. Lotus sylvestris quam Tri-  
 folium minus appellant, absurdè quī, enim  
 planta bicubitalis, & sæpè maior, ac ob id Tri-  
 folia omnia magnitudine superās, Trifolium  
 min⁹ rectè dici posset: caule bicubitali, & sæpe  
 maiore, alis multisfoliis Loto Trifoliæ pratēsi  
 similibus (non vt Ruellius interpretatur, foliis  
 Trifolij pratensis, sic enim Græcè legitur. Φύλ-  
 λε ὁμοία λωτὸς τριφύλλῳ τῷ ἐν χορτοκοπείοις γεννω-  
 μένῳ) semine Fœnigræci, multo minore, gustu  
 medicato. Idem Dalech. Lotos alias esse obser-  
 uauit, quarum historias subiungo. Lotus Lati-  
 folia radice est tenui, modicè fibrata, foliis  
 multis, humi quaquauerfum iacētibus, quæ ex  
 multis foliolis constant, inæqualiter dispositis,  
 suprema parte grandioribus & latioribus: cau-  
 le dodrantali, flores densos sustinente, prius-  
 quam aperiantur subrubētes, cum reclusi sunt,  
 luteos. Fert semē paruum in breuibus siliquis.  
 Quidam plantā istam Anthyllidem maiorem

Li. 4. c. 107.

Forma lat.



*Locus. LOTVS ENNEAPHYL-*  
*los Dalechampij.*  
 Forma. pu.

*Locus.*  
*Forma.*  
*Enneap.*



*LOTVS ASPERIOR,*  
*fruticosa Lobellij.*

*Li. 4. c. 106.*  
*Vires &*  
*Temper.*

*Li. 22. c. 21.*

*Libr. 7. sm.*



habet, ita etiam exsiccandi, in caliditatis frigiditatisque coniugatione media quodammodo, & temperata. Lotus verò agrestis plurima in Lybia prouenit. Eius semen secundi est ordinis excalfacientium, habetque nonnihil absterforium.

*MELI*

vocant. In aridis, macris, & sabulosis prouenit. Lotus pratensis purpurea radicem gignit gracilem, candicantem, parum capillatam: cauliculos multos, fere pedales, furculosos: folia Loti nunc terna, nunc quaterna, exigua: flores in ramulorum vertice copiosos, purpureos. In pratis & humidis locis nascitur. Lotus Enneaphyllos radice firmatur breui, sub nigra, valde fibrata: cauliculos edit multos, per terram sparsos, vel supra terram paululum extantes: folia Loti in singulis pediculis nouena: qua ex causa Enneaphyllum cognominarunt: flores luteos in ferra congestos: semen paruum in corniculis longis & gracilibus. In pratis & terrarum aggeribus gignitur. Iisdem in locis altera non dissimilis, foliis eodem ordine collocatis, sed non perpetuo nouenis: flore simili, sed purpureo: semine iisdem corniculis incluso. Postrema erit Lotus asperior fruticosa, sine Narbonensis, incana Lotus Lobellij, tota facie Lotis similis: In caulibus rigidis, pallidis dodrantalibus, folia terna, incana, Loto pratensi Monspeliensi angustiora, Cyriso ferme paria, dorycnio latiora. Cauliculis summis luteoli flosculi exeunt, minores quam in Loto, & aliquantum cani. Nunc de Lori facultatibus dicendum. Loti satiuæ succus, inquit Dioscorides, addito melle oculorum argema, nubeculas, ceterasque caligines discutit. Sylvestris Lotus calfaciendi, & leniter adstringendi vim habet, vitia cutis in facie maculasque cum melle peruncta purgat. Trita per se aut cum Maluæ semine, in vino aut passo bibitur aptissime contra dolores qui vesicam male habent. Plinius. Loto qui arborem putant tantum esse, inquit Plinius, vel Homero auctore coargui possunt. Is enim inter herbas subnascentes deorum voluptati Loto primam nominauit. folia eius cum melle oculorum cicatrices, argema, nubeculas discutiunt. Hæc Plinius cum tradit, de Loto satiuæ, foliis eius tribuit, quod Dioscorides expresso succo. De sylvestri siue Lybica Loto, quod sciam nihil scripsit. Galenus verò Loti effectuum causas reddidit his verbis. Lotus satiuæ, quam quidam Trifolium nominant, ut mediocriter abstergendi vim



## MELILOTVS, CAP. LXX.

**M**ΕΛΙΛΩΤΟΣ Græcis hæc planta dicitur, Latinis Melilotus, Ca-  
 roni Serta Campana, Celso, & Plinio, Sertula Campana, aliis Coro-  
 na Regis. Meliloti nomen Officinæ retinuerunt. Italis *Meliloto*, &  
*Trifolio Canalicato*, Anglis *Melilote*. Sertulam Romani veteres dixerunt,  
 quod flos eius coronamentis dicatus sit, & quia ex ea antiquitus coronæ & ser-  
 ta factitata sunt. Campanam, quod in Campania Italiæ, laudatissima sit: Coro-  
 nam autem regiam, quoniam luteis floribus supernè coronetur. Melilotus vul-  
 garis qua pro legitima Officinæ vtuntur, quorundam est Lotus urbana, teste  
 Matthiolo, vt diximus paulo antea, Trifolium odoratum Dodonæi, vulgaris  
 tres aut quatuor pedes alta est caule in ramulos statim à radice diuiso: folia ter-  
 na, Trifolio similia, per oras lente, ac minutim diuisa: Flores lutei in breuibus  
 spicis: deinde semen in exiguis, nigris, ac latiusculis siliquis, paruum, pallidum.  
 Radix longa est. Tota herba odorata est, præcipuè flos qui odor siccescentibus  
 ipsis intenditur. Melilotus vera, siue Italica, aut Campana, cubitali est altitudi-  
 ne, statim à radice fruticosa, ramis multis, exilibus: foliis Trifolio proximis, ex


Nomina

Genera

Matth. in  
cap. 41. lib.  
3. Dioscor.

Forma.

*MELILOTVS* *Vulgaris*, siue  
*Trifolium odoratum* Dodonæi.



*MELILOTVS*, siue  
*Sertula Campana*.



angusta origine in latum sese diffundentibus, & longo appensis pediculo: flo-  
 ribus Melinis, paruis: siliquis repandis, numerosis, pluribus ex vno ramusculo  
 pendulis, in quibus semen inest minutum, subrufum, odoris non ingrati, quo  
 vtendum: radix inutilis, & superuacua. Nascitur laudatissima in Africa, ait Dio-  
 scorides, & Cyzico, & Chalcedone: eius color vicinus est Croco, boni odoris.  
 Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum læguescente, odore in-  
 firmo. Meliloton Sertulam Campanam vocamus, inquit Plinius est enim in  
 Campania Italiæ laudatissima, Græcis in Sunio: mox Chalcidica & Cretica, vbi-  
 cumque verò asperis & sylvestribus nata. Coronas ex hac antiquitus factitatas,  
 indicio est nomen Sertulæ, quod occupauit. Odor eius Croco vicinus est, &

Locus.

Ibidem.

Lib. 21. c. 9.



- Cap. 11. flos ipsa cana. Placet maximè foliis breuissimis, atque pinguis-  
simis. Idem paulo post. Melilotos ubique nascitur, laudatissima tamen in Attica. Vbi-  
cumque verò recens, nec candicans, & Croco quàm simillima, quanquam in Italia odorator,  
& cãdida. Igitur Croco simillima dixit, quod Dioscorides *κροκίον*. Antea odo-  
rem & florem Croco vicinum esse dixerat. Hodie probatissima legitimaq; Me-  
lilotus non modò in multis Campaniæ locis, sed etiam in Gargano Apuliæ  
monte prouenit. Melilotus, auctore Galeno, mista est facultatis. Habet enim  
quiddam adstringens: sed & digerit, & concoquit: copiosior enim in eo est sub-  
stantia calida, quàm frigida. Melilotus Dioscoridi vim habet adstrictoriam. In-  
flammationem emollit, præsertim quæ in oculis, vulua, sede, aut testibus erumpit,  
si ex passo cocta illinatur: interdum autem addito oui luteo assato, aut Fæ-  
nigraci farina, Lini semine, aut Polline, aut capitulis Papaueris, intyboue. Re-  
centes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite illita cum Cre-  
ta Chia, vino, aut galla sanat: stomachi dolores & cruda & cocta cum aliquo  
ex antedictis leuat: doloribus aurium mitigandis cruda ex passo instillatur: in  
aceto aut rosaceo madefacta capitis dolorem lenit. Melilotus, si Plinio credimus  
oculis medetur cum lacte, aut cum Lini semine. Maxillarum quoque dolores le-  
nit: & capitis cum rosaceo: item aurium è passo, quæq; in manibus intumescunt,  
vel erumpunt. Stomachi dolores in vino decocta, vel cruda tritaq; Idem effe-  
ctus, & ad vuluas. Testes verò, & sedem prociduum, quæq; ibi sunt vitia, recens  
ex aqua decocta, vel ex passo. Adiecto rosaceo illinitur ad carcinomata. Defer-  
uescit in vino dulci. Peculiariter & contra meliceridas efficax. Sed vulgati Cod-  
ices falso habere videntur lacte pro luteo oui: differet enim in Dioscoride *ωσὶ λε-  
κίον* legitur. Serapio Meliloti siliquis & feminibus vtendum esse censet, cum  
ex auctoritate Isaac Ebenamram de Melilotus differit his verbis. Melilotus her-  
ba est quæ folia fert rotunda, & viridia, ramulos emittit admodum exiles, in qui-  
bus foliarara. Semen gerit in siliquis tenuibus, ac rotundis, quæ grana includunt  
pauca, glauci coloris, rotunda, infra sinapis magnitudinem. Porro in Melilotus  
vsum sibi vendicarunt siliquæ, & semina quæ in eis continentur. Ex quibus fa-  
cilè est coniicere, inquit Matthiolus, non esse mirum, si emplastrum quod de Me-  
lilotus Officinis dicitur, sæpe medicos fallat, cum in id legitimi Meliloti semi-  
nis farina nunquam recipiatur.

## TRIBVLVS, CAP. LXXI.

## Nomina

## Genera.

Lib. 4. c. 14.

Lib. 6. Hist.  
cap. 5.

Cap. 1. li. 6.



ΤΡΙΒΛΟΣ *χέρσατος* Græcis, Tribulus terrestris Latinis dicitur,  
quod siliqua plantaq; Muricata sit, Italis *Tribolo terrestre*, Arabibus  
simpliciter Tribulus *Hafach*, siue *Haferk*, Hispanis *Abroyos*, & *Abrallo*.  
Dioscorides duo Tribuli genera statuit, alterum terrestre, alterum  
aquis familiare, de quo alibi dicemus. Theophrastus duo terrestris Tribuli gene-  
ra descripsit his verbis: Ο δὲ τριβλος ἰδιον ἔχει, διότι περιεχεται ἀνθος ἐστὶ. Δὸς  
δὲ αὐτοῦ γένη. τὸ μὲν γὰρ ἔχει φύλλον ἐρευνθώδες. ἕτερος δὲ φυλλάχανθος. Καὶ ἐπὶ γὰρ αὐτῷ  
καὶ πολλὰ χεῖρα ἔχον χερσίδμοι. ὁ φιλαδάτης δὲ μᾶλλον ὁ φυλλάχανθος, περιέχεται τὰς ἀνθους.  
τὸ δὲ πᾶν τὸ μὲν πρῶτον, σηθωδες, τὸ δὲ ὅψις στρογύλον, ἐπιμένει ἐν τοῖς. Quæ re-  
ctius fortasse quam à Theodoro sic verti possunt. Tribulo peculiare est, quod  
in tegumentum fructus aculeatum gignit. Duo eius genera. Vnum folium Cice-  
ris habet nullis spinis aculeatum, alterum foliis est spinosis. Humi iacent am-  
bo, & quaquaversum ferè disperguntur. Serius germinat qui folia spinosa ha-  
bet, & circa villarum septa prouenit. Semen præcociis Sefamo simile, serotini  
rotundum, nigricans, siliqua clausum. Quod hoc loco dixit Theophrastus Tri-  
bulum περιεχεται ἀνθους esse, paulo ante dixit τὸν τριβλον καὶ τὴν περιεχεται φυλλά-  
χανθον



χρῆσθαι εἶναι, ἔχον γὰρ ἀχρῆσθαι ἐν τῷ περὶ ἀχρῆσθαι: id est Tribulum habere seminis conceptaculum aculeatum, & folia spinosa: etenim in seminis integumento spinas esse. Tribulo proprietas, inquit Plinius, quod & fructum spinosum habet. Idem alibi: Aliqua & secundum spinam habent folium, ut Tribulus & Ononis. Sed rursum idem dilucidius. Tribulus non nisi in palustribus nascitur, dira res alibi. Iuxta Nilum, & Strymonem amnes, recipitur in cibos: inclinatur in vadum, folio ad effigiem Ulmi, pediculo longo. At in reliquo orbe genera duo, vni Cicerulae folia, alteri aculeata. Hic & serius floret, magisque septa obsidet villarum. Semen ei rotundius, nigrum, in siliqua: alteri arenaceum. In Theophrasti vulgaris nostris exemplaribus σιγαῶδες legimus, id est, Sefamo simile, quo loco, ut apparet Plinius ἀμυῶδες legit, utpote qui arenaceum verterit. Alij non arenaceum in Plinio, sed acanaceum legunt. Tribulo sabulosæ planities mari Adriatico, Tyrrheno, & Gallico mediterraneo vicinæ scatent. Monspelij etiam in aridis & oliuetis serpit, forma Ciceris, ramulis permultis, exilibus, gemino foliorum versu refertis, non Portulacæ, ut legitur in vulgatis Codicibus Dioscoridi, sed Aphacæ, vel Lentis, ideoque pro ἀνδράχνη suspicatur Pena, legendum ἀφάκη *Forma.* ἡμοια, id est Aphacæ, siue Viciæ similia, id quod ipsius plantæ inspectio demonstrat. Pusilli flosculi, luteoli, in pediculis, ex alis exeunt, & qua emergunt infestiaculei, rigidiusculi, sexanguli, quinquanguliue, tanquam Murices, medullam &

Lib. 21. c. 15.

Lib. 21. c. 16.

TRIBVLVS Terrestris  
Matthioli.



TRIBVLVS MINOR  
rectus Dalechampij.



semen ambiunt, per maturitatem & ætatem dehiscentes: radix parua, fibrata, nec altè depacta. Nullius hodie fermè vsus, nisi asinis, quibus pabulum illic est. Tribulus terrestris, in aruis Hispaniæ frequēs est, frugibus infestus. Lolium Tribulos, carduos, lappasque non magis quàm rubos, inter frugum morbos potius, quàm inter ipsius terræ pestes numerat Plinius, ut & Vergilius.

Lappa, Tribulusque, interque nitentia culta,  
Infelix Lolium, & steriles dominantur Avena.

Hist. frum.  
cap. 101.  
Locus.  
Lib. 18. c. 17.  
Lil. Geor.

Duo



Forma  
Tribul.  
recti.

Duo alia Tribuli genera Dalechampius nouit, quæ hîc depinximus. Alter est Tribulus minor rectus, alter Tribulus minor repens. Tribulus minor rectus radicem emittit dodrantalem, tenuissimam, candidam, capillaceis villis parum fibratam: caulem simplicem, rotundum, quatuor digitos altum, in ramulos dispersum: folia parua, Lenti similia, superiore parte latiuscula, qua petiolo adnectuntur angustiora, per ipsa media excurrente ac eminente costa, in singulis petiolis terna, vt in Loti ac Trifolij generibus. Florem fert Pisi, paruum, luteum: semen exiguis ac rotundis pilulis inclusum, quæ in terram deciduæ suam plantam quotannis ferunt, atque in radice plantæ ex ipsis natæ cum terra effoditur, hæere solent. In arenosis & sabulosis locis gignitur: gustus citra mordacitatem & acrimoniam desiccantis. Tribulus minor repens tota plantæ effigie superiori

Forma  
Trib.rep.

TRIBVLVS Terrestris,  
minor repens.

Li.8. simpl.  
Vires &  
Temper.



ri similis est, nisi quod hic longissimis viticulis per terram repit, & quaternas, aut quinas simul echinatas pilulas gignit. Ille autem breuis est & erectus, binasq; tantum, aut ad summum ternas pilulas edit. Tribulus, aquaticus Galeno, ex humida substantia & modicè frigida, terrestris ex sicca non mediocriter, & frigida componitur: (est enim legèdum τελεολος ενυδρος, ἐξ ὑγρᾶς ῥοίας, μετεῖως ψυχρᾶς, χερσαῖος δὲ ἐκ ξηρᾶς & μετεῖως, καὶ ταύτης ψυχρᾶς συνέστηκε.) In terrestri tamen superat terreum frigidum quod adstringens est, in aquatico aqueum. Propter vtrumq; itaque & contra phlegmonarum generationes, & omnino contra omnes humorum affluxus congruit. Porro terrestris ipsius fructus cum tenuium sit partium, potus, lapides in renibus comminuit. Dioscorides has illis vires assignat Tribulus vterque, refrigerantis, & spissantis est naturæ, inquit Dioscorides, ideo inflammationes omnes cataplasmate adiuuat: vlcera in ore erumpentia, putredines, gingiuas, tonsillâsque persanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum

Li.22. c.10.

medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum adfert. Drachma terrestris Tribuli pota, illitæue ictos à vipera recreat: contra venena cum vino aptissimè bibitur. Decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amnem habitant, virente Tribulo equos saginant, & è dulci semine, ac esculento panem quo vescuntur, faciunt. Tribuli vnum genus Plinio, in hortis nascitur, alterum in fluminibus tantum. Succus ex his colligitur ad oculorum medicinas. Est enim refrigerantis naturæ, & ideo utilis contra inflammationes, collectionesque. Vlcers per se erumpentia, & præcipuè in ore, cum melle sanat, item tonsillas. Potus calculos frangit. Thraces qui ad Strymona habitant, folijs Tribuli equos saginant, ipsi nucleo viuunt, panem facientes prædulcem, & qui contrahit ventrem. Radix castè purèque collecta discutit strumas. Semen adalligatum, varicum dolores sedat: Tritum verò & in aquam sparsum pulices necat.

VACCA



**V**ACCARIAM plantam vocant Herbarij, quod eam libenter Vaccæ depascantur, rubram à floris colore. Pallidæ supra meminimus inter Isatidis genera. Quidam Condurdū Plinij esse volunt. Ea certè circa Solstitium, rubrum siue roseum florem mittit, quod de Condurdo suo, herba Solstitiali, Plinius tradit. Gignitur in agris argillofis inter segetes, radice lignosa, candida, breui, modice fibrata: caule singulari, pedem alto, in

Lib. 26. c. 5.

*VACCARIA Rubra  
 Maior.*




*VACCARIA Rubra  
 Minor.*



vertice tantū furculoso: foliis oblongis, læuibus, pallidis, in fastigio acuminatis, binis simul, ex aduerso sitis, cauli sine pediculo adhærentibus: ex foliorum sinu in plantæ vertice exiles pediculi emergunt, & calices sustinent albos, inferne latos, superne fastigiatos, quinque herbaceis costis distinctos, ex quibus flos promitur, aspectu pulcher, puniceus, quinque foliolis constans, media linea sic diuisis, vt in alia quinque rursus diducantur, & sic distracta decem efficiant: semine rotundo, copioso in supradictis calicibus.









# HISTORIAE

## OMNIVM PLANTARVM

LIBER QVINTVS,



*In quo describuntur & depinguntur Olera, & herba  
quæ in Hortis nascuntur.*

BRASSICA, CAP. I.



IRIDARIO Hortus proximus est, quo nomine apud antiquos omnis villa dicebatur, ut scribit Festus: quod ibi, qui arma capere possent, orirentur. Et Plinius, in xii. tabulis legum nostratum, ait, nusquam nominatur Villa: semper in significatione ea hortus: in horti verò, hæredium. Κήπος Græcis hortus dicitur, & Κληρος, quamquam propriè hæreditatem significet. Nicander,

Ἡετι καὶ κληροισιν ἐπὶ πολλοῖς τοῖς περ ὄρεσι  
εἰσέλθαι φορέουσιν ἐν ἐπιμήναια κύβηταις.

Nomina

Lib. 19. c. 4.

In Alexiph

Quæ sic Gorraus conuertit.

*Quæ per æstatem nostris nascuntur in Hortis*

*Mala, quibus ludunt, delectanturque puella.*

Vnde sumptum Latinorum hæredium, quod pro horto, ut ex Plinio dictum est, usurpabatur, quodque paruum prædium Festus interpretatur. Horti sunt in quibus arbores, & olera potissimum oriuntur, quibus antiquitas nihil prius mirata est, veluti Hesperidum hortos, & Regum Adonis, & Alcinoi, itémque pensiles, siue illos Semiramis, siue Assyriæ Rex Cyrus fecit. Romani quidem Reges ipsi hortos coluere. Quippe etiam Superbus Tarquinius nuntium illum sæuum atq; sanguinarium filio. remisit ex horto. Iam quidem hortorum nomine, inquit Plinius, in ipsa vrbe delicias, agros, villasque possident. Primus hoc instituit Epicurus otij magister. Vsq; ad eum moris non fuerat in oppidis habitari rura. Romæ quidem per se hortus Ager pauperis erat. Ex horto plebei macellum, quanto innocentiore victu? Hinc primum agricolæ æstimabantur prisci, & sic statim faciebant iudiciū, nequā esse in domo matrem familias (etenim hæc cura scemina dicabatur) ubi indiligens esset hortus. Quippe è carnario aut macello viuendum esse. Nec caules, ut nunc, maximè probabant, damnâtes pulmentaria, quæ egerent alio pulmentario. Id erat oleo parcere. Nam gari desideria etiam in exprobratione erant. Horti maximè placebant, quia non egebant igne, parcerentque ligno, expedita res, & parata semper: vnde etiam acetaria appellantur

Plin. lib. 19.  
cap. 4.

Ibidem.



(acedaria Tintianus, accetaria legit Hermolaus, non ab aceto, vt credi ceptum est, sed ab accipiendo deflexa. Ideo enim, inquit Plinius, accetaria appellabantur horti, hoc est horrenſia, quoniam expedita res & parata ſemper eſſet: nam & acceptabulum ab accipiendo dicitur, etiam ſi Græci Oxybaphon appellent, quali ab aceto) facilia concoqui, nec oneratura ſenſum cibo, & quæ minimè accenderent deſiderium panis. Horti igitur ab antiquis, vt & à nobis, & ad voluptatem, & ad neceſſitatem comparabantur. Nos autem hortum hic deſcribere inſtituimus, qui λαχανα, ideſt olera potiſſimum continet. Oluſ autem dicebant quamcumque herbam eſculentam, inquit Scaliger, claro indicio priſcæ frugalitatis, quæ ad victum nihil obſonij ſibi deeſſe exiſtimaret, modo ne deeſſet oluſ: hoc enim ὄλον eſt, ſicut & panis πῶλον. Nec iis ſolū, quæ nobis vſui cibario ſunt hortū inſtrui-  
mus, ſed etiā iis ex quibus remedia vulgò parantur, inuētu facilia, ac ſine impēdio.

In lib. 1. de  
Plant.

Supra nos glandiferas arbores, eaſque quæ primū victu mortales aluerunt, nutrices inopis, ac ſeræ ſortis expoſuimus, deinde pomiferas, quæq; mitioribus ſuccis voluptatem primæ cibis attulerunt. Sequitur natura hortorum, id eſt eorum quæ præter arbores & frutices benigna tellure proueniunt, maximè ex quibus viuimus, multa etiam quæ ſalutis, & quædam quæ voluptatis hominum gratia terra gignit.

Nomina

Lib. de  
Hort.

A Braſica verò quæ omnibus notiſſima eſt exordiemur. Κράμην Græci quali Κράμην, inquit Suidas, quòd pupillas oculorum, quas Græci Κόρας vocant, hebetet. In qua ſententia fuit Columella, cum ſcribit,

*Nunc veniat quamuis oculis inimica corambele.*

Et melius κράμην, quali κοράμην dicta eſt, quod τῶ κορῶ ἀμύλη, vel rectius ἀμύλη, id eſt, quod crapulæ ſatietatiq; aduerſetur, vt dicetur. Græci veteres etiam παρῆνον vocarunt, ob mutuam quamdam amicitiam & affinitatem vtriuſuiſ ſeminis, vetuſtioris præſertim, vtramuiſ plantam generandi. Braſica à Latiniſ appellatur, quali præſeca, inquit Varro, quod huius ſcapus minutatim præſecatur: liquidem nunc tonſili, nunc cymoſo caule ſpectatur. Sunt qui dictam exiſtiment quali paſſicam, quod ex caule minutatim præſecatur vt paſſa fiat. Vel ἀπὸ τῆς βράξαι, id eſt à vocando dictam veriſſimile eſt. Eſtur enim tota à plebecula, tum cruda, tum cocta, vel muria ſeruata. Vulgò Caulis, quoniam præ cæteris grandi, validòque turgelcit caule, à Mauritanis Corumb, & Karumb, ab Italiſ Cauaio, & Verſa, à Germaniſ Kaul, ab Hiſpaniſ Colthes, & Couues, à Galliſ Chou, à Belgiſ Koolen, ab Angliſ keale, & Cole.

Genera.

Lib. 7. hiſt.  
c. 4.

Braſicæ permulta ſunt genera, Theophrasto tria. Τῆς δὲ παρῆνης, inquit, τρεῖς αἰσιν, μικρὸν ὃ καὶ περὶ ῥῆτος, πολὺ καὶ ῥῆτος, καὶ τῆς τῆς ἀρχαίας, ἢ τὸ μὲν φύλλον ἐχέει φαρμακώδη. Διὸ καὶ πρὸς τὰς κοιλίας αἰσιν χρῆναι οἱ ἰατροὶ. οὐσίως ὃ καὶ ἐκ τῶν εἶναι δοκίμαται διαφορὰ καὶ ἐτέρη. ἐπεὶ ἀσπερμὸν τινὲς αἰσιν ἐστὶ, ἢ καὶ ἀσπερμὸν. τὸ δ' ὅλον ἢ εἰς τὴν αἰσιν ὡχρύτερα, καὶ μεγαλοφυλλώτερα. Id eſt, Braſica trifariam diuiditur: in eam quæ criſpa & in eam quæ læuia folia habet, & tertiam agreſtem. Huic folium læue eſt, paruum & rotundum: multis ramis, multiſque foliis conſtat. Huic præterea ſuccus acris ineſt, & medicatus, quo medici ad purgandas aluos vtuntur. Similiter priorum Braſicarum hæc videtur eſſe differentia, quod harum quædam nullum, quædam malum ſemen habent. In vniuerſum autem criſpa Braſica & meliore ſucco, & maioribus foliis eſt quàm læuia. Notandum autem non hic ſolū Braſicam τὴν παρῆνην à Theophrasto nominari, & ita à Theodoro conuerti, ſed aliis

In comm.  
in lib. cauſ.  
Theoph.  
Lib. 9. dei-  
pnoſ.

etiam in lociſ ſapientiſſimè, in quibus erudiſſimuiſ philoſophuſ & medicuſ Scaliger τὴν παρῆνην pro Braſica vſurpat, non pro radice, neque radícula, quam etiam παρῆνην vocant Græci. Et apud Athenæum ἡ παρῆνη Theophrasti κράμην eſſe dicitur: illic enim ſcribitur. Θεοφραστος ὃ ἔτιωσ ῥαφῆτι, Τῆς δὲ παρῆνης (λέγω δ' τὴν κράμην) ἢ καὶ



ἡ μὲν ἐστὶν ἐλάφυλλος, & cætera. Aristoteles quoque de erucis scribens. αἱ δὲ κράμπαι γίνονται, inquit, ἐκ τῶν φύλλων τῶν χλωρῶν, καὶ μέλαινα ἐπὶ τῆς ραφάνος, ἣν καλεῖται τινὲς κράμβην. Id est, nascuntur erucæ ex virentibus foliis, maximè raphani, quam vocant nonnulli cramben, hoc est Brassicam. Quæ cum Plinius negligētius legisset, imò ne animaduertisset quidē quæ Theophrastus & Aristoteles de Brassica scripserunt, ipse raphano, idest radicæ adscripsit. Ac primum locum Theophrasti suprâ citatum apertè expresse his verbis, Genera raphani Græci fecere tria, foliorum differentia, crispæ atque lævis, & tertium siluestre. Atque huic lævia quidē, sed breviora ac rotunda, copiosaque atque fruticosa: sapor autem asper, & medicinali instar ad eliciendas aluos. Et in prioribus tamen differentia seminis est, quoniam aliqua peius, aliqua admodum exiguum ferunt. Hæc vitia non cadunt nisi in crispæ folia. At hæc non ad raphanum radicem, sed ad raphanum Brassicam pertinent. Id quod ex ipsiusmet Plinij loco alio demonstrari potest, quo quæ raphani genera illic statuerat, eadem ad Brassicam refert, Catonem qui illa ex Theophrasto transcripsit citans his verbis: Sed Caro Brassicæ miras canit laudes, quas in medendi loco reddemus. Genera eius facit tria. Vnam extentis foliis, caule magno, alteram crispæ folio quam Apianam vocat, tertiam minutis caulibus, lenem, teneram minimè probat: Eadem tria genera alio postea loco idem Plinius repetit. In tres species, inquit, diuisere eam (Brassicam) Græci antiquissimi. Crispam quam Selinada vocauerunt à similitudine apij foliorum, stomacho vtilem, aluum modice mollientem. Alteram læam, latis foliis à caule exeuntibus. Vnde caulodem quidam vocauere, nullius in medicina momenti. Tertia est propriè appellata crambe, tenuioribus foliis & simplicibus, densissimisque, amarior, sed efficacissima. Cato crispam maximè probat, deinde læuam grandibus foliis, caule magno. Quo verò Catonis sententiam de tribus generibus à Plinio citatam, ex Theophrasto descriptam esse dilucidius intelligamus, eius verba hîc adscribenda sunt. Nunc uti cognoscas naturam earum, prima est lævis quæ nominatur. Ea est grandis, latis foliis, caule magno: validam habet naturam, & vim magnam habet. Altera est crispæ, quæ à similitudine apij σεληνάδης vocatur. Hæc est natura & aspectu bona ad curationem: validior est quàm, quæ superscripta est. Item est tertia quæ κράμβη vocatur, minutis caulibus, tenera & acerrima est omnium istarum, tenui succo vehementissima. Et primum scito, de omnibus Brassicis nullæ est illiusmodi medicamentosior, &c. Deinde Plinius erucarum ortum describens, ex Aristotele, de raphani folio dixit, quod Aristoteles apertè se dixisse de foliis Brassicæ declarat loco à nobis citato. Plinij autem verba hæc sunt. Multa autem insecta & aliter nascuntur, atque imprimis ex rore. Insidet hic raphani folio primo vere, & spissatus sole in magnitudinem milij cogitur, &c. Sed de hoc Plinij errore quædam alia postea dicemus. Tria Brassicæ genera agnoscit etiam Eudemus Atheniensis, in libro de oleribus, ut legitur apud Athenæum: κράμβης φησὶν εἶναι γένη πρία, τῆς γὰρ χαλαρῆς ἀλμυρίδος, καὶ λευκοφύλλης, καὶ σεληνάδης. τῇ τε ἡδονῇ περὶ τὴν κεκεῖναι τὴν ἀλμυρίδα. φύσει δὲ ἐν ἐρετρίᾳ, καὶ κύμῳ, καὶ ρόδῳ: ἔτι δὲ κινδῶ, καὶ ἐφέσῳ. ἡ δὲ λευκοφύλλος ἀνὰ πᾶσαν (φησὶ) χώραν γίγνεται. ἡ δὲ σεληνάς τὴν νομισίαν ἔχει διὰ τὴν ἐλάφην: ἐμπερὶς δὲ ἐστὶ σελίνῳ, καὶ τῇ τὴν ἄλλην πύκνωσιν. Idest, Tria sunt Brassicæ genera: Halmyris, Læophyllos, & Selinusia. Halmyris suauitate cæteras antecellit. Nascitur in Eretria, Cumis, Rhodo, Cnido, Ephefo. Læophyllos à læuore foliorum sic dicta, ubique nascens nullam respuit regionem. Selinusia à crispitudine foliorum nomen accepit, ideo quod σελίνῳ, idest apio similis sit, atque etiam densitate. Dioscoridi Brassica alia est ἡμερος, idest, satiuæ, alia ἀγρία, idest silvestris, alia θαλασσία, id est marina. Sub satiuæ tria iam explicata genera, vel quædam horum complectitur. Sub quæ etiam Ægyptiam comprehendit, quæ in Ægypto propter

Lib. 5. Hist. an. c. 19.

Lib. 19. c. 5.

Lib. 19. c. 8.

Lib. 20. c. 9.

De re rust. c. 157.

Lib. 11. c. 32.

Lib. 9.

Lib. 2. c. 12.



Lib. 20. c. 9. amaritudinem non estur, inquit Plinius. Sed multò plura idem Plinius tradit, ex  
 Lib. 19. c. 8. cultu, locis, & forma nomen adepta. Præcipuus fit caulis, inquit, sapore ac magni-  
 tudine, primum omnium si in repastinato feras: dein si terram fugientes caulicu-  
 los feces, à terrâque proceritate luxuriosa attollentes se, exaggerando aliam accu-  
 mules, ita ne plus quam cacumen emineat. Tritianum hoc genus vocatur, bis  
 computabili impendio radiôque. Cætera genera complura sunt. Cumanum ses-  
 fili folio, capite patulum. Aricinum altitudine non excelsius, folio numerosius  
 quàm tenuius. Hoc vilissimum existimatur, quia sub omnibus penè foliis fruti-  
 cat cauliculis peculiaribus, Pompeianum procerius caule ab radice tenui, intra  
 folia crassescit: rariora hæc, angustiorâque, sed teneritas in dote, si frigora non  
 toleret: quibus etiam aluntur Brutiani, prægrandes foliis, caule tenues, sapore  
 acuti. Sabellico vsque in admirationem crispa sunt folia, quorum crassitudo cau-  
 lem ipsum extenuat: sed dulcissimi perhibentur ex omnibus. Nuper subiere La-  
 cuturres ex conualle Aricina, vbi quondam fuit lacus, turrisque quæ remanet,  
 capite prægrandes, folio innumeri. Alij in orbẽ porrecti, alij in latitudinẽ torosi.  
 Nec plus vllis capitis post tritianum, cui pedale aliquando conspicitur, & cyma  
 nullis senior. Hæc Plinius. Nostri etiam in Hortis plurimæ visuntur Brassicarum  
 species, quædam etiam veteribus incognitæ, quas primum distribuemus in faci-  
 uam & agrestem. Satiuam in albam, nigram, & rubram.

j. Brass. spe.

Brassica sativa alba vulgaris notitiæ omnibus conspicua, ea est, quæ levis à  
 Theophrasto, Catone, Plinio dicitur, caule magno, crasso, grandibus & latis  
 Formæ. foliis, carnosiss, ex viridi seu cæsis candicantibus, in latera diffusis, prominulis  
 venarum toris fruticantibus, tonsili cymarum luxuria: flore tum luteo, tum albo:  
 semine in siliquis. Cum gelicidia sensit, gravior est cibus: tenerescit enim frigori-  
 bus: iusculis pinguibus incoqui solet. Cymosum eius cacumen acetariis submi-  
 nistrat, prius subferuefactum, mox oleo salæque diffusum.

BRASSICA ALBA  
 vulgaris, Levis sativa.



BRASSICA ALBA  
 crispa.



Altera



Altera Brassica alba ea est, quæ brassica Sabaudica cognominatur, *Chou de Savoie*, 2. spec.  
Dodon. Lacuturris, Catonis Crispa brassica, Plinij Sabellica. Etenim crispis admo- Lib. 5.  
dum foliis lactucæ modo in sese concluditur, sed non in tam absolutum orbem  
coit, quàm Brassica capitata, neque vsque adeo conuolutis interioribus pāniculis,

**BRASSICA CAPITATA**

*Albida.*



intus albicans, tenera, subdulcis, & quæ hac  
ætate præstantissima habetur: flores albos, &  
semen in exiguis siliquis profert. Hyemem &  
gelicidia non tolerat. Hæc Brassicæ candidæ se-  
cundum genus est Dodonæi.

Lib. 5. c. 6.

Tertia albæ Brassicæ species, cuius folia in  
orbem conglomerantur, exterius callosa, & per  
ambitum rugata, multis intus carinarum volu-  
minibus, externis semper interiora complectē-  
tibus, numquam nisi cum in florem exeunt de-  
hiscētibz, eximio candore, miranda teneritu-  
dine, humili caule, capite prægrandi, nonnum-  
quam sesquipedē crasso. Brassica capitata vulgo  
nominata est, quoniam in capitis formam ex-  
tuberat, Gallis *Chou capu*, idest Caulis capitatus.  
Nonnulli à candore foliorum album vocant,  
quo nostra fere rura victitant. Huic hyeme præ-  
cipua nobilitas. Plinio Lacuturris est Brassica,  
vt vult Matthiolus, vt Dodonæus brassica Tri-  
tiana. Sed verisimilius est Lacuturrim nostram  
esse Brassicam capitatam candidam. Tritianam  
verò nostram esse Brassicā capitatam viridem.


3. spec.

In lib. 5.  
Diosc. c. 1.

Ibidem

**BRASSICA CAPITATA**

*Polycephalos.*



Est alia Brassica capitata polycephalos, ra- 4. spec.  
dice, caule & magnitudine aliis scissilibz &  
capitatis par & similis, sed hoc differt, quod  
spectanda quidem & fere prodigiosa natura  
lasciuientis, vt ita dicam, ostentatione, non vt  
superior, vnicum caput profert, sed plura, alia  
ab aliis discreta, in vnum tamen tanquam a-  
ceruum congesta, è venosis multis foliis con-  
globata, alia maiora, alia minora, inusitata qua-  
dam & rara specie. Quidam id terræ, cui se-  
men creditur, vbertati adscribunt, quæ tam co-  
piosum alimentum præbet, vt gignendis atque  
nutriendis tot capitibus sufficiat.

Miranda est aliis Brassicæ albæ & peregrini 5. spec.  
næ natura, quam Dodonæus Pompeianam vo-  
cat, aut Cypriam, & Brassicam floridam, *Chou*  
*de Cypre*, &, *Chou fleur*, Itali *Caulifiori*. Primum  
enim folia profert Brassicæ albæ & lævis mo-  
do, quadamtenus cinerea: deinde ex ipsorum  
medio foliorum conglobatorum veluti centro  
cauliculus multos, crassiusculos, candidos, dul-  
ces, multis & breuibz ramulis vestitos, pari  
proceritate, & in sese conglomeratos. Hos cau-  
liculos huius Brassicæ florem appellant. Nec



*BRASSICA Pompeiana, aut  
Cypria, Brassica florida Dodo.*

*BRASSICA Asparagodes  
Dalechampij.*



minus mira est ea Brassica, quam asparagodem esse herbarij censent, cuius mentio fit in Geoponicis Casiani Constantino attributis.

6. spec.

Caulis & radix eadem quæ in cæteris Brassicæ generibus. Folia nunc sunt laciniata, & frequentissimis diuisuris incisa, qualia Brassicæ crispæ, nunc plana, lata, & expansa. Eadem nonnumquam tota virent, nonnumquam venis per ipsa folia

*BRASSICA RAPOSA.*



7. spec.

In lib. 1.  
de Plant.

dispersis, & media costa rubent. Huic vero id peculiare est & insigne, quod ex foliis ramuli multi, breues, torosi, foliosi nascuntur, florentes suo tempore, & semen edentes, nõ aliter quàm in reliquis plantis, ex caule, vel stipite, quorum ramulorum cum asparagis similitudo fecit, ut hanc Brassicam asparagodẽ Græci vocauerint. Hi tenelli asparagi in iure aliquo pingui, ut capi, aut veruecinæ eduntur.

Admiranda verò magis, & veteribus, opinor, incognita ea Brassica (nisi sit rapitius colis Cætonis) quæ γορτυλαρραβον nominari potest, idest Brassica raposa, Gallice Chourave, quod caulis in magnum, carnosum, & rotundum caput extuberat rapi modo, intus etiam album sicuti rapum, è quo folia nascuntur, reliquis Brassicis similia, laciniata, viridia, longis, crassisque fultis pediculis. Ex eodem cum albis floribus cauliculi prodeunt. Caulorapum vocat Scaliger. Vidimus, inquit, hunc cinnam vtriusque naturæ. Sed Brassicæ radix sub terra condita fuit, rapum supra terram in stipite turgescere. Dodonæo est



est Brassicæ candidæ quartum genus. Tuber rapi modo in frusta concisum, & elixum estur cum aceto & pipere, magna eorū voluptate qui Brassicis delectantur. Alij in iure capi veruecinæ & vitulinæ coquunt, sic lautiore apparatu, & meliore gustu: quomodo trambaspa agorum parari solent tenelli asparagi, vt dictum est.

**BRASSICÆ RVBRÆ**  
prima species.



**BRASSICA NIGRA**  
Dodonæi.



Hæc albæ Brassicæ genera. Quarum primæ similis est Brassica nigra, Gallicè *Chou noir*, cui stipites longi sunt & proceri, folia grandia, lata, nigricantia, rugis multis asperata: flores lutei: semen & siliquæ vt cæteris.

Brassicæ rubra foliis est magnis, latis, lacinia-  
tis, læuibus in viridi fusco rubescentibus, venis  
etiam rubescentibus per transversum virgatis:  
floribus luteis: siliquis longis & gracilibus: se-  
mine minuto, rotundo, exterius fusco, interius  
flavescente, napi vel rapi semini simili, sed ma-  
iore. Hæc Brassica est Cumana & rubra, & Bras-  
sica lævis Catonis Dodonæo, quæ prima omnium  
à Fuchsio descripta est, Gallicè *Chou rouge*.

Brassicæ rubra secunda species superiorem  
foliis plane imitatur, sed tempore folia quæ in  
medio sunt, alia aliis incumbantia, vt in Brassi-  
ca alba capitata, conglobantur, eaque rubescen-  
tia, aut purpurascantia. Dodonæus Brassicam  
Lacuturram appellat, Galli *Chou capu rouge*.

Tertia species folia habet incisâ, cæterum  
colore, floribus, & semine primo generi proxi-  
ma, Dodon. Brassica *σελινοειδής*, Latine Apiana.

Quarta foliis est valde rugatis crispisque cæ-  
tera superioribus similis. Nigram Dodonæus  
vocat. Fuchsius Brassicam crispam, & *σελινοειδής*,  
idest Apianam à similitudine apij, Galli *Chou*  
*cre. feu noir*.

Huic adiungenda Brassica crispa Tragi, quæ  
radice, caule, flore, semine, sapore, superioribus  
generibus similis, folia gerit plane illis dissimi-  
lia, hoc est crispa, & per ambitum incisâ, veluti  
crispa lactuæ. Quamquam in hoc genere quæ-  
dam frequentioribus & profundioribus, aliæ  
rariotibus & minoribus incisuris dissectæ sint.

Ad idem genus referenda Lobellij Brassica  
tenuifolia lacinia-  
ta, cuius gemina est varietas.  
Prior foliorum lacinias incisuras ad medium  
vsque neruum habet, artemisia, eryngijve cam-  
pestris ritu, quæ hic appicta est.

Alterius fimbriata magis, lacinia-  
ta minus  
sunt foliata, quæ eadem est, aut valde similis Sa-  
bellicæ Dodonæi.

Id postremum Brassicæ rubrae genus ponit  
Dodonæus, quod est omnium minimum, & fe-  
re siluetri simile. Caulibus & foliis primum

Brass. rub.  
i. species &  
forma.

Lib. 5. ca. 6.

Brass. rub.  
ij. species.

Lib. 5. c. 6.

Brass. rub.  
ij. spec.

Ibidem,

Brass. rub.  
iii. spec.

Lib. 2. c. 59.

Ibid.



*BRASSICA Crispa Tragi.**BRASSICA Tenuifolia laciniata.**BRASSICA Siluestris.**BRASSICÆ III. Genus Fuchsj.*

genus maximè refert, nisi quod ea minora habet. Vix in cibos admittitur, sed feminis tantùm gratia feritur, ex quo exprimitur oleû, quod vulgò olei ex naporum femine expressi nomine venundatur. *Huile de nauette* Galli vocant. Hanc tertiam esse Catonis Brasicam existimat Dodonæus, quæ Crambe propriè dicatur.

Ibid. De Brasicæ satiuæ generibus satis multa: nunc de agresti, quæ *rapum* in *argel*, no-  
 Forma Brasicæ siluestr. minatur, id est, Brasicæ siluestris. Foliis & floribus Brasicæ rubræ secundo & vlti-  
 mo



mo generi planè similis est, nisi quòd Caules foliâque minora habet, candidiora, hirsutiora, & gustu multò amariora. Cui planè similis est tertia Brassicæ sativæ species Fuchsi, hic appicta.

Alias duas Brassicæ silvestris species descripsit Cordus. Quædam est, inquit, quæ Lib. 1. plan. ca. 31. caulem erigit bicubitalem, & ferè teretem, glabrum, intus medullaceum, cui statim à terra vique ad summitatem iunceæ gracilitatis deinceps adnascuntur rectæ virgæ, longitudine cubitali. Sub his iuxta exortum singula sunt folia longitudine digitalia, inferiùs vncie, aut interdum duùm digitorum latitudine, in mucronem desinentia, pingua, & glabra, sine pediculo caulem & virgas veluti sinu quodam circum amplexentia. Totis virgis siliquas erectas producit, digiti longitudine, valde graciles, intus sinapi similia semina continentes, quæ per longitudinem in duas partes tenuissima quadam membrana diuiduntur. Flores vere & æstatis initio in summis tantùm virgis apparent candidi, minimis quatuor foliolis, & paucis staminibus constantes. Floret particulatim. Itaque simul maturas & maturescen-  
tes siliculas, simulque flores habet. Radix subest dodrantalis, digiti mediocris cras-  
titudine. Tota herba sativam Brassicam sapore æmularur. Alia Brassicæ agrestis  
species est, inquit idem Cordus, quæ cubitalem habet caulem, teretem, glabrum, Lib. 1. plan. ca. 32. aliquantulum concavum, & in ramulos diuisum: folia ex intervallo singula pro-  
fert secus ramulorum eruptiones, trium aut quatuor vnciarum longitudine, pau-  
lo angustiora, subrotunda, glabra, & Brassicæ modo corrossa: flores veris exitu  
candidos & oblongos fert, quibus singulæ succedunt siliculæ, digito longio-  
res, angustæ & quadrangulares, oblongo nigròque semine plenæ. Radice niti-  
tur exigua, lignosa, semestri, & inutili. Folia Brassicam gustu imitantur: semen  
verò amarior est, & aliquantulum acre. Nascitur pinguibus agris, lento & glu-  
tinoso solo. Hæc Cordus.

BRASSICA Campestris  
Clusij.



Clusius Brassicam aliam campestrem pinxit Lib. 1. stirp. i. Hisp. c. 61. & descripsit, quæ caules pedales habet, candi-  
cantes, rotundos, ramulos aliquot, folia per in-  
terualla, perfoliatæ similia, candicantia, colore  
Brassicæ, gustu feruido, caulémque sic ample-  
ctentia, vt tenellæ plantæ plurimum ad perfo-  
liatam accedant, in ramulis ex alis exeuntibus  
flores insident candidi, Brassicæ floribus simi-  
les, deinde cornicula, siue siliquæ oblongæ, qua-  
drangulæ, in quibus continetur semen minutum.  
Alterum eius genus firmioribus virgis, neque  
adeo ramosis, cuius folia in summo aliquantul-  
um serrata, & calidi etiam vt alia gustus: flores  
priori similes, maiores, leucij aut violæ ma-  
tronalis æmuli, purpurei, & floribus Bolbonac  
non absimiles, vtriusque radix licet dura, fibro-  
sæque & candida, annua tamen est. Plurima re-  
gno Murciano ad Eliocratam urbem, vulgò  
horca, in agris & iuxta vias nascitur. Floret mar-  
tio. Primum genus agro Viennensi etià frequēs.  
Incolæ Hispani *Collejon* appellant, quasi Brassi-  
culam. Sunt qui Brassicam semine quadrângulo  
vocent. Poteest etiam Brassica campestris nun-  
cupari. Eius acrimonia proxime ad Brassicæ facultates hanc plantam accedere  
indicio est. Perfoliata siliquosa à Lobelio nominatur.

Brassicam



Brassicæ  
marinæ  
Forma.  
Lib. 2. c. 15.

**BRASSICA MARINA**  
*Soldanella officinarum.*



In libr. 2.  
Diosc. c. 15.

Lib. 2. c. 54.

Lib. 3. c. 54.

In Hort.  
Germ.

Ibid.

Locus.

Ibid.

Brassicam marinam his adnumeravit Dioscorides, quæ Græcis *αρδύλην γαδάρια* dicitur. A fatiua prorsus abhorret, inquit, quod folia ferat rotunda aristolochiæ, longa, tenuia: singula è ramulis rubentibus exeunt, singulari vt hederæ pediculo: albo succo prædita est, sed paucò, falso gustu, sed aliquantum amaro, pingui concretu. Hanc Brassicam censent herbarij peritissimi eam esse stirpem, quam officinæ Soldanellam & Soldanam appellant, etsi scripserit Dioscorides folia habere rotunda aristolochiæ, longa. Quippe quæ in maritimis nascatur, ramulis constet rubentibus, ex quibus prodeunt folia, vt in hederæ, quæ lacteum succum emittunt, gustuque salû & amara, & quadamtenus acris percipiuntur. Quare locum Dioscoridis mendo non carere rectè videtur Matthioli existimasse, faciliq; librariorum lapsu euenisse, vt folia *μακρά*, idest longa, pro *μικρά*, idest parua nunc legamus. Tamen in nostris Dioscoridis exemplaribus nō legimus huius Brassicæ folia *μακρά* neque *μικρά*, sed *διμήκη*, idest prælonga. Dalechampius legit *πρὸς ῥηκην*, idest porrecta, quod est

verissimum. Quo Dioscoridis loco sic emendato, Soldanella omnibus planè notis Brassicam marinam Dioscoridis refert. In qua etiam sententia cum sit Ruellius, quod Soldana vulgo dicta, vt scribit, cum tota Dioscoridis pictura nulla reclamante nota videatur subscribere, in eo tamen errat, quod eam folio aristolochiæ longæ, atque etiam prælongo esse prodiderit. Rectius Dodonæus qui Soldanellæ siue Brassicæ marinæ folia tribuit asari, aut aristolochiæ rotundæ, sed minora. Errat præterea Matthæus Siluaticus pandectarum auctor, quod Soldanellam Arabum Chachile esse crediderit, cum Serapio Chachile vsineæ simile esse, folioque non aristolochiam, sed nasturtium imitari tradiderit. Brassica marina, vt rectè ait Gesnerus, toto genere differt à Brassicis, nec aliud quàm nomen commune habet. Eam opinor ob causam, Dodonæus non ceteris Brassicis, sed smilacibus læuibus, & conuoluulo subiunxit. Nam graciles & rubescentes cauliculos, seu viticulas per terram spargit, à quibus exeunt folia parua, rotunda, viridia, hederæ foliis rotundiora, & viridiora, asari aut aristolochiæ rotundæ similia, minora tamen. Flores smilaci læui & minori similes, rubescentes siue purpurei: semen nigrum in siliquis, aut rotundis capitulis, vt smilacibus: radix longa & tenuis. Denique smilaci minori proxima est, demptis foliis, quod rotundiora sint, crassiora, & gustu salû. Prouenit abundè in Zelandia, & Flandriæ litoribus marinis, in litoribus etiam Venetis, inquit Matthioli, Aquilecensibus & Tergestinis.

Pena, Brassicam aliam perpulehram marinam siluestrem, à Dioscoridis specie diuersam, locis oriundam Angliæ maritimis ad Portlandiam insulam depinxit, sed quia inculta, neglecta, hispidior tota & prædura est, cymæ ingratiore multo, cibo toleranda tamen. Turnerus *μυρδαμίδαν* & *μυρδαμίδαν* à singulari semine vocabat. Sunt enim in florum pallentium alborum congerie eleganti, densa & umbellifera multis in ramis, siliquæ breuiores, crassiusculæ, quibus singulis singulum inest semen, paulo minus pisò, Soldanellæ aut orobi æquale: folia eadem ferme quæ Brassicæ nigra, sed crassiora & latiore aspectu, & fimbriis undulatis, plicisq; admo



BRASSICA MARINA  
silvestris, Monospermus Penn.

admodum artificiosa. Silvestris Brassica in maritimis Senensibus, Argentario promontorio, aliisque tum Thyrrheni, tum Adriatici maris littoribus frequens nascitur. Hanc non longe à Terracina vrbe, via qua itur Neapolim plurimam vidisse se affirmat Matthiolus, folijs domesticæ similibus, sed hyoscyami modo hirsutis, amaro & insuavi gusto. Sic & Dioscorides maritimis præruptisque locis magna ex parte gigni prodidit, sariuæ similem, sed cãdidiorem, hirsutiorem, & amatam. Reliquæ Brassicæ in hortis passim proueniunt. Frigidis verò & pluuiis regionibus positio earundem optima. Salis etiam aquis iuuari Brassicam, & his rigatam meliorem fieri tradit Theophrastus: quare nonnullos nitro aqua permisto aspergere Brassicæ, vt Ægyptios, atque ita multò dulciorem tenerioremque effici, sicuti etsi priusquam coquatur, sale commaceretur. Martialis nitrata aqua viriditatem conseruari scribit his versibus.

*Næ tibi pallentes moueant fastidia Caules,*

*Nitrata viridis Brassica fiet aqua.*

Palladius non nitratam aqua, sed nitrum ipsum inspergi iubet his verbis. Celerius coqui virore seruato, si dum est trium vel quatuor foliorum, nitrum tritum cribello desuper spargas, vt speciem pruina candentis imitetur. Quæ ex Geoponicis Calsiani Constantino attributis transcripta videri possunt. Εἶδεναι χρὴ ὅτι τὴν κρέμειν ἐν ἀμυρῷ τὸ πρῶτον ὡς εἶρην ὡς ποσὴν ἐστὶ. διὸ χρὴ περιφύλλω τὴν γεομένην, νίτρον λεῖον, ἢ ἀμυρῶν δαγὴν διὰ κοσκίνου κλίσας τὸ θῆναι πάλαι, ὥς δόξῃ ἐν αἰνῇ πεπαχυῖν. τὸ πρῶτον δὲ τὸ τρῶτον ἐξ ἀνδρείου γίνεσθαι. Quorum quædam cum ex vetere quopiâ scriptore, Didymo fortasse (quæ in Geoponicis postea exscripta fuerint) Plinius exprimere vellet, aut non intellexisse, aut alioqui corruptū locum videtur descripsisse: sic enim ait. Sunt qui plantant (Brassicam) in transferendo alga subdita pediculo, nitroque trito, quod tribus digitis capiatur, celerior ad maturitatem fieri putant. Sunt qui semen trifolij nitrumque simul tritum aspergunt folijs. Nitrum in coquendo etiam viriditatem custodit: aut Apiciana coctura, oleo ac sale priusquam coquantur maceratis. Hic Plinius trifolij semen habet, pro περιφύλλω κρέμειν γενομένην, id est, Brassica trium foliorum, vt rectè Palladius conuertit. Brassicæ Augusto mense potissimum florent, ac subinde etiam semen proferunt. Brassica sariua, vt scribit Dioscorides, aluo idonea est, si modo leuiter feruesfacta edatur. Nam percocta aluum sistit, sed multo magis bis cocta, aut quæ in lixiuo coquitur: stomachum autem male habet: acrior est aestiua. In Ægypto propter amaritudinem non estur. Cæcutientibus & tremulis esse prodest. Summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxā restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendam vrinā validior. Ea condita, siue sale asservata stomacho inimica est, aluum conturbat. Crudæ succus cum nitro & iri deuoratus, aluum emollit (legendum enim Græcè, ὅ δὲ χυλὸς ἀντὶς ὤμης, non ὤμης, id est crudus succus, vt vertit Ruellius) cum vino quoque potus viperarum moribus auxiliatur: cum fœnigræci farina & aceto podagris, & articulorum vitijs illinitur: prodest & sordidis vlceribus, & vetustis illitus: caput purgat naribus infusus: menses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per se illita, aut cum polenta trita conferant inflamma

Ibid.

Lib. 2. c. 125.

Lib. 2. cauf. c. 7.

In Xen. Corn. in lib. 7. comment. phar. local.

Lib. 3. c. 24.

Lib. 12. c. 17.

Lib. 9. c. 8.

Tempus.

Vires &amp; Temper. Lib. 2. c. 125.



- inflammationibus, tumoribúsq: epinyctidas, ignem sacrum, lepráque sanant. Carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent. Elixá autem ac mellis permixta gangrænarum corrosionibus auxiliantur (meliùs quàm quomodo vertit Ruellius, cocta addito melle aduersus depascentia vlcera, gangrânáque valent, cum Græcè legatur, ἐσθιόμενα ὃν μὴ γινόμενα μέλισι πρὸς νομὰν γαγγραιῶν ποιεῖσι) Cruda verò cum aceto si edantur, lienosis profunt (Græcè habetur, αἰσθόμενα μὴ ὄξος ἀληνικὸς ἀφελῇ, quæ parum dilucidè reddidit Ruellius, lienosisque ex aceto cruda profunt.) Mansa deuorato succo interceptam siue abscissam vocem instaurant, (Ruellius φωνῆς ἀποκοπὴν retusam vocem non satis rectè videtur reddidisse.) Decoctum eius potu aluum & menses ciet. Flos sterilitatem adfert, siue conceptionem impedit post puerperium, siue partum in pello subditus (Græcè legitur, τὸ ὃ ἄνθος ἀπόκιον μετὰ τὴν ἀποκύησιν πρὸς ἐθὲν ἐν πρῶσῳ, quæ sic Ruellius, flos post conceptionem in pello subditus, partum abortu viriat.) Semen eius præsertim, quæ in Ægypto nascitur potum tineas pellit. In antidota theriaca additur: faciei cutem lentiginésque expurgat. Virentes cauliculi cum radice cremati, & adipe porci velutusto excepti, diurnos laterum dolores mitigant. Siluestris Brassicæ cyma in lixiuo cocta ori non insuavis. Folia illitu vulnera conglutinât, & inflammationes tumorésque discutiunt. Marina Brassica in totum stomacho inimica, acris: vehementissimè aluum ciet in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne. Hæc Dioscorides, in quibus quæ de foliis manducatis tradit: Asclepiades Galenum de cauliculis ad vocem interceptam præscripsit. Brassicæ viridis cauliculos absterfos manducandos præbe, & quod instar palearum exuccum est, expuere iube, succum verò delingere. Alia, Brassicæ succum cum melle coctum delingendum exhibe, auxiliabitur confestim. Quæ verò cyma Brassicæ dicta est, à Dioscoride κύημα appellatur. quid autem sit, declarat Plinius his verbis. Cymas à prima sectione præstat proximo vere. Hic est quidā ipsorum caulium delicatior teneriôrque cauliculus. Et paulò post, post cymam ex eadem Brassica contingit æstiuū autumnalésque cauliculi, mox hiberni, iterumq; cyma, nullo atque genere multifero, donec sua fertilitate consumatur. Cymas itaque τὰ κυήματα Plinius dixit, quæ Collumella in carmine Cymata appellat per synæresin.
- Frigoribus caules, & veri cymata mittit.*
- Lib. 2. Alim. Id quod Galenus adnotauit, ὁ μὲν οὖν, inquit, τῆς κρέμλης (ἀσπαραγὸς suba.) ὃν κύμα καλεῖσιν ἔνιοι, καὶ συναίρεσιν ἐμπὶ δλοκῆν, τὸ διὰ τειῶν συλλαβῶν ὀνόματος, λεγόμενον τὸ κύημα, τῆς κρέμλης, &c. Id est, Brassicæ igitur germen, quod nonnulli etiam κύμα nominant per contractionem, opinor, nominis trissyllabi κυήματος, & cætera.
- Lib. 2. co. ph. loc. ca. 1. & Corn. ibid. Eadem cymata prototomi caules appellantur à Galeno, quo loco & si corrupta sint vulgata exemplaria, quæ habent πρὸς τομῶν καυλῶν ἀφελῆματος καὶ ὄξος β. νήσῃ δὲ δομένους ἐπὶ ἡμέρας θ', non dubium est quin legendum sit πρὸς τομῶν καυλῶν, & cætera.
- Lib. 2. c. 125. Id est, Prototomi caulis decocti cyathos duos ieiuno ad dies nouem exhibitos. Cuius auxilij ab Archigene ad renum affectiones præscripti efficacia, & prototomorum caulium lectio à Dioscoride confirmatur. τὸ ὃ αὐτῆς (κρέμλης) κύημα, inquit, ὡς τομαχώτερον μὲν, λεμνύτερον δὲ, καὶ ἔρητικώτερον. Id est, Brassicæ cyma stomacho commodior quidem est, sed acrior, & magis vrinam ciens. Eorumdem caulium meminit & Martialis.
- Lib. 10. *Et faba fabrorum, prototomique rudes.* Item.
- Lib. 14. *Quum mihi boleti dederint tam nobile nomen, Prototomis, pudet heu, serui cauliculis.*

Appellantur autem prototomi à prima sectione ac cæsura, quando videlicet ad feminis generationem augescerent succiduntur, & in ciborum vsum veniunt.

Cap. 20. A Marcello caules Haplofiles à teneritudine Græca appellatione dicti sunt. Brassica lat.



ficæ laudes longum exequi, inquit Plinius, quum Chrysippus medicus priuatim volumen ei dicauerit, per singula membra hominis digestum, & Dieuches. Ante omnes autem Pythagoras & Cato non parcius celebrarunt. Quæ fusiùs persequi prolixum nimis & superuacaneum foret. Quare ea qui volet apud Plinium & Catonem legat, sed ita vt Catonis de Brassica iactatas religiones nihil moretur. Id vnum ex Plinio dicemus, quod & Dioscorid. sententiæ cōsentaneum est, Brassicam vino aduersari, vt inimicam vitibus. Antecedēte in cibis cauere ebrietatem, postea sumpta crapulam discuti. Haud ita multo post scribit Siluestre Brassicam inimicissimam vino, quam præcipue vitis fugiat, aut si non possit fugere, moriatur. Et alio in loco, pernicialia esse Brassicæ cum vite odia. Quæ cum recte ex veterum sententia dixisset, ea quæ sequuntur non sine errore scripsit. Quorundam natura non necat quidem, sed lædit odore, aut succi mixtura, vt Rhabbanus & Laurus vitæ. Olfactrix enim intelligitur, & tangi eam odore mirū in modum. Ideoque cum iuxta sit auerti & recedere, saporēque inimicum fugere. Hinc sumpsit Androcides medicinam contra ebrietates, Rhabbanum mandi præcipiens: pro Rhabbano enim hic Brassicam bis reddere debuerat. Transtulit enim locum illum ex Theophrasto, qui *ράβανον* dixit, quod supra ostendimus, vt & veteres Græci, quam quidam & posteriores *κράμεινον* vocauerunt. *Ἔνια δ' ὁ φθέρει μὲν, χεῖρ' ὁ δὲ ποιεῖ ταῖς λιναίεσι τῶν χυλῶν καὶ ὀσμῶν, οἷον ἡ ῥάφανος, καὶ ἡ δίαφρη τὴν ἀμπέλον. ἀσφραγίζονται φῆσι, καὶ ἔλθουσιν. Διὸ ὅταν πωλησίον ὁ βλαστὸς γένηται, πάλιν ἀναστρέφειν, καὶ ἀφορεῖν, ὡς πολέμιας ὕλης τῆς ὀσμῆς. Ἀνδροκίδης καὶ παρὰ δεισιμαλίᾳ τὸ τῷ χεῖρ' ἐχέτω πρὸς τὴν βοήθειαν τὴν ἀπὸ τῆς ῥαφάνος γινομένην πρὸς τὸν οἶνον. ὡς ἐξελαύνουσιν τὴν μέθην. φάσκει καὶ διὰ καὶ ῥάβαν τὴν ἀμπέλον τὴν ὀσμὴν.* Sed & quod alio loco Plinius scripsit, Odium his (rhabbanis) cum vite maximum, refugitque iuxta *ῥατος*, de Brassica intelligi debet, non de raphano. Cur autem crapulam sedet Brassica, id causâ reddidit Aristoteles, quod dulcem succum abstergentēque contineat: quare eo medici ad eluendam aluum vtuntur. Ipsa autem frigida est: nam ad vehementes diarrhoeas vtuntur medici valde cocta, caule purgata, refrigeratāque. In iis autem qui crapula tentantur, Brassicæ succus crudos humores & vinosos in aluum attrahit, ipsa in ventriculo remanens refrigerat corpus, quo refrigerato tenues humores in vesicâ feruntur. Quum igitur humores, vtrinq; abiguntur, refrigerato corpore, illos crapula liberari perspicuum est, præsertim quum sequax vini vapor humoribus deorsum conuersis deuocetur, & præceptum ad ima deuoluatur, qui sese efferens in caput, mentis arcem obsidet, & temulentiam grauitatēque creat. Galenus ex Apollonio in dolore capitis ab ebrietate ad refrigerandum repellendūque, rosaceum per se, & cum aceto, aut hederâ, aut Brassicæ succo præscribit. Quin & ipsa Brassicæ folia calida macerata, capitique circumposita, ac obligata naturaliter ebrietati resistere ait. Sed de Brassicæ facultatibus idem verissimè disserit alio loco, his verbis. Brassicæ succus facultatem habet purgatricem, corpus autem ipsius communi siccantium ratione sistit magis, quàm ad deiiciendum incitat. Quum igitur quæ in ventre continentur excernere voluerimus, è propinquo cacabo in quo cocta cum aqua fuerit, extractam ipsam protinus in vasa, in quibus oleum cum garo paratum fuerit, conicere conueniet: nihil autem retulerit, si salem loco gari sumpseris. Quod si humentem aluum siccare voluerimus, priorem aquam, vbi Brassica mediocriter cocta videbitur, effundentes, aliam calidam mox iniicemus: ac deinde rursus Brassicam, quoad contabuerit, ei incoquemus, quod non facimus cum ventris deiiciendi gratia sumitur: volumus enim hoc casu proprium ipsius succum omnem nō deponere, sed quoad maximè fieri licet, retinere. Porro nihil quod coquitur, proprium succum seruare omnino potest: quin potius omnem abiicit, si coctū diutius fuerit: Brassica paucum habet alimentum, & edulium

Lib. 20. c. 9.

Ibidem.

c. 137.

Lib. 20. c. 9.

Lib. 24.

præfat.

Li. 17. c. 24.

Lib. 4. hist.

cap. 20.

Lib. 19. ca. 1.

Probl. sec. 3

Lib. 2. com.

phar. local.

Li. 2. Alim.



est non firmum, sed laxum. Succum habet non probum, ut lactuca, sed prauum & graueolentem. Quod verò ad vrinas attinet, nihil ipsas, quod sciam, insigniter neque prouocat, neque moratur. Brastica germen quod nonnulli *xyris* nominant, minùs quàm Brastica ipsa siccatur, tamen si aliorum olerum caulis temperatura ut plurimum est quàm folia sicciora, potissimum quàm iam prope est, ut semen profundant. Et, Brastica esculenta desiccandi vini habet, tum etiam, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioquin & vlcera glutinat, & maligna vlcera sanat: præterea phlegmonas iam induratas, ac ægre solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se absterfitorium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maxime Brastica Aegyptia: quoniam ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amara qualitas semen particeps est: sicut videlicet alia omnia medicamenta, quæ ad lumbricos idonea sunt. Eadem facultate et helidas & leudes, & quæcumque modicam absterfionem postulant, adiuuat. Porro caules Brasticae combusti cineres efficiunt admodum desiccantes, ut videlicet iam & caulicam vini participant. Hac ratione et veterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent nam valenter digerens medicamentum efficitur. Brastica agrestis quodammodo calidior, sicciorque est quàm domestica: cetera alia propemodum omnia agrestia sui generis domesticis vtraque facultate valentiora sunt. Quamobrem neque intra corpus citra noxam sumitur, ut quæ longius ab humana recesserit temperatura. Eadem de causa & gustantibus amarior est quàm domestica: quanquam domestica quoque acrimonia non nihil & amaritudinis contineat: sed vtramque agrestis habet validam: quare etiam extergit, & digerit quàm domestica valentius. Brastica marina præter quàm quod veterem deiciat, ut pote subsalsa, & amara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis vsus, & ad ea omnia, ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea. Hæc Galenus. Symeon Serhi malum, inquit, & melancholicum iucum Brastica procreat, visum hebetat, & somnum per tumultuosa insomnia interturbat. Succus eius aliquatenus purgat: corpus verò eius ventrem silit. Quapropter in quibus humectam aluum siccare volumus, ipsam modicè decoquentes, aquamque primam abicientes, confestim alteri aquæ feruenti indimus: nihil enim neque aeris, neque frigida aquæ quod bis coquitur tangere debet. Aestiu Brastica peioris succi est quàm hyberna. Et verò vrinam, lumbricos interficit, & iis qui ex vino crapula laborant auxiliatur. Fertur autem ab humiditate ortam hebetudinem sanare. Cocta cum pingui carne, plurimum noxæ atque vitij amittit. Flos eius proprietate quadam, semen genitale corrumpit vtero impositus, & mulieres concipere prohibet. Pulmonem lædit. Tradunt quoque si ante alios cibos assumpserit, ebrietatem arcere. Et quod eius succus cum melle sumptus, magnificè defectiones vocis iuuat. Vulneribus imposita ea conglutinat, & malefica vlcera, & induratas inflammationes sanat. Brastica semen crassiusculè confusum, inquit Matthiolus, & in carniū iure seruifacit, potumque vnà cum ipso iure colico dolore laborantes presentaneo remedio iuuat. Brastica tormina discit, si bis cocta edatur addito cymini semine, sale, oleo, & hordeacea farina polline: præsertim si sine pane deuoretur. Idem facit ius decoctæ cum vetere gallo. Idem proudest iocinorosis, lienosis, & renū calculo laborantibus. Prodest per cocta tabidis, si frequenter edatur. Succus ex melle coctus visum clarificat, angulis tantum oculorum illitus. Datur succus vtiliter potandus aduersus fungorum venena. Cocta, & longo pipere aspersa, vnàque cum iure sumpta, nutritibus lactis vbertatem præbet. Caulium medulla ex cremore amygdalino decocta, & cum melle in ecclignatè parata, datur lambenda magna vtilitate anhelosis.

Marina

In libr. 2.  
Diosc. c. 113.



Marinæ Brassicæ decoctum cum rhabarbaro potum, ad vacuandas hydropicorum aquas plurimum valet. Idem præstat eius pulvis additis rhabarbaro, & cubebis, sæpius ex vino haustus.

B E T A, CAP. II.



QVOD olus Græcis τετταλον vel σελταλον, Latinis Beta dicitur. σελταλον Nomina autem Græci ab impulsu nominarunt: etenim cultus ratione quadam incrementum capefit arboris, neque vlli hortensium latitudo foliorum maior, quæ in binos pedes aliquando se pandunt, foli natura conientiente, & quibusdam locis amplissimæ Betæ proveniunt. Betæ nomen positum fuit, quod figuram β literæ, dum semine turgēt, referre videatur, nam summitatem in cacumine reflexam habet, id quod testatur nobis reliquit Columella his versibus.

Lib. 10.

Nomine cum Graio, seu litera proxima prima  
Pangitur in cera docti mucrone magistri,  
Sic & humo pingui ferrate cuspide ictu  
Deprimitur folio viridis, pede candida Beta.

Arabibus Decka, & Celb, Italis Bietola, Gallis Bete, Iote, Poerce nominatur, Germanis Mangolt, & Pieffen, Hispanis Aselgas. Beta duorum generum est, inquit Dioscorides candida, & nigra. Plinius, Beta hortensiorum leuissima est. Eius quoque à colore duo genera Græci faciunt, nigrum & candidius, quod præferunt parcissimi seminis: appellântque Siculum, candoris sanè discrimine præferentes vt lactucam. Quæ ex Theophrasto exscripsit: ὁ χυλότερον ὃ ἐν τῶν τετταλῶν τὸ λευκὸν τὸ μέλας, ἢ ὀλιγοσπερύτερον, ὃ χαλῶσι τινες σικελικόν. Sed quamuis sicula cognomento Beta solummodo candida veniat, vt ex Plinij & Theophrasti locis intelligi licet, tamen nunc extrita vna litera omnibus ferè nostri seculi medicis omnis beta Sicla cœpit nominari. Beta nigra ad atrum colorem accedere videtur, quia ex rubrò nigricat, Gallis Bete rouge, Germanis Rotermangolt vocatur. Cuius aliud est genus radice maiore crassiore, rubra, quæ Beta erythrorrhizos ob id cognominari potest, vulgò Beta Romana. Alij Betam nigram faciunt quæ eadem sit quæ candida, sed nigram vocant à foliorum colore ex obscuro magis virentium. Rubram verò vulgatiorem, quæ alius est nigra, quæ à candida nihil differt, nisi saturo colore rubente, quæ hic ex Lobellio appicta est: rubram aliam, quæ ab aliis secernitur raposa radice effigie. His addidit Dalechampius Betam τετταλον, id est laticaulam, vt quatuor nobis sint hodie Betæ cognita genera. Plinius quoque hæc ad superiora adiunxit. Nostri Betæ genera faciunt vernum & autumnale, à temporibus satuius: quanquam & Iunio feratur. Esse & Betam siluestrem Plinius scripsit, quam Limonium vocant, alij Neuroides, quam Dioscorides non nouit, qui Limonion à Betis valde disiunxit: neque eam sententiam probat Galenus, cum scribit, Maluam vt Lactucam diximus non modo esse satiuam, sed aliam etiam quandam esse agrestem: Nulla autem Beta est agrestis, nisi quis lapathon id nominare velit. Quibus verbis Galenus tam plausibilem ac receptam Platonis sententiam in Timæo ambigua nobis vt esset, effecit, satiuas omnes plantas olim fuisse feras, neque à seipsis nisi cultu differre. Cum enim, inquit Scaliger, lapathum à nobis multo studio huius rei gratia cultum, numquā induerit Betæ faciem, aut saporem, etiam nunc hæremus in illius sententiâ, non omnē plantam mitem, fuisse prius agrestem. Beta candida foliis est grandibus, latis, læuibus, inter quæ caulis exoritur bicubitalis, striatus, circa quem nascuntur flores exigui, in pallido virides, vel lutei stellularum figura. Deinde semen copiosum, rotundum, durum, asperumque.

Genera  
Lib. 2. c. 16.  
Lib. 19. c. 8.

Lib. 7. hist.  
c. 4.


Ibid.

Lib. 20. c. 8.

Li. 2. Alim.

In lib. 2.  
causl. ca. 14.



BETA RUBRA.  
vulgarior Lobellij.In hist. pla.  
cap. 77.


radix subest vnica, crassa, intus candida, in longum protensa, ex cuius lateribus alia modò singula, modò binæ, nonnumquam ternæ funduntur, fibris multis referta. Hinc Beta rubra, siue nigra vulgaris, foliis, caulibus, semine, radice proxima est, nisi quod ei folia caulisque non candicant, sed ex rubro nigricant. Cui Beta rubra Beta alia rubra, siue Erythrorrhizos foliis, caulibus, semine, figura, colore planè similis est, sed radice dissimilis: est enim huic multò crassior, breuior, medio sui ventricosa & turbinata, napi modo: foris, intusque tota rubens sanguineo cruore suffusa, & superiorum radicibus suauior. Fuchsius inter raporum genera recenset, & rapum rubrum vocat, cum tamè rapi species non sit. Beta *ωλεσικαυδος* Dalechampi, in monstrosis, vt ita dicam, plantis numeranda est. Nam vt in cæteris rebus, sic & in stirpibus interdum aut monstra existunt, aut prodigiola quædam, & digna quæ literarum monimentis consignentur. Annò Domini 1557. Cepam vidit, manibusque tractauit Dalechampus, quæ in summa caulis parte, loco seminis bulbos paruos genuerat, & multos, raro prorsus euentu permutatè vices natura, & quod radicem esse oportebat, pro semine sursum extrudente. Non minùs est admiranda Beta species, quam hic depinximus. Cuius caulis est quatuor digitos latus, circa quem parua sunt folia, & quem totum semen operit, sed in eius fastigio ita densum, vt caulis prospectum adimat. Aliquando prope D. Ramberti oppidulum Allobrogum

uos genuerat, & multos, raro prorsus euentu permutatè vices natura, & quod radicem esse oportebat, pro semine sursum extrudente. Non minùs est admiranda Beta species, quam hic depinximus. Cuius caulis est quatuor digitos latus, circa quem parua sunt folia, & quem totum semen operit, sed in eius fastigio ita densum, vt caulis prospectum adimat. Aliquando prope D. Ramberti oppidulum Allobrogum



BETA Erythrorhizos Dodo.

BETA Rubra Matthioli.



BETA Παλιούριος,  
Platycaulos Dalech.



lobrogum in pingui quodam prato talem vidit Dalechāpius siluestris cichorij caulem. In hortis passim, & cultis locis nascuntur Beta. Eas etiam aquis salis iuuari, & iis rigatas meliores effici tradit Theophr. Iulio & Augusto mensibus, floribus & semine turgent. Beta nigra, ut scribit Dioscorides, coquitur cum lenticula ut ventrē sistat: quod magis radice eius praestatur (genus id cibi τὸ Ἰσπανικόν veteres appellarunt.) Candida aluo utilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se, noxij est succi. Vnde succus earum cum melle maribus indutus, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radice & foliorum, furfures lendeſq; deterget: perniones fotu mitigat. Crudis foliis vitilignes nitro antea perfrietas, alopeciarum inanitates, scalpendo prius exasperatas, atque depascentia vlcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustiq; cocta medetur. Plinius de Betis, ut de olere & alimento hæc tradit. Vſus iis & cum lente ac faba, idemq; qui oleris: sed præcipuus ut lenitas excitetur acrimonia sinapis. Medici nocentior

Locus.

Lib. 2. cauf.  
cap. 7.

Tempus,  
Vires &  
Temper.  
Lib. 2. c. 116.

Lib. 19. c. 8.

rem quàm olus esse iudicauere. Quamobrem appositas non memini. degustare etiam religio est, ut validis potius in cibo sint. Gemina iis natura & oleris, & capite ipso exilientis, bulbi. (Nam cum foliis humisparſis caulis ex illorū medio prodicere incipit, eius caput gustu, & callosa quadam firmitate bulbo simile esse videtur.) Et paullo post. Mira differentia si vera est, candidis folui aluos modicè,



Lib. 20. c. 8. nigris inhiberi. Et cum Brassica corrumpitur in dolio vini sapor, odore Betæ fo-  
 lis demersis restitui. Sed idem alio in loco vsum medicum ex Beta præscribit,  
 tum ea quæ Dioscorides, tum alia recensens. Nec Beta sine remedio est vtraque.  
 Siue candida, siue nigra radix recens & madefacta, suspensa funiculo contra ser-  
 pentium morsus efficax esse dicitur. Candida Beta cocta, & cum allio crudo sum-  
 pta, contra tineas. Nigra radices, ita in aqua coctæ porriginē tollunt: atque in to-  
 tum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores veteres, & vertigi-  
 nes, item sonitum aurium sedat, infusus iis ciet vrinam. Medetur dysentericis in-  
 iecta, & morbo regio. Dolores quoque dentium sedat illitus succus. Et contra ser-  
 pentium ictus valet, sed huius radice duntaxat expressus. Ipsa vero decocta per-  
 nionibus occurrit. Albæ succus epiphoras sedat fronti illitus: aluminis paucio  
 misto ignem sacrum. Sine oleo trita, scilicet adustis medetur. Et cōtra eruptiones  
 papularum, coctaq; eadem contra vlcerata quæ serpunt, illinitur, & alopecis cruda,  
 & vlceribus quæ in capite manant. Succus eius cum melle naribus inditus caput  
 purgat. Coquitur & cum lenticula addito aceto, vt ventrem molliat. Validius co-  
 cta fluxiones stomachi sistit & ventris. Galeno verò auctore, succus Betarum ter-  
 gendi vim habet manifestam adeo, vt ventrem ad excernendū incitet, & stoma-  
 chum interdum mordicet, præsertim quibus natura sensu exactiore præditus est:  
 ob idque edulium id stomacho est noxium, si largius sumatur: corpori autem ab  
 ipsa, vt ab aliis oleribus paucum alimentum accedit. Verū obstructū hepar mal-  
 ua magis aperit, & multo magis si cum sinapi, aut omnino saltem cū aceto man-  
 datur. Lienosis item eodem modo sumpta vtile est medicamentum. Et, Beta nitro-  
 sa facultatis particeps est, qua tum digerit, tum exterget, & per nares purgat. Ca-  
 terum cocta nitrositatem omnem exuit, fitq; facultatis phlegmonis aduersa, leui-  
 ter discutientis. Porro ad detergendum digerendūque validior est Beta alba:  
 nam nigra adiunctum habet quippiam adstrictionis, & magis in radice quàm in  
 aliis partibus. Ex Symeone Sethi Betæ succus mediocriter abstergit. Ventrem  
 etiam ad effluxum proritat, & stomachum aliquando vellicat, eorum præsertim,  
 qui hunc valde sensilem habent. Quapropter edulium est stomacho infestum, si  
 plurimum comedatur. Exiguum est eius alimentum sicut ceterorum olerum.  
 Vtilis verò est ad iecoris obstructions cum aceto comesta. Pari modo si edatur,  
 & lienis obstructions bonum fit medicamentum. Constat autem Beta ex  
 contrariis facultatibus: succus enim eius calidus est ventrem constringit, & sitim  
 adfert. Eius verò corpus crassarum partium, flatuosum, concoctu difficile, & fri-  
 gidum, ventremque sistit: maximè si aqua in qua coctum est, subinde abiiciatur.  
 Ad Betarum cocturam vinum & piper expeti scribit Martialis his versibus.

*Vt sapiant satius fabrorum prandia Beta*

*O quam saepe petet vina pipérque cocus.*

Matth. li. 2.  
Diosc. li. 6.

Betæ succus à facibus expurgatus, clysteribus infusus ad indurata alui excremen-  
 ta euocanda mirum in modum valet, præsertim cum lenientia clysmata nihil  
 profecerint. Albæ radix darsa, & melle saléque illita suppositæque, aluum exone-  
 rat. Nigra radix in aqua decocta & illita pruritum extinguit. Succus ex ea expre-  
 sus tum potus, tum illitus, ad serpentium venenosorum morsus confert. Ex Betæ  
 erythrorrhizi radice hyeme in aqua, aut sub cineribus calentibus cocta, & corri-  
 cibus exuta Germani acetaria parant asperso pipere, carotæ vulgo vocata modo.  
 Sed hac illa dulcior est, & gustui gratior. Præterea eiusdem Betæ radices parum  
 elixatas, deinde transuersim in particulas sectas fictili vase cum aceto recondunt,  
 addita raphano agresti, quam *Cren* vocant, minutim concisa. His vescuntur  
 cum assis carnibus.

ATRIPLEX



ATRIPLEX, CAP. III.

**A**TRIPLEX olus Græcis ἀτρίπλεξ & χρυσολόχανον dicitur. Atriplexum vt Festus refert, appellabatur ab atro, vt aliqui putant, colore. Verùm à voce Græca potius quàm ab atrore fluxit nomen. Nam Atriplicis olus ἀτρίπλεξ Græcis dici Columella testatur, Hippocrates ἀτρίπλεξ appellat, Helychius ἀτρίπλεξον, quod ἀτρίπλεξον, & Suidas ἀτρίπλεξον (Atticis, d, literam, in t, mutare frequenter amantibus) Ἐίδος λαχάνος ὁ ἰαχέως εἰς μέγεθος ἀνέσται, id est, quod statim in amplitudinem adolescat: siquidem octauo à satù die profilit, confestimque incremento proficere conspicitur, fidem celeris augmenti facit ereptum in confinio cæteris herbis alimentum. Ac ne in hortis quidem iuxta eam nasci quicquam tradunt, nisi languidum χρυσολόχανον, id est, aureum olus Græci appellant, quod auri colorem repræsentet. Alij tradunt ab aureo siue luteo flore nomen hoc inuenisse. Arabes *Cataf*, seu *Caraf* vocant, Itali *Atriplice*, & *Reppice*. Galli *Arroches*, & *Bonnes dames*, Germani *Molten*, & *Milten*, Hispani *Armoles*. Atriplicis duo genera esse ait Dioscorides, satiuum & siluestre. Dodonæus duorum satiuæ atriplicis generum meminit, duorum item siluestris. Matthioli tres siluestris species exhibet, præterea aliud atriplicis marinæ genus. Atriplex satiuæ radice nititur in altum descendente, fibris multis capillata, ex qua caulis erigitur rectus, rubescens, inferiore parte rotundus, superiore quadratus, ad quatuor cubitos excrefcens, multis vndique adnatis. Folia prope caulem lata sunt, deinde in mucronem desinentia sagittarum instar, pingua, succosa, longa, cum nouella sunt candicantia, perinde ac si farina aspersa essent, cum adoleuerunt colore ex viridi in luteum elanguescente. In caulium summitate flores numerosi coaceruantur, lutei, exigui: dein foliatum semen, & obductum cortice promitur. Alterius Atriplicis satiuæ folia, caules, flores in rubro fufcescunt, inquit Dodonæus, alioqui magnitudine & figura superiori Atriplici proximi.

Nomina

Lib. II. c. 3.

Lib. 2. c. 112.

Genera.

Lib. 4. c. 1.

In libr. 2.

Diosc. c. 112.

Forma.

Ibid.

ATRIPLEX Satiuæ.



Siluestris tam luxuriosa proceritate prodit, vt quaternos sæpe cubitos excedat: caule vt hortensis anguloso, ramoso, & purpurascens: folio hortensi non admodum dissimili, potissimum quod ad colorem attinet, sed paulo minore, & crenato: flore luteo, exiguo: semine racematim congesto, radice fibrata. Atriplex siluestris secunda Matthioli, à Lobellio & Pena dicitur Atriplex siluestris vulgarior, sinuata. Hanc specie distare à satiuæ præter cultum frustra tentatum, etiam folia docent, quæ nigricant plumbeo colore solani, quo cum lubens sociatur in viarum marginibus, frequens etiam circa moenia & fimeta: foliis minoribus, angustioribus, obtuse per ambitum sinuatis, floribus ex luteo herbidis. Atriplex siluestris tertia Matthioli, est *Pes anserinus*, de quo mox. Huc referunt Pena & Lobellius plantam aliâ quam Atriplicem siluestris vocant *Polygoni* aut *Helxines* foliis, Matthioli secunda commentariorum editione Atriplicem siluestris primâ facit. In vinetis & agrorum marginibus frequens occurrit, foliis angustis siluestris Atri-



*ATRIPLEX Siluestris I.**Math. prima editionis.**ATRIPLEX Siluestris I. Math.**Polygoni folio . secunda editio**ATRIPLEX Siluestris II.**ATRIPLEX Siluestris III.*

plicis, spargens humi ramulos striatos, cubitales & sesquicubitales, flore muscolo,  
 & semine folioso, Atriplicis hortensis onustos. Atriplex marina per humum  
 repit, circumquaque caules spargens, in quibus folia sunt subalbicantia, Atriplicis  
 siluestris spinachij oleris figura, sed minora: semen in caulium summitatibus  
 profert,



*ATRIPLEX Marina.*



*POLYSPORON Casiani.*



profert, baccis quibuscumque inaequalibus, racematim coherentibus: radice nititur multiplici, sapore salso, nitidiflore. Huius nulla (quod sciam) à Dioscor. & Galeno facta est mentio, sed iis facilis erit inuentu, qui maritimas stirpes studiosius conquirere voluerint. His inferere possumus ob similitudinē foliorū Polysporon Casiani Anguillaræ, à seminibus florisque muscosi Botrydi non dissimili copia, quibus onusti numerosi cauliculi sesquicubitales exiliores, imis foliis Solani, aut Atriplicis siluestris, sumis minoribus multo & delicatioribus. Hac mire capiuntur pisces, auctore Casiano, cui subscripsit Anguillara experimento nixus. Radix alba, gracilis. Atriplex hortensis nō nisi sata prouenit. Siluestris sua sponte nascitur, prope vrbiū muros, & in capestribus. Vtraque assiduo humore satiari amat. Marina, inquit Matthiolus, in maritimis nascitur, copiosa Tergesti ad salinas in maris littore. Iunio & Iulio mensibus florent, deinde semen proferunt. Atriplex, vt scribit Dioscorides, cocta estur vt olus, aluum mollit. Panos discutit siue cruda, siue cocta illinatur. Semen cum aqua multa potum, regium morbum sanat. Atriplicis vt oleris in cibis vsūm cum blito declarat Galenus, qua de re postea dicemus. Vsum medicum, & temperamentum alibi sic explicat. Atriplex frigida & humida temperie est, humida quidem secundi ordinis à mediis, frigida verò primi, quam vtique tepidam esse caliditatem posuimus, cuiusmodi ros inest: non tamen adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimum terrena, similiter ac malua. Quin & ventrem celeriter permeat, vt illa, ob lubricitatē. Porro parum omnino eius est, quod digerendi obtinet facultatē. Hortenses autem Atriplices & malua, quam agrestes tum humidiores sunt, tum frigidiores. Quare phlegmonis & phygethli incipientibus gliscentibusque, & mollibus etiamnum, ac velut feruentibus hortenses: vigentibus autem ac declinantibus, & indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abstergendi vim habet. Itaque ad morbum regium ex hepate obstructo obortum vtile est. Ex quibus sane verbis tota Dioscoridis sententiā declarata est. Sed quæ de Atriplice Plinius tradit, audire operæ pretium est. Atriplex & siluestre est, & fatuum, accusatum à Pythagora, tanquam faceret hydropicos, morbosque regios, & pallorem, coqueretur difficillimè: ac ne in hortis quidem iuxta id nasci quicquā, nisi languidum culpauit. Addidere Dionysius & Diocles, plurimos gigni ex eo morbos: nec nisi mutata sæpius aqua coquendum. Stomacho contrarium esse, lentigines & papulas gignere. Miror quare difficulter in Italia id nasci tradiderit

*Locus.*

*Ibid.*

*Tempus.  
Vires &  
temper.*

*Li. 2. Alim.*

*Li. 6. simp.*

*Lib. & c. 20*

Solon



Solon Smyrnæus. Hippocrates vuluarum vitiiis id infundit cum Beta. Lycus Neapolitanus contra cantharidas bibendum dedit. Quibus subiicit ea cum quibusdam aliis, quæ Dioscorides & Galenus tradiderunt. Panos, furunculos incipientes, duritias omnes, vel cocto, vel crudo vtiliter illini putant. Item ignem sacrum cum melle, aceto nitroque, similiter podagras. Ungues scabros detrahare dicitur sine vlcere. Sunt qui in morbo regio dent semen eius cum melle, arterias & tonsillas nitro addito perfricent, aluum moueant cocto vel per se, vel cum malua aut lentricula, concitantes vomitiones. Siluestri capillos tingunt, & ad supradicta vtuntur. Scribit Serapio Rhafim vidiſſe hominem quendam, qui ex Atriplicis semine duarum drachmarum pondere sumpto, tum crebris vomitionibus, tum alui deiectionibus adeo vexatus fuit, vt ad extremam virium imbecillitatem deueniret.

Ibidem.

Et Matthiolus pharmacopœum quendam se nouiſſe ait, qui ad rusticos purgandos Atriplicis tantum semen exhibebat, quod iis non sine molestia magna aluum abunde ciebat, simul etiam crebros vomitus prouocabat. Quam facultatem cum scribat Matthiolus paucis hactenus fuiſſe cognitâ, eam tamen à Plinio non prætermiſſam fuiſſe ex ſuperioribus intelligere licet. Atriplex frequentiſſima in Inſubria feritur, quod ex ea præſertim rura ſibi placente genus quoddam conficiant, hoc modo. Acutiſſimo cultello concifa Atriplicis folia caſeo in ſcobem attrito, butyro, ouis commiſcent, & in ſartagine folioſa paſta ſabſtrata decoquunt.

## BLITVM.

## CAP. IIII.

## Nomina



Atini Blitum olus vocant, & ita ſcriptum in quibuſdam Græcis codicibus reperitur. Hippocrates tamen, Theophrastus, & Dioſcorides βλίτον habent, Arabes appellant *Bachala iamenia*. & *Bachale alienania*, Itali *Blito*, Germani *Mayer*, Galli *Blete*. Plinius Bliti nomen ad ignauiam & fatuitatem referre videtur. Blitum iners videtur, inquit, ac ſine ſapore, aut acrimonia vlla. Vnde conuiuium ſceminis apud Menandrum faciunt mariti. Dicuntur etiam ſæpe Hippocrati βλίτοι, & ἀποπληκτοί, ſiderati, ſtupidi, & attoniti. Et

L. 10. c. 11.

Lib. 2. de

morb.

Lib. 2. de

mul. inc.

## BLITVM Album maius.

alio in loco medicamentum ἐκβόλιον habet, quod το πικρόν βλίτον γενόμενον ἐκβόλιον, id eſt, ictum & enectum. Feſtus Blitum appellatum eſſe à ſtupore ex Græco putant, quod ab aliis βλάξ dicitur ſtupidus. Quod nomen in vulgus noſtrum emanauit, ſocordes, inertesque medicos, nulliusque momenti homines Blitres, Bliteos Græca imitatione nominans. Sic Plautus Bliteâ meretricem appellauit. Bliti genera duo, album & rubrum. Ruſus albi genera duo facit Dodonæus, maius & minus. Rubri toridem genera, ſicut & Matthiolus. Blitum album maius ad binum ternumve pedum altitudine aſurgit, caulibus ſerè cinereis, rotundis, foliis læuib, latis, ſubalbicanſibus, Betae vel Atriplici proximis. Flores, deinde ſemen corticeum, copioſum, & racematim coherens, tenuibus inſident ramuſculis ex alarum cauis prodeuntibus, panicularum effigie, vt in ſilueſtri panico. Radix continuo multiplex eſt, & prolixa. Blitum album minus ocyſimè erumpit, caule viridi, ſin culolo, foliis longiuſculis & anguſtis, Betae haud abſimilibus

In Trucul.

## Genera

Lib. 5. ca. 2.

In libro 2.

Dioſc. c. 110.

## Forma.





BLITVM Rubrum maius



BLITVM Rubrum m. nu.



milibus, sed multo minoribus, radice fibrata: floribus in rubro fuscis, semine racemoso, ut in Atriplice. Blitum rubrum maius, quod Polyantes Dalechamplus appellat, proflis ex radice longa, crassa, multum fibrata, nigricante: caule est rubris lineis virgato, ad hominis altitudinem sese attollente, ramoso, firmo: foliis Bliti in viridi sub rubentibus: flore coccineo, spicato, praelongo, in planta summitate numeroso, villis asperiusculis, tanquam aristis munito, luteis punctis maculoso, aspectu pulchro. & ob id expetito: decerpta enim planta raram illam coloris venustatem in flore diu conseruat. Sapor qui & Bliti. Lobellius nomen ei indidit Amaranthi maioris floribus paniculosis, spicatis. Blitum rubrum minus foliis & caule est superiore longe minoribus, quæ tamen adeo rubescunt, ut coccineo colore infecta videantur, etsi temporis tractu tandem purpurascant. Radix etiam sanguineo succo madet. Flores & semen in ramulorum fastigio coherent. Blitum utrumque in incultis prouenit. Sed & seritur in hortis, præsertim rubrum Polyantes, ob coccinei coloris in flore pulchritudinem. Blitum cultis solo cum semel natum fuerit, ipsum se per multa sæcula seminis deiectione reparat, ut etiam si velis vix possit aboleri: satumque semel pluribus annis restibili fertilitate prouenit, nec rancari, nec farriri flagitat. Martio mense seritur, floræque media æstate & autumnis, semineque prægnans est. Blitum estur oleris modo, inquit, Dioscorides. Alio vrile est, nullius in medicina vsus. Blitum & Atriplex auctore Galeno, aliis oleribus sunt aquosiora, & qualitaris expertia: quo fit, ut non ex solo oleo & garo ipsa mandant, sed acetum etiam iniiciant: nam alioqui stomacho sunt noxia. Olera autem huiusmodi ad facilem deiectionem sunt propensa, præsertim si cum humiditate lubricum quiddam habeant: propensionem tamen ac momentum pessum habent non forte, sed exiguum, propterea quod nulla qualitas ipsis inest acris ac nitrosa, quæ ventrem ad excernendum excitet. Porro alimentum corpori præbent exiguum. Et, Blitum

Locus.

Tempus,

Virus &amp;

Tempus.

Lib. 2. c. 10.

Lib. 2. Alim.

Li. 6. simp.

Lib. 2. de

diat.

Lib. 2. de

mal. mor.

Lib. 20. c. 22

olus est esculentum, humida frigidaque temperatura in secundo maxime excessu à temperatis. Hippocrates contra, βλήτον scribit esse θερμὸν & ξηρὸν, id est calidum esse, & ad excernendum non incitare. Et alibi ad fluxum muliebrem rescicandum βλήτον τὴν βολεάνην ὡς γλῶσσαν, ἔσταν ἐν εἰλεῶι ποιεῖν προσθεῖν. Plinius inutile stomacho esse ait: ventrem adeo turbare, ut choleram faciat aliquibus. Dicit tamē aduersus scorpiones potum ē vino prodesse, & clauis pedum illini: item lienibus, & temporum



& temporum dolori ex oleo. Hippocratem menstrua fisti eo cibo putare. Qui Hippocratis locus fortasse est quem paulo ante citauimus, in quo apponendam, & in lana subdendam Blitum herbam Hippocrates præcipit, si mulieribus fluxus sit exsicandus. Plinius tamen in cibo sumendam parum attentè dixit, & *pōov* Hippocrati dictum, menstrua vocauit. Blitum album Tridentina rura *Bredone* vulgo appellant, vt scribit Matthiolus, & à nonnullis in cibū admittitur. Primum aqua decoquat, dein affuso oleo, vel butyro in sartagine frigunt, additis allio, & omphacio, vel aceto. Sed is cibus, vt is vsu sese cōperisse testatur, vomitiones mouet, ventriculi & intestinorum tormina facit, & alui fluxiones ciet excitata bile. Mirū igitur si Hippocrates, Galenus, Plinius, Matthiolus vera scripserunt, quod dixerit Dioscorides Blitum aluo vtile esse, nullius in medicina vsus.

In libro 2.  
Diosc. c. 110.

## SYMPHONIA PLINII. CAP. V.

Nomina  
Lib. 26. c. 7.

Hermol.  
coroll. 159.  
lib. 1. Diosc.

Forma.

**H**anc stirpem Blito propter similitudinem subiunximus, quæ Symphonia Plinio dicta, & Gomphrena (aliqui Cremphenam scribunt, alij Symphonam, alij Comphenam, aut Symphenam) existimari potest, ab Hetruscis hodie *Herba de la marauiglia*, idest, herba mirabilis, ob excellentem & admirandam coloris varietatem in foliis. Radice est breui, candida, in surculosas propagines diuisa: caule vnico, pedali, rubente: foliis Bliti, alternatim viridi, roseo, & luteo colore pictis, sic vt in singulis foliis adultis & perfectis ea coloris varietas iucundissimum intuentibus præbeat spectaculum. Non dissimulandum tamen Plinium scribere Symphoniam esse alternis viridibus roseisque per caulem foliis, considerandumque num velit per caulem sic disposita esse folia intelligere, vt vnum sit viride prorsus, id sequatur aliud roseum etiam omnino, & sic deinceps. A Lobellio inter Amaranthos recensetur, vocaturque Amaranthus Tricolor, à Trago Gelosia, fortasse Theombrotum est Persarum apud Plinium, inquit Pena, non è floribus, sed ex foliorum triplicis coloris maculis scitè distinctis venustas huius æstimatur, quæ sunt Ocimi aut Bliti, interdum luteo, viridi, vel purpureo, interdum triplici, viridi, luteo & sanguineo variegata, alarum psitacorum ritu: quare Flandri *Papagalli* vocant. Cæterum planta hic depicta semen profert in exigua spica, villosa, cauli adhærente sine pediculo, flauescen-  
bus punctis notata, quod vice floris est, perinde ac si natura tantum venustatis ac gratiæ prius in folia contulerit, vt deinde veluti picturæ florum oblita, eos vix inchoatos reliquerit. In hortis colitur ad acetariorum vsum, præsertim ab olitoribus Italis, allato ex Hetruria semine. Alsiosia est hæc planta, ad primam frigoris inclementiæ flaccescens. Quamobrem ante veris teporem eius semen olitores terræ credere non audent, ne tenella herba algoribus vratur ac pereat. Sapor idem qui & Bliti, nisi quod paullulo magis austera est: quare in posca sanguinem reicientibus medetur, auctore Plinio.

SYMPHONIA Plinij.  
Dalechampij.



Locus.

Tempus.

Vires.

Ibidem.

LAMPSONA





Lus Græcis λαμψάνη dictum videtur ἀπὸ τοῦ λαμψαί, quod lambere significat, quod foliorum mollitie, caduca decubitive in humū, eam lambere videatur. Sic & Latinis Lampfana vocatur, olim à Romanis Napus silvestris. Quibusdam λαμψάνη, & Lapfana dicenda videtur, nō λαμψάνη neque Lampfana. Hanc Dioscorides inter olera recenset, nullis tamen notis eam ut notissimam delineat. Sed nunc non æquè omnibus cognita. Plinius scribit inter silvestres Brassicas Lapfanam esse, pedalis altitudinis, hirsutis foliis, napi simillimis, nisi candidior esset flore, coqui in cibo, alium leuiter emollire. De eadem hæc Plinius alio in loco. Nec non olus quoque silvestre est trium foliorum, Diui Iulij carminibus præcipuè iocis que militaribus celebratum. Alternis quippe versibus exprobrare Lapfana se vixisse apud Dyrrhachium præmiorum parsimoniam cauillantes. Est autem id cyma silvestris. Quæ hic depicta est planta, nascitur frequentissima, inquit Matthiolus, in Hetruria, Apulia, ac

Nomina

Lib. 2. c. 109

Lib. 20. c. 9.

Forma.

Lib. 19. c. 8

Locus.

ibid.

LAMPANA Matthioli.



LAMPANA Dodon.



plerisque Italiae locis, iis præsertim campis qui aratrum eo anno non sensere: tamen si hodie, nisi fortè vrgente penuria in cibarium vsum vix recepta sit. Eam tamen, quod maxime oportuit, nec describit, nec cur Lāpfana Dioscor. sit explicat.

Lampfanam Betæ silvestris speciem facit Dodonæus, quæ foliis est latis, in pallido viridibus, utrimque profundius incisis, napo similibus, sed minoribus: caulibus bipedalibus, in ramulos multos diuisis, in quorum fastigiis emicant flores multi, parui, lutei, hieracij minoris floribus fere similes. Eandem Lobellius Lampfanæ nomine depinxit. Vbiq̃ue prouenit, in viis scilicet, & in hortis in quibus Betæ nascuntur, & humidis locis. Pena hanc Dodonæi Lampfanam, neque naps neque Brassicis congenerem esse censet, sed potius hieraciis, floribus nimirum stellatis, luteis, non Brassicæ, foliis hieracij modo laciniatis, caulibus ses-

Lib. 3. c. 109

Forma.

Locus.



*LAMPSANA* Vera falso  
Theophr. *Erysimum* Dodon.

Lib. 5. cap. 10.



quipedem & binos pedes altis, è fibrata radice & exigua, semine pusillo. Hæc nulla sui parte in olere manditur: quare Lampsanam esse negat, eam vero genuinam esse putat, quam Galli *Saunes blanches* vocant, quali Sinapistrum albū, quidam Sinapi silvestre, Lugdunenses *Rauenon*, Pena Rapistrum aruorum, quam Dodonæus Theophrasti *Erysimum* esse falso credidit, de quo diximus, cap. De Rapo, & de Erysim. Plus alit Lampsana quam Rumex, auctore Dioscoride, & stomacho vtilior est. Eius folia & caules coquuntur in cibo. Plinius scribit coqui in cibo, & aluū leniter emollire. Galenus in lib. de Aliment. facultatib. de Lampsana nihil scripsit, fortasse sub Brasicæ generibus comprehensa. Verum in lib. simpl. Lampsana, inquit, si edatur, malum succum gignit. Si vero imponatur extergendi ac discutiendi vim quandam habet. Hanc Northmanni rustici prope Codomum inter segetes colligunt, & minutim confectam in iusculis coquunt, ac pro olere comedunt non insuaui gustu.

*PES ANSERINVS.* CAP. VII.

**S**uperioribus stirpibus duæ quæ sequuntur plantæ subnectuntur, non quod sint *ἀνίσχυρος*, & in cibos receptæ, aut quod in iis ferendis operam ponant olitores, sed ob tam magnam ipsarum cum Atriplice & Blito præsertim florum & seminum affinitatem, ut prior hæc,

*PES ANSERINVS.*

Nomina

In hist. pla.  
252.

Forma.

Locus.

Tempus.

Temper.

cap. 252.  
Lib. 5. c. 3.


tertia Atriplicis species à Matthiolo constituitur, à Lobellio Atriplex silvestris latifolia vocetur. Quidā tamen herbarij nomen eius veteribus Græcis Latinisq; ignotum esse arbitrati, à foliorū figura, quæ in ambitu ita laciniata sunt, ut Pedis Anserini formam repræsentet, Pedem Anserinum vocant, Galli similiter *Pied d'Oye*, Germani *Genszusz*. Quum vero hæc herba stirpibus etiā inimica sit, factū est, inquit Fuchsius, ut à mulierculis vocata sit *Senutod*, & *Schunenszod*, id est, mors porcorum, Gallicè, *La mort aux porceaux*. Caulem profert cubitalem, interdum maiorem, rectum, striatum, furculosum: folia lato toto ambitu altius incisa, atque ideo Pedis Anserini speciem referentia: flores racemosos, exiguos, rubentes: semen racematim velut in Atriplice silvestri singulis ramulis insidens, radicem obliquam cum fibris plurimis. Locis incultis passim, & in hortis, aliisq; in locis ubi simū reponitur, nasci solet. Junio & Julio mensibus floret. Sucundo refrigerat ordine, inquit Fuchsius, non secus atque solanum hortense, vel fere ad tertium



terrium vsque ordinem, vt putat Dodonæus. Suibus exitium adferre herbā hanc deuorant experientia compertum est. Corpori humano exterius admota, idem quod Solanum hortenſe præſtare poteſt. Quare etſi huius herbæ nullus ſit in officiis vſus, tamen quia paſſim naſcitur, & temere fortaiſis à nonnullis vires eius ignorantibus vſurpari poſſet, eam ſilentio prætereire noluimus, vt tam vulgaris herbæ facultas omnibus perſpicua foret.

VULVARIA.

CAP. VIII.



**H**æc herba Atriplici quadamtenus ſimilis eſt, niſi quod omnibus partibus minor, vnde quibuſdam puſilla Atriplex, Lobellio Olida, & garum olens, Cordo Garoſmam dicitur. Eius nomen Græcis Latinisque ignotum eſſe putāt Herbarij. Quare à fœtido odore Tragium vocauit Dodonæus, Gallice *Herbe de Boue*. Quia vero duo ſunt alia Dioſcoridi Tragij genera, ad horum diſcrimen Tragium Germanicum cognominauit. Cateris Herbariis Vuluaria dicitur. Quia viroſum illum odorem refert, quem impuri meretricū oculi ſpirant. Aliis atriplex canina, quæ eā ex vrina canū naſci putāt. Humilis eſt & tenera plāta, cauliculis multis, per humum repentibus foliolis candicantibus, ac veluti farina aſperſis, Atriplici ſimilibus, ſed minoribus, & maioranæ foliis vix maioribus. Semen paruum, album, racemoſum proferat Atriplicis ſilueſtris modo. Tota planta odoriseſt abominandi, piſcis, aut capitis piſcis, aut olidi hirci fœtorem referens. In viis & ſabuloſis locis prouenit. Aſtate media floret, editq; ſemen. Herbæ fœtor ſcæminis ſtrangulatu vuluæ oppreſſis confert, maximè ſi vmbilico imponatur.

Nomina

Lib. 5. c. 4.

Forma.

Locus.

Tempus.

Vires.

SPINACHIA.

CAP. IX.

**S**pinacia, & Spinachia, & Spinaceum olus Latinis appellari poteſt, quod *σπινάχιον* Græcis recentioribus dicitur. Spinacia quidem & Spinaceum olus ab inſigni ſeminis ſpiculorum nota, quod tam glabræ, & mollis herbæ ſemen in ſpinas occaleſcat. *Σπινάχιον* vero à raritate, quod raro illo medici vterentur. Quibus hæc vocabula diſplicent, Atriplicem Hiſpanienſem vocant, Mauritani *Hiſpanach*, ideſt, Hiſpanicum olus, fortaiſe quod inde primū duxerit originem, ad cæteras tandem nationes translatum: quidam Seutlomalachen. Ruellius Seutlomalachen, inquit, recens Græcia fecit olus, quaſi dicas maluaceam betam, quod, vt reor, parentum adulterio natum exiſtiment, veteribus inauditum, fortè quod figura, & denticulato ſeminis habitu betam, & mollitia malum mentiretur. Quod ſi ita eſt, neotericis omnibus tritiſſimum, ab inſigni, ſpiculorum ſeminarium nota Spinaceum vulgò dictum putant. Sed forte Seutlolphathum, ait Geſnerus, hoc eſt mediæ inter betam & rumicem naturæ, potius quam Seutlomalachon appellandum. Galli *Eſpinars* vocant, & *Eſpinaches*, Germani *Spinet*, vel *Spinnet*. Spinachia genera duo, ſatiuū, & ſilueſtre. Satiui item duo, mas & fœmina. Mas ſemen fert. Fœmina floret quidem, ſed ſeminis infœcunda ſterileſcit. Nam Spinachia vt cannabe, ſemina edit, ex quorum nonnullis exit mas, ex aliis eiufdem plantæ fœmina. Spinachia exit ſeptem diebus à ſatu, folio primū triangulo molli, mox intubaceo, plerūque qua pediculo

Nomina


Lib. 2. c. 147

In hor. Ge.

Genera.

Forma.



In libro 2.  
Diof. c. 117*Vires.**Tempus.**Vires &**Temper.*

Matth. ibi.

obscurum: vel quod, ut conici potest, nondum in vsum vulgi, literatorumque cognitionem eo saculo venerat, qui eorum quæ sua fuerunt memoria, prorsus intactum nihil intentatumque reliquerunt. Non enim silentio tam frequens olus abolere voluissent, sed potius celebratum in lucem prodere. Nunc passim in hortis feritur, nullumque solum respuit, sed quocumque provenit latissimè. Scribitur Septembri mense, non horrens hiemis frigora, ut vere cibum suppeditet, quo tempore semen profert. Martio etiam mense feritur. Iunio & Iulio flores & semen edit. Spinacia primæ refrigerantium & humectantium classis. Aluum emollit, melius Atriplice suppeditat alimentum, sed aluo parum hærens faciliè exigitur. Flatus colligit, & vomitiones concitat, nisi excrementitius humor abiciatur: ventrem decocti iure proluit. Citra aquam coquitur, quod magnam vim humoris inter coquendum remittat, & veluti proprio contentum iure alienum aspernetur. Ligula subinde percussum abacto lentore versatur, deinde in manuales globos expressa penitus sanie redacta, patinis in oleo vel butyro frigitur, addito quo magis palatum titillet, omphacio. Bibitur eius succus ad scorpionum, & araneorum ictus, ac etiam vulneri illinitur: quinetiam cocta lenit exasperatas fauces. Spinacia silvestris plurimis statim à radice cauliculis fruticat, rotundis, glabris, rubescentibus ima parte: cum adoleuerunt cubitalibus & longioribus, in quibus ex longis pediculis singula folia dependent, ampla, longa, in ambitu minimum profundis laciniis sinuosa, rugata, auersa parte venosa, latius virentia, aduersa obscurius, acuminata, & sagittarum cuspidis figuram planè referentia. In caulium summitatibus semen racemosum est. Ex radice ut cauliculi, ita pediculi bene longi emergunt, singuli singula folia valde magna sustinentes. Sunt qui aquam ex hac planta vitreis organis eliciunt, & ad ciendos sudores plurimum valere predicant.

LACTV



## LACTUCA CAP. X.

**L**ACTUCA à lactis copia nomē adepta Græcis θηλαξ dicitur, à recen-  
 tioribus vt Pſello, & Symeone Sethi μαρούλιον, vel μαρούλιον, & θηλαξίνη.  
 quamquam ſilueſtre olus quoddā proprie θηλαξίνην appellari Galenus  
 ſcripſit, Mauritanis Cherbas, ſeu Chas, Italis Lattuca, Germanis Laſtuck &  
 Lattick Hiſpanis Lechuga, aut Alſatſa, Gallis Laitue. Lactuca genera plurima. Plinius.  
 Lactuca Græci tria fecere genera. Vnum lati caulis, adeo vt hoſtiola olitoria ex his  
 ſactitari prodiderint. Folium his paulo maius herbaceo, & anguſtiſſimū, vt alibi  
 conſumpto incremento. Alterum rotundi caulis. Terriū ſeſile, quod Laconicum  
 vocant. Quæ ex Theoph. ſunt exſcripta. ἡ τῆς θηλαξίνης ἢ λαδικῆ γλυκυτέρη, ἢ ἀπαιλω-  
 ῖρα, γένη δ' αὖτις ἐστὶν ἄλλα ἴρια, τὸ τε πελαστικαυλον, ἢ τὸ ροσφυλοκαυλον, ἢ τὸ τριπλον, τὸ λακωνικόν.  
 αὖτις δὲ τὸ μὲν ἔχει σκολιμῶδες, ὁρθὴ δὲ ἢ ὠξὺς καὶ ἀπαρθελατος ἐκ τῆς Κορυθῆ. τῶν δ'  
 παλαιῶν οὐδ' ὅτινες πελαστικαυλοὶ γίνονται, ὥς ἐνὶ τῆς φασὶ ἢ τῆς γήραις χερῶν καὶ πωρεκαῖς. τὸ δ'  
 ὁπωδὸς σφόδρα, ἢ μικρόφυλλον, ἢ λακωνικώτερον ὅσον ἀγρί. Id eſt, Lactuca candida  
 dulcior & tenerior eſt. Cuius genera alia ſunt tria, laticaulis, rotundicaulis, & laco-  
 nicum. Hoc folio eſt ſcolymi, rectū, inſigni proceritate, nec à caulibus brachiātū.  
 Laticauliū quædam vſque eo in latitudinē adoleuerunt, vt aliqui in valuas horto-  
 rum uſurparint. Quæ verò valde ſuccoſa eſt, foliόque exiguo, ac candidiore caule,  
 ſilueſtri ſimilis eſt. His plura genera deinceps Plin. ſtatuit. Alij, inquit, colore &  
 tempore ſatus genera diſcreuere. Eſſe enim nigras, quarum ſemen menſe Ianuario  
 ſeratur: albas quarū Martio: rubētes quarum Aprili. Et earum omniū plantas poſt  
 binos menſes differri. Diligētiores plura genera faciunt, purpureas, criſpas, cappa-  
 docas, Græcas. Longioris hæſ folij, caulisque lati, præterea longi & anguſti, intubi  
 ſimilis. Peſſimū autē genus cum exprobratione amaritudinis appellauere picrida.  
 Eſt etiamnum alia diſtinctio atra, quæ Meconis vocatur à copia lactis ſoporiferi:  
 quamquā omnes ſomnū parere credūtur. Apud antiquos Italia hoc ſolum genus  
 earū fuit, & ideo lactucæ nomen adepta. Purpuream maximæ radicis Cæcilianam  
 vocant. Rotundam verò ac minima radice, latis foliis, Aſtylida (Athenæus habet  
 Aſtytida, qualiſ urbani) quidāque Eunuchion, quoniā hæc maximè refragetur  
 veneri. Eſt etiamnū quæ vocatur Caprina (marina ex Corn. Celſo) lactucā. Et ecce  
 cum maximè cœpit irrepere ſatiuis admodum probata, quæ Cilicia vocatur, folio  
 Cappadocæ, niſi criſpum latiūſq; eſſet. Columellæ quoque plura ſunt lactucæ ge-  
 nera, quæ ſuo quoque tempore ſeri oportet. Earum quæ fulci, & veluti purpurei,  
 aut etiam viridis coloris, & criſpi folij, vt Cæciliana, menſe Ianuario rectè diſſe-  
 ritur. At Cappadocia quæ pallido, & pexo denſoque folio virescit, menſe Februario,  
 quæ deinde candida, & criſpiſſimi folij, vt in prouincia Berica, eſt, ſinibus Gadi-  
 tani municipij, menſe Martio rectè pangitur. Eſt & Cyprij generis ex albo rubi-  
 cunda, leni & teneriſſimo folio, quæ Idibus Aprilis commodè diſponitur. Lactuca  
 in ſatiuam & ſilueſtrem diuiditur à Dioſcoride, à Marthiolo ſatiua in criſpam,  
 rotundam, & capitatam, quibus quartam addit quæ Romana vulgò vocatur, &  
 quintam Cypriam, quam ex Cipro allatā ferunt. Dodonæo lactucæ ſpecies ſunt,  
 lactuca vulgaris, criſpa Plinij, & aliorum veterum, Gallicè Laitue creſpue, tertia  
 lactuca capitata, Gallicè Laitue pommee, lactuca ſeſilis, & Laconica veterum,  
 Columellæ Berica. Quibus addit lactucam Cæcilianam Columellæ, foliis fulcis, &  
 fere purpureis: præterea lactucā Cypriā eiūſdē, quæ lactuca eſt Græca Plinij, foliis  
 rubefcentibus, lauibis, teneriſſimis, guſtus optimi. Sed duas poſtremas ſpecies re-  
 cētioribus incognitas eſſe ait. Lactuca ſatiua foliis eſt longis, latis, lauibis, nu-  
 dis, minimè cōglomeratis, inter quæ caulis excreſcit binū fere cubitorū altitudine,  
 ſucco prægnans lacteo, in ſummo brachiatus, flores proferēs luteos, qui tandē in  
 pappos abeunt: ſemen candidū, parū, oblongū. Radix ſub eſt longa, craſſa, fibrata.

Nomina

Li. 2. Alim.  
& lib. 2. cō-  
ph. loc. c. 1.  
Genera  
Lib. 19. c. 2.Lib. 7. hiſt.  
ca. 4.

Ibid.


Lib. 20. c. 7.

Lib. 11. c. 3.

Lib. 2. c. 129

Lib. 5. c. 18.



LACTUCA CRISPA  
Dodon. & Fuchf.

Lactuca Crispa, folia habet crispa, intubo  
maiori similia, valde laciniata, caule superiori  
proxima. Rotunda in orbem spargitur, rotun-  
dioribus foliis tenerioribusque, vna se stipan-  
tibus. Capitata seu sessilis, foliis rotunda parū  
differt, sed in globum folia circumvoluuntur, &  
extuberant. Brassicæ capitatæ modo. Romana  
quæ in cibis omnibus præstat, foliis est maiori-  
bus pinguioribus, viridioribusque. Ea in ouatū  
caput extuberat, cæterisque tenerior & candi-  
dior fit, si in cacumine ligetur, terræque obvol-  
uatur ad cacumen usque: hac enim arte mirum  
in modum tenerescit, & candidior, gustuique  
gratior redditur. Caulem edunt omnes bipeda-  
lem, albicantem, lacteo pregnantem succo, in  
summo brachiatum, foliis plenum in acutum  
desinentibus. Flores in ramusculorum cacumi-  
nibus prodeunt lutei, qui tempore papposi fa-  
cti in auras abeunt. Semen omnibus oblongū,  
in acutum tendens, candidū, quandoque etiam  
nigrum. Senescentes omnes amatores contra-  
hant. Nascitur Lactuca quarto aut quinto à sa-  
tu die, & adulta transponitur. Siluestris Lactu-

Lib. 2. c. 130.

Lib. 7. hist.  
c. 6.

ca, inquit Dioscorides, latius similis est, sed longior caulis, & candidiora folia  
graciliora & asperiora: amaro gustu est. Theophrastus, γεινῶν δὲ τὸ τε φύλλον  
βραχύτερον τῆς ἡμέρας, καὶ τελειόμενον ἀναθίσται, ἔτι καὶ αὐτὸν ὁμοίως. Τὸν ὅπῃ δὲ λεγόμενον  
ἔστι φαρμακώδη. Φύλλον δὲ ἐν ταῖς ἀρρώσiais ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος ὃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος  
ὑδρωπα, καὶ ἀχνὺν ἀπὸ ὀφθαλμῶν ἀπάγει, καὶ ἀργεῖμα ἀφαιρῶν ἐν γάλακτι γυναικείο. Idem  
Lactuca



Lactuca siluestris folio breuiore est quam sativa, quod consummatum aduleatur, similiter & caule breuiore. Succo manat acri & medicato; nascitur in aruis. Carpitur succus per menses. Aitunt eo purgari hydropem, caliginem ab oculis atteri, & argema tolli cum muliebri lacte. Hæc est, inquit Ruellius, quæ passim ab Officinis nostris nunc endivia dicitur, cum in aruis nascatur sponte, & vinetorum li-

*LACTUCA Siluest. Matth.*



*LACTUCA Siluest. vera, Dalechampi.*



mitibus, folio cum adoleuit per oras aculeato, dorso spinulis inhorrescente, quasi prona carinae parte echinata, supinâ lauiore, nonnunquâ cum infenuit laciniatim ferrato: caulibus bicubitali proceritate consurgentibus, hirtis, flore luteo, succo candido, amaro, acri, ideo linguam, & os aliquantulum vellicante. Huius uti satiuæ semen occultitur lanugine. In eadem sunt sententia Fuchsius & Dodonæus. Quibus subscripsit etiam Marthiolus. Siluestris Lactuca, inquit, in cæpëstribus nascens faciliè dignoscitur, quod caule, floribus, semine & folio satiuam iam flores & semina proferentem amuletur. Verum gustu amara est, & lacte copiosiore referta. Hæc Lactuca siluestris Fuchsi & Marthioli, est Endivia vulgatiore Officinarum, Penæ & Lobellio. Seris sativa altera Lactucarum simillima, amara, angustifolia Dioscoridis. Alia, verò Lactuca siluestris à Dalechambio hic exhibetur, quam veram esse arbitrat. Radice est minimi digiti crassitudine, candida, fere semper contorta, paucis fibris capillata, succi lactei plena. Folia circa radicem antequam in caulem assurgat humi iacent, Lactuæ similia, in ambitu crenata, sed non sinuosa, veluti huius edita pictura demonstrat, dorso aculeato, arefcentia cum caulis gliscit. Is teres est, cubito altior, aliquantum spinosus haud procul à radice, cætera glaber, subrubens, in quo folia impari intervallo disposita, caulem amplexantia, quam cauli iunguntur bifida, in summo tripartita, figura nonnihil ad triphyllum accedente. Flos est luteus, Lactuæ similis. Totius plantæ sapor insigne amarus est. Alterius Lactuæ siluestris historia & pictura extat apud Pessiam, quæ omnibus partibus ad Lactuam accedit, vel ad Scridem latifoliam, vulgò Scariolam, Lactuæ simillimâ. Succo lacteo, tota manat, adeo ut præ eius copia saporifero sit, odore retro & ingrato, veluti opium. Caulis bicubitalis glutinosus: flores Lactuæ: semen aliquantominus nigricans. Ea, inquit Lobellius, in agro Romano foliis nigris maculis variata conspicitur. Satiua Lactuca in hortis prouenit, latis & riguis stercoratisque. Lactuca siluestris Dalechampi in

Lib. 2. c. 69.

Lib. 2. c. 111.

Lib. 2. c. 111.

In hist. pl.

c. 112.

Lib. 2. c. 111.

In lib. 2.

Diosc. c. 130.

Lib. 2. c. 111.

Locus.

ibo  
ori  
un-  
an-  
arū  
r, &  
ana  
ori-  
tati  
di  
uol-  
tum  
que  
eda-  
, in  
tum  
mi-  
i fa-  
ngū,  
tiam  
ura  
à la-  
ctu-  
olia,  
exat  
quæ,  
satiua  
dest,  
tucca



*Tempus.**Vires &**temper.*

Li. 2. c. 129.

Lib. 19. c. 8.

Plin. lib. 20

cap. 7.

Li. 2. Alim.

rupibus lapidosis saxosisq; locis nascitur, vbi durum solum pauca terra contegitur: nonnunquam ex rupium ipsarum rimis exilit. Seritur Lactuca toto anno, sed Martio, & Aprili mensibus potissimum, binis mensibus inter semen plantamque & maturitatem. Lactucæ sativæ ut scribit Dioscorides, refrigerant, stomacho gratæ habentur, somnum conciliant, aluum emolliunt, lac euocant: verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & veneri refragatur. Ipsæ verò frequentiores in cibo claritati oculorum officiunt. Muria condiantur, cum in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur succo lactis silvestris Lactucæ similem. De iisdem hæc Plinius. Est quidem natura omnibus refrigeratrix, ideo æstate gratæ stomacho fastidium auferunt, cibique appetentiam faciunt. Diuus certe Augustus Lactuca conseruatus in ægritudine fertur prudentia Musæ medici. Cum priores cauerent, religione nunc omni caret, intantum recepta commendatione, ut seruari etiam in alienos menses eas oxymelite repertum sit. Sanguinem quoque augere creduntur. Venerem inhihent, æstum refrigerant, somnumque faciunt. Cruditatem ipsæ nequaquam faciunt, nec vlla res maiorem in cibis auaritatem incitat, inhihentque. Ambustis prosunt recentibus, priusquam pustulæ fiant cum sale illitæ. Vlcera etiam quæ serpunt, coercent initio cum aphronitro, mox in vino tritæ. Igni sacro illinuntur. Conuulsa & luxata caulibus tritis cum polæta ex aqua frigida leniunt: eruptiones papularum cum vino & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederunt, ad quod vtilissimæ quàm maximi caulibus, & amaræ. Quidam lacte infundunt. Deferuefacti ij caules, & stomacho vtilissimi traduntur, sicur somno & satiuæ maximè Lactuca & amara lactensque, quàm meconidem vocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte vtilissimum esse præcipitur, dum tempestiuè capiti inunguntur. Semen satiuarum contra scorpiones dari. Semine trito ex vino poto & libidinum imaginationes in somno compesci. Tentantes aquas non nocere Lactucam edentibus. Quidam tamen frequentiores in cibo officere oculorum claritati tradiderunt. Sed de iis accuratissimè Galenus. Plerique medicorum, inquit, hoc olus, ut ficus autumnalibus fructibus prætulerunt. Nam inter ipsa aliud melioris succi non inuenias. Quod porro nonnulli vitio verterunt, id ei in præcipuam laudem cedit, & si ita reuera haberet, non modo nulli olerum, sed ne optimi quidem succi, ac maximi nutrimenti edulis esset secundum. Nempe Lactucam aiunt sanguinem generare. Quidam non simpliciter sanguinem dicunt, sed multum sanguinem generare affirmant. Verum ij tamen si prudentius obiciunt, longius tamen aliis à vero absunt: quamquam hoc ipsum, puta, multum sanguinem procreare, non est quod merito quis damnet. Constat enim eiusmodi edulium laudatissimi succi esse, quod plurimū quidem sanguinis, aliorum vero succorū nullum producere sit comparatum. Si verò quia permultum è lactuca sanguinis congeratur, idcirco damnandam eam censeant facillimè huic malo occurri potest: quippe quum vefcentibus & liberatius exerceri, & ea parcius uti integrum sit. Hæc ergo aduersus eos qui olus hoc non rectè vituperant. Illud porro scire conuenit, omnibus aliis oleribus paucissimum sanguinem & vitiosum generantibus, ex sola Lactuca nō multum, quidē, nec vitiosum, haud tamen omni ex parte laudabilem gigni. Ut plurimū quidem cruda ipsa vefcuntur: æstate autē cum iam in semen proruptura est, in aqua dulci præcoquentes cum oleo, garo, & aceto assumunt, aut cum aliquo ex condimentis, obfonijsve, præsertim iis quæ caseo constant. Pleriq; etiam antequam excaulescat in aqua elixa vtuntur, ut ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse cœperunt. Nam amicus quidam meus cum olere hoc à longo tempore, me ut familiaris cibo vsum fuisse sciret, videretque post mandī à me citra magnā molestiā non



non posse, cocturæ rationem indicauit. Etenim in iuuentute quoniam os ventriculi bile efferuescebat, æstus moderandi gratia Lactuca utebar. Cum autē ad pro- uectam ætatem peruenissem, olus hoc contra quā in iuuentute somnum iam omni studio & industria accercenti auxilio fuit. Quippe qui etiamnum iuuenis lucubrandi gratia vigiliis dedita opera me assuefeceram. Declinante iam ætate ipsa ex se infomni, grauius hoc incommodo afficiebar. Aduersus quod vnicum mihi præsentissimum remedium lactuca vespere commanducata fuit. Frigidum ergo humidūque succum profert, non tamen vitiosum. Itaque sicut alia olera à iusta concoctione non excidit, neque aluum cohibet vti neque impellit. Atqui hæc illi non immerito accidunt, quum nec austera, nec acerba sit, quibus faculta- tibus in vniuersum aluus sistitur, quæmadmodum à falsis, acris, & omnino ab- stergendi vim habentibus ad excretionem concitatur, quorum nihil lactucæ in- est. Et alio in loco. Lactuca humidum est frigidūque olus, non tamen extremè, Li. 6. simp. siquidem edendo non foret, verum maximè secundum aquæ, vt sic dicam, fonta- næ frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas accommodum est, & ad parua & leuia erysipelata, non tam ad maiora. Est etiam edulium siti aduersum. At semen potu genituræ profluuium cohibet, quamobrem iis datur qui libidinis somniis vexantur. Præterea Galenus alibi ex Archigene recensens olera, quæ stomachicis Lib. 8. com. in cibo conueniunt, in iis habet lactucas, & *μυκωνίδας*, quas meconides lactucas ph. loc. c. 4. conuertit Cornarius. Appellatur enim meconis quoddam lactucæ atræ genus, à copia succi & lactis soporiferi, similitudine quadam cum meconio, hoc est papa- ueris succo: *μυκων* enim papauer Græcis dicitur. Sed de hoc lactucæ genere Plinij Lib. 29. c. 7. verba supra adscripsi, de quo rursus ille alio in loco. Et amara lactensque, quam Me conidē vocauimus. Sic enim eo loco legi debet. Lactucæ succus, auctore Matthio- In libro 2. lo, & ex rosaceo frōti & temporibus illitus, non solum febrientibus somnum cō- Diosc. c. 129. ciliat, verum etiam capitis dolorem mulcet. Gargarizatur vtiliter ex punici mali succo, ad columellæ inflammationem. Testiculis illitus seminis profluuium co- hibet, præsertim addito caphuræ momento, sed venerem extinguit. Idem præstat epotum semen ex papauerini seminis cremore haustum, atque etiam ardoribus vrinæ opitulatur. Cauendus lactucarum succus suspiriosis, sanguinem excrean- tibus, pituitosisque, & iis maximè qui liberis dant operam. Lactuca innatat acri. Post vinum stomacho, inquit Horatius, quæ res quia concoquendi vim debilitat atque obtundit, lactucas in prima mensa apponere, easque primas Lib. saty. 2. fat. 4. omnium gustare & esse debemus, siue crudas, siue coctas. Huc pertinet Martialis Lib. 13. distichon.

*Claudere quæ cœnas lactuca solebat auorum,*

*Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?*

Nunc de lactucæ siluestris facultatibus dicendum. Viribus aliquantum papaueri Lib. 2. c. 130. similis est, inquit Dioscorides, vnde lacteum eius succum aliqui meconio permi- scuerunt. Aquam per aluum elicit potus in aceto mulso succus ad duos obolos: ar- gema caliginemque repurgat: cōtra adustiones efficaciter illinitur cum lacte mu- lierum. In summa somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit: contra scorpionum & phalangiorum ictus bibitur. Semen non aliter quā sati- uæ libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venerem arcet. Succus ad ea- dē valer, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, antea, vt in aliis Lib. 29. c. 7. liquaminibus moris est, insolatum. De hac Plinius ita tradit. Lactucæ sponte na- scentis primum est genus eius quam Caprinam vocant (marinam) qua pisces in mare deiecta protinus necantur qui sunt in proximo. Huius lac spissatum mox in aceto pondere obolorum duūm, adiecto aquæ vno cyarho hydropicis datur, quibus verbis exprimere voluit illa Dioscoridis *ἡ γὰρ αἰσὶν ὁ μὲν ὀξύρρατος ποθεῖς*, &c. Aquam




- Aquam per aluum elicit potus in aceto mulso, & cætera. Eiusdem succi vsum  
 Ibidem. medicum Theophrastus habet eo loco quem supra citavi. Ex quo & hæc Plinius  
 descripsit, additis quibuldam aliis. Succus omnibus (siluaticis) candidus, viribus  
 quoque papaveri similis: carpitur per menses inciso caule: conditur in fictili nouo.  
 Sanat omnia oculorum vitia cum lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatrices,  
 aduersionesque omnes, præcipuè caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra  
 epiphoras. Idem succus aluum purgat in posca potus ad duos obolos. Serpentium  
 ictibus medetur in vino potus. Et folia tosta thyrifq; triti ex aceto bibuntur. Vul-  
 neri illinuntur, maxime contra scorpionum ictus. Verum contra phalangia com-  
 misto vino ex aceto. Aliis quoque venenis resistunt, exceptis quæ stragulando ne-  
 cant, aut iis quæ vesicæ nocent: item psymmichio excepto. Imponuntur & ventri  
 ex melle atque aceto, ad detrahenda vitia alui. Vrinę difficultates succus emendat  
 Cratenas cum & hydropicis obolis duobus in aceto & cyatho vini dari iubet. Hęc  
 Li. 6. simp. verò Galenus tradit. his qui venereis somniis vexantur agrestis lactucæ semen ex-  
 hibetur, cuius colligitur succus argema, caliginesque expurgans, tum aduersiones  
 cum lacte muliebri inunctis. Quæ argema Theophrastus, Dioscorides, Galenus  
 dixerunt, Plinius cicatrices videtur conuertisse. Ad Theophrastum Dioscorides  
 addidit, καὶ πρὸς ἐπιουστις succum illini, Galenus πρὸς ἐπιουστις, quod idem est,  
 Sunt autem ὄφρυς & ἐπιουστις, seu ἐπιουστις oculorū vlcerā, quæ Paulus aperte  
 Lib. 3. c. 22. declarat his verbis. Vlcus in oculis genus quidem vnum est, differentia verò  
 particulares diuersæ. Etenim in cornea brana vlcus cauum, angustum, & purum  
 βόθρον Græcis dicitur, id est, fossula. Quod autem latius bothryo est, sed minus  
 profundum κίλωμα nuncupatur. Argemon in pupillæ circulo iacens, ambientia  
 comprehendit, vt etiam in exteriori pupillæ parte rubicundum, in interiori can-  
 didum appareat. Ἐπικύμα vlcus est sordidum, & crusta obductum, quo repurga-  
 to humores oculi sæpe effluunt. Hęc Paulus. Galenus quoque de ocularibus  
 Li. 4. com. compositionibus scribens, ait. Ἄλλο προφερόν ἐπιγραφόμενον, πρὸς ἐπιουστις, &  
 ph. loc. c. 7. cætera. Ruellius in Dioscoridis & alij Galeni interpretes, aduersiones conuerte-  
 runt, secuti, vt opinor, Plinium, qui vt ex loco paulo ante citato intelligere licet,  
 Dioscoridis ἀχλὺς, ὄφρυς, & ἐπιουστις, nubeculas, cicatrices, aduersiones in-  
 terpretari videtur. Qui omnes si aduersiones igni, vel quouis alio modo ambusta  
 Ibidem. accipiunt, vehementer errant. Cornarius inuersiones vertit. Nec video, inquit,  
 quomodo hoc vlcis oculorum genus possit Latine commodè dici. Vstiones  
 autem simpliciter dixit etiam Scribonius in collyrio psittacino. Et auctor Ἐλκε-  
 γος Galeno inscriptæ definit ἐπικύμα esse, cum superior tunica in superficie in-  
 usta vlcatur, aut etiam paullo altior vlcera fit, ob magni fluoris influxum.  
 Vnde non malè adeo inustio dici potest.

## PORTULACA.

## CAP. XI.

## Nomina



Νόσος Græcis, Latinis Portulaca dicitur, Arabibus *Bakleancha*, seu  
*Bachelo alhanica*, Italis *Porcellana*, *Porchellachia*, & *Porcellina*, Germanis  
*Burtze kraut*, Hispanis *Verdolagas*, & *Baldroegas*, Gallis *Pourpier*, *Porchaille*,  
 & *Porcellaine*. Portulacę tria sunt genera. Satiuū, siluestre, & marinum.

## Genera

## Forma.

Portulaca satiuā caules edit crassos, pingues, teretes, glabros, erectos, lentè vergen-  
 tes in puniceū: folia crassa, pingua, latiora & oblonga, in summo rotundata, taba-  
 rię vulgò vocatæ, modo splendentia, à tergo candicantia: flores exiguos, luteos siue  
 pallidos in summis fere caulibus semina nigra, exigua in caliculis herbaceis, & ro-  
 tundis inclusa: radicem multifidam, teneram, fibratam. Portulaca siluestris quæ  
 sponte in hortis, vineis, aliisque in locis nascitur, caulibus est rotundis, pinguibus,  
 crassis,



PORTULACA Sativa.



PORTULACA Siluestris.



crassis, sed tenerioribus, minoribus, magis rubescentibus, & per humum sparsis: foliis minoribus, & oblongioribus quam sativa, cætera planè similibus. Alterū vero siluestre, inquit Matthiolus, humi repens minoribus, tenuioribus, ac crebrioribus foliis. Hæ portulacæ succosæ sunt cum quadam austera aciditate. Hæ cū sint portulacæ vtriusque genuinæ delineationes, tum peritissimorum Herbariorum testimoniis, tum ipsa earum stirpium inspectione comprobata, perspicuum est caput de siluestri portulacæ in vulgaribus Dioscoridis libris ad caput de sativa falso, neque ab ipso auctore adiunctum fuisse. Quam sententiam approbasse videntur Ruellius, & Matthiolus, qui in vtraque suorum in Dioscoridem commentariorum editione id caput penitus sustulit, sed ab aliquo homonymia decepto, ex libro quarto huc temere translatum. Cum enim videret ille Dioscoridem cæterorum fere omnium olerum genera siluestria sativis subiunxisse, & libro quarto tertiam semperuii speciem portulacæ agrestem quibusdam dictam descripsisse, itemq; Plinium idem semperuium ita nominasse, & iisdem fere verbis depinxisse, eius historiam hallucinans Portulacæ coniunxit. Quasi verò ea semperuii species Portulacæ siluestris sit, quæ vulgari Portulacæ nostræ hortensi & esculentæ opponatur, cum illius vis sit excafactoria, acris, exulceras, ut Dioscorides ait, huius refrigerans & humectans, quaque in acetariis æstate cruda vescimur. Sic & telephium huc referendū esset, quod ut scribit Dioscorides, foliis & caule Portulacæ similis sit, & Galeno in glossis Hippocraticis auctore, Portulacæ siluestris nominetur. Alij in quibus sunt & Fuchsius, & Andr. Lacuna, id caput de Portulacæ siluestri Dioscoridis esse agnoscunt, sed multis modis contaminatum, & ab aliquo imperito rerum ex capite de tertio aizoo multa excerpta, & huc sine iudicio inserta. Sic igitur legit Fuchsius. Ἀνδράχνη ἀγρία φύλλα ἔχει ὁμοία ἐλαία, μικρότερα δὲ πολλὰ, ὡς ἑστὸν δὲ καὶ ἀπαλὰ, καυλὸς ἐρυθρὸς ἀπὸ μικρῆς ρίζης πολλὰ ἐπὶ γῆν κεκλιμένα, μακρόμενα δὲ ἔνχυμα, καὶ γλισχρὰ, καὶ ὑπόλευκα. Id est, Andrachne siluestris folia oleæ habet minora tamen, multo numerosiora, & tenera, rubentes cauliculos, ab vna radice multos, in terra sessiles, qui commanducati succo abundant, & sapore salsi sunt. Reliqua omnia plane adulterina sunt, & supposititia. Portulacæ marina Portulacæ siluestris species, caulibus multis fruticat, tenuibus, duris, lignosis. Folia habet crassa, pingua, cinerea, Portulacæ planè similia, falso sapore, sed candidiora, tactu lævia, neque tam lubrica

In lib. 2.  
Diosc. 17.

Lib. 2. c. 56.

Ca. de semperuii.

Lib. 4. de semperuii.

Lib. 2. c. vlt.

In hist. pla. cap. 39.




## PORTVLACA Marina,

*Halimus vulgaris, Matth.*Lib. 1. Diosc.  
ca. 103.

Lib. &amp; c. 12

Lib. 5. c. 10.



Locus.

Ibidem.

Lib. 2. c. 117

Temper.

&amp; Vires

Li. &amp; c. 10

lubrica. In caulium summitate flores profert atriplicis, vel bliti modo, deinde semen minutum, racematim coherens: radicem longam & lignosam. Mauritanos scribit Matthiolus Halimum molochiam & Atriplicem marinam appellasse. Cuius historiam referens Serapio, narrat olitores in manuales fasciculos digestâ per Babyloniam circumferentes molochiam clamitare. Quæ Mauritanorum molochia, inquit fortasse est secundum Halimi genus à Plinio positum his verbis. Alij olus maritimum esse dixerent falsum, & inde nomen, foliis in rotunditate longis, laudatum in cibis. Hæc planta frequentissima est in littoribus Venetis (incola Bidone vulgò appellant) & ut olus in cibum recipitur. Sed quæ à Matthiolo pictura expressa est, siue sit Arabum molochia, siue Pliniani halimi genus, nihil aliud prorsus est quam Portulaca marina, quam hic describimus, & pictam damus. Cui nostræ sententiæ subscribit etiam Dodonæus. Interim studiosos rei Herbariæ admonemus Mauritanos hallucinantes molochiam cum halimo Dioscoridis, & atriplice marina

confudisse, si illis molochia est, quam Matthiolus, nosque depinximus: Portulaca enim marina, halimus Dioscoridis, & atriplex marina valde à sese distant, ut locis idoneis demonstratum est. Hanc marinam Portulacâ Lobellius & Pena Crithmum esse Dioscoridis, arbitrantur, eiusque historiam Portulacæ marinæ multo aptius congruere quam sceniculo marino, qua de re fusius tractauimus in Umbelliferis, capite de Crithmo Matthioli. Portulaca satiuâ in hortis feritur, siluestris in hortis etiam sponte prouenit & in vineris, nonnunquam in incultis & saxosis locis. Marina in littoribus maris. Nascitur frequens, inquit Matthiolus, prope Tergesti mœnia circa salinas, ubi etiam seorsum, nec minùs copiosa visitur atriplex marina. Portulacæ Iunio & Iulio mensibus florent, semenque differunt in Septembrem usque. Iam Portulacæ siue in cibis, siue in medicamentis usum explicemus, ex Dioscoride. Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus, inflammationibus oculorum, cæterisque cum polenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, vesicæ doloribus auxilio est, commanducata dentium stupores sedat: stomachi & intestinorum æstuationem fluxionesque mulcet: renes & vesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiant: veneris impetus exoluit: succus epotus simili effectu prodest, in febris valens. Contra teretes ventris tineas, cruentam excretionem, dysenteriam, hæmorrhoidas, & profluvia sanguinis percocta efficax est. Item contra sepi morbus. Ocularibus medicamentis utilissimè commiscetur: interaneis fluxione laborantibus, atque vuluarum erosionibus infunditur: contra dolores quos æstus excitaui caput ex rosaceo & oleo fouetur: eruptiones papularum in capite cum vino emendat: vulneribus quæ ad syderationem spectant ex polenta illinitur. Ex Plinio. Portulacæ memorabiles vsus traduntur, sagittarum venena, & serpentium hæmorrhoidum & presterum restingit pro cibo sumpta, & plagis imposita extrahit. Item hyoscyamo potò, è pascoque expresso succo. Cum ipsa non est, semen eius simili effectu prodest. Resistit & aquarum vitiis, capitis dolori, vlceribusque in vino tusa & imposita. Reliqua vlcera cum melle commanducata sanat. Sic & infantium



infantium cerebro imponitur, vmbilicóque prociduo. In epiphoris verò omnium fronti tēporibúque cū polenta. Sed ipsis oculis è lacte & melle. Eadē si procidat, prodest, foliis tritis cum corticibus fabæ. Pustulis cum polenta & sale, & aceto ac cera. Et vlcera oris, tumorēque gingiuarum commanducata cruda sedat. Item dentium dolores. Tonfillarum vlcera succus decoctæ. Mobiles dentes stabilit cōmāducata. Cruditates sedat, vocēque firmat, & sitim arcet. Ceruicis dolores cū galla & lini semine pari mensura sedat. Mammarum vitia cum melle, aut cimolia creta. Salutaris & suspiriosis, semine cum melle hausto. Stomachum in acetariis sumpta corroborat. Ardentibus febribus imponitur cum polenta. Et aliās māducata refrigerat etiam intestina. Vomitiones sistit. Dysenteriae & vomitis datur ex aceto, vel bibitur cum cumino. Tenesimis autem cocta, & comitialibus cibo vel potu prodest. Purgationibus mulierum acetabuli mensura in sapa. Podagrīs calidis cum sale illita, & sacro igni. Succus eius potus renes iuuat & vesicas. Ventris animalia pellit. Ad vulnere dolores ex oleo cum polenta imponitur. Neruorū duritias emollit. Venerem inhibet, venerisq; somnia. Pratorij viri pater est Hispania princeps, quem scio propter impatibiles vix morbos, radicē eius filo suspensam è collo gerere praterquam in balneis, & ita liberatum incommodo omni. Quinetiam inueni apud auctores caput inde litum destillationem toto anno non sentire. Oculos tamen hebetare putatur. Ex Galeno. Portulaca quidam vt Li. 2. Alim. cibo vtuntur, sed imbecille prastat alimentum, idq; frigidum, humidum & glutinosum. Vt medicamentum autem dentium stupori medetur, ob lentorem suum Li. 6. simp. morsus expertem. Ex eodem alio in loco. Portulaca frigida & aquea temperamento est, pauca cuiusdam particeps austeritatis. Proinde fluxiones repellit, & maximē biliosas, & calidas, cum eo quod eas mutet, & alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sanē in refrigerandi quidem facultate tertij excessus à temperatis, in humectando verò secundi. Hac ratione aestuantes, vt si quid aliud, adiuuat tum ventris osculo imposita, tum totis hypochōdriis, maximē in febribus hecticis. Præterea stuporem dentium sanat: nempe quæ ab acidorum contactu asperè exsiccata fuerant, leniens atque replens, vtpote quum viscosam habeat humiditatem. Similiter verò & succus eius. Itaque non foris modò impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sanē & toti herbæ comestæ accidit. Quoniam autem restringit, vtiliter dysenteris editur, & muliebri profluuiio, & sanguinis reiectionibus. Sed adhæc quidem multo est quàm herba, succus ipsius efficacior. In his cur dentium torporem discutiatur portulaca, causam reddit Galenus. Alexander tamen Aphrodiseus hoc Portulacæ munus cæcis rerum facultatibus, & abditis causis acceptū retulit. Portulaca tam satiaua quàm sponte nascens apud nos solet cōdiri hac ratione. Crassissimos quosque cauliculos exēptis radicibus legunt: namq; graciles facilius in aceto contabescunt. Arenulæ quibus sunt obfiti, diligenter aqua proluuntur, si qua infedit sordes, aut limus adhæsit, decuritur, tantisperque siccantur, donec aliquantū inflaccuerint: alioqui marcoris labē, cui propter humoris copiam magnopere sunt oportuni, confestim sentiunt, aut rācore fracescūt. Deinde acerbam varū melligine madefacti substrato fœniculi viridis spissamēto componuntur siccilibus vasis, aut doliolis, & cōperso sale sufficenti, interiectoq; rursum fœniculo, Portulaca vas impletur, & tandem spissamēto fœniculi cōtegatur, quod herbas deprimat, iusque quod est mistum duabus partibus aceti, & vna omphacij infunditur, ita vt ius in summum labrū fidelix perueniat: tum penore siccissimo, & auersa à sole recōdi debet, ne situ loci cōditura mucorē cōtrahat, quā innoxia ea res cōseruabit, vbi portulaca non innatet, sed semper sit iure submersa, & exemptis ad vsum salgamis quicquid superest, suo pondere ad fundū leniter deprimatur. Deinde cum vsus exigit, aqua vel etiā vino abluunt, & superfuso oleo vtuntur.



Nomina  
L. 10. c. 84.

Lib. 16. c. 7.

Forma.



Vfus. reo candicante: semine minutulo. Veris initio priusquam in caules assurgat in  
Locus. acetariis ea vulgus vescitur. In pratis & agris nascitur, maximè tamen in vineis.

INTUBA. CAP. III.

Nomina

Lib. 2. c. 18.

Lib. 3. c. 46.

Lib. 9. c. 48.

L. 7. epist.

In ann. in  
Pand.

**I**N TUBI generibus, & iis quæ καρωδάνη, idest cichoriacea, siue Intubacea Theophrastus appellat, deinceps dicemus. Σείρις Græcis dicitur quæ Latinis Intubus & Intubum, Arabibus Dumbabe, Hundebe, seu Eudeba, Italis & Hispanis Enduvia, Germanis Enduien, Gallis Endue. Sed & Seris appellatur etiam à Græcis τρώξιμος: sic enim in Geoponicis Cassiani Constantino inscriptis legitur ex Didymo. Σείρις τρώξιμος ἐν ὄξει βαπτισθεῖσα & ἰσθίουρα τομάχω μακάριστα. Seris, idest, troxima si aceto tingatur & edantur, itomacho grata sunt Et Paulus ait, τὸ intubὸν δὲ τὸ τρώξιμον. Et Aetius in quodā pharmacō, ἀναλίσκων χυλῶ τρώξιμον. idest, succo intybi excipe. Politianus tamē scripsit τρώξιμον etiam si nihil aliud addas, propriè de vua eduli intelligi, quæ & cibaria à Plinio dicitur. Atque ita Pauli iuriconsulti locū ex archetypo Pandectarū quodā Florentiæ asseruatur restituit. Qui sandum vendidit pomum recepit, nuces & ficus, & vuas duntaxat duracinas, & purpureas, & quæ eiusdem generis essent, quas non vini causā haberemus, quas Græci τρώξιμος appellant recepta videri. Sic & τρώξιμος verbum quod deorat, in antiquo se legisse Budæus affirmat. At cum τρώξιμος substantiue, vt loquuntur Grammatici Intuba sint, vt superiorum scriptorū auctoritate probauimus, atque τρώξιμα sint appellata, quod cruda ex aceto & oleo, & quondam etiam gato addito velut lactuca edantur, videtur τρώξιμος adiectiuū, non ad vuam duntaxat, sed ad omne genus eorum quæ cruda eduntur pertinere, quæ ipsi peculiariter adiunguntur. Quare fructus τρώξιμος erit quicumque crudus esculentus est, velut vua, ficus, vua passia, pomum, raphanus, & quicquid eius generis crudum apponitur. Τρωγίματα autem & τρωγία, quamuis eandem habeant cum troximis etymologiam, significatione tamen differunt, quod sint bellaria, & postremarum mensarum fercula. Hippocrates τρωξιμων δὲ βαπανίδι χρεῖσθαι. καὶ σελίνῳ ἐξ ὁξὸς βάπτειν. Idest, ex troximis autem, idest, iis quæ cruda eduntur, raphanide



nide vtatur, & apio in aceto tinctis. In Geoponicis Constantino adscriptis Li. 14. c. 17.  
 τρωκλιν σαφίδα legimus, idest, cibariam. Et Galenus in glossis Hippocraticis vocem Lib. 1. c. 65.  
 τρωκλῖος exponit ὠμοῖς ἐσθιομένοις. Artemidorus, ὅσα δὲ ἀποξύνεται τρωκλῖα ὄντα, &c.

Quæcunque deraduntur, & cruda comeduntur. Quare non minùs rectè τρωκλῖος  
 quam τρωξίμους in superioribus Pauli verbis legere possimus. Seris duùm est gene-  
 rum. Altera siluestris, altera satiuua. Siluestris duplex. Vna quæ picris & cichorium Genera.

vocatur, altera latioribus foliis, & ori gratior hortensis. Hortensis autè duplex. Al-  
 tera folio latiore, lactucæ similior, altera folio angustiore, & gustu amara. Hæ sunt Lib. 2. c. 125.

Intubi species ex Dioscoride, doctissimorum Herbariorum præsertim Matthioli  
 sententia, qui cū videret initium capituli de Intybo in Dioscor. valde deprauatū

& confusum, ex Oribasio, & exemplaribus Dioscoridis manuscriptis ita restituit,  
 & intyborum genera distribuit. Σέρεις ἀγρία καὶ κηπώλη. ὣν ἡ μὲν ἀγρία διόσκη. ἡ μὲν δὲ

κηπώλη, ἡ δὲ κηπώλη καλεῖται, ἡ δὲ ἡμέρος παλαιφυλλοτέρα καὶ διτομαχοτέρα τῆς κη-  
 πώλης, τῆς δὲ κηπώλης διτίλον εἶδος. ἡ μὲν δὲ ἐστὶ γλαυκωδέτερη, καὶ παλαιφυλλος. ὁ δὲ τενο-

φυλλος ἐστὶ ἐμπύκνους. Idest, interprete Matthiolo. Seris siluestris & hortensis. Siluestris  
 quidè duplex, altera picris, quæ & cichoriū vocatur: altera satiuua latioribus foliis,

& ori gratior quā hortensis. Hortensis verò duplex genus. Vna folio latiore, lactu-  
 cæ similior, altera folio angustiore, & gustu amara. Huic lectioni, inquit, maximè

adstipulatur Serapio, qui ex Dioscoride tot habeat siluestris seridis species, quot  
 satiuæ. At si τῶ ἀγρίῳ, id est, siluestri, siue erratico, siue ei quod sponte nascitur, τὸ

ἡμέρον, idest, mite siue satiuum opponatur ex diametro, qui seris siluestris in picri-  
 da siue cichorium, & in τὴν ἡμέρον idest, satiuam rectè diuidetur? Siluestrè satiuam

Matthiolus intelligit, quæ colitur vt mitescat: quod in hortis frequenter fit, vt in  
 Intubis, ita in armoraciis, scolymis, asparagis. Sic Theophrastus cum τοῖς γεωρ- Li. 2. cauf.  
 γουμήμοις τὰ ἀγεώργητα oppofuerit, mox τὰ ἡμέρα τοῖς ἀγρίοις, in quibus τὰ ὁλοθνήσκοντα esset ca. 15.

cum γεωργήματα & ἡμέρα eadem esse videantur, & ἀγεώργητα, & ἀγρία, nisi plantæ  
 multæ essent mites quæ non coluntur, vt arbores natura sua mites quæ ignauos

habent colonos, & contrà multæ agrestes, quæ coluntur vt mitescant, sicuti dixi-  
 mus. Potest & emendata esse huius loci scriptura hoc modo. Σέρεις ἀγρία καὶ κηπώλη.

ὣν ἡ μὲν ἀγρία διόσκη, ἡ μὲν δὲ κηπώλη, ἡ δὲ κηπώλη καλεῖται, ἡ δὲ παλαιφυλλοτέρα, καὶ δι-  
 τομαχοτέρα τῆς κηπώλης. τῆς δὲ κηπώλης, &c. Idest, Seris siluestris & hortensis.

Siluestris duplex. Altera picris, quæ & cichorium nominatur. Altera latioribus  
 foliis, & stomacho vtior quā hortensis. Hortensis verò duplex, &c. Oribasius

tria tantum fecit genera, si rectè interpretes, quod illi facile fuit, conuertit. Seris  
 agrestis est, & satiuua. Agrestis picris aut cichorium vocatur, cuius & latiora & ori

iucundiora quā hortensis sunt folia. Hortensis verò duplex est genus. Altera  
 enim magis ad lactucæ similitudinem accedit, & latis est foliis, & amarescens.

Altera folia habet angustiora, & subamara est. Quam lectionem secutus est Cor-  
 narius. Seris duplex est, inquit, ex quibus siluestris quæ picris & cichorium nomi-

natur latiora folia habet, & stomacho magis commoda est (διτομαχοτέρα legit, nō  
 διχωμοτέρα) quā hortensis. Et huius duæ species sunt, &c. Intubum siluestre, pi-

cris, siue cichorium erraticum apud nos, inquit Plinius, quidam Ambugiam (me-  
 liora exemplaria, & Celsus Ambubeiam habent) appellauere, in Ægypto cicho-

riion vocant quod siluestre sit. κηπώλη Theophrasto dicitur, & κηπώλον. Horatius  
 cum dixit,

*Me cichorea leuè que malua, &c.*  
 Κηπώλη à singulari κηπώλον posuit. Hodie in Officinis cichorea siluestris, Galli-  
 ce *Cichoree sauvage* nominatur. Intubum satiuum latifolium corrupta ab Intu-  
 bo voce Endiuia passim appellatur. Gallice *Endive* & *Cichoree de iardin*. Intybum  
 satiuum angustifolium deminuto à Seris nomine Serida dicitur, quod deinde  
 corruptentes recentiores scariolam fecerūt Gallicè *Scariole*. Vtraque Officinis



etiam scariola dicitur, sed perperam, cum Intubo latifolio parua seridis nomen  
 ibid. convenire haud queat. Plinius satium serin vocat, quod est minus & venosius.  
 At paulo post, rursus tum silvestre tum satium serin vocat. Seris & ipsa Lactuce  
 Formas. similima duorum generum est: silvestris melior, &c. Intubum satium latifolium

INTVBVM Satium  
 Latifolium.



INTVBVM Satium  
 Angustifolium. Dodon.



INTVBVM Satium  
 Angustifolium. Matth.



foliis est magnis, longis, latis, in candido viridi-  
 bus, lævibus, foliis lactucarum quarūdam haud  
 ab similibus: caule procero, striato, frequentibus  
 furculis brachiato: floribus venustis, cæruleis,  
 rarò candidis: semine albo: radice longa, candi-  
 da. Endiuvia est & Scariola Officinarum Lobel-  
 lio. Intubum satium angustifolium folia fert  
 longa, angusta, aliquando per oras parum cre-  
 nata, caulem rotundum, flores cæruleos, supe-  
 riori similes, radicem candidam, longam, succo-  
 sam. Intubum silvestre latifolium, quam serida  
 satium latioribus foliis, & cichorium domesti-  
 cum Matthiolus vocat, seridis silvestris specie  
 statuens, Intubo satiuo latifolio similitudinem est  
 radice longa fibrata, foliis longis, latis, caule  
 magno, ramusculis brachiato, pulchris & cæru-  
 leis, rariùs candidis floribus ornato, Seris est  
 satium Penæ & Lobellij. Intubum silvestre angu-  
 stifolium, quod ille cichorium silvestre vocat,  
 foliis est longis, in ambitu valde laciniatis, an-  
 gustioribus, asperioribus, & amarioribus, & ob  
 id ipsum picris appellatum. Seris est silvestris  
 Ambubæ



Ambubeia Penæ & Lobelli. Hortensis Intubi tertium genus additur, quod crispū cognominatur, in acetariis expetitur, amplo foliosoq; cespite proveniens, foliis magnis, toto ambitu crispis, ac fimbriatis: caule cæteris maiore, crassiore ac tene-riore, reliqua cum cæteris habet paria. Intuba media æstate florent, deinde semen-

Math. li. 2.  
Dioscor. c.  
125.

INTVBVM Siluest. Latifol.  
Cichorium sativum Matth.  
Seris sativa Lobellij.



ferunt. Olitores hyeme instante terra & sabulo in hortis obruunt: quoniam hoc artificio al-bescunt, tenerrima euadunt, & in totam hyemē asseruātur, artem hanc à natura edocti, quod vi-derint sæpius in campestribus cichorium aqua-rum inundationibus terra vel arena obrutum, & tenerrimum, & candidissimum redditum, depōita omni amaritudine. Huius oleris mul-tæ sunt, eaq; permagna utilitates. Vtraque fe-ris, inquit, Dioscorides, refrigerat & adstrin-git, stomacho utilissima: alium sistit cocta si cū aceto assumatur. Siluestres stomacho meliores, quandoquidem æstuantem ipsum, & quem im-becillitas vexat, cibo leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta utiliter illinuntur: podagris & oculorum inflammationibus auxilio sunt. Her-ba cum radice illita percussis à scorpione sub-uenit: igni sacro cum polenta medetur. Succus cū cerula & aceto valet ad illitus eorū quæ re-frigerationē desiderant. De seride eadē ferē Pli-nius. Vtraque stomacho utilissima, præcipuē quem humor vexat. Cum aceto in cibo refrige-rant, vel illita, discutuntq; vel alios morbos quàm stomachi. Cum polenta siluestrium ra-

Tempus.

Vires &  
Temper.  
Lib. 2. c. 125.

Lib. 20. c. 8.

INTVBVM Siluest. angust. Matth.



INTVBVM Crispum.





dices stomachi causa sorbentur, & cardiacis illinuntur super mammā sinistram, ex aceto. Omnes ea & podagris utiles, & sanguinem reiicientibus. Itē quibus gentura fluit, alterno dierū potu. At de Intubis & cichorio Intubi quoque non extra remedia sunt. Succus eorum cum rosaceo & aceto, capitis dolores lenit. Idem cū vino potus iocinoribus, & vesicæ, & epiphoris imponitur. Et mox, Cichoriū refrigerat in cibo sumptum: & illitum, collectiones, sacculq; decocti ventrē soluit iocinori, & renibus, & stomacho prodest. Et paullo post. Quod quidē propter singularem salubritatē aliqui Chreston appellant, alij pancration: Galenus. Seris olus est subamarū, & magis quod agreste est, quod ob hoc ipsum picrida quidā nuncupant, quidā cichorium. Est autem sicca frigidaq; temperatura, vtrūque secundo excessu. Porro domestica magis etiā refrigerat quā agrestis. Sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit. Verū vtraque adstringentis facultatis est particeps. Et alio in loco. Cichoria & seris cibarij generis sunt: nam apud nos rustici hæc edunt & cruda, & cocta. Vtitur etiā iis Erasistratus abunde in affectionū circa aluū curatione. Facultas horū olerū subfrigida est, & subamara, ac modicē adstringens. Et propter has facultates optima sunt pharmaca calidis intemperarijs hepatis: nam præterquam quod moderatē refrigerant, robur etiam visceri addunt per adstringentem facultatem. Præterea commissuras osculorum venarū in sinu visceris parte ad eas quæ in gibba sunt, extergens. Neque verò frigidas intemperies magnopere lædunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem absque adstrictione aut amaritudine habent, facere solent: iuuare etiā viscus talium olerum substantia potest, etiamsi citra serosorum aut aliorum humorum vitiationem intemperies fiat per se, & cum humiditatis cuiuscumque complexu: mixtura enim mellis humiditatem per urinam educunt: Quapropter etiamsi siccata tusa quis potioni inspergat, itidē iuuant. Quin & eorum decoctum potatū multū cōmodi adfert. Si verò non calida aliqua intemperies infestet, aut si obturatio quædam sit circa viscus magnopere auxiliantur ex vino albo, tenui potata, cum hisquæ urinam ciunt. Vtilis autē non solum succus ipsorum est, tum recens, tum exsiccatus, sed & ipsa olera exsiccata, tusaq; ac trita potui inspersa, & eorū decoctum in potu acceptum auxiliatur. Hæc Galenus. Matthiolus acerbē inuehitur in perniciosam seplasiarum multorum ignorantia atque ignauia, qui cū horti omnes Intybo latifolio lactuce simili, quæ vera endiuia est, vt diximus, & capi cichorio scareant, loco tamē endiuia modò hieraciū, modò lactucā siluestre supra descriptā succo lacteo manantē vsurpāt, atque ex his aquā plumbeis organis eliciūt, quā aquā endiuia falso vocāt. Quæ duæ plāæ quāuis frigida vi præditæ sint, tamē nihil iis inest, quod iccori peculiariter prodesse tātopere possit: earumq; succus lacteus, quo potissimū tēpore eo refertæ sunt, quibusdā suis partibus adeo calidus est, vt lingua vellicet, quibusdā adeo somnificus, vt nō desint, teste Dioscoride, qui illū meconio permisceat. At Matthiolo gnauiter sese opponūt Lobellius & Pena, qui lactucam siluestre illius prorsus respuūt, & Seridē domesticā alterā Dioscoridis, amarā & angustifoliā esse cōtendunt, vt diximus capite de lactuca, recteq; à patribus nostris pro endiuia vsurpatā, neque calore immodico, neque amarore nocere, cum eius amaror nō sit à calido, aut certe nō calidus: quemadmodū opii, meconiū, papauer, lactucā, mandragorā, & quædā alia calida esse nō dicimus, quia amara sunt, cum multū sint frigida. Quare nostri illi patres doctissimi, quamuis barbari, tum ratione tum experientia freti, rectē syrupis immiscuerunt, & stillatitias aquas ex ea elicerunt, quod decocto, succo, stillatitia, ad intemperies obstructionesque hepatis & primarum venarum, & ad mare rationes rhabarbari & similium medicamentorum vtiliorem esse deprehendisset: quia cum tenuiore sit, & minus excrementitio humido, & amaro, melius abstergit & aperit.

Li. 8. simp.

Li. 8. com  
ph. loc. c. 8.

Lib. 2. c. 130.



tum etiam intima rerum macerandarum altius permeat. Rectè igitur Dioscorides docet Serides siluestres stomacho vtiliores esse, nimirum æstuantem ipsum, & quem imbecillitas vexer, cibo lenire: foris etiam ad motas prodesse.

In libro 2.  
Diosc. c. 175.

*ZACINTHA* sive Cicho.  
*Verrucosum.*



*CICHORIUM* Constantinopol. Matthioli.



Sunt præterea cichoriacei generis plantæ duæ à Matthiolo posita, primâ Zacintham, quidâ ex Zacintho insula in qua nascitur, ille ab effectu cichorium Verrucarium nominavit. Radice nititur rapunculi figura, subnigricante, adnatis circumquaque capillaceis fibris. Folia habet cichorij, sed asperiora paullo, caules cubitales, quandoque maiores, tenues, asperiusculos, in quorum fastigiis flores prodeunt aurei, cichoreacea specie, quibus dilapsis semen oritur subnigrum, capituli instar, per longitudinem melo peponis modo striatum. Mira est huius plantæ ad tollendas verrucas vis atque efficacia. Affermat enim Matthiolus scire se nonnullos, quorum manus verrucis scatebant, ab iis planè liberatos fuisse, deuoratis semel tantum in acerario huiusce plantæ foliis. Idem præstat eius semen tribus diebus drachmæ pondere deuoratum, dum cubitum eunt verrucosi. Hæc accepta refert Matthiolus Francisco Calzolari pharmacopæo Veronensi, qui plantam hæc ad eum cum facultatibus misit. Chondrillam vel cichorium siluestre vocat Pena, asseritque in Italia non solum in Zacyntho oriri, negat hæc semel voratam delere verrucas, illitam verò posse, certum & commune illi esse ait cum plurimis, quarum succo exuruntur aut exsiccantur verrucarum radices. Alterum cichorij genus Constantinopoli allatum, ad eundem Matthiolum Vienna misit Augerius de Busbecke Flander, radicibus numerosis, velut in asphodelo pendulis, siliquarum ferè raphani figura. Cuius imago ob rei nouitatem hic prætermittenda non fuit. At minimè nouum aut peregrinū putat Pena. Dentem leonis Monspeliensium vocat, & in Cene, Hetruriæ, Liguriæ, Galloprovinciæ & Narbonæ pratis, non parum copiosum prouenire asserit. Monspeliensium Dentem leonis etiâ vocat Lobellius, fortasse Chondrillam alteram Dioscoridis, Asphodeh bulbulis. Rarum aliud cichorij genus addit Dalechampius, quod cichorium bulbosum vocat, de quo in libro de maritimis, dicimus. Nec minus rarum, sed simile & mirandæ facultatis Cichorij genus ad nos misit Doctissimus Miconius Medicus Barcinonensis, quod strumosum appellat. Nascitur hæc herba in vmbrosis locis, & agrorum marginibus inter frutices, foliis digi-





tum vnum lata, quattuor longis, lauibus, viridibus, minimè per ambitum serratis, incertis spatiis eminentia quædam habentibus, ex pediculo emergentibus, quandoque multis, quandoque paucis, aliis per terram stratis, aliis rectis. Ea trita lacteum succum emittunt, sed paucissimum, horum sapor subamarus est vt sonchi. Flos ei est luteus, è suo calice emergens vt in soncho & consimilibus, intus & per orbem foliolis luteis cinctus, ex cauliculo pender, vt in Dente leonis, tandem in pappum definit. Radix tenuis est, per humum sparsa, non admodum profunde se diffundens. Huius extremo radix quædam videtur adnata, aut prorsus aut ferme globosa, interim candida, quandoque, ex cædido in purpureum vergens, cortice tenui, pulpa intus candida, valde amara. Radicem istam globosam ad strumas curandas multum conferre se experimento didicisse Myconius asserit. Quinque aut sex integræ cum melle sumptæ, multis diebus continuis mirum in modum profunt. Eadem præstat aqua earum stillatilia, vel decoctum, sed inefficacius: item conditum ex iis cum melle paratum admodum iuuat. Quare hanc plantam Myconius cichorium strumosum à forma & effectû nūcupauit. A foliorum forma cichorium, strumosum vero ab effectû & forma radicis, quæ strumas refert, & sanat. Quam ob causam Barcinone, vbi frequens oritur, Porcellanes vocant, quasi dicas strumosam.

## CICHOREACEA ALIA.

## CAP. XIII.

Lib. hist. 7.  
cap. 7.



Ἀχάνα, inquit Theophrastus τὰ τοιαῦτα καλεῖται, κιχώριον, ἀφάκη, ἀνδράκλα, ὑποχρίσις, ἡεργέριον, καὶ ὅλως ὅλα κιχωριώδη τὰ ὅλα, διὰ τὴν ὁμοίωσιν τῶν φύλλων: πάντα γὰρ πῶς ἐμφερῆ ἔχει τῶν κιχωρίων. Id est, olera hæc vocantur, cichorium, aphaca, andryala, hypocheris, erigeron. Atque vniuersè omnia cichoriacea, à similitudine foliorum sic dicta: omnia enim quodammodo cichorio similia habent. At sunt quæ non foliis solum, sed & radicibus, & floribus cichorio similia sunt: præterea lacteo succo plena sunt, & cruda coctave similiter eduntur. Quorum multa cum hætenus ab herbariis non satis sint explicata, nec suis distincta nominibus, atque ob id magna ex parte ignota, Dale



Dalechampius ex Theophrasto & Plinio sic explicauit. Cichoreacea seu intubacea sunt, Picris, Apate, Aphaca, Apargia, Crepis, Hypochaeris, Andriala seu Hedy-  
pnois, Thesion, Corchorus. Picris quæ amarago à Theodoro Latinè dicitur, herba  
est quæ in arenosis & macris locis prouenit, lacte referta, foliis hieracij, minori-  
bus rotundioribus, humi iacentibus, cinereis, cauliculis breuibus, flore aureo, qui

Nomina

Locus.

Forma.

DICRIS Dalech. Hieracium  
Math Dodon.



APATE Dalecham.



hyemis asperrimæ vel niuib. opertus, iniuriâ  
sustinet, eoque tempore in nudis campis & ge-  
lu rigentibus conspicitur, tanta florescendi con-  
stantia, vt fere numquam flos ei desit, vt rectè  
scripserit Plinius & Theophrasto, eam toto an-  
no florere, quod cum de cichorio erratico dici  
non possit, florem ante hyemem amittente, fal-  
luntur qui id cichorium Picridem esse putant.  
Radiculis multis nititur, & tenuibus. Tota plan-  
ta gustu est amarissimo, vt vix aloë ipsa sit ama-  
rior, nomen etiam ei amaritudo imposuit. Sunt  
tamen qui ea cocta vescuntur vt cichorio. Tol-  
lit eximie verrucas auctore Plinio. Matthiolus  
Dodonæus, Lobellius pro hieracio minore de-  
pinxere. Cum cichoriacea auctore Theophra-  
sto germinet post Vergiliarum exortum, cir-  
ca initia scilicet mensis Aprilis, apate, fraus, à  
Theodoro dicta longè tardius exit, Mayo vide-  
licet, quod cum in ea herba cichoreacea quotan-  
nis vsu venire videmus, quam pro chondrilla  
maiore Dodonæus & Lonicerus monstrarunt,  
eam Theophrasti apaten esse iudicauit Dalechâ-  
pius. Gignitur ea frequentius in aruis pingui-  
bus, & terrenis aggeribus, nonnumquam in sil-  
uis, radice longa alba, cichorio simili, multis fi-  
bris superne capitata, foliis longis ex albo cine-  
reis altissimè incisis, proximè terrâ multis: cau-  
le sesquipedali, nonnumquam altiore, tenui, in  
exiles ramulos diuiso, in quo pauciora folia: ca-  
pitalis in summis caulibus rotundis: flore cum  
dehiscit caruleo, cichorio simili, minore: non-  
numquam luteo interdum puniceo, qualem in  
silua Vernacensi haud procul Lugduno (inco-  
le, le bois du Verneau vocant) Dalechampius vidit.  
Theophrastus Apate inter ἐπιγυρόφυλλα, id est,  
quæ ab radice foliata sunt recenset, Plinius inter  
ἐπικαυλόφυλλα, id est, quæ caule foliato sunt. Cau-  
le foliato est, inquit, & crepis & apate. Sed eo  
deceptus mihi Plinius videtur, quod apaten po-  
stemam τὴν ἐπιγυρόφυλλον in Theophrasto, cre-  
pidi proximè sequenti, & primæ τὴν ἐπικαυλό-  
φυλλον coniunxerit, tanquam etiam ἐπικαυλό-  
φυλλον. Aphacen primis imbribus post æquino-  
ctium germinare, & cito florere Theophrastus  
tradit, & eam ex æquinoctio nasci Plinius, ex  
eodémque

Li. 21. c. 17.  
Lib. 7. hist.  
cap. 11.

Lib. & cap.  
22.  
In libro 3.  
Diosc. c. 63.  
Lib. 7. hist.  
cap. 11.

Nomina

Lib. 5. c. 16.

Locus

Forma.

Lib. 7. hist.  
cap. 9.

Lib. 21. c. 16

Aphace.

Lib. 7. hist.  
cap. 8.

Lib. 21. cap.

14.

Lib. 7. hist.

cap. 11.





Ibid. eodémque Theophrasto subinde marcescente flore emittere alium, tota hyeme,  
Lib. 7. hist. totóque vere vsque in æstatem. Amaram esse & in cibos non admitti idem Theo-  
cap. 7. phrastus prodidit, inter olera tamen reposuit. Hac cum in cichoriacea plâta hic  
Lib. 5. c. 12. depicta perspicuè cernantur, aphacem esse indicauit Dalechampius, quam pro  
Locus. Hedypnoide, siue cichorio luteo depinxit Dodonæus. Nascitur in locis humidis  
Forma. & vliginosis, prope fossarum & lacunarum margines, radice pedali, succo lacteo

## CREPIS Dalechamp.

Apargia.  
Lib. 7. hist.  
cap. 9.  
Lib. 5. c. 14.

Locus.  
Forma.

Crepis.  
Lib. 7. c. 9.



referta, superne fibrata: foliis intubi siluestris,  
longioribus, latioribus, laciniatis: caule cubitali,  
multum ramoso: flore luteo hedypnoidi simili,  
capitulis comante. Apargiam inter plantas ἐπι-  
χτοφύλλος recenset Theophr. id est, quæ proxi-  
mè terrâ foliata sunt, qua nota cū hæc à reliquis  
cichoriaceis discrepet, à Dalechampio pro Apar-  
gia depicta est, à Dodonæo pro hieracio minor  
primo cui subscribit Lobellius, qui Hieraciū lon-  
gius radicum appellat. Prouenit in incultis ad  
oras pratorū, & agrorum, in fossis circa prædia, &  
viis, radice longa, candida, gracili, multiplicifor-  
liis humi iacentibus, ex atro viridibus, longis, la-  
ciniatis, hedypnoidi similibus: caulibus multis,  
palmum altis, subarris, nudis, læuibus, flore luteo,  
multiplici strue congesto, in pappos abeunte.  
Contra Crepis ἐπιφυλλόχουλός est Theophrasto  
id est, in caule foliata, cuiusmodi cū sit hæc plantā  
ta, & eam seruato adhuc crepidis nomine Crepalū  
vocat Itali, & terra crepalo, crepidem esse Theo-  
phrastus




phraſti indicauit Dalechampius. Naſcitur ſponte in aggeribus terrenis agri Monſpelienſis, ſatu verò & cultu in hortis noſtris. Radicem habet intubo ſimilem, parum fibratam, candidam: caules multos, cubitales, foliatos: folia intubo ſimilia ſunt, cãdiora, minus infecta ac laciniata, ſucco lacteo manãtia, guſtatu ſuauiſſima.


Locus.

Forma.


ANDRYALA maior.  
Dalecham.



ANDRYALA minor.  
Dalecham.



HYPOCHÆERIS  
Dalecham.



licet nonnihil amara ſint: ſlos luteus in pappos euanaſcens. Lobellius Italorum *Terracrepolo* vocat *Chondrillam* cœruleam cichorij ſilueſtris laciniatis foliis. Andryalã inter oleracea & intubacea numerat Theophraſtus. Eam arbitrat Dalechampius duplicem eſſe Fuchſij & Dodonæi ſonchum. Alter eſt maior horridior & aculeatus, alter humilior, tenerior, & ſpinis carens. Vterque in hortis humidioribus proſilit inter olea, & in vlginofis agris, radice longa flauoſcente, multis fibris innixa: foliis longis, latis, per ambitum incifis, in maiore pungentibus, in altero minimè: caule anguloſo, cauo, geniculato: flore luteo, hedypnoidi ſimili, minore, in pappos abeunte, qui Iunio menſe prodit, & tota æſtate durat. Hypochaeris, inquit Theophraſtus lauior eſt, & aſpectu mitior, & dulcior, nec vt Chondrilla, quæ proriſus edendo nõ eſt, & radice ſuccum multum & acrem fundit. Hæc eſt planta quam ex Dalechampi ſententia hic depinximus, quam Gaza inepte Porcelliam vertit. Cœruleo flore cichorium refert, quare Dodo-

Andryla

Lib. 7. hiſt.

cap. 7.

In hiſt. pl.

cap. 261.

Lib. 5. c. 13.

Locus.

Forma.

Hypocha

ris.

Lib. 7. hiſt.

cap. 11.

Lib. 5. c. 12.

Forma.

me,  
ico-  
hic  
pro  
idis  
Geo  
tris,  
rali,  
nili,  
æon-  
oxi-  
quis  
Apu  
pori  
i lon  
is ad  
lia, &  
zifo-  
is, la-  
ulis,  
ureo,  
unre.  
caſto.  
plan-  
repoli  
theo-  
trali



*Locus.* nœus intubum siluestre & cichorium vocat. Foliorum laciniis chondrillam secundam imitatur. Gignitur in locis herbosis, humidis, & incultis, radice longa, candida, foliis angustis, longis, per ambitum incis, pallidis, grato colore prætereuntium oculos inuitantibus: caule cubitali, ramofo: flore caruleo, æstate media

Lib. 21. c. 15.

**HEDYPNOIS**

Dalechampij.

**Nomina**

Lib. 20. c. 8.

Matth. in

lib. 2. Diosc.

cap. 125.

Ibid.

Lib. 1. c. 87.

Lib. 5. c. 16.

**Forma.****THESION** Dalechamp.

Endiuia Tragi.



Lib. 20. c. 8.

**Thesion.**

Lib. 1. c. 87.

*Locus.*

vigente. In acetariis cocta apponitur cichorij modo, salubris & iucundi saporis non Aegyptiis tantum, vt scribit Plinius, sed & aliis, vt Græcis præsertim, & Siculis, qui oleribus multis, quæ nos negligimus, valde delectantur. Siluestre genus cichorij alij Hedypnoida vocant, inquit Plinius, Officina Rostrum porcinum, Dentem leonis, Taraxacon, & dentem caninum, quidam Caput monachi. Matthiolus aphacen Theophrasti de qua diximus, esse putat. Anguillara Chondrillam Galeni. Hedypnoidis nusquam meminit Theophrastus. Tragus pro hæratio exhibuit. Dodonæus pro Chondrilla altera. Galli Pissenliet appellat, Germani Pissenblatt. Prodit hæc planta statim ineunte vere, in pratis, gramineis campis, sepulchretis, sepibus, radice cichorio proxima, lacteo succo referta, sed amariore, exterius flauescente, intus candida, gracili, longa, parum capillata: foliis magna ex parte per humum sparsis, cichoriaceis, longis, vtrinque per ambitum laciniatis, pinguioribus, mollioribus, auersa parte nonnihil venosis, erubescens, in mucronem sagittæ crispidi similem desinens. Inter quæ longi exoriuntur scapi rotundi, glabri, subrubentes, caui, lacteo succo pregnantibus, in quorum verticibus flores emicant pulchri, lutei, multiplici foliolorum ordine densi, qui cum deciderint succrescunt lanuginosa & papposa capitula, admirabile naturæ ludentis opus, quæ tandem à vento dissipata in ærem auolant, remanentibus scaporum nudis, candidis & rotundis verticibus, raso monachorum capiti similibus, qua de causa caput monachi plantam hanc quidam appellarunt. Stomachum dissolutum adstringit cocta, inquit Plinius, crudæque sistit aluum. Et dysentericis prodest magis cum lente. Rupta & conuulsa utroque genere iuuantur. Item quibus genitura valetudinis morbo effluat. Aprili mense floret. Est alterum prorsus huic simile plantæ genus, sed minus, nigrius, & radice succosa, non aliter quam eius quæ morsus Diaboli vocatur. Thesion eam esse plantam Dalechampi arbitrat, quam Tragus endiuia, Lancerus lactuce siluestris nomine pinxerunt. Locis incultis & saxosis, præter



pter muros & macerias, in frigidis & umbrosis locis reperitur, radice breui, alba, fibrata: caule procero, rotundo, ramofo, foliolis linguam imitantibus ornato, reliqua folia lactuca similia sunt, minimè incisa. Flos est luteus, qui tandem in pappos euanesceat, vt in senecione: semen nigrum est. Ex tota planta succus lacteus

**CORCHORVS**

*Dalechampi.*



**CORCHOROS** *Lobel.*



amarissimus exprimi potest. Quam ob causam, opinor, picridi thesion Plinius subiunxit: sic enim cum de picride dixisset, Thesion quoque, inquit, non dissimili amaritudine est, sed purgat aluum, in quem vsus teritur ex aqua. Id quod ex Theophrasto mutuatus est, sic scribente, ἡ δὲ τῆς θησιῆς φύλα τῇ μὲν γέσσει σικκὰ, πριβόμεν δὲ κοιλίας ἀποκαθαίρει. Athenæus thesij florem inter coronarias recenset ex Timarchidè poeta. Corchorum oleraceis & intubaceis adnumerat Theophrastus, qui ob amaritudinem in prouerbio est, eiusque folium ocimum amulatur, Plinius iis quæ sponte nascuntur, quibus pleræque gentium vtuntur in cibis. Alio in loco corchora anagalida interpretatur, de qua hinc non agimus. Dalechamplus corchorum esse suspicatur plantam eam, quam pro myosotide, id est, auricula muris maiore Tragus depinxit ac descripsit. Est enim valde amara, cocta tamen estur à quibusdam. Nascitur in umbrosis nemoribus, interdum in veteribus muris soli non expositis radice breui, valde fibrata, plantaginis simili: foliis humi stratis octo vel nouem, ocimi maioris figura, in ambitu crenatis superne interdum maculis rubris conspersis, inferne plerumque rubentibus, villosis: caule cubitali, rotundo, tenui, hirsuto, & foliis, & geniculis destituito. Flos in summitate caulis & furculorum luteus, multiplici foliorum ordine stipatus existit, hieracio similis, in pappos tandem euanesceat, floret Iunio. Tota planta lacteo succo madet. Cum Theophrastus corchorum ocimi folio esse dixerit, mirum est Plinium ex alio fortasse auctore scripsisse corchorum herbam esse conuolutis foliis ad similitudinem mori. Quare quidam legunt conuolutis foliis ad succi mori similitudinem, quod ex huius plantæ descriptione verum esse perspicitur. Illud vero silentio prætereundum non est, proximè terram ad caulis exortum inter folia saluosum quendam humorem colligi, iuglandis magnitudine, rotundum, qui spatio temporis incanis, pilis obductus velut situ, muris effigie representat. Corchorus, vt scribit Plinius, præcordiis, vt ferunt, utilis, aloperiusque & lenti-

*Forma.*

Li. & c. 22.

Lib. 7. hist. cap. 11.

Lib. 15.

Lib. 7. hist. cap. 7.

Lib. 20. c. 15.

Lib. 25. c. 13.

Lib. 9. c. 21.

*Locus.*

*Forma.*

Lib. 21. c. 32.

Lib. 21. c. 32.

*Vires.*



ri ea inuenio, apud Nicandrum quidem & serpentium morsus, antequam floreat. Lib. 1. c. 92. Aqua eius stillatitia, auctore Trago, ad quasuis internas & feruentes inflammationes cordis, stomachi, hepatis, pota & foris imposita facit. Chirurghi potiones vulneribus conferentes ex ea conticiunt, vino decoctam vulneratis propinantes, acque etiam foris admoventes. Succus expressus vtiliter auribus instillatur: nam punitiones earum & tinnitus tollit. Diuersum prorsus Cercorum pinxit Lobellius, Molochiam Serapionis quorundam, foliis Ocimi in sequipalmaribus & dodrantalibus cauliculis, flosculis iuxta pediculos luteis, semine in longis corniculis, Asclepiadis gracilioribus. Ex Hispano semine alebat in pensilibus hortis Io. Brancion in Bergio, & Cercorum Plinij faciebat.

## CHONDRILLA, CAP. XV.

## Nomina

Lib. 8. c. 22

Lib. 2. c. 126

## Genera.

Diosco.

ibid.

## Forma.



Ὠνδρίλλα. Latinis Chondrilla, Plinio Chondrillon, & Chondrile, Arabibus Candaret, Candaron, seu Amiron dicitur. Aliqui, vt Dioscorides tradit, cichorion, aliqui Serin appellauere. Eius duo sunt genera. Prior caules, flores, & folia habet cichorio similia, qua ex causa nonnulli siliuestris intubi speciem esse dixere. Verum tenuior tota est, nempe foliis, caule, floribus ac semine gracilioribus. In cuius ramulis gummi masticis simillimum, magnitudine faba inueniri solet, à quo tuberculo masticia, aut nucleo thuris simili, quem chondrum Græci nominat, nomen chondrilla sortita est. Quamuis amarior sit, non minùs quàm cichorium in acetaria admittitur. Nasci-


## CHONDRILLA

prior, Matth.



## CHONDRILLA

altera, Matth.



tur in locis cultis, & scrobium aggeribus, secusque vias. Aliud chondrilla genus folium fert oblongum, circumrotum, humi sparsum: caulem succo madentem lacteo, radice tenui, rotunda, laui, vicieta, flauescente, succosa. A lactis vbertate, quo omni in parte, praesertim in radice redundat, ab Hetruscis vulgò Lattaiola vocatur, quam rura suis acetariis pro cichorio immiscent. Nascitur in cultis & latis.

An haec



CHONDRILLA *rara*  
*purpurea, Lob.*

An hæc Chondrilla rara sit Lobellij Chōdrilla purpurante flore? Belgis dicitur Crupina à vocabulo Cruppen, hoc est repere, quia semen manu contrectatum se subducit ac prorepat. Hetruria, Syria, & agri Narbonēsis collibus, non procul à Lupo monte plantula hæc non inelegans exit, ad Chondrillas referenda. Dodrantales & sesquipedales cauliculos & geniculatos erigit: flores purpurantes in capitulis ex squamulis compactis. Semen laceæ aut Cartami silvestris nigrum, nitidum, pellucidum, deciduū. Prior chondrilla cum radicibus tusa adiecto melle, diuiditur in pastillos qui nitro admisti vitilignes emaculat. Gummi cum myrrha tritum, & linteo appositum instar oliuæ sceminarum menses trahit, inordinatos pilos replicat. Quod item tenera radix efficit, si intincta succo acus pilis admoueat. Contra vipersas in vino pota proficit. Succus decoctæ in vino, aut per se potus aluum sistit. Alterius chondrillæ caulis & folia concoquendi vim habent. Succus incommodos palpebrarum pilos reflectit. Galenus de feride tractans, chondrillam feridis

Diosco.  
Ibid.  
Vires.

Lib. 8. sim.

speciem esse scribit, & adstringentis esse facultatis. Ac ut Dioscorides, & cichorium & ferin appellari tradit, ita & Galenus hanc ferin etiam nominari, esseque eiusdem ferè cum illa facultatis, nisi quod sapore amarior est chondrilla, ac præterea sicciore vi prædita. Idem tamen alibi. Lactuca silvestre, inquit, simile olus est, quod chondrillam appellant, quæ citius in caulem assurgit, amaritudinemque habet magis perspicuam, & lentum quendam succum, albumque, cuiusmodi est timalorum succus, non tamen acer perinde ut ille: utrumque interdum ipso ad pilos in palpebris reglutinandos. Quo loco de secunda chondrillæ specie Dioscoridis loqui videtur Galenus. Hæ itaque species distinguendæ ex Dioscoride, tum ut internoscantur, tum ut in eorum usu non facile peccetur, quanquam haud periculosus error hic committi potest, cum facultatibus sint affines. Plinius utramque speciem confundit, & quæ Dioscorides duabus, ipse vni attribuit. Chondrillon siue chondrile, inquit, folia habet intubi, circumrosis similia, caulem minus pedali, succo madentem amaro, radice fabæ simili, aliquando numerosa. Habet proximam terræ mastichen, tuberculo fabæ, quæ apposita sceminarum menses trahere dicitur. Tusa cum radicibus tota diuiditur in pastillos, contra serpentes argumento probabili. Siquidem mures agrestes læsi ab hac esse dicantur. Succus ex vino coctæ aluum sistit. Eadem palpebrarum pilos inordinatissimos pro gummi efficacissime regit. Dorotheus stomacho & concoctionibus vtilem carminibus suis pronuntiavit. Aliqui sceminis & oculis, generationi quæ virorum contrariâ putauere. Idem inter vulgares in cibo herbas chondrillam recenset. Et rursus, Chondrilla, inquit, amara est, & acri in radice succo. Clusius aliam chondrillam pictam dedit, & descripsit foliis latis cichorij modo diuisis, prorsus incauis, & densa tomentosaque lanugine obsitis: inter quæ caulis eminet pedalis aut amplior, rotundus, candidus, aliquot ramulis brachiatus, & foliis minoribus atque angustioribus, quibus atque etiam ipsis ramulis plerumque inhaerent grumi fuluescentes succi istic concreti. Flos extremis ramulis insidet luteus, in pappos eua-

Lib. 2. Ali.

Lib. & ca.  
22.

Lib. 21. c. 15.

Ibid. ca. 17.

Lib. 2. stir.

Hispa. c. 65.



nescens: radix longa, nigricans, digiti minimi crassitudine. Tota planta incaua est, & succo pragnans, qui liccatu s fuluescit, & acris est. Inuenitur in agro Salmanticensi, locis incultis, & multis aliis Hispaniæ regionibus. Augusto floret, vel etiã ferius. Nonnulli Hispani vocant *Irua di S. Gayteria*, eiusque decoctum præmoris à cane rabido vtiliter exhiberi credant. Clusio plurimum ad primam Dioscoridis chondrillam accedere videtur. Hanc Lobellius Verrucariam Chondrillam appellat, à canaliculatis feminum capitulis clauam exprimentibus, *Mazza di cauallo*, & *Mazzaferata* Italicè dictam, à Matthiolo zacintham: quamquam figuræ inter sese differant. Conspicitur in eodem agro Salmanticensi post messes in aruīs Chondrillæ genus vimineum, planè longis lentisque & flexilibus virgis, candicantibus, sesquicubitalibus & tactu viscidis, multis exiguis foliolis secundum longitudinem nascentibus, quæ secundum radicem initio maiora sunt, cichorij fere incisura, postea flaccescunt: extremi rami flosculum exiguum, luteum, & in pappos euascentem gerunt: radix oblonga est, lacte manans, vt & reliqua planta. Floret quo superior tempore. Salmanticenses lunquiera vocant, & ex ea scopas faciunt, pueri viscum ex eius radice cum nigro melle faciunt, ad carduales aliasque aunculas capiendas idoneum. Hanc chondrillam eandem esse puto, quæ à Pena

CHONDRILLA  
prior, Clusij.



CONDRIILLA viminea  
viscosa, Pena.



Chondrilla viminea viscosa vinearum dicitur. Nam radix vniuersaque planta, inquit, lacte turget, & viscida est tactui, creberrimis vimineis viticulis, flexu mollibus, candidis, rectis, confertis assurgit, duorum cubitorum altitudine, folia in incichorij aut cyani incisura, sed valde exilia & tenera, reliqua foliola secundum viticulorum longitudinem certis & æquis distincta interuallis, ad fastigium vsque porriguntur, speciemque virgarum viridi albòque variegatarum præbentium: in viticulis insunt, flosculi lutei in pappos dehiscetes. Chondrilla hæc visu pulcherrima, plurima Iunio & Iulio floret cis Pontem Castrinoui à Mompelio vix sesquimiliare, cuius hæc datur pictura.

HIER



**H**OD *ἱεράκιον* Græcis similiter Latinis Hieracium dicitur, id est, Accipitrina, Gallicè Herbe d'esperuier, quod accipitres aues, Græcis *ἱεραὶ*, huius herba succo oculorum aciem acuere dicuntur. Hieracij genera duo facit Dioscorides, magnum & paruum, quibus adiecit Dalechamplus hieracium *μεγερόκευλον*. At hieracium quidem minus Matthioli, picrida Theophrasti ex Dalechampi sententia esse diximus. Hieracium autem magnum

Nomina

Genera.

Lib. 3. c. 63.

Ibid.

HIERACIVM magnum  
Dalechamp.

HIERACIVM minus Dalech.  
maius Matth.



Dioscoridis, caulem emittit asperum & spinosum, subrubrum, cauum: folia ex interuallis rariuscule diuisa, similia soncho per ambitum, luteos flores in oblongis capitulis. Hieracium maius id est, Matthiolò & Dodonæo, quod hîc Hieracij minoris nomine pinximus. Minus Hieraciũ Matthioli & Dodonæi paullo ante Picridis nomine exhibuimus. Aliud verò hieraciũ magnum profert hîc Dalechamplus, quod radicem habet reliquis hieraciis similem, sed crassiorẽ: folia circa radicem magna, ampla, sinuosa, in medio caule quaternã, quinãve eum amplexantia. Caulis cubito altior est, striatus: flos in eius vertice luteus, tragopogoni similis, amplior in lanuginẽ euanescentẽ, non vt in reliquis id genus plantis candidam, sed e rufo nonnihil rufescentẽ. Lacteo succo tota planta manat. In pinguibus & apricis locis nascitur. Quod autem hieracium maius Matthiolus exhibuit, pro hieracio minore ex Dalechampo hîc proponimus: folia enim ex interuallis habet, diuisa in ambitu, cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores orbem circinantes emicant. Eiusdẽ hieracium *μεγερόκευλον* à caulium longitudine cognominatum est. Radice nititur crassa, in fibras multas diuisa: caule est cubito maiore, subrubro, rotundo, villosò, media sui parte foliato: foliis multis, vna stipatis, oblongis: flore & in caulis vertice, & medio, qua filia cumulata exeunt, luteo in oblongis capitulis, tandem in pappo auolante. Tota planta lacteum succum fundit.

Forma.

Locus.

In lib. 3.

Diosc. c. 63.



HISTORIÆ OMNIVM PLANTARVM,  
*HIERACIVM Macrocaulon,* *HIERACIVM Sabaudum*  
*Dalechamp.* *Pen. & Lobell.*



*HIERACIVM Narbonense*  
*falcata filiqua, Lob.*



Lib. 3. c. 69.  
*Vires & Temper.*

Lib. 20. c. 7. sub lactuca aut intubi generibus id comprehendentes: Plinius de lactuca sponte nascentis generibus tractans. Ex his, inquit, rotunda folia & brevia habentem, sunt qui Hieraciam vocent: quoniam accipitres scalpendo eam, succoque oculos tingendo

Inhumectis, pinguibus, & opacis gignitur. Lobellius duo alia Hieracia pinxit. Prius Sabaudum nominat: Pena montanum, foliis & laciniis Chondrillæ cæruleæ altius incis, viridibus, in caule flaccido, molli, glabro: flore Dentis leonis, aliquanto minore: radice Tragopogonis. Alterum Narbonense falcata filiqua calendula semen & pedem alaudæ expriment. Notissimum est Monspelienfibus, ubi inter segetes, & in agrorum marginibus Bontoneto finitimis luxuriat, foliis oblongis Hieracij, vel chondrillæ marinæ: gracilibus alis, multis divisis cauliculis, & floribus luteolis lampinæ similibus: semen in falcatis paruum, calendula ritu exilibus corniculis radiatim ab vno pediculo aptis, alaudæ, cancri, vel aranei pedes referentibus. Vtrumque Hieracium, ut scribit Dioscorides, vim habet refrigerandi, & modicè subadstringendi. Vnde illitum stomacho æstuantis inflammationibusque prodest. Succus erosionem stomachi sorbitione mitigat. Herba cum radice illita vibratis à scorpione ictibus auxiliatur. Galenus Hieracium in simplicium censu præterit, ita etiam Paulus & Aetius.



gendo obscuritatem cum sensere discutiant. Quare non sine ratione Cordus existimat Dioscoridem libro tertio inter umbelliferas plantas Hieracia non descripsisse: cum enim sint oleraceæ & intubaceæ plantæ, eas libro secundo, ubi de lactuca & intubo agitur, describi oportuit.

In lib. 3.  
Diosc. c. 72.

SONCHVS.

CAP. XVII.

**S**onchus Græcis dicitur, sic & Latinis Sonchus, ἀπό τῆς σῶνός, id est, quod salubrem fundat succum. Cicerbitam à Romanis vocari, quo vocabulo etiam hodie Hetruria vitur, in quibusdam Dioscoridis exemplaribus legitur. Sed id nomen recens Dioscoridi attributum putat Ruellius, cum nusquam à Latinis usurpatum inueniatur. A recentioribus etiam lactucella, eademque fortasse quæ ab Apuleio lactuca leporina nominatur, quod cum leporem animus deficit æstu, hac sibi solet mederi, Galli *Lactifrons* à lactis copia nominant, & leporis palatum, *Palais au lieure*, quod hoc animal ut ab æstu vindicetur, & caloris propulset incommoda, soleat sub ramis eius decumbere. Sonchi genera duo agnoscunt Herbarij omnes. Siluestrius quoddam, & magis spinis horrens. Alterum tenerius, cibis expetitur. Plinius item duo, album & nigrum, ambo spinosa. Galenus ait Sonchum ubi adoleuerit ex spinosis plantis esse. Theophrastus quoque inter spinosas & aculeatas plantas Sonchum retulit. Dioscorides verò cum duo Sónchi genera, quæ primum diximus, fecerit descripsitque, in fine capitis subiungit. Alter Sonchus tenerior arboris instar latis constans foliis, caulem in ramos exeuntem folia distinguunt. Quod tertium genus scribit Matthiolus in utraque editione suorum in Dioscor. commentariorum non solum non inueniri in Italia, in qua non meminit se vidisse plantam, quæ Sonchum arborefcentem referat, sed etiam nihil de eo à Theophrasto, & Plinio literis mandatum. Idem tamen in secunda commentariorum editione Sonchum læuem alterum depinxit tantum Corna-

Nomina

Lib. 1. c. 20.


Genera

Li. 8. simp.  
Lib. 7. hist.  
ca. 9.  
Li. 2. c. 124.

In lib. 2.  
Diosc. c. 124

Embl. 117.  
li. 2. Diosc.

SONCHVS Lævis  
latifolius, Lobel.



SONCHVS Asperior,  
Lobelij.



Bb 4

or-  
ci-  
fi-  
en-  
na  
en-  
ter  
eto  
vel  
di-  
na  
ila  
di-  
re-  
bit  
ro-  
ra-  
st.  
iti-  
ne  
m-  
us,  
re  
me  
in-  
do



*SONCHVS Luis laciniatis  
foliis Lobel.**SONCHVS Luis.**SONCHVS Asper  
Matthioli.**SONCHVS Luis alt.r, Matth.*Embl. 117.  
lib. 2. Diosc.

rius duo duntaxat Sonchi genera à Dioscoride constitui putat, nec tertium accipiendum genus, de quo postremis verbis agat, velut antea de duobus locutus fuerit, sed de priore quod agrestius & spinosius est, primum agere: deinde in fine capituli de Soncho teneriore qui arborem refert. Lobellius alios, aut certe aliter pictos Sonchos exhibuit. Primum laevem teneriorem, latis foliis, leuiusculis per ambitum



tum laciniis & spinulis, asperis. Alterum aculeis asperiores, aut horridiusculum, foliis angustioribus, laciniis amplioribus & spinis acutioribus. Tertium lenem foliis multum laciniatis, dentis leonis. Quartum lauem alterum, folio profundis laciniis sinuato, cuius summum hederæ folium refert, aversa parte rubens, nullis spinis hirtum: flos endiuæ siluestris: caulis bicubitalis. Sonchus est laevis alter Matthioli. Sonchus latifolius Lobell. Sonchus asper Lobellij. Sonchus laevis Lobellij vulgaris. Dalechampiij tertium Sonchi genus arborefcēs protulit item & aliud quorum Historiam eius iudicio hic aliis Sonchis subiunximus. Sonchus asper & laevis caule cōstant anguloso, cubitali, intus cauo, inani, molli, fragili, lacte referto, & plerumq; rubescēt: foliis in ambitu per intervalla dissectis, sine cichorij modo laciniatis, quæ quidem in aspero crispa, aspera, & pungentia ac subrubescētia sunt, in laui leuia, & sine spinis. In caulium summitate flores sunt latei, Senecioni haud absimiles, qui tandem in pappos euanescent. Hi Sonchi nascuntur in hortis, campis & vineis. Vtriusque vis refrigerat, inquit Dioscorides, modicè adstringit, æstuantī stomacho, & inflammationibus illi profunt. Succus eorū stomachi resiones sorbitione mirigat: lac elicit, in vellere appositus sedis ac vuluæ collectionibus opitulatur. Tam herba quam radix illita vibratis à scorpione ictibus subuenit. Galenus de Sonchi viribus hæc scripsit. Sonchus ubi adolenerit, ex spinosis plantis est. Cæterum viridis etiānum & tener estur, perinde vt cætera olera siluestria. Temperamentum eius quodammodo mistum est: constat enim ex aquea terraq; substantia, vtraque lauiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est pariceps, & siue cataplasmatris modo illinatur, siue edatur, aperte refrigerat: postea verò quā planè resiccatus fuerit, terrestre eius temperamentū redditur, modicam habens caliditatē. Quæ præterea Plinius scripserit, scire operæ prætiū est. Estur & Sonchus, vt quē Theleo apud Callimachū apponat Hecale, vterque albus & niger, lactuca similes ambo, nisi spinosi essent, caule cubitali, anguloso, intus cauo, sed qui fractus copioso lacte manet. Albus cui est lactis nitor utilis orthopnoicis, lactucarum modo (ex embammate addit Cornarius ex vetere Pliniano codice.) Erasistratus calculos per vrinam pelli eo monstrat, & oris graueolentiam commanducato corrigi. Succus trium cyathorum mensura in vino albo, & oleo calefactus adiuvat partus, ita vt à partu ambulent grauidæ. Datur & in sorbitione. Ipse caulis decoctus facit lactis abundantiam nutricibus, coloremq; meliorem infantium: vtilissimus iis quæ lac coire sibi sentiant. Instillatur auribus succus, calidusque in straguria bibitur cyathi mensura, & in stomachi resionibus cum semine cucumeris nucleisq; pineis. Illinitur & sedis collectionibus. Bibitur contra serpentes scorpionésque, radix verò illinitur. Eadem decocta cum oleo in Punici mali calice, aurium morbis præsidium est. Hæc omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet vesci, vt morbos faciente, de albo consentiens. Agathocles etiam contra sanguinem tauri demonstrat succum eius. Refrigeratoriam tamē vim esse conuenit nigro, & hac causā imponendum cum polenta. Sic enim Cornarius ex eodem vetere codice. Soncho nostri vtuntur hyeme in acetiariis, inquit Matthioli, præsertimq; eius radicibus, quæ cum teneræ sint & dulces, mensis expetuntur. In vino decoctus stomachi fluxionibus medetur. Lacteus liquor è caule manans datur potandus agrè spirantibus, & astmaticis. Idem auribus instillatus dolorem tollit, præsertim in mali corio cum oleo decoctus. Sonchus dendroides, idest, arborefcens Dalechampiij radicem habet crassam, nigricantem, ex qua radicle multe prodeunt: caules bicubitales, atque interdum altiores, teretes, foliis stipatos sinuosis, seu per oras ex intervallo infectis, latis, quercui haud absimilibus, lacte diffluentibus. Rami in caulibus nulli sunt, sed ab imo scapo ad summū vsque

Forma.

Locus.

Ibidem.

Vires &

Temper.

Li. 3. simp.

Li. & ca. 22.

Ibid.



*SONCHVS Dendroides, Dalechamp.*



non procul à singulorum foliorum exortu, singuli nascuntur petioli, tenues, qui multos flores sustinent luteos, quales sunt aliorum Sonchorum, aut lactuca, qui tandem in pappos abeunt. Hoc est tertium Sonchi genus, cuius capite extremo de Soncho Dioscoridem meminisse diximus. Sed hic scrupulum ac dubitationem rei herbariæ studiosis iniiciet Dioscorides Latinus, in quo sic legitur. Alter Sonchus tenerior arboris instar, latis cōstans foliis: caulem in ramos exeuntem folia distinguūt, cum dixerimus ramis nullis, sed foliis tantum & floribus huius Sonchi caules ornari. Quem scrupulum eximent Græca quæ sic habent. ὁ δὲ Περὶ σόγχος, ὁ δὲ τρυφερός, δένδρωδης ἐστὶ, καὶ πολὺφυλλος: τὰ δὲ φύλλα διαφέρει τὸν ἄλκυον. Quæ sic fidelius conuertisset Ruellius. Alter Sonchus qui etiam tenerior, arborefcit, & latis constat foliis: caulem folia distinguunt. In laxosis frigidorum montium cliuis prouenit hic Sonchus. Eadem præstat quæ & reliqua Sonchi genera.

SENETIO.

[CAP. XVIII.]

**Nomina**

Lib. 7. hist.  
ca. 7.



Racis hētyepov quod flores eius capillorum ritu vere canescant, Latinis Senetio dicitur, quibusdam vulgò Cardocello, aliis Spellicciola, Gallis *Senesson*, Germanis *Creutzvurtz*, Hispanis *Bonuaron*. Theophrastus Senetionem oleraceis & intubaceis adnumerauit. Is & Dioscorides vnius duntaxat Senetionis meminerunt. Recentiores iidemque rei herbariæ

Li. 4. Diof.  
c. 92.

Lib. 5. c. 17.

**Genera.**

periti plura genera fecerunt. Quidam Iacobeam à quibusdam vocatam, Senetionem maiorem appellant. In qua etiam sententia est Matthiolus secunda cōmentariorum in Dioscoridem editione. Addunt his Senetionem marinum, Dalechampius Senetionem fœtidum. Dodonæus genera tria descripsit, Senetionem maiorem, huic similem minorem, tertium foliis longis & angustis, caule gracili recto, ex fusco purpurascens, molli veluti lana vestito. In summitate flores in palido lutei, statim atque dehiscunt cani fiunt. Hunc Theophrasti Senetionem esse arbitratur. Senetio Dioscoridis & veterum cauliculo est cubitali, subrubro

**Forma.**

foliis cōtinuis, laciniatis, & per extremitates erucæ modo diuisis, sed minoribus: floribus luteis, qui celeriter dissecti vanescunt in pappos: radice superuacua

**Locus**

Nascitur passim in hortis, atque etiā super mœnia & in maceriis. Virescit toto anno, & quolibet fere mense floret. Ideo non desunt qui hunc Italico idiomate vocent *Fiore d'ogni mese*. Folia cū floribus refrigerant, inquit Dioscorides

Matth. ibi.  
Lib. 4. c. 92.

**Vires.**


**Temper.**

Li. 6. simp.

Quare illita cum vini modico, vel per se, testium, & sedis inflammationes leniant: quin & ex manna thuris medetur cum reliquis vulneribus, tum iis qui nervi acceperunt. Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præstant. Verum recentes epoti strangulant. Totus caulis, si coctus in passo potui detur, stoma-



SENETIO *Math.*



his verbis. Senetio facultatem nullam ob-  
net, simul refrigerantiam, & modicè dige-  
rentem. Plinius de Senetione multas easque  
diuersas sententias recenset, inter quas eam e-  
tiam quam ex Dioscoride proposuimus. Eri-  
geron, inquit, à nostris vocatur Senetio.  
Hanc si sine ferro circūscriptam effodiat ali-  
quis, tangatq; ea ter dentem, & alternis ter de-  
spuat, ac reponat in eadem locum, ita ut viuat  
herba, aiunt dentem eum postea non doliturū.  
Herba est trixaginis specie ac mollitia, cauli-  
culis subrubicundis. Nascitur & in regulis & in  
maris. Nomen hoc Græci dederunt, quia vere  
canescit. Caput eius numerosè diuiditur, lanu-  
gine qualis est spinæ inter diuisuras exeunte.  
(Sic enim legit & distinguit Cornarius, cum in  
vulgaris exemplaribus exaratum sit, caput eius  
numerosè diuiditur lanugine, qualis est spinæ,  
inter diuisuras exeunte.) Quare eam Callima-  
chus Acanthida appellat, alij pappū. Nec dein-  
de Græcis de ea constat. Alij erucæ foliis eam  
esse dixerunt, alij roboris, sed minoribus multo.

Lib. 17. c. 13.

Fab. 1. 3. 1.  
4. Dioscor.

Radice alij superuacua, alij neruis vtili, alij potu strangulante. E diuerso quidam  
regio morbo cum vino dederunt, & contra omnia vesicæ vitia item cordis & io-  
cinoris. Renibus extrahere arenam dixere. Ischiadicis drachmam cum oxymelite  
ab ambulatione propinauere: torminibus quoque in passo vtilissimam. Præcor-

SENETIO maior, *sive*  
*flos S. Iacobi, Fuch.*



diis etiam cibo ex aceto eam prædicantes, se-  
rentesq; in hortis. Nec desuere, qui & alterum  
genus facerent, nec quale esset demonstrarent,  
contra serpentes in aqua bibendā, edendamq;  
comitialibus dantes. Nos eam Romanis expe-  
rimentis per vsus digeremus. Lanugo eius cum  
croco & ex igno aquæ frigida trita, illinitur  
epiphoris. Tota cum mica salis strumis. Nec  
hoc solum loco Plinius Romanis experimen-  
tis per vsus eam digerit, sed aliquanto post, Eri-  
geron quoque cum farina thuris & vino dulci  
testium inflammationes sanat. Et rursus. Dolo-  
ribus Erigeron ex aceto illinitur: quæ paulo  
aliter Dioscorides habet. Senetio maior quo-  
rundam, ab Herbariis vulgò Herba S. Iacobi, &  
S. Iacobi flos, & Iacobea nominatur, Gallicè  
*L'herbe S. Iaques*, Italicè *Carduncello maggiore*, Ger-  
manicè *S. Jacobs Blum*, caulibus est longis, ali-  
quando sesquicubitalibus, rubentibus, striatis,  
furculosis: foliis in ambitu laciniatis, erucæ sil-  
uestris æmulis, nigricantibus, gustu amaris, an-  
te caulium exortum humi iacentibus: floribus  
luteis forma chamæmeli floribus haud dissi-  
milibus, qui flaccescētes in papposam lanuginē  
euolant:

Lib. 6. ca. 8.

Cap. 12.

Forma  
Iacobea.



*SENETIO Maior, siue  
flos S. Iacobi. Matth.*

*Locus.*

*Li. 1. c. 47.*

*Forma*



*SENETIO Fœtidus  
Dalechamp.*

*Lib. 2. c. 5.*

*Locus.*



euolant: in medio semen est cinereū: radix alba, & fibrata. Nascitur in agrorum marginibus, & aquarum ripis, locisque arenosis. Iulio & Augusto mensibus floret. Amara est, & adstringit, ideoque calidam & siccam esse constat. Recentiorum medicorum experientia cognitam est, herbam hanc vulneribus mirifice mederi, & ad interanea prodesse. Fistulas quoque iidem curare, & ne ultra serpent prohibere impositam tradūt. Aiunt alij huius succo gargarizato gutturis inflammationes & apostemata sanari. Eandem pinxit Lobellius nomine Iacobæ Senetionis. De Senetione marino, siue Iacobæ marina Dodonæi diximus in libro de maritimis. Senetio fœtidus Dalechampij radice nritur palmum longa, lignosa, cōtorta, nigricante, fibrata: constat venusta foliorum coma ex atro virentium denso stipatu prodeuntium, Senetioni similium, elegantissimis incisuris diuisorum, ut acanthi speciem ob venustatem pictoribus sculptoribusque magnopere celebratam vincant, tam pinguiū, ut melle illita quipiam credere possit, & complicata, & sese mutuo contingentia vix separentur, sic tanquam eo glutinis lentore cohærescunt, odore graui, qualis est scrophulariæ maioris, aut ebuli, vnde ei fœtidi cognomentum: caulæ pedem non excedente, supra folia parum extante, ac inter ea ferè abdito: flore Senetionis, luteo, in pappos abeunte. Quidam artemisiā fœtidam appellant, à quadam cum artemisiæ foliis similitudine. Sunt qui sideritim quartam à Plinio memoratam esse volunt, in maceris nascentem, cum teritur fœtidi odoris. In macris, asperis, & frigidis locis luxuriat. Succum laudant ad vlcere maligna. Alia duo Senetionis genera Myconus dedit quæ hic depinximus. Prius herba est in saxis nascens, fruticosa, radice minima, in radículas alias diuaticata, cauliculis multis, teretibus, lignosis, candicantibus, dodrantalibus, in quibus folia sunt minima, tenuia, rorimarini, sed tenuiora, superne viridia, inferne candida, quæ inæqualibus spatiis in caulibus oriuntur: in singulorum cauliculorū cacumine modo bina, modo ternam, quandoque quaternam capitula emergunt pinæ nuci effigie, quæ tandem in pappos euanescent. Trita manibus folia pini odorem referunt, mania vero adstringentem saporem. Hanc ille Senetionem vocat, quod ut cætera Senetionis genera, facile canescat. At stœchadis citrinæ species potius videtur, de qua dicemus idoneo loco. Alterū genus, herba est in quercetis, locisque non admodū siccis



fecis, sed humidis, interdum & in pratis nascens, cubitali altitudine, radicibus tenuis, candidis, lignosis, dulcibus, caule aliquantisper piloso, rotundo, cauo, medulla lanuginosa farcto, in quo folia sunt exigua, pilosa, in ambitu serrata, crassa, aliquantulum viridia, infernè rubescentia, quæ quandoque colore vinoso manus inficiunt. In caulis summitate flores sunt lutei, in pappos protinus abeuntes. Sapor totius plantæ aqueus est, ut vulgaris Senetionis. Videtur genus esse Se-

SENETIONIS Genus,  
*Miconij.*



SENETIONIS Species,  
*Dodonai.*



netionis à Plinio descriptum loco supra adducto, trixaginis specie & mollitia, cauliculis subrotundis. Nascitur in tegulis & in muris. Sic ea quam hîc damus, foliorum specie trixaginem æmulatur, caulis & folia rubescunt, citò canescit, & flos in pappos abit. Quod in tegulis & muris oriatur, non repugnat: nam vulgaris Senetio etiam in montibus, & locis diuersis reperitur. Aliam Senetionis speciem protulit Dodonæus alio in loco, quæ tamen differt à Senetione maiore & minore, foliis maioribus, profundius incisis, & ad cichorij folia accedentibus, caules eius ramosi, pedales, comantibus in summo floribus luteis, qui citissimè & canescunt, & in pappos abeunt, veluti Senetionis, cætera Senetioni æqualis. Fœtet herba nonnihil, unde cichorium fœtidum à nonnullis vocatur. Hæc herba certè in cichoracearum numero habenda, & talis quidem, inquit Dodon. qualis est Theophrasti Aphace cichoreacea, nisi quod hæc æstate solum floret. Theophrasti vero Aphace tota hyeme, totòque vere. Hanc pinxit Lobellius nomine Erigeri tomentosi. Foliis enim est tomentosis, in calidis regionibus proueniens.

Lib. purg.  
Ape. l. c. 25.



Nomina

**B**ουγλωσσον, & βεγγλωσσος, Latinis etiam Buglossum, & lingua bouis, seu lingua bubula, nominatur, vulgò Borrage, Plinio Euphrosynon ab efficienda voluptate, vt dicitur, Arabibus *Lesan arthaw*, seu *Lesan al-thaw*, Gallis *Buglosse* & *Bourrache*, seu *Borrage*, Italis *Borragine*, Germanis *Borrescht*, Hispanis *Borraia*. Leoniceus, Manardus, Ruellius, Fuchsius, Tragus, Cordus, Matthiolus, Marcel. Virgilius, Dodonæus, Cornarius, Pena & Lobellius, atque alij rei herbaria periti, Buglossum veterum, eam proculdubio herbam esse putant, quam borraginem vocamus, non illam quæ vulgò buglossa nominatur, & cuius in officinis communis est vsus, neque id temerè, ac sine iudicio. Primum

Li. 4. c. 124.

**BORRAGO** Buglossum verum.Dere rust.  
ca. 40.Lib. 2. cauf.  
ca. 436.Li. de med.  
herb.

descriptio buglosi à Dioscoride tradita borragini ita conuenit, vt nulla prorsus nota ab illa discrepet. Buglossum, inquit, verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitans linguas. Quis nisi plane amens ex ipsa inspectione non iudicet Borriginem folijs esse verbasco similibus, nigrioribus tamen & asperioribus? Nonne & folia Borriginis in terram inclinant, & bubulas linguas tum forma, tum asperitate imitantur? Contra quæ Buglosi nomen in officinis sibi falsò vendicauit, nonne folia habet oblonga echio similia, non ita lata vt bubulas referant linguas? Ob id Cato furculum insitum cum lingua bubula obtegere iubet, si pluat, ne aqua in librum permanet, nonne rotundiore & latiore potius folio, quale est Borriginis, quàm longiore & angustiore, quale est Buglossa, ad contegendam rotundam infisionem vt maluit? Præterea Buglossa folia minùs in terram vergunt, quin potius surgunt, è toto ferme cespite sursum tendentia, nec aliqua ex parte verbascum referentia. Ad hæc Buglossa folia modicè hirsuta sunt, mollia, denique albicant, non nigricant. His accedit Auicennæ testimonium sic scribentis: Lingua bouis est herba lata habens folia sicut almaru, & ad tactum aspera, & rami eius asperi sunt, sicut pedes locustarum. Oportet autem vt illa administretur, quæ est in Corasceri crassa habens folia, super quorum faciem sunt puncta, quæ sunt radices spinarum & pilorum exeuntium ab ea. Quibus verbis adeo perspicuè Borriginè expressit Auicenna, vt faciliè quiuis intelligat eam esse linguam bubulam, quam diligenter descripsit præter motem, quod suo quoque tempore non deessent, qui veri Buglosi loco alia vterentur: quod declarat iis verbis quæ subiicit. Quæ autem in hac terra reperitur, & qua vtuntur medici, plurimum illius est. Hæc Auicenna. Iam vero Apuleius Buglossum Corraginem à Lucanis appellari scribit, quod cordis affectibus quam maximè opitentur, quæ primè monstratum sit Borriginem nostram veterum esse Buglossum, in posterum medicum pharmacopœiis, sicubi Buglossum ab antiquis in medicamentorum compositiones adhibitum legerint, Borriginem nostram, non vulgare Buglossum usurpent.



vsurpent, vt iis vsuri quas debent vtilitates ex medicamentis capiant. Est igitur Borrigo Buglossum latifolium Lobellij, perperam Lycoplis Anguillare: foliis latis, oblongis asperis, eminentibus vbique bullis, tenuissimis aculeis armatis, qui totam plantam hirsutam, atque rigidam reddunt: caule cubitali, & quandoque maiore, pingui, cauo, subrubente, aculeis vbique rigente, ramulis multis brachiatos: floribus stellam modo radiantibus, speciosis, carulei coloris, nigro è medio prominente apice: semine nigro & striato: radice alba, tenera, pollicari crassitudine, gustu subdulci, & lento. Aliam Buglossam seu Borriginem scribit esse Cordus, quæ solo florum colore à superiore differt: omnino enim candidos edit. Quid verò de vulgari nostra Buglossa sentiendum? Buglossum domesticum seu hortense & satium Mesues esse Borriginem, siluestre verò seu erraticum esse Buglossum vulgò dictam censuit in Mesuem Manardus. In eadem est sententia Valer. Cordus. Matthiolus Borriginem & vulgarem Buglossam specie quidem & forma à sese differre arbitratur, sed iisdem pollere viribus, eundemque vtriusque saporem euidentem facere eiusdem facultatis iudicium: aut si eadem prorsus vires non sint, certe proximas, & valde similes esse: quin & facie non multum ea differre, si illud genus spectes, quod hodie ex Hispania allatum in hortis feritur, quod etsi verbascum non omni ex parte referat, quemadmodum Borrigo, foliorum tamen figura bubulas linguas maximè imitatur. Fuchsius Buglossam vel linguam bouis Officinarum & Herbariorum, Cirsium Italicum vocat. Dodonæus eandem Buglossam domesticam maiorem Officinarum, Cirsium Fuchsi, Buglossum magnum satium vocat & lycopsum. Lobellius & Pena Buglossum angustifolium. A Dodonæo dissidet Matthiolus, sicut & ab iis qui Buglossam vulgarem echij genus esse statuunt, sicut in Echio & Circio dicemus. Cæterum buglossum vulgare folio est longiore quàm Borrigo, hirsuto, mollius aspero: caule sesquicubitali, rotundo, hispido, ex quo rami exeunt sursum spectantes: flores edit purpureos, Borragine minores, è quibus nigrum oritur semen. Radix illi est Borragini similis omnino, sed crassiore, pinguiorèque cortice. Buglossam longifoliam Cordus, Tragus Italicam appellat. Huius tria obseruauit genera Matthiolus, hortense latioribus ac longioribus foliis, & siluestris duplex genus. Vnum foliis latioribus, & floribus purpureis, alterum foliis angustioribus, & floribus nigricantibus. Dodonæus præter Buglossam satium quod diximus, alterum Buglossum minus reperiri in quibusdam Germaniæ locis, & in Belgij hortis scribit, facitque anchusæ genus. Lobellius, Buglossum minimum Echij facie appellat, radice & foliis angustifolij Buglossi, sed exilioribus, Echij paribus. Flos ex rubello violaceo nitet. Semen Buglossi haud ab simile. Saporis, odoris & vsus non disparis. Hæc Lobellius. Alterum Buglossum siluestre, quod lycopsum siluestrem ipse appellat, seplasiarij

Matthi. in li. 4. Diosc. ca. 124.

Forma.

Lib. 1. plan. ca. 74.

Ibidem.

Li. de hist. plan. c. 128. Lib. 1. ca. 3.

Forma.

Matth. ibi.

Lib. 1. plan. ca. 45. Lib. 1. c. 77. Ibidem.


Lib. 1. c. 3.

*BVGLOSSVM Vulgare.*



Buglossam siluestrem, Buglossum satium minus, quod modo ex Lobellio descriptum Buglossum maiori satiuo prorsus simile facit Dodonæus, caule, foliis hirsutis, asperisque & radice: nisi quod hæc omnia in isto sunt minora, cauliculi bre-



BUGLOSSVM Minus  
silvestre, Dodonai.

Caput.



uiores, folia minora, & angustiora, flores similes, minores, purpurei coloris, sed dilutioris: semen item simile, minus & nigrius. Id Fuchsius pro circio Germanico exhibet. Huic proximu Buglossum silvestre, siue Lycoplis silvestris, sed foliis asperioribus, minoribus, angustis, flores similes, sed multo minores & caerulei, semen minutum & fuscum, radix longa & gracilis. Fuchsius id echium esse, ac pro eo depingere voluit. Hic non omittendum Buglossum semper virens Penæ, etiam in frigidissimis regionibus, Anglia, Antuerpia & reliquo Belgio, ubi plurimum & per oportune viget in hortis ad vsus medicos. Folia ei subrotunda, lactioia Borriginis, vti etiam caulis: radix situ, habitu, & muccagine consolidæ maioris: flores vero secus alas & folia prorsum angustifolia, eiusdem saporis & vtilitatis ad cordis, & melancholicos affectus. Huius plantæ Lobellius non meminit, sed alterius quam Symphytum pumilum repens Borriginis facie appellat, Borriginem minimam herbariorum, quæ alicur in hortis Belgij, foliis Borriginis aut pulmonariæ, minoribus: flosculis item in caeruleo purpureis Borriginis, sed radix pulla Vlmariæ aut caryophyllaræ fibris implexa. Floret hyeme in pensilibus hortis, vere, etiam Augusto in hortis. Gustanti cum muccagine quandam acrimoniam exhibet, quod Borriginis aut Buglossi negatum est. Quam





Quenam sit hæc antiquis adhuc ignoramus. Hæc Lobellius, qui eandem aut  
 persimilem vidisse se ait in horto Mutoni, cuius folia conspersa erant notulis  
 pulmonariæ ritu. Sed quæ de Borragine & Buglossò dicenda supersunt perse-  
 quamur. Borrage sponte nascitur in hortis omnibus, adeo vt inde haud facîle ex-  
 tirpari possit, & in sabulosis campestribusque. Tota æstate floret. Borrage, aucto-  
 re Dioscoride, in vinum injecta animi voluptates auget. Cui subscribit Galenus  
 sic scribens. Buglossum humidæ calidæq; temperiei est. Itaque vinis injectum  
 lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditur. Sed & iis qui ob gutturis asperitatem tus-  
 siunt, coctum in melicrato conuenit. Et Paulus his verbis, Buglossum humidum  
 est & calidum temperamento: quamobrem vino immisum lætitiæ ac animi  
 voluptates efficere dicitur: Plinius. Iungitur huic Buglossos, boum linguæ similis,  
 cui præcipuum, quod in vinum deiecta animi voluptates auget, & vocatur  
 eufrosynon. Quæ verò in quibusdam Dioscoridis exemplaribus reperiuntur,  
 Buglossum nascitur in campestribus, &c. Deinde aiunt eam quæ tres thyrsos  
 emittit, &c. Dioscoridis non sunt, sed planè supposititia, tum ob dictionis dissimi-  
 litudinem, tum quod eadem in Plinio de Cynoglossò leguntur. Iungitur & Cy-  
 noglossos caninas imitans linguas, topiariis operibus gratissima. Aiuntque quæ  
 tres thyrsos seminis emittat, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesse,  
 quæ quatuor ad quartanas. Quamquam etiam in Plinio simile quiddam habeat-  
 ur de Buglossò: Buglossò inarescente si quis medullam è caule eximat, dicatque  
 ad quem liberandum febreid faciat, & alliget ei septem folia ante accessionem  
 aiunt à febre liberari. Quare illa ex Plinio, vel ex alio quouis Dioscoridi adiecta  
 esse constat, nec in Aldino exemplari Græco reperiuntur, neque ea habet Ruel-  
 lius in translatione sua, in qua hoc capitis exordium est. Buglossum verbasco simi-  
 le est, &c. Buglossum vrinam cit, inquit Symeon Sethi, & sitim sedat. Caules eius  
 cocti, & crudi comesti iecoris affectibus profunt. A viatoribus ex eo conficitur

*Tempus.*

*Li. 4. c. 12.*

*Vires.*

*Tempus.*

*Li. 6. simp.*

*Lib. 7.*

*Li. 25. ca. 8.*

*Lib. 25. c. 8.*

*Lib. 26. c. 11.*



Matth. ibi.

zulapion, & est vtile. Vulgari Buglosso vt & Borragini vis sane magna inest ad animi deliquium, atque alios cordis affectus, & ad melancholicos morbos, & præsertim eorum decoctum ex vino vel aqua. Trita vulgaris Buglosi radix ex aceto, & illita tribus diebus continuis scabiosos iuuat. Præstat vtriusque plantæ succus haustus ad epota venena, & venenatorum animalium morsus. Stillaricia eorum aqua delirius, quæ cum febre eueniunt mirificè auxiliatur. Præterea oculorum inflammationes mulcet tum sumpta, tum imposita.

## CIRSIVM.

## CAP. XX.

Nomina

Li. 4. c. 114.

Forma.



ΙΡΣΙΟΝ melius quàm vt quidam transposita vna litera legunt *ιρσιον*, Latine etiam Cirsium dicitur, quod varices quos Græci *υρσιος* vocant, sanet à Romanis spinam mollis. Cirsium, vt auctor est Dioscorides, caulis est tener, duorum cubitorum, triangularis ab imo foliola rosæ speciem referentia: anguli spinosi, per intervalla molles: folia Buglosso similia, longiora, subcandida, modicè hirsuta, patibus extremis aculeata: cacumen caulis orbiculatum, hispidum, in quo capitula in summo purpurea, quæ soluantur

Lib. 17. c. 8.

CIRSIVM, Matth.

Li. 4. Diosc.  
c. 114.

Locus.

Vires.

Ibidem.

Lib. 4. ca. 11.

Forma.

Locus.

cuius figuram hic apponimus, pro Cirsio Matthioli exhibet, quod ei Dioscoridis descriptio maxime convenire videatur: Nascitur, vt ille scripsit, in vliginosis locis. Radicem Cirsij loco laboranti adalligatam dolores varicum sedare, Andreas scripsit referente Dioscoride. Et hanc herbam, Plinius ait, radicemve eius adalligatam dolores varicum sanare tradunt. Cirsium aliud describit Dodonaus, quod & hic apponimus, foliis magnis, latis borraginis foliis maioribus, latioribusque, spinis parvis opertis: caule anguloso, tenero, fragili, circa cuius summum foliola multa sunt congesta, inter quæ cardus echinatus & rotundus prodit; flore purpureo in auras abeunte. Radix est crassa & fibrata. Locis humidis, & circum aquas provenit. Augusto mense floret, frigido siccoque est temper



*CIRSIVM Dodonæi.*




temperamento, & viribus soncho fere simile. Cirsium aliud duobus in locis pictum dedit idem Dodonæus, cuius folia sunt oblonga, lactuca fere similia, verum acuminata, & per circumferentiam aculeata, candidiora vulgaris buglossi foliis: caules recti, bicubitales, in alas nonnullas discreti, in quorum singulis capitulum eminet hispidum, quod post floris vigorem deorsum reflexum nrat, tandemque in papposam lanuginem resolvitur: flos purpureo rubet colore: semen splendet aliorum carduorum instar. In hortos aliunde illatum est. Fertur alicubi in maritimis exire. Id carduorum generibus adnumerat. Lonicerus & Fuchsius cirsium buglossum magnum, siue buglossum Italicum esse existimant. Cui omnino similem plantam quandam in Germania copiosè nasci tradunt, nisi quod minora omnia habet, cuius figuram hîc damus. Ob quam, cum cirsio seu buglossio Italico, ut illi putant, similitudinem Cirsium Germanicum nominarunt. Scribit Lobellius in Belgij hortis plures Cirsij ex

Lib. pur.  
App. 1. cap.  
22. & lib.  
de Hortic.

foliis & capitulis conspici differentias, præter genera memorata. Vnicaules quaternum & quinum cubitorum, folia incana buglossio hortensi angustifolio altero tanto maiora & longiora, oris & ambitu laciniatis & spinosis, flores purpurei, singuli in singulis cymis papposi in duplo maiore squamulis loricato capitulo, minus spinulis horrido. Eius hæc est icon. Pinxit etiam Lobellius Cirsium Anglicum quod videtur Spinam albam adumbrare, spithameo caule & fo-

*CIRSIVM Germanicum, Loniceri.*

*CIRSIVM aliud, Dodonæi.*







lis circij, ad quod commodè referri potest, flos singularis Cardui bulbosi. Radix Bellioli, aut Ellebori nigri modo fibrata. Prouenit in pratis. Gustu præficcò, adstringente, moderatè calido. Hæc Lobellius.

## MALVA. CAP. XXI.

**Nomina**  
Lib. 20. c. 21  
Lib. 20.



**Genera.**

**Genera.**

**Forma.**

T malua Latinis quasi molua quod aluum molliat, dicta est, auctore Varrone, ita Græcis *μαλάχη* ab emolliendo vêtre, quia *μαλάσσειν* molire significat. Plinius mouorem, à Græcis molopen vocari in fatiis, alteram malachen scripsit. Athenæus *μαλάχην* Attice dici, in multis autem Antiphanis & Epicharmi exemplaribus *μολόχην* per *δ*, scriptum reperiri. Arabicè *Chuberg* seu *Chubas* nominatur, Italicè *Malua*, Germanicè *Pappel*, Hispanicè *Maluas*, Gallicè *Maunue*. Maluæ multa sunt genera. Est enim malua *κρημνή*, id est, hortensis, siue fatiua, & malua siluestris, non quæ in siluis, aut asperis locis, sed quæ in incultis sua sponte nascitur, quam *χρυσάνθη* Dioscorides vocat, quæ vox incultam & inelaboratam terram significat, qualis in semitis, pratis, aliisque huiusmodi ruris & agri partibus est. Et siluestris hanc maluam, vulgare intelligimus, non althæam, nec alceam, de quibus postea dicemus. Hæc malua vulgaris in viis omnibus & areis prope vrbes luxuriat, caules multos edens teneros, flexiles, folia quæ plurima, crassiuscula, ambitu nonnihil laciniata, circinata, viridat: flores tota æstate fert particulatim purpureos, vel ex purpureo pallidos, deinde orbiculos in quibus semina, radix est longa, digitum æquans, lignosior. Maluæ differentia sunt aliquot, ex florū figura, & vario colore. Alia enim rubras, alia candidas, alia in purpuris albicantes rosas producit. Et has rursus atque illas vel simplici, vel multiplici foliorum textura constantes, quarum effigiem & pulchritudinem demirans vulgus Rosam transmarinam cepit appellare, Gallice *Rose d'outremer*. Malua siluestris duplex: quædam enim altius attollitur, & fere arborefcit, quædam pumila est, & humi iacet. Malua hortensis quæ sæpe grandescit in arborem, radice est longa crassaque: caudice simplici, luxuriose proceritatis, baculi vsum præbente, rotundofoliis amplis, per ambitum ferratis, iis verò quæ in superiore caule sunt vulgaris maluæ



ut modo diuisis, flores pulcherrimi, caulem à medio fere ad verticem usque exor-

*MALVA Vulgaris, Matth.*



nant, varij coloris, vt diximus, breui admodum pediculo dependentes, qui venustate rosis non cedunt, & si suppeteret odor, de principatu certarent. Primum capitula quaedam brevibus innixa petiolis, & leuiter in mucronem fastigiata è caule profiliunt, illque paulatim intumescen-  
tibus pręgnantia florum inuolucra fatiscunt, in quibus dehiscen-tes rose sese pandunt, & explicantur in folia, interdum quinque interdum structili quadam serie, vt diximus, numerosa, calicibus apices paucos complexis, qui lutei me-  
diis emicant, quibus decidens erumpunt purpurea stamina. His fortis succrescit multipli-  
citer tunicatus, atque in vmbilici formam numero-  
so semine coagmentatus, in quibus cum decussa sunt folia, reliquarum maluarum mo-  
do semina recluduntur. Hęc malua maior à Matthiolo, & iure quidem nominatur. Aliam maiorem maluam depinxit, caudice non sim-  
plici, sed similiter crasso, rotundoque & egregiis floribus decorato, ex cuius inferiore parte folia exoriuntur longis pediculis nitentia, valde am-  
pla, rugata, venosa, per oras ferrata, in profun-

Lib. 2. Dio  
scor. c. III.

das lacinias diuisa, superiore caudicum parte minora. Item tertiam, quę aut est malua satiu laciniola Cordi, aut ab ea non multum disidens. Caulem singula-  
rem erigit humana statura plerunque proceriorem, numerosis & cubitalibus ad-  
natis ramoiam, modico angulosum, glabrum, intusque angusta concauitate per-

*MALVA Maior I. Matth.*



*MALVA Maior II. Matth.*



uium



*MALVA maior tertia,  
Matthiol.*Lib. 1. hist.  
cap. 5.

Lib. 19. c. 4.

Quod non longo fit tempore, sed senis aut septenis mensibus, ut longitudine crassitudinēque hastam æquet: quare baculi usum præbet, tempore verò longiore maius quoque proportionē fit incrementum. Plinius eadem fere prodidit. Tradunt auctores, in Arabia malvas septimo mense arborescere, baculi usum præbere

*MALVA silvestris  
Pumila, repens.*

uim. Folia fert glabra, sub ramulorum exortu singula, in quinas, senas, aut septenas (non tamen profundius incisas) per ambitum crebro laciniosas, & infractas partes diuisa, quæ verò in summis virgis folia sunt, his magnitudine cedunt: flores per totam æstatē secus folia fert multos, paruos, candidos, ex quinque foliis constantes, singulis multa succedunt semina, in orbem mucroni cuidā velut centro circumposita quinque partito calice incidentia. Radice nititur pete longiore, singulari, candida, fibrata. Tota herba gustum dulcem, lubricum & glutinolum refert saporē. Malua hortēsis in hortis sata prouenit, quæ in tantā magnitudinē accrescit, ut iustæ arboris formā adipiscatur, & iam nec herba, nec frutex, sed planē arbor dici debeat. Ob id *δενδρομαλάχη* Græcis dicta est, id est, malua arborea, quæ nihil aliud est quam satiuæ, ut Matthiolus censet, cultorum diligentia & arte in tantam magnitudinem assurgens, quod Theophrasti auctoritate probat. Quædam cultu diuersa efficiuntur, & à natura sua discedunt, ut malua in altum accrescens, & arborescens.

extemplō. Sed & arbor est malua in Mauritania Lixi oppidi æstuario, vbi Hesperidū horri fuisse produntur CC. pass. ab oceano, iuxta delubrum Herculis antiquius Gaditano, ut ferit. Ipsa altitudinis pedum XX. crassitudinis quam circumplecti nemo possit. At contra Pena malua siluestri euenire putat quod filici, sedo, arundini, atque aliis, ut etiam non cultæ arboream proceritatem, durationem & ramorum magnitudinem assequantur, asseritq; se in Cænobio D. Spiritus prope Venetias, & aliis locis maritimis Thyrrhenæ oræ vidisse sponte adultas. Persicam arbusculam æquantēs altitudine & crassitie stipitis, qui ramis sparsis, frondis læuore, virore, imo toto flore, semine, & facie maluam testabantur, sed crassiores totam & habitiores, qualem Gallobelgiæ, Angliæ, & Germaniæ horri hodie colunt, quadriennium & quinquentium edurantem, lignosiore prægrandi radice, & solido trunco, duritie lignea, senum & octonum cubitorum, facultate non diuersa à malua vulgari, sine vlla olitorum industria, ut solo natiuo duntaxat deberi hanc differentiam ex natali



*MALVA siluestris*  
maior.



natalibus perspicuum sit.

Malua siluestris maior seu altior rectū erigit caulem, sesquicubitalē, minimi digiti crassitudine teretem, raris pilis hirsutum, statim à terra in ramos diuisum, folia habet longis pediculis insidentia, multum laciniata, serrata, fusciora, minora & leuiora satiuarum foliis, flores æstate fert secus ramos & folia, satiuarum floribus, qui simplici sunt textura aut rosis siluestribus similes, quinquefolios, & in rufo candicantes, quibus in orbem disposita succedunt semina. Radice nititur pedali aut longiore, digiti crassitudine, candida, & in partes distracta. Tota herba dulci est gustu & glutinoso. Nasctur in aggeribus, hortorum arcis, & circa rudera. Malua siluestris minor seu pumila, quam supinam vocat Cordus, repentem Lobellius, caules per terram spargit cubitales, teretes, virides & solidos, in quibus folia sunt in longis pediculis, minora, & non vt in superiore laciniata, sed rotunda, preterquam quod ab vna parte in profundum sinum recedunt usque ad pediculi adnexum, in ambitu serrata, pingua, flores

Lib. 2. plā.  
cap. 97.

secus folia fert paruos, quinquefolios, alteri siluestri maluæ similes, minores tamen, in candido rubentes, quibus exigua succedunt semina, in orbem disposita, radice nititur longa, neruosa, candida. Tota planta glutinosum humorem emittit. Nasctur circa hortos, pagos, & rudera. Non omittendæ Maluæ Roseæ siue Hyemales Roseæ, à floris Rosei elegancia & similitudine dictæ, partim althææ, partem maluis cognatæ: etenim foliorum & cauliculorum incana superficie, molliore, mucrosâque radice althæam referunt, ambitu verò maluaceo & caule arborecentem maluam plene assequuntur, sed althææ positu & modo oriuntur, quotannis etiam pereunt, radice denuo primò verè sese propagante, culmósque edente ternum & quaternum cubitorum. in quibus serotini prodeunt flores, videlicet Augusto, magnitudine, effigie, elegancia rosam prouocantes, interdum simpliciores, interdum multiplices & conferta foliolorum structili serie constantes, triplicis in hortis septétrionalibus varietatis: sæpe puniceo colore saturato, aliquando candido, interdum dilute rubente, aut vtrisque confusis. Semen althææ similius, sed maius. Hæc ex Pena. Malua hortensis Iulio & Augusto mensibus floret: neque enim flos is vt in rosa fugax est, sed diu vigor vitæque durat. Siluestris pumila per totam æstatem, & in maximam autumnii partem durat. Arborecens Iunio & Iulio mensibus floribus

Locus.  
Tempus.

*MALVA Rosea simpliciore*  
flore, Lobelij.





*MALVA* *Rosea multi-*  
*plex, Lobellij.*Lib. 1. c. 11.  
Vires  
Temper.

bus quàm maximè abundat. Antiqui maluis ceterorum olerum modo vescabantur, subducendæ alui gratia. Vnde Martialis.

*Exoneraturas ventrem mihi villica maluas*  
*Attulit, & Varias quas habet hortus opes. Et*  
*Vescere lactucis, & mollibus vivere maluis,*  
*Nam faciem durum phœbe cacantu habes.*

Quare scripsit Dioscorides, Malua sativa esui longe aptior est silvestri, stomacho adversatur, aluum iuvat, sed multò magis caules: interaneis & vesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo manducata ægilopas ex melle sanant, verum cum cicatricem trahere cœperint, ea demum citra salem vtedum est. Contra aculeatos apum vesparumque ictus illita efficax est: eadem cruda cum oleo trita peruncti non feriuntur: vlcera manantia in capite, fursuresque cum urina sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia tritaque utilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum vulvas in fisione mollit: prodest erosionibus vesicæ, & intestinorum, vulvæ, sedisq; clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua contra omnia venena auxiliatur, si continuo à

bibentibus reuomat. Contra phalangiorum morsus remedio est. Lac euocat. Semen in vino potum, addito loti silvestris semine vesicæ cruciatus lenit. De hac perspicuè disserit Galenus his verbis. Quemadmodum *γελανία*, quæ lactuca agrestis est, ab hortensi, ita malua agrestis à sativa differt. Plantæ enim congenere inter se dissident, quod agrestis quidem siccitate, sativa verò humiditate superat. Porro succo maluæ lentor quidam inest, quod lactucae non inest, à refrigerandoque abest perspicuè. Id quod etiam antequam edas intelliges, si utrumque olus vicissim calido alicui affectui, ut erysipelati cataplasmatibus modo applicueris, quod etiam vulgò faciunt, tenera folia diligenter ad exactum leuorem conterentes. Senties enim in hoc cataplasmate lactucam quidem manifestè refrigerare: maluam autem calorem quandam habere moderatū ac tepidum. Ceterum hoc olus facile subducitur, non modò propter humiditatem, verum etiam propter lentorem, & potissimum quando quis cum oleo & garo copiosam ipsam sumperit. Nutrit autem & ipsa mediocriter. Et rursus. Malua agrestis digerentis paululum & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis quantò plus habet aquæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est, fructus eius tanto validior est, quato & siccior. Porro, huius generis est quæ dendromalache nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo. Plinius diffusius virtutes maluarum explicat. In magnis laudibus malua est utraque, inquit, & sativa & silvestris. Omne solum in quo feruntur pinguius faciunt. Huic contra omnes aculeatos ictus efficacior vis, præcipuè scorpionum, vesparum, similiumque, & muris aranei. Quin & trita cum oleo qualibet earum peruncti ante, & habentes eas non feriuntur, folium impostum scorpionibus torporem adfert. Valent & contra venena. Aculeos omnes extrahunt illitæ cruda cum nitro, potæ verò decoctæ cum radice sua leporis marini venena restinguunt, & ut quidam dicunt, si vomatur. De iisdem mira & alia traduntur. Sed maximè si quotidie quis succi ex qualibet earum sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturum. Vlcera manantia in capite sanant cum urina putrefacta,

Lib. 7. sim.

Lib. 20. c. 21



putrefacta, lichenas & vlcera oris cum melle. Radix decocta furfures capitis & dentium mobilitates. Eius quæ vnum caulem habet radice circa dentem qui doleat punge, donec desinat dolor. Eadem strumas & parotidas panôsque, addita hominis salua purgat circa vulnus. Semen in vino nigro potum à pituita & nauseis liberat. Radix mammarum vitii occurrit, adalligata in lana nigra. Tussim in lacte cocta, & sorbitionis modo sumpta, quin diebus emendat. Stomacho inutiles Sextius niger dicit. Olimpias Thebana abortiuas esse cum adipe anferis. Alij purgari feminas foliis earum manus plenæ mensura, in oleo & vino sumptis. Vtique constat parturientes foliis substratis celerius solui, protinus à partu reuocandum ne vulua sequatur. Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina. Quin & semen tritum adalligant brachio, genitale non continentium. Adeoque ex veneri nascuntur, vt semen vnicaulis aspersum genitali feminarum auiditates augere ad infinitum Xenocrates tradat. Item tres radices iuxta adalligatas Tenesimo & dysentericis vtilissimè infundi. Item sedis vitii, vel si foueatur. Melancholicis quoque succus datur cyathis ternis tepidus, & infanientibus quaternis. Decocta comitialibus hemina succi. Hic & calculosis, & inflatione, & torminibus, aut opisthotonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacris ignibus, & ambustis decocta in oleum folia imponuntur: & ad vulnere impetus cruda cum pane. Succus decocta neruis prodest, & vesicæ, & intestinorum rosionibus. Vuluas & cibo & infusione emollit in oleo: succus decocta pori meatus suaues facit. Scribit Symeon Sethi, maluum ventriculum facile subire, non solum propter humiditatem, verum etiam propter lentorem, atque imprimis si cum oleo & garo offeratur, vino quo editur tempore irrorata. Vesicam, thoracem, pulmonemque iuuare, & raucam vocem lenire. Siluestris malua, vt ferunt, comesta dolores ex vesparum ictu tollit. Si quis morsus à vespis aut apibus, succo maluæ præsertim siluestris perungitur, confestim dolore leuatur. Dicitur etiam huius decoctum potum lapides conterere, somnum conciliare, facilemque partum præstare, si mulier ea crebrius vtatur. Illita inflammationes lenit, & quæ indurata sunt mollit. Illud maluæ peculiare est, vt vesparum & apum ictibus imposita, dolores leuet. Maluæ radix sicca, inquit Matthiolus, die vno in aqua macerata, deinde madida papyro circumuoluta, & sub feruente cinere decocta, rursusque siccata, vtiliter vsurpatur ad dentifricia: dentes enim affricta expurgat, & gypseam materiam exterit, foliorum & radicum decoctum gargarizatu exasperatas fauces lenit, muccago verò acrimonias emendat, feruēfacta folia in cibum apposita raucedines expediunt, ex oleo, sale, & recente butyro aluum citant, fit è foliis cum salinis frondibus tritis præstantissimum emplastrum ad vulnere, & quascumque alias inflammationes: valent eadem cum porris & cepis illita ad serpentium venenosorum morsus. Succus auribus instillatus dolorem sedat. Decocta vnà cum radice ad lentorem vsque datur potanda ægrè parturientibus magno eorum commodo. Id quod præstat succus felibræ pondere haustus. Semen ex vino nigro potum nauseam tollit. Cauliculi molles cocti ex aceto eduntur oleo & sale, asparagorum modo prima statim mensa, ad ciendam aluum. Datur succus vtiliter, melancholicis sex vnciarum, infanientibus octo pondere, hauriendus. Denique malua ad plurima vtilis est, vt non immerito eam antiqui omnium orbicem appellauerint.

ALTHAEA.

CAP.

XXII.

**Q**VÆ Græcis ἀλθαία, Latine simpliciter Medica dici posset: sic enim nominata est διὰ τὸ πολυαλθὲς καὶ πολὺ χερσὶν αὐτῆς auctore Dioscoride, id est, quod inter primas sit vtilis, & plurimis polleat remediis, ab ἀλθάνειν quod mederi significat. Dicitur & ἰβίσκος, & ἰβίσκος, Latine Althæa, Ibisus seu Ebiscus, & ab excellētia effectus à quibusdam Aristalthæa,

D d

In libr. 2.  
Dioc. cap.  
III.

Nomina

Lib. 3. cap.  
146.

Lib. 20. c. 21



Lib. 9 hist.  
cap. 16.  
Lib. 1 plan.  
c. 47.

Lib. 9 hist.  
cap. 19.  
Genera.

Lib. 3 c. 146  
Forma.

inquit Plinius, à Theophrasto etiam *μαλάχη ἀγρία* id est, malua siluestris est enim, ut ait Dioscorides, in siluestrium maluarum genere. Et Plinius, è siluestribus, cui grandefolium, & radices albæ, althæa vocatur. A Cordo malua palustris appellatur, Arabice *Chatini*, *Chatini*, *Chachine*, & *Rosa Zamani*, vulgò maluaufcus nominatur, nomine ex malua & ibisco cōposito, ab Italis *Maluaufco*, Officinis *Bisimalua*, Germanis *Ibsch*, & *Heylaure*, à Gallis *Guimauc*, quod glutinosa sit malua. Theophrastus althææ species duas constituere videtur: sic enim ille. Habet althæa folium malvæ, sed maius & hirsutius, caules molles, flores luteos, fructum veluti maluar, radicem nervosam & albam, gustum quoque caulium malvæ. Vfus ad rupta & tasselles in vino dulci, & ad vlcera in oleo. Aliam quandam si cum carnibus coquas, in idem coniungere, & has quidem agglutinare, alias arrabese, lapidis magnetis modo & succini. De priore, cui luteos flores tribuit Theophrastus, mox dicemus, nunc de vulgari. Althææ, inquit Dioscorides, folia ut cyclaminum rotunda, lanugine canescunt: flore roseo: bicubitali caule, radice lenta, intus alba. Sed totam sigillatim depingamus. Althæa caules emittit plerumque bicubitales, rectos, minimi digiti crassitudine, rotundos, lanuginosos & solidos, foliis ex intervallis usque ad summam veltitos, & longo petiolo dependentibus, ex rotundo in angulum exeuntibus, in ambitu serratis, tres quatuorve digitos latis, tactu mollioribus, breui, densa, & veluti detonsa lanugine holoserico similibus: flores in summis caulibus profert malvæ siluestris, aut rosarum siluestrium figura, paulo minores tamen, in candido rubescentes, quinque foliolis constantes, in quorū medio parvum est nectamentum rubescens, semen habet latum, parvum in orbem centro cuidam circumposicum, quod cortice detracto nigricat. Radicibus nititur diuturnis, ab vno trunco exortis, cubitalibus, digiti crassitudine, foris subpallidis, intus candidis, nervosis, lentis, glutinosis, & dulcibus. Nascitur locis vliginosis & pinguibus, humectibus, & palustribus pratis, & in fossis. Floret Iulio & Augusto mensibus maluarum siluestrum more. Multiplicem eius in medendo usum ac utilitatem declarat Dioscorides his verbis. Decocta in vino aut aqua multa, aut per se pota efficax est contra vulnera item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, contusiones sedis, inflationes, nervorum rigores, siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta, ut dictū est, adiecto suillo adipis, aut anserino, terebinthinæve, ut malagmatis lentior fiat, facit ad vulvæ inflammationes, præclusionesque in pefsis subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera vulvæ, reliquiasque à partu extrahit. Decoctæ succus ex vino potus succurrit vrinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis, (quæ cum Græcè legantur, τὸ δὲ τῆς ἐξ ἰσχυρίας οὐδὲν τῶνδεσθον ὡφελὲς δυσπορώτεας, λιμνίσαν ὡμότητας, &c. sic vertenda censet Andr. Lacu. Radicis autem decoctum potum ex vino difficultati vrinæ auxiliatur, acerbissimisque doloribus à lapillo excitatis. ὡμότης enim, ut ait, non solum significat cruditatem, sed acerbitatem etiam summam, atque acrimoniam doloris. Cui conuersioni consentit, inquit,



Locus.

Tempus.

Lib. 3 c. 146

Vires &

Temper.

bus, & palustribus pratis, & in fossis. Floret Iulio & Augusto mensibus maluarum siluestrum more. Multiplicem eius in medendo usum ac utilitatem declarat Dioscorides his verbis. Decocta in vino aut aqua multa, aut per se pota efficax est contra vulnera item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, contusiones sedis, inflationes, nervorum rigores, siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta, ut dictū est, adiecto suillo adipis, aut anserino, terebinthinæve, ut malagmatis lentior fiat, facit ad vulvæ inflammationes, præclusionesque in pefsis subdita. Decoctum eodem fungitur munere: onera vulvæ, reliquiasque à partu extrahit. Decoctæ succus ex vino potus succurrit vrinæ difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis, (quæ cum Græcè legantur, τὸ δὲ τῆς ἐξ ἰσχυρίας οὐδὲν τῶνδεσθον ὡφελὲς δυσπορώτεας, λιμνίσαν ὡμότητας, &c. sic vertenda censet Andr. Lacu. Radicis autem decoctum potum ex vino difficultati vrinæ auxiliatur, acerbissimisque doloribus à lapillo excitatis. ὡμότης enim, ut ait, non solum significat cruditatem, sed acerbitatem etiam summam, atque acrimoniam doloris. Cui conuersioni consentit, inquit,



quit, rerum vsus atque experientia: quippe contra dolores illos acerrimos, inclementissimósq; quos excitare calculi solent, decoctum radicum althææ maximo successu propinamus: licet pluribus diebus id potum, non solum non conferat coctioni quæ in ventriculo fit, sed etiam eam vitiet & labefactet, id quod liquidò constat, tum ex nausea graui quam gignit, tum vel maximè ex ructibus fastidientis quos excitat. Dalechamp. Lacunæ interpretationem improbat, & λιθωντων αμύ-  
 τητας interpretatur pituitosos, crudos, lentos humores meiando exeuntes, & gra-  
 uissimos cruciatus excitantes inter meiendum, qui certissimo indicio calculum  
 vesicæ, renumve, sed vesicæ magis significant, nunc præcedentes, nunc comitan-  
 tes, nunc subsequentes. Dentium mulcet dolorem cum aceto decocta, colluto inde  
 ore. Viride semen siccúm; tritum vitilignes in sole cum aceto perunctas emen-  
 dat (in vulgari quidem codice legitur, *ἡ χλωρὰ τοῦ ὕδατος*, id est, inunctum cum ace-  
 to, in vetere autem *συνὸν ὕδατος ἢ ἐλαίου*, id est, ex aceto & oleo.) Eodem cum aceto &  
 oleo peruncti à venenatis non feriuntur. Valet contra dysenteriam, & sanguinis  
 reiectiones, aluiq; profluuium. In posca aut vino decoctum bibitur contra omnes  
 vesparum, apum, similiúm; aculeatos ictus, folia cum olei momento, morsibus &  
 igni ambustis illinuntur. Constat aquam trita radice addita addensari. Quæ po-  
 strema Græcè sic habentur. *πρήγνυσι ὃ ἢ ῥίζα* (in vetere codice additur *χλωρὰ*, id est,  
 viridis) *καὶ ὕδατος, μνηστέα λεία, καὶ συνεξαλειαστέα*. Id est, radix viridis tusa, & aqua  
 permista, & simul tota nocte sub dio relictæ, cõdensat illam. Theophrastus ex quo  
 hæc mutuatus est Dioscorides, vocem *χλωρὰ* non habet: sic enim ille. *πρήγνυσι ὃ  
 τὴν τῆς ἀλθίας ῥίζαν τὸ ὕδατος, ἐάν τις τελεῖται ἐμβάλλῃ καὶ θῇ ὑπαίθριον*. Id est, Radicem  
 althææ aquam densare aiunt, si quis tritam iniecerit, & sub dio reliquerit. Plinius  
 maluarum vsus medicum (de quo iam diximus) fusiùs persecutus, tandem addit,  
 Althææ in omnibus supradictis efficacior radix, præcipuè conuulsis ruptisq;. Cocta  
 in aqua aluum sistit. Ex vino albo strumas & parotidas, & mammarum inflamma-  
 tiones tollit. Panos illita. Eadem arida in lacte decocta, quolibet perniciosæ tussi  
 medentur. Hippocrates vulneratis, sitientibúsq; defectu sanguinis radicis deco-  
 ctæ succum bibendam dedit: & ipsam vulneribus cum melle & resina, item con-  
 tuis, luxatis, tumenibus, & musculis, neruis, articulis imposuit: & asthmaticis ac  
 dysentericis in vino bibendam dedit. Mirum aquam radice ea addita addensari  
 sub dio, atque lactescere. Efficacior autem quò recentior. Hæc Plinius, quorum  
 quædam etiam Dioscorides habet. Verum quod aquam radice althææ addensari  
 atque lactescere dixit, id iam ex Dioscoride atque Theophrasto protulimus, vt ex  
 iis non immeritò dubitet Cornarius, an lactescere rectè in Plinio legatur, & non  
 potius lentescere, aut coalescere. Idem Plinius qui illa de althæa prodidit, seorsum  
 aliquot locis de ibisco, vt ab althæa diuerso scripsit. Hibiscum, inquit, à pastinaca  
 gracilitate distat, damnatum in cibis, sed medicinæ vtile. Et, Pastinacæ simile hi-  
 biscum, quod molochen agriam vocant, & aliqui pistolochiam, vlceribus cartila-  
 ginis, & ossibus fractis medetur, folia eius ex aqua pota aluum soluunt, serpentes  
 abigunt. Apum, vesparum, crabronum ictibus, illita medentur. Et mox, Celsus &  
 podagris, quæ sine tumore sunt, radicem eius ex vino decoctâ imponi iubet. Et,  
 Medetur lichenibus hibisci radix cum glutino & aceto acri decocta ad quartas.  
 Qua in re Plinio apertè refragatur Dioscorides & Galenus, cæteri q; Græci, qui al-  
 thæam ibiscum, siue ebiscum vocauerunt. Sic enim Galenus. Ebiscus siue althæa,  
 est autem malua agrestis, facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmonè leuan-  
 di, mitigandi, concoquendi difficiles coctu abscessus. Radix porrò eius & semen  
 cætera quidem pari foliis modo agunt, verum tenuiorum partium, magisq; exsic-  
 catoriam, adhæc magis exterforiam facultatem ostendunt, vt & vitilignes deter-  
 gant, & semen renum calculos confringat. At radicis decoctum ad dysenteriam,

Lib. 9 hist.  
cap. 19.  
Lib. 20 c. 21

Embl. 147.  
lib. 3. Diosc.

Lib. 19. c. 5.  
Lib. 20. c. 4.

Lib. 26. c. 4.

Lib. 6. sim.



diarrhoeam, & sanguinis reiectionem aptū est, nempe cum adstringentem quam-  
 Lib. 7. sim. dam facultatem habeat. Et de maluis agens. Huius generis est & ea quæ dendro-  
 malache nominatur: sed efficacissima prædictarum in digerendo, appellatur etiam  
 althæa. Dodonæus plantam secundo loco depictam althæam, seu ibiscum Theo-  
 Lib. 5. c. 25.  
 Lib. 9. hist. phrastī esse arbitratur, & Abutilon Auicennæ, foliis rotundis in exortu, sed in ex-  
 cap. 19. tremo acutioribus, candidis, tactu mollibus, &

ALTHÆA Th. phr. sti.



in lib.  
 Dodon. cap.  
 146.

ferè lanuginosis, ut & prioris althææ, sed multo  
 maioribus, & forma ferè magnitudinēque cor-  
 carbitæ foliis similibus: caulibus longis, cra-  
 sis, validis, in quibus nascuntur flores lutei, deinde  
 de caliculi pilosi, membranei, in quibus lutei  
 paruum, nigricans: radix malvacea. Eandem  
 pro Ibisco vel Althæa Theophr. descripsit Pe-  
 na, pinxit Lobellius. Martiniolus eadem asser-  
 dit. Sed neque Althæam alteram Theophrasti,  
 neque Auicennæ Abutilon esse arbitratur, nul-  
 lan ratione aliorum opinionem refellens: sed  
 solum neutri respondere dicens. Non tamen  
 prætermittenda est, inquit, eius herbarum cogni-  
 tio, ut eius quoque omnibus cognita sit facul-  
 tas. Nam experientia constat eius semine epo-  
 to sesquidrachmæ pondere ex vino, calculos in-  
 renibus frangi, educiq; urinas eici, doloriq;  
 sinistid quod tamen de abutilon Auicennæ  
 prodidit. Abutilon, inquit, est planta similis cor-  
 carbitæ. Dicitur recentibus vulneribus ma-  
 ximè prodesse, eaq; statim conglutinare. Althæa  
 etiam hic althæam ex Dalechamptio depinxit.

ALTHÆA altera, Matth.



ALTHÆA Lignosa, Dalech.



in lib.



mus, quam lignosam & arboream vocant, propter arboream soliditatem. Radices plurimas habet, densas, crassas, caudicem non minus crassum, quam est nostri corporis truncus, homine proceriorem, ramosum, cortice è rufo purpurascēte, foliis althææ, magnis interuallis per ramos nascentibus: flore etiam althææ, grandi, candido. Nascitur propè Miramuallem Monspeliensis agri vicum, in confrago- so saxo, cui Anachoritæ domuncula imposita est. Hæc eadem esse videtur, quæ Clusio Althæa frutex, Penæ & Lobellio Althæa arborea siue Arborefcēs dicitur, & paucioribus locis & feruidiore cœlo (quale in maritimis Gallicæ Prouinciæ ad Olbiam) prouentu tanto fruticat, vt ad sepēs constituendas satis sit. Multo solidio- re scapo est quam Malua arborea, salignæ quasi concretionis, & in arboream formam versio, flos maluæ vulgaris aut althææ, nec dispar semen. Est & Althæa pa- lustris, de qua dicemus in libro de Palustribus.

ALCEA.

CAP. XXIII.

**A**lcæa Græcè, ita Alcea Latinè dicitur, Officinis ferè incognita, Italicè *Nomina*  
Bismalua, & Malua saluatica, & Buon vischio, Germanis Sigmar, *Forma.*  
Kraut, Hispanicè Malua de Vngria, & Alalua montesina, Gallicè Gui-  
mauue sauuaige. Vulgares herbarij & Empirici Symeonis herbam ap-  
pellant. Alcea maluæ siluestris species est, folia tamen habet magis fissa, & profun-  
dius incisa, & in plures partes diuisa, verbenacæ ferè similia, sed multò minora:  
caules rotundos, rectos, bipedales aut maiores: flores figura maluis aliis similes, pur-  
pureos, aut dilutius rubescētes: semen item simile, eodémque modo tunicatum:  
radicem crassam, bipedalem, & eo maiorem, intus candidam. Hæc est eius icon ex  
Matthiolo. Eadem videtur esse quæ Alcea fruticosa Penæ & Lobellij, Cannabis sil-  
uestris Dioscoridis, quibusdam. Prolixioribus magisque vimineis furculis fruticat,  
foliorum diuisura altiore quinaria, & crenulis exiguis. Pentaphyllum rubrum, si-  
ue Cannabim æmulatur: flos purpurascit. Est quibusdam Cannabis siluestris.  
Quare aliam Alceam vulgarem Penæ & Lobellius proponunt, figura, ortu, cauli-

ALCEA Math.

ALCEA vulgaris, Lobellij.





culis similem Maluæ, sed foliis altius incis, quinque partitis, qualia sunt Maluæ verustiori pusilla, aut Geranio: flore copioso, maluæ semine orbiculari compresso, sicque item Maluæ: radice etiam prorsum Maluæ, minus mucosa. Et calidis & Septentrionalibus regionibus familiaris est. Dioscorides breuiter sic describit, Alcea siluestrium maluarum generi assignatur, folia habens densa, verbenace

Lib. 3. c. 17.

*ALCEA Veneta, Dodon.*

Lib. 27. c. 4.

Locus.  
Tempus.  
Vires.  
et Tempus.

Ibid.  
Lib. 17. c. 4.  
Ibid.  
Lib. 26. c. 8.

Lib. 7.

*ALCEA villosa, Dalecham.*

Fuch. in hi  
stor. plant.  
cap. 27.

Dodon. lib.  
5. cap. 7.  
Cordus in  
obser.

proxima: caules tres aut quatuor, cortice cinabino vestita: florem rosæ paruum: radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales. Quæ Plinius ex Dioscoride ferè transcripsisse videtur. Alcea, inquit, folia habet similia verbenacæ, quæ & peristereon cognominatur, caules tres aut quatuor, foliorum plenos, florem rosæ, radices albas, cum plurimum sex, cubitales, obliquas. Nasceitur in pingui solo, nec sicco. Hæc Plinius. Nasceitur & in incultis, campestribus, & agrorum, serotinumque marginibus, iuxta sepes & vias, florer Julio & Augusto mensibus cum malua siluestri. Radices cum vino aut aqua potæ, inquit Dioscorides, dysentericis ruptisq; medentur. Plinius, Vfus radice ex vino vel aqua dysentericis, aluo citè, ruptis, cõuulsis. Et, Alceæ radix collectiones discutit. Et paullo post, Spaticis, tremulis, opisthoronicis alceæ radix bibitur ex aqua mulsa. Sic & rigores excalfacit. Et, Alceæ siccæ farina torminibus pota cum vino resistit. Galenus Alceam in simplicium catalogo prætermisit. Paulus ex Dioscoride, Alceam siluestris maluæ speciem esse dixit, quæ cum vino pota dysenterias & rosiones sanat, & magis ipsius radix. In hoc tamen Paulus à Dioscoride & Plinio dissidet, quod *rosiones*, id est, rosiones, habet pro his quæ *phrygæ*, id est, rupta, Dioscorides & Plinius appellauerunt, ut fortasse *phrygæ* in Paulo, pro *rosiones* legere oporteat. Ex emplasticorum medicamentorum numero esse alceam, & folia quæ glutinosissima ac lentum habent, etiã radix ipsa quæ glutinosa, dulcis, & modicè adstringens apparet gustantibus, abinde monstrant. Hinc satis constat alceam citra insignem tum caliditatem, tum frigiditatem siccare, ac planè emplasticorum consistentiam obtinere. Celebratur ad caliginem oculorum ab Empiricis, ita ut non desint qui credant radicem alceæ è collo suspensam aciem oculorum supramodum acnere, & tueri posse. Est herbariorum sententia Alceæ species hic depicta, quæ adfertur ex Italia, & ab his Alcea Veneta nuncupatur, Gallicè *Grimmaue de Venise*. Pena tamen ait se nupiam in Italia nedum Venetiis vidisse nisi in hortis, multoque maiorem



maiores eius copiam Septentrionales herbarios habere quam Italos. Quare ille & Lobellius Alceam peregrinam folifequam vocant. Tragus Alceam Venetā. Dodonaus in Histo. Purgant. Alceam vesicariam, Matthiolus perperam Hypecum. Caulem profert teretem, mollem, ramosum, aculeis hispidum: folia obcurius virentia, carnosā, fissā, & profundius incisa, foliis Alceæ superioris haud multū abfimilia, minora. Flores in summis caulibus emergunt, florum maluarum omnium speciosissimi, sed ferè similes, quinque foliis constantes, foris candidi, vel pallidi, in medio purpurei, ex quo apex pistilli forma lutei, siue aurei coloris emicat, tibus, quatuorve horis ab exortu solis sese aperientes, meridie horā vnam hiantes, deinde sese contrahentes. His succedunt vesiculæ, in quibus capitula rotunda, hirsuta, quibus semen nigrum includitur. Radix parua est, & tenera. Hæc Alceæ non nisi herbariorum diligentia & cultu in hortis nostris provenit. Martio aut Aprili mense feritur, Iunio, & Iulio floret. Huc spectat perelegans & nova planta à Lobellio depicta ex cultissimo horto D. Brancionis, quam quidam Sabdariffam vocant. Caule est singulari, alis donato, quinos & senos cubitos alto, cui insidet flores Alceæ peregrinæ similes & eiusdem fere coloris, ex luteo cinereo obsoleti, sed maiores, alio sanguineo medium cingente. Lius folia maluarum adaltam prorsus æmulantur, sapor prorsus oxalidis. Hæc ex Lobellio. Ob similitudinē hanc quoque Alceam nuncupavit Dalechampius, quæ radice est palmum longa, è ruffo candicante, paucis fibris capillata, caulibus multis, densissima lanugine hirsutis: quam obrem Alceæ villosa nominata est, palmo non altioribus folio per ambitum valde crenato, in tria diuiso, lanugine quoque spissā tecto: flore panicato, amplo, specioso, tracheliorum florem magnitudine penè superante: fructu nigro, placetæ simili,

Locus.

Forma.

SABDARIFFA, Lobelij.



SABDARIFFA Alia.



perinde ac malvæ vulgaris, intra folliculū clauso, densis ac subasperis pilis hirtū, & vndique fructum occultentem, ut in halicacabo. In radicibus Iuræ montis nascitur. Floret Majo mense. Fructus Iunio maturefcit. Sabdariffa alia ad me missa fuit, quam tibi tradere volui, quoniam siliquata est, & ab alia quodāmodo diuersa.

Locus.

Tempus.



Nomina  
Li. 8. simpl.

Genera

Li. 3. c. 109.

Lib. 7. hist.  
ca. 14.

Lib. 9. hist.  
c. 12. & 15.  
Lib. 17. c. 13.  
Cap. 8.

Lib. 21. c. 31.

In Hort.  
Germ.

Li. 4. Diof.  
ca. 68.

Forma.

**S**olūnos, & præposito σ, σολύνος, inquit Galenus, Latinis Solanum nominatur, Officinis Solatrum, vulgo Cuculus, Vua lupina, Vua vulpis. Arabibus *Hameb alhomaleb*, *Hameb alhaich*, siue *Hanab althaich*, Gallis *Morelle*, quod hortense est, Italis *Solatro hortolano*, Germanis *Nacht schadt*, Hispanis *Terua mora*. Quatuor Dioscoride & Galeno auctoribus Solani sunt genera. Primum σολύνος κυπείος, Solanum hortense, quod olim in hortis cum aliis oleribus, quæ edendo sunt seminabatur. Hodie sua sponte, & inuitis cultoribus prouenit. Nigrum alio nomine à nigris foliis, aut à fructu in extrema maturitate nigro appellatur. Secundum σολύνος ἀλικακῆος, Solanum halicacabū, & φουσαλῖς, id est, vesicaria à folliculis quos producit, vesicarum in animantibus speciem imitantibus, non quod vesicæ calculis medeatur. Officinæ Arabes secutæ corrupto halicacabi nomine *Achachengi* apellant, Itali *Halicacabo*, Germani *Indenkysen*, Hispani *Bexigo de perro*, Galli *Alquaquenge*, Coqueret rura nostra cant, ait Ruellius. Tertium σολύνος ὑπνωδῆος, Solanum somniferum, ab effectu scilicet. Sunt qui Solatrum dormitorium, & marinum dicant, quod in rupibus non longe à mari inueniatur. Gallicè *Solane dormitif*, Italicè *Solatro somnifero*. Quartum σολύνος μανικῆος, Solanum furiosum, Officinis Solatrum mortale, Gallicè *Solane farioux*. Theophrastus tria genera facit cum scribit, ὁ μὲν δὲ δώδεμος σολύνος, ὃς ὡς ἔστιν ἡμερον κάρπον ἔχει πρυγῶδη. ἑτέροι δὲ δύο εἶσιν, ὃν ὁ μὲν ὑπνον, ὃ δὲ μανίαν ἐμποιεῖν δύναται. Id est, est Solanum edule, & fructū veluti mitem & acinosum ferens. Sunt alia duo, quorum alterum somnum, alterum insaniam adfert. Aliquanto post duo duntaxat genera statuit. τῶν δὲ σολύνων ὁ μὲν ὑπνωδῆος, ὃ δὲ μανικῆος. Solanum aliud somniferū, aliud furiosum. Plinius quatuor ponit genera. Solanum Græci strychnum vocant. Dixit autem suprà cucubali folia trita cum aceto, serpentium ictibus & scorpionum mederi. Quidam hanc alio nomine strumum appellant, alij Græcè strychnum, &c. Quæ nomina sunt etiam inter suppositicia apud Dioscoridem. Idem alio in loco strychni historiā Fuchsius persequitur. Strychno, quam quidam trychnum scripsere, utinam nec coronarij in Ægypto vterentur (Dioscoride solo halicacabi fructu coronarij vtuntur, quod & hodie per hyemē in Gallia fit, non autem hortensis vtriuslibet folio, flore fructu) quos inuitat hederæ florum similitudo, (Lege ederæ fructum similitudo in duobus eius generibus. Præter illa tertium cui acini, &c.) in duobus eius generibus. Quorum alterum cui acini coccinei, granosi folliculi, halicacabum vocant, alij callion. Nostri autem vesicariam, quoniam vesicæ & calculis prodest, &c. (Halicacabum veteres vesicariam non dixerē quod vesicæ & calculis prodest, sed vt demonstrat vox Græca φουσαλῖς, quod fructus folliculo tanquam vesica includatur vt diximus.) Tertio folia sunt ocimi (εὐζάριος Dioscorides habet, id est Eruca) minimè diligenter demonstranda remedia non venena tractanti: quippe insaniam facit paruo quoque succo, &c. Quin & alterū genus quod Halicacabum vocant, soporiferum est, &c. Gesnerus Solanorum genera permulta esse scribit præter illa quatuor à Dioscoride & aliis memorata. Omnibus sunt acini, inquit, iūq; seminibus albis pleni. Pleraque aliquam in foliis & floribus similitudinem habent, odore graui, vi refrigerante prædita. Matthiolum quoque experientia sese comperisse ait plura ac varia Solanorum esse genera. Solanum vulgare, quondam hortense, quia ferebatur cibi gratia, nunc in cibus illud vitamus, frutex est pusillus, multis concauius alis: caulibus rotundis, pedatilibus, surculosis: foliis nigricantibus, tactu mollibus, succosis, ocimo similibus, sed latioribus, & multò maioribus, per ambitum incisis, in mucronem desinentibus. Flores tota æstate ex mediis alis profert paruos in singulis pediculis ternos, quater-



*SOLANVM Hortense.*



ternos, quinos, aut senos, qui quinis exiguis, oblongis, acuminatis, & cædids foliolis, instar radiorum stella dispositis constant, in quorum medio lutei minimiq; apices in vñu coniuncti eminent. Floribus singuli succedunt acini, rotundi, magnitudine pili, substantia molles, primum virides, post maturitatē nigri, intus subviridi glutinosiq; succo, atque parvis flavescentibus compressisq; seminibus pleni ab, vno pediculo instar corymbi, aut parui racemi dependentes, in terram spectantes. Radice nititur longa, fibrata, candida. Sapore folia sunt aqueo, simulq; adstringente, acini vero glutinosi, & aliquantulum, vinoso. Odorem spirat herba granē & fetidum. Cordus huius Solani speciem alteram facit Solanum puniceum, acinorum colore ferē solummodo distans: nam ramulis, foliis, floribus acinorum figura & quantitate, radice, sapore, odore & natalibus superiori Solano simile est, differt tantum, quod paulo asperioribus constet ramulis, acinosisque in croceo colore puniceos producat, qui etiam ante maturitatem virent. Id Solanum rubrum appellat Gesnerus, cui & luteū aliud addit, cui lutei sunt acini. Eadem cum vulgari, cui acinos nigros esse diximus, nisi colore acinorum differrent. Solanum halicacabum seu vesicaria, caules habet graciles, lentos, qui postquam adoleuerunt proni terrā spectant, in quibus folia Solano hortensī similia sunt, sed minora, latiora, firmiora, subasperaque, nec vt in illo nigricantia. Flores pallidi, maiores, & minus albi quā in Solano hortensī, ex quibus folliculi oriuntur, vesiculis similes, iugladium magnitudine, & quandoque maiores, turbinata figura, ex octonis costis æqualiter à se distantibus compacti, qui recentes virides sunt, maturi rufescunt, baccis intus vinosis, quæ ima folliculi parte inhaerent, rubris vix acinis similes, sapore austero simul & amaro, ac numeroso, minutoq; intus semine albicante, aut flavescente, rotundo, laui. Coronarij fertis apud nos acinos & vesiculas intorquent, vt pulchritudine coccinei grani, & folliculi punicei venustate corollas commendent. Alterum vesicariæ genus à Fuchsio & Dodonæo descriptum est, peregrinum vocant, cuius etiam meminit Matthioli, Vesicariæ repentis nomine. Alij Pisum cordatum, alij Cor Indicum vocant. Est tamen à superiore valde diuersum. Planta est pergulis operiendis aptissima: suis enim clauiculis latissimè sese diffundit. Folia habet oblonga, laciniata: flores candidos, ex quibus vesicæ

Li. 2. plan.  
ca. 137.

In Hort.  
Germ.

Forma.

*SOLANVM Halicacabum, Matth.*



no hortensī similia sunt, sed minora, latiora, firmiora, subasperaque, nec vt in illo nigricantia. Flores pallidi, maiores, & minus albi quā in Solano hortensī, ex quibus folliculi oriuntur, vesiculis similes, iugladium magnitudine, & quandoque maiores, turbinata figura, ex octonis costis æqualiter à se distantibus compacti, qui recentes virides sunt, maturi rufescunt, baccis intus vinosis, quæ ima folliculi parte inhaerent, rubris vix acinis similes, sapore austero simul & amaro, ac numeroso, minutoq; intus semine albicante, aut flavescente, rotundo, laui. Coronarij fertis apud nos acinos & vesiculas intorquent, vt pulchritudine coccinei grani, & folliculi punicei venustate corollas commendent. Alterum vesicariæ genus à Fuchsio & Dodonæo descriptum est, peregrinum vocant, cuius etiam meminit Matthioli, Vesicariæ repentis nomine. Alij Pisum cordatum, alij Cor Indicum vocant. Est tamen à superiore valde diuersum. Planta est pergulis operiendis aptissima: suis enim clauiculis latissimè sese diffundit. Folia habet oblonga, laciniata: flores candidos, ex quibus vesicæ

In H. st. pl.  
ca. 164.  
Lib. 3. c. 89.  
Li. 4. Diof.  
ca. 67.

Forma.



*HALICACABVM* Peregrinum, seu *vesicaria repens*, Fuchf.

In Hor.  
Germ.

Li. 4. c. 67.

Lib. 21. c. 31.  
Lib. 27. c. 8.



*HALICACABVM* Peregrinum, siue *vesicaria repens*, Matth.

Locus.

Tempus.

Vires &  
Temper.  
Li. 4. c. 66.



aduersus ignem sacrum, & vlcera quæ serpunt, cum cersa, rosaceo & argeñi spuma: ad agilopas cum pane: infantium adustioni quam Syriasiñ vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyriis aquæ vel oui vicē exhibet, cōtra acutas fluxiones illitus

sicæ prodeunt virides, subrotundæ, senis per longitudinem diuisuris: semine intus pullo, erui magnitudine, aut maiore, in cuius medio veluti effigies cordis humani insculpta apparet. Radice nititur gracili & fibrata. Halicacabū hunc peregrinum ex Solano genere esse negat Gesnerus, quod acinis careat. Sciendum enim acinum nō pro vuae vinaceo, sed pro vuae fructu toto accipi, qui ex succo, & parte quæ veluti caro est, & ex vinaceis, & ex ambiente cute constat. Vt cum Dioscorides de Solano halicacabo dixit, καρπὸν δὲ ἔχει ἐν θυλακίαις περιεσπιν, ὁμοίαις φύσας, πυρρὸν, περιεσπιν, λεῖτον, ὡς βῆλα σταφυλῆς, intelligendum est Solanum halicacabum fructum habere rufum, rotundum, lauem, velut vuae fructum, non vuarum acinis, idest, vinaceis similem, quin non vuae vinaceo, sed vuae fructui toto similis sit Solani huius fructus. Plinius non aliter acinorum nomē usurpauit, cum dixit de eodē halicacabi fructu, cui acini coccinei, &c. sic certē βῆλα πυρρὸν reddēs. Et de Solano hortensi dixit, acinos habet nigros, quos βῆλας μέλανας apud Græcos legerat. Est etiam hīc animaduertendum Theodorum Gazam τρύχων, idest, Solani species omnes male in Theophrasto vesicarias interpretari. Nā vesicaria peculiare nomen est, & halicacabo tantum proprium, quæ fructus vesicæ similes fert, vel quod vesicæ & calculis profit, vnde & nomen inuenit. Solanum hortense nascitur in hortis & viridariis, secus publica itinera, præsertim prope sepes, & ædificiorum ruinas. Halicacabum in vinetis copiosissimè prouenit, prope sepes, locis humidis, & parietinis: feritur etiam in hortis. Solanum hortense tota fere æstate floret, autumno autem fructus eius maturefcit. Halicacabum vesicas illas suas in fine Augusti, & inter initia Septembris mensis colore primū viridi, mox paulatim rubescere profert. Nunc singulorum Solanorū vires diligentius declarandæ. Solano hortensi natura refrigerandi, inquit Dioscor. quare folia vlceribus quæ serpunt, & ignibus sacris cōuenienter cum polline polentæ illinuntur. Agilopa capitisque dolores trita & imposita per se sanant: æstuanti stomacho auxiliantur: parotidas cum sale detrita illitū discutiunt. Valet succus eius aduersus ignem sacrum, & vlcera quæ serpunt, cum cersa, rosaceo & argeñi spuma: ad agilopas cum pane: infantium adustioni quam Syriasiñ vocant, cum rosaceo perfusus proficit: in collyriis aquæ vel oui vicē exhibet, cōtra acutas fluxiones illitus



illius: aurium dolori instillatus prodest, mensium abundantiam sistit in vellere subditus. Succus fuluo gallinarum corticalium subactus, & linteo appositus, agilopis præsentaneo est remedio. Solano, inquit Plinius, vis reprimendi refrigerandiq; Et, Cucubali folia trita cum aceto serpentium ictibus & scorpionum mederi. Quidam hanc alio nomine strumum appellant, alii Græcè strychnon. Acinos habet nigros. Ex his cyathus succi cum mulsi duobus medetur lumbis: item capitis doloribus cum rosaceo infusus. Ipsa strumis illita. Sed hic vsus medicus in Dioscoride non habetur. Tradit Galenus Solani esculenti quod in hortis nascitur, omnibusq; noti vsus esse ad ea omnia quæ refrigerari, adstringiq; postulant: potest enim hæc duo ordine secundo. Et inter olera quibus vescimur nullum se novisse, quod tantam habeat adstrictionem quantum Solanum. Merito igitur raro quidem ipso vti homines ut alimento, ut medicamento autem assidue: efficax enim est in iis in quibus adstrictionis & refrigerationis vsus incidit: minimi autem est alimenti. Scribit Matthiæolus cum foliorum, tum baccarum succum addito rosaceo, & aceti momento aduersus capitis dolores a caliditate ortos plurimū valere: phreneticos etiam iuuare, imbutis eo linteolis sincipiti impositis. Illinuntur fronti eodem modo ad calidas oculorum fluxiones. Gargarizatur quoque utiliter cum aceto ad faucium & columellæ inflammationes, additurq; in vnguenta quorum ad vlcera contumacia est vsus. Solanum halicacabum, inquit Dioscorides, vim vsusq; hortensis habet: verum cibis nequaquam expetitur. Regium morbum purgat semine potu, & urinam pellit. Quæ vltima sententia cum Græcè sic legatur, *ἡ δὲ ῥίζη ἐκ γαστρὸς διὰ τὸ πλεονέκτην ἐκλεποὺ ἀπορροῶν ἀπορροῶν*, sic transferri debuit: fructus eius potu expurgandi morbum regium vim habet, cum urinas cieat. Etenim ob id quod urinas moueat is fructus, ait Dioscorides ab eo bilē per ictericorum corpus effusum expurgari. Galenus halicacabum in foliorum facultate hortensi Solano simile esse scribit, fructum habens ciendæ urinæ idoneum: quare multis compositionibus, quæ ad iecur, ad vesicā, ad renes accommodantur,

Li. 27. ca. 13.  
Cap. 8.

Li. 8. simpl.

Li. 2. Alim.

Ibid. c. 67

Ibidem.

Lib. 21. c. 32.

*SOLANVM Americum,  
Dalechamp.*



miscetur. Huius baccarum vis præstantissima est, inquit Matthiæolus, non solum ad ciendam urinam, sed ad eius quoque ardorem mulcendum. Earum enim succus ex papaueris albi cremore, aut seminū melopeponum, aut cucurbitæ, aut ex maluæ decocto, aut ex hordeacea præsana potus, mirificè ardoribus urinæ succurrit. Baccæ musto dilutæ efficaciter imponuntur incipientibus oculorū carbunculis. Calculosi cum maturis uis acinos miscent, & dies aliquot simul efferuescere sinunt, ut habeant vinum acinaticium contra renū & vesicæ mala, vocantq; Coquereticum vinū, Gallicè *Vin de Coqueret*. Hoc propinatum vnciarum quatuor pondere, magnam arenularum vim deturbat. Nec illud prætereundum ex Plinio, aspidum naturæ halicacabū in tantum aduersam, ut radice eius propius admota soporetur illa sopore enecans vis earum. Ergo trita ex oleo percussis auxiliatur. His addendum Solanum Indicum, seu Americum appellatum, quod ex America, quam Indiam occidentalem vocant, Hispanorū classe & armis debellata, huius semē aduectum



aduectum sit. Ex vna radice multis ramis fruticat, cubitalibus, lentis, obsequiosis, furculosis: folio Solani hortensis angustiore, longiore, acutiore, quale visitur in summo Solani hortensis fastigio, acri persicariæ quam hydropiper vocant, non dissimili, venoso, pallidius virente: floribus violæ candidis, ex longo pediculo dependentibus, ternis ferè, aut quaternis simul, tuberculo in medio extante, umbonis figura, phœniceo, aut crocato, venustissimiq; coloris, apice tenuissimo ex illo prominente: baccis rubris, ceraso, aut halicacabi acino paribus, acidis, subamaris: semine minuto, candido, copioso refertis, quale est halicacabi. Licet id in feruidissimo solo cæloq; Americorum spôte proveniat, frigidum tamen & aliosum nostrum nō dedignatur, tantisper dum æstatis tepor fouet: nam hyeme moritur, nec brumæ sæuitiam tolerare potest. Amomum Plinij quidam putarunt, rectius alij strichnodendrum, idest, Solanum arborefcens. Dodonæus, pseudocapsicū vocat. Hispani *Guyndas de las Indias*, idest, Cerasa Indiana.

## LAPATHVM.

## CAP. XXV.

## Nomina



ΑΠΑΘΟΣ & λάπαθον Græcis dicitur, qui Rumex Latinis, Barbaris Lapathium: à Lapatho tamen Lapathium diminutum nomē barbarum non est. Varro: Hanc eandem voluptatem tacitulus taxim consequi Lapathio, & prisana possim. Lapathus autem ἀπό τῆς λαπάθης dictus est, quod valet exinanire, & pro ventrem leuare vsurpatur: vnde λαπάθης, qua voce vitur Aristoteles, οἷον τὸ βαδίσαι, εἰ λαπάθης ἐνεχγῇ, idest, verbi gratia ambulare, si est alui leuādæ gratia. Lapathum Arabes *Humadh*, *Hundh*, seu *Hamad* appellant, Itali *Rombice*, & *Lapatio*, Germani *Ampffer*, Hispani *Labaca*. Theophrastus duo genera Lapathi tradidit, siluestre & satium. Dioscorides quinque non eo quo solet, sed perturbato ordine descripsit. Ex generibus Lapathi, inquit, oxylapathum vocant, quod in acutum tendit, dura habens extrema, in palustribus nascens. (At cum Græcè legatur, λάπαθον τὸ μὲν αὐτὸν ὀξυλάπαθον λέγεσθαι, εὐρυλάπαθον ἐν ἔλασι, σκληρόν, καὶ ἀκρα, ὑπόξυ, conuertendum erat. Ex Lapathi generibus oxylapathum dicitur, durum, & aliquantum in extremis acuminatum.) Aliud est satium illi dissimile, & ὁμοίον τῷ πρώτῳ, vt vulgata habent exemplaria. Alia, & vt opinor meliora, & ἀνδροίον, id est, non dissimile. Cui lectioni subscribit Plinius, qui oxylapathum satiuo similis facit: quāquam non dissimulandum in quibusdam codicibus etiam dissimilius legi. Oribasius habet, & τὸ αὐτὸ ὁμοίον τῷ πρώτῳ, non omnino simile primo: vt priora duo Lapathi genera non tantum inter sese differant, quantum ex vulgata lectione intelligere licet. Tertium genus siluestre, paruum, plantagini proximum, humile, & molle. Quartum est quod alij oxalida, alij anaxyrida, aut Lapathon vocant (additur in vetere codice ἀγρον, idest, siluestre Lapathum) folia eius siluestri ac exiguo rumici similia: caule non magno: semine subacuto, rubente, acri, in caule & agnatis appendicibus emicante. Postremum hippolapathum olus est magnum in paludibus nascens. Vides primum Lapathi genus agreste à Dioscoride positum, deinde satium, tum ad siluestria redire. Plinius ita distinguit. Nec Lapathū dissimiles effectus habet. Est autem & siluestre, quod alij oxalidem appellant, satiuo proximum, (pro satiuo lege siluestri exiguo) foliis acutis, colore betæ candidæ, radice minima: nostri verò rumicem, alij Lapathū cantherinum, ad strumas cum axungia efficacissimum. Est & alterū genus, ferè (feri non fere) oxylapathum vocant, satiuo item similis (Cornarij codex pro item similis, dissimilius habet: prior tamen lectio Oribasio, & melioribus Dioscoridis libris consentit, vt diximus,) & acutiora habet folia, ac rubriora, non nisi in palustribus nascens. Sunt qui hydrolapathum tradunt in aqua natum. Est & aliud hippolapathum maius satiuo, candidiusque ac spissius. Aliquanto post ex Solone adicit

Li. 2. Phyl.

Lib. 7. hist. cap. 6.

Genera

Li. 10. c. 21.



adiicit bulapathum: Silvestre itaque genus quod oxalis dicitur, Latinis rumicem vocari dixit, non alia Lapatha. Idem etiam alio in loco. Omnia autem silvestria Li. 19. c. 12. ferè sunt & foliis minora, & caulibus, succo aciora, sicut cunila, origanum, ruta. Solummodo ex omnibus silvestre Lapathum melius. Hoc in satiis rumex vocatur, nasciturq; fortissimum. Traditur semel satum durare, nec vnquam vitiari terra, maximè iuxta aquam. Non desunt tamen qui legendū contendunt. Hoc in satiis rumex vocatur, nasciturq; fortissimū: traditur certè semel satum durare, nec vinci vnquam à terra, &c. vt rumicem hīc hortensem faciat, quem superiore loco silvestrem posuit. Oxalidem autem propriè Romani rumicem appellarunt, forsitan quod ab ea succus non aliter atque mamma, quam rumem veteres dixerunt, sitientibus exugī soleat: nam foliorum acor à quibusdam hauritur, vt lac ab agnis, qui in suis matribus subrumantur. De quo Vergil.

In More-  
ro.

*Fecundūque rumex, malus, violāq; virebant.*

Nisi quis à teli similitudine ductum nomen existimet: quod sparo cognatum in modum pedis recuratur, cuius meminit Lucilius.

*Tum spara, tum rumices portantur, tragula porro.*

Adfertur tamen & hic versus à Festo, sed pro rumices habet muticante Nonio. Adfertur tamen & hic versus à Festo, sed pro rumices habet muti- rices. Galenus de iis ita scribit. Licet Lapathum appellare betam agrestem, vt quod non gustu modo, sed viribus etiam betæ hortensi sit simile. Verū cum beta Lapathum sit suauior, nemo est qui non libentiū ea vescatur. At oxylapathi qualitatē & vires nomen ipsum indicat: est enim Lapathum acidum. Quod autem ad Lapathum attinet, nemo est qui crudum ipsum mandat, quemadmodum neque betam. Oxylapathum tamen mulieres nostræ pica laborantes, interdum & pueri quidam gulosi crudum mandunt. Perspicuum autem est olus hoc ex genere esse eorum quæ non nutriunt, multò magis quàm Lapathum. Ex his intellectu facilè est Galenum oxylapathum pro oxalide accepisse, & non ab acuminatis foliis, sed ab acore, siue acido sapore oxylapathum dictum asserere. Idem alio in loco tria duntaxat Lapathi genera ponit. Lapathum simpliciter dictum, oxylapathum, & Li. 7. simpl. hippolapathum. Sed cum herbariis plura Lapathi genera hodie cognita sint, ea sic distribuemus. Lapathum aliud hortense, aliud silvestre. Hortense foliis est nigra betæ, minoribus, plantagini proximis, humi iacentibus, nō tam acuminatis, venosis, è longis crassisq; pediculis pendentibus: caule cubitali, striato: flore rubro: semine minuto, pellucido, subnigricatē: radice crocea, amarāque. Id secundum est genus à Dioscoride traditum, quod in hortis rura colunt apud Allobrogas, præsertim oppido Cremutio vicina, vocantq; *du Lapas*, eiusq; foliis vtuntur in iusculis, aluū cieri eius decocto arbitantes: & quamuis in hortis non feratur, in iis tamen sponte nascitur. Gesnerus in Sabaudia, circa Laufannā, & alibi sese vidisse ait, & Lampe vocari. Idē asserit Tragus. Matthi- Li. 1. c. 104. Li. 2. Dios. ca. 108. Fuchsius pro Lapatho satiuo, id quod vulgò Rhabarbarū Monachorū appellant. Item Dod. & alij. Silvestris Lapathi multa sunt genera.

Li. 2. Alim.

Li. 7. simpl.

Forma.

Locus.

In Hort.  
Germ.

Li. 1. c. 104.  
Li. 2. Dios.  
ca. 108.

In hist. pl.  
ca. 174.  
Lib. 5. ca. 9.

LAPATHVM Satiuum.





## OXYLAPATHVM.

Forma.



Ibidem.

Forma.

In Hort.

Germ.

L. 1. c. 49.

Ibidem.

## LAPATHI Siluestris

## II. Genus.

Lib. 4. c. 11.

L. 1. c. 104.

In Actiū.

Forma.



Oxylapathum Dioscoridis est primum Lapathi genus cuius notum, sic, ut ille ait, dictum non ab acido sapore, ut oxalis, sed à foliis subacutis, ut *Œg.* & in sapore, & in mucronata figura intelligatur. Id quod non animaduertentes Auicenna & Serapio, Lapathū omne sine discrimine acetosam nominare, nō recte ad saporem referentes, quod ad foliorum figuram retulit Dioscorides in hoc Lapathi genere. Officinæ Laparium acutum nuncupant, Galli *Panlle*, Germani *Mengelwurte*. Foliis est longis, angustis, duris, in summo subacutis: caulibus rotundis, geniculatis, cauis, nigricantibus, in quorum fastigiis flosculi copiosi, pallidi, semē triangulum, nigricans, tenui membrana conclusum. Radix est longa, intus crocea. In palustribus nascitur. Alterum siluestre tertium Dioscoridis Lapathi genus, paruum, plantagini proximum, humile & molle, ut ille describit. Docti quidam vulgi acetosam rotundam esse rentur: omnibus enim reliquis folia dura sunt, huic soli mollia & tenera. Dodonæus oxylapatho proximum esse ait, sed brevioribus foliis, & latioribus, per humum sparsis, plantagini ferē similibus, caule minore. Illud est fortasse Lapathū, quod rotundum vocat Gesnerus, & circa Friburgum Heluetiorum inueniri ait. Istud Lapathum Ruellius acidulam, aut minutam oxalidem vulgō dictam, Gallicè *Oxelle menue* arbitratur esse. Fuchsius eam plantam, quæ vulgato nomine Bonus Henricus, Germanicè *Guter Heinrich* nominatur, quam Dodonæus Chrysolachanum, id est, aureum olus, ob excellentes virtutes appellat, eoque nomine eam depinxit ac descripsit: vulgō Totabona dicitur, Gallicè *Toutbonne*. Tragus Rumicem vinctuorū vocat, Germanicè etiam *Schmerbel*, à purguibus & mollibus foliis, quem alii bonum henricum. Sollierius idem Lapathum siluestre eam plantam exiguum esse credit, ubique copiosissimam, quæ Gallis *Lapas*, Delphinatibus *Du lapas* dicitur. De oxalide minore dicitur postea. Bonus Henricus autem folia fert lata, crassa, oxalidi ferē similia, sed breviora & latiora: caule crasso, pedē & dimidiū altū, in quo coacervatur semen fere sicut in atriplice: radice nititur grandi, longa, crassa & crocea. Locis incultis gignitur, secus semitas & sepes. Iunio & Iulio mensibus floret. Tertium Lapathi siluestris genus Dioscoridi indictum, Lapathū nigrum, & sanguis draconis à foliorum & caulium colore, & succo, à recentioribus nuncupatum, superiori caulibus, foliis, semine proximum



LAPATHVM Siluestre,

III. Genus.



mun est, sed caules quidem habet purpureos, folia verò in rubro nigricantia, Lapathi acuti angustiora, longiora, numerosa, rubris venis sparsa, gustu adstringente, quæ expressa rubrû succum remittunt. Ex Lapathorum est genere, quoniam toto habitu Lapathum refert. In Septentrionis hortis etiam sponte oritur, rariùs in calidis regionibus. Quartum genus eam plantam quidam esse putant, quam nonnulli panaces chironium folio Lapathi, flore aureo à Plinio dictum esse arbitrantur. Radice est breui, furculosa, fibrata, dura, lignosa: caulibus duobus aut tribus, angulosis, palmi altitudine: foliis oxylapathi, oblongis, angustis: flore in summis ramis aureo. Vnde Anthoxanthon, idest, lutei floris Lapathum nuncuparunt, copioso, densiùs aceruato, vt in spinaceo olere, quod teutlomalachen quidam vocant. In fossis & vlginosis locis prouenit.

Forma.

Locus.

In Hort.  
Germ.

Forma.

Quintum genus Lapathum aquaticû, seu potiùs oxylapathum ob foliorum cum vero oxylapatho similitudinem vocat Dalechampius: cuius etiam meminit Gesnerus. Eius radix est geniculata, ex singulis geniculis fibras emittens, quibus vado inhaeret, primis internodiis rubescens. Caules edit multos, rotundos, quinque aut sex cubitos longos, in aqua fluitantes: folia palmum atque eo amplius longa, angusta, in ambitu cre-

LAPATHVM Siluestre,

IIII. Genus, Dalech.



OXYLAPATHVM

Aquaticum, Dalechamp.



Ec 2



Locus.

nata, alternatim per caules nascentia, gustu saturo & sicco. In caulium vertice thyr-  
sus eminet ea prorsus specie, qua in potamogetone visitur. Nascitur in vadis am-  
nium pigrorum vt Araris. Longe diuersum Hydrolapathum, id est, Lapathū aqua-  
ticum Lobellius proposuit, idq; duplex. Maius tota facie Hippolapathum satium

## OXALIS MAIOR.

OXALIS Minor,  
Math.

referens, folio nigriore, non dispari, vt neque  
caule, neque semine, radice duntaxat breuiore,  
magis fibrata, foris nigriore, intus magis ru-  
bra. Frequens in aquis, nec alibi sponte exit. In  
aquis etiam prouenit Hydrolapathum minus,  
sed non nisi limpidis & fontanis, ex quarum  
fundo exerit cauliculus teneriusculos, flacci-  
dos, graciles, non absque filamentis, vt careat  
aquarica, stipantibus & pendulis. Folia sunt  
admodum tenuia & mollia, nec tamen aque  
innatantia ritu Potamogetonis, sed erecta, ex  
atro viridia, lanceolata similia, angustiora qua  
Potamogetonis. Postremum Lapathi silue-  
stris genus Dioscorides quartum oxalida con-  
stituit, quæ vt ex eius descriptione intelligere  
licet, nihil aliud est quam oxalis nostra maior  
& pratensis, cui folia sunt Lapathi acuti, delica-  
tiora, tenuiora & magis oleracea, in imo la-  
tiora, pinnatas, & lunatas, Spinaciam & Atri-  
plicem referentia: caulis striatus, ruber, succu-  
lentus: semen angulosum, acutum, in folliculis  
Lapathis cæteris nō dissimilibus. Radicibus ni-  
tetur plurib<sup>9</sup>, sed nō vt in rumice croceis, acido

HYDROLAPATHVM  
Maius, Lobel.



gustu, perinde ac folia & caules. Oxalidem igitur sic diuidemus, vt alia sit siluestris, alia hortensis. Siluestris oxalis Dioscoridis ea est, cuius modò historiam retulimus, quæ maior cognominatur. Alia est minor tenuifolia, sinuata, veruecina nuncupata, cui folia sunt longè minora, cuspidis lanceæ figura, mollia, læuia, quibusdā veluti capillamentis subrubentibus inspersa, succosa, foliis maioris acidiora, & in medicos vsus plusquàm cætera expetita. Hortensis item duplex est, maior quæ pratensis est in hortos translata, oblongis & nigricantibus foliis. Altera foliis albicantibus, rotundiusculis, breuibus, angulosis, hederæ foliis ferè similibus, tamen minoribus, neque crassis, neque duris. Caules eius teneri sunt, in quibus semen cæteris simile. In hortis nostris passim obuia est, vt & prior. Quæ oxalis à Gallis, imitatione Græca, *Oxaille* dicitur, & *Ozeille*, ab alijs *Vinette*, à nonnullis *Aigrette*, à Lugdunensibus, *Sallette*, à Germanis *Saurampffer*. Oxalis siluestris minor omnium acidissima, *Ozeille menue*, & *Ozeille de brebis*. Hortensis minor, *Ozeille ronde*, *Ozeille franche*, & *Ozeille Romaine*. Dicitur autem Oxalis ab acido eius succo: gratum enim acorem palato repræsentat: vnde acetosam nominarunt Officinæ. Hic minimè prætermittenda Oxalis alia à Lobellio posita radicibus tuberosis filipendulæ vel Oenanthes valdè spectabilis, exotica: etiam foliis, caule & semine hortensis, quā toto habitu præfert. Raram esse

Genera.

Forma.

Forma.

HYDROLAPATHVM

Minus, Lobel.



OXALIS Tuberosa, Lobel.



OXALIS Rotunda.



Ec 3



## HIPPOLAPATHVM

Siluestre, Matth.

Genera.



Lib. 6. 154.

Lib. 3. cauf.  
Theophr.  
c. 4.

ait Lobellius in Belgio, & huc ex Italia delatū. Superest Hippolapathum, cuius species duæ. Siluestre non solum in paludibus nascens, sed etiam in mōtibus iis præsertim in locis in quibus pæcudum diutius stabulantium latamine pinguescit solum: sequenti Hippolapatho simile, sed foliis angustioribus & magis in acutum tendentibus. Alterum hortense, Matthioli iudicio, id quod pæssim in hortis rhabbari monachorum nomine habetur, quod alij Lapathū satiuū Dioscoridis esse opinantur ut diximus, Gallicè *la Patience*. Id Oxylapatho fere simile est, nisi quod folia maiora sunt, latiora, molliora, in summo non mucronata. Caules longissimi sunt, crassi, rubri: flores flauescētes: semen rubrum, triangulūm: radix longa, crassa, cæca. Id Lapathum satiuū Dioscoridis, Fuchsi, Dodonæi, Solerij sententia diximus esse. Tragus Hippolapathū Dioscoridis esse putat, Scaliger Bulapathū, sic enim scribit. Quod sanè in hortis pro *Raued* offendant, Bulapathum est, radice admodum medicata. Francigenæ virgines Deo dicata, quo nomine illud appellant, haud multum abhorret à vero: vocant enim *La patience*. Huic addunt Lobellius & Pena Hippolapathū aliud, rotūdo folio, Pseudorhab. recentiorū, quod pauci & diligentiores herbarij colūt, quasi multò magis affine vero Rheobarbaro, quia folio sit rotundiore, & summo ambitu retusiore, propioreq; ad Personatā, aut Petasitem,

## HIPPOLAPATHVM

Satiuum latifolium, Lob.



## HIPPOLAPATHVM

Rotundo folio, Lobel.



quibus



HIPPOLAPATHVM

hortense



quibus fermè magnitudine aequiparatur: non tamen maiore, aut ita diuersa radice Hippolapato, nec vñ aut natura dissimili. Lapathorum & hippolapathorum historias retulimus, nunc eorum virtutes sunt explicandæ. Omnium decocto olere, inquit Dioscorides, alius emolitur. Crudi illitu melicerides rosaceo aut croco adiecto discutiuntur. Siluestris (nempe mollis) & oxylapathi, & eius quam oxalida nominant, semen ex aqua aut vino vtiliter bibitur contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus. Quod si quis in potu præsumat, nihil molesti ex ictu parietur. Radices ex aceto coctæ, aut illitæ erudæ lepras, impetigines, & scabiosos vngues persanant, sed ante locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus corporis decoctum earum sedat, si foveatur, aut in solis balnearum confrietur. Græcè legitur ἵππολαπῆνον, ἢ λούζον μεγύμενον, id est, si affundatur, aut si vt fons adhibeatur, aut cum aqua balnei misceatur, tamen hæc verba ἢ λούζον μεγύμενον, in multis græcis codicibus desiderantur, ea tamen legisse videtur Plinius, de eadem re scribens, Pruritus corporis in solia balnearum additum)

Lib. 2. c. 108  
Vires &  
Temper.

Coctæ in vino & instillatæ aurium dentiumque dolorem mulcent: strumas, parotidasque discutiunt: lienem cum aceto extenuant (quibus verbis Græca non satis exprimi videntur, leguntur enim, παρηγοροῦσι τὸ ὄλεθρον, καὶ ὀδονταλγίαν ἐξ ἡβρίσσει ἐν οἴνῳ, καὶ διακλύει μεννῆ. Διαποροῦσι καὶ χοιμάδες, καὶ παραπιδίαι ἐξ ὅσων συνίστησι, καὶ κατὰ πλάσσει, σπλῆνι. τὸ συνίστησι. Id est, aurium & dentium dolorem leniunt coctæ in vino, si colluantur, strumas parotidasque discutiunt coctæ in vino, & cataplasmatibus modo adhibitæ, splenem autem cum aceto coctæ.) Aliqui amolendis strumis radicem gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Tritæ & admotæ foeminarum profluvia sistunt: cum vino autem potæ regio morbo medentur, calculos vesicæ comminuunt, menses cient, scorpionum ictibus auxiliantur. Hippolapathum eadem vires habet, quas supradicta rumicis genera. Plinius non eundem quem Dioscorides vñum medicum habet, scribit enim. Siluestris scorpionum ictibus medetur, & ferire prohibent habentes. Dioscorides ait, eum qui præbiberit, nihil ex scorpionis ictu mali passurum. Radix, inquit Plinius, aceto decocta si coletur, succus dentibus auxiliatur, si verò bibatur, morbo regio. Dioscorides ad vtramque affectionem in vino coquit, & mendosè vulgata exemplaria, coletur, habent pro colluatur. Semè stomachi inextricabilia vitia sanat. Dioscorides ἀσση σμαχῆς dixit, id est, stomachi fastidium ac nauseam, cum os stomachi à vitiosis humoribus ita mordetur, vt nauseam & fastidium pariant. Hippolapathi radices priuatim vngues scabros detrahunt. Dysentericos semen duabus drachmis in vino potum liberat. Quæ siluestris, & oxylapathi, & oxalidis radicibus Dioscorides attribuit. Oxylapathi semen lotum in aqua caelesti sanguinem reicientibus adiecta acacia lentis magnitudine prodest. Præstantissimos pastillos faciunt ex foliis & radice addito nitro, vel iure exiguo (thure pro iure reponit Cornarius) in vñ aceto diluunt. Sed satium in epiphoris oculorum illinunt frontibus. Radice meliceridas & lepras curant. In vino verò decocta, strumas, & parotidas, & calculos. Quæ de

Lib. 20. c. 21

Lib. 20. c. 21

Embl. 102.  
lib. 2. Diosf.



Ibid.

siluestrium radice Dioscorides dixit. Poto vino & lienes (Cornarius emendat, femine potio è vino, & cetera.) cæliacos æquè ac dysentericos, & teinesmos. Ad eadèmq; omnia efficacius ius lapathi (ius τὸ ἀπέσμημα, id est, decoctum intelligit) quod ructus facit, & vrinam ciet, & caliginem oculorum discutit: item pruritus corporis in solia balinearum additum, aut prius ipsum illitum sine oleo. Firmat & commanducata radix dentes. Eadem decocta cum vino sistit aluum, folia soluunt. Alio in loco cap. 12. 20. de lapatho siluestri ita scribit. Vfus eius cum

Ibid.

pristana tantum in cibis leuiorem gratioremq; saporem præstat. Quo loco Cornarius verba hæc, cum pristana tantum, redundare arbitratur, & rectè quidem:

Lib. 7. sim.

coquitur enim oxalis integris foliis vt reliqua olera cum cibus, carnibus, & piscibus, non cum pristana tantum. Lapathum, inquit Galenus, moderatè digerentem facultatem habet, at oxylapathum mixtam: nam cum eo quod digerit, non nihil quoque repercutit. Semen eorum manifestam quoque quandam adstrictionem obtinet, vt & dysenterias, & diarrhœas sanat, & maximè oxylapathi. Porro hippolapathum quod totum in paludibus prouenit, easdem facultates ob-

Lib. 6. c. 24.

tinet, sed imbecilliores. Aetius scribit vlcus demorforum à cane rabido perfundendum esse chamameli, radice lapathi, quod oxalidem vocant, decocto, non uisèque sese senem quendam, qui ubi quis morsus esset à rabioso cane, sola oxalide curabat. Nam & vlcus decocto perfundeat, & herba integebat, & de ipsa bibendum dabat. Meiunt autem homines qui ipsam acceperunt multa, & cum vrinæ incontinentia. Et propterea morbum regium hæc expurgant. Nos verò etiam impetiginem ex ipsa cum aceto confricatam depellimus: & pruritus auxiliamur per eandem radicem. Vtunturque etiam ipsa ad canis rabiosi morsus cum alijs auxilijs. Similiter facit etiam syluestre lapathum, folijs in acutum tendentibus, radicem habens oblongam veluti raphanus paruus. Hæc Aetius. Ex oxylapathi radicibus aqua destillatur, quæ ad pustulas, alphas, ionthos, vitiligines, lichenas, omnes denique cutis, præsertim faciei maculas delendas plurimum facit, hoc modo. Eius aquæ & melonis præmaturi sumantur singulorum libræ duæ, oua hirundinum decem, salis nitri semuncia. Quæ teri debent, trita cum aquis in vitreum vas coniiciantur, vnde succenso igne aqua extrahitur, qua manè facies abluenda, vesperi illinenda oleo ex tartaro, & amygdalino, permixtis. Decoctum oxylapathi ex vino, diebus aliquot potum auriginem pellit, & cutim pristino nitore restituit. Credunt quidam lippire nunquam eos qui rumicis siluestris radicem luna decrescēte effossam nitidissimè secum portauerint. Quæ planta Bonus Henrichus dicitur, vulneraria est, & mirificè ad fordidam purganda, ac glutinanda vlcera cōfert, sic vt appensa etiam, ac trita vulneribus imposita vermes, qui in iis nati sunt, excidere faciat. Denique siccata & abstergit.

*Vires Boni Henrichi.*

In hist. pl. cap. 174.

Lib. 1. c. 104

Hippolapathi, quod rhabarbarum monachorum vocant, radix auctore Fuchio, purgandi vim habet, si in puluerem redacta drachmæ pondere sumatur. Neque id mirum admodum, inquit, cum Dioscorides omnium rumicum olus decoctum aluum mollire, atque decoctas eorum radices cum vino, regio morbo correptos emendare, ob bilis nimirum per inferna educationem testetur. Tragus affirmat radicem hanc cum pauxillo zingiberis sumptam phlegma & bilem per inferiora euacuare, seseque hoc remedio vsum experientia didicisse. Ex ea autem medicamentum sic conficitur. Radicis aridæ drachma, zingiberis scriptum, in puluerem redigantur, sumanturque à ieiunis in iure calido.

ASPA







asparagorum plantario & silua, qui eduliseft, deinde asperatur, & deflorefcit procedente tempore, flos vero ex ipfo folùm, non ex prioribus emergit: hic enim annuo conftat caule: Quæ Theophrastus dixit, ἀναβλασαντι ὁ κλωνὶς ἐκ τῆς ἀσπαργίας, Theodorus interpretatus eft, exit caulis de Corrudagine. Verum ἀσπαργίαν, feu ἀσπαργίαν, vel pro fummis asparagi radicibus, vel potiùs pro asparagorum

*ASPARAGVS fatuus.*

Corol. 139.  
lib. 2. Diosc.

Lib. de re  
rust. c. 6.

Forma.

In libr. 2.  
Diosc. c. 18




*ASPARAGVS Siluestris,  
Matthioli.*

Lib. III. c. 3.



plantario & silua, vt & conuertimus, videtur vſurpaſſe. Id quod & Hermolaus adnotauit. Theophrastus asparagiam, inquit, pro planta ipſa videtur accepiſſe, aut etiam pro loco vbi ſatus eſt asparagus, eodẽ etymo ferẽ quo apud nos Cepina, Rapinãque. Theodorus corrudaginem, quaſi aliud quam Corruda genus interpretatur. Cato certẽ ad eundem modum corrudam quo cepinam & rapinam accipit. In arundine- to, inquit, corrudam ſerito, vnde fiant asparagi. Hæc Hermolaus, qui altiles asparagos veteribus incognitos fuiſſe iudicat, corrudamque dictam ab Atticis non horminion, ſed orminion, ſive ormenum potiùs, ab aliquibus Libycum, alpa- ragum ſilueſtrem, qui poſt inuentum altilem propriẽ corruda eſt. Scorpionem alibi deſcri- pſimus, nunc de asparagis dicendum. Aspara- gus fatiuus ex radicibus thyrſos primũ emitit teneros, virides, læues, rotundos, ſine foliis, car- noſos, digiti ferẽ craſſitudine, cacumine in to- rulos turbinato. Hos thyrſos orobanche rectẽ comparat Matthiolus, qui tãdem increſcentes explicantur in prægrandes ramos, quibus in- ſunt folia capillamenti modo, & vt ſceniculi tenuata, quæ occaleſcunt in ſpinulas, florem fundit paruulum, pallidum, quo decuſſo baccæ dependent rotundæ, piſi magnitudine, virides, quæ tandem maturitate rubeſcunt, ſeminibus nigris, & corneæ ſoliditatis reſertis. Radices cir- ca caulem ſpongioſæ, vnde numeroſæ oriun- tur radiculae inter ſeſe implicatæ & quaſi vnita- tem facientes, quas radículas ſic illigatas & con- nexas olitores ſpongiæ appellant, inquit Colu- mella, & veteres alparagum ſpongiam in radi- cibus habere dixere. Corruda nouellis cauli- culis ſeu turionibus, fruſtũque fatiuo asparago proxima eſt, ceterũ tota ſpinofa eſt, & aculea- ta: nam foliorum capillaceorum loco, quibus altilis asparagi ramuli veſtiuntur, tota ſpinis horret, minutis, breuib, duris & pungentibus. Ex Matthiolo Asparagum fatiuum & ſilueſtre hic pictum damus. Sed is ſponte perumens ſo- la tranſplantatione & cultu à fatiuo differt. Qua- re Corruda non eſt, quæ ſpecie ab altili aspara- go prorsus differt, rarior multò, vt ſcripſit Pena neque



CORRUDA *Dodonæi*.CORRUDA *Pena.*

neque enim Veneto tractui maritimo, neque Germania, Gallia, Anglia ve maritimis visitur, ubi tamen altis frequens oritur: facilis autem à superiore dignotio, quod hæc tota candidior, & rigidior est, & ramis diuarcatis funditur per sepes, folia acutiora, breuiora, & magis in ordines stipata: flosculis oleæ luteolis, crebris, subter alas emicantibus, semen illi non ut altilli, corallij colore, sed cum maturuit, nigricat ex viridi, magnitudine aliquanto inferius, quod glomeratim proximè furculos adnascitur. Hæc scitè Pena expressit hac pictura. Magis montosis & collibus in decliui & afflatu maritimo delectatur. Altis asparagus passim in hortis feritur & colitur. Corruda siccis & saxosis locis nascitur in Gallia Narbonensi, præsertim in sepibus & fructetis. Ille thyrsus primum cum ver appetit emicante viret, spica tum cibus expetita. Recentes hos thyrsulos in voluptatem gulæ verterunt helluones, & Rauennatibus palmam dedere, quæ gloria etiam hodie manit ei terræ. Hodie decoctus in iure asparagus, aceto, sale, & oleo conspersus magno gulæ delectamento comeditur, & in principum delitiis est. Contra corrudæ caliculi amariusculi sunt, & nullam ferè in cibus gratiam habent. Semè æstate legitur. Dioscorides petræi asparagi virtutes primum declarat. Huius cauliculi, inquit, in cibo cocti ventrem emolliunt, vrinam cient (legitur in vetere codice  $\delta\tau\omicron\kappa\alpha\lambda\upsilon\lambda\iota\omicron\nu\iota\omicron\nu\iota\pi\prime\omicron\lambda\iota\gamma\omicron\nu\iota\epsilon\iota\sigma\theta\epsilon\iota\epsilon\nu\kappa\alpha\iota\beta\rho\omega\theta\epsilon\iota\epsilon$ , id est, cuius cauliculus modicè elixus esitatusque, & cætera. Cui lectioni cum experientia ratio etiam patrocinator, quia per longiorem cocturam vtræque vis & molliendi alui, & ciendi vrinam exoluitur in asparagos). Radicis decoctum contra vrinæ difficultatem, regiū morbum, renum vitia, & coxendicum cruciatus in potu proficit: cum vino autem phalangiorum moribus auxiliatur. Si decocti succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad eadem valet. Canes, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriuntur. Asparagum etiam nasci prodiderunt arietis cornibus contusis, atque defosis, quod à veritate abhorreere credit Dioscorides. Quod verò deinceps dicit,

$\delta\mu\theta\iota\tau\iota\varsigma\alpha\sigma\pi\acute{\alpha}\rho\alpha\gamma\omicron\varsigma\omicron\upsilon\iota\lambda\omicron\varsigma$ , id est, Hic quidem asparagus, &c. ad satium referendum est, & quæ deinde sequuntur, sicut priora illa ad siluestrem. Declarat id quod dixit, si quis cornua arietis contusa defodiat nasci asparagum, ut sic satius ex siluestri fiat. Hic quidem asparagus, & cætera. Deinde quæ sequuntur ad siluestrem referri minimè possunt: cum enim hunc initio capitis notum esse dixisset, facultatibus eius

Locus.

Tempus.

Lib. 2. c. 118.

Viresc.

Temper.

And. Lac.



12 HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
eius explicatis descriptionem non subieciſſet. Hic quidem aſparagus, ſive altilis  
aſparagus, inquit Dioſcorides, multis ramis fruticat, foliis ſceniculi, longis, nume-  
roſis, radice rotunda, grandi, ſpongiam habente (ἐχέσσαι κόνδυλον, id eſt, tuber ha-  
bente, ſive tuberoſa). Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renum dolores ſe-  
dant (in Græcis corruptè legitur, ἄνωγει φρενιτιδα, ſedat phrenitida, pro ἄνωγει  
φρενιτιδα, ſic enim ſtatim initio capitis, βοηθεῖ νεφριτικοῖς, opitulatur nephriticis). Aſ-  
paragus autem elixuſve urinae ſtillicidium, difficultatēque ac dyſenterias mitigat.  
Radix cum vino aut aceto cocta laxat artus mulcet. Decocta cum ficis aut ci-  
ceribus ſumpta, regium morbum ſanat: coxendicis cruciatus ſtranguriæque le-  
vatur. Huius decoctum conceptum adimit, & ſterilitatem

ceribus sumpta, regium morbum extenuat. Veneris causam conceptum adimit, & sterilitatem auget. Alligata radix, aut haustum eius decoctum conceptum adimit, & sterilitatem adfert, *ποιει ἄβελιον, καὶ ἄγονον*, conceptionem impedit, & infecunditatem adfert. melius. Plinius eundem ferè vsum medicum de asparago altiti, & siluestri prodidit. Vtilissimus stomacho cibis asparagi vt traditur. Cumino quidem addito infestationes stomachi coliq; discutiunt, iidem oculis claritatem adferunt. Ventres leniter molliunt. Pectoris & spinæ doloribus intestinorumque vitis profunt, vltimo cum coquantur addito. Ad lumborum & renum dolores semen trium obolarum pondere, pari cumini bibitur: venerem stimulant: vrinam cient vtilissimam præterquàm quòd vesicam exulcerant. Radix quoque plurimorum prædicationum trita, & ex vino albo pota calculos quoque exturbat, lumborum & renum dolores sedat. Quidam & ad vuluæ dolorem radicem cum vino dulci propinant. Iidem in aceto decocta contra elephantiasin proficit. Asparago trito cum vinoperunctumungi ab apibus negant. Siluestris ad supradicta omnia efficacior, & candidiori maior. Regium morbum extenuat. Veneris causa aquam eorum decoctam bibi iubent ad heminam. Ad idem & semen valet cum anetho teritur inque vtrinque obolis. Datur & ad serpentum ictus succus decoctus. Radix miscetur cum marathri inter efficacissima auxilia. Si sanguis per vrinam reddatur, feri asparagi, & apij, & cumini ternis obolis in vini cyathis duobus, quinque drachmis Chrysippus dari iubet. Sic & hydropicis cōtrarium esse, quamuis vrinam motu docet: item veneri, vesicæ quoque nisi decoctum: quæ aqua si canibus detur, dicit eos. In vino decocta radices succum, si ore contineatur, dentibus moritur.

Asparagi Galeni sententia siue regij sunt, siue pauciores nonnulli  
nam cientes & parum prebent nutrimenti. Si tamen ij probe concoquantur,  
rum asparagi magis alunt, nimirum quanto illis sunt sicciores. Rursus, Aspa-  
gus petraeus seu myacanthinus abstergendi vim habet, idque citra manifestam  
frigiditatem aut caliditatem. Hinc renes ac icterus inferctum liberat, & maxime  
herbe ipsius radices ac semen. Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine  
requiritur. Scribit Auicenna asparagos in cibis sumptis

quam vel maximè dentes requirunt. Scribit Auicenna asparagos  
suauì odore corpus commendare, verum vrinam sætidam trahere. Hic Cluſius  
rudas proponere volumus. Prior Dodonæi vel Penæ corruda fuerit. Quam  
thiolus exhibet, Cluſius corrudâ esse negat, sed asparagi altilis genus esse ait, quod  
(quia maritimis decliuioribus & herbidis locis sponte prouenit) marinum vocat  
caule breuiore, firmiore, foliis crassioribus, firmioribus, ex cæruleo virentibus  
baccis maioribus quàm vulgaris hortensis, & non ad eò coralli modo intensè

Altera Clusij corruda fruticosa est, in viridibus & mollioribus ramis, siue virgimosis, spinas acutas tres aut quatuor hinc inde pro foliis ferens, virides itidem rami sunt, florem nullum ille vidit, sed frequentes baccas rotundas vti in superiore, primum virides, deinde per maturitatem nigricantes, succo & pulpa viridibus, quas semina includitur durum, foris nigrum, intus candidum, plerumque unicum, interdum binarum, radix crassa, longa, superiori similis, frequens est ad

Vnicum, interdam s...



*CORRUDA* tertia, Clusij.

*CORRUDA* altera, Clusij.



gum in Lusitania, & in Batia, solo petroso, in collibus & sepibus. Tertia eiusdem corruda cubitales profert virgas, ramosas, candidas, lignosas, & priori similes, firmis, candicantibus, & deorsum spectantibus spinis alternatim, & secundum ramorum virgarumque inaequalium inflexionem horridas, ad quas quina aut sena folia simul & ex eodem capite prodeunt, prioris speciei longiora, mollioraque, que comanducata subdulcia, & aliquatulum gummosa deprehenduntur, flos inter folia ex alarum sinu longo tenuiq; pediculo dependet, ex viridi pallescens: deinde fructus propemodum rotundus, qui tricoccus videtur (tametsi vnicum granum continet, raro bina, foris nigrum, intus candidum, firmum, uti in superioribus) initio virens, per maturitatem rubescens & carnosus, siue succum & pulpam concludens lentam & viscidam: radice firmatur multiplici, velut alij silvestres asparagi, longa, crassa, intus alba, foris flavescente, fert aliquot thyrsos, qui aliorum asparagorum modo eduntur cocti & crudi cum oleo, aceto, & sale. Nusquam abundantius quam supra Vlyssiponem salebrosis locis iuxta vias, non procul à Tago se observasse ait. Nascitur tamen & aliis Lusitaniae locis & tota fere Batia.

FRAGARIA.

CAP. XXVII.

**E**RBA quæ fraga fert, fragaria ab herbariis nominatur, quæ quomodo à Græcis appellata sit nondum constat. Sunt tamen qui rubum Idæum non spinosum esse putant, quorum sententiam non improbat Fuchsius, cui non subscribit Dalechâpius, ex cuius iudicio longè alium, & verum rubum Idæum non spinosum depinximus. Apuleius Græcis *χβρα* <sup>φορ</sup> appellari scripsit, quod si verum est, longè alia est à comaro, quam ex Dioscoride, Galeno, & aliis descripsimus: hæc enim arbor est, illa herba. Fragaria à verbo frago, quod odorem reddo significat, nominata est, Gallis *fraiser*, fructus fraga, *fraises*, Germanis *Erdbeer*. Seruius mora terrestria vocat. Fragariam ex quinquefoliorum genere esse quidam arbitrantur, quod falsum esse ipsa quinquefolij plantæ

*Nomina*

In hist. plā.  
cap. 27.

In Dum.  
cap. 1.

Ff



# HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,

*Genera.* inspectio aperit sibi testatur, ut suis loco dicetur. Fraga nascuntur in montibus & siluis, quæ dicuntur montana, & siluestria. Alia in hortis, & dicuntur sativæ. Diffinguntur & colore, non tantum loco. Sunt enim quædam alba, quædam rubra. Fragaria humi sine caule spargitur, multis à radice lanuginosis pediculis, singulis ternis folia sustentibus, quinquefolio quodammodo similia, crenata in ambitu, venosa, flores sunt candidi, intus latei, figura quinquefolij floribus proximi, fructus initio viridis, rotundus, cum maturuit ruber vel albus, tum gustu, tum odore suavisissimus, radix foris atra aut rubescens, intus candida, multo fibrata capillino. Alia in silvis & opacis montibus gignitur. Alia in hortis colitur. Aprili mense floret, Maio & Junio fructus est maturus, fragaria viridia, necdum matura frigido, siccoque sunt temperamento, fraga matura frigido & humido, fragaria auctore Marthiolo refrigerat ordine primo, siccatque secundo, folia & radix vulnera & vlcera sanant, muliebres fluxus & dysenterias cohibent, urinam cient, & lieni conferunt. Herbarum & radicum decoctum potum auxiliatur iocinoris inflammationibus, mundatque renes & vesicam. Eodem si colluatur os, gingivæ roborantur, dentes firmantur, destillationes fiunt. Fraga verò biliosis astutibusque ventriculis profunt, & sitim sedant. Vinum quod ex his exprimitur vlcibus & oculorum ne-

*Forma.*

## FRAGARIA.



*Locus.*

*Tempus.*

*Dodo. lib.*

*cap. 7.*

*Vires &*

*Temper.*

*Initio 4.*

*Diole. cap.*

*6.*

beculas, calidæque defluxiones imposuim tollit.

## CUCURBITA.

CAP. XXVIII.

*Nomina*

*Lib. 1. c. 20.*

*Athel. lib. 2.*

*Genera.*

VNC cartilaginei generis plantas cucurbitas scilicet, & cucumeres, atque id genus alias per horti nostri areas digeramus. Καλκωβα, & καλοκωβα, & καλοκωβα. Græcis, Latinis Cucurbita dicitur, à concuatu, quod facile si quid obstiterit, aut fuerit impedimento quod minus extendatur, incurvescat. Græci, ut scribit Ruellius, ex aduerso vocabulum inposuere, colocyntham nominantes, quod scilicet pumili breuesque sint fructus quos ipsa passim enititur, cum corporis mole omnes herbarum arborumve fructus videantur superare. Euthydemus, cucurbitam vocauit Indicam cucumerem, quod semen eius ex India fuisset delatum. Menodorus duplicem esse cucurbitam dixit, vnam Indicam, quæ σικία, id est, cucumis, alteram quæ καλοκωβα vocatur. Helespontis longas vocarunt σικίας, cucumeres, rotundas cucurbitas. Tanta potest natura cognatio est inter cucurbitas, cucumeres, pepones, & melopepones, sepe numero & proprietates, & nomina Græci confundant. Illud quoque vnicolum instrumentum quod corpori affixum vel spiritu, vel leui scarificatu sanguinem elicit, Græci à cucumere σικίαν, Latini à cucurbita per diminutionem cucurbitulam cognominarunt. Globosa verò cucurbita cum penitus inaruiscentia principio venerunt in usus medicorum. Nunc ex ære, cornu, vitroque continguntur. Cucurbita duo potissimum sunt genera. Cucurbita sativa siue hortensis, quæ καλοκωβα ἐδάδιμος, id est, cucurbita edulis dicitur, Arabibus Haraba, Haraba, Charaba.



*Charba*, Italis *Zucca*, Germanis *Kurbß*, Hispanis *Calabazza*, Gallis *Courge*, & *Concourde*. Altera agrestis, de qua postea. Latini siue cucurbita in globum tumeat, siue teres in longitudinem extendatur, eodem vocabulo sunt complexi, neque ob dissimiles formas, natura & viribus differunt. Varia enim in iis forma arte facile effingi potest, vt dicemus. Herbarij tamen varias eius species & formas, & locis distinctas enumerant. Plinius duo cucurbitæ genera facit. Vnum reptantibus flagellis scandens parietum aspera in tectum vsque, natura sublimitatis amida. Vires sine adminiculo standi non sunt, velocitas pernix, leui vmbra cameras ac pergulas operies: inde camerarium vocatur. Alterum plebeium quod humi repit. In priore mirè tenui pediculo libratur pondus immobile auræ. Cucurbita quoque omni modo figuratur, vaginis maximè vitilibus, cōiecta in eas postquam desloruit. Crescit quæ cogitur forma, plerumque & draconis intorti figura. Libertate verò pensili concessa iam visa est nouem pedum longitudinis. Ex quibus perspicuum est genera quæ herbarij ad formā respicientes constituunt, cucurbitæ camerariæ & plebeiar species esse. Vnam scilicet maiorem, alteram verò minorem. Maiorem vocant a floribus & fructu quos maiores habet. Minorem cui hæc minora sunt. Tertiam

Lib. 19. c. 5.

Fuchf. cap.

137.

Dodo. lib.

5. cap. 32.

In libr. 2.

Diosc. cap.

127.

Forma.

*CUCURBITA Cameraria, longa.*



longiorem à fructu oblongiore. Matthiolus etiam triplicem tradit esse cucurbitam. Longam, rotundam, & sessilem. Cucurbita longa flagellis longis, sarmentosis, teneris, angulosis, vitis modo sese diffundens per humum repit, nisi adminicula nacta fuerit, quæ capreolis suis, quos secus folia singulos producit, facile complectitur: iisdem etiam arbores & pergulas scandit, seseque illis implicat, folia ex interuallo profert singula, singulis petiolis infidètia, ferè rotunda, nisi maximè anteriore parte acuminati anguli eminerent, subcandicantia, tactu mollia, leuiter hirsuta, ampla admodum, asari foliis haud multum absimilia, flores iuxta capreolos & folia albos, figura liliaceos, vel in quinque foliola stellæ modo diuisos, intus hirsutos partim steriles, partim fecundos, qui sic facile internoscuntur. Steriles breues habent in medio apices, & hirsutiores sunt, nec qua pediculo iunguntur tuber siue capitulum vllum intercedit, futuri fructus spes: fecundi verò in medio tria crassiuscula bifidaque stamina continent, nec statim pediculo hærent: nam inter ipsos & pediculum capitulum paruum & leuiter hirsutum extuberat, cucurbita futura, iuxta adnexum in angustum collum desinens, quod marcescente flore paulatim accrescit, deinde in magnam & longam molem, quam cucurbitam vocamus auctum maturefcit. Fructus is primum herbaceus est, & lanuginosus, cortice tenero, pulpa candida, gustu dulci, in maturitate flauus, cortice duro, pulpa fungosa, seminibusque plena. Ea plana sunt & compressa, altera parte acuminata, eaque duabus eminentiis veluti cornuta, altera latiuscula, quorum cortex lignosus est & candidus, gustu dulcem nucleum includens. Tota planta radice nititur candida, in multas radículas distracta. Cucurbita cameraria maior siue sessilis viticulis, foliis, floribus, semine superiori similis est, fructu distat, qui in hac in orbem collectus intumescit, crassusque & latus est. Huic




CUCURBITA Cam-  
raria maior,

Cap. 266.

sunt, alia parua, alia mediocres. Alia rotunda, qualis hic exhibetur. Alia oblonga, qualis & hic depicta est, cuius fructus admodum flauus est, quem Fuchsius nomine cucumeris Turcici depinxit. Sunt & varij coloris. Foliis sunt longè maioribus quàm nostrates, firmioribus, asperis, vitigineis, rigido pediculo adnexis, lat-

proxima est cucurbita cameraria minor, sue rotunda, nisi quod semine minore est, & fructu breue crassamentum coacto, collo oblongiore angustioréque. Sed hæc diuersæ cucurbitarum formæ olitorum arte possunt effingi. Nam semina quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt cucurbitas: item ab imis, sed non comparandas supradictis: quæ in medio rotundas quæ in lateribus crassas, breuiorésque. Si verò cordi sit, ut fiant incrementi vastioris, de media parte cucurbitæ semen inuerso cacumineposito. Ea cum inaruerint in vsum veniunt cadorum vice ad vina atque alia condenda, quod alio capaciore plus cæteris intumeant, viatoris ferè vasis dicata. Quæ seruantur ad semina, usque ad hyemem in sua vite depedant: deinde in sole siccantur aut fumo, ne semina putrefacta deperant. Sunt & alia cucurbitarum genera peregrina, quas ferunt ab occidentis Indiis asportatas fuisse, vnde, cucurbitæ Indica à multis cognominantur. Hæc magnitudine, figura, colore differunt, omnes tamen ad melopeponum figuram, accedunt. Alia magnæ

CUCURBITA Cam-  
raria, minor.CUCURBITA  
Indica, rotunda.



**CVCURBITA Indica longa.**  
*Cucumis Turcicus, Fuchsij.*



**CVCURBITA**  
*verrucosa.*



& id quidem in muria fit. Sed & in scrobe, opaco in loco arena substrato, scœnôque sicco opertas ac deinde terra, virides seruari tradunt. Hæc Plinius. Hodie Genuenses cucurbitam in longas fascias solerter & ingeniosè dissectam in solatu siccant, totôque anno subdukes & quasi pauxillo saccharo conditas eas fascias seruant,

mentis crassis, angulosis, asperis, & hirsutis, quæ longo reptatu per humum diffunduntur, per-  
 ticitis etiam, & aliis adminiculis innixa perigu-  
 las & attegias scandunt & opacant: flores illis  
 magni, liliorum effigie, aureo colore, fructus  
 autumnò decerpuntur, qui totam hyemem in  
 culinis asservantur, semen includunt magnum,  
 amygdalini nuclei figura, in quo nucleus dul-  
 cis & suavis. Sapor his cucurbitis nō vt nostra-  
 tibus vsque adeo insipidus. Ad hæc genera ad-  
 iunxit Dalechampius cucurbitam verrucosam  
 quæ aliis cucurbitis radice, folio, flore, capreo-  
 lis similis est, fructu differt, qui in aliis laui &  
 plano cortice tegitur, costis tamen in Indicis  
 elatis & eminentibus, in hac verrucarum acro-  
 chordonum modo nodis plurimis tuberosus  
 est, ludentis lasciuientiq; naturæ visendo spe-  
 ctaculo. Præterea cucurbitam laciniatam appel-  
 lauit ille, quam peponis lati nomine descripsit  
 Dodonæus, cuius fructus compressus est, totum

Lib. 5. c. 29.

dus & latus, tenui & molli cortice contextus,  
 in ambitu laciniatus: clypei figuram refert, in-  
 tus semen album continet, cucumeris semini  
 simile, sed maius. Vulgus appellat *des oreilles*.  
 Cucurbita quoque siluestris inuenitur, inquit  
 Plinius, Somphos à Græcis appellata, inanis

Lib. 20. c. 3.

(vnde ei nomen) digitali crassitudine, non nisi  
 in saxosis nascens. Huius commanducatæ suc-  
 cus stomacho admodum prodest. Cucurbitam  
 marinam nonnulli putant esse. A' colocynthi-  
 de, quæ siluestris etiam cucurbita dicitur, lon-  
 gè alia est. Hæc cucurbita somphos Plinij Mo-  
 mordica nostra est peritiorum herbariorum  
 sententia. Cucurbita amat rigua & finum, nec

Locus.

nisi sata prouenit, plurimumque iuuatur hu-  
 more. Quæ tamen sine multa rigatione con-  
 ualuit, fructum iucundioris saporis præbebit.

Tempus.

Copiam aquæ nacta minorem curam deside-  
 rat. In calidioribus locis citius, in frigidioribus  
 tardiùs maturefcit. Cucurbitæ cibus quò lon-  
 giores tenuioresque, eo gratiores auctore Plin-  
 io, & ob id salubriores quæ pendendo creuê-  
 re: minimumque seminis tales habent, duritia

Lib. 19. c. 5.

Uiresc.

Temper.

earum in cibus gratiam terminante. Inuenta est  
 ratio qua cibus quoque seruarentur, eodémque  
 modo cucumis, vsque ad alios penè prouentus,



# HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,

## (CUCURBITA

### Latinate.

L.b.1.Ali.



tanta est calidioris in ea prouincia com-  
moditas, in uisculis edant, libra ferè quinis af-  
sibus venali. Cruda quidem cucurbita insana  
est, vt docet Galenus, stomachumque ledit, &  
concoctu est difficillima: adeo vt si quis alie-  
rius cibi inopia cucurbitam edere coactus fue-  
rit, pòdas frigidum ventriculo incumbere sen-  
tiant stomachumque habeat euersum, ac vom-  
turiat, quo solo vomitu à prementibus sym-  
ptomatis poterit vindicari. Hanc igitur & alia  
fugacium plerique, postquam elisa fuerint, aut  
statim certè, aut in sartagine frixa, aut assa om-  
nes edere consueuerunt. Cucurbita autem cli-  
xa nullam euidentem saporis habet qualitatem.  
Humidum frigidumque, & ob id exiguum cer-  
pori præbet alimentum. Facile autem subsideat  
cum ob substantiæ suæ lubricitatem, tum ob  
communem omnium ciborum humidorum  
rationem, qui scilicet citra adstrictionem suam  
humidi. Ad hæc coquitur non egre, si modo  
prius corrupta non fuerit. Id vero illi accidit,  
cum parata viriose fuerit, aut succus prauus in  
ventriculo fuerit acernatus, interdum autem

quod in ipso diu morata sit, quod aliis quoque omnibus fugacibus quæ humidi  
sunt temperamento solet accidere. Corruptuntur enim in ventriculo ni ce-  
leriter occupent subside. Quemadmodum igitur cucurbita quantum in se  
ipsa est, succum qui in totum corpus alendi gratia distribuitur, habet qualitatem  
sentium ex parte, ita cum alicui eorum quæ acrem, aut salinam habent qualitatem  
mixta fuerit, facile illi assimiletur. Assa autem vel frixa in sartagine, quamplur-  
imum quidem de propria humiditate deponit, reliquum autem ipsius nullam in-  
gnem obtinet facultatem, vt cum nec in iure simplici parata fuerit. Ceterum ob  
aqueam qualitatem sibi innatam merito gaudet origano. Omnia enim eius in  
di succis acerbis, vel acidis, vel austeris, vel salis admiscere postulant, si modo in  
cibo suauias sunt futura, & nauseam non paritura. Quantum verò ad eius in medi-  
cina vsum attinet, Galenus humidæ frigidaq; temperaturæ esse scribit, vtriusque  
qualitate secundi ordinis. Quocirca ramentorum eius succum ad aurium doloris  
cum phlegmone iunctos cum rosaceo vtilem esse. Sic tota quoque calida illita  
lidas phlegmonas mediocriter refrigerat. In esu autem humida est & sicim prope-  
lens. Dioicorides, cucurbita esculenta, inquit, cruda trita illitu tumores & ables-  
sus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam sitia in ve-  
cant in incipiente illinuntur: oculorum inflammationes podagraque refrigerant.  
Succus è ramentis tufis per se, aut cum rosaceo infusus aurium doloribus auxili-  
tur: adustiones cutis in ardente febre illitu adiuuat. Totius seruefactæ & expre-  
ssæ succus cū melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucur-  
bitam recentem excavatam infusum, si mistum sub dio teneatur, potum aluum  
mitigabit. Quæ postrema sententia cum Græcè legatur, καὶ εἴ τις κοιλίας ἀλγος  
ᾧ οὐκ ἐγγυῖα τε οἶνον, καὶ ἐξ αἰθέρος, κεράσις τε πρὶν νῆψις, καλὰ τῆς τῆν κοιλίας κόπας, con-  
uertenda fuit, Si quis autem in ipsam crudam excavatam vinum infuderit, & sub  
dio reliquerit, ac temperatū ipsum ieiunus biberit, aluum molliet leuiter. Verū  
vbi vulgares codices habent πρὶν νῆψις legitur in vetere codice δὲ πρὶν, hoc est  
bibendum

Lib. 7. sim.

Lib. 1. c. 127.



bibendum perrexerit. Plinius eadem quæ Dioscorides, & plura remedia ex Cucurbita describit. Cucurbitæ sativæ rasæ succus tepetactus auribus medetur. Caro eius interior sine semine clavis pedum, & suppurationibus, quæ Græci vocant apostemata. Decoctæ autem vniuersæ succus dentium motus stabilit, & dolores inhibet. Vinum cum ea feruefactum oculorum etiam impetus. Folia eius cum recentibus cupressi contusa & imposita ipsa quoque tosta in argilla, ac trita cum adipe anseris vulneribus medentur. Nec non ramentis corticis recētes podagras refrigerat, & ardores capitis, infantium maximè. Et ignes sacros vel strigmentis his impositis, vel seminibus. Succus ex strigmentis illitus cum rosaceo & aceto febrium ardores refrigerat. Aridæ cinis impositus mirè combusta sanat. Chrysippus medicus eas damnabat in cibis. Sed omnium cōsensu stomacho vtilissimæ iudicantur, & interaneorū vesicarumq; exulcerationibus. Quos itaque Plinius dixit capitis ardores & maximè infantium, Dioscorides σφελῶσι παιδίοις habet: σφελῶσι verò παιδία sunt pueri, quos inflammatio partium circa cerebrum & membranas eius vexat: ita enim Paulus scribit: Σφελῶσις ἐστὶ φλεγμὴ τῶν περὶ τὸν ἐγκέφαλον ἔμφυτος μωρίων. Et mox ipse Cucurbitæ ramenta ad siriafes præscribit. Plinius alibi adustionem infantium siriasim vocat. Osibus in canino fimo inuentis adustio infantium, quæ vocatur siriasis, adalligatis emendatur. Et alibi infantium destillationes, folia, inquit, infantium destillationibus, quod siriasin vocant, illita medentur. Aliquando simpliciter Græco verbo utitur, ut siriasis infantium spongia frigida cerebro humefacto, rana inuersa alligata efficacissimè sanat, quam aridam inueniri affirmant. His modis Plinius siriasin reddidit. Strigmenta verò eadem quæ ramenta idem vocat Dioscorides ξύσμαθα, & ea succo febrium ardores refrigerare tradit, quod Dioscorides ait: πρὸς καυσσολύην ἐπιράσαν ἐγγυρόμηνος ὡφέλεται, idest, adustiones cutis in ardente febre illitu adiuvat. Vel ut vertit Cornarius, Cuti summæ à febris ardore, ac æstu vexatæ illitus prodest.

Lib. 20. c. 3.

Lib. 1. c. 13.

Lib. 30. c. 1.

Li. 22. c. 21.

Li. 32. ca. 10.

CUCUMER SATI VVS. CAP. XXX.

**Κ**ΥΚΣ, & σίκυος ἡμερος, & σίκυον Græcis, Cucumis & Cucumer Latinis dicitur, à curuore, ut Varroni placet, quasi Curuimer. Demetrius auctore Athenæo, σικύος dictos esse ait ἀπὸ τοῦ σίκυος, ἔκφυ, idest, quod veneremur, cum contra veneri refragentur. Inde prouerbium fuisse commemorat Athenæus, τὸν σίκυον τρώγῃσαι γυνή, τὴν χλοῖαν ὕφαρε, idest, texens palliū mulier cucumerem deuoret. Cum enim textrices magna ex parte, si Aristoteli creditur, sint impudicæ, ut in iis veneris impetus refrenetur, adagium edendos cucumeres textricibus consulebat: nam venereorū auariciam inhibere tradidit Diphilus. Quare καὶ ἀνίσφρασσιν nomen impositum ei fuit. At potius σίκυοι dicuntur ἀπὸ τοῦ σίκυος, ἔκφυ, quod ad gignendos, spargendos, diffundendos ramos caulesq; valdè incitentur, non quod veneremur stimulent. Matron suis carminibus terræ filium Cucumerem nominauit. Heraclides Tarētinus Hedygeon, quasi terræ suauitatem. Recentiores Græci Cucumeres ἀγέμα vocarunt. Symeon Sethi, ἀγέμα τὰ λεγόμενα σίκυα, καὶ κοινὴν ἢ τετραγέμα. Anguria Cucumeres dicuntur, communi sermone tetragura, Arabes Chathe, Chetha vocant, Itali Cocomero, Hetrusci Cedruolo, quasi Citrulum, Germani Cucumern, Hispani Cogombro, Galli Concombre. Est Cucumis sativus, est & siluestris. Cucumerum Græci tria genera fecere, inquit Plinius ex Theophrasto, Laconicum, Scytalicum, Bæoticum. Ex his tantum Laconicum aqua gaudere. Cucumerem Dioscorides, ut vulgaris notitiæ plantam nō descripsit, sed nec aliorum veterum vllus suis notis nobis illum representauit. Quare dubitatur à multis an Cucumeris nostratis vires capite huic dicato expouerit Dioscorides, an verò

Nomina

Lib. 3. deipno.

Athenæibi.

Genera.

Li. 19. c. 1. Lib. 7. h. 1. cap. 4.

Li. 2. c. 128.



vulgaris angurix. Sed Dioscoridem ceterosq; Græcos *σίκυος* nomine Cucumerē, Gallorum *Concombre*, intellexisse veris coniecturis assecutus videtur Matthiolus. Scribit enim Dioscorides Cucumerem siluestrem fructu solo à satiuo differre, cū foliis, floribus, sarmentis satiuum prorsus referat. Quibus omnibus cum hic illi prorsus similis sit, nemini dubium esse debet Dioscoridem de Cucumeris nostri vulgaris, non de angurix viribus hoc capite tractasse. His accedit Plinij auctoritas ita scribentis. Cucumeres crescunt qua coguntur forma, in Italia virides, & quàm minimi, in provinciis quàm maximi, & citrini aut nigri. Placent copiosissimi Africæ, grādissimi Mœsiæ. Viunt hausti in stomacho in posterum diem, nec perfici queunt in cibis, non insalubres tamen plurimū. Quæ de Cucumere nostro verissimè dici possunt, minimè verò de anguria. Nam angurix in Italia in magnam excrescunt molem, ac cum aqueæ sint substantiæ, ac prædulces cum maturæ fuerint, facilè à ventriculo descendunt, quod Cucumeribus nostris nō euenit, qui cum frigido glutinosoq; sint succo, ob id concoctu contumaces, non nisi longo tempore labuntur. Præterea Cucumeres eodem auctore, in fistula flore demisso, mira longitudine crescunt: quod in Cucumeribus nostris certa experientia compertum habemus. E quorum semine qui postea sunt orti, eandem retinuerūt formam, ut in vite sua pendentes longi, & anguium modo contorti spectentur. Ad hæc natura oleum odere mirè, ut idem scripsit: nec minùs aquas diliguunt. Deiecti quoque ad eas modice distantes adrepunt: contra oleum refugiunt: aut si quid obstat vel si pendeant, curuantur: idq; vel vna nocte deprehenditur, si vas cū aqua subiiciatur, quatuor digitos descendantibus ante posterū diem: at si oleum eodem modo sit, in hamos curuatis: quod anguriis, quæ globi instar rotundæ semper sunt, euenire non potest. Cucumis satiuus igitur & esculentus viticulis, longis, asperis per terram repit, in quibus folia scabra, & quadamtenus rotunda, capreoliq; Flores in pallido lutei: fructus longus, cartilaginei generis, tuberculis maculosus, initio viridis, postremo luteus: semen intus cādium, latum. Huius species est Cucumis anguinus Columellæ: foliis, floribus, sarmentorum reptatu superiori similis: fructu dissimili, longo tres pedes, atque etiam amplius, angusto, leuiter striato, è viridi nigricante, anguē figura imitante. Quo fit, ut vel hoc genus sit à vulgari Cucumere diuersum, vel fructu vulgaris in fistulam demisso, & ad eam longitudinem extento, semen inde exemptum seruatumq; talem Cucumin gignat. Cucumis feritur in hortis: aprica loca amat: hyemem odit & frigora. Particulatim autem floret, ut scribit Plinius, sibi ipse superflorescens, & sicciore locos patitur, candida lanugine obductus, magisq; cum crescit. Mira voluptate Tiberio Principi expetitus, ut refert Plinius, nullo quippe non die contigit ei, pensiles eorum hortos promouentibus in solē rotis olitoribus, rursusq; hybernis diebus intra

Forma.

## CUCUMIS Satiuus.



Locus.

Tempus.

Lib. 19. c. 5.

Ibidem.


Lib. 3. cauf.  
ca. 12.

specularium munimenta reuocantibus. Quin lacte & mulso semine eorum macerato, apud antiquos Græciæ auctores scriptum est feri oportere, ut dulciores fiant. Sic apud Theophrastum, Τὰ τῶν σικύων σπέρματα γάλακτι βρεχόμενα καὶ μελιερρόφ γλυκύσσιν



CUCUMIS Longus.

CUCUMIS Angurus.



γλυσκίς ποσει. Id est, Cucumerum semina lacte & melicrato si macerentur, eos  
 dulciores efficiunt. Inuenta est ratio, inquit Plinius, qua cibis seruarentur Cucur-  
 bita & Cucumis, vsque ad alios prouentus: & id quidem in muria fit. Sed & scrobe  
 opaco in loco arena substrato, fenoq; sicco opertos, ac deinde terra, virides serua-  
 ri tradunt. Salgamarj hodie sale, aceto, feniculo, sampsucho condiunt. Alij trita  
 sinapi cum aceto. Cucumeres, vt tradit Galenus, vrinam quidem, vt & pepones  
 cient, sed minus quam illi, quod ipsorum substantia minus est humida, ideoq; non  
 facile, vt illi, in ventriculo corrumpuntur. Inuenias autem qui ipsos bellè conco-  
 quant. Qui autem eo ipso fisi affatim sese impleuerunt, tandem longo tempore  
 succum frigidum ac mediocriter crassum in venis coaceruant, qui in ea conco-  
 ctione quæ in venis fit haud facile mutationem in probum sanguinem recipit.  
 Quam ob causam omnibus prauis eduliis abstinendum, etiam si ea quibusdam  
 concoctu sint facilia. Nobis enim non aduertentibus prauus succus ex ipsis post  
 longum tempus in venis colligitur, qui postea exiguum ad occasionē putredinem  
 nactus, febres malignas accendit. Et alio in loco. Cucumis esculentus maturus  
 quidem tenuioris essentia est, immaturus autem crassioris. Sed & abstergerendi &  
 incidendi facultas eis inest. Quare & vrinam mouent, & corpus splendidum red-  
 dunt ac magis quoque si quis semine arefacto contusoq; atque cribrato vice pul-  
 ueris absterforij vtatur. Superat in eis frigida humidaq; temperies, non tamen  
 magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen, aut  
 radicem arefaciat, haud etiam humida fuerit naturæ, sed iam desiccantis: idq; in  
 primo quodammodo ordine, aut etiam secundo, sed incipiente. Est & in istis ma-  
 ior abstergerendi facultas, quam in fructus ipsius carne. Quibus consentanea sunt  
 quæ de eodem Dioscorides tradidit. Satiuus Cucumis aluo & stomacho perquam  
 utilis habetur: refrigerat, corruptionem non sentit. Vesicæ prodest, olfactu reuo-  
 cat quos animus liquerit: semen modicè vrinam mouet: cum lacte aut passo vesicæ  
 vlcerationibus subuenit. Illita cum vino folia morsus canum sanant, & epinycti-  
 das cum melle. Hac Dioscorides, Quorum initium paulo aliter conuertri debuit.  
 Sic enim

Ibidem.

Li. 2. Alim.

Vires.

Temper.

Li. 3. simpl.

Li. 2. c. 128.



Sic enim Græcè habetur, *Σίκυς ἡμερὸς Διοκίδιος, ἀπομαχὸς, ὑπερλινὸς & φθιπέμερος*. Id est, Cucumis sativus aluum lenit, ventriculo est gratus, refrigerat si nō corrumpatur. Quæ postrema ideo adiecit Dioscorides, quod si Cucumis in ventriculo corrumpatur, biliosum & acrem humorem, atque inde ardentissimas gignit febres, ut eo non modo non refrigeretur corpus, sed etiam exuratur. Id quod Galenus docet cum aliis locis, tum libro de Euchy. & Cacochy. his verbis. Sunt autem inter fructus Cucumeres, & Pepones, & Melopepones. Sed qui à bonitate succi tantum absunt, ut nisi celeriter transeant, in ventre corrupti succum ex ea corruptione faciant mortiferis venenis proximum. Horum probatissimorum auctorum sententiæ ut assentiuntur omnes, ad stipulante ipsa etiam experientia, ita Diphili Carysij opinio reprehensione digna, qui apud Athenæum Cucumerem noxium damnauit primis mensis, ut qui raphani modo sursum feratur, ultimo cibo innocentiores esse, concoctusq; faciliorem, alioqui vsum eius abdicauit. At contra cum prauus sit succi, ante alios omnes cibos sumendus, ut facilius per aluum subeat, nec in eo corrumpatur, quod facile ei eueniet, si aliis cibis postremus ingeratur. Addidit his quæ vera sunt, urinas eo cieri, refrigerandi vim habere, difficile in corpus distribui, ægrè per ventris anfractus euadere. Quinetiam horrores conciliare, bilem creare, venerem arcere. Plenilunio maximè gliscunt in hortis Cucumeres, manifestumq; capessunt incrementum, & more marinorum echinorum implentur, ut tradit Athenæus, quod est aquei humoris incrementum. Sunt qui herba, quæ vocatur Culix nomine, trita, semen eorum macerari iubent, ut sine semine nascantur, vel prius eorum semina Sesamino oleo perungi. A mulis Cucumeres expetuntur, capiunturque mira eorum voluptate, nec non odorem emittunt sentiunt. Quare munienda sunt Cucumeraria, ne irrumpentes ea depopulentur, ac proterant.

PEPONES, MELOPEPONES. (CAP. XXX.

Lib. 19. c. 5



Nomina

Li. 2. Alim.

Prob. sc.

20. quæst.

32.

Genera

VNT etiam Cucumerum species Pepones: & horum Melopepones. Plinius tradit Cucumeres cum magnitudine excessere Pepones vocari. Ecce, inquit, cum maximè noua forma eorū in Campania prouenit, mali cotonei effigie. Forte primo natum ita audio, vñu mox semine ex illo genus factum, Melopepones vocant. Non pendent hi, sed humi rotundantur. Mirum in his præter figuram, coloremq; & odorem, quod maturitatē adepti, quamquam non pendentes, statim à pediculo recedunt. Ex quibus verbis intelligere licet Pepones in genere cucumerum esse, & Melopepones in genere Peponu: quos Palladius Melones appellat, à mali Cydonij figura, quā referunt nomine cōposito Melopepones appellatos. A Peponibus autem differunt, quod Pepones maiores sunt, magis striati, magisq; succulenti, sed minùs grati, carne molliore, & semine pauciore, oblonga figura, ut cucumeris, Melopepones globosa. Πέπων igitur Græcis, inquit Galenus, τὸ μέπων, hoc est maturum significat, quod omnibus aliis fructibus maturis conuenit. Sed peculiarem fructum hoc nomine appellarunt, quomodo atramentum quo scribimus μέλαν, id est, nigrum. Quare medici non simpliciter fructum hunc nominare voluerunt Pepona, sed σικυπέπων, id est, Peponem cucumeralem. Aristoteli σίκυος πέπων dicitur, & Polluci. Quinetiam ἀσπερδίας. de quo Dioscorides, Galenus, & Plinius seorsum à cucumeribus & Melopeponibus tractarunt, Gallis *Pepon*, & *Poupom* dicitur. Eius permulta sunt genera, quæ sapore, figura & colore distinguuntur. Est enim ventricosus Pepon, qui à pediculo ad umbilicum vsque striatus & canaliculatus est. Alius quam fœminam vocant, minùs striatus. Quidam totum corticem textura quadam reticulari



culari, miro naturæ artificio conspersam habent. Aliquorum fructus grandis est, humani capitis instar, aliquando etiam maior, nonnullorum longè minor. Sunt qui herbaceo sunt colore, alij flauo, alij pallido, nonnulli cinereo. Interior quoque palpa varia: in quibusdam enim rubet, in aliis albicat, in nonnullis ex albo rufescit. In quibusdam dulcis, & gustui suauissima, in aliis insuavis & insipida. Sunt item qui Hircini, & vulgò Turciei dicuntur. Melo pepones etiam varij sunt, nunc magni, nunc mali Cydonij figura & magnitudine. Horum caro interdum candida est, interdum flaua, quandoque pallidior, aliquando solidior, aliquando laxior. Præferuntur candidi, solidi, ac sic dulces, vt saccharo conditi videantur, quos ideo Saccharatos vocant, Galli *Succrins* & *Succredes* vocant. Præterea quibusdam semine pulpa firmissimè inhaeret, vt cultelli mucrone particulatim euellendum sit, aliis in medulla humida semen iacet, quæ concussio fructu separatur sponte, ac decedit à reliqua pulpa disuncta. Sunt præterea qui olitorum mangonio rosarum & moschi odorem spirant, seminibus qua parte germinat parum per apertis, & aqua rosacea quæ moschum exceperit, maceratis. Est genus quoddam hybernium, quod in area non maturefcit, sed flauescit laquearibus appensum, magnaq; voluptate hyeme comeditur. Hoc Hetrusci melle saccharove condiunt citrei pomi modo. At citrulus & anguria Peponum etiam species sunt. Hæc omnia Peponum Melo peponumq; genera forliciter in Gallia proueniunt. Pepo longis ac viticulosis sarmentis & hirsutis per terram reptat cucumeris modo. Folia profert vitis similia, non tam profundis incisuris diuisa, scabra, hirsuta, & iuxta hæc capreolos quibus vicinis sese alligat: flores magnos, luteos: fructum magnum, crassum, rotundum,

Forma.

PEPO.

MELOPEPO.



ea varietate quam diximus distinctum: in quo semen includitur, latum candidum semine Cucumeris maius. Melo pepo similibus viticulis per terram reptat, sed minoribus, folijs etiam similibus, sed minoribus, nec tam altè incis: floribus itidem similibus & luteis: fructu minore, rotundo, varioq; vt diximus, semine itè minore. Ex multis qui ex eadè planta nascuntur fructibus pauci sunt qui bonitate excellant, ceteri



Tempus.  
Li. 2. c. 128.  
Vires &  
Temper.

Li. 2. c. 127.

Embl. 121.  
lib. 2.

Lib. 204. 2.

Embl. 121. li.  
2. Diosco.

Li. 2. Alim.

cateri sunt insuaues. Odor suauior, crassior pediculus, pondusq; bonitatis sunt indicia. Gaudent lato & aprico solo ac libero, quò possint latius euagari. Rigatione gaudent si pluuia defecerint. Cum verò maturefcere cœperint, pluuia iis aduersissima sunt, ab iisq; insipidi, & gustui insuaues redduntur. Calidior loco & astate citius, frigidior tardius maturantur. Peponis caro, vt tradit Dioscorides, in cibis vrinam citius inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra siriā sincipiti imponuntur: fronti admota oculorum fluxiones auertūt. Succus cum semine adiecta farina siccatus in sole, cogitur in smegmata, quæ faciē repurgant, & nitorem adferunt. Radix sicca, & ex hydromelite pota drachmæ pondere vomitionem mouet. Si quispiam moderatè secundum cœnam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illita cum melle vlcera, quæ ceria vocant. In his quæ interpretes & rectè quidem transtulit. Ramenta eius contra siriā sincipiti imponuntur, in vulgatis exemplaribus leguntur, τὸ δὲ βρέγμα αἰσὶ σιελῶσι παιδίοις & τὸ βρέγμα ἰσὶ ἐπιθῆναι, videtur βρέγμα mendosè pro ξέσμα positū fuisse, sicut ipse etiam Dioscorides de cucurbita dixit, τὸ δὲ ξέσμα αἰσὶ παιδίοις σιελῶσι ἀπελθῆναι & τὸ βρέγμα ἰσὶ ἐπιθῆναι. Id est ramenta eius infantibus siriā vexatis sincipiti vtiliter admoventur. Cornarius tamen vocis βρέγμα lectionem non improbat, & significare videtur, inquit, sinciput, & apicem, ac summam Peponis partem, quæ recisa eum vsū præbeat, quem cucurbitæ ξέσμα, id est, ramentum. Eadem ferè à Plinio traduntur. Pepones qui vocantur, refrigerant maximè in cibo, & emolliunt alium. Caro eorum epiphoris oculorum, aut doloribus imponitur. Radix sanat vlcera in modum faui, quæ ceria vocant. Eadem contra vomitiones siccatur, & in farinam tusa datur quatuor obolis in aqua mulsā, ita vt qui biberit, quingētos postea passus ambulet. Hæc farina & in smegmata adiicitur. Cortex quoque vomitionem mouet, faciem purgat. Hæc Plinius. Qui, nisi mendosi sint codices, Dioscoridi & Galeno planè aduersatur, cum dixit radicem contra vomitiones siccari, vt legendum putet Hermolaus. Eadem contrahit vomitiones: siccatur, & in farinam, &c. Cornarius legit, Eadem ad vomitiones siccatur, &c. quam emendationem perspicuè approbat sequens Plinianæ orationis contextus. Quod verò dicit radicis farinam in smegmate addi, an de eadem Dioscorides intelligat cum scribit succum cum semine admixtum, ad farinam siccatum in sole cogi ad smegmata, dubitari sanè potest. Nam etsi radici eandem quam Plinius vomitiones concitandi vim tribuat Dioscorides, nulla tamen adhuc radicis mentione facta, eius farinam qui potuit intelligere? At cum ad eum vsque locū de Peponis carne tantum tractarit Dioscorides, cum etiam hæc Galeno abstergendi vi prædita sit, magisq; semen ipsius, eius carnis exsiccata farina hoc loco accipienda videtur, vel τὸ ἀλφρον simpliciter farina aliqua vulgaris vt triticea, vel hordeacea, quæ si non ad abstergendū, certè ad pastillorum formam effingendam, succo & semini admisceatur, eaq; forma illa excipiat. Galenus aperte naturam Peponum, & Melo-peponum expresit his verbis. Vniuersa Peponum natura frigidior est cum humiditate copiosa: habent autem vim quandam abstergendi, cuius beneficio vrinam cient, & deorsum expeditius quàm cucurbita, Melo-peponesve permeant. Quod porro abstergeant intelliges, si sordidam cutem ipsis fricueris. Quamobrè si quis maculas à sole contractas, aut lentes in facie habeat, aut alphas, hos quoque deterget. Semen autem potentiùs deterget, quàm ipsorum veluti caro, adeò vt aduersus renes calculo infestatos conueniat. Succum autem in corpore gignit caro vitiosum, idq; potissimum cum concocta probè non fuerit. Quo casu cholera morbo obnoxios efficere consuevit. Quinetiam priusquàm corrupta fuerit, ad vomitiones quoq; est idonea, largiusq; sumpta (nisi quis post ipsum aliquid eorū quæ probi sunt succi supermandat) omnino vomitum excitabit. Hæc Galenus de Peponibus



Peponibus, qui quod radici Peponis tribuerunt Dioscorides & Plinius, ipsius Peponis carni adscripsit. De Melopeponibus verò sic. Melopepones minùs quàm Pepones sunt humidi, nec adeò prauis sunt succi, minùs item vrinæ mouent, tardiusq; deorsum descendunt. Ad vomitum præterea excitandum, non tantùm quantum Pepones habent momenti. Sicut nec celeriter adeò, vt illi, in ventriculo corumpuntur, quum prauus humor in eo collectus fuerit, aut alia quæpiam corruptionis causa ipsum prehenderit. Cæterùm etsi in iuuando stomacho, autumnalibus fructibus longè sint inferiores, haudquaquam tamen ei vt Pepones, sunt noxij: neque enim vomitum, vt illi, excitant. Huc accedit quod in Peponibus homines à carne intima, in qua semen habetur, abstinere: in Melopeponibus autem mandunt, idq; ipsis ad deiectionem confert. Qui verò eorum quasi carne tantùm vescuntur, non tam cito eam ac Peponum excernunt. Ex Melopeponibus in particulas scētis, ari, bryoniæq; radicibus, & limonum succo, ac caprino lacte quod hæc omnia superet additis, aqua vitreis organis, vt vocant, destillatur, qua faciem mulieres adornant, & concinnam reddunt. Seminibus Melopeponum & Peponum cremor febrientibus vtiliter ex hordeacea pituita propinatur, non solum enim refrigerat, sitimq; extinguit, sed etiam obstructions tum hepatis, tum vasorū expedit, & vrinam prouocat. Datur tussientibus, tabidis, & marasmo affectis: atque etiam contra vrinæ ardore valde prodest, additis pastillis ex halicacabo, aut glycyrrhizæ succo, manna, gummi arabici, aut tragacanthæ momento. Sed & magis confert, si seminum papaueris cremor accedat, baccarumq; halicacabi, & maluæ decoctum. Peponis siue cucumeris species est, qui Citrus medicis dicitur, quasi Citreolus, quod Citrei mali in forma & colore sit æmulus, Gallis *Citrouille*, Italis *Anguria*, Auicennæ *Batheca*. Andr. Bellunensis in expositione nominum Arabicorum, *Melon abrachi*, inquit, est *Melon Indus*, idest, Anguria communis, quæ apud Arabes quondòque appellatur *Batheca Inda*, quondòque *Batheca viridis*, quondòque *Batheca filistin*, quondòque *Batheca alzachi*. Est & *Batheca*, seu *Batheca* nomen commune ad omnes species Melonū, & Anguriarum. Serapio cum de Peponibus & Melopeponibus ex Galeni sententia dixisset, peculiare de anguria caput subiicit, quam Arabicè *Dullaha* nominat. In cuius historia & viribus exponendis cum nulla Græcorum, sed Arabū duntaxat testimonia proferat, facile intellectu est angurias veteribus Græcis penitus fuisse ignotas. Eam ob causam eos hallucinari qui Pepones angurias esse arbitrati sunt: item Fuchsum qui Cucumerem quem primo loco descripsimus, Anguriam esse dixit. Anguria itaque folia fert colocynthidis, maiora, aspera, per ambitum diuisa, alarum seu pennarum instar: caulem sarmentosum, humi repentem sicuti Cucumis & Pepo: florem luteum. Fructum edit magnitudine insigni, rotundum, grauē, cortice læui connectum, herbaceo, maculoso, & qua parte humi iacet albicante. Carne constat humida, aquosa, in aliis insipida, in nonnullis subacida. Semen in ea concluditur latum, Peponum semine duplo maius, cortice solidiore, & nucleo grandiore in quibusdam nigrum, in aliis rubrū. Fructus

Matthi. in lib. 2. Diosc. ca. 128.

ANGURIA, Citrus  
Officinarum.



In Hist. pl. ca. 266.  
Forma.



*Temper.*

etiam immaturus in aceruo tritici diutius asseruatur, illicq; maturefcit. Frigidus & humidus est ordine secundo, siti arcenda maxime conueniens. Quare Itali ardente furio eius pulpa sese reficiunt: ardentibus febribus, maximeq; lingue ariditati confert: acres humores reprimat, iisq; præsertim febrientibus auxiliatur, qui humorum malignitate potius vexantur, quam copia grauantur. Nam anguria, vt Serapioni placet, aluum initio non valenter citat: quare illis conuenit qui tenues & imbecilles, macriq; sunt, ac exangues: quibusque alterantia potius humores quam euacuantia sunt ex vfu. Quod quamuis acidis effici possit, inaspida tamen, & dulcedine quadam prædita, qualis est anguria, ad id longè sunt aptiora. Etenim acida incidunt & attenuant, quæ cum maciem augeant, & ventriculum lædant, imbecilli corpori, macro & exangui sunt noxia. Quod si acida sint & adstringentia, exsiccat, nihilq; prorsus humectant. Inaspida verò quæ crassa sunt substantia, & quibus dulcedo aliqua, vt anguriæ inest, humectant simul & refrigerant, generantque sanguinem aquosum, qui flauæ bilis feruorem coërcet & extinguit, tam in hepate, quam in venis. Anguria in calidis regionibus suauior provenit. Ideoq; circa Romam, in Campania, in Apulia, Calabria, Sicilia præstantior habetur, & mole vallior. Semine ex Asia misso Anguriæ Lugduni prouenerunt, ex-

PEPO MAXIMVS INDICVS, Lobel.



terna quidè specie similes aliis, sed carne rubra, & gustu tam dulci, vt aspersæ conditæve saccharo videantur. Est Pepo alius fructu rotundo quadatenus compresso, Melonis effigie, caulibus & foliis hirsutis vulgaris, flore luteo, simili, semine minore albo. His addendus ex Lobellio Pepo maximus Indicus compressus, magnitudine à superioribus discrepans. Fructus interdum octoginta libras pendet: & folia rotundiora.

MELONGENA.

CAP. XXXI.

Li. 2. c. 445.  
*Nomina*

Lib. 4. c. 71.  
Dioscor.  
Lib. 3. c. 84.

Li. 2. c. 124.

Li. 1. de pl.  
*Genera*

*Forma*

**M**ELONGENA scriptum est in codice Auicennæ, & Arabicū nomen est. Itali Poma, corrupto nomine *Melanzanas* vocant, Ligures *Melanzanas*, Hetruscis, teste Matthiolo, *Petranciani* dicuntur, Dodonæo nomine Hispanico *Veranzenes*, Germanis *Melanzan*, & *Dollopsfil*, id est, poma furoris, Gallis *Pommes d'amour*. Quidam suspicantur Mandragoram marem esse Theophrasti. Cur autem Poma amoris appellentur à nostris, haud scio, inquit Ruellius, nisi quod fortasse elegantia & perpulchra placeant, & ita digna quæ amentur. Sunt tamen & alia Poma amoris, vt infra dicetur. Melanzanas mala insana minus sano iudicio vocat Hermolaus, inquit Scaliger: esitata namque nullos excitant furores: quotidianis bellariis vtuntur Genuenses, Melongena quadam poma fert purpurea, alia in flauo candicantia, siue pallida, sed cæteris omnibus partibus similia: caulem erigit vnicum, semicubitalem, aliquando etiam cubitalem, crassitudine minimi digiti, solidum, lignosumq; teretem, ramosum, subpurpureum, hirsutum. Folia fert lata, fusca, maiori folano haud absimilia, sed subaspera, hirsuta, parum



## MELONGENA.



parum & inæqualiter sinuata, in mucronem desinentia. Secus quæ breues, rubentes & hirsuti oriuntur pediculi, & in his singuli aculeati calices, ex quibus singuli item nascuntur flores subpurpurei, aliquando candicantes, in acuminata, & rugosa foliola stellæ modo diuisi, in quorum medio quinque sunt erecta lutei coloris stamina, in medio vno eminente apice. Floribus subnascuntur fructus oblongi, cucumeris ferè magnitudine, plerumq; rubentes, aliquando etiã flauis, & candicâtes, leuissimo cōtecti cortice, succosa, rara, & albicâte intus pulpa: semine numerofo, paruo, siliqua tri amulo. Radicibus nititur numerosis, in fibras ceu capillamenta distributis. Seritur in hortis & viridariis ineunte vere. Floret æstate, & autûno fert fructum. Planta est frigoris impatiens. Brasauolus & Fuchsius, Hermolaum reprehendunt, quod putarit Melongenam tertiam esse Mandragoræ speciem, quam Morion vocant, cum scribit. De Morio Mandragora nihil habeo quod addi possit iis, quæ à Dioscoride no-

Locus.

Tempus.

Coroll. ca.

79. lib. 4.

Dioscor.

tantur. Sed quoniam mala terrestria & canina Mandragoræ fructus appellantur, in mentem subeunt quæ vulgò *Melanzana* vocitamus, hoc est, vt ipse puto, mala insana: de quibus nihil à veteribus scriptum fuisse desino iam mirari, quod multa huiusmodi reperio: sicut hercle multa quondam fuere, quæ modo vel ignorantur, vel certè non habentur. Mala ergo insana è frutice vulgari sunt passim nascente, vt Pepones, melones, & cucurbitæ, pari quoque cultu, foliis propè ficulneis: flore oblongo, specioso, candido. Manditur vulgò pomum ex oleo, sale, pipere, fungorum modo coctum. Hæc Hermolaus: Ex quibus nemo sanæ mentis colligat, mala insana Morij mandragoræ fructus esse. Melongena vetus auctore Aucenna, noxia est, recens melior. In ea calidam temperiem superare, & siccam esse secundo ordine, ex amarore & acrimonia calligit. Melancholiam gignit, cancrum, lepram, hæmorrhoidas, panos, dolorem capitis, & fetorem oris. Obstructiones hepatis & lienis efficit, nisi cum aceto cocta fuerit, colorem corporis foedum, atrum & citrinum, vt mirum sit Auerroëm mala insana commendasse suo quodam modo parata. Fuchsius in his malis haud dubiè, vt in cucumere esculento aut fungo frigidam & humidam temperiem superare scribit. Hodie mala insana elixa, cortice exuta, & in particulas secta, deinde farina aspersa, oleo, aut butyro in parellis frigunt, mensiq; apponunt, sale & pipere condientes: sunt enim gustui non ingrata. Alij vbi paulum inferbuerunt igni, in orbiculos vel taleolas digerunt, & in acetariis ex oleo, vel pipere & aceti momento mandunt. Salgamarij in muria acida seruant, cibo per hyemem & ver ori non ingrato, sed tamen qui ægrius coquatur. Sunt qui his malis vescuntur ad venerem excitandam. Quod fortasse præstare possunt, quod cum concoctu difficilia sunt, flatus pariunt.

Li. 2. ca. 15.

Vires.

Tempus.

Li. 1. ca. 1.

ca. 201.



HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
POMVM AMORIS, SIVE AVREVM.  
CAP. XXXII.

Nomina



EREGRINA quoque est, & à superiore diuersa hæc planta, quæ fructum fert Pomum Amoris nuncupatum, à quibusdam Pomum aureum, Italicè *Pomi d'oro*, Gallicè *Pomme d'amour*, & *Pomme d'or*, Germanicè *Goleppfel*. Planta hæc caulem producit rotundum pallidum, hirsutum, ternum quaternumve pedum altitudine, ramosum: folia magna, profundius incisa: ex breuibus pediculis flores luteos, quinos senosve simul, quibus succedunt

POMA AVREA.



Locus.

Tempus.

Poma orbiculata, melopeponum modo striata, colore primùm viridi, deinde per maturitatem in quibusdam plantis aureo, in quibusdam rubro. Multò accuratius depinxit & descripsit Dodonæus lib. 3. purgam. Caules, inquit, habet rotundos, bicubitales & ampliores, multis alis ramosos, succi plenos, facile collabentes, foliis luxuriat multis, multipliciter dissectis, agrimoniam ferè modo: flosculi lutei sub foliis prodeunt: excipiunt hos fructus rotundi, profundis crenis striati, mediocris mali magnitudine, per maturitatem aut pulchri è rubentes, aut auri luteo colore relucetes, & sine striis, in quibus copiosa humens medulla succi instar, qua semen coditur. Tota herba grauem fœtidumq; odorem spirat, è viridi colore inalbicat, & aliquantulum hirsuta est. Facile in hortis sata prouenit. Rigatione gaudet & solo pingui. Iulio & Augusto mensibus floret: Autumno fructus perfrigit: Hæc Mala aurea cum vniuersa planta refrigerant, aliquanto tamen minùs quàm mandragora: quare noxius est ipsius vsus. Poma tamen à nonnullis cum pipere, sale & oleo præparata & cocta eduntur. Præbent autem corpori alimentum quidem perexiguum; & hoc ipsum prauum ac vitiosum. Quidam Lycopersum esse putant memoratum à Galeno in lib. simpl. Alij Glaucium Dioscoridis.

STRAMONIA.

CAP. XXXIII.

Nomina



STR etiam externa hæc planta quæ Italis *Stramonium*, & *Stramonium* dicitur, & *Pomum spinosum*, Turcis *Tatoula*, Græcis hodiè *Paracoccalon*, siue *Barycocalon*, idest, nux grauans, siue torporem & somnum inducens, quibusdam Corona regis, Venetis *Melospinus*, Gallis *Pommes du Perou*, Germanis *Sack oppffel*, & *Rauch oppffel*. Cordo Hyoscyamus Perunianus.

In hist. pl. ca. 264.

Lib. 3. c. 86.

Li. 4. Dios.

ca. 62.

Li. 3. Diosc.

ca. 141.

Fuchsius stramoniam à nonnullis inter solani species numerari scribit, non quod descriptioni respondeat, sed quod eius folia opij odorem referre videantur. Flores huius herbæ, inquit, suauem lilij odorem spirant. Videtur viribus parum à posterioribus generibus solani differre. Dodonæus Stramoniam sui generis plantam describit. Marthiolus priore commentariorum in Dioscoridem editione idem planè, quod Fuchsius de Stramoniam literis mandauit. Secunda verò editione priore mutata sententiâ nucem Methel, Stramonij fructum esse cæterâ auctoritate



## STRAMONIA.



auctoritate fretus, qui scribit nucem Methel stupefaciendi vi præditam esse, & similem nuci vomicæ, cortice crassis & breuibus aculeis armato: semine mandragoræ, vt legit Matthiolum, vt ego, citri semini simili. Sic Stramonix fructus nucis imaginem refert, aculeis crassis, & breuibus riget, semen mandragoræ semini simile habet. Nec dubium quin fructus ipse atque tota planta soporiferæ sit facultatis. Id quod plantæ facies solano non absimilis, odorq; illius grauis apertè videtur indicare, vt etiam libro de peregrinis dicemus. Gesnerusq; Stramoniam Fuchsi núc, Methel Auicennæ esse putat, & mādregoris annumerandā videri posse hanc plantā, aut sui generis potius esse, quā solani. His assentiri videtur Andr. Bellunenſis, & nihil aliud nucis Methel nomine describere, quàm Stramonix fructum, his ferè verbis. Nux Methel, inquit, ex sententia Ebeubitar, atque omnium Physicorum Syriorū, & Ægyptiorum fructus est cuiusdam plantæ magnitudine & foliis melōgenæ similis: vnde & à qui-

In Hort.  
Germ.

buisdam Arabibus Berbengine nominatur, idest, Melongenæ similis. Flos huic est albus, magnus, oblongus. Fructus nux Methel nuncupatus, est veluti nux aspera, cortice spinoso, intus semina habet. Pomi mandragoræ seminibus similia, dulcia, pinguia. Hoc fructu pharmacopœi & physici Orientales ad stupefaciendū vtuntur, & nucem Methel esse affirmant, quia facultatibus iis præditus sit, quas nuci Methel Auicenna attribuit, eosdem effectus habere experientia ipsa doceat. Stramoniam igitur, siue nux Methel caulem emittit rotundum, binos fere pedes altum, folia habet cineritia, solano ferè similia, sed maiora præsertim ea quæ radici propiora sunt: flores albos, rotundos, cauos, campanæ fere effigie, lilij odore: fructus rotundos pomi instar, virides spinis vndique stipatos, intus melongenæ modo seminibus confertos. Non nisi in herbariorum hortis reperitur. Stramoniam auctore Auicenna, stupefacit, cerebro noxia est, cordi aduersatur. Carum adfert, drachmæ sexta pars sumpta inebriat, drachma vna eadem die interimit.

Forma.

Vires.

## BALSAMINA.

## CAP. XXXIIII.

**B**ALSAMINE siue Balsamina, aliis Momordica, Venetis & Patauinis *Charantia* dicitur, Hetruscis *Pomum Hierosolymitanum*, Italis quibusdam *Viticella*, Gallis Pomū mirabile, *Pōme de merueille*, Cordus Cucumin puniceum vocat. Lobellius Balsaminā cucumerinam puniceā. Balsamina veteribus incognita, planta est, nisi sit cucurbita somphos Plinij, vt supra monuimus, quæ tenuibus prælongisque, & angulosis flagellis vltro citroque reptantibus euagatur: foliis vitis, aut bryoniæ, sed minoribus, & per ambitum profundius incisus, tactu aspectuque glabris & mollibus. Capreolos prope singula folia producit intortos, quibus vicinis adminiculis sese illigat, & ea comprehendens ascendit. Flores edit cucumeri similes, subluteos, quosdam steriles, quosdam fecundos. Steriles pauca, breuia, luteaque stamina in medio habent, sed nullum post se tuberculum, quod secuturi fructus principium sit.

Nomina

Lib. i. plan.

ca. iii.

Forma.



## BALSAMINA,

Matth.



Locus.

Tempus.

Dodon. li.

1618.

Viresc.

Temper.

Matth. in

li. 4. Diosc.

c. 177.

lorésque mulcendos, ad exulceratos inflammatosque uteros siphone injectum. Iidem fructus doloribus hæmorrhoidum mirè auxiliantur, oleo amygdalino

## BALSAMINVM,

seu Balsamina femina,

Matthiol.




Balsaminū

Forma.

Fœcundi terna reflexa, biindaque stamina in medio habent, & post se oblongum capitulum futuri fructus rudimentum, quod dilapsis florum foliolis paulatim in fructum excrefcit oblongum, figura plerumque ouatum, siue vtrunque turbinatum, cute carnosâ, tuberosâ, aculeis rigente. Huic maturo color est puniceus, & vltimam maturitatem adeptus facile rumpitur ac disilit, grauidamque aluum feminibus ostendit, anguriæ similibus, sed minoribus, cortice crasso, duro, pingui & lubrico, ac valde rubente contactis. Radice nititur, minimo digito graciliore, in fibras desinente. Nusquam nisi lata & diligenter culta in hortis prouenit, nec citius fructum maturat quam ineunte Autumno, siue Augusto & Septembri mensibus. Balsaminæ poma ordine primo calida, sicca secundo esse quidam affirmant. Hæc diu in oleo omphacino insolantur, aut in balneo aquæ calidæ, aut in fimo equino calido macerantur. Ex quibus oleum exprimitur præstantissimum ad vulnere, & mammarum inflammationes inhibendas, doloresque mulcendos, ad exulceratos inflammatosque uteros siphone injectum. Iidem fructus doloribus hæmorrhoidum mirè auxiliantur, oleo amygdalino dulci, aut oleo ex semine lini expresso macerati vt diximus, additis ad singulas olei libras, singulis liquidæ vernicis vnciis. Idem tam igne quam feruente aqua ambustis medetur. Punctis faucibusque neruis viliter illinitur. Vulnere cicatrices attenuat, atque etiam delet. Scribunt recentiores quidam steriles mulieres fœcundas reddi, si a balneo ex iis, quæ ad vterum conferunt parato, eodem oleo vteri osculum perunxerint, deinde cum viris concubuerint. Ramicosis pueris confert eodem locum affectum sæpius inungi. Idem aiunt foliorum puluerem cochlearis mensura ex plantaginis siue equiseti decocto, intestinorum vulnera sanare. Sunt & qui eundem puluerem ad coli dolores, & intestinorum tormina valde commendant. Est & alia planta Balsamine quoque dicta, & Balsamella, sed à superiore planè diuersa, Itali Balsaminum genere neutro vocant, Dodonaus Balsaminam fœminam, vt superiorem marem, absurdè, cum toto genere differant. Lobellius & Pena etiam Balsaminam fœminam persicifoliam. Caulem cubito altiore à radice mittit, rubentem vt in portulaca, inferius circa terrâ, qua manere implere



## BALSAMINA, Fuch.



implere possit crassitudine, superius minimo digito multo graciliorem, cui ab inferiore parte usque ad summum undique cubitum longi, crassi & recti adnascuntur rami. li. & caulis, læues sunt. Pingui, carnosâ, succosâq; substantia constant, ut portulacæ caules, sed multò robustiores sunt. Pinguiâ & molliâ totam herbam vestiunt folia, salicis vel tenuifoliæ lauri foliis similia, leuiter per ambitum serrata. Flores sunt venusti, magni, in rufo purpurei, purpureis violis non dissimiles, sed multò maiores, à tergo breuem apicem, & incuruam caudam ferentes, quamuis in anteriore etiam parte longiorem apicem gerant, ex singulis floribus singula capitula prodeunt, hirsuta, in quibus milio æqualia sunt semina, nigra, aliquantulum aspera. Radicibus fulcitur crassis & robustis, à quibus numerosæ aliæ tenues, & pingues descendunt.

## CAPSICVM.

## CAP. XXXV.

**A**RECENTIORIBVS planta hîc depicta Piper Indicum, Piper Calcuthium, Bresilicum, & Piper Hispanum nominatur, Gallicè *Poivre d'Inde*, & *Poivre d'Espagne*. Auicennæ zingiber Caninum quibusdam videtur esse, Dodonæo Actuarij Capsicum. Est Fuchsijsententia siquastrum Plinij, à siliquis nimirum magnis & oblongis, quas producit sic dictum. Quæ & piperitis ab eo dicitur, quod semen eius Piperis sapore & acrimonia sit, diuersa tamen ab ea quæ ab herbariis vulgò piperitis nominatur. Plinius, Castor inquit, Siliquastrum demonstrabat caule rubro & longo, densis geniculis, foliis lauri: femine albo, tenui, gustu Piperis. Et alio in loco Panax Piperis saporem reddit, & magis etiam siliquastrum, ob id piperitidis nomine accepto. Hanc piperitidē Fuchsius in quatuor distinxit genera. Est enim, inquit, maius & minus siliquastrum. Maius siliquas producit maiores, & colore subnigras, aut fuscas. Minus cōtrâ minores profert, & colore puniceas. Tertium longissimas, & colore puniceas. Quantum verò latiores, multoque breuiores producit siliquas. Dodonæus in tria diuisit siliquarū magnitudine & figura distincta. Primum siliquas mediocriter longas & crassas habet, Capsicum appellat, alterum longas & angustas, unde Capsicum oblongum dictum. Tertium breues, latas & rotundas, & Capsicum latum nominat. Cætera in his omnibus non valde dissimilia sunt. Piperitis caulem emittit cubitalem, aut etiam longiorem, minimi digiti crassitudine, in angulos striatum, viridem, & circa foliorum ramorumque exortus in purpureo nigricantem, intus ceu sambuci medulla farctum. Habet oblonga folia initio lata, dein in mucronem fastigiata, media lauri & solani foliorum similitudine. Flores ex ramulorum alis erumpunt candidi, quinque senisve foliolis stellæ modo dispositi constantes, paucis in medio staminibus, quibus dilapsis rotunda, & sine commissura ex caliculis succrescunt vascula siue siliquæ, ea quæ iam à nobis dicta est longitudine & latitudine, principio viridia, cum maturuerunt subnigra aut fusca

## Nomina

Fuchf. cap. 280.

Lib. 5. c. 69. Lib. 19. c. 20

Lib. 20. c. 27 Lib. 19. c. 19.

Ibid.

## Genera.

Ibid.

## Forma.



*CAPSICVM* mains &  
minus, seu Piper maior &  
minor. Matth.

Locus.  
Tempus.  
Vires &  
Temper.




in primo genere, in reliquis punicea, siue coralli expoliti instar rubefcentia atque pellucida, quæ aperta plurima in flauo candida, compressa, & lenti similia semina, sed tenuiora ostendunt. Radices habet numerosas, tenues, & in minimas fibras diuisas. Caulis, flores, & radices nullam insignem qualitatem habent. Vascula cum seminibus, & quod carnosum in medio est, acerrimo sapore linguam vellicant, & odorata sunt. In hortis ac in fictilibus testaceisque passim prouenit. Aestate floret, decedente flore filiquæ nascuntur. Aliud Capsicum ex Dalechamptio his adiciamus, rotundum scilicet & striatum. Id nascitur in hortis, radice in plurimas exiles fibras diuisa, subluteas, caule cubitali, ac interdum proceriore, virgato, è viridi nigrescente, ramoso, foliis in ambitu laciniatis, ad pediculum latioribus, in extremo acuminatis, superne virentibus, inferne albicantibus, flore paruo, breuib; pediculis nixo, foliolis sex albis constante, in medio luteo, fructu rotundo, rimis profundioribus fisso, rubro, pusillis granis farcto, subflauis, gustu acri. Vis eadem quæ & cæterorum generum. Exotica planta est, &

non nisi magna cum diligentia semine terræ credito prouenit. Lobellius ad Solana refert, & Solanum pomiferum Herbariorum vocat, Vulgò Piper de Gui-

*CAPSICVM* Latum,  
Dodonæi.




*CAPSICVM* Oblongius,  
Dodonæi.



ncæ





nequaquam minime vr̃at. His addendum Capsicum Brasilianum, quod Clusius  
 obseruauit in nonnullis Lusitaniae locis, fruticosum, cubitalibus ramis, virentibus,  
 foliis hortensis solani ferè, aliquantulum angustioribus: flore candido, exiguo, vt  
 solani hortensis: fructu in longis pediculis, paruo, initio viridi, deinde nigrican-  
 te, vt maturuit, rubro, quo clauduntur multa semina latiuscula, alterius Capsici  
 modo, tam feruidi gustu, vt fauces aliquot dies incendat gustatum, fleret & fru-  
 ctum profert toto autumnino, & in calidioribus regionibus etiam hyeme. Illi vo-  
 cant *Pimenta de Bresil*, hoc est piper Brasilianum, in qua prouincia copiosè na-  
 scitur, & multiplici in vsu est. Hæc Clusius. Valenter excalfacit atque desiccet,  
 inquit Fuchsius, id quod seminis insignis acrimonia, & foliorum amaritudo eui-  
 dentissimè monstrant, vt certè non temerè plerique hoc semine loco veri pipe-  
 ris vtantur, vt quod easdem facultates haud dubiè habeat. Dodonæus hoc pi-  
 per Indicum calidum siccumque esse ordine tertio, eadèmq; quæ Fuchsius de  
 eius viribus tradidit, quibus addit eo cibos quibus miscetur, croceo colore infi-  
 ci, ventriculum excalfieri, ciborum coctionem promoueri, strumas, cætera-  
 que œdemata discuti, eodem cum melle illito maculas faciei lentiginèsque de-  
 leri, frequentem tamen eius vsum noxium esse, quod malefica quadam vi eâ-  
 que occulta præditum sit, qua canes, si id comederint, interimit. Piperi-  
 tis, inquit Plinius, quam & siliquastrum appellamus, contra morbos comitia-  
 les bibitur: utilis gingiuis, dentibus, oris suauitati & ructibus. Auicenna zin-  
 giber caninum, canes interficere scribit: calidum esse ordine secundo; siccum  
 primo, recens cum semine tritum cutis & faciei maculas lentèsque abstergere,  
 duros tumores digerere.

Lib. 5. c. 69.

Lib. 20. c. 17

L. b. 2. c. 748

RHAPH



## Nomina

Lib. 2.



Ῥαφανός & Ῥαφανίς Græcis, & Ῥαφάνη, Homero, Latinis raphanus, radix & radícula dicitur. Raphanus ἀπὸ τῆς ῤα φαίνεσθαι auctore Athenæo, id est, quod facillè appareat, sibi nomen asciuit: nam tertio à satù die profilit. Radicis vocabulum, ut auctor est Varro, è Græcia venit in Latium, cum veteres Græci radicem dixerint, quam nunc raphanum. Nisi quis forsitan arbitretur nomen accepisse, quod ceteras amplitudine superet, vel quam paucissimis magnitudine cedat. Etenim plerumque in tantam molem accrescit,

Lib. 19. c. 5.

ut frigidis locis quibus gaudet, sicut in Germania, Plinio teste, infantium puorum magnitudinem æquet. Id quod etiam hodie in Thuringis, & ad Erfordiam videre licet. Est etiam attendendum aliam esse herbam, quæ simpliciter radícula dicitur, Græcis struthium, & à raphano plurimum distat. Præterea Aristotelem, Theophrastum, & alios veteres Ῥαφανόν, non ἀπὸ Ῥαφανίδος, sed ἀπὸ Ῥαφάνους id est, non pro radice, sed pro brassica usurpasse, quæ res Pliniū adeo fecellit, ut radicem cum brassica confuderit, ut cum de brassica ageremus demonstratum fuit, & infra demonstrabitur. Raphanus ab Arabibus nominatur *fugel*, siue *figiel*, ab Italis *Raphano*, & *Radice*, à Germanis *Rettich*, ab Hispanis *Rauano*, & *Rauanillo* à Gallis *Reisfort*, id est, radix fortis, hoc est, acris. Dioscorides duo raphani genera facit.

## Genera.

Lib. 2. c. 106

Vñ est Ῥαφανὶς ἡμεῖρος, raphanus sativus, alterū Ῥαφανὶς ἀγρία, raphanus silvestris. Latini Armoraciam, siue Armoracium vocant, hodièque Romani antiquam raphani silvestris appellationem retinentes, raphanum sativum primæ literæ metathesi Ramoraciam vocant. Theophrastus in plura genera raphanum distribuit. Distinguunt hæc, inquit, foliis, radicibus, coloribus, succis, atque aliis huiusmodi, ut radicis genera Corinthium, Cleonæum, Liothalassium, Bæotium. Corinthia maximè adolescit, quæ radicem habet nudam: nam sursum versus protruditur non ut cetera deorsum. Liothalassia, quam nonnulli Thraciam vocant, aduersus frigora validissima. Bæotia dulcissima est, & figura rotunda, nō ut Cleonæa, longa.

Lib. 2.

Athenæus Theophrasti locū hunc citat his verbis. Ἡ Ῥαφανὶς ἐν τοῖς περὶ φυτῶν, γένη Ῥαφανίδων φησὶν εἶναι πέντε, κορινθίαν, λιοθαλασσίαν, κλεοναίαν, ἀμωρέαν, βαιωτίαν, &c. Id est, Theophrastus in libris de plantis, raphanidōn genera quinque esse dicit, Corinthiam, Liothalassiam, Cleonæam, Amorheam, Bæotiam, &c. Pergit Theophrastus. Quarum autem lævia folia sunt, ea dulciores, & suaviores sunt, quorum autem aspera, aciores. Præterea genus est quoddam, cui folium est erucæ simile. Hæc de radice Theophrastus. Quæ transtulit Plinius. Sed quæ ille περὶ Ῥαφανίδος scripsit, eadem hic de napis tradidit. Idem naporum genera, inquit, quinque fecere, Corinthium, Cleonæum, Liothasion (non Liothalassium, ut in vulgatis Theophrasti exemplaribus exaratum est), Bæotiū, & quod per se viride dixerunt. Ex iis in amplitudinem adolescit Corinthium, nuda ferè radice. Solum enim hoc genus supernè tendit, non ut cetera in terram. Liothasion quidam Thracium appellant, frigori patientissimum. Ab eo Bæoticum dulce est, rotunditate etiam breui notabile, neque ut Cleonæum prælongum. In totum quidem quorum tenuiora folia ipsi quoque dulciores, quorum scabra & angulosa, & horrida, amariore. Est præterea genus silvestre, cuius folia sunt erucæ similia. Hæc ex Theophrasto Plinius, ex quibus perspicuū est ipsum raphanidas Theophrasti naps esse existimasse. Sicut autem raphanidem pro naps hic agnōuit, ita mox eodem loco raphani genera recensens his verbis, Genera raphani Græci fecere tria, foliorū differentia, crispī, atque lævis, & tertium silvestre, raphanum pro brassica à Theophrasto usurpatum, raphanidem Dioscoridis, & eum quem hodie raphanum & radicem appellamus, esse putavit, sicut capite de brassica docuimus. Mox Plinius eodem


Lib. 19. c. 5.

Lib. 19. c. 5.



dem loco rectè de raphano radice hæc tradit. Nostri alia fecere genera. Algidense à loco, longum atque translucidum. Alterum rapi figura, quod vocant Syriacum, suavisimum ferè ac tenerimum, hyemis quoque patiens. Præcipuum tamen est, quod è Syria non pridem aduectum apparet, quoniam apud auctores non reperitur: id autem tota hyeme durat. Etiamnum


*RHAPHANVS sativus,*  
*Matthiol.*



vnum silvestre Græci agrion vocant, Pontici armon, alij leucon, nostri armoraciam, fronde copiosius quàm corpore. In omnibus autem probandis maxime spectantur caules. Immittunt enim rotundiores, crassioresque ac longius canalibus, folia ipsa tristiora, & angulis horrida. Raphanus sativus foliis est magnis, latis, scabris multum laciniatis, napo similibus: caulibus rotundis: floribus candicantibus: siliquis tumentibus, in mucronem desinentibus, in quibus semen concluditur rufum, aut fuscum, acre. Huic raphano pro vario genere cultus: radix est varia, huic longa, alba, teres, tenera, fragilis, translucida, nec admodum acris, illi crassa, napi penè figura, durior, acrior, gustui ingratior. Raphanus secundus Matthioli est Raphanus minor purpureus Lobellij & Pene, qui multis hortis Italiæ præsertim, rubello colore colitur & editur, ut minor, sic suavior, minus acris, lautiorque ex aqua salita excitandæ appetentiæ gratia, idque prima mensa. Raphanus silvestris habet folia satiuo similia, sed minora,

*Forma.*

*RHAPHANVS secundus,*  
*Matthiol.*



*RHAPHANVS silvest.*  
*Dodonæi.*



& ma



*RHAPHANVS purpureus*  
*minor, Lobel.*In hist. pl.  
cap. 255.

Lib. 2. c. 106

*RHAPHANVS Rusticus,*  
*Matthiol.*Dodo. lib.  
5. cap. 37.In libr. 2.  
Diosc. cap.  
186.  
Embl. 101.  
lib. 2.*Locus.*

apocopen facta sit. Crescit circa margines itinerum, & in locis arenosis, nonnumquam etiam in pratis. In Germania hodie feritur, & edomita feritate mitescit, meliorque fit. Mense Aprili exoritur, Iunio floret. Rhabanus sativus in hortis feritur. Seri autem vult auctore Plinio terra soluta, humida, finum odii, palea contentus.

& magis incisa: caulem pede altiore, flores luteos, siliquas parvas, in quibus semen minutum admodum includitur, radicem multo minorem, acriorem, ut mendosum Dioscoridis codicem esse necesse sit, in quo habetur, ἡ δὲ ἰχθυή, μαλακή, ὑπὸ δὲ λευκός. Id est, interprete Roellio, radix gracilis, tenera, subacris. Quare legendum esse ex vetere codice censet Lacuna, non μαλακή, sed μακρά, id est, longa. Est enim radix silvestris multo durior atque strigosior quam sativa. Præterea longior, gustuque magis feruente. Fuchsius pro silvestri raphano siue armoracia plantam eam depinxit, quæ vulgò raphanus rusticus, siue raphanus magnus, siue montanus nominatur, παρὰ τὴν ἀγροίαν. Gallis *Reiffort sauvage*, Germanis *Merrettich*, fortasse tamen hac appellatione, tum acri admodum huius plantæ sapore in eam sententiam inductus. Quæ multum à vero abesse, Matthiolo & plerisque doctis herbariis videtur. Nam raphanus silvestris folia raphano sativo similia habet teste Dioscoride, raphanus rusticus folia habet multo maiora, latiora, hippolapathosimilia, grandiora tamen & asperiora: caules teneros, breues, graciles, in quorum summitate oriuntur candidi flosculi, deinde siliquæ parvæ in quibus semen. Radix longa est, crassa, gustatu acerrima & valde linguam vellicans. Hæc planta, præsertim radix calida siccaque est tertio ferè ordine, quæ vniuersa ferè Germania & Pannonia ad carniū & piscium intinctus & condimenta sinapi vice vtuntur. Recentiores, inquit Cordus, raphano adscripserunt acrem istam radicem, quam Germani *Merrettich* appellant, & ea vtuntur supradicti raphani loco, sed malè: nullum enim ex veteribus auctorem habent, qui *Merrettich* raphani speciem esse indicarit, quam plantam ipse Cordus maius thlaspi esse indicauit, quod Arabes nasturtium album appellarunt. Cornarius quoque armoracium alium raphanum esse iudicat ab eo, qui per Germaniam plerisque omnibus raphanus silvestris esse creditur, nimirum is quem officinæ raphanum maiorem, & Germani *Mherrettich*, quasi maiore vi præditam radicem vocant: nisi hæc appellatio ex armoracio per



tentus. Rhabbanus siluestris in fossarum aggeribus, & locis aliis vliginosis prouenit. Eundem etiam satium in Italia esse Plinius tradit. Cum enim loco iam citato rhabbanum siluestem armoraciam vocari dixisset, aliquanto post de eodem rhabbano siluestri ait. Est & satiui vsus in Italia, & armoraciam vocant, de siluestri armoracia non de satiua intelligens, quæ in Italia feritur, & ferendo mitescit: quem admodum hodie in Germania rusticus rhabbanus vt diximus, in hortos transfertur. Rhabbanus satius vere & æstate feritur, quare æstate & hyeme colligi potest, estq; illius vsus quotidianus. Quæ autem sint eius vires, Dioscorides declarat his fere verbis, quæ rectius fortasse conuerti possunt quàm Ruellius verterit. Rhabbanus excalfacit, flatus gignit, ori suavis est, ventriculo non acceptus: ructus mouet, vrinam cit, aluum facilem reddit. Si quis ipsum à cibo sumpserit, distributioni eius vtilior erit, præsumptus autem cibum attollit siue subleuat. Prodest etiam vomituris datus ante cibum, sensus exacuit, decoctus cōtra veterem tussim, & crassitudinem in pectore natam prodest. Cortex eius cum oxymelite sumptus potentiùs vomitiones citat: hydropicis vtilis, ad motus cataplasmatibus modo lienosis confert. Cum melle nomas sistit, fugillata tollit. Contra viperarum ictus auxiliatur, alopecias pilis explet, lentigines cum loliacea farina exterit. His qui à fungis strangulantur tam cibo quàm potu salutaris est, menses trahit, semen eius vomitum proritat, vrinamque mouet. Cum aceto potum lienem extenuat. Coctum cum oxymelite calido angina laborantibus vtiliter gargarizatur. Contra cerasitis morsum potum ex vino auxilio est. Cum aceto illitum gangrenas validissimè emarginat. Siluestris rhabbani tam folia quàm radix olerum modo in cibo coquuntur. Excalfacit autem, vrinam cit, æstuosus est. Plinius quæ sequuntur rectè de rhabbano tradit. Cortice & cartilagine constant rhabbani: multisq; eorum cortex crassior etiam quàm quibusdam arborum. Amaritudo plurima illi est, & pro crassitudine corticis. Cætera quoque aliquando lignosa. Et vis mira colligendi spiritum, laxandi q; ructum. Ob id cibus illiberalis: vtique si proximè olus mandatur: si verò cum oliuis drupis, rarior ructus fit, minùsque fœtidus. Aegypto mirè celebratur propter olei fertilitatem, quod è semine eius faciunt. Hoc maximè cupiunt ferere, si liceat: quoniam & quæstus plus quàm à frumeto, & minus tributis est, nullumq; copiosius oleum. Sed quod paulo post subiungit, Odium his cum vite maximum, refugitq; iuxta factos, ad brassicam pertinere non ad rhabbanum capite de brassica fusiùs ostendimus. Vsum verò eius in medicina eodem loco attingit, vbi ait. Crudos suadent medici ad colligenda acria viscerum dandos cum sale ieiunis esse, atque ita vomitionibus præparant meatum. Tradunt & præcordiis necessarium hunc succum: quãdo phthisim cordi intus in hærentem non alio potuisse depelli compertum sit in Aegypto, regibus corpora mortuorum ad scrutandos morbos infecantibus. Et alio in loco eadem prolixiùs exponit. Rhabbani satiui decocti mane poti ad ternos cyathos comminuunt & eiiciunt calculos. Iidem in posca decocti contra serpentium morsus illinuntur. Ad tussim etiam manè ieiunis rhabbanus prodest cum melle. Semen eorum tostum, ipsùmq; commanducatum ad lagonoponon. Aquam foliis eius decoctis bibere, vel succum ipsius cyathis binis contra phthisias: phlegmonis ipsos illinere tussos, liuori verò recenti corticem cum melle: veteriosis autem quàm acerrimos mandere, semenq; tostum, dein contritum cum melle suspiriosis. Iidem & contra venena profunt. Cæterò & scorpionibus aduersatur, vel ipso, vel semine infectis manibus impunè tractantibus, impositioque rhabbano scorpiones moriuntur. Salutares & contra fungorum, aut hyoscyami venena æquè, vt Nicander tradit. Et contra viscum quoque dari Apollodori duo iubent, sed Citieus semen ex aqua tritum, Tarentinus succum. Lienem autem extenuant. Iocinori profunt, & lumborum doloribus. Hydropicis quoque ex aceto, aut

Tempus.

Vires.

Temper.

Lib. 2. c. 106

Lib. 19. c. 5.

Lib. 20. c. 1.



sinapi sumpti, & lethargicis. Praxagoras & iliosif dādos censet, Plistonicius & celiacis. Intestinorum vlcera sanant, ac puralenta præcordiorū, si cum melle edantur. Quidam ad hæc coquere eos in luto illitas malunt, sic & feminas purgari. Ex aceto & melle sumpti intestinorum animalia detrahunt. Item ad tertias decocto eorum cum vino, enterocelis profunt, sanguinem quoq; inutilem sic extrahunt. Medius ad hæc & sanguinē excreantibus coctos dari iubet: & puerperis ad lactis copiam augendam. Hippocrates capitis mulierum defluuia fricari raphanis, & super umbilicum imponi contra tormenta vuluæ. Reducunt & cicatricem ad colorem. Semen quoq; ex aqua impositum sistit vlcera, quæ phagedænas vocāt. Democritus venerem hoc cibo stimulari putat, ob id fortassis voci nocere aliqui tradiderunt, folia quæ in oblongis duntaxat nascuntur, excitare oculorum aciem dicuntur. Vbi verò acrior raphani medicina admota sit, hyssopum dari prociuis imperant. Hæc antipathia est. At aurium grauitati succum raphani instillant. Nā vomituris summo cibo esse eos vtilissimū est. Siluestris raphanus vtilior vrinæ duntaxat ciendæ. Non est hic silentio prætereundum longè diuersam plantam esse, quæ raphanus agria, id est, raphanus siluestris Plinio dicitur, quæ est Apio ischas. Quod verò Plinius priore loco dixit, cum sale ieiunis dandos esse, atque ita vomitionibus præparari meatum, Dioscorides habet, præsumptus eleuat cibum. Quare etiam vomituris præsumptus cōmodus est. Quod autem Dioscorides ait, Si quis ipsum à cibo sumat, ad distributionem conferre, hoc Galenus refellit his verbis. Mirari subit eos medicos, atque idiotas, qui post cœnam coctionis iuuandę gratia crudos raphanos esitant, ipsi quidem hanc rem experientia satis sibi exploratam esse affirmant, qui tamē ipsos sunt imitari, omnes læsi fuerunt. At posteriore loco Plinius sibi ipse repugnat, cum scribit, nam vomituris summo cibo esse eos vtilissimum, cum priore dixisset, ieiunis cum sale dandos esse, atq; ita vomitionibus præparari meatum. Sed Galenum audiamus de raphano tum vt cibo, tum vt medicamēto loquentem. Urbani, inquit, homines solam radiculam crudam vt plurimum ante alios cibos cum garo alui deiiciendę gratia mandunt, quidam autem aceti quidpiam admiscunt. Rustici verò cum pane sæ penumero vescuntur, vt aliis obsoniis quæ sua sponte proueniunt. Radiculæ autem caulem etiam ac folia mandunt, sed coacti potius quàm voluntarij. Radix autem ex iis est quibus assidue vescimur, estq; obsonium magis quàm alimentum: nimirum quæ & ipsa cum manifesta calfactione attenuadi habet facultatem. Nam qualitas acris in ipsa superat. Vere autē caulem quēdam, qui in altum assurgit, gignere consuevit, quemadmodum & alia omnia quæ caulem sunt productura, quem caulem elixantes mandunt cum oleo & garo & cum aceto, vt rapæ caulem, ac sinapi, & lactucæ, nutritq; magis caulis iste, quàm cruda radícula, vt qui in aqua acrimoniā omnem ponat: paucissimum tamen & ipse habet alimentum. Quidam autem non caulem modò, sed & radículas ipsas elixantes mandunt, non aliter ac rapa. Et alio in loco, Raphanus excalfacit quidem ordine tertio, deficcatur verò secundo. Agrestis autem in vtroque efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est, facultas ei inest digerēdi. Itaque ad sugillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem accōmoda existit. Hæc Galenus. Recens minutim incisa radix, vt scribit Matthiolus, albo meraco conspersa, & in sartagine calfacta, pubiq; admota, suppressam vrinam euocat. Idem præstat eiusdem succus duarum vnciarum pondere ex vino Cretico haustus. Corticis vncia cū mercurialis pari pondere, croci granis quatuor, pulueris cassiæ odorata drachma, succi sabine drachmis duabus, omnibus simul in mortario confusis tenuissimo linteolo exceptis, vteriq; ceruici admotis, ægrè parturientibus mirifice subuenit. Eiusdem radices succus cum oleo dulciū aut amararum amygdalarū, & vini albi & colocynthidis momento aurium sonitus tollit, si calidus instilletur.

RAPVM.





QVÆ γογγύλη & γογγυλῖς Græcis, Latinis Rapum & Rapa dicitur, unde deminutum nomen apud Horatium rapulum, Arabibus *Seliem*, *Seligem*, siue *Alfegiem*. Italicè *Rapo*, Germanicè *Ruebem*, Hispanicè *Nabo redondo*, Gallicè *Rabe*, & *Naueaurond*, Græci γογγύλης aut γογγυλῖδος vocabulum à figura quæ plerumque rotunda esse solet, detorserunt: nam quod in rotunditatem circumactum est γόγγυλον, hoc est τρύγγυλον dixerunt. Et Hippocrates gongyli vocabulum pro globulis orbiculisve qui deuorantur, quasi catapotiiis vsurpauit. Rapa verò quod ex terre rure, quasi ruapa Varrone teste nominata est. Alij quod pascim rapiatur rapī nomen inditum esse putant. A' Græcis tamen manasse id nomen facile videri potest, qui raphyn & raphyn auctore Athenæo dicunt. Lib. 9. Rapas Lacedemonios γαστέρας id est, ventres vocare Apollas apud eundem Athenæum tradidit. Sed Nicæder Colophonius γαστέρας à Bæotis brassicas intelligi, rapas verò Zaceltidas appellari voluit. Amerias & Timachides non rapas, sed cucurbitas ita dici arbitrantur. A' rapo rapina Gallis *Rabiere*, & Rapitium desectitur, unde rapitios caules dixit Cato. Rapi genera duo sunt Dioscoridis sententia, rapum satiuum & siluestre. Plinius aliter ea distinxit. Genera eorum, inquit, Græci duo prima fecere, masculum, femininumque, & ea ferendi modo ex eodem semine. Denflore enim satū masculoscere, item in terra difficili. Semen præstantius quò subtilius. Species verò omnium tres. Aut enim in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari. Tertiam speciem siluestrem appellauere, in longitudinem radice procurrente, raphani similitudine, & folio anguloso scabroque. Apud Athenæum legimus Theophrasto duo esse raporum genera, matrem & feminam, & ambo ex eodem semine nasci. Hæc autem sunt Theophrasti ea de re verba. Γογγυλῖδος ὁ οἱ ἴδιον φασὶν εἶναι, οἱ δ' ὅτι φασὶν, ἀλλὰ τῷ ἄρρενι, καὶ τῇ θηλειᾷ διαφέρειν. γίνεσθαι δ' ἐκ τοῦ αὐτοῦ σπέρματος ἀμφω, πρὸς δ' τὸ ἀποθληῦσθαι, πηγνύσκειν δὲ ἑλκυσματὶ. ἐὰν γὰρ πυκνὰς, πῶσας ἀπορρῶσθαι, τὸν ἀντὶν δ' τρύπον καὶ ἐν γῇ μοχθηρὰ σπαρῶσι. Rapi genera quidem esse alij aiunt, alij negant, sed mare & femina differre, nasci autem ambo ex eodem semine. Vt autem feminae fiant, rariùs feri oportet, si densius, omnes masculoscere aiunt. Eodem modo si in vitiosa terra seueris. Quæ repetit Plinius his verbis. De rapis abundè dixisse poteramus videri, nisi medici masculini sexus facerent in his rotunda: latiora verò concaua, & feminini, præstantiora suauitate, & ad condendum faciliora: quæ sæpius sata transeunt in marem. Tria igitur sunt rapi genera quæ nos agnoscimus, & habemus, rapum latum, siue masculum, rapum rotundum, siue feminam, tertium siluestre. Rapum satiuum profert initio folia magna, lata, aspera, profundius in lateribus incisa, raphano similia. Deinde caulem erigit, in quo flores oriuntur parui, lutei, hinc siliquæ paruæ fuscum semen includentes, quibus floribus, siliquis, & seminibus brassicæ rapum valde simile est. Radice est crassa, candida, & tanta, vt vidisse sese affirmer Plinius Rapa quadraginta libras excedentia, & Matthiolus innumera, quæ triginta libras penderent, & centum quibusdam in locis, permagno naturæ miraculo, quæ ex tam paruo semine, tribus pene mensibus, tam magnas gignit radices. Idem in Ananiensi agro longa, & colore purpurea sese vidisse ait. Illi orbiculata siue globosa radice, huic teres & oblongior & rapo similior effigie, quæ sola à superiore differt. Rapum siluestre, Dioscoride auctore, in aruis nascitur, frutex est cubitalis, ramosus, læuis in cacumine, folia habet læuia, digitali latitudine, aut maiora, & fructum in siliquis calicularis. Cùmque eorum inuolucra aperiuntur, alia intus siliqua spectatur, quæ quandam capitis speciem præbet, in qua semina paruula concipiuntur, foris nigra, intus alba. Siluestre rapum copiosè nascitur auctore Pena, apud Flandros & Germanos, qui serum,

Nomina  
Lib. 2. Sary. 2

Lib. 9.

Cap. 35.

Genera.

Lib. 18. c. 13.

Lib. 9.

Lib. 7. hist.  
cap. 4.

Lib. 19. c. 5.



Forma.

Lib. 18. c. 13.

In lib. 2.  
Diosc. cap.  
104.  
ibid.

Lib. 2. c. 104



*RAPVM Sativum orbiculatum.**RAPVM Longum.**RAPVM Silvestre.**RAPVNCVLVS Minor. Matth.*

hoc quod folia bubus pabulo cedant. Luxuriat enim tanto foliorum numero, ut  
radix iam non tuberosa aut raposa, sed exilis, nec ventricosa vspiam sit, alioqui fa-  
tina rotunda oblongiori non absumilis, sed discretu facilis, crispior, rugosiorq;  
& vberiore folio. Huius generis est Rapistrum vulgò dictum, Lugdunenlibus Ra-  
pion, passim viarum margines & segetes ornans, præsertim Septentrionalium: flo-  
ribus numerosis, luteis Brassicæ aut Rapi: folia sunt in caulibus sesquicubitalibus  
Rapi



Rapi siluestris, Brassicæ lauore, & virore, non eruca, quæ debentur Erysmo Dioscoridis: radix tenuis, non fibrata, gustu Rapi siluestris, cuius facultates etiam ferè habet, sed vehementiores. Matthiolus Erysimum Dioscoridis fecit, cuius depicta est in Capite 42. sub nomine Irio. Fuchsum secuti herbarij multi, siluestre rapum

In libr. 2.  
Diosc. c. cap  
104.

RAPVNCVLVS

Minor, Dodon



esse putant plantam, quæ vulgò rapunculus, rapunculum & rapontium nominatur. Gallicè *Raiponce*, Germanicè *Rapinzel*, quo in acetariis passim omnes vtuntur. Sed horum sententiæ refragatur Matthiolus, quoniam rapunculi capitula, in quibus semè concluditur, duplicia nõ sunt, nec vlla in eius semine reperitur qualitas, quæ abstergere possit, vt de rapi siluestris semine dicemus. Est autem rapunculus planta cubitalis, primùm folia ferens, oblonga, humi iacètia, initio violis Martiis ferè similia, deinde caules rotundos, duos, in cacumine ramosos, in quibus folia sunt longiora & angustiora. In ramulorum summitate flores edit purpurascètes, in cæruleum inclinantes, qui quatuor foliolis constant. Semen minutum in simplici capitulo continetur, pullo colore. Radix est trium, interdum quatuor digitorum longitudine, crassiuscula, protuberante media ipsius parte, alba, fragilis, tenera, subdulci succo prædita, id quod Dioscorides non prætermisisset, si rapunculus rapum siluestre fuisset. Nascitur in aruis non cultis, in sepibus, & in pratis. Seritur etiam in hortis vt grandiores edat radices, quarum esu plurimi delectantur, eduntur in acetariis & crudæ & coctæ. Dodonæus Fuchsum, opinor, secutus, rapunculum hunc, rapum siluestre minus vocat, & alterum statuit genus, Rapunculum maius scilicet, Gallicè *Grande raiponce*, quod rapum siluestre maius appellat. Id rapunculi genus caules emittit rectos, cauos, in quibus folia primùm latiora oriuntur, deinde angustiora, in quibusdam plantis, quas masculas esse putant, atria macula notata: in caulium cacumine spicè magnæ, flosculis longiusculis confertè, qui antequam dehiscant, corniculis incuruis simillimi sunt, aperti in quatuor foliola angusta diuiduntur, cærulea, vel purpurea, vel cineritia, vel alba. Iis succedunt siliquulæ multæ rotundæ, inter sese iunctæ, rapunculi superioris capitulis, siue caliculis similes, sed minores. Radix est crassa, candida, succosa, figura gustuque superiori proxima. Hanc plantam Dodonæus Alopecuron Theophrasti esse affirmat, qua de re alio magis idoneo loco dicitur. His aliam Rapunculi speciem Dalechampius addit, quam à figura Pyramidalem vocat, quoniam pyramidis instar latior inferne sit, superne angustior. Radicem ea mittit longam, crassam, obliquā, furculosam, & pallidè subluteam, viuacem, vtpote quæ hyemis sæuitiam perferat, & quotannis repullulet: caules multos hominis


Locus.

Lib. 5. c. 35.

Rapunc. genus. 2.

Forma rapunc. maior.

RAPVNCVLVS Maior,  
Dodon.



et, Gallicè *Grande raiponce*, quod rapum siluestre maius appellat. Id rapunculi genus caules emittit rectos, cauos, in quibus folia primùm latiora oriuntur, deinde angustiora, in quibusdam plantis, quas masculas esse putant, atria macula notata: in caulium cacumine spicè magnæ, flosculis longiusculis confertè, qui antequam dehiscant, corniculis incuruis simillimi sunt, aperti in quatuor foliola angusta diuiduntur, cærulea, vel purpurea, vel cineritia, vel alba. Iis succedunt siliquulæ multæ rotundæ, inter sese iunctæ, rapunculi superioris capitulis, siue caliculis similes, sed minores. Radix est crassa, candida, succosa, figura gustuque superiori proxima. Hanc plantam Dodonæus Alopecuron Theophrasti esse affirmat, qua de re alio magis idoneo loco dicitur. His aliam Rapunculi speciem Dalechampius addit, quam à figura Pyramidalem vocat, quoniam pyramidis instar latior inferne sit, superne angustior. Radicem ea mittit longam, crassam, obliquā, furculosam, & pallidè subluteam, viuacem, vtpote quæ hyemis sæuitiam perferat, & quotannis repullulet: caules multos hominis


Ibid.



## PIRAMIDALIS Rapunculi

genus, *Dalechampia*.

Locus.

Tempus.  
Lib. 18. c. 13.Lib. 7. hist.  
cap. 4.

Lib. 18. c. 13.

Lib. 2. c. 104.

Vires &amp;

Temper.

Columellæ palma Nursino agro nascentibus, proxima in Algidonatis. Athenæus & Pollux è Mantinea maximè commendarunt. Alpini quibus rara seges rapa valde vtilia sunt, & necessaria, tam ad hominum alimentum, quàm iumentorum pabulum. Χειμαζομένη δὲ χαίρει καὶ ἀπὸ τῆς γογγυλῆς, inquit Theophrastus, καὶ παρὰ τὴν ὁρίαν αἰμα γλυκαίνεισθαι τε, καὶ τὴν αὐξήσασθαι τὴν ῥίζαν βίπρασθαι, καὶ ὅς ἐστι τὸ πρῶτον. τὰς δὲ ὁρίαν καὶ τὸ ἐν ἑαυτῇ ἐκκαυθεῖται ταχὺ. Quæ sic Plinius transcripsit, frigore dulciora fieri existimantur, & grandiora, tempore in folia exeunt. Quæ æstate seruntur vindicantur ab erucarum iniuria, quæ plerumque tenella folia prorsus erodunt, commissa sationis tempore semini fuligine, aut eodem semine maioris sedi succo per noctem macerato. Id quod Columella experientia sibi comprobatum esse asserit. Rapi cotta radix, inquit Dioscorides, alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, venerem stimulat. Decocto podagræ pernionisque fouentur: contritæ quoque rapo atque imposito iuuantur. Si excauata radici rosaceum cæratum adigatur, & feruente cinere eliquescat, exulceratis pernionibus proficiet. Cimæ eius decoctæ manduntur, & vrinam cient. (Græcè habetur, ὅς ἐστι ἀπὸ τῆς ἀσπαραγῆς βελῶσται ἐσθλὸς, ἐστὶ δὲ διωρητικός. Id est, ipsius asparagus, &c. Plinius cymas dixit, vterque turiones caulis inter folia ex summo rapo emicantes intelligit.) Semē antidotis & theriacis, præsertim quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est (τὸ δὲ σπέρμα ἐστὶ ἀνιδότυον, καὶ θηριακὸν ἀνολύσας ἐσθλόν. Id est, semen antidotis & theriacis, quæ dolores leniendi vim habent, admodum vtile est. Quare Ruellius minus rectè ἀνολύσας quæ sensum doloris auferunt, interpretatus est: sunt enim ea ναιμαστικά, id est, stupefacientia, quæ sensum non propriè dolorem tollunt eximia sua frigiditate. Anodyna verò quæ non extinguendo sensum aut stupefaciendo, sed partes relaxando, & demulcendo dolorem leniunt & mitigant.) Potum contra venena salutare est: venerem concitat. Rapum muria conditum minus alimenti sufficit, sed multò magis appetentiam recreat. Siluestre rapum additur in medicamenta quibus ad detergendam cutem in facie, totòque corpore vtimur: præsertim quæ ex lupini,



lupini, aut erui, tritici, aut lolij farina fieri solent. Eundem ferè Rapi vsum tradit etiam Plinius his verbis. Est & Rapo vis medica. Perniones feruens impositum sanat. Item frigus vellit ex pedibus aqua decoctum. Et ius feruens podagris etiam frigidis medetur. Et crudum tusum cum sale cuicumque vitio pedum. Semen illitum & potum in vino, contra serpentes & toxica salutare esse proditur. A multis verò antidoti vim habere in vino & oleo. Democritus in totum ea abdicavit in cibis, propter inflationes. Diocles magnis laudibus tulit, etiam venerem ab eis stimulari professus: item Dionysius, magisq; si eruca cōdirentur. Tostum quoque articulorum dolori cum adipe prodesse. Silvestre Rapum in aruis maximè nascitur, fruticosum, semine candido, duplo maiore quàm papaveris. Hoc ad læuigandam cutem in facie, totoq; corpore vtuntur, mista vrina pari mensura. Erui, hordei, tritici, & lupini radix ad omnia inutilis. Quæ postrema in publicis exemplaribus deprauatissima sunt: ea enim verba, mista vrina pari mensura, & cætera, ad ea de quibus hic agitur nihil prorsus faciunt. Quare ex Dioscoride sic corrigenda. Hoc ad læuigandam cutem in facie, totoq; corpore vtuntur, admixto in smegmata, quæ ex erui, lolij, tritici, aut lupini farina fiunt. Alio in loco tradit Rapi silvestris succum acrem, qui circa messem exceptus sit, oculos purgare, mederiq; caliginis admisto lacte mulierum. De rapis verò vt cibis idem ita scribit. Quando alius vsus præstantior quàm his non est. Ante omnia namque cunctis animalibus nascuntur, nec in nouissimis satiant ruris alitum quoq; genera, magisq; si decoquantur in aqua. Quadrupedes & fronde eorum gaudent. Est homini non minor rapaciorum (melius ex vetere codice legas Rapitiorum) suis horis gratia, quàm cymarum: flaccidorum quoque, & in horreis enecatorum, vel maior quàm virentium. Ipsa verò durant & in sua terra seruata: & postea passa penè ad alium prouentum, famemq; sentiri prohibent. A vino atque messe tertius hic transpadanis fructus. De iisdem sic Galenus. Huius plantæ oleraceum quidem est quod terra extat, radix autem quæ terra continetur, dura quidem est nisi coquatur, & non esculenta: aqua autem incocta nulla plantarum congenerum minùs nutrit. Hanc quoque variè vulgò apparant, adeo vt aceto vel muria condientes, in totum annum ipsa vtantur. Succum autem in corpus distribuit mediocri crassiore. Proinde si quis ipsa liberalius vescatur, succum crudum asseruabit, potissimum si ipsam minùs iusto in ventriculo confecerit. Quod verò ad ventrem attinet, nemo ipsam, neque deiicere, neque sistere dixerit, præsertim cum cocta bellè fuerit. Coctionem enim diuturniorem postulat: eaq; est laudatissima, quæ cocta bis fuerit. Quod si sumpta crudior fuerit, concoctu est difficilior, ac flatulenta, stomachoq; noxia. Nonnumquam autem & ventrem mordicat. Præterea scribit Galenus Rapi semen venerem excitare, vt pote spiritum flatulentum procreans. Sic & radicem coctu difficilem esse, inflare, & semen generare. His adiungenda Symeonis Sethi de iisdem sententia. Rapa admodum nutriunt, inquit, vrinam ciunt, inflant, genitale semen gignunt, fauces leniunt atque thoracem. Crebrior illorum vsus crassum humorem generat, & obstructions iecoris parit. Ventrem nec sistunt, nec mouent. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum, & haustum magna copia venerem suscitatur. Aiunt enim qui hoc ipsum semine cum calamintha & lemnia terra sumperit, eo die neque veneno, neque venenati animalis morfu lædi. Appensum inguinum morbis peculiari quadam proprietate medetur. Rapunculum cum sale & aceto estur ad appetentiam excitandam & ciendam vrinam, præsertim modicè elixum. Cum lupinorum aut lolij farina illitum tergit & nitidam reddit faciem, atque etiam totius corporis cutim. Foliorum & caulium præsertim minoris succus oculis cum lacte mulieris instillatus eorum aciem acuit.

Li. 20. c. 13.

Lib. 18. c. 13.

Ibidem.

Li. 2. Alim.

Li. 6. simpl.



Nomina



ΒΟΥΝΙΑΣ Græcis, Latinis Napus nominatur, Italicè *Naone*, Germanis *Steckrueben*, Hispanis *Nabicas*, Gallis *Nauet* & *Naueau*. *Buniados* appellationem à tumete figura, quam præ se fert hæc planta, Græci deflexerunt: namque radix eius in amplitudinem excrefcit, & in rotundum extuberat. Cliuos, colles, verrucosaq; loca *βουνος* nominant. Dioscorides Napum neque descripsit, neque in genera distribuit. Apud Athenæum legimus Theophrastum *Βουνιάδα* quidem non nominasse, cum Nicander eo antiquior eius mentionem fecerit, sed marem quoddam Rapum vocasse, quod fortasse Bunias est. Quia, opinor, Napi in raporum genere videntur esse, & raphano & rapo similes, vt ex Plinio mox dicemus. Foliis etenim & radice raphanos referunt, caule, floribus, semine rapum æmulantur. Eandem ob causam puto Galenum inter rapum quæ γογγυλὶς vocatur, & Napum quæ *βουνίς* discrimen nullum statuere, cum scribit. Siue γογγυλὶς vocare volueris, siue *βουνιάδα* hanc plantam, oleraceum in ipsa est, id quod è terra eminet, quæ verò in terra continetur radix. Et in lib. pharma. simpl. *Βουνιάδος* mentionem nullam fecit, gongylidis, vt supra diximus, vires declarauit. Plinius τῆς ραφανίδος Theophrasti genera ad Napos transtulit, Corinthium, Cleonæum, Liothasion, Bæoticum, &c. vt ex vtriusque locis iam ostendimus. Ex quibus aperte perspicitur τὰς ραφανίδας Theophrasti, id est, radículas pro Napis v'surpasse. Porro idem Plinius velut superiorū Naporum generum oblitus, duas rursus Naporum differentias statuit his verbis. Naporū duas differentias & in medicina Græci seruant. Angulosi foliorum caulibus florentis (Cornarius emendat, Angulosi alterum caulibus florentem) quod Bunion vocant, purgationibus scæminarum, & vesicæ, & vrinæ vtilem decoctum, potum ex aqua mulla, vel succi drachma. Semen dysentericis tostum, tritumq; in aquæ calidæ cyathis quatuor. Sed vrinam inhibet si non lini semen vnà bibitur. Alterum genus Buniada appellant, & raphano & rapo simile: seminis præclari contra venena. Ob id &

Li. 4. Diosc. ca. 119.

## NAPVS SATIVS.


Lib. 5.  
Li. 4. Diosc. c. 124.In hist. pl.  
cap. 63.  
Lib. 5. c. 34.  
Lib. 5. c. 23.  
Forma.

in antidotis vtuntur ipso. Ex quibus Plinii verbis colligit Matthiolus Bunion eam esse plátam, quam Napum siluestrem *Rura* in Hetruria appellant. Idem in epistolis Bunium Dioscoridis siluestrem Napum esse ait. Quare in re Matthiolus cum Plinio vehementer errat: nam à Bunio plurimùm Bunias differt. De quo Bunio in Umbelliferis dicemus. Item Matthiolus duo tantùm Napi genera reperiri scribit, album & flauum. Album flauus crassitudine superat, & magis colore placet: est tamen insipidior, & gustui minùs gratus. Fuchsius & Dodonæo duo sunt Napi genera, satiuum, & siluestre: quod siluestre Fuchsius non Bunium, sed Buniada siluestrem vocat. Dodonæus Bunium longè diuersum à Buniade siluestri descripsit. Napo satiuo folia sunt multa à radice exeuntia, magna, lata, profundissimè vtrimque incisa, rapi foliis simillima, sed læuiora. Inter hæc caulis erigitur cubitalis, in quo flores, siliquæ & semen perinde atque in rapo. Radix subest longa, rotunda, crassa, acrior rapi radice.



radice. Napus siluestris superiori similibus est, sed foliis magis incis, eruca non dissimilibus, radice breviori, sed rotundiore. Satius in agris & hortis colitur. *Locus.*

**NAPVS** *Siluestris, Dodon.*



pis hæc scripsit. Napi verò Amiternini, quorū eadem ferè natura, gaudent aq̃e frigidis. Et alio in loco. Palma Romæ Amiterninis datur, inde Nursinis, tertia nostratibus. Et Martialis Napis nursinas pilas appellat his versibus.

*Nos Amiternus ager salicibus educat hortis.*

*Nursinas poteris parcius esse pilas.*

Cocta Napi radix inflat, vt rectè scripsit Dioscorides, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur. Conditur muria radix. Galenus medicamenta simplicia, quæ in theriacam adduntur expendens, siluestris Napi semen ex Creta sumendum esse ait. Cui non omnino adstipulandum esse censet Matthiolus, quoniam Andromachus, nec satiui, nec siluestris meminit, sed dulcis seminis Napi, quod de satiui semine potius intelligendum videtur, quia in agresti nulla dulcedo infit, sed potius acris quedam amaritudo in satiui verò cōtra. Præterea iunior Andromachus, item Democritus Napi tantū semen requirunt.

Quibus accedit Dioscoridis auctoritas scriben-

tis Napi semen si præbatur, letalia venena inefficacia reddere, & antidotis admisceri. At fortasse Galeno compertum erat siluestris ex Creta semen peculiari, quadam virtute aduersus venena pollere, atque ob id in theriacam addendum, quod tamen destituti satiui semine vtendum in antidotis esse censet Matthiolus. Id semen eodem Matthiolo auctore, necat interaneorum animalia ex limonum aut arantiorum succo potum: ex adianti siue lentium decocto cum alia exanthemata, tum sublimia illa, quæ vulgò Morbillos vocant, ad cutim pellit, tum quod ab imis corporis partibus ad extimas partes morbificam materiam ducit, tum quod propria vi morbi malignitati resistit. Datur vtiliter cochlearis mensura ex vino addita seminis lini drachma ad ciendam vrinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit, si ex oxymelite & tepente aqua hauriatur. Summopere etiam prodest multis diebus eius seminis drachmam ex marrubij decocto propinare ictericis, & aqua intercuti incipienti.

**SINAPI.**

**CAP. XXXIX.**

**G**RÆCI σινυπι & σινυπι, vāπυ Athenienses appellauerunt auctore Athenæo, & Plinio, alij Thapsi, alij Saurion, Latini Sinapis & Sinapi, Arabes Cardel, seu Chardel, Itali Senape, Germani Seneff, & Senff, Hispani Mostaza, Galli Senene, & Mostarde, inde fortasse deducta appellatio- ne, quod cum musto acre illud Sinapis semen ad intinctus conteri soleat. Dicitur autem σινυπι auctore Athenæo, ὅτι σινεῖ τῶς ὠπας τῇ ὀσμῇ, idest, quod olfactum luminibus officiat. vāπυ verò quasi vāqu eodem interprete, quoniam non sine natura sit, sed acri, ac proinde incommoda. Addit quod vel pusilla sit corpore: namque ἀφύς dicit quod natura priuatū sit, inde piscis apua nominatur detracta aspiratione

*Nomina*

*Lib. 9.*

*Lib. 19. c. 8.*

*Lib. 9.*



Gener. 1  
Li. 2. D. of.  
ca. 148.  
Lib. 5. ca. 55.  
Ca. 203.  
Lib. 19. ca. 8.

aspiratione. Alij Napi per priuationē, videlicet *νηπιον*, quasi immite dici volunt, quoniam acrimoniæ vehementis particeps sit. Sinapis tria genera numerant Matthiolus & Dodonæus, Fuchsius duo duntaxat. Plinius trium generum esse dicit. Vnum gracile, alterum simile rapi foliis, tertium crucæ. Semen optimū Ægyptium. Sinapi igitur aliud est hortense siue satium, aliud siluestre. Hortense du-

*SINAPI Hortense.*



plex. Vnum semine fusco, siue rufescente, alterum candido. Hoc album, illud nigrum Galli vocant. Sinapi hortense, cæteris maius, nigrum & vulgare caulem habet hirsutum, ramosum: folia terræ propinqua rapo, aut crucæ, haud absimilia, minora tamen & asperiora, toto ambitu infecta: folia alia minora & crenata: flores luteos: siliquas rotundas & hirsutas, plenas semine in rufo nigrescente, calido & acri, atque idè celebri apud Gallos adagio, qui insignem veteratoris astutiā indicaturi, Sinapi callidiore esse aiunt, quod ignea vi semen nares & cerebrum apprehendat, & lacrymas excitet. Alterum hortense caule, foliis, & proceritate superiori simile est: flores eidem lutei, & in siliquis semen pallidum & minus acre. Satium Sinapi semine albo facit Pena simile prorsus figura & semine Napivulgaris, sed albo, duplo maiore. Istud vero Matthioli secundum, Lobellius & Pena siluestre faciunt apij, aut potius laueris folio, cætera haud admodum dissimile figura & seminis acrimonia. Sinapi tertium Matthioli erraticum est folio & semine tenui, quod Lo-

*SINAPI Satium.*



*SINAPI Siluestre.*




bellius




bellius & Pena appellant Sinapi silvestre minus Burſæ paſtoris folio. Aridis locis iuxta margines & rudera prope vrbes naſcitur, foliis valde laciniatis, Burſæ paſtoris ſimilibus, ſed acutioribus minutoribusq; laciniis: flores veluti in umbellis, & ſiliquæ circa ſummitates eryſimi Dioſcoridis: caulis pedalis. Tota planta guſtu eſt ſinapi feruidiſſima. His Sinapi echinatum Dalechampius addidit, quod in

*SINAPI Echinatum.*



agris prope Monſpelium gignitur, radice craſſiſcula, fibrata, caulibus multis, cubitalibus: foliis longis, anguſtis, in ambitu nonnihil laciniatis, in caulibus paucis: flore luteo, quinque foliolis conſtante, echinis quadrangulis ſemen cōtinentibus, guſtu acre. Aliud Sinapi Amarum cognominatum ex eodem, hic pictum damus: gaudet hæc planta pinguib; & humidis locis, in quibus ſeri cannabis ſolet. Ad altitudinem cubiti ſurſigitur, radicibus paucis, breuibus, gracilibus, albis: caule cubitali, virgato, rubeſcente, intus fungoſa medulla pleno, ſurculoſo: foliis longis, anguſtis, obſcurius virēribus, hyſſopo ſerè ſimilibus: flore aureo, denſius cōgeſto, in quatuor foliola explicato: ſemine minutulo ruſo, ſili quis oblongis & prætenſibus incluſo: ſaporis in tota planta & omnibus eius partibus amariffimi. Flos Auguſto menſe proſilit, & ad Nouembrem uſque particulatim emicat. Frequens hæc planta eſt in agris Arari vicinis iuxta Inſulam & Cœnobium D. Barbaræ, prope Lugdunum. Vtrumque Sinapi ſatiuum in hortis & aruis colitur. Terram diligit

*SINAPI Amarum, Dalechampi.*



aratam, & ſi fieri poteſt congeſtitam: quamuis vbi- cumque naſcatur, & nullo cultu plerumque germi- net. Silueſtre ſaxoſis locis & humidis, & ſecus vias prouenit. Iunio & Iulio menſibus floret, deinde ſemen profert. Eius in medicina multa & magnæ vi- res. Nam auctore Dioſcoride, ad calfaciendum, ex- tenuandum, attrahendum efficax eſt. Ad eliciendâ capitis pituitam manditur: contra præduros tonſil- larum tumores, ac veterem calloſamq; arteriæ ſca- britiem ſuccus ex aqua & melle conuenienter gar- garizatur: ſternutamenta ciet tritum & naribus ad- motum: comitialibus quoque auxiliatur: ſcēminas vuluæ ſtrāgulatu oppreſſas excitat: lethargicis dera- ſo capite illinitur. Ficis admixtum & impoſitum donec rubefcat locus, ad coxendicum cruciatus, lie- nes, & omnis generis veteres dolores confert, cum permutandi mali cauſa ex alto ad ſuperficiem attra- here volumus. Alopeciis illitum medetur: faciem purgat: ſugillata cum melle, adipe, aut cerato rapit: ſera impetigines & lepræ co cum aceto perungun- tur. Contra febriunt circuitus aridum bibitur, aut potui polenta modo inſpergitur (Græcè legitur,

*Tempus.*

*Vires &*

*Temper.*

Li. 2. c. 149.



ἀνέ) δὲ καὶ πρὸς περὶ τοῦ ξηρὸν, ὡς ἀλφίτε ἐπιπασσόμενον τῷ πύρρι. Quod sic melius  
 vertetur. Bibitur autem aridum contra circuitus febrium, instar pollinis potui in-  
 spersum. Attrahentibus emplastris, scabiemq; extenuatibus vtiliter admisceri so-  
 let: tritum grauitati aurium, & sonitui cum fico impositum prodest. Succus ad he-  
 betudines oculorum, & genarum scabritias magna vtilitate cum melle illinitur.  
 Expressus recenti semine succus in sole siccatur. Plinius de Sinapi hæc scribit. Id  
 Lib. 19. c. 8. esse acerrimum sapore, ignei effectus, ac saluberrimum corpori, nulla cultura, me-  
 lius tamen planta translata. Quin è diuerso vix est fato semel eo liberare locum,  
 quoniam semen cadens protinus viret. Vfus eius etiam pro pulmentario in pati-  
 nis decocto, citra intellectum acrimonia. Coquantur & folia, sicut reliquorum  
 Li. 20. c. 22. olerum: Alio in loco eius effectus, & vsum fusiùs persequitur. Sinapi Pithagoras  
 principatum habere, ex his quorum in sublime vis feratur, iudicauit: quoniam  
 non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Ad serpentium ictus & scorpio-  
 num tritum cum aceto illinitur. Fungorum venena discutit. Contra pituitam te-  
 netur in ore, donec liquecat, aut gargarizatur cum aqua mulsâ. Ad dentium do-  
 lorem manditur. Ad vnam gargarizatur cum aceto & melle. Stomacho vtilissi-  
 mum contra omnia vitia, pulmonibusq;. Excreationes faciles facit in cibo sum-  
 ptum: datur & suspiriosis. Item comitialibus tepidum cum succo cucumerum.  
 Sensus atque sternutamentis caput purgat, aluum molli, mēstrua & vrinam ciet.  
 Hydropicis imponitur: cum fico & cumino tusum ternis partibus comitali mor-  
 bo. Ex vuluarum conuersione suffocatas excitat odore, aceto misto: item lethar-  
 gicos. Mox Sinapismi vsum qui fit cum ficibus, & sine ipsis ad rubrificationem  
 vsque declarat. Et si vehementior somnus lethargicos pramat, erubris, aut etiam  
 capiti illinitur cum fico ex aceto. Veteres dolores thoracis, lumborum, coxendi-  
 cum, humerorum, & in quacumque corporis ex alto vitia extrahenda sunt, illitū  
 caustica vi emendat, pustulas faciendo. At in magna duritia sine fico impositum  
 (Legit Dalechamp. At in magna lienis duritia, &c.) Vel si vehemēter virgo timea-  
 tur, per duplices pannos. Vtuntur ad alopecias cum rubrica, psoras, lepras, phthi-  
 riales, letanicos (falso habent habent vulgata exemplaria lithanicos) opisthotoni-  
 cos. Inungunt quoque scabras genas, aut caligantes oculos cum melle. Succusq;  
 tribus modis exprimitur in fictili, calefcitque in eo in sole modicè. Exit & è cauli-  
 culo succus lacteus, qui ita cum induruit, dentium dolori medetur. Semen ac ra-  
 dix cum immaduere musto, conteruntur, manusq; plenæ mensura sorbentur ad  
 firmandas fauces, stomachum, oculos, caput, sensusq; omnes: mulierum etiam las-  
 situdines, saluberrimo genere medicina. Calculos quoque discutit potū ex ace-  
 to. Illinitur & liuoribus, sugillatisq; cum melle & adipe anserino, aut cera Cypria  
 fit, & oleum ex semine madefacto in oleo, expressoq;, quo vtuntur ad neruorum  
 Li. 8. simpl. rigores, lumborumq; & coxendicum perfriktiones. Horum omnium effectuum  
 causas breuiter reddidit Galenus his verbis. Sinapi calfacit & siccatur ordine quarto.  
 Li. 9. med. loc. Alio in loco Sinapi Alexandrinum probat, sicut Plinius Ægyptium. Rectè etiam  
 Symeon Sethi scribit Sinapi vim habere dissoluendi, & discutiendi humiditates  
 quæ in capite, & stomacho sunt. Conferre etiam lienis affectibus ab humiditate  
 & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex adusta pituita contracti sunt.  
 Ad hæc & podagris à pituita factis. Officere verò visui, & calido capiti, & iecori.  
 Adiuvat concoctionem & distributionem ciborum crassarum partium. Minuit  
 quæ in ventriculo sunt humiditates. Illitum lepris eas in melius mutat. Linguas  
 etiam humiditate grauatas siccatur. Si cum melle sumatur, tussis resoluit. Cum cari-  
 cis verò ischiadicis illitum, & lienosis, vtile est: trahit enim quæ intus sunt ad cor-  
 poris superficiem. Suffitum verò & incensum serpentes fugat. Nostri musteum  
 semen nocte macerāt aqua, deinde manibus expressum adiecto aceto pila terunt,  
 acerrimo



acerrimo ciborum cōdimento. Alij pervindemias cū musto maduerit semen conterunt, ita magnam acrimoniæ vim exuit, totoq; anno seruat. Nec hodie quicquam hyeme ad intinctus ubiq; cibis frequentius immiscetur, gratissimo obsoniorum condimento: nihil quoque frigidis diebus magis epulas videtur commendare. Quod si vel assidua consuetudine, vel vsu, gratia ciborum exolefcit, huius acrimonia fastidiosis gustum reuocant, & hoc velut irritamento elanguescentem appetentiam inuitant, quo velut igniculo morosius palatum titillante, vorandi moliantur auiditatem. Sed huius vis confestim in sublimē fertur, vt ex Plinio diximus, nec aliud magis in nares ac cerebrum penetrat. Quare si modus abfuerit, huius odor naribus raptus, statim sternutamenta ciet, & vellicans sensum lacrymas elidit, quod & testatur Columella canens.

Lib. 10.

*Seq. laceffenti fletum factura Sinapis.*

Vnde Aristophanes Cleonem ira percitum, contracta fronte, & indignabundum, excandescentemq; innuens, dixit.

110 Equit.

Κ' ὁ δ' ἔλεψε νότον, καὶ μέτωπον ἀνέσσωσεν.

*Conspexit Sinapin & frontem contraxit.*

ERUCA. CAP. XL.

**E**Y Z O M O N Græcis, Eruca. Latini nominatur, Arabibus *Iergir*, *Er- gir*, seu *Giargir*, Italis *Ruchetta*, & *Rucola*, Germanis *Rokute*, & *Rokelen*, Hispanis *Oruga*, & *Aruga* Gallis *Roquette*. Ὠζωρον dictum volunt, quod iura commendat, habeatq; peculiarem in eis gratiam: quod dixit Plinius, in condiendis obsoniis tanta est Erucæ suauitas, vt Græci Ὠζωρον appella- rint. Erucam verò, quod erodat: nam si degustaueris, os & linguam satis acriter vellicabit. Ea duplex est, satiuæ, & Siluestris. Satiuæ folio est longo angustiq; in profundas, sed rariore crenas diuiso, lissym- brij, aquatici modo, sapore acri & amariuscule: caule pedali aut sesquipedali: floribus in cacu- mine albicantibus aut pallidis, semine in cor- niculis incluso, vt in irione. Radix est illi alba, tenuis acris. Erratica folijs est. satiuæ angustio- ribus, frequentioribus incisuris laciniatis, gustu acriore, sapidioreq; canibus numerosis, flori- bus luteis, corniculis in vniuersa ferè planta numerosis, sursum spectantibus, semine sinapi simili, acri & amariuscule. Vtrique in aceta- rijs cum lactuca frequentissimè vescimur. Cru- da Eruca, inquit Dioscorides, viderem largio- re cibo concitat. Semen eius idem præstat, vri- nam ciet. Concoctioni prodest, alio perquam accommodata. Semine ad condimenta vtun- tur: quod vt in longum tempus assertetur, adiecto lacte aut aceto digerunt in pastillos. Gignitur etiãnum siluestris Eruca maximè in Iberia, quæ Occidentem spectat. Cuius se- mine pro Sinapi incolæ vtuntur. Vrinam ve- hementius pellit, & multo satiuæ acrior. Erucæ facultatem & vsum medicum, Plinius explicat

Nomina

Li. 20. ca. 13.

Genera

ERUCA SATIVA.



his verbis. Eruca quoque & nasturtium vel æstare vel hyeme facillimè nascuntur. Eruca præcipuè frigorū contemptrix, diuersa est quàm lactuca naturæ, conci-

Li. 2. ca. 134.

Vires

Temper.

Lib. 19. c. 8.



## ERUCA Siluestris.

Li. 20. c. 13.



Li. 2. Alim.

etiam testimonio Eruca stimulanda veneri nata videtur. Martialis.

*Et venerem reuocans Eruca morantem.*

*Et qua frugifero scribitur vicina priapo,  
Exstat ut veneri tardos Eruca maritos.*

Idem salacem nominauit.

*Idemque Eruca salax secundo prouenit horto.*

## ERUCA Palustris.

Forma.

Locus.

Tempus.



liatrix veneris: idcirco iungitur illi ferè in cibis, ut nimio frigori par feruor immixtus temperamentum æquet. Et alio in loco. Eruca semen scorpionum venenis & muriasranci medetur. Bestiolas omnes innascentes corpori arcet. Vitia cutis in facie cum melle illitum: lentigines ex aceto. Cicatrices nigras reducit ad candorem cum felle bubulo. Aiunt verbera subituris potum ex vino, duritiam quamdam contra sensum inducere. Putant subtrita Eruca si fricentur oculi, claritatem restitui. Tussim infantium sedari. Radix eius in aqua decocta fracta ossa extrahit. Tria folia siluestris Erucae sinistra manu decerpta, & trita in aqua multa si bibantur, regio morbo medentur. Galenus quoque scribit hoc olus manifestissimè calfacere: quare solum ipsum mandare, nisi lactucæ foliis misceatur, non esse facile. Semen autem generare, & coëundi appetentiam excitare. Capiti etiam dolorem inferre, præsertim si quis ipso solo vescatur. Non solum autem supradictorum auctorum, sed Poëtarum

Columella.

Item Ouidius:

*Nec minus Erucas iubeo Vitare salaces.*

Erucae annumeranda videtur herba illa, quam alicubi in hortis colunt, & acetariis immiscet, & quam vulgares herbarij S. Barbara herbam appellant, Dodonæus Barbararam, Galli l'Herbe sainte Barbe, Germani S. Barbara kraut. Eruca igitur palustris nominetur. Caulem habet rotundum, solidum, striatum: folia Erucae modo laciniata: flores luteos: siliquas teretes, semine refertas: radicem ex obliquo procedentem, & oblongam. Pæsim in campestribus nascitur, & locis aliis incultis, maxime vlinosis. Majo & Iunio mensibus floret, ac subinde in siliquis semen profert. Pena pseudobuniadem dici posse ait, quod sit incisura, magnitudine, floribus & siliqua napi siue Buniadis. In aruis humidis prouenit. Gustanti primum subacris esse, deinde parum etiam adstringere videtur, ut calidam & siccam esse nemo dubitare debeat. Vulnerariam herbam esse & temperamentum eius, & experientia docet. His verò



verò potissimum vlceribus medetur quæ impura sunt, & in quibus caro super-  
crescit: nam quod quadamtenus acris sit, sordes extergere, quod valenter ficeret  
carnem minuere potest. Sunt & qui Erucam cineream vocent herbâ hîc postre-  
mo loco depictam, quod foliis Erucæ siluestri proxima sit. Radice est modicè fi-  
brata, crassiuscula: caule sesquipedali, anguloso, lanugine candida & molli obducto: foliis Eru-  
cæ siluestris, vt diximus, auersa parte albicanti-  
bus, aduersa planè cinereis, lanuginosis, crassis:  
flore in vertice caulium velut racematim con-  
gesto, spissa lanugine pubescente, nigris pun-  
ctis maculoso. In maritimis Corsicæ prope  
Aiaceam nascitur. Præter has Erucâ peregrinâ  
Clusius pictam dedit, quæ aliquot caules ex  
vna radice exeuntes habet, sesquipedales, ro-  
tundos, graciles, & in his multa foliola oblon-  
ga, angusta, incaua, nonnihil veluti circumro-  
sa, acris sapore: flores in summis caulibus con-  
gestos, luteos, Erucæ vulgaris floribus mino-  
res: quibus succedunt siliquæ, seu folliculi sub-  
rotundi, tumentes, in quibus semen subrusum,  
acre. Radix est minimi digiti crassitudine, can-  
dida, nonnihil fibrosa. Crescit quibusdam Ca-  
stellæ locis incultis & secus vias, vbi Maio flo-  
ret, in Belgio, Iunio & Iulio. Hanc ille inter  
Erucæ genera referendâ censet. Lobellius Pa-  
tauinum marinum Leucoium vocat. Hic etiâ  
inferanda fuit propter communes & affines

Forma.

Locus.


ERVCA Cinerea, Dalech.



ERVCA Peregrina, Clus.



ERVCA Siluestris, angustifolia.





naturam & effigiem inter Erucam & Erysimum, quæ Eruca siluestris angustifolia Lobellio dicitur: Profert enim ex cauliculis inflexis & cubitalibus flores luteos Erucæ siluestris, cornicula siliquarum Sinapi sunt aut Nasturtij siluestris, ubi semen acre, uti folia angustiora, eiusdem cum Eruca siluestri coloris, sed minimè diuisa, Tarconis ferè paria, quæ Erucam aut Erysimum sapiunt, quibus idcirco affinis natura putatur, imo Erysimum nostris verum videtur esse.

## ERYSIMVM.

## CAP. XL I.

## Nomina



**E**ρύσιμον Græcis dicitur quod Latinis Erysimum & Irio teste Plinio: *ἐρύσιμον* quidem ἀπὸ τῆς ἐρείτης, id est, à multiplici foliorum sectione: nam erucæ modo laciniata conspiciuntur. Alij ab oleris præstantia dictum volunt, quasi *ἐρύτιμον*, quod est pretiosum & nobile. *Ἰοννολή* ἀπὸ τῆς ἐρύτης, quod ob suam caliditatem maxima trahendi facultate præditum sit. Irionem autem Latini ab irruendo nuncuparunt, quod ignea vi, & feruido sapore irruat in gustum. Erysimum scribit Dioscorides foliis esse erucæ siluestris: cauliculis in lori modum lentis, & obsequiosis: floribus luteis: siliquis in cacumine gracilibus, ut scenigræci, corniculatis, semine nasturtij, exiguo, vrentis gustus. Theophrastus (quod & hic diligenter animaduertendum est) Erysimum inter cerealia connumerat, & sesamo simile facit, atque ideo ab Erysimino Dioscoridis prorsus diuersum, quod folia erucæ siluestris habet, atque inter plantas acres non inter frumentaceas, in quibus de sesamo agitur, ab eo recensetur. Cum Theophrastus scribat, τῶν δὲ γερμένων κέγχρη μὲν καὶ μέλινος καλαμάδος σησαμὸς δὲ καὶ ἐρύσιμος καὶ θημάδης μάλλον. Id est, *Astiuarum milij, scilicet & panici arundinaceus caulis, Sesamo autem & erysimo ferulaceus magis. Et rursus, ὁ ἑρύσιμος δὲ ἔσθ' ἐστὶν ὁ σολυχλάρων, ὃς δὲ γέρμων, εἰ δὲ μὴ ἐρύσιμον. μηδὲ ὄρμονον. συνεπὶ οὖν καὶ τὰ ῥα. Εἰ πάντως, ἐστὶ δὲ ὁ μὲν ἐρύσιμος ὅμοιον συσάμω, καὶ λίπος ἔχει.* Id est, *Sesamū viride nullus edit, neq; lupinum. Si etiam neque Erysimum, neque orminum, quærendum si & hæc amara sunt. Est autem Erysimum sesamo simile, & pinguitudinem habet. Plinius vniūque Erysimi meminit. Vno enim loco Theophrastum secutus frugibus annumerat.* *Ἀστία* quæ æstate ante Vergiliarum exortum seruntur, ut milium, panicum, sesama, orminum, irio, Italia duntaxat ritu. Et paulò post. *Ἀστία* frumēτα diximus, sesamam, milium, panicum. Sesama ab Indis venit, & ex ea faciunt oleum. Color eius candidus. Huic simile est in Asia, Græciāq; Erysimum: idemq; erat nisi pinguis esset, quod apud nos vocant Irionem, medicaminibus annumerandum potius quàm frugibus. Alio in loco Dioscoridis Erysimum memorat his verbis. Irionem inter fruges sesamæ similem esse diximus, & à Græcis sesamum vocari. Galli Velarum appellant, (vetus Cornarij codex Velam habet). Est autem fruticosum, foliis erucæ, angustioribus paulò, semine nasturtij. Galenus quoque inter simplicia medicamenta, erysimū plantis acrimonia, & ignea facultate præditis comparat, inter alimenta sesamo. Ex quibus perspicuum est hoc erysimum ab illo multum differre. Etsi Plinius ea non distinxisse, sed pro eadem planta accepisse videatur. Hermolaus & Ruellius siluestrem illam erucam, quam Nobilem vocant Itali, Erysimum esse dixere: quorum sententiam Matthiolus improbat, & duo alia Erysimi genera proposuit. Priori notas ferè omnes à Dioscoride traditas in eum competere putat. Alterum cui folia sunt minora, cornicula paulò vegetiora, magis genuinum esse censet. At Matthiolum reprehendunt Pena & Lobelius, quod Rapistrum vulgò à rapi sapore & aliqua foliorum similitudine sic dictum loco Erysimi prioris accepit, quod neque Dioscoridis Erysimino respondet, neque cum Matthioli Erucæ siluestris foliis similitudinē habet. Tum odor, sapor rapi,



IRIO, Matth.



rapi, non adeò, vt in Eryfino acris reclamant: præterea Eryfini vires, de quibus mox dicemus. Verum igitur Dioscoridis Eryfinum radice nititur longa, lignosa: foliis erucæ siluestris, quæ primum erumpentia nō nisi ab exercitatis à foliis burfæ pastoris discerni possunt, quæ huic non ita viridia, & extremo magis acuta sunt, Eryfino verò rotundiora in summo & retusiora, subpinguia, multa in imo terram operientia, est & eorum lacinia grandior. Caulis sesquicubitalis, interdū maior, semen in siliquis erucæ siluestris, multò minoribus, acre, feruidum: flosculi in summo lutei. In compitis, sepulcretis & maceris frequens. Dodonæus in Historia stirp. Eryfinum Theophrasti, siue Rapistrum plantam esse censet, quæ Gallis *Velar* & *Tortelle* nuncupatur, quam Lobellius eandem cum Eryfino priore Matthioli, idest, Rapistro aruorum facit, Pena Lampfanam veram, vt diximus hoc libro. Idem Lobellius pro Eryfino genuino, alterum Matthioli Eryfinum vsurpat, quæ Eruca siluestris quibusdam videtur esse. Eryfinum, vt scribit Dioscorides, iuxta vrbes, itinera, hortosq; nasci. Cōtra thoracis fluxiones efficax est, etsi purulenta extulsiūtur, inquit: regio morbo & coxendicibus prodest: contra venena in delinctu cum melle datur (Græcè legitur, τριονύχια τὸς ὀφθαλμοῖς ἐκφυλισμοῦς, ἐμπύους, ῥήχας, ὕδρεον, ἰσχυράδας, ἐκ ἀγχοῦ μόνον σὺν μέλιτι, τινεῖ) &c. Idest, ea semina faciunt ad fluxiones in thoracē,


Locus.  
Vires &  
Temper.  
Liban.

busdam videtur esse. Eryfinum, vt scribit Dioscorides, iuxta vrbes, itinera, hortosq; nasci. Cōtra thoracis fluxiones efficax est, etsi purulenta extulsiūtur, inquit: regio morbo & coxendicibus prodest: contra venena in delinctu cum melle datur (Græcè legitur, τριονύχια τὸς ὀφθαλμοῖς ἐκφυλισμοῦς, ἐμπύους, ῥήχας, ὕδρεον, ἰσχυράδας, ἐκ ἀγχοῦ μόνον σὺν μέλιτι, τινεῖ) &c. Idest, ea semina faciunt ad fluxiones in thoracē,

IRIO Altera, Matth.



ERYSIMVM Verum.





pectore suppuratos, tusses, icterum, coxendicum dolores, si cum melle delingantur. Bibuntur etiam aduersus letalia venena) illinitur ex aqua aut melle vtiliter cæcis carcinomatis, parotidibus, duritiis mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madefcat, atque torreatur, vel linteo alligatum pinsita farina oblitum perassetur. Rutellius corruptum codicem securus sic vertit: sed in vetere legitur non *Εἰς τὰ κλύσματα*, sed *Εἰς τὰ ἐνδύματα*. Vertendū igitur, melius multo ad eclegmata, siue linctus fiet, &c. Hanc lectionem cōfirmat etiam Galenus de Erysimi viribus sic scribens. Erysimi semen sicut gustu nasturtio apparet simile, ita facultate igneum est, & calfaciens. Porro vbi in eclegmate vti ex vsu est, præstat aqua maceratū refrigerare, aut lincolo inuolutum, & crusta pistoria circūlitum torrere. Vtile est cum eclegmate ad promouendas crassorum lentorumq; pectoris pulmonisq; humorū expuitiones. Quin & parotidas induratas, & duritias antiquas vberum & testiculorum iuuat. Refert Dioscorides quod cum aqua & melle cataplasmatibus modo illitum occuitis proffit cancris. Eadem tradidit Plinius, & præter ea quoddā alia habet. Erysimum vtilissimū tussientibus cū melle, & in thoracis purulentis excreationibus. Datur & regio morbo, & lumborum vitiis, pleuritidis, torminibus, cœliaciis. Illinitur verò parotidum & carcinomatum malis. Testium ardoribus ex aqua aliās cum melle. Infantibus quoque vtilissimum. Item sedis vitiis & articularis morbis cū melle & fice. Contra venena etiam efficax potū medetur & suppuriosis item fistulis cum axungia vetere, ita ne intus addatur. His facultatibus quā maximè Erysimi nostri virtutes respondent: constat enim tenui quadam moderatè & incidente substantia, cum humidis & abstergentibus partibus permixta, vt crassam viscidamq; pituitā citra nimiam exsiccationem incidere, & abstergere, atque propter statū nonnihil commixtum non magno concitu expectorare. Quare arteria cum est præstantissimum, asthmaticis infarctū & obstructione pulmonum laborantibus vtilissimū, atque etiam voci rauca, etiam diuturnæ. Hoc primus quod sciam, in vsum adduxit Præceptor Rondeletius, quem memini pueri phonaçi vocem retusam addidum & pene cū spiritu amissam, clarā sonorāq; reddidisse eius dūtaxat decocto.

Li. 6. simpl.

Li. 22. c. 25.

## NASTURTIVM.

## CAP. XLII.

Nomina



**N**ASTURTIVM Græci, Latini Nasturtium dicunt, Mauritani *Nas-  
alch-f*, seu *Narf*, Itali *Nasturtio*, & *Apretto*, Germani *Kressen*, & *Gardékress*,  
Hispani *Nastureyo*, & *Malpica*, Galli *Cresson de iardin*, *Cresson alemaïs*, &  
*Nasturt* Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Barbari quidam her-  
bari, Cressionem horrensem vocant. Nonnulli *κάρδαμον* Græcis dictum putant,  
quasi *καρδάμον*, quod caput domet: nam arcem mentis obsidens sua ferit acrimo-  
nia, & ignea vi præditum caput tentat. Alij *παρὰ τὸ κέραιον*, idest, quod pupillas  
coëuntibus oculorum palpebris abscondat, ita dici aiunt: nam luminibus admo-  
tum subinde cogit conuiuere. A quo *καρδαμήτην* verbum declinarunt, quod  
conuiuere dicimus. Nec desunt qui dictum arbitrentur *ἀπὸ τῆς καρδίας*, quod  
cor foueat, & in syncope cardiaca plurimum valeat. Id innuere videtur Aristophanes,  
cum ait, *ἐχθρὸς πρὸς καρδία*. *Τὶ καρδαμύξῃς*; Edi heri Nasturtia. Quid Nasturtiaris?  
Et, *ὀξύθυμον καὶ δειγνόν, καὶ βλέποντων καρδία*, idest, qui acri sunt animo,  
iustique, quique Nasturtia tuentur, idest, acutum cernunt. Nasturtium verò  
Plinio auctore nomen accepit à narium tormento. Et inde vigoris significatio  
proverbio id vocabulum vsurpauit, (Legit Dalechamp. Et inde vigoris significatio  
proverbium id vocabulum vsurpauit,) veluti torporem excitantis. Quæ vul-  
garium Plinij codicum lectio cū vix tolerari possit, voce excitantis ad præcedentē  
gignendi

In Thef.  
mop.  
In Vesp.



gignendi casum non rectè relata, cum potius excitans scilicet significatio, siue proverbium legi debere videatur, Cornarius multò emendatiùs locum hunc legisse videtur, hoc modo. Et inde vigoris significatio proverbio eius esum vsurpauit, velut torporem excitantis. Est enim reuera proverbium, *ἡσυχία καὶ ἀδολειον*, Ede nasturtium, quòd in socordem, ignauum, & hebetem dicebatur, propterea quòd vim nasturtio inesse credebant animi vigorem excitandi, vt ex Plinio dicemus. Dioscorides nasturtij vnus meminit. Plinius duo eius genera cum fecisset, vnum album, alterum nigrius, aliquanto post nasturtij siluestris meminit. Hic tria nasturtij genera primùm facimus, nasturtium hortense, siluestre, & marinum, de quo in libro de plantis maritimis dicemus. Euchsius & Dodonæus Iberidem nasturtium siluestre vocant. Nasturtium hortense caules erigit teretes, pedales, aliquando etiam sesquipedales, tenues, in quibus folia parua, laciniata, gustus acris & feruidi, flores paruos, albos: folliculos rotundos ac pressos, in quibus semen includitur, in rubro nigricans. Palsim in hortis satum prouenit: floret aestate, Iunio potissimùm mense. Haud multò post semine pragnans est. Nasturtium siluestre radice est longa, tenui, candida, fibrata: caulibus multis fruticat dodrantalibus, & si pinguius solum fuerit, pedalibus, folio est satiuu, copioso, densius per ramos congesto: flore in umbella ex albo purpurascens: semine in latis vaginis, thlaspeos modo bifidis, gustus acris, & satiuum nasturtium odore imitante. In agris frumentariis prouenit, & lapidosis, macrisq; Nasturtium, inquit Plinius, in Arabia mirè amplitudinis dicitur gigni. Idem cum Dioscoride dicit esse Babylonicum. Omnium semen Dioscoride auctore est acre, excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tinea excutit, lienem imminuit, partus examinat, menses cit, venerem stimulat, sinapis & erucæ simile intelligitur: lepras & imperigines absterget. Illitum cum melle lienem extenuat, fauos expurgat: pulmonum vitia extrahit sorbitionibus incoctum: serpentium venenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorum defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur: tumores collectionesque discent: ad suppurationem perducit furunculos, illitum cum muria. Herbae ad omnia eadem effectus, licet minor. Plinius diffusius nasturtij vires declarat, & in quibusdā à Dioscoride dissentit. Nastur-

**NASTURTIVM,**  
*Hortense.*



**NASTURTIVM**  
*Siluestre, Dalech.*



Lib. 20. c. 19.  
*Genera.*

Cap. 121.  
Lib. 5. c. 65.

*Forma.*

Lib. 19. c. 8.

Lib. 2. c. 141.  
*Vires & Temper.*

Lib. 10. c. 13.



tium, inquit, venerem inhihet, animum exacuit. Album purgat, bilem detrahit potum ex aqua decem denarium pondo. Cum lomento strumis illitum opertumq; brasicæ præclarè medetur. Nigrius capitis vitia purgat. Visum compurgat, commotas mentes sedat ex aceto sumptum: lienem ex vino potum, vel cum fico. Tussim ex melle, si quotidie ieiuni sumant. Semen ex vino omnia intestinorum animalia pellit, efficacius adhibito mentastro. Prodest & contra suspiria, & tussim cum origano, & vino dulci. Pectoris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos discutit cum pice, extrahitq; corpore aculeos. Et maculas illitum ex aceto. Contra carcinomata adiicitur ouorum album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infantibus verò è melle vtilissimè. Sestius adiicit vstum serpentes fugare, scorpionibus resistere. Capitis dolores contrito, & alopecias emendari addito sinapi, grauitatem aurium trito imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in aures succo. Porriginem & vlcera capitis cum adipe anserino, furunculos concoquit cum fermento. Carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit. Phagedænas ulcerum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis cum polenta ex aceto illinitur: item lichenitem vnguibus scabris: quippe natura eius caustica est. Siluestri verò ad omnia ea effectus maior. Hæc Plinius. Dioscorides tradidit nasturtij semen *συνισταν παρματιν*, id est, venerem stimulare. Plinius contra venerem inhihere. Cui assentitur Florentinus in Geoponicis Constantino attributis, *φασὶ δὲ, τὸς ἐσθίωντας κορδαμον, ὁ ξυλίσπος τὴν δυνάμειν γίνεσθαι*. Et addit, *ἀφροδισίων ἐφελκυστικόν ἐστι*. Sed quum hæc tum Dioscoridi, tum experientia repugnent, dicendum aut eos nasturtij virtutes nō rectè intellexisse, aut codices eo in loco deprauatos esse. Galenus perspicuè eius vires & facultates explicat. Nasturtij semen, inquit, adurentis seu causticæ facultatis particeps est, velut napy. Proinde coxendicis & capitis dolores leuat, atque adeò quodcumq; rubrificationem postulat & excalfacit sicut napy. Miscetur quoque remediis iis, quæ exhibentur asthmaticis, tanquam scilicet id, quod crassos succos valenter incidere valeat, velut & napy. Nam per omnia ei simile est.

Lib. 12. c. 17.

Lib. 7. sim.

**NASTURTIVM** *Peregrinum, Myconij.*




Porro & herba arefacta similem semini vim possider. Humida verò adhuc ac viridis, propter aqueæ humiditatis mixtionem, multo femine inferior est, adeoque tunc mordacitas eius moderata est, vt cum pane eo vti liceat. Hæc Galenus. Nostri cum lactuca in acetariis nasturtio per æstatem libèter vescuntur. Adiiciemus hîc ex doctore Myconio rarum & peregrinum Nasturtium quod Perunianum cognominat, atque ita describit. Herba est bicubitalis multos ab vno trunco caules ex viridi rufescentes, leues, geniculatos, rotundos, solidos, & ex iis ramulos itè multos hac illac spargēs, & longius porrigens, vt ad miculis egeat, quibus fulciatur, & ob id vicinas plantas amplectatur. Ex iis folia longis pediculis nixa pendent, rotunda, læuia, neruola, neruis à centro foliorum ad circumferentiam ductis veluti lineis, & qua foliorum extremitates attingūt, veluti in spinas desinentibus, folia non prorsus rotunda sunt, sed quadam ex parte anserinum pedem æmulatur, caua sunt acetabuli figura, supernè viridia, infernè minùs. Horum ferè medio siue centro pediculus



**NASTVRTIVM,**  
*Indicum, Dodon.*



**NASTVRTIVM**  
*Silvestre, Clusij.*



pediculus inferitur, prope cuius è caule exortum, alius pediculus emergit longus, cui flos insidet lateus, calathi specie, ex quinque foliolis contextus, quæ rursus ambiunt alia quinque folia exterius rubescencia, quemadmodum & totus calathus rubescit. Calathi forma est consolidæ regali adsimilis, nisi quod recta protenditur. In tribus inferioribus foliolis, florum ad latera diuisuræ quædã sunt & sectiones, in quorum medio macula rubra conspicitur, & supra eorundem trium foliolorum medium secundum longitudinem à centro ad folij extremum decurrit stamen quoddam instar simbræ ex multis tenuibus, breuibus & luteolis pilis contextæ, vt in iride visitur. Cæterum per omnia foliola à calathi fundo ad apicem vsque, lineæ quædã dicuntur rubræ: flos inodorus est, qui autumnino exoritur, quo abeunte vas quoddam relinquitur, ex tribus veluti vasis compactum, viride, asperum, vt in secunda heliotropij specie. Semine cum legitur viride est & molle, deinde nigrescit & rugatur. Radix subest candida, non admodum altè depacta, multifida, fibrata. Sapor radice, caulium, foliorum, florum, idem qui nasturtij. Odore etiã nasturtio proxima est. Quare nasturtium Myconio iure dictum, veteribus ignotum. Perunianum verò à Peru vnde aduectum, nobis non nisi in hortis diligenter cultum & satum provenit. Vires nasturtio similes esse gustus demonstrat. Quare in acetariis & medicamentis idem qui nasturtij, vsus. Dodonæus plantam pictam Nasturtij Indici nomine accipit, quã ex icone minus affabrè delineata ita describit. Speciem conuoluuli exhibet, folia eius lata, angulosa, & pulchrè depinguntur virentia: flos luteus retro propendens habet corniculum instar floris regij, quem Delphinium appellant. Clusius aliud Nasturtium silvestre Valentinum depinxit, atque sic descripsit. Vnicus huic caulis, atque statim à radice supra solum in ramulos diuisus, hirsutus & asper, virens, rotundus, pedalis, foliis tenuibus & multifidis, nasturtij ferè vulgaris amulis, sed tenuioribus, viridibus, acris gustu & sapore, vulgaris nasturtij modo fert extremis ramis spicatim pallidulos flosculos, deinde exiguas siliquas, duabus valculis constantes, cum

ligula prominente, in quibus semen continetur nasturtij. Radix singularis, candicans, quæ singulis annis perit. In regno Valentino reperitur. Martio floret. Quod pleraque notas cum nasturtio communes habeat, nasturtij nomine donauit cui quantum ex gustu diiudicare licet per similes facultates habere potest.

CARDA



Nomina  
Lib. 2. c. 121.  
Ibid.



SISTYMBRIVM, Cardamine

I. Crescio vulgaris, Matth.

Lib. 2. c. 60.  
In lib. 2.  
Diosc. cap.  
120. & 121.  
cap. 275.



Forma.

SISTYMBRIVM, Cardamine

II. Matthioli.

Lib. 2. c. 122.

Genera.

Lib. 2. Diosc.  
cap. 221.



ARDAMO cardamine est affinis, atque ideo sic dicta, auctore Dioscoride, quod gustu cardamum, id est, nasturtium representat. Sisymbrium cardaminem Dioscorides, alij sion appellant. Sed cardamine solo nomine sisymbrio similis est: nam nasturtij potius quam sisymbrij species est. Cardaminem magno consensu Ruellius, Matthiolus, Fuchsius eam herbam esse putant, quam Officina nasturtium aquaticum appellant, vulgus *Crescionem*, Galli *Crisson*, Germani *Brunnenkroß*, Itali, *Crescione*, quod notæ omnes à Dioscoride expositæ huic maxime faueant. Est enim herba rigorum vernacula, & laueris comes: nusquam nisi in aquatilibus nascitur, tum nasturtium respicit, unde cardamines, id est, nasturtiaræ, & in Officinis nasturtij aquatici nomen. Adhæc folio est, cum inter initia emicat orbiculato, cum adoleuit in folium erucæ laciniatum degenerat. Postremò nec ei desunt vires à Dioscoride & aliis veteribus assignatæ, ut dicemus. His paucis in re notissima delineamenti Dioscorides contentus *crescionem* nostrum expressit. Cæterum caule profilit cauo, sesquipedali, ima parte multis radicularum fibris subinde capillato, è cuius alarum cauis cirri frequenter sinuatim erumpunt, candidulo flore: semine in siliquis exiguo & acri. Ramuli in aquis cum infenuerunt etiam candicantibus capillamenti articulatim confibrantur, quæ seniles canos aliquatenus representant. Plinius eiusdem meminit, cum enim de priore sisymbrio dixisset, subiicit, Quod in riguis nascitur simile nasturtio est. Pena & Lobellius id sion erucæ folium Cratenæ esse arbitrantur, ut annotauimus in lib. de Palust. Est & Cardamine altera eiusdem generis auctore Matthiolo, hic secundo loco appicta, sed foliis & caulibus longè minoribus, ramulis numerosis, in cacumine tantum comantibus, in quibus flosculi exeunt albicantes. Hæc non solum in aquosis & riguis prouenit, sed & in hortis, & secus itinera, acri sapore. Pena & Lobellius cum Matthioli Cardamine, siue Sisymbrium aquaticum primum, id est, ut vulgi verbis utar, *Crescionem* nostrum, fecerint sion Cratenæ, erucæ folium, istam secundam cardaminem Matthioli siue sisymbrium aquaticum secundum statuunt cardaminem primam siue sisymbrium aquaticum primum Dioscoridis. Idem Dodonæus in Historia stirp. Gallicè *Passerage sauuage*, à caloris acrimonia, aut *Petit Cresson aquati*



SISYMBRIUM Cardamine

CARDAMINE IIII.


III. Dodon.

Dalechamp



aquatique, Germanicè *Gauchblum*, & *wilder Kress* dicitur, à quibusdam herbariis flos cuculi. Nasturtium silvestre & Iberis Fuchsi, Nasturtium silvestre Cordo, & pratense Trago, folia primum rotunda emittit. Deinde caulem rotundum erigit, ferè pedalem, in quo erumpunt folia oblongiora, vtrinque profundius incisa, foliis

CARDAMINE Altera,  
sive *Sisymbrium*.



erucæ ferè similia: in cacumine flores candicantes, deinde siliquæ parvæ, quæ semen continent. In pratis humidis provenit, & circa fossas & stagna. Cardamine altera sive *Sisymbrium*, cardamine secundum, Lobellio auctore, exit pratis vdis Angliæ, Germaniæ, Belgij, & frigidarum regionum, vbi Cardamine quam foliis imis refert. In pedali caule ut plurimum singulari folia exitiora nasturtij hortensis similia, flores lactei purpurantes erucæ aut napi, cardamines prioris maiores, gustu, uti vniuersa planta, & viribus *Sisymbrium* referentes. His accedit ex eodem Lobellio Cardamine trifolia, quibusdam Belgij cultoribus & stirpium ditioribus hortis repertu facilis, nasturtij, cardamines gustu & facie plantula palmaris, foliis quadrantenus *Sisymbrij* cardamines, sed posita terro, oxys Plinianæ ritu, humi procumbente, flos in pediculis albus, isopyri vulgaris aut cardamines. Radix multum fibrata. His alias duas cardamines species Dalechampus addidit, cardaminem minimam aquaticam, & cardaminem odoratam. Cardamine minima aquatica, radice est tenui, longiuscula,





giuscula, parum fibrata, candida, foliis eius quam sisymbrium cardaminem vocat Dodonæus, minoribus: flore paruulo, candido, minore quàm in superiore, strigiflore, & graciliore: siliquis tenuibus eiusdem gustus. In marginibus & aggeribus fossarum prata cingentium nascitur. Cardamine odorata radice est crassiuscula, sensim gracilescente, dodrantali, granulis plurimis candidis, & coriandri semine non maioribus, tuberosa, albæ saxifragæ modo, multum fibrata, foliis sisymbrij cardamines Dodonæi, humi stratis, amplioribus, nigricantibus, gustu acribus, sed odore cum manduntur, tam suavi, ut ad cinnamomum accedat. Quam ob causam cardaminem odoratam, seu nasturtium odoratum vocauerunt, flore ac fructu est eodem. Quidam Calitrichon Plinij esse putant, cui folia sunt lenticulæ similia, caules iuncei, tenuissimi, radix minima. Nascitur in opacis & humidis gustatu feruens. In Sequanorum siluis abietibus & piceis confitis cardaminem hanc odoratam vidit Dalechampius, muscoso solo. Cardamine, inquit Dioscorides, exalfacit, vrinas mouet, cruda estur, lentigines purgat, cutisq; vitia in facie, noctibus imposita, matutinisq; detracta. Galenus, sisymbrium cardamine quoniam cardamo, id est, nasturtio simile quiddam gustu præse fert, cum siccum est, tertij est ordinis calfacientium & desiccantium: cum humidum, & viride, secundi. Quare Cresionis nostri cum lotium hæret, decocto, vel crudi esu medici vrinas mouent & calculos comminuunt. Estur quotidie crudum & coctum primis mensis. Cum raphano & petroselini radicibus ex albo meraco & butyro calfactum, & pubi admotum vrinas remorantes educit. Succus ex aceto illinitur vtiliter veteriosis.

## THLASPI. CAP. XLIIII.

## Nomina

**S**INAPI, erucæ nasturtio similis est herba, quæ Græcis τὸ θλάσι, & θλάσιον & θλασιδιον dicitur, & σινηπι ἀγρον, Latinis Thlaspi, & thlaspe, Capsella & Scandulaceum. Sunt huius temporis herbarij, qui nasturtium tectorum vocent: quoniam subinde in parietinis nascitur, alij




alij siluestre. Vulgus nostrū sinapi rusticum appellat, quoniam digitis friatum sinapim subolet. Germani *Baurnsenff*, & *Baurnkresz*, Hispani *Paniquejo del fior blanco*, Galli quidam *senec sauvage*. Thlaspi autem Græcis à fructus forma dictum est, qui nasturtio similis est, sed latior, & veluti infractus & contusus. θλάσιν enim contundi & infringi significat, infringendoque quod globosum tumidumque erat, malleo vel lapide cum dilatatione exequare, vel à seminis inuolucro foliaceo transuersim per mediumve incusso aut diffracto. Duo thlaspeos genera memorat Dioscorides, vnum angustifolium, alterum Cratenæ latifolium. Eadem Plinius habet, nulla thlaspeos Cratenæ mentione facta. Periti herbarij multò plura genera ex seminis forma, à qua huic herbæ nomen inditum fuisse diximus, obseruarunt, vt ex singulorum historia intelligitur. A thlaspe Dioscoridis exordiemur, quæ herba est angustis foliis, digiti longitudine in terram versis, subpinguibus, in cacumine diuisis, binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascensibus ramis (Græcè legitur ἀποφυάδας ὀλγας ἔχοντα, id est, qui adnata, siue ramulos, siue propagines paucas habet) fructu circa ipsum totum, ab extremo in latius se pandente: semine nasturtij, incluso vasis Lenticulæ effigie, nisi quod infringitur (Græcè habetur, ἐν ᾧ ἀσπεριότιον ἐμφερές καρδιάει, δισκοειδές, ὡς ἐν τετρασπιδίον. Id est, in quo semen exiguum, simile nasturtio, disci figura, veluti compressum. Ruellius legisse videtur σκοειδές, quod verterit lenticulæ effigie, nec temerè, quum thlaspi semen illi pulchrè respondeat, vel ex Plinio ita interpretatus est, vulgaria tamen Dioscoridis exemplaria δισκοειδές habent) vnde nomen accepit, flos albicat. Nascitur in semitis & parietibus, sepibusque. Semen asperi gustus (ita Ruellius ex Plinio vertit, quod Græcè dicitur ἀσπεριότιον, id est, semen acre) excalfaciens. Alterum thlaspi tradit Cratenes, quod aliqui Persicam sinapi vocant, latis foliis, radicibus magnis. Quæ omnia Plinius ex Dioscoride trāscripsisse videtur, aut certè vnde ille excriferat. Thlaspi, inquit, duorum generum est, angustis foliis, digitali longitudine & latitudine, in terram versis, in cacumine diuisis, cauliculo semipedali, non sine ramis, peltarum specie, semine incluso lenticulæ effigie, nisi quod infringitur, vnde nomen, flos albicat. Nascitur in semitis & sepibus. Semen asperi gustus. Alterum thlaspi, aliqui Persicon napy vocant, latis foliis, radicibus magnis. In quibus Plinij verbis mancum id videri potest, non sine ramis, pellarum specie, ita vt vox fructu deesse videatur, quæ pellarum speciei comparetur. Galenus de thlaspi hæc etiam prodidit. Vtuntur thlaspi quod è Creta adfertur, quodque vbique nascitur, colore inter luteum & flauum medium, figura rotundum, exiguum adeò, vt sæpe grano milij cedat. Melius est autem è Cappadocia comportatum thlaspi imponamus. Hoc ad nigredinem inclinat, figuram non exquisitè rotundam habet, & antedictum magnitudine per multum superat, atque ab vno latere paruam quandam veluti compressionem præ se fert, vnde ei nomen inditum est. Nascitur luteum vt hoc, ita & illud in Cappadocia plurimum. Ideoque non absolutè quod inde asportatur, optimum censendum est, sed quod peculiariter in Sauro nascitur, nec Cretico, nec passim nascenti simile. Hæc de thlaspi Galenus. Ex quibus colligitur duplex esse thlaspeos genus, semine, figura, & colore distans præter illud quod Dioscorides & Plinius secundum fecerunt. Primum Dioscoridis & Plinij thlaspi, Matthioli, Fuchsij, & aliorum peritorum herbariorum iudicio, id est, cuius effigiem hic proposuimus, quod etsi caule iam edito folia non habeat in cacumine diuisa, tamen cum cætera omnes notæ, quas thlaspi suo Dioscorides assignat, ei conueniant, credendum id legitimum esse, præsertim cum antequam caulem emittat, vt obseruare perfacile est, ineunte vere folia proferat humi accubantia, vtrinque circa cacumen diuisa. Sed hæc fugacia sunt, statimque conflascunt. Quæ autem in caule sunt, angusta sunt, vt Dioscorides ait, subpinguia, digitali longitu-





THLASPI Angustifolium, Fuchsy.



THLASPI. III. Matthiol.



dine. Ad hanc caule est tenui, duorum dodrantum longitudine, non sine adnatis ramulis, circa quos totos fructus spectantur, folliculi scilicet compressi, aut disco similes, aut lenti, in quibus semen concluditur nasturtio simile, acris sapore. Pena & Lobellius hoc Thlaspi vulgatissimū esse aiunt Vaccarię folio. Sunt qui hoc thlaspi esse Cratena, cuius Dioscorides & Plinius meminerunt, falso credunt. Nam & fo-



THLASPI IIII.

Matthiol.



liis latis, & radicibus magnis caret, quæ thlaspi Cratenæ habet. At si qua sit planta hodie nota, quæ thlaspi Cratenæ merito censerî possit, eam esse putat Matthiolus, quam raphanum rusticum appellauimus & descripsimus: huic enim folia lata sunt, radices magnæ, & ischiadicis confert. Cordus id maius thlaspi sine dubio eam herbam esse putat, quam Germani *Merrettich* appellant, Arabes nasturtium album à candore radices, eosq; reprehêdit, vt diximus, qui acrem istam radicem raphano adscripserunt, eaque malè vtuntur, cum raphano vtendum sit. Alterû thlaspi genus ex Matthiolo etiam depinximus, quod eius semen thlaspi haud absimile videatur. Nascitur in agro Pragensi, locis saxosis & asperis, floret medio vere, Iunio mense semen profert gustui acre. Addidit Matthiolus & tertium & quartû thlaspeos genera hîc quoque apposita. Plura periti herbari obseruauerunt, & in lucem prouulerunt: quorum declaratio in librum de plâis, quæ in asperis, aridis & montosis nascuntur, reicienda. Est & thlaspi marinum, minimum, de quo in libro maritimis stir-

In lib. 2.  
Dioic. cap.  
186.

Cap. de rapha.

Locus.

Tempus.

Lib. 6. c. 62.  
In hist. plâ.  
cap. 214.

Lib. 2. c. 190.

Vires &

Temper.

Lib. 27. c. 13.

Lib. 6. sim.

pibus dicato, dicemus. Quare de thlaspeos viribus Dioscoridem nunc audiamus. Semen, inquit, bilem vtrinque extrahit potum acetabuli mensura: prodest ischiadicis infusum: sanguinem potu educit, internas suppurationes rumpit: menses ciet, sed partus enecat. Alterum thlaspi vtile ischiadicorum infusioni. Eadem Plinius isilem verbis habet. Eadem & Galenus, thlaspeos semen, inquit, facultatem habet acrem, adeo vt internos abscessus potum distrumpat: menses ciet, & foetum necat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuat, ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum supernè tum infernè biliosorum humorum euacuatorium oxybaphi mensura epotum.

ARABIS SIVE DRABA. CAP. XLV.



ARABIS sive Draba, sive Arabis herba dicta reperitur, & à Serapione nasturtij generibus adnumeratur, quam nasturtium orientale vocat, ob insignem eius acrimoniam, quidam Bâbylonicû nasturtium vocant. De draba hæc in Dioscoridis exemplaribus leguntur. Draba herba ad cubiti altitudinem assurgit, tenues spargens ramos, & ex vtroque latere folia seu lepidij, sed molliora & candidiora. In cacumine verò sambuci umbellam gerit, candidos flores habentem. Herba hæc cum prisana coquitur in Capadocia maximè. Semen aridum pro pipere obsoniis admiscetur. Sed hoc caput Dioscoridi falsò adscriptum fuisse Marcel. Verg. Matthiolus, atque alij viri docti non sine ratione suspicantur. Primû plantę appellationem si rectè expendamus, neque Græcam, neque purè Latinam esse comperiemus, cum neque apud Galenum, Oribasium, Paulum, Aëtium, neque apud Plinium, aliòsve Græcos aut Latinos auctores scriptum de ea quicquam reperiatur. Deinde in exemplari Dioscoridis Græco manuscripto, bis hæc herba secundo Dioscoridis libro habetur, tum statim post thlaspi, tum in fine libri post glastum ante telephium intrusa,

Nomina

Forma.




ARABIS SEV DRABA,  
Dodon. seu Thlaspi Creticum.

ARABIS SEV DRABA,  
Matthiol.



ARABIS SEV DRABA  
altera, Pena & Lobell.

Lib. 4. c. 63.



In lib. 1.  
Diosc. cap.  
107.

quod aperte ostendit supposititiam esse in Dioscoride hanc herbam. Caterum siue à Dioscoride, siue à quouis alio herbario literis prodita sit hec herba, illam putat esse Dodonæus, quam hic pictam damus, quam recentiores herbarij thlaspi Creticum vocant. Pedalis est herba, foliis angustis, iberidis foliis ferè similibus, in caulicorum summitate umbellas ferens, in quibus flosculi oriuntur candidi, aut quasi in purpura albicantes: deinde siliquæ parvæ, compressæ, thlaspeos siliquis similes, minores tamen, in quibus semen includitur, gustu acre & feruens, sicuti thlaspeos semen. Huic herbe thlaspeos vires Dodonæus tribuit. Cordus Plinium eius herbe mentionem fecisse nomine Dryophoni existimat, cuius verba cum de dryopteris dixisset, hæc sunt. Dryophonon similis herba est, cauliculis tenuibus, cubitalibus, circumdatis utrimque foliis, pollicari amplitudine, qualia oxymyrsmes, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido sambuci. Edunt cauliculos decoctos. Semine verò eius pro pipere utitur. Drabam aliam exhibuit Matthiolus, quæ legitimam esse censet, in qua cum leuiuscula sentiatur acrimonia, quam insignem in Draba requirit Serapio, an ea sit eius draba quæ in Italia nascitur, affirmare non audet, nisi forte drabæ pro regionum diuersitate accidat, quod aro accidere scripsit Galenus. Drabam aliam Lobellius monstrat, quæ inter Narbonensem Drabant



& Myagrum media est & congener. Dignoscitur reptatu dodrantalium cauliculorum densissimorum, & radicis exilitate, flos albidus est, quatuor foliolis constans. Hac Lobellius.

IBERIS.

CAP. XLVI.



QVÆ IBERIS Græcis herba dicitur, ab Iberia regione nomen inuenit. Paulus lepidium, & ἀγριοκαρδάμων, id est, siluestre nasturtium appellari scripsit. Aëtius Cardaminem, quia odorem, saporem, & figuram cardami, hoc est nasturtij habet, & Galenus odore & viribus cardamo simile lepidium esse dicit. Quare in Dioscoride ἰβερὴς ἡ τοῦ καρδαμάντων pro καρδαμὺν falsò legi Cornarius existimat. Galenus etiam lepidium eandem esse herbam cum iberide declarat his verbis. Damocratis extat libellus Clinicus inscriptus, in quo versibus Iambicis de tribus differit medicamentis. Ac primò quidem eo quod ex herba quam ipse iberidem appellat, constat. Mox subiungit Galenus. In Iberide medicum quendam amicum suum hac herba curatum esse, quam ipse Damocrates iberidem appellat, ut qui ipso visu herbam cognorit, nomen autem eius nullum audierit, quin etiam id ipsum ignorarit is qui eum usum eius docuit. Verùm ex signis quæ scribit, videtur iberidè appellare, quæ à Græcis lepidium appellatur, à regione in qua amicus eius curatus est, appellatione ducta. His subiicit Galenus Damocratis iambos quibus iberidè descripsit. Addit rursus his Galenus. De hac iberide etiam Archigenes scribit, lepidium ipsam appellans. Dicit autè & splenicis, & ischiadicis ipsam cōuenire. Ad ischiadas & perfrigerationes Hygieni Hipparchi. Herbam iberidem quam aliqui lepidium vocant aut agriocardamum colligito, &c. Cùm igitur iberis & lepidium eadem sit herba, perspicuum est iberidis caput calci primi libri Dioscoridis à nimis curiosis librariis vel medicis, nō à Dioscoride adiectum fuisse, cùm is iberidi locus non rectè assignetur, sed libro secundo, in quo cum permultis plantis quæ acri facultate præditæ sunt, de lepidio tractat. Eius effigiem his iambicis versibus Damocrates depinxit.

Nomina

Lib. 3. c. 17.

Lib. 3. c. 184.

& lib. 12. c.

12.

Lib. 7. sim.

Lib. 10. ph.

loc. cap. 2.

Gal. lib. 10.

ph. loc.

Locus.

Forma.

Herba hæc ubiq; multaq; frequens nascitur,  
Monumenta iuxta antiqua, muros & veteres,  
Tritasque quondam publicè pedibus vias,  
Quas iuxta aratrum duxit haud quis agricola.  
Semper virescens foliis nasturtij,  
Florentibus vere, attamen maioribus:  
Caulem cubitalis longitudinis gerit,  
Paulo minorem, aut rursus ampliorem, ab hoc  
Æstate pendent folia, donec multa hyems  
Sarmentitiam deducat hæc ad imaginem, &  
Deiecta & exsiccata depereant gelu.  
Adnata radici tamen cernes alia.  
Æstate florem fert colore lacteo  
Multum, tenuem, variūque valde, cauliculus.  
Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,  
Visum ferè ut fallens, oculos quoque effugiat  
Odorem habet radix inde acerrimum,  
Vero similem quàm maximè nasturtio.

Hos versus aperte declarat Plinius his verbis. Inuenit nuper & Seruilius Damocrates è primis medentium quam appellauit iberidem, quamquam ficto nomine, inuentioni eius assignato carmine. Nascitur maximè circa vetera monumēta, parietinaq;, & inculta iterum, floret semper folio nasturtij, caule cubitali, semi-

Lib. 25. c. 8



Lib. a. c. vi. ne tam paruo, vt vix aspici possit. Radici odor nasturtij, & c. Huic descriptioni etiā simillima est ea quæ in Dioscoride reperitur, siue ab eo posita sit, siue ab alio aut re inserta. Iberis folia habet nasturtij, vere virētiore, caulem cubitale aut minorem. In inculcis nascitur. Aestate lacteum florem promit, quo tēpore efficacior est. Ra-

*IBERIS siue Lepi-  
dium. Math.*



Lib. ii. c. 2.

Lib. 3. c. 184.

Math. lib.  
1. Dioscor.  
cap. vii.  
*Forma.*

Lib. 39. c. 8. *LEPIDIVM PAULI  
& Plinij.*

Lib. 3. c. 77.

Cap. de si-  
liq.  
*Forma.*



lices duas nasturtio similes habet calfacientes & adurentes. In qua descriptione corruptus est locus, μήκος ὅσον πηχυαῖον, ἢ ἑλαττον, id est, caulem cubitalem aut minorem. Deest enim voc. καλοῦ & πλέον, vt sic legatur, μήκος ὅσον καλοῦ ὅσον πηχυαῖον, πλέον ἢ ἑλαττον. Id est, caulem longitudine cubitalem, maiorem, aut minorem, sic enim Damocrates habet. Sic & Aëtius, versus Damocratis, sed lege carminis soluta recitans, & Archigenes in Epistolâ ad Aristonem referente Aëtio, in quibusdem planè verbis iberidem describit, vt vel ex Dioscoride exscripsisse videtur, vel ex ipso Archigene ad finem libri primi Dioscoridis caput de iberide aliquis attexerit. Veterum Græcorum iberis siue lepidiū doctissimorum herbariorum iudicio, ea est quam hic pietam exhibemus, *Nasturtio saluatico* Italarum, *Passerage* & *Cresson sauuaige* Gallorum, caulis rotundis, cubitalibus, surculosis: foliis angustis, floribus candidis, & siliquis in quibus semen: radice crassâ, candida, gustu acerrima. Ab herbariis colitur in hortis. In Italia tamen & Gallia Narbonensi locis incultis sponte nascitur. Huic iberidi cū minimè conueniant quæ de lepidio quodam Plinius tradit, id exire in cubitalem altitudinem, foliis laurinīs, sed molli- bus, item Paulus fruticosam quandâ apud suos nasci iberidem similibus lauri foliis, & multo amplioribus, attendendum id lepidium à superiore iberide siue lepidio prorsus esse diuersum: præsertim cū Dioscorides Lepidiū suum βοτάνιον vocet, id est, Herbulam. Est autem id primum siue maius lepidium Pauli & Plinij ea planè herba quæ à recentioribus Piperitis nuncupatur, (non est autem piperitis Plinij, de qua iam diximus) quod acerrimo gustu linguâ vel licet, Officinis raphanus siluestris, non ille quidem de quo post satium diximus, neque raphanus rusticus, sed qui nominatur à Gal- lis *Passerage*, à feruido gustu, à Germanis *Pfiffkraut*. Lepidiū maius Cordi & Tragi. Folia huic longa sunt, lata, laurinīs similia, sed latiora & longiora, & toto ambitu parim crenata: caules rotundi, fractu contumaces, fere bipedales: in quorū summitate flores parui & candidi, dein- de semen minutum, radix longa est, & simplex, quæ



quæ sub terra serpit, unde quotannis surculi multi enascuntur. In hortis herbariorum passim colitur, semelq; fata haud facile extirpari potest. Sed de Iberidis, siue lepidij prioris viribus dicamus. Lepidiū, inquit Galenus, ex quarto est ordine excalfaciētiū, simile nasturtio, tū odore, tū gustu, tū viribus: sed minùs eo desiccatur. Qui verò qualitates has sequatur effectu, hi sunt ex capite de Iberide, quod in Dioscor. additū fuisse diximus. Radices ischiadicis cū fālſa axungia emplastri modo vtilēs, quaternis horis alligatæ, vt dein in balneas descēdatur, & postea oleo cū lana locus perungatur. Idē auxiliū de Iberidis radice præscripsit Damocrates, his versibus.

Vires &  
Temper.  
Li. 7. simpl.

Gal. lib. 10.  
ph. loc.

Hanc erutam larga satis cape copia  
Æstate nam tunc optima & fortissima est  
Adhuc recens siccata sit: sed debilior.  
Tusam hinc probe (nam difficulter tunditur)  
Pauca subactamque excipies axungia.  
Cuique toti, & maxime coxendici  
Adhibebis, & ligabis, & fines duas  
Horas mulieribus, viris sed quatuor.  
Hinc balneo inductos, nec ullo ex unguine  
Nec smegmate ullo pinguiore collines,  
Sudore sed modico exiliente, in solium  
Merges iubens perferre: nam mordacitas  
Ingens, calorū sensus atque exoritur.  
Verum hinc rigatos leniter perducito.  
Illi enim quamvis manibus sint plurium,  
Exibit attamen pedibus suis valens,  
Quicumque consilium hoc bonum susceperit.  
Ad multum oleum miscebis hinc vinum modicum,  
Et concuties. & illines lotos eo.

Ac mox madore terso, & pinguitudine Totum teges crus mollibus tu velleribus.

Lib. 10. ph.  
local.

Hoc sanè vtendi modo, inquit Galenus, & inueteratos capitis dolores, & aliàs omnes quacumque corporis parte inueteratas & ægrè solubiles affectiones ac resolutiones se curasse Damocrates, & omnino vitia in quibus alij sinapismo, alij remedio ex thapsia vtuntur, se hac herba perfasse ait. Idem omnino ad ischiadidas remedium Aëtius bis habet. Idem & Plinius his verbis. Radici Iberidis odor nasturtij. Vſus æſtate efficacior, & recenti tantum. Tunditur difficulter: coxendicibus, & articulis omnibus cum axungia vtilissima, viris plurimum quaternis horis, fceminis minùs dimidio adalligata, vt deinde in balneis descendatur in calidam, & postea oleo ac vino corpus perungatur: diebusq; vicens interpositis idem fiat, si qua admonitio doloris superſit. Hoc modo rheumatismos omnes faciat occultos. Imponitur non in ipsa inflammatione, sed imminuta. Ex his grauiſſimorum auctorum scriptis locum in Dioscoride capite de Iberide corrupto legi putat Cornarius, Καὶ ἐλάω μετ' ἐξ ἑ τοῖς τόποις ἐπιχέσθω, & postea oleo cum lana locus perungatur, pro ἢ ἐλάω μετ' ὀνὺς τοῖς τόποις ἐπιχέσθω, hoc est, oleū cū vino locis illinatur: sic enim habent Damocrates & Plinius, vt ex superioribus intelligitur. Sic & Aëtius: ἐξελθὼν δὲ οἶνε καὶ ἰσχυρῶς περιχέσθω, καὶ περιχέσθω, σκέπε τὸ ἰχθὺν ἐξ ὁῦς καὶ θαρρεῖς. Id est, Egressus autem vino & oleo multo perfusus ac deterſus, coxendicem lanis puris tege. Et alio in loco. A balneo ad oleum multum paucum admodum vinum admisceto, & illinito. Superiores auctores radice Iberidis vſum solummodo ischiadicis præscribunt, Paulus etiā foliorum: sic enim scribit. Quæ verò Iberis apud nos fruticosa nascitur similibus lauri foliis, & multo amplioribus, respondere multa experimenta restantur, non solum in coxarum,

Li. 3. c. 184.  
& 12. c. 2.  
Lib. 25. c. 8.

In li. 10. ph.  
loc. Gal.

Lib. 12. c. 24

Lib. 3. c. 77.



sed in alijs quoque diuturnis affectibus. Per æstatem verò longè sunt efficaciora. Atqui si folia tunc non prodixerit, cortex ipsius radicis contunditur cum adipe fuillo, vt emplastri speciem repræsentet, inde linteolo dæsiore illitum locis maximè dolentibus imponitur, &c. Dioscorides etiam lepidij folia ad coxendicis dolores adhibet. Vis foliorum acris & exalfaciens, inquit, quapropter trita ischiadicis præsentissimum est auxilium, si cum helenij radice, quarta parte horæ illinatur: lienosis simili modo prodest: lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur. In quibus verba illa, si quarta parte horæ illinatur, quæ Græcè leguntur ἐπὶ τοῦ μέρους πρὸς τὸ ἄσπον ἄσπας mendo non carere suspicatur Cornarius. Cum enim ceteri omnes auctores, vt diximus, emplastrum ex lepidio positum, quatuor horas sinendum præscribant, credibile non est rectè hic legi, vt ad quartam horæ partem imponatur: neque enim tam breui tempore vires suas exerere potest: & fieri potuit, vt τὸ ἄσπον pro τὸ ἄσπας sit suppositum, quod faciliè euenire potuit, si quaternarij numeri nota, ὁ, interpreti fuit exprimenda. Porro reliquum lepidij in medicina vsum, & ex eius radice amuletum Plinius aliter quàm Dioscorides refert his verbis. Lepidium inter vrentia intelligitur. Sic & in facie cutem emendat exulcerando, vt tamen cera & rosaceo faciliè sanetur. Sic & lepras & psoras tollit semper faciliè, & cicatricum vlcera. Tradunt in dolore dentium ad alligatam brachio qua doleat, compescere dolorem.

## CORONOPUS. CAP. XLVII.

## Nomina



ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΣ, Latine Cornicis pedem significat, atque etiam refert, folijs ita fisis & dispositis vt Cornicis pedem repræsentent. Est enim Coronopus Dioscoridis acetarium olus, quo horti omnes hodie scatent, Manardi, Scaligeri, Matthioli, Fuchsi, Cordi, & aliorum doctissimorum herbariorum sententia, quod vulgò herbariorum à foliorum integrorum figura Cornu cerui, Gallis *Corne de Cerf*, Italis *Herba stella*, Germanis *Krautfuß* dicitur: etsi eius breuissima sit apud Dioscoridem descriptio: oblonga herbula est, inquit, per terram strata, fisis folijs, coquitur in olera. Radicem habet tenuem, adstringentem, quæ in cibo celiacis facit (vel vt in vetere codice legitur, ἢ ῥίζα ἐφομένη καὶ ἐσθιομένη ποιεῖ τὸ πρὸς κοιλιακὸς, idest, cuius radix elixa si edatur, celiacos iuuat.) Prouenit in aggeribus & locis incultis, & secus vias. Breuiter etiam eadem tradit Plinius. Coronopus oblonga herba est cum fissuris. Seritur interim, quoniam radix celiacis præclare facit in cinere tosta. Et alio in loco. Aculeatarum caules aliquarum per terram serpunt, vt eius quam Coronopum vocant. Quæ ex Theophrasto expressa sunt, qui Coronopum inter ἐπὶ γὰρ φυλλὰς, idest, ea quæ ab radice foliata sunt recenset: itemq; inter aculeatas & sponte crescentes herbas. Etsi verò Dioscorides Coronopum aculeatam esse herbam non dicat, neque de ea libro tertio cum cæteris aculeatis herbis agat, sed libro secundo cum oleribus, iisq; quæ in ciborum vsum veniunt, nemo tamen iure eorum sententiam reprehendere possit, qui Coronopum hîc depictum Dioscoridis Coronopum esse existimarunt. Theophrastus enim ad Coronopi foliorum præsertim recentium formam alludit, vt rectè cenfer Matthiolus, quæ ea sunt laciniarum tenuitate, vt aculeata videantur, cum tamen pungere non possint, vt cum acanthinis similiter ludit Dioscorides, vel vt ait Fuchsius, foliorum fissuras aculeos appelles licet. Coronopus igitur siue Cornu cerui, folia fert longa, angusta, hirsuta, & in singulis lateribus terna, quaternave foliola, ita vt folia integra Cerui cornibus ramolis simillima sint, per humum strata, & in stellæ figuram disposita, ex quorum medio rotundi & hirsuti oriuntur cauliculi spicam, florem, semen edentes, omnia hæc plantagini proxima, vt nullum ferè discrimen obseruari possit. Vnica nititur radice, innumeris tamè capillamentis stipata. Hæc Dioscorides & Plinius, vt diximus, celiacis

Li. 2. Diosc.  
c. 123.

Ca. 169.

Forma.

Li. 2. Diosc.  
c. 123.

Ca. 169.

Forma.




cœliacis prodesse scripserunt, quibus subscripsit Galenus. Coronopodis radix co-  
mesta, inquit, cœliacis prodesse creditur. Aëtius idem tradit. Paulus colicos iuuare  
scribit, non cœliacos. Nec librarij est hic error ex vocum affinitate decepti, sed  
ipsius auctoris Pauli, qui cum alaudam colicis auxiliari scripsisset, mox subiunxit,  
χορειαν ποδος ἢ ῥιζα αὐτῆς περὶ τὸ καλὸν ἀρετὴν ἐσθιωμένην. Id est, Ipsa etiam Co-  
ronopodis radix colicos iuuare creditur.

Li. 7. impl.  
Lib. 7.

Corn. Em-  
bl. 16. li. 2.

CORONOPVS, *Math.*



Scribit Matthiolus inueniri Coronopū sponte  
nascentem diluto extenuatoq; solo, in Comita-  
tu Goritienſi, quam ibi vulgus Serpentinā ap-  
pellat, quòd eius radix in vino pota viperarū,  
aliorumq; venenatorum animalium morſibus  
maximè aduerſetur, adeò vt ipſa ſola (id quod  
ſe experientia compertum habere affirmat) li-  
beret demorſos. Huius etiā meminimus in li-  
bro de iis quæ in aſperis naſcuntur, capite de  
Holoſtio. Eſt & Serpentina minima, nullatenus  
diſtans à ſuperiore, præterquàm exilitate: cau-  
liculis enim vix vncia, aut ſeſquiunciam æquat.  
In celſis montium iugis ſterilis Saenæ in Gal-  
lia Narbonenſi copioſè prouenit. Ea eſt, opinor,  
quam Pena pingedam curauit: & quam Monſ-  
pelienſes Holoſtium ſuſpicabantur, ſed perpe-  
ram propter radicis notam planè contrariam.  
Eadem etiam aut eam proximè referens, quæ à  
Cluſio nomine Holoſtij Salmaticenſis depic-  
ta eſt & deſcripta, vt oſtēdimus loco ſupra citato.  
Ex his quæ de Coronopo diximus, perſpicuum

SERPENTINA *Omnium*  
*minima, Lobellij.*



CORONOPVS *Silueſtris,*  
*ſive Serpentina.*



eſt vehē



est vehementer eos errare, qui Coronopum, plantam eam esse putant, quæ herbariorum vulgò Pes Coruinus, à nonnullis Pes gallinaceus dicitur, quo nonnumquam ad exulcerandas corporis partes, necessitate ita postulante vtuntur medici, cum reuera ranunculi species sit, vt suo loco dicitur. Fuere alij eruditi viri qui multum temporis & diligentia in plantarum natura cognoscenda posuere, qui

*CORONOPVS* Ruellij,  
ex Dodon.



*CORONOPUS* Mas-  
siliensis, Pena.


Li. 2. c. 62.



aliter de Coronopo senserunt. Leoniceus imprimis Coronopum eam herbam esse putat, quam ipse lingua vernacula Capriolam vocat, alij Itali sanguinellam, quod eam pueri astate in nares immittant, vt sanguinem eliciant. Cuius sententiam minimè probat Manardus. Nam etsi herba hæc in culmi fastigio quinque graciles veluti spicas gerat, quæ cum dilatantur, formam Pedis cornicis, vel alterius auis repræsentent, tamen cum hominum cibis nõ exspectatur, folioq; sit nullis incisuris dissecto, nec seratur in hortis, & arida sceni modo assurgat, Coronopus nullo modo dici potest. Quod si quis obiciat Plinio & Theophrasto Coronopum aculeatam esse herbam, atque ideo Capriolam, siue Sanguinellam esse posse, facile is refelletur, quod Capriolæ caulis calami modo geniculis interreptus humi minimè repat, sed rectus in altum assurgat, & culmorum more spicas ferat. Dodonæus quem Coronopum esse diximus, non Dioscoridis Coronopum, sed Pseudocoronopum vocat, atque aliam plantam exhibet, quam ad Coronopum Dioscoridis proximè accedere ait, quæ à Ruellio graphicè depicta est his verbis. Herbulâ prostratis itineribus & semitis passim viret, quasi pedibus calcari letetur, humi semper sparsa proserpit, folio in multas partes laciniato, sessilibus cauliculis, flore candido, exili inuolucris seminum orbicularibus, per ambitum echinatis, in quibus duplices prominulo ventre sinus extuberant, singuli singulorum seminum eo capaces. Vulgus quod folium multipliciter confectum in Ceruini cornu imaginem effigietur, hoc ei nomen non immeritò dicauit. Verùm quænam haberetur apud veteres, hæc herba Ruellius affirmare non audet. Pena verò hanc multò melius Coronopi speciem habendam esse censet, quàm Serpentariam Matthioli, quæ incerta est, & foliis longè dissimilibus, & potius holostij species. His idem Pena nouam antiquis & recentioribus indistinctam subdidit, quæ collibus & cautibus Massiliæ vicinis ad maris allisiones inter tragacanthum passim luxuriat, densissimo sparsoque foliorum stipatu, sedi minimi saxei montani, vel pinastris ritu, positu, & rigiditate



CORONOPVS Repens, Lobell.



rigiditate, innumera etiam sobole cauliculorum dodrantalium, semen pusillum plantaginis, aut serpentinae vulgaris spicis includentiū. Radix longiuscula, lignosa, crassior, gustu nonnihil calida, aromatica.

MENTHA CAP. XLVIII.


**M**ENTHAE nomen suauitas odoris apud Græcos mutauit, inquit Plinius, cum alioqui Mintha vocaretur. Vnde veteres nostri nomen declinauerunt. Quæ sic scripsit Plinius, quod *ἡδύσχοπος* Græcis nunc appelletur ab odoris iucunditate, quæ antea *μύθη* dicta nobis Mentham fecit, Arabes *Nabatnaho* vocant, Itali *Mentha*, Germani *Mentz*, Hispani *Hierua Buena*, Galli *Menthe*. Dioscorides duorum duntaxat Menthæ generum meminit, satiuæ siue hortensis, cuius ut vulgò cognita descriptionem prætermisit, & siluestris, quam Mentastrum Latini vocant. Recentiores plures Menthæ hortensis species esse annotarunt. Matthiolus plures Menthæ hortensis species esse ait. Vna enim, inquit, breuioribus & crispioribus constat foliis, alia rubenti caule & flore, alia albicante. Fuchsius genera quatuor, sed diuersa depinxit, totidem Dodonæus, siluestris duo. Matthiolus primâ Menthæ specie breuioribus

*Nomina*  
Lib. 19. c. 8.

*Lib. 3. ca. 35.*  
*Genera*

*Cap. 110.*  
*Lib. 2. c. 62.*

MENTHA Satiua Crispa,  
Dodon. primâ.



MENTHA Satiua, Matth.  
prima, Dodon. 111.



& crispio



& crispioribus constare foliis scribit, de qua mox ex Dodonæo & Fuchſio dicemus, aliam rubente caule & flore, aliam albicante, quas duas postremas depinxit. His addidit Mentham Græcam, quæ Salvia Romana nominatur, de qua alio capite tractabimus. Fuchſij & Dodonæi mentha ſatiua prima ea eſt quæ mentha criſpa, Gallicè *Menthe creſpue*, Germanicè *Deyment*, & *Kranſdeyment* vocatur.

*MENTHA ſatiua*  
altera, Matth.

Forma.



*MENTHÆ Sarracenica*,  
ſpecies altera Myconij.



Mentha vulgata ſerpens rotundiore folio Lobellij. Cauliculos edit quadrāgulos, nigricantes, lanugine pubescentes: folia ſerè rotunda, ſerrata, ſaturatæ viriditatis, criſpa, mollia, odoratiſſima: flores purpureos, internodia geniculatim coronantes verticillato ſemper ambitu. Radice eſt fibrata per terrā longius euagante. Altera eorundem ſatiua Mentha Germanorū *kranſmuntz* & *kranſoalſam*, id eſt, Baſamū criſpū, Lobellij. Mentha rotundifolia altera, flore ſpicato, ſiue cruciata Mentha, ſuperiori valdè ſimilis eſt, foliis rotundis, nigricantibus, odoratis, cauliculis quadratis, radicibus per terram ſerpentibus: ſed in ſtagitiis flores ſunt ſpicati. Hæc eſt Mentha ſecunda ſatiua Matthioli. Mentha ſatiua tertia eiſdem Dodon. Mentha Sarracenica, & Mentha Romana quibuſdam dicitur, Gallicè *Menthe de Noſtre Dame*, & *Mente Romaine*, Germanicè *Baſammuntz*, & *Unſer fraunenmuntz*. Lobellij Mentha Romana Officinarum, ſiue præſtantior, anguſtifolia, ſatiua prima Matthioli, folio longiore & acutiore conſtat, ſalicis folio ſimili, ſed candidiore molliore, & hirsuto: ſtoſculis purpureis cauliculorum cacuminibus ſpicatim inſidentibus, radice tenera, fibrata. Aliam Menthæ Romanæ, ſiue Sarracenicæ ſpeciem ex Myconio hîc appinximus: quæ à Pyreneorum montium incolis, vbi frequens naſcitur, vocatur *Herba del Moro*, id eſt, Herba Sarracenica. In locis frigidis maximè prouenit, in pratis, & iuxta fluentia, vix alibi. Herba eſt cubitalis, interdū minor. Ramulos à radicibus multos edit, aliqua ex parte per caulis longitudinem, velut ſtriis notatos, nonnihil lanuginofos, in quibus folia parua, breuia, non admodum lata, viridia, in ambitu ſerrata, odorata, medio inter ageratum vulgare & Menthaſtrum odore, & tam ſimili Menthæ Romanæ vulgò dictæ, vt hæc illi commodè poſſit ſuccedere. Flores in cacumine multi, anthemidæ ſimiles, in medio luteoli, in ambitu candidi, odorati. Radices ſubſunt candicantes. Floret Iulio & Auguſto menſibus. Iuribus carnum eam incoquunt ad ſaporis gratiam. Myconius Menthæ Romanæ ſpeciem



speciem esse credit, sapore, odore, & simili fermè foliorum figura inductus, nisi docti alij herbarij aliter senserint. Quarta Mentha Germanis *Herzkraut*, & *Balsamkraut* dicitur, Gallicè *Herbe de cœur*. Lobellij Mentha Romana angustifolia, siue cardiaca: foliis itidem longioribus est, caulibus & radice proximè dictæ similis,

*MENTHA Sativa*  
quarta, Dodon.



sed flores purpurei geniculatim internodia haud secus quàm in prima specie caules coronant. Mentha silvestris siue Menthastrum ἡδυόσμος ἄγρος Græcis, Gallis *Menthe sauvage*, & *Menthe chevaine*, Germanis *Rosmuntz*, & *Wilderbalsam*, Italis *Mentastro*, hirsutior est folio, ut ait Dioscorides, & prorsus maiore quàm sisymbrii, grauiore odore, quare minùs ad sanorum vsus expetitur. Idipsum est herbariorum sententia quod hic exhibemus. Cauliculos habet quadrangulos, hirsutos: folia longiuscula, rugosa, mollia, tam supernè quàm infernè lanugine canescentia, & hirsutiora, sisymbrio procerius, odore magis viroso, flosculis spicatim cauliculorum fastigia coronantibus, radice est tenera & fibrata. Alterum Menthastrum genus Dodonæi, sisymbrium est, de quo proximo capite agemus. Lobellius Menthastra alia ostendit. Campense & Zuulense, Mentastro vulgari persimile, sed foliis nigrioribus, longioribus, profundius crenatis, minusq; incauis & hispidis, & florum spicatorum diuisura. In agro Frisio secus Campen & Zuulen oritur.

*MENTHASTRUM*  
vulgare, Matth.



*MENTHASTRUM Campense*  
& Zuulense, Lobellij.





## MENTHASTRVM


niueum Anglicum, Pena  
& Lobellij.



Tempus.  
Lib. 3. ca. 35.  
Vires &  
Temper.

## MENTHASTRVM

minus spicatum, Lobellij.



Li. 19. c. 10.

Li. 10. c. 14.

Menthastrum niueum Anglicū, quod cultio-  
res horti alunt in Anglia, vt ait Pena, vulgato  
longè minus & odoratius, cuius folia partim  
sunt viridi colore, partim niueo candore & læ-  
uore nitidissimo, cuiusmodi in hyssopo & sal-  
uia illic euenire ipsemet Pena annotauit.  
Menthastrum minus spicatum, odore mirius  
minuſq; graue, folio Heliotropij Tricocci. Sa-  
tiua Menthae passim in hortis proueniunt.  
Amant apricum locū, non pinguem, non ster-  
coratū: humidis facilius adoleſcunt. Mentha-  
strum vliginosis locis gaudet: passimq; irrigua  
hoc Menthaſtro pubent. Florent omnes mēſe  
Augusto. Superest vt Mēthae vires declaremus,  
primum ex Dioscoride. Mentha hortenſis cal-  
faciendi, adstringendi, atq; exſiccandi vim ha-  
bet. Siſtit ſanguinem pote ex aceto ſucco: ti-  
neas in ventre teretes enecat: venerē ſtimulat.  
Singultus, vomitiones, choleraſq; ſedant terni  
ramuli cum acidi granati ſucco poti. Suppara-  
tiones diſcutit, ſi cum polenta illinatur. Impo-  
ſita fronti capitis dolores mulcet: mammæ ſi  
tendantur, aut lacte turgeant compeſcit: cum  
ſale canum morſibus illinitur: aurium dolori-  
bus cum aqua mulſa ſubuenit: vuluę ante coitū  
admota conceptioni ſiſtit: lingua ſcabritiem  
cōſtricta læuigat: Lac coire denſariq; in caſeum  
non patitur, ſi folia (aliàs κλωνία, id eſt, ramuli)  
portionibus lactis immergantur. In ſumma ſto-  
macho vtilis eſt, & in condimentis peculiarem  
gratiam habet. Ex Plinio. Grato Mentha men-  
ſas odore percurrit in ruſticis dapibus. Seme-  
ſata diutina ætate durat. Et aliquanto poſt.  
Menthae ipſius odor animum excitat, & ſapor  
auiditatem in cibis, ideo embammatum miſtu-  
ræ familiaris. Ipſa acſcere aut coire, denſariq;  
lac non patitur. Quare lactis portionibus addi-  
tur, ne huius coagulati potu ſtrangulentur. Da-  
tur in aqua aut mulſo: eadem vi reſiſtere & ge-  
nerationi creditur, cohibendo genitalia den-  
ſari. Aequè maribus ac ſcēminis ſiſtit ſanguinē,  
& purgationes ſcēminarum inhiſcet: cū amylo  
ex aqua pota celiacorū impetus. Syriation  
& vomica vuluę curauit. Ille & iocinorū vi-  
tia ternis obolis ex mulſo datis. Itē ſanguinem  
excreantibus in ſorbitionem. Vlceræ in capite  
infantiū mirē ſanat; arterias humidæ ſecat, ſic-  
cas adstringit. Pituitas corruptas purgat in mulſo & aqua. Voci ſuccus ſub certa-  
mine vtilis duntaxat, qui & gargarizatur vva tumente, adiecta ruta & coriandro ex  
lacte. Vtilis & contra tonſillas cū alumine, lingua æſperæ cum melle: ad conuulſa  
intus



intus per se, vitiisq; pulmonis. Singultus & vomitiones sistit cū succo granati, vt Democritus monstrat. Recentis succus nariū vitia spiritu subductus emēdat. Ipsa trita choleris, in aceto quidē pota. Sanguinis fluxiones intus. Ileum etiam imposita cum polenta: & si mamma tendantur. Illinitur & tēporibus in capitis dolore. Sumitur & contra scolopendras, & scorpiones marinos, & ad serpētes. Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus: itē sedis vitiis. Intertrigines quoque, vel si teneatur tantū, cohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt & lieni mederi eā in horto gustatā, ita ne vellatur, si iis qui mordeat dicat se lieni mederi per dies nouē. Arida quoque farinā tribus digitis apprehensam & stomachi dolorem sedare in aqua, & similiter aspersam in potionem, ventris animalia expellere. His Plinius partim plures virtutes Mēthæ quā Dioscorides tribuit, partim Dioscoridi apertē refragatur, qui Mentham ἀφροδισια ἐπέθει, id est, venerem stimulare dixit, Plinius eam veneri officere, adducta etiā cur id faciat causa, inquit Cornarius. At Plinius non dixit veneri officere, sed generationi resistere: quod ait Dioscor. ἀστυλασίου ἐπὶ γαστρί, Idem Florētinus in Geoponicis habet, Si Mentha in lac iniiciatur, etiam si coagulū postea immittatur, lac non coagulabitur. Et addit, Inepta etiā ac incōmoda rebus venereis habetur. Dioscoridi etiā Hippocrates & Aristoteles aduersantur, vterq; diuersam rationem secutus. Sic enim Hippocrates, Mētha calfacit, urinā ciet, & vomitus sistit. Et si quis sæpe comedat, semē genitale colliquescit vt diffuatur, arrigere prohibet, & corpus debile facit. Aristoteles in Problematis sic proponit. Cur dicitur Menthā belli tempore, neque edendā, neque ferendā esse? Num quia perfrigerat corpus? Indicat autē id seminis corruptio. Hoc autem contrarium est fortitudini, atque audaciæ, sicut ipse ostendit alio Problemate, cū ait, eos qui natura sunt frigida formidolosiores esse, contrā qui calida, audaces. At Hippocrates immodicū Mēthæ esum veneri resistere intelligit, quod caliditate sua sanguinē extenuet, & semē genitale colliquet, eamq; ob causam arrigere prohibeat. Aristoteles verò, Menthā corpus ex accidēte refrigerare, atque debilitare, quod semen corrūpat. Galenus Mēthæ facultates, & causam cur ad venerem incitet, exponit his verbis. Hedyosmos, alij verò Minthem odoratā vocāt. Est enim & alia quādā Mentha insuavis odoris, quā calaminthē vocāt. Vtraque gustu acri, & facultate calida est, ex tertio ordine calfacientium. Infirrior tamen est Mētha odorata quā calaminthe, & minū calfacit. Vt enim in vniuersum dicam, hæc seu siluestris quādā est, illa seu domestica. Quamobrē sanet ob eam quæ ex cultu accedit humiditatem, mediocriter item ad venerē excitat. Id quod omnibus accidit quæ humiditatē semicoctam & flatuosam continent. Ob talem ipsius herbar temperaturā in abscessibus ea quidā cū polenta mista vtūtur. Id quod in calaminthæ facere nequeas, propterea quod valentiū tum excalfaciat, tum desiccet quā id genus medicamenta poscant. Habet verò etiam quiddā amarū in se & acerbū. Illo quidem lumbricos interficit, acerbitate verò, si cum oxycrato bibatur, recētes sanguinis eiectiones reprimat. Substantia est, vt si qua alia herba, tenuium partiū. Nec omittenda sunt quæ Symeon Sethi de ea prodidit. Iuuat iecur frigidum, & ventrē corroborat ac stomachū, coctionē facit, vomitū sedat ac singultū. Prodest etiam ad cordis morsus, & appetitionem suscitāt. Flatus discutit, & lumbricos interimit, potissimū siluestris Mēthæ ius. Venerem stimulat, & iecoris obstructiones tollit. Verū hac vesci ad satietatem non oportet: quoniam sanguinem extenuat, & serosum facit, & ipsum in flauam bilem mutat. Dein efficit vt sanguis, qui maximē est tenuium partiū, discutiatur, & crassus ac melancholicus relinquatur. Quare oportet biliosos ab ea abstinere. Cōtrita cū sale & rabiosi canis morsui imposita, medicamentum fit salubre. Arida verò trita, & post cibum sumpta ad concoctionem facit, & lienosos iuuat. Cum vino pota difficulter parienti succurrit.

Li. 2. c. 24.

Lib. 2. de diat.

Sect. 20. Prob. 2.

Li. 6. simpl.



Ferunt etiam quod manſa lippienti impoſita fiat remediũ: quodq; eius decoctum abſorptum conſeſtim ſanguinem ex faucibus eiicientes ſanet. Huius ſemẽ ventrẽ purgat, & pulmonem lædit. Scribit Matthiolus aquã è tota Mentha planta deſtillatam, quatuor vnciarũ pondere epotam ſiſtere ſanguinem (quod mirum fortaſſe multis videbitur) è naribus profluentem. Sunt & expendenda quæ de Menthafro ſcribit Plinius. Genus eius (Mentha) ſilueſtre Menthaſtrum eſt, & hoc propagatur vt vitis, vel ſi inuerſi rami ſerantur. Et aliquãto poſt. Menthaſtrũ ſilueſtris Mẽtha eſt, differens ſpecie foliorũ, quaſi figura ocimi, pulegij odore, propter quod quidã pulegiũ ſilueſtre vocãt. Legitur tamen in excuſis exẽplaribus pulegij colore, quod falſum eſſe odor vtriuſque arguit, & ex Dioſcoride perſpicuẽ oſtẽditur, qui capite de calamintha, pĩmã & ſecundã eius ſpecie iũdem planẽ deſcribit verbis, quas duas ſpecies Plinius in vnã Menthaſtri ſpecie cõfudit. Et Galenus loco antea citato calaminthẽ velut ſilueſtrẽ quãdam Menthã ſatiã oppoſuit. Poſtea tamen de calaminthe ſuo ordine ſeorſum tractat. Neque ſanẽ mirũ, inquit Fuchſius, quandoquidẽ auctores ſocietate quẽ eſt inter Menthã, Menthaſtrũ, & Neperã decepi, tum ſpecies, rũ nomina cõfundunt. Plinius Menthaſtri deſcriptioni mox vires & eius in medicina vſum ſubiungit, qui à Dioſcoride capite de Mẽtha prætermiſſus eſt, ſed eadem capite de calamintha ferẽ omnia calaminthæ ab eo attributa repe- riuntur. Sic igitur Plinius habet. Iis (Menthaſtri folijs) cõmanducatis & impoſitis ſanari elephantiaſin, Magni Pompeij ætate fortuitò cuiuſdã experimẽtò propter pudorẽ faciei illa compertũ eſt. Eadem illinũtur bibunturq; aduerſus ſcolopen- dras & ſerpentiũ ictus, drachmĩs duabus, in vini cyathis duobus. Aduerſus ſcõr- pionũ ictus cũ ſale, oleo & aceto. Itẽ aduerſus ſcolopẽdras ius decocti. Aduerſusq; omnia venena ſervantur folia arida ad farinã modũ. Subſtratũ vel accẽſum fugat ſcorpiones. Potũ ſcẽminas purgat à partu: ſed partus necat. Orthopnoicis, tormi- noſis inſtillatur: in regio morbo bibitur: Strumis illinitur. Sõnia veneris inhibet. Tineas pellit ex aceto potum. Contra porriginẽ ex aceto inſunditur capiti in ſole.

## SISYMBRIUM.

## CAP. XLIX.

## Nomina



ATINI Sisymbrium, vt Græci *σιςυμβριον* vocãt, Arabes *Sinasbarium*, ſeu *Sinasbar*. Sisymbriũ autem dici putat Varro à Sisymbrio, quæ fuit veteribus comœdiis meretricula. Coronã etiam veneris nõnulli ap- pellarunt, q; ob odoris ſuauitatẽ quã præ ſe fert, eo iuuetus, quæ amo- ribus gaudet coronata, in comẽſtationibus ſuis blando odoris oblectamento ſuas illecebras cõmendaret. Dioſcorides duo facit Sisymbrij genera. Vnum Sisymbriũ ſilueſtre, alterũ Sisymbrium cardaminẽ. De hoc quod ſolo nomine priori ſimile eſt, iam diximus, de illo nũc dicendũ. Eſt id Sisymbriũ Mẽthẽ ſpecies. Vnde Gallis dicitur *Menthe aquarique*, Germanis *Fifhmuntz* & *Vaſſermuntz*. Lobellij aquati- ca, ſiue Sisymbria Mentha, Baſamĩne Officinarum. Eſt enim hæc planta primæ menthæ hortẽſis ſimilis, quadrato caule, quadãtenus purpureſcente, folijs mẽthẽ, ferratis, latioribus, & odoratioribus: floribus purpureis, albicãtib; cauliculorum ſummitati inſidentibus, rotundorũ capitulorũ inſtar: radicibus longis, per terram ſerpentibus. In aquoſis naſcitur. Quæ cũ Dioſcoridis Sisymbrio conueniunt, ſic ſcribentis. Sisymbriũ in ſolo inculto naſcitur, menthæ hortẽſis ſimilitudine, odo- ratius, latiorẽ folio: inſeritur coronis. Idem Sisymbrium intelligit Plinius, cum ait. Sisymbriam ſilueſtre à quibuſdã Thymbrum appellatũ, pedali non amplius alti- tudine. Et alibi. Serpyllo & Sisymbrio montes pleriq; ſcarent, ſicut in Thracia, vbi aquæ ex iis deferunt auulſos ramos, ſeruntq;. Item Sicyone ex ſuis montibus, & Athenis ex Hymetto. Simili modo & Sisymbrium ſerunt. Latiffimum naſcitur in puteorum

## Genera

## Forma.

## Locus.

Li. 2. ca. 121.

Li. 20. ca. 22.

Lib. 19. c. 8.



*SISYMBRIUM Silvestre.*



*SISYMBRIUM Hortense.*



puteorū parietibus, & circa piscinas ac stagna. Quæ ex Theophrasto expressa sunt sed perpe-  
ram. Nam Theophrastus lib.6.hist.c.7.Serpyl-  
lo nō Sisymbrio alicubi mōtes planaꝫ; scatere  
tradit, vt in Thracia. Præterea serpyllū siluestre  
esse, quod quidā ē mōtibus delatum ferunt, vt  
Sicyonenses & Athenienses ex Himetto, &c.  
Vt legendum sit, si Theophrastum sequamur.  
Serpyllo mōtes alicubi planaꝫ; scatent, sicut in  
Thracia, vbi quidam, non aquæ deferunt ex iis  
auulsos, &c. At idem Theophrastus locis ali-  
quot satiui Sisymbrij mentionem fecit. Quod  
Matthiolus & periti herbarij eam esse putant,  
quam Officinæ Balsamitam appellant, vulgus  
Menthā Romanam, siue crispā, Galli *Bau-*  
*me crepū*, Florentinus in Geoponicis videtur  
Balsamum hortensē appellasse. Lobellio est Si-  
symbria Mentha agrestis satiua, cruciatæ Men-  
thæ, idest, secundæ Mēthæ satiua Dodonæi su-  
periori capite descriptæ congener aut eadem.  
Italici etiā *Balsamita*, seu *Mēthæ crepæ*. Folia  
enim profert rotunda, vulgaris menthæ foliis  
latiora, crispā: caulē quadrangulū, rubentē, vi-  
rentemq; odorēq; est quā mēthā vehemen-  
tiore. Denique Balsamita facili in menthā de-  
generat, nisi diligens adhibeatur cultura, quod  
de Sisymbrio prodidit Theophrastus. ἡ δὲ τῆς  
σισυμβρίου εἰς μίνθαν δι' ἀργίαν γενομένη, συμβαίνει  
ἡ ὅταν μὴ εἰς ἐξεργάζῃ, μὴ δ' ἀποδιδῶ τὴν οὐκ εἰς  
θεραπεύαν, ῥιζοῦσθαι μᾶλλον εἰς τὸ χάρτω. ῥιζοῦσθαι  
δὲ, ἔ τὴν διωκτικὴν ἐκείσε τρέπον πᾶσαν ἀσθενέστερον  
εἴωθε γίνεσθαι, καὶ τὴν λευκὴν ἀποβάλλει τῆς  
δομῆς, ὥστερ' ἐξ ἀμφωδῶρων ἡ οὐμοδῆς, ἣ δὲ βλαστῆς,  
ἢ τῆς δομῆς. τῆς δὲ λευκῆς ἀφαιρουμένης, ἡ καλὰ  
λοιπὸς δομῇ μαλακῇ τις ὅρα, καὶ ἀντιμῆνη, πρὸς σερπυλλῆς  
τῇ μίνθῃ γινέσθαι. Id est, Sisymbrij in menthā mu-  
tatio ex neglectu euenit. Cum enim quis non  
excolit, neque solitā curam adhibet, radicatur  
magis in inferiora: cū autem radicatur, & illuc  
totam vim conuertit, debilius Sisymbriū solet  
reddi, odorifq; sui acrimoniam amittere, quasi  
ex ambobus illis germine atque odore simili-  
tudo proueniat: sublata enim acrimonia, reli-  
quus odor mollis & remissus, fit menthæ simi-  
lis. Plinius non in mentham, sed in calamintham degenerare Sisymbriū dixit. Sed  
cū id, ex Theophrasto hausisse certum sit, mēdosē calaminthā pro mēthā legi  
viri docti existimant: Degenerare autē odore quē vehementissimū habet, Sisy-  
mbrium in menthā, non tota specie & natura in ipsā transire quidā credunt. Qua  
de re Scaligeri eruditissimi & integerrimi viri sententia hæc est. Quidam præci-  
piti ingenio maleferiati, qui ad primā quamq; inspectionē transfugiunt à receptis

Lib.6.hist.  
ca.7.

cap.23.lib.ii.

Forma.

Lib.5.caul.  
ca.8.

Li.19.ca.10.

Lib.1.depl.



*Vires &  
Temper.*

Lib. 2. c. 121.

Li. 20. c. 22.

Li. 8. simpl.

Li. 2. Dios.  
cap. 121.

*Nomina*

Lib. 2. c. 64.

*Forma.*

Lib. 1. c. 32.

Lib. 2. c. 91.

Li. 20. c. 17.

opinionibus, ac temerè constituunt effata vniuersalia: Sifymbrium menthæ odorè tantū capere, non autē speciem sibi vindicare. Nos verò, inquit, Sifymbrio perire pristinam faciem, nitore, rotunditatē, odorem, saporē, acque abire in mentham, & vidimus sæpenumero, & meminimus, & profitemur. Sifymbrium siluestre calfaciendi vim habet, vt auctor est Dioscorides. Contra stillicidia vrinæ calculosq; semen ex vino bibitur: tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore fronti & temporibus illinuntur: itē cōtra vesparū apumq; ictus. Vomitiones potu cohibet. Plinius prolixius tam Sifymbrij siluestris, quàm Sifymbrij cardamines facultates simul declarat. Breuius verò & apertius Galenus huius de quo agitur, his verbis. Sifymbrium tenuium est partium, digerentis, excalfacientis, & resiccantis facultatis est, & temperaturæ in tertio ordine: sed & semen eius tenuium est partium, & calidum: quocirca ipsum quidam cum vino exhibent singultientibus, & tormina patientibus. Hæc Galenus. Sifymbrium tam hortense quàm sponte nascens, vt tradit Matthiolus, flatus & lumbricos pellit cū herba ipsa in puluerem trita, tum decoctū eius potum. Valet ad vteri inflationes, si cū parthenio in calente regula calfactū, & odorato mero aspersum ventri applicetur. Valentius vteri doloribus à partu subuenit, si cum parthenio, anthemidis flore tenuiter cōcisā tribus aut quatuor ouis excepta, in patella cum oleo lilino ad ignem fiat placenta, quæ calida vmbilico applicetur. Illinitur tam recēs, quā sicca herba calfacta, & vino Cretico aspersa ad ventriculi dolores. Succus testibus illitus seminis profluuium cohibet.

#### COSTVS HORTENSIS. CAP. L.



VAE hic exhibetur herba, viuacissima passim in hortis prouenit, à quibusdā mentha Græca, & mentha Sarracenica, in Hetruria Saluia Romana, quod folijs saluiam potius, quàm mentham referat, ab alijs Herba D. Mariæ, à quibusdā Lassulata nominatur. Dodonæus Balsamitam vocat, Galli *Coq.* Hanc faciunt peregrino illi Costo vel nomine affinem, & Costum hortensem appellant. Quorū iudicio subscribere videtur Florentinus in

#### COSTVS Hortensis.



Geoponicis, cū Costū & balsamū in hortis feri viuiradice Nouēbri mēse prodit, odoratu perquam suauē: vt sampsuchum Aprili & Maio. Nam balsamum sua ætas sifymbriū hortense, vt diximus, & Costū herbā de qua hīc agimus, videtur innuisse. Costus hīc folio est saluia longiore, latioreq; betonica æmulo, per oras serrato, in viridi albicante: caulibus cubitalibus, & aliquādo maioribus, in quorū cacumine flores lutei, capitelli similes, vt in tanaceto, sed minores: radice fibrata, & furculosa. Tota herba amara est, & substringens, grauitérque odorata. Hæc est Matthioli. Mentha Græca, & multorum herbariorum Costus hortensis. Atque ita se sentire cum Ruellius duobus locis apertè declarasset, alio Costum hunc hortensem, Gallorum *Coq.* siliquastrum, siue Piperitidem Plinij esse putat, quam Castor demonstrauit caule rubro, longo, densis geniculis, folijs lauri, semine albo, tenui, gustu piperis, vtilem gingiuis, dentibus, oris suauitati, & ruētibus. Quæ siliquastrum effigies, inquit, cum Costum nostrum in hortis nascentem exprimat, nulla refragante delineatione, cui etiam



etiam vires adstipulantur, hunc Plinij siliquastrum, seu piperitidem esse credit. Sed cum siliquastrum siliquas magnas & oblongas producat, unde siliquastrum nomen inuenit, & semen eius gustatum saporem piperis præ se ferat, unde etiam piperitis nuncupatur, ut capite de siliquaastro diximus hac in re Ruellium hallucinatum esse constat. Sunt quibus Costus hic noster potius Leucas Plinij esse videatur, de qua pauca hæc scripsit. Leuce mercuriali similis, nomē ex causa accepit, per medium folium candida linea transcurrente. Mox subiicit, fortassis eadem sit quæ Leucas appellatur, contra omnia marina venena efficax. Speciem eius auctores non tradunt, nec aliud quàm siluestrem latioribus foliis esse efficaciorē, hanc semine acriorem. Tota Costi hortensis planta auctore Matthiolo, exalfacit, siccatur, aperit, attenuat, roborat, abstergit, & prouocat, auxiliatur vteri affectibus. Medetur hydropicis, & præsertim anasarca laborantibus: quia refrigeratū hepar exalfacit, & vasorū obstructions aperit. Illinitur ex oleo irino lienosis, & ex vino feruēfacto vrinam ægrè reddentibus. Lentigines, alphos, & alia cutis vitia absterget illitus noctu succus, folia adduntur in placentas quæ à mulieribus vteri affectibus obnoxiis eduntur. Sunt qui ea tenui pulicula illita frigunt patellis in oleo aut butyro, & iis in cibis vtuntur. Huius epotus succusalui tineas, & lumbricos necat: frigidovtero subuenit: ventriculū roborat tam haustus quàm illitus, & vomitio- nes compescit. Tota planta tum substratu, tum suffitu serpentes fugat, & eorum venenis resistit.

Lib. 27. c. 11.

Lib. 3. c. 35.  
Diosc.

Vires &  
Temper.

OCIMUM. CAP. LI.

**Q**UOD ὄκνον Græci dicunt, Latini similiter Ocimum appellant, Mauritani Berendaros, & Bedarog, Itali Basilico, Germani Basilien. & Basilgram, Hispani Albahara, Galli Basilic, quod nomen apud omnes ætatis nostræ herbarios, & Officinas, & multas gentes increbruit, à recetioribus Græcis deriuatum, qui βασιλικὸν vocant, id est, regium, quod ob præstantem odorem basilica, id est, regia domo dignum sit. Sunt tamen qui Ocimum cario-

Nomina

OCIMUM Maximum.



phyllatum duntaxat sic nominant. Ocimum autem quibusdam à nascendi celeritate dictum videtur, quia à sato tertio statim die erumpit. At verius id ocymo etymum videtur conuenire, quod pabuli & farraginis quoddam genus est, sic nominatum ab ὄκνος Græca dictione, quæ citum significat. Quare sunt qui significantius per ζ, scribendū putent ozimum, ab ὄζω, quod valet redolere: quoniam tota herba suauissimū odorem spiret. Sunt qui statuunt Ocimi duo genera, vnum latiora folia habens, alterum angustiora. Fuchsius tria, ocimū exiguum, alterum mediocre, tertium magnum, foliis tantū distantia, quæ in primo genere sunt admodum exigua, in altero paulò latiora, in tertio latissima, quibus tribus vnus idēque est odor. Matthiolus quoque tria haberi Ocimi genera tradit, eaque in secunda in Dioscoridem cōmentariorum editione accuratius quàm in prima distribuit, hoc modo. Primum Ocimum est maximum. Secundum medium siue mediocre: cuius duæ sunt species, alterum enim vulgaris ocimi, alterum citrei mali odore est, quod eam ob

Dodo. lib.  
2. cap. 60.  
cap. 207.

Genera.



causam citratum vocarunt Arabes. Tertium ocimum minimum est, quod Itali *Basilico Gentile* vocant. Quorum omnium meminit Serapio de ocimo differens, appellans medium de quo tractauit Dioscorides, ocimum non caryophyllatum,

Lib. 2. c. 135.

*OCIMUM Medium,*

*Fuchsij.*

*Forma.*



*Locus.*

Lib. 5. cauf.  
cap. 8.

*OCIMUM Medium,*

*Matthiol.*



Lib. 2. c. 135.

*Uiresc.*

*Temper.*

mouet sternutamenta, quod idem herba efficit. Sed oculos premi necessum est cum

caryophyllatū verò omnium tum minimum, tum odoratissimum, postremum citratum ab odore. Ocimum pedali altitudine profilit, surculosum, ramulis rotundis, folio diluti viridis, floret particulatim, primò parte inferiore, deum superiore: flosculo candido aliquando purpureo: semine paruo & nigro. Radix vna descendit crassior & lignosa, cetera, à lateribus funduntur exiles ac prolixæ. Ocimum maximū Matthioli folia habet amarantho longe maiora, lata, longa, crassa, citrea malo similia. Secundum foliis est & ramulis minoribus, cuius vna species vulgare ocimum, altera citream malum odore adeo refert, vt nulla ferè inter ea odoris differentia percipi possit, vnde citratum Mesues, atque alij eiusdem familiæ auctores, vt diximus, appellarunt. Tertium foliis constat angustis, minutis, &c. odoris præstantia superat. Ocimum in hortis satum feliciter prouenit. Passim etiam in figulinis vasis extra fenestras adium fouetur. Iunio & Iulio mensibus floret, dein semen producit. Ocimum quandoque in serpyllum degenerare auctor est Theophrastus, & causam ad Solem refert. το δὲ ὄσιμον, inquit, τὸ ἐν ἡλίῳ πολλὸς καίμενον ἀφ' ἐρπύλλου, διὰ τὸ ξηραίνεσθαι καὶ ἄλλων. καὶ γὰρ τὸ φύλλον ἑλπίσιν γίνεται, καὶ ἡ ὄσμη δειμυτέρα τῶν ξηρῶν. ἑλπίσιν γὰρ καὶ ἡ τροφή. Id est, Ocimum quod in sole sæpe situm est, abit in serpyllum, quia magis siccat. Etenim folium minus redditur, & odor vehementior est siccorum: minus enim ea aluntur. Ocimum vt tradit Dioscorides, copiosiore cibo oculorum aciem hebetat, alium mollit, flatus mouet, vrinam pellit, lac euocat: agrè tamē conficitur. Illitum cum polline potentæ aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est (Græca pulmonum vocem non habent, nec eam Cornarius in conuersione sua expresit) Draconis marini & scorpionis ictibus per se prodest, & cum vino Chio oculorū doloribus (quæ aliter ex Græco sunt distinguenda, Draconis marini & scorpionis ictibus, per se autem in vino Chio, &c.) Succus visus caliginem abstergit: destillatione exsiccat. Semen potum conuenit atram bilem gignentibus, difficili vrinæ, inflatisq; naribus haustum subinde



OCIMUM Paruum.



OCIMUM Caryophyllatum.



cum sternutamentum virget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant, quandoquidem manducatum & in sole positum vermiculos creat. Aphri autem adiiciunt, si feriantur à scorpione qui ocimum ederunt, nullo conflictari dolore. At non solum ut noxium in cibis, sed & ut in medicina inutile & perniciosum veterum quidam grauitè repudiarunt, quod declarat Plinius his verbis. Ocimum quoque Chrysippus grauitè increpuit, inutile stomacho, vrinæ, oculorum quoque claritati. Præterea infantiâ facere & lethargos, & iocinoris vitia: ideoque capras id aspernari. Hominibus quoque fugiendum censet. Addunt quidam tritum si operiatur lapide, scorpionem gignere: commanducatum & in sole positum vermes asserere. Aphri verò, si eo die feriat quispian à scorpione, quo ederit ocimū, seruari non posse. Quinimo tradūt alioqui manipulo ocimi cum cæcis decem marinis vel fluuiatilibus trito, conuenire ad id scorpiones ex proximo omnes: Diodotus in Empiricis, etiam pediculos facere ocimi cibum. Secuta ætas acriter defendit id esse capras nec cuiquam mentem motam: & scorpionum terrestrium ictibus, marinorumque venenis mederi ex vino, addito aceto exiguo. Vsu quoque compertum deficientibus ex aceto odoratu salutare esse: item lethargicis & inflammatis refrigerationi. Illitum capitis doloribus eum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris impositum ex vino, stomacho quoque utile, inflammationes & ructum ex aceto dissoluere sumptum. Aluina sistere impositū, vrinā ciere. Sic & morbo regio, & hydropicis prodesse, choleas eo, & destillationes stomachi inhiberi. Ergo etiam cœliaci Philistio dedit, & coctum dysentericis & colicis Plistonius. Aliqui & in tenesmo, & sanguine excreantibus in vino, duritia quoque præcordiorum. Illinitur mammis, extinguitque lactis prouentum. Auribus vtilissimum infantium, præcipuè cum adipe anserino. Semen tritum & haustum naribus sternutamenta mouet, & destillationes quoque capiti illitum. Vuluas purgat in cibo ex aceto. Verrucas misto atramento sutorio tol-

Lib. 20. c. 12

lit. Venerem stimulat, ideo etiam equis asinilque admissuræ tempore ingeritur. Hæc Plinius. Auicenna etiam libro de viribus cordis à Dioscoride dissentire videtur: scribit enim Ocimum sanguinem turbidum & melancholicum generare: quoniâ superuacua humiditas quæ in ipso est, parit inflationem in venis. Nec aliter videtur sensisse Galenus, cum ait. Ocimum ex secundo est ordine excalfacientium, ha-

Lib. 8. sim.

bet autem



bet autem recrementitiam humiditatem, proinde nec commodum est quod in corpus sumatur. Cæterum foris illitum ad digerendum, & concoquendum vile est. Et alio in loco. Ocimo plerique ut obsonio utuntur, ex oleo & garo esitantes. Vitiosi autem est succi, quod impulit quosdam, ut falsa de eo prodiderint, affirmantes quàm celerrimè paucis diebus scorpiones generare, si tritum in ollam novam immittatur, & potissimum si quis quotidie ollam ad Solem calfecerit, quod falsum est. Verè autem dixeris olus stomacho esse noxium, praviq; succi, & concoctu difficile.

## OCIMOIDES.

## CAP. LII.

## Nomina

Lib. 20. c. 13.

Lib. 4. c. 25.

Forma.

In lib. 4.

Diosc. cap.

26.

Cap. 343.



RAECIS *αμυροειδής* dicitur haud alia ratione, quàm quod ocimo foliis potissimum simile sit, ocimastrum à Latinis appellari in nothis Dioscoridis legimus, quasi silvestre ocimum, & sic ipsum videtur appellasse Plinius. Itali *Basilico saluatico* vocant, Hispani *Allahaqua montesina*, Galli *Basilic sauvage*. Ocimoides depinxit Dioscorides foliis ocimi, & ramis dodrantalibus, hirsutis, filiquis hyoscyamo similibus, semine ut gith, nigro prægnantibus, radice tenui & superuacua. Id Ocimastrum esse putat Matthiolus, quod hic exhibemus, passim copiosè nascens in Italia, præsertim inter segetes, propè septa, & in agrorum marginibus, foliis sanè ocimo satiuo similibus, ramulis hirsutis, quadratis, dodrantalibus aut cubitalibus, in quorum vertice flores exeunt candidi, quandoque purpurei, quod Dioscorides omisit, è quibus vascula enascuntur ut in hyoscyamo, capaci ventre, arctis faucibus, per ambitum denticulatis, viperinis dentibus similia, in quibus semen includitur nigrum, melanthio ferme similè. Ocimastrum aliud depinxit Fuchsius, cui quidem Dioscoridis descriptionem adeò conuenire putat, ut nulla prorsus reclamare nota videatur, siquidem folia fert ocimi, ramulos palmares, quadratos, hirsutos, flores purpureos, forma ocimi floribus similes, qui tamen colore, qui illis candidus est, constat: deci-

OCIMOIDES Maius,  
Matthiol.OCIMASTRUM  
Fuchsj.

denticibus



*OCIMOIDES Minus,*  
*sive album.*



*SESAMOIDES Paruum,*  
*sive Ocimoides minimum.*



dentibus floribus filiquas hyoscyamo similes, seminis nigri, melanthio similis plenas ostendit. Radice etiam nititur tenui & superuacua. His omnibus accedit odor, qui planè ocimum referre videtur. Dodonæus Acini nomine depinxit. Alia ocimastris genera Dalechampsio videntur esse. Primum ocimoides minus, fortasse Perdicium secundum Plinij. Id ex radice longa fructicat, crassiuscula, intus lignosa, carnosa pulpa foris obducta, nodosa, flagella multa huc illuc diffundente, ex quibus rami multi assurgunt cubitales, vel etiam proceriores, rotundi, geniculati: foliis binis ex singulis geniculis enatis, figura foliorum calthæ, aut violæ quam Cheiri vocant Officinæ, eiusmodi multis ad radicem iacentibus, & proximè terram stratis, circa caules longioribus & acuminatis: caulibus in summo sic pinguibus, ut dum attrectantur, melle peruncti censeferi possint, in ramulos plures fissis, rotundos, sesquipedales, geniculatos, ad genicula superiora, quæ folia prodire dictum est, nascetes, flore albo, ex quinque foliolis constructo, ea forma, ut singula foliola ex coniunctis duobus transcurrente linea diuisis composita videantur, ut in Dodonæi vaccaria, quam Officinæ Ben album vocant: calice post floris lapsum oblongo, in metam fastigiato, viridi, semine pleno, gustu læto & amaro. In asperis, sabulosis, frigidis & ventosis provenit, floret Maio mense. Id Clusius à Salmanticensibus Sesamoides magnum dici scripsit, eoq; nomine depinxit. Cui dissimilem omnino plantam subiungit, quæ etiam Salmanticensibus Sesamoides parvum nuncupatur, tametsi eius descriptioni minimè conveniat. Est verò ea dodrantalis, tres aut quatuor virgulas teretes ab una radice producens circa quas folia lini exigua, densa, inordinata, & in extremis plurimos flosculos, spica aut racemi instar cōfertos, ex herbaceo purpurascens primum, deinde tenuibus capillamentis ex albo pallascentibus ornatos, in quorum medio veluti quatuor grana viridia conspiciuntur, quæ decidènte flore in parvas filiquas excrescunt, semine exili nigricante plenas. Radice candida, satis crassa & dura quæ perennis est, & ante hyemè repullulat. In col-

Lib. 22. c. 17  
Forma.

Locus.  
Tempus.

libus Salmantica proximis provenit, lapidoso solo, ubi Maio floret, deinde semen profert. Ocimoides minimum dicenda potius quam Sesamoides. Ingrato est gustu & amariuscule. Pena plantas duas pictas dedit, quas à plebecula Muscarias, Vitæ & amariuscule. Pena plantas duas pictas dedit, quas à plebecula Muscarias, Vitæ & amariuscule. Pena plantas duas pictas dedit, quas à plebecula Muscarias, Vitæ & amariuscule.

vt





Lib. 27. c. 8.  
 Lib. 2. ff. rp.  
 Hufp. c. 53.

Lib. 4. c. 125.  
*Vires &*  
*Temper.*  
 Lib. 8. simp.

Lib. 20. c. 13.

vt non solum manum, sed etiam muscas & papiliones præteruolantes implicet. Priorem putamus esse. Ocimoides minus siue album à nobis modò descriptum. Alteram non multum diuersam esse scribit, folio, caliculis, semine, & cauliculis, sed perquam exiguo flore racemoso, ex luteo herbaceo, quam hîc appinximus. Alterum Ocimoides repens appellari potest, quod & cucubalum Plinij multi esse censent. De quo in libro, de iis quæ in vicina adminicula scandunt, tractauimus. Hæc de diuersis ocimastri generibus. Quibus addemus Ocimastrium Valentinum Clusij, quod est pedali altitudine, ramis quadrangulis, hirsutis: foliis per singula genicula ex aduerso sitis, ocimi magnitudine & forma, gustu adstringentibus: circa summos ramos flores proueniunt orbiculatim compositi marrubij modo, candidi, ocimi floribus similes in vasculis pungentibus, semine marrubij, nigro: radix vrticæ aut Lamij amula. Prouenit copiose circa riuos ex flumine ductos ad urbem Valentiam in Hispaniis, vbi eam initio Aprilis florentem & semine prægnantem obseruauit Clusius, nec vsquam alibi. Istic Ocimastrium appellant, et si odore Stæchadis Lobellius appellat. Cæterum ocimastri Dioscoridis semen in vino potum vim habet qua viperarum carcerarumq; serpentium moribus medeatur. Datur ischiadicis cum vino, melle, myrrha, & pipere. Ocimoides, inquit Galenus, quidam philetærium cognominant. Radix superuacua est, at semen tenuium partium, ac desiccantis citra mordicationem facultatis est. Plinius, cum de ocimo scripsisset, subiicit. Siluestri ocimo vis efficacior ad eadem omnia, peculiaris ad vitia quæ vomitionibus crebris contrahuntur: vomitibusq; vuluæ, contraque bestiarum morsus radix in vino est efficacissima. Sed cum hæc cum iis quæ Dioscorides & Galenus de ocimoide tradiderunt non consentiant, ocimum siluestre Plinij, illorum ocimoides, siue ocimastrium vix esse potest.

DRACO



**L**ITORES hodie in hortis ferunt herbam Græcis & Mauritanis inditam, præterquam Simeoni Sethi, à quo Tarchon dicitur, vulgò Draconem vocant, Galli *Dragon*, alij Targon, Italis *Dragoncello* & *Dragone*, vnde Dracunculus hortensis à Matthiolo, & recentioribus herbariis nominatur. Herba est folio angusto, oblongo, quadantenus nigricante, folio hyssopi vulgaris haud absimili, eo & radice linguam amburens, aceti & salis gustu: caule rotundo, cubitali, in ramulos diuiso, in quibus capitula minima, ex quibus dehiscen-

*Nomi.*

*Forma.*

DRACO, Hortensis.



tibus flosculi emicant lutei, quandoque candidi, deinde semen minutum, nigrum, radice est longa, gracili, fibrata, humi repente. Sunt qui plantam istam cultorum mangonio factitiam esse, nec talem natura prouenire credunt: eam enim nasci lini semine excauatis cepis imposito, ac in terra condito. Sed qui huiusce rei periculum facere voluerunt, operam perdiderunt. Saporis acrimonia commendationem attulit ad usum acetariorum, ex qua ex ordine esse vehementer excalfacientium facile est coniicere. Draco hic hortensis Chrysœonre Dioscoridis est Dalechamphio, palmum alta (cultu procerior) coma hyssopi, corymbis onusta (*κορυμβώδης* legit, non *κορυμβοειδής*) radice densa (*ῥαχοειδής* sic vertit nō hirsutam) tenui, instar veratri nigri, cypero pari, gustu non insuaui, ex dulci subaustero. Quæ omnia conueniunt. Nascitur sponte in saxosis montibus foro Sebusianorum propinquis, vulgò *Bourg en Bresse*, haud procul pago *Cæsarea*, vulgò *Cæsaria*, qua itur in oppidulum comitatus Burgundiæ *hannas*. Fabulosum est quod aiunt nasci lini semine cepa incluso & sic lato.

Diosc. lib. 4. cap. 10.

CARYOPHYLLATA. CAP. LIIII.

**V**O NOMINE herba hæc ab antiquis Græcis & Latinis scriptoribus nuncupata sit, nondum compertum est, nisi fortasse sit Geum Plinii, cui radículas tribuit tenues, bene olentes. Sunt qui falsò Dioscoridis Lagopum esse credunt, quia in segetibus non nascitur. Recentiores Latini Caryophyllatam vocant à radicis odore, vulgus Benedictam à Diuina efficacia, & Sanammundam. Duo esse eius genera animaduertit Fuchsius, non tamen multum à sese dissidentia. Primum genus caryophyllatam hortensem vocat, cui ex cultura aliqua teneritas accedit in foliis, floribus, & paniculis, cuique flos paulò minor & pallidior quàm siluestri. Alterum caryophyllatam siluestrem appellat, cui flores multò maiores, & magis crocei. Duo quoque genera hîc depicta sunt. Caryophyllata vulgaris, & Caryophyllata montana. Caryophyllatæ vulgari folia sunt in summis pediculis tripartita, hirsuta, subaspera, agrimonix foliis quadantenus similia, quibus bina alia succedunt in eodem pediculo multò minora, omnia in ambitu infecta: caulis ramosus, rotundus, sesquicubitalis, geniculatus, hirsutus: flores pentaphylli æmuli, quibus villosa succedunt capitula, in quibus se-

*Nomina.*  
 Lib. 20. c. 7.  
 March. in  
 lib. 4. Diosc.  
 cap. 17.

*Genera.*  
 Cap. 143.

*Forma.*

M m





*Locus.*

*Forma.*

men: radices copiosæ, tenues, subrufæ, caryophyllorum odore. Colitur in hortis ab herbariis. Nascitur etiam sponte secus vias, circa agrorum & hortorum sepes, & opacis locis gaudet. Caryophyllatæ montanæ radix nigra est, supernè crassâ, paulatim gracilescens, vndique fibrata, inodora, fatuiq; gustus: folia non ita multa, caryophyllatæ superiori similia, in ambitu serrata: caulis pedalis, tenuis, in quo pauca folia & parva: flos luteus, lineis puniceis plurimis distinctus, capite in medio extuberante, quod suffuso flore arrectis nigricantibus pilis horret. Aquosis locis gaudet. Aliam Caryophyllatam montanâ exhibet Matthiolus. Caryophyllatâ maiorem rotundifoliam vocat Lobellius. Hæc folia habet crassiora, crispiora, hirsutioraq; quâ vulgaris, multa ab vna radice enata, longis pediculis nixa subaspera, laciniata, humi strata: caules tenues in cacumine non brachiatos, in quibus rara paruaque folia spectantur. In caulium singulorum verticibus singuli flores insident, pulchri, triplo ferè quàm in vulgari maiores, aurei, qui tandem flaccescentes pinnatum efficiunt orbem, magno naturæ artificio radice firmatur spithamæ longitudine minimi digiti crassitudine, sed non fibrata, rufaque: odore caryophyllorum, & gustu adstringente. Efficaciorem esse putat vulgari. Caryophyllatam aliam Pena descripsit, siue Geum Alpinū recentiorum, folia habet in imo plura, hederacea, nonnihil cristata, asari

*CARYOPHYLLATA*  
*Montana, Matth.*

In bb. 4.  
 Drole cap.  
 17.





**CARYOPHYLLATA,**  
*sive Gum Alpinū Pena.*



ta, alarinarum rotunditate, aut saxifragiarum albarum, sed maiora: caulem è radice geniculatam, & ex fusco rufoque albicante rectum, gracilem, cubitalem, summo ramulis diuisum, & flosculis albis, stellatis onustum. Tota nonnihil calfacit, exsiccatque, gustu caryophyllatarum aut sanicularum. Recentiores, & peruerustus herbarius calidam & siccam esse caryophyllatam in secundo ordine statuunt, folia sanè in gustu non mediocrem adstrictionem ostendunt. Radix itidem haud parum adstrictionis habet. Ea luto & sordibus eluta siccat, & imbre aceti respersa arcas & vestes iucundo odore commendat. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosque coli dolores. Pectoris laterisque dolores & cruditates incado sapore discutit. Manuscriptus herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructiones tollendi scribit, fomentum item ex vino decoctionis eius menses cingere. Contra venena etiam cum vino sumptam valere, concoctionem roborare, dolorem ventriculi & intestinorum à frigiditate aut flatibus ortum, decoctum in vino sanare ait. Mirum

Fuchf. cap.  
143.  
*Vires*  
*Temper.*

cè etià ad inferna vulnera huius herbarum decoctum cõfert. Externa verò ex ea collini debent. Scribit etiam Matthiolus recentior s caryophyllatarum potu vti ad thoracis interna vulnera: succum eius admista argente cuniculosis, contumacibusque vlcibus vtiliter iniici. Eandem olfactu spiritus recreare, & frigidum cerebrum roborare. Epotam prodesse cœliacis, dysentericis, scæminarum profluuiis, & cruenta expuentibus. Tam intus sumptam, quàm foris illitam enterocelis auxilio esse. Temperamentum ei exalfaciens & exsiccans, maximè radicibus, quæ odorata & adstringentes gustu deprehenduntur, quibus qualitatibus attenuat, discutit, adstringit, & roborat.

In lib. 4.  
Diosc. cap.  
17.





# HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER SEXTVS,



*In quo describuntur & depinguntur planta Umbellifera.*

FOENICVLVM, CAP. I.



VERUMMODVM earum rerū quæ absconditæ sunt demonstrato & notato loco facilis inuentio est, sic, cum rei herbariæ studiosi stirpes peruestigare cupimus, natales singularum locos scire debemus: sic enim diuersarum diuersis in locis à natura procreatarum scientiam percipiemus & consequemur. Quare primam stirpium differentiam à locis peritam primum exposuimus: deinceps verò differentias alias, quæ tum à partibus earum insignibus sumuntur, tum à notis quibusdam illustribus, tum ab occultis & admirabi-

libus viribus, persequemur. Exordiemur autem ab iis quibus umbella summam infidet, quæq; venustè coronantur, veluti Fœniculum, anisum, anethum, daucum & alia pleræque. Est autem umbella floris seminisve pedamentum, in multos digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodem tanquam centro orti, in latius continuè radiatur, singuliq; florem vel semen sustinent in orbem circumactum. Quod quoniam umbellæ, qua mulieres vultum vindicant à sole, & æstum arcant, circinatam effigiem gerit, Græci primum hunc floris habitum *σκιᾶδιον*,

*Nomina*

mox Græcos imitati Latini dixerunt umbellam, à qua umbellifera plâta cognominantur: inter quas vulgarissimæ notionis est Fœniculum, quod Græcis *μάρραρον* dicitur, Actuatio *μαράσσειν*, Latinis Fœniculum, Arabibus *Raenigi*, Gallis *fenouil*, Germanis *fenchel*, Italis *finocchio*, Hispanis *Hinoio*, & *funcho*. *Μάρραρον* autē, ἀπὸ τῆς μαράσσειν, id est, à marcescendo Græcis dictum putant, quod eius è marcidi & arentis multus sit vsus ad condienda plurima. Fœniculum autem à Latinis, quod satum magno cum fœnore semen reddat, vel potius Græcorum imitatione Fœniculum dictum, quod quasi fœnum in hyemes arefactum & marcidū reponatur. Eius genera tria assignat Dioscorides, marathrum siue fœniculum, hippomarathrum, id est, fœniculum erraticum siue siluestre, cuius aliud genus est semine coriandri.

*Genera.*

Lib. 3. c. 67.

*Forma.*

Apud nos in triplici differentia visitur, vulgare, dulce, & erraticum siue hippomarathrum. Fœniculum vulgare siue satium (quamquam & sponte virens reperitur in agris squallidis & ficcioribus, vt in Narbonensi) caule assurgit geniculato, rotundo, multum ramoso, hominis plerunque altitudine, laui exterius & herbaceo cortice, medulla intus fungosa, foliis longis, mollibus, minutissimè dissectis, vt capillamentorum congeriem potius quàm folia dixeris, odoris iucundi: umbella in summis caulibus rotunda, ampla, lutea, in orbem radiatim circinata, in qua semen pallidum




FOENICVLVM

Vulgare.



FOENICVLVM Siluest.

Loniceri.



pallidum siue luteum, oblongum: radice candida, longa, odorata. Dulce caule est breuiore & exiliore, foliis anethi, semine maiore, gustu anisi dulci, colore albido, minus acri, hyemes non perinde fert ac vulgare; nec perinde frequens feritur, vt potè semine è Syria vel Græcia delato, tum pharmacopœis, tum coquis in apparatis cibis vsu frequentissimum. Siluestre Foeniculum nominant Officinæ auctoribus Ruellio & Lonicero, satiuo procerius, brachiali crassamento, foliis etiamnum maioribus, semine miliaceo, radice alba, odorata. Tanta amplitudinis in Mauritania, vt canlis duodecim cubitis assurgat, crassitudine palmorum quatuor. Foeniculum passim in hortis satum prouenit. Agreste in petrosis & calidis inuenitur. Floret Iunio & Augusto mensibus, Augusto semen maturum est: Foeniculum herba si edatur, inquit Dioscorides, aut semen cum præsana bibatur, lac attrahit. Comæ decoctum in renum doloribus subditum proficit, quippe quod vrinam excitet, (Sic Ruellius græca conuertit quæ in vulgatis codicibus leguntur. τὸ δὲ ἀπὸ χυμοῦ τῆς κλύης ὑποτρεῖν, vesiculis κῆλ τοῖς πρὸς κλύιν χροσμοῖν, quæ sonant, Comæ autem decoctum subditum, renum vitis ortis circa vesicam confert, &c. In veteri autem codice legitur, τὸ δὲ ἀπὸ χυμοῦ τῆς κλύης ποθὲν, vesiculis, ἢ τοῖς πρὸς κλύιν χροσμοῖν, διασπινδὸν ὑπὸ χροῦ. Hoc est, Potum autem ipsius comæ decoctum, renum atque vesicæ vitis est vtile, cum vrinam cieat. Quæ lectio est omnium inculpatissima, & eam Cornarius agnouit, non enim renibus & vesicæ supponi potest hoc decoctum, maxime vt vrinam ciet. At, dicet aliquis, imponi quidem posset his locis coma, vna cum decocto, aut etiam decoctum, sponsia ex ipso imbuta, atque sic ἐπιπρεῖν legendum esset. Sed neq; hic vtendi modus, vrinam ciere posse videtur. Quare omnino ποθὲν legendum, vt is effectus sequatur. Eandem comprobat Serapio, locum hunc Dioscoridis sic interpretatus. Et quando sumitur decoctio summitatum Foeniculi in potu prouocat vrinam, & ideo confert doloribus renum & vesicæ.) Contra serpentium ictus in vino potum prodest, menses ducit, in febribus nauseam & stomachi ardorem

Lib. 3. c. 48.  
T. 1. fo. 233.

Locus.  
Tempus.  
Vires &  
Temper.  
Lib. 3. c. 67.

And. La.

Embl. 72.  
lib. 3.

ex aqua frigida potum sedat. Radices contrita & cum melle illita, morsibus canum medentur. Succus caulibus & foliis expressus, in sole siccatus, medicamentis quæ ad excitandam oculorum aciem conficiuntur, vtiliter adicitur. Extrahitur etiam succus ex semine viridi, foliis, ramulisq; ad eadem vtilis, & radix exprimitur in pri-



ma germinatione. In Occidentali Iberia liquorem gummi similem reddit. Caulum medium dum herba floret incolæ demetunt, igniq; admovent, quò facilius vi caloris exudans gummi remittat. Hoc efficacius succo est ad medicamenta oculorum. Hippomarathrum est fœniculum siluestre, magnum fert semen cachryi simile, radix subest odorata, quæ pota vrinæ stillicidium sanat, radix apposita menses ducit. Semen autem & radix aluum sistunt potu, & contra serpentium morsus auxiliantur, calculosq; atterunt, & morbum regium expurgant. At foliorum decoctum potum lac attrahit, & mulieres à partu purgat. Vocatur & alterum hippomarathrum, folia habens angusta, parua, oblonga, semen rotundum, ad coriandri semen accedens, acre, odoratum, calfaciendi vi prædictum, facultas eius superiori responder, sed efficacia debiliore. Plinius eadem ferè de iisdem tradidit his verbis,

Lib. 20. c. 23. Fœniculū nobilitauere serpentes, gustatu, vt diximus, senectam exuendo, oculorumq; aciem succo eius reficiendo. Vnde intellectum est, hominum quoq; caliginem præcipuè eo leuari. Colligitur hîc caule turgescente, in sole siccatur, inungiturque ex melle. Vbique hîc est. Laudatissimus in Iberia è lacrymis fit, & ex semine recenti, fit etiam ex radicibus prima germinatione incisus. Dixerat autè de serpentibus multò ante. Anguis hyberno situ mēbrana corporis obducta, fœniculi succo impedimentū illud exuit, nitidusq; vernat. Et paulo post. Idē hyberna latebra visu obscurato, marathro herbæ sese affricans oculos inungit ac refouet. Quo loco græca *μαραθρον* voce vsus est. Istis subiūgit. Est & in hoc genere siluestre, quod alij hippomarathrum, alij Myrsineum vocant, foliis maioribus, gustu acriore, procerius, brachiali crassitudine, radice cādida. Nascitur in calidis, sed saxosis. Diocles & aliud hippomarathri genus tradit, longo & angusto folio, semine coriandri. Medicinæ in satiuo, ad scorpionum ictus, & serpentium, semine in vino potu. Succus & auribus instillatur vermiculosisq; in his necat. Ipsum condimentis prope omnibus inferitur: oxyporis etiam apertissime quin & panis crustis subditur. Semen stomachum dissolutum adstringit, vel in febribus sumptum, nauſeam ex aqua tritum sedat, pulmonibus & iocinoribus laudatissimū. Ventrem sistit cum modicè sumitur, vrinā exciet, & tormina mitigat decoctū, in lactisq; defectu potum mamas replet, radice cū prāsana sumpta. Renes purgat, siue decocto, siue succo, siue semine sumpto. Prodest & hydropicis radix ex vino cocta: item conuulsis. Illinuntur folia tumoribus ardentibus ex aceto. Calculos vesicæ pellunt, genituræ abundantiam quoquomodo haustum facit. Verendis amicissimū, siue ad fouendum radice cum vino cocta, siue contrita in oleo, illitum. Multi tumoribus & saggillatis cum cera illinunt. Radicis succo, vel cum melle contra canis morsum vtuntur, & contra multipedam ex vino. Hippomarathrum ad omnia vehementius, calculos præcipuè pellit. Prodest vesicæ cum vino leni, & fœminarum menstruis hærentibus. Efficacius in eo semen quàm radix. Modus in vtroque, quod duobus digitis tritum additur in portionem. Petridius qui Ophiaca scripsit, & Miction (Alij Micon legunt) qui Rhizotomum ena, aduersus serpentes nihil hippomarathro efficacius putauere. Sanè

Lib. 7. sim. & Nicander non in nouissimis posuit. Galenus vtriusque facultates distinctius explicat, à Dioscoride tamen non dissentit. Fœniculum, inquit, tam valenter excalfacit, vt ex tertio ordine excalfacientium cenſeri possit, desiccatur verò non aequè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit, quare lac procreat, quod si admodum desiccaret, non sanè efficeret, suffusus eadem ratione auxiliatur, vrinas mensēque ciet. Porro est & alterum fœniculum, quod ob magnitudinem hippomarathrum nuncupant, cuius radix ac semen amplius quàm domestici desiccandi vim habet. Quocirca ventrem quoque hoc nomine sistere videtur. Nec sanè manifesta illis inesse videtur adstrictio. Huius non radix modo, sed & semen cachryi adsimile est, potestque & calculos frangere, & ictericos sanare, mensēque



seſq; & vrinas mouere, non tamen lac congerere ſicut illud ſuperius. Aliud eſt hippomarathrum, cuius ſemen rotundum eſt & acre, ſimile ſemini coriandri, facultate quidem hippomarathro ſimile, ſed debilius. Hæc Galenus.

ANETHVM.

CAP. II.


**A**NHON Græcis, ſimiliter Anethum Latinis, Mauritanis *Aebet*, *lebet*, ſiue *Sebet*, Italis *Anetho*, Germanis *Dyllen*, & *Hochkraut*, Hiſpanis *Eneldo*, Gallis *Anet*. *Ἀνθον* autem quaſi *ἀνθίσθον*, ideſt, inuictum quidā dictum volunt, quia appetentiam cibi excitat, ſed etiam *ἀνθός* congreſſus eſt, familiaritas, & coitio venerea, ad quam laceſcit Anethi eſus, vt antiqui prodiderunt, tamenſi plurimo uſu genituram tandē exhauriat. Dioſcoride teſte. Anethum caules fert rotundos, geniculatos, ramoſos, ſequicubitali proceritate, folia exilia, ſceniculi haud abſimilia, ſed duriora & craſſioribus ſtaminibus: ſtoſculos luteolos in vmbellis caulium ſaltiſſimis inſidentibus, vt in ſceniculo ſemen minutum, latum, & quaſi foliatum: radicē lignoſam, neque adeo prolixam, neque adeo multis ſubnixam fibris. Adeo ſceniculo ſimile eſt, vt pharmacopeos ſæpē fallat, niſi ſapore facilē diſcerneretur, ingrato, calidiore, & colore obſcurius virente. Hortis iam frequentiſſimum eſt, interdum etiam ſponte ſceniculi modo prouenit. Iunio & Iulio menſibus floret. Facultatibus his pollet, auctore Dioſcoride. Anethi aridi comæ ac ſeminis decoctum potum lac attrahit, inflationes ac tormina ſedat: aluum vomitusq; ſiſtit (Sic vertit Ruellius quæ in vulgari codice leguntur, *κοιλίαν τε καὶ τὰς ἐπιπολαιὰς ἐμέτας ἰσχυροί*. Ideſt, Aluum & vomitus leues ſupprimunt: quauis in veteri exemplari legamus, *κοιλίαν τε καὶ τὰς ἐπιπολαιὰς ἐμέτας ἰσχυροί*: quod eſt, aluum purgat, & vomitus leues ſupprimunt, vrinas ciet, ſingultus lenit, oculos hebetat, & geniturā extinguit aſidue potum. Vtile etiā eſt ipſius decoctum mulieribus præfocatione vuluæ laborantibus ad deſeſiones: ſemen eius uſtum & illitum condylomata tollit. Plinius cū Aniſum & Anethum culinis & medicis naſci dixiſſet,

Nomina

Pet. Pe. in  
Hol. fol.  
347.

Forma.

ANETHVM.



Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 58.

Vires &

Temper.

Lib. 19. c. 8.

Li. 20. c. 18.

Li. 6. ſimpl.

poſtea Anethum quoque ructus mouet, inquit, & tormina ſedat: aluum ſiſtit. Epiphoris radices illinuntur ex aqua vel vino. Singultus cohibet ſemen feruens olfactum: ſumptum ex aqua ſedat cruditates. Cinis eius vuam in faucibus leuat: oculos & genituram hebetat. Anethum, inquit Galenus adeo excalfacit, vt habendum ſit, aut ſecundi ordinis intenſi, aut primi finientis. Itaque meritò in oleo decoctum digerit, dolorem ſedat, ſomnum conciliat, & crudos incoctosq; humores concoquit: ſit enim ex eo oleum cuius propinqua ſit temperies pus mouentibus, & concoquentibus medicamentis, niſi quatenus paulò illis tum calidius, tum tenuiorum partium eſt, ac digerendi facultate præditum. Uſtum autem tertij ordinis tum excalfacientium, tum deſiccantium ſit. Propterea vlceribus nimis humidis mollibusq; prodeſt, potiſſimum iis quæ in pudendis cōſiſtunt. At quæ in præputio ſunt inueterata, iis probè cicatricem obducit. Caterum viride humi-



dus est, & minus calidum. Itaque magis quàm siccum concoquit, & somnum conciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi videntur veteres in conuiuiis vti esse coronis ex eo concinnatis.

## ANISVM.

## CAP. III.

Nomina

Lib. 2. c. 17.

Perr. Pe. in

Ad. fol. 322

Forma



NIZON & ἀνισον Græcis, Latinis & Officinis Anisum, Mauritanis *Aneisum*, & *Anexissum*, Italis *Aniso*, Hermanis *Anisz*, & *Enisz*, Hispanis *Matuhalua*, & *Terna dulce*, Gallis *Aniu*. *Anisov* quidam, auctore Plinio, quasi ἀνισον vocauere, quia appetitiam cibi præstaret. Sed verifimilius est sic dictum ὅτι ἀνισον ἔστι ἐκ τοῦ μισθός, idest, quod remittit & laxat tensiones flatulentas internas & externas.

## ANISVM.

Locus.

Tempus.

Lib. 2. c. 16.

Vires &amp;

Temper.



Lib. 2. c. 17.

naribus dolorem capitis sedat: tritum & cum rosaceo instillatum aurium medetur rupturis. Hæc Dioscorides. Quæ particulatim & pluribus verbis Plinius declarauit. Anisum aduersus scorpiones in vino bibitur, Pythagoræ inter pauca laudatū siue crudum, siue decoctum. Item viride aridumve omnibus quæ condiuntur, quæq; intinguntur desideratum: panis etiam crustis inferioribus subditū. Saccis quoque additur. Cum amaris nucibus vina cōmendat, quin ipsum oris haliū iucundiores facit, foetoremq; tollit manducatum matutinis cum Smyrnio, & melle exiguo ore mox vino colluto: vultum iuniorem præstat. Insomnia leuat suspensum in puluino, vt dormientes olfaciant. Appetentiam ciborum præstat: ob has causas quidem Anicetum id vocauere. Dolores capitis leuat suffitum naribus. Epiphoris oculorum è vino radicem eius tusam imponit lollas. Ipsum cum croco pari modo & vino, & per se tritum cum polëta ad magnas fluxiones, extrahendiq; si qua in oculos inciderint. Narium quoque carcinodes consumit illitum ex aqua. Sedat anginas cum melle & hyssopo, & aceto gargarizatum. Auribus infunditur cum rosaceo. Thoracis pituitas purgat tostum: cum melle sumptum melius. Cum acetabulo



tabulo Anisi nuces amaras quinquaginta purgatas tere in melle ad tussim. Præcipuum autem est ad ructus, idè inflationibus stomachi, & intestinorum torminibus, & cœliacis medetur. Singultus & olfactum decoctum potumq; inhibet. Porū somnum conciliat, calculos pellit, vomitiones cohibet, & præcordiorum tumores. Et pectorum vitis, neruis quoque quibus succinctum est corpus vtilissimum. Prodest eius & capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Non aliud vtilius ventri & intestinis putant idè dysentericis & in tenesmo datur tostum. Dalion herbarius dedit bibendū cum Anetho parturientibus. Phreniticis quoque illinunt recens cum polenta. Sic & infantibus comitialia vitium, aut contractiones sentientibus. Pythagoras quidem negat corripī vitio comitiali in manu habentes, idèq; quamplurimum domi ferendum. Parere quoque facilius olfactates. Sosimenes contra omnes duritias ex aceto vsus est, & contra lassitudines, in oleo decoquens, addito nitro. Semine eius poto lassitudinis auxilium viatoribus spondit. Heraclides ad inflationem stomachi semen tribus digitis cum castorei obolis duobus ex mulso dedit. Similiter ad ventris, aut intestinorum inflationes, & Orthopnoicis, quod ternis digitis prehenderit seminis tantundem hyoscyami cum lacte asinino. Multi vomituris acetabulum eius, & folia lauri decem, trita in aqua, bibenda inter cœnam suadent. Strangulationes vuluæ si māducetur & linatur calidum, vel si bibatur cum castoreo aceto & melle sedat. Vertigines à partu cum semine cucumeris & lini pari mensura ternū digitorum, vini albi tribus cyathis discutit. Tlepolemus ad quartanas ternis digitis seminis anisi & sceniculi vsus est, in aceto, & mellis cyathō vno. Lenit articulares morbos, cū amaris nucibus illitum. Sunt qui & aspidum venenis aduersari naturam eius putent. Vrinam ciet, sitim cohibet, venerem stimulat. Cum vino sudorem leuiter præstat. Vestes quoque à tineis defendit. Efficacius semper recens, & quò nigrius. Stomacho tamen inutile est, præterquā inflato. Hæc Plinius. Galenus, Anisi semen, inquit, maxime vtile est, acre & subamarum, vt propè ad vrentium accedat caliditatem. Est autem & in siccando tertij ordinis, sicut & in calefaciendo. Proinde & urinā ciet, & digerit, & flatu ventris reprimat. Hæc Galenus. Sed cum nullum sanè ex omnibus flatu dissoluentibus oleraceis seminibus gratius sit ventriculo, minùs habeat acrimoniam, aut plus suauitatis quā anisi semen, neutiquā, vt ex Dioscoride Galenus arbitratur, tertio gradu hodie gustanti apparet calidum. Quare id de Aniso in Syria, aut sponte alibi in regionibus calidis nato intellexisse videtur, nunc cū nusquam sponte proueniat, sed in hortis duntaxat etiam Septentrionalium regionum colatur, mutatione cœli, soli & cultus, nonnihil caloris deposuisse necessum est. Simeon Sethi ad vetustos ex frigore iecoris affectus Anisum prodesse scripsit, & ad spirandi difficultatem quæ ex pituita proficiscitur. Flatus qui in ventriculo sunt digerere, obstructions tollere, & lactis copiam facere.

Liosimpl.

## C A R V M.

## C A P. I I I I.

**K**apos Græcis & καρὸν siue καρῶν, Latinis Carū, vel Careū, Officinis Carui nominatur, Arabibus *Caruia*, *Karauia*, seu *Carui*, Italis *Caro*, Germanis *Matthkumich*, Hispanis *Alcarauca*, Gallis *Carui*. Carum autem à Caria regione in qua laudatissimum nascitur, appellationem accepit. Id pastinacæ siluestri haud absimile caules ab vna radice multos emittit quadrangulos, geniculatos, cubitales, folia pastinacæ siluestris, umbellas in summis caulibus, candidis floribus refertas, semen angulosum, copiosum, subnigricans, acre, & linguam vellicans, radicem oblongam & luteam, crassiusculam. In pratis hodie prouenit, optimū, vt dictum est, in Caria. Maio & Iunio mēsis florēt, & semine prægnans

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.



CARVM; *Maub.*

Lib. 3. c. 57.  
Vires &  
Temper.

Lib. 19. c. 8.

Li. 7. simpl.

Li. 2. Alim.

Maub. in  
ca. 57. lib. 3.



men quod aperit, prouocat, dissoluit, incidit. Auxiliatur frigidis vteri affectibus, confert omnibus frigidis morbis capitis, visum acuit. Herba pro oleris editur, radix cocta est ut perinde ut pastinaca. Seminis farina miscetur cataplasmatibus, quæ ad fuggillata parantur. Integrum semen Germani cum pane subigunt, ciborumq; condimentis indunt, quemadmodum nos anisum & fœniculum.

AMMI.

CAP. V.

Nomina



AMMI Græcis, Ammi Latinis dicitur, Officinis corruptè Ameos, Arabibus *Nanoch* h. *Anazue*, seu *Nanachue*. Cui idem quod superioribus non euenit: harum enim descriptiones à Dioscoride prætermisæ, quin etiam vulgo notæ essent efficere non potuerunt, illius integra facies ab eodem non delineata quodnam genuinum sit ex multis generibus, quæ ab herbariis proponuntur, ambiguum reliquit. Ait enim ille duntaxat *απερμύτιον*, id est, paruum semen esse vulgo notum, multò minùs cumino, gustu origanum respiciens, ut videatur Ammi appellatio perpusillum quasiq; arenaceum exilitate & colore semen esse. Fuchsius & eum secutus Dodonæus Ammi commune, siue

Ca. 11. hist.

Lib. 2. c. 79.

Forma.


Ibidem.

Ammi Officinarum, verum Ammi esse autumant: quod caule rotundo & herba ceo constat, furculis multis & exiguis: folio oblongo, angusto, per ambitum incisuris diuiso: flore paruo, candido, umbella anethi: semine exiliore multò quàm cuminum, acris & subamaro, origanum præ se ferente: radice candida & multifida. Quidam Bupleuron Plinij esse volunt, ut Buprestin Auriculam leporis descripta post hac cap. 23. de Panace. Esse autem hanc herbam verum Ammi, inquit Fuchsius, feminis in gustu sapor qui subamarus & acris est, omnium maximè ostendit: talem enim in eo saporem Galenus requirit: origanum etiam gustu referre videtur. Quibus accedit antiqui & manuscripti herbarij testimonium, cuius pictura & testimonium satis docent hanc herbam esse Ammi genuinum. Inter cætera enim semen Ammios piper gustu referre, ideoq; à nonnullis piperulam dictam esse ait.

Id quod



*AMMI*, *Fuchf.*



*AMMI*, *Matthioli.*



Id quod verissimum esse comperies, si semen gustaueris: miram enim huic acrimoniâ inesse senties. Nusquam apud nos sponte sua nascitur, inquit Fuchsius, satum tamen facile & magna copia provenit, sic ut deinde extirpari vix queat. Augusto mense floret, ac deinceps ubi defloruit semen abundè producit. Sed hæc improbat Matthiolus his verbis. Quod Ammios nomine passim in Officinis habetur, cum probatissimum, Plinio teste, omnino sit candidius, id nigricat, adeoq; vulgaris petroselinii semen æmulatur, ut visu ab eo discerni minimè possit, sed in hoc gustum consulere oportet: nam cum haud leuiter sit acris facultatis discrimen gustu facile deprehenditur. Præterea cum hoc nullū origani saporem gustu representet, perspicuum est non esse legitimū. Hæc ille. In quibus animaduertendum Plinium candidioris nota non præstatiam seminis Ammios, sed huius à cumino discrimen indicasse. Sunt enim hæc eius verba. Pleriq; alterius naturæ (à cumino Æthiopico) in totum putant, quoniam sit exilius & candidius. Illi verò legitimum Ammi substituit Matthiolus, quod ex horto Patauino Anguillara misit. At Pena istud in Patauinis hortis cultum, etiamq; nō procul Ageno & Garumna in Aquitania à se collectum, foliis & umbellis Dauci cretensis, semine & radice hortensis apij, neutiquam illis in Ammi semine viribus expetitis præditum est. Aliud semen non multis ab hinc annis cœptū fuit deueni ex Siria aut Creta Venetias, hortensi apio par, sed flauum, gustu aromaticum, feruidum, origanum præferens. Ex eo in horto Condenbergii, sapore pastinacæ, aromatico semine provenisse ait Lobellius Ammi Creticum aromaticum, quod & pinxit Matthiolus. Aliud Ammi perpusillum ex Lobellio hîc appinximus, radice superioris simili, foliis fœniculi, semine perpusillo in umbellis multis. Sunt qui aliud Dauci genus faciunt, id nimirum quod Matthiolus crithami terrestris nomine descripsit his verbis. Nascitur, inquit, in Bohemia, præsertim in agro Pragensi non solum inter segetes: sed in agrorum marginibus & secus vias, foliis longis, angustis,

*Locus,*

*Tempus.*

Ca. 6. li. 3.


Li. 20. c. 15.

In Ad. fol. 323.

Ca. 132. li. 20.

firmis, ternis ex vno pediculo, ipsoque longo prodeuntibus, vtrinq; denticulatis, falcis frumentariæ modo. Caterum quæ in caulium summis partibus habentur minora brevioraque sunt: caulem gerit ramosum alis concauum, geniculatum, in cuius summitate ramuli exeunt diuulsi, in quibus floridæ albicantesq; umbellæ, postremò semen paruum, oblongum, acre & odoratum. Radice nititur simplici, pastinacæ



*AMMI Perpusillum, Lobel.**AMMI quorundam, Dalech.*

Lib. 3. c. 61. *Vires & Temper.* pastinacæ haud absimili, minore tamē, sapore imprimis dulci, sed si diutius mandatur, acii & odorato. Ammi, inquit Dioscor. vim habet excafactoriam & exsiccantem. Facit ad tormina, vrinæ difficultatem, venenatorum morsus cum vino potum, menstrua ciet. Miscetur rodentibus ex cantharidibus confectis n edicamentis, vt inde exortis vrinæ difficultatibus resistat. Suggillata cum melle illitum tollit. Colorem potum & inunctum in pallorem mutat. Suffitum cum vua passa aut resina vuluas purgat. Eadem tradit Plinius. Inflationes & tormina discutit. Vrinam & menstrua ciet. Suggillata & oculorum epiphoras mitigat cum lini semine. Scorpionum ictus in vino potum drachmis duabus, priuatimq; cerastrarum cum pari portione myrrhæ. Colorem quoque bibentium similiter (nimirum vt cuminum), mutat in pallorem. Suffitum cum vua passa aut resina vuluas purgat. Tradunt facilius concipere eas, quæ odorentur id per coitum. Galenus herbæ quam vocant Ammi, semen maximè vtile esse scribit, facultatis excafactoriæ & desiccatoriæ, tenuiumq; partium. Sed & gustu subamarum est, & acre. Hinc perspicuum est quod digerat, & vrinam moueat. Fuerit autem in calfaciendo resiccandoq; ex ordine tertio intenso.

Li. 20. c. 15. *Li. 6. simpl.*

## CUMINVM SATIVVM. CAP. VI.

*Nomina**In Ad. fol. 330.**Genera**Pc. ibid.*

CUMINON Græcis, sic & Latinis Cuminum, Officinis Cyminum, Arabibus *Camum* seu *Kemum*, Italis *Cumino*, Hispanis *Comino*, Gallis *Comin*, Germanis *kimmel*. Est autem tantæ feracitatis, inquit Pena, inter oleracea Cuminum, vt etiam maledictis satū vberimè luxuriat. Vnde Cuminum quis, quasi prægnans à verbo *κύω* manasse putet. Eius genera tria sunt Dioscoridi, satium, & siluestre duplex. Satium aliquantū diuersum diuersis è locis Syriæ, Græciæ, Ciliciæ allatum obseruatur. Quod enim albicat hirsutumq; est semen, præstantius habetur. Aliud neutiquam hirsutum est. Nec putandum discrimen aliud fuisse Æthiopici aliūve, quam loci prærogatiua.


*Vilusq;*



Vitufq; est Hippocrates fatium istud albicans hirsutumq; , basilicum seu Æthio-  
picum statuisse. Cuminum fatium caule est longo, recto, multis adnatis ramus-  
culis, foliis minutim discisis, fœniculi similibus, flores in umbellis emicant veluti  
in fœniculo, in quibus tandem copiosum semen. Radix albicat, & summo repit

Forma.

CUMINVM Satium  
Matthioli.




cespire. Tractu gaudet calido & putrescibili, quamobrem frequentissimum in maritimis nascitur. Prouenit, inquit Dioscor. in Galatia, in Asia, Cilicia. Omnibus præfertur Æthiopi-  
cum, quod Hippocrates regium appellat. Se-  
cundum locū tenet Aegyptiū, reliqua sequun-  
tur. Cuminum siluestre eodem Dioscoride  
auctore, frutex est paruus, caule palmum alto,  
tenui, in quo foliola quaterna aut quina, te-  
nuia, veluti, serrata, & gingindij diuisarar in ca-  
cumine capitula quina aut sena habet, rotun-  
da, mollia, in quibus semen est acerolum, gustu  
fatiuo acrius. Nascitur in collibus. Plurimum  
efficaciūq; , inquit Dioscorides, in Lycia, Gala-  
tia Asia, & in Carthagine Hispania. Alterum  
siluestris Cumini genus fatiuo non dissimile  
est, quod à singulis floribus elata promit cor-  
nicula, in quibus semen est melanthio simile.  
Cuminum fatium vulgo satis notum, hinc ex  
Matthiolo pictum damus. Item prius silue-  
stris genus ex Cortusiana liberalitate. Alterum  
verò siluestris genus, idem Matthiolus cum  
Ruellio & Gelnero eam plantam esse putat

Locus.

Lib. 3. c. 49.

Cap. 49. li. 3.

CUMINVM Siluestre,  
I. Matthioli.



CUMINVM Siluestre,  
II. Matthioli.



N n



quam herbarij Consolidam Regiam siue Regalem appellant, Galli *Pied d'Alouue*, Germani *Kutschsporn*, idest, equinus calcar. Caulem fert simplicem, ramulis multis brachiato, tenuibus, longis, diuisis, siluestris nigellæ modo. Flores edit purpureos, nigre violæ amulos, ex quorum altera parte prodeunt cornicula sursum spectantia, quæ calcaris veterum formâ exprimere videntur, vnde illi nomen à Germanis inditum. Semen fert in corniculis melanthio simile. Hanc plantam Dodonæus nomine buccini, seu Delphini alterius pinxit & descripsit, & huic prorsus similem, sed omnibus partibus maiorem & habitiozem Cōsolidam Regalem hortensem, Delphinij nomine. Fuchsius perperam nomine Chamæmeli eranthemi. Sed in postrema Commentariorū editione Matthiolus sententiam retractat, aliudq; Cumini siluestre alterum, ab eodem Cortuso acceptū, idq; verum depinxit, Hypocoum Clusij & Dodonæi. Eadem cumini siluestris genera Pena: his ferè verbis explicauit, atq; ita delineauit. Speciem præ se ferunt, inquit, vtriusque siluestris Cumini duæ plantæ, quæ locis glareosis prope Aquas Sextias Gallicæ provincie vberim crescunt. Primæ foliola gingidij, vel siluestris pastinacæ modo diuisa sunt, radix albicat, parua, cauliculi inflexi, exiles scandicis seu pectinis veneri modo, sed albidis, rotundis, villosisq; glomerulis, globulos arctij imitantibus, tenera papposæ lanugine cinctos, in spherulam densam, magnitudine pinpinellæ, plarum modo globulariæ ve Monspelienfibus dictæ. Semen dētis leonis vel platani, sed multò minus. Alterius siluestris duæ sunt plantæ quæ effigie satis congruere videtur. Ea quæ minus cognita, exigua & pulchra, non procul Aquis Sextiis oriunda, complura gerit cornicula, siliquata, adunca, scorpioidis dictæ modo, sed crassiora, semine intus præsepiolis distincto, colore flauo, oblongo: cauliculi graciles teneriusculi, & folia parua, carei aut scandicis, pectinis veneri, fumaricæ ve incisuris profundis: exigua radix, lutei flores Maio mense, Chelidoniij maioris, aut erucæ, sed minores. Eidem eisdemq; natalibus siliquata perquam similis sociatur altera non nisi folio tenuiore, distans, angustiore, seseli Mafsiensis diuisura, ad imum plantæ iuxta radicem albicantem, chærephyllo similem plurimum nascente, cauliculis ferme glabris, siliqua maiore: semine ibi contento, galegæ, subfuluo. Regia verò consolidā alibi dicta, Cumini foliis, floribus purpureis, & interdum

*CUMINVM Siluestre  
alterum, Matth.*

Lib. 2. ca. 15.

Ca. 8. hist.

In Ad.



*CUMINVM Siluestre  
siliquatum, Pena.*





terdum candidis, speciosis, coronariis, in calcaris antiqui speciem, è quibus cornicula oblonga, recta promuntur, semine nigellæ nigro, adeò hortis mulierculisq; familiaris est, vt minimè notionis dilucidioris egeat. Hasce itaque plantas Pena proposuisse se ait, vt quisque pro arbitrio de illis statuatur. Cum enim Cumini satiuu sapore odorève grato non polleant, nedum id superent, dubium est illane sit Cuminum siluestre. Alteri quidem lutei flores insunt, & semina melanthij defunt. Sola horum Regia consolida vocata videtur adhuc Cumini siluestris coniecturâ fouere: tametsi vsus medicamentis, aut cibis, vel nullus vel incertus. Hæc Pena. Nunc de viribus dicendum. Cuminum satiuum, inquit Dioscor. ori gratum est Lib. 3. c. 59. (vetus codex & Oribasius habent *ὀρεμαχον*, idest, stomacho gratum) Calfacit, ad- Vires & Temper. stringit, exsiccat, ad tormina inflationesque conuenit coctum, & cum oleo infusum, aut cum hordeacea farina impositum. Orthopnoicis datur in posca, demorsis à serpente in vino. Testium inflammationibus auxiliatur impositum cum vua passa, aut lolij farina ceratove. Fluxum muliebrem cohibet, item sanguinis è naribus profluium tritum cum aceto & admotum. Siue bibatur, siue illinatur corporis colorem in pallidius mutat. Cumini siluestris prioris semen bibitur ex aqua aduersus tormina inflationesq; , ad venenatas bestias, & stomachi humiditatem cum vino: singultus ex aceto sedat. Tollit & suggillata commansum, ac cum melle & vua passa impositum. Inflammationes etiam testium sanat cum iisdem illitum. Alterius Cumini siluestris semen serpentium moribus optimum est præsidium. Vrinæ stillicidio vexatis, & calculosis auxiliatur, & iis qui sanguinis grumos meiunt. Sed iis apij semen feruefactum postea bibendum est. Cumini vtriusque eadem vires Fuchsius declarauit. Plinius his verbis, Cumino satiuo magnus vsus Li. 20. c. 14 in stomachi præcipue remediis. Discutit pituitas & inflationes tritū & cum pane sumptum, vel potum ex aqua vinoq; : tormina quoque & intestinorum dolores. Verumtamen omne pallorem bibentibus gignit. Ita certè ferunt Porcij Latronis clari inter magistros dicendi, affectatores similitudinem coloris (palloris alij legunt) studiis contracti imitatos: & paulò ante Iulium vindicem assertorem illum à Nerone libertatis, in captatione testamenti sic lenocinatum. Narium sanguinem pastillis inditum, vel ex aceto recens sistit. Testiculorum epiphoris per se impositum, tumentibus cum melle prodest. Infantibus imponi in ventrali satis est. Morbo regio in vino albo à balneis datur. Æthiopicum maximè in posca, & in ligmate cum melle. Africano priuatim vrinæ incontinentiam cohiberi putât. Satiuum datur ad iocinoris vitia tostum, tritum in aceto: item ad vertiginem. Iis verò quos acriore vi vrina mordet, in dulci tritum vino. Ad vuluarum vitia in vino, præterque impositis cum vellere foliis: testium tumoribus tostum tritumq; cum melle, aut cum rosaceo & cera. Siluestre ad omnia eadem efficacius. Præterea ad serpentes cum oleo, ad scorpiones, ad scolopendras. Sistit & vomitionem nauseasq; ex vino, quantum apprehenderint tres digiti. Propter colum quoque bibitur, illiniturque, vel penicillis feruens adprimitur fasciis. Strangulationes vuluæ potum in vino aperit, tribus drachmis in tribus cyathis vini. Auribus instillatur ad sonitus, atque tinnitus cum seuo vitulino vel melle. Suggillatis illinitur cum melle, & vua passa, & aceto: lentigini nigræ ex aceto. Cymini semine maximè vtimur, inquit Galenus, quemadmodum Anisi, Ligustici, Li. 7. simpl. Cari, Petroselini. Est verò & facultatis excalfacientis, sicut illorum vnumquodque, tum vrinam mouentis, & flatum extinguentis, ex tertio ordine excalfacientium.



**Nomina**Fuchs. cap.  
28. hist.

In Ad.

**Genera**

Lib. 3. c. 46.

**Forma**

RAECIS σέλινον, & σέλινον κηπίδιον, Latinis dicitur Apium, & Apium hortense, aut fatium, Arabibus Charṣ, Charṣi, seu Chares, Italis Apio domestico, & Petrosello, Germanis Petersilien, & Peterlin, Hispanis Perexil, Gallis Persil. Selinum autem Græci vocant, quasi ἐλεος σελινον, hoc est paludibus impulsus: quapropter Homerus ἐλεοτρεπλον σέλινον cognominat, quod paludosis gaudeat, & in iis enatum lætius exurgat. Mauult tamen Pena Selinum quasi lunaticum, dictum ab illo formidando affectu, quem accersit esu, quā à palustri solo, ubi non semper nascitur. Multa alia sunt Apij genera à locis & magnitudine nomen sortita. Apium silvestre, Gallis Persil sauvage, Eleoselinum, Oreoselinum, Petroselinum, Hipposelinum. Apium hortense siue fatium verum antiquorum, omnium ferè herbariorum sententia, & coniectura potius quā vlla à veteribus expressa figura, vulgare nostrum Petroselinum hortis frequentissimū, cibisq; gratissimum esse creditur, caule concauo, inquit Ruellius, tenuiter striato, rotundo, multisq; ramis brachiato, sæpe cubitalem æquante altitudinem: foliis tripartito dissectis, & leuiter crispis, oris leuiusculè laciniatis: flosculo candido, &

APIVM Hortense.

APIVM Silvest. Dalech.

Lib. 7. hist.  
ca. 4.

Lib. 3. c. 69.

**Forma****Locus**

Lib. 5. c. 45.

quo minutiorem haud temerè reperiās, nudo semine, radice singulari, suauiter olente. Aliud est hortense Apium crispatum, perelegans & rarum, à superiore nihil distans, nisi foliorum crispatis oris, argutioribq; & minoribus incisuris: σέλινον ἄγριον, Apium silvestre, cuius meminerunt Theophrastus & Dioscorides, hic ex Dalechampij opinione depictum est, descriptumq; radice gracili, longa, candida, odorata, folio Apii hortensis, perquam tenui, caule palmum alto, flore pusillo, albo in exiguis umbellis, quas herbacei cortices glumis spicarum non dissimiles sustinent, & subtus ambiunt, semine minutulo. In asperis collibus provenit. Dodonæus longè aliud silvestre Apium exhibuit, quod foliis est magnis, valde incis, planè silvestris pastinacæ, sed multò maioribus, caulibus rotundis, cauis, quaternos



*APIVM Siluest. Dodon.*



ternos quinóve pedes longis, ima parte ex fusco rubentibus, in quorum summitate rotundæ umbellæ flores albos gerunt, deinde semen cōpressum, hirsutum, anetho, haud dissimile, sed maius: radix in duas tréve alias secatur radices, non in altum descendentes, sed obliquè huc illuc sparsas, calefaciendi vi præditas, & linguam vrentes. Ex tota herba, tam ex caulibus quàm ex foliis succus albus manat non aliter quàm ex tithymalis. Thysseliū fortasse Plinij. Thysseliū est, inquit, non dissimile Apio: huius radix commanducata purgat capitis pituitas. Silaus Plinij quibusdam, perperam Meum Barauis & Antuerpiensibus. Ελδοσέλιον, palustre apium, Gazæ paludapiū, Officinis Apiū, Mauritanis *Asilus*, italīs *Apio palustre*, Germanis *Eppich*, seu *Eppich*, Hispanis *Perexil d'agua*, Gallis *Perfil de mare*, *Ache*, *Api*. Satiuo grandius, sed ingrati tum saporis, tum odoris, in aquosis locis nascitur. *ὀρεοσέλιον*, Latine etiam *Oreoselinum*, & *Apium Monranum*, Gallicè *Perfil de montagne*. Id, inquit Dioscor. Caulis est vnus dodrantalis

Thysseliū  
Plinij.  
Lib. 25. c. 11.

Forma.

Oreoselinum.  
Lib. 3. c. 64.

Forma.

extenui radice. Circa ipsum sunt ramuli & capitula cicute similia, multò tamen tenuiora, in quibus semen oblongum, acre, tenue, odoratum, cumino simile. Nascitur in petrosis & montibus. Quod ex herbariorum sententia hîc depinximus, radice crassâ, longa extrinsecus nigra, intus candida, acri, odorata, aromatica, foliorum densa coma circa radicem humi iacentium, Apio hortensi similem, sed

*APIVM Palustre, Matth.*



*APIVM Palustre, Fuchs.*






## APIVM Montanum, Dalech.



## PETROSELINVM

Dalechampij.

Petroseli-  
num.

Lib. 3. c. 64.

Forma.

latiorem iucunde olentium in pediculis infernè rubentibus: caule cubito altiore, è medio foliorum ambitu proficiente, ferulaceo: Flore in umbella candido, semine Apij, acri, odorato & amaro. Prouenit in asperis, saxosis, lapidosis, apricis, nonnunquam etiam ex saxorum rimis emicat. Floret Iulio mense. Sed cum in hac planta quadam Dioscoridis historia repugnent, nihilominus herbarij, vt diximus, plantam istam Oreoselinum, & horum quidam Oreoselinum maius appellant: aiuntq; deprauiatos esse Dioscor. codices, præsertim ubi legitur, *περὶ δὲ αὐτὸν κλωνία καὶ κεφάλια μακρόν παρεμπερή*, in aliis *κωνία παρεμπερή*. Nam cum Theophrastus & Plinius scribant, vt dicemus, Apio montano inesse folia Cicuta, cumq; nihil edat capitulis papaueris simile, perspicuum est legendum esse non *κεφάλια μακρόν*, sed *κὼφύλλα κωνίω παρεμπερή*, idest, & folia cicuta similia. Alij aliud Oreoselinum proponunt in Sequanorum montibus ad pratorum saxosos margines nascens, caule & foliis Cicuta, nunc humile, nunc procerum pro loci natura: radice tenui, candida. Flore in umbella albo, semine oblongo, nigro, acri, odorato, Cymino simili. Parisienses pro Oreoselino plantam monstrant raram & nobilem in fabuloso Surenæi montis vertice, nec vsquam alibi nascentem, radice longa, crassa, acri, odorata, sapore & odore Empetro nostro simillimo, coma Apij, humi procumbente, densa: flore in umbella candido, semine acri, & odoris suauis. *Πετροσέλινον*, & *πετροσέλινον μακεδονικόν*, Latine Petroselinum & Petrapium, & Apium saxatile, & Petroselinum Macedonicum, quod copiosius in Macedonia proueniat, in præruptis locis, ait Dioscorides, semine annui, odoratiore, acri & aromatico. Verum id Petroselinum esse putat Dalechampius, quod hic depinximus, in saxosis tumulis prope Gratianopolim nascens, atque adeò rupibus ipsis paucula terra operis hærens, qua sol flagrantissimus illudit radios, radice breui, parum fibrata, nigra, nec, quod mirum est, acri, nec odorata, supernè festucis comata, folio Apij hortensis, non illo quidè latiusculo, coriandro simili, prope radicè luxuriante, sed Altero illo tenuiore, anetho propemodum simili, summis Apij caulibus & ramis conspicuo ac exili, cum teritur Apij hortensis odorem sic spirare, vt si quis clausis oculis naribus admoueat, apium hortense olfactu esse iudicet, flore in umbella non prorsus candido, sed nonihil rubente, semine apij hortensis, primum



mum subrubro, deinde nigrescente, si gustes, amaro initio, at cum plusculò manditur acri & valde vrente, odorato quod Galenus in hoc semine requirit. Aliud

PETROSEL. Macedon.

Matthiol.



HIPPOSELINVM, Matth.

sive Leuisticum vulgare.



sed paulum quid vtrinque retusa in basi, medicato gustu, acri, ad Smyrnum accedente, radix est satis crassa longaque, hortenfi magis succosa, vesca, tenerior quam

Petroselinum Macedonicum depinxit Matthiolus, quod iam in quibusdam Italiae hortis colitur petito ex Macedonia semine, foliisque exit apio palustri similibus, sed minoribus, caule crasso, ramoso, alis frequentibus cauo, floribus albis, semine hortenfi apio simili, odorato & amarescente, *ἵπποσέλινον* Græcis, Latinis Olusatrum nominatur, Gaza Equapium, à magnitudine sic dictum. Est enim maius Apio hortenfi & candidius, inquit Diosco. caule cauo, alto, tenero, veluti lineas habente, foliis latioribus, subpunicis, in quibus est coma velut roris marini, flore plena, in corymbos priusquam deflorescat, compacta. Semē est nigrum, oblongum, acre, solidum, aromaticum: radix odorata, candida, non crassa, ori grata (*ἵππος* enim legitur in vulgatis exemplaribus, in antiquo *ἑστὸμαχος*, id est, ventriculo grata) Nascitur in locis umbrosis, & iuxta paludes. Matthiolus pro Hipposelino monstrat Leuisticū vulgare hic depictum, cum nullam aliam plantam norit quæ legitimam referat, & Brassauolam reprehendit, qui herbam Maceronē Italici vulgo vocatam Hipposelinū esse falsū existimari fortasse, inquit, peruersa Marcelli interpretatione deceptus, qui præter Dioscoridis sententiam hipposelino radicem intus candidam, foris nigram reddidit, cum tamen in Dioscoride nulla nigri coloris fiat mentio. Eius Marcelli lapsus in causā esse potuit, quod apud Theophrastū legerit Hipposelini radicem Raphani modo crassam esse, sed nigram, cum Theophrastus illic non Dioscoridis Hipposelinum, sed Smyrnum potius descripserit, ut dicemus. At non solum Marcellus & Brassauola, sed Dodonaus, Pena & plerique alij herbarij plantam, quam recentiores Petroselinū Alexandrinum, Officinæ nō sine errore Petroselinum Macedonicum vocant, Galli *Alexandre*, Hipposelinum verum esse asserunt. Caules edit alāsve multas statim à radice, folia Apij palustris, sed maiora, rotundiora ex atro virentia. Caulis est striatus, bicubitalis, cōcauus: Apij umbellæ corymborum instar pendula, maturitatē assecuta, onustæ semine copioso, atro, vnde illi Olusatrum nomen, pleno, grani, semisphærica figura,

In cap. 64.  
lib. 3.

Hipposelinum.

Ibid.  
Forma.

In cap. 64.  
lib. 3.

Lib. 5. c. 45.  
In Ad. fol. 315.



- suapte sponte nato, foris color pullus, intus albus, odora, gustu grato & nonnihil medicato: non solum Italis, sed & Gallis, Germanis, Anglis avidissime in acetariis expetita, quæ etiamnum tempore Dioscoridis cruda coctave debatur. Quamobrem à sedulis olitoribus passim in hortis colitur. Leuistici nullus usus in acetariis, non est enim herba oleracea, sed ingratisima & acerrima gustu: semen multum diuersum sapore, odore, & tota umbella. Quatum ad Marcelli interpretationem attinet, ea peruersa existimanda non est, si radices foris nigras, intus albas in quopiam exemplari à vulgaribus diuerso legit & scripsit. Theophrastus apij genera distinxit his verbis. τῶν δὲ σελίνων καὶ ἐν τοῖς φύλλοις, καὶ ἐν τοῖς καυλοῖς αἱ διαφοραὶ. τὸ μὲν γὰρ πυκνὸν ἐστὶν, καὶ διασπύρον τὸ φύλλον ἔχει. τὸ δὲ μακρότερον καὶ πλεονέστερον, καυλὸν δὲ μετρίω. τούτων δὲ πάλιν τὸ μὲν λευκόκαυλα, τὸ δὲ πορφύρεοκαυλα, ἢ ποικιλόκαυλα. τὸ δὲ ὅλον ἅπαν τὸ τοῖσδε τὸν ἐμφερὲς αἶον τῶν ἀγρίων. Quæ Plinius reddidit his verbis. Et satui autem differentiæ in folio denso, crispo, aut rariore & lauiore, item caule crassiore & tenuiore, & caulis aliorum candidus est, aliorum purpureus, aliorum varius. Idem Theophrastus aliquanto post, τὸ δὲ ἐπὶ ποσέλινον καὶ ἐλεσιόσελινον, καὶ ὄρεοσελίνον, καὶ πρὸς ἐλμὸν διαφορὰν ἔχει, καὶ πρὸς τὸ ἥμερον. τὸ μὲν γὰρ ἐλεσιόσελινον τὸ παρὰ τὰς ὀχλοῦς, ἐν τοῖς ἐλεσι φυτόμενον, μονόφυλλον δὲ, ὃ δὲ διασπύρον γίγνεται, πρὸς ἐμφερὲς δὲ τῷ σελίνῳ καὶ τῇ ὁσμῇ, καὶ τῷ καυλῷ, ἐτὶ σχήματι. τὸ δὲ ἐπὶ ποσέλινον φύλλον μὲν ἐμφερὲς τῷ ἐλεσιόσελίνῳ, διασπύρον δὲ, καὶ μεγαλόκαυλον, ἐτὶ τὴν ρίζαν ὥσπερ ῥαφανὶς ἔχει τὸ πάχος, μέλαιναν, μέλας γὰρ καὶ ὁ καρπὸς, μέγεθος δὲ μετρίον ὀρύβου. τὸ δὲ ὄρεοσελίνον μετρίως ἐστὶ διαφορὰς ἔχει. τὸ μὲν γὰρ φύλλον ὁμοεικὸς ἐστὶν, ῥίζα δὲ λεπτή, τὸν δὲ καυλὸν ἔχει καὶ ὥσπερ ἄνηθον, πλεονέκτητον. διδρασι δὲ τοῦτον ἐν ὀνίφ ἀντηρῷ, τῶν γυναικείων χάριν. Ex quibus Plinius hæc mutuatus est. Id quod sponte in humidis nascitur, eleoselinum vocatur, vno folio, nec hirsuto. Rursus in siccis hipposelinum, pluribus foliis, simile eleoselino. Tertium est oreoselinum, cicutæ foliis, radice tenui, semine anethi, minuitore tantum. In quibus error est in Plinio, qui de eleoselino μονόφυλλον pro μονοφύλλῳ legit, atque ita deceptus vno folio pro raro folio conuertit. Deinde falsò legitur in Theophrasto de oreoselino καυλὸν pro καρπὸν. Non enim caulis, sed semen anethi semini simile est, veluti Plinius rectè reddidit, semine anethi. Ex utroque verò perspicuum est in Dioscoride de oreoselino tractante legendum καὶ φύλλα κωνίφι ἐμφερῆ, pro κεφάλια κωνίφι ἐμφερῆ id est, folia cicutæ similia, pro capitula papaueri similia, ut iam diximus. Præterea Theophrastus ex hipposelini radice raphani modo crassa, nigra, & succo eius myrrhæ simili apertè docet, id se cum smyrnio, quod etiam monuit Dioscorides, confudisse, quod etiamnum hodie Græci faciunt. Nunc singulorum vires expendendæ. Apij hortensis herba, inquit Diosco. ad eadem ad quæ coriandrum conuenit: ad inflammationes oculorum cum pane aut cum polenta polline illinitur: æstum stomachi mitigat: mammas ex concreto lacte induratas laxat: siue crudum, siue coctum edatur vrinas ciet. Dococtum ipsius radicisque portum letalibus medicamentis resistit, vomitus mouet, aluum sistit. Semen vehementius vrinam ciet, contra venenatarum bestiarum morsus, & epotum lithargyrum auxiliatur, flatus dissoluit. Admiscetur commodè medicamentis dolorem sedantibus, & thoracis & tussis remediis. Galenus verò, Apium vsque adeò calidum est, inquit, ut & vrinas & menses ciet: flatus quoque, discutit, & magis semen quàm herba ipsa. Quæ siue de apio nostro hortensi vulgariq; siue de apio palustri intellecta, si vera sunt, ut certè vera esse experientia certò comprobatur, qui apium calidum ad eadem ad quæ coriandrum conuenit, quod idem Dioscorides refrigerandi vi præditum esse scripsit? Qui calidum inflammationibus oculorum proderit? æstuantis stomacho, mammis lacte turgentibus? Hunc nodum sic soluit Petrus Pe. esse præsidia non parum multa, quæ contrariis aut valde diuersis polleant facultatibus, & tamen eidem medeantur affectui eiusdem incremèti & modi. Id in capitis fractu



fracturis & vulneribus, inquit, facile de Galeni Celsiq; lectione, & medicamento-  
rum collatione discas, quorum hic siccantibus frigidis, ille verò calidis digeren-  
tibus, etiãque humectantibus feliciter vsi fuere. Testium tumoribus viola-  
ceo farinis excepto leguminum quidam, alij verò Cretensi feruido vino excepto  
cumini puluere medentur. Sic nihil mirum coriandri succo refrigerante, & paul-  
lum quid adstringente partim dissipari, partim repelli materiam eiusque incre-  
mentum, vel apio calfaciente digerentẽque in habitum per poros laxatos dissilari.  
Galenus in Consilio pro puero epileptico apium probat & laudat. Contra Aui-  
cenna tanquam venenum fugiendum esse suadet. Aiunt enim Arabes tum oculis,  
tum epilepticis noxium esse, quod eius vsus epilepsia paroxysmum inuehat. Sed  
Galenus apium, nostrum est hortense & vulgare petroselinum, incidendi vi pradi-  
tum, quod in epilepsia tuto dari potest. Auicennæ verò & cæterorum Maurita-  
norum apium, id est, quod Officinis hodie quoque apium dicitur, Græcis Eleose-  
linum, de quo mox. Apio, inquit Plinius, gratia vulgo est, namque rami largis  
portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiarem gratiam habent.  
Præterea oculis illitum cum melle, ita ut subinde foueantur feruenti succo deco-  
cti, aliisque membrorum epiphoris per se tritum, aut cum pane vel polenta im-  
positum mirè auxiliatur. Pisces quoque si ægrotent in piscinis, apio viridi recreã-  
tur. Galenus alibi, familiarissimum, iucundum, & stomacho gratum apium esse  
scribit. Hippocrates, Apium, inquit, magis vrinam ciet quàm aluum mouet: &  
radices magis quàm ipsum, aluum mouent. Idem in libro de internis affectionib.  
ubi à pituita in aquam intercutem transitus fit, ex oleribus raphanorum & apij  
vsus præscribit. Ex quibus colligere licet apium hic intelligi vulgare nostrum  
petroselinum hortense. Videmus enim etiam hoc tempore eius folia ramulof-  
que per iura tum carniũ, tum piscium innatare, aqua butyròque incoqui, & iu-  
sculum iucundum inde effici, sicuti idem Plinius apium suauiores aquas potui in-  
coctum præstare dicit. Eleoselinum id est, paludapium, siue apium palustre, ad ea-  
dem ad quæ apium efficax est, inquit Dioscorides, sed est ingrati tum saporis tum  
odoris, ut si quod fuerit apium Chrisippi, Dionysijq; medicorum consiliis à cibis  
abdicatum, quia propensius paroxysmum epilepticum excitet, visus quoque cla-  
ritati sit inimicum, istud palustre apium sit merito censendum. Est tamen efficax  
valde, ideòque Arabibus & pharmacopœis nonnullis vsitatus in syrupis ad ob-  
structiones tollendas præscribi solitis ut in Byssantino, & quinque radicum. Pli-  
nius, Eleoselino, inquit, vis priuata contra araneos. Oreoselinum vrinam ciet, au-  
ctore Dioscoride, semine ac radice ex vino potis: menses trahit. Miscetur antido-  
tis & medicamentis vrinam cientibus & excalfactoriis. Petroselinum eodem au-  
ctore, vrinam ciet & menstrua: contra stomachi & coli inflationes & tormina  
prodest: laterum, renum & vesicæ doloribus in potu subuenit. Admiscetur anti-  
dotis vrinam cientibus. Petroselini semen, inquit Galenus, maximè vsui est, tum  
tota etiam herba vnà cum radice similem, sed imbecillio rem facultatem sortiatur.  
Est autem gustu acre cum amaritudine, sic & facultate calidum vnà cum inciden-  
di effectu. Hinc menses & vrinas affatim prouocat, flatus extinguit, fuerit itaque  
& ipsum tertij ordinis tum excalfacientium, tum desiccantium. Hipposelinum,  
ut scribit Dioscorides, oleris modo editur, ut apium radix tum cruda tum cocta  
estur, folia cum caulibus decocta manduntur, & per se aut cum piscibus præparan-  
tur, crudaque muria condiuntur. Vim ducendi menses semen habet in mulso  
potum, calfacit frigore prehensos tum potum tum illitum: vrinæ stillicidio auxi-  
liatur. Radix eadem præstat. Plinius, Olusatrum, inquit, quod hipposelinum vo-  
cant, aduersatur scorpionibus. Poto semine torminibus interaneis medetur: itẽm  
que difficultatibus vrinæ semen eius decoctum ex mulso potum. Radix eius in vi-  
no deco

Lib. 20. c. 21.

Lib. 2. Al.

Lib. 2. de  
Diat.

Lib. 20. c. 11.

Petr. Pe.  
Pl. lib. 20.  
cap. 11.

Lib. 20. c. 11.

Lib. 3. c. 64.

Lib. 8. sim.

Ibid.

Lib. 20. c. 11.



no decocta calculos pellit, & lumborum ac lateris dolores. Canis rabiosi moribus potum & illitum medetur. Succus eius argentes calfacit potu. Hæc ferè omnia ex Dioscoride qui quos *ῥιγούρας* dixit, ille argentes conuertit, id est, aut frigore aut rigore prehenso. Nam de utrisque intelligi posse videtur, tum de his qui ab externi aëris frigidi occurfu frigus contraxerunt, tum de iis qui rigorem febres præcedentem patiuntur. His addit Theophrastus, *γίνεται ὅ καὶ τὸ δάκρυον ἐξ αὐτῶν ὅμοιον τῇ μύρρῳ. οἱ δὲ φασὶν ὅλως μύρραν*. Quæ Plinius sic. Sed præcipuè olulatum myrrhæ naturæ est, hipposelinū Græci vocant, alij smyrnium. E' lacryma caudicis sui nascitur, feritur & radice. Succum eius qui colligunt, myrrhæ saporem habere dicunt. Auctorque est Theophrastus myrrha sata natum. Ex quibus colligere licet Theophrasto hipposelinum dici, quod ab aliis smyrnium vocatur.

Lib. 7. hist.  
cap. 6.  
Lib. 19. c. 8.

### SMYRNIVM. CAP. VIII.

#### Nomina

Lib. 3. c. 64.

Lib. 3. c. 65.

Forma.

#### Locus.

Lib. 27. c. 13.

Lib. 19. c. 12.

Cap. 290.  
hist.

In cap. 65.  
lib. 3.

*Μύρρον* Græcis, Smyrnium Latinis dicitur, in Cilicia petroselinum, & quibusdam hipposelinum agreste auctore Galeno. Smyrnium dictum est, quod semini idem sit odor qui myrrhæ, vel radici, ut scribit Plinius. Monuit Dioscorides hipposelinum à quibusdam Smyrnium vocari, quum tamen aliud sit quod propriè Smyrnium dicitur, quod ex descriptionum collatione cognosci potest. Smyrnium, inquit, caulem gerit apio similem, propagines multas habentem, folia latiora, ad terram confRACTA, subpinguia, robusta, cum acrimonia odorata, medicatæque, & colore sublutea, umbellam in caule qualis anetho inest, semen rotundum, brassicæ simile, nigrum, acre, myrrhæ sapore, ut alterum pro altero vsurpetur. Radix est acris, odorata, tenera, succosa, fauces mordens, cortice extrinsecus nigro, intus cum virore pallido, aut subalbicante. Nascitur in petrosis locis, siccis collibus & limitibus agrorum. Plinius idem Smyrnium describens in paucis à Dioscoride variat. Smyrnium, inquit, caulem habet apij, folia latiora, & maximè circa stolones multos, quorum à sinu exiliunt pinguia, ad terram infracta, odore medicato, & cum quadam acrimonia iucundo, colore in luteum languefcente, capitibus caulium orbiculatis ut anethi, semine rotundo, nigro, quod arescit incipiente æstate. Radix quoque odorata, gustu acri mordet, succosa, mollis, cortex eius foris niger, intus pallidus, odor myrrhæ habet qualitatem, unde & nomen. Nascitur in saxosis collibus & in terrenis. Idem alibi, & Smyrnium olus feritur iisdem locis, myrrhæque radice respicit. Hæc ille de Smyrnio propriè dicto, qui tamen alibi, ut ostendimus, hipposelino, quod & impropiè Smyrnium appellatur, tribuit myrrhæ saporem, atque cum illo Smyrnium confundit Theophrastum secutus. Hæc quamvis dilucidæ satis delineationes, non æquè omnibus notum Smyrnium reddiderunt. Fuchsius Ruellium secutus Smyrnium eam herbam esse putat, quam hodie Leuisticum nominant, Gallica rura *Leueche*. Matthiolum contendit Smyrnium ei herbæ simillimum esse, quæ in Hetruria vulgò vocatur *Macerone*, quod caule sit apij, stolonibus multis referto, foliis latioribus, subpinguibus, robustis, ad terram versis, odore medicato, cum quadam acrimonia iucundo, colore in luteum languefcente. Præterea in caulium summitatibus umbellam gerit anethi modo, semine brassicæ, maiore, oblongo tamen, nigro, acris odore myrrham referente. Denique radice nititur odorata, acris, succosa, mollis, cortice exteriùs nigricante, interiore parte ex albò virescente. In quibus etsi Maceronis semen brassicæ semini compararit, tamen iis respondens qui similitudinem hanc reprehendere possent, quod illius semen rotundum non sit veluti brassicæ, ait, cum ceteræ omnes notæ illi respondeant, faciliè in seminis delineatione mendum subesse potuisse, vel quod non in rotunditate, sed in alio quopiam huic semini



SMYRNIVM,  
Matthioli.

SMYRNIVM Verum,  
Diosco. & Dodo.

707



semini cum illo intercedat similitudo. Aliis, inquit Pena iam in procinctu est  
Smyrniij veri cognitio, & ab hipposelino & leuifolico distinctio, quibus nota sit illa  
planta iamdiu in multis Galliae & Belgij hortis enata, cuius radix crassiuscula, fo-  
ris nigricans, intus alba: folia ima ampla & multipliciter dissecta, reliqua rotunda  
& caules circumambientia, ut ab eis traiecta,

SMYRNIVM Creticum,  
Matthioli.



in perfoliata herba cernantur, umbellae ane-  
thi, aut perfoliatae: flores ex luteo herbacei pal-  
lentes, semen fuscum, subrotundum raphano-  
minus, brassicae par & simile, prorsum myr-  
rham spirans, acre. Hanc plantam sic expresse-  
runt Dodonaeus & Lobellius. Matthiolus Smyr-  
nium Creticum depinxit, quod ab aliis accepit,  
sed est eius pictura à superiore satis diuersa.  
Hoc ita describit. Fert folia macerone crassio-  
ra, quina ex singulis pediculis, per ambitum ser-  
rata, altera parte ima ab exortu mutila, longè  
autem diuersa in caule: sunt enim rotunda, & à  
caule ramisq; in quibus nascuntur, perfoliatae  
modo transinguntur, nullis in ambitu denti-  
culis. Caulem edit firmum, striatum, & subter  
folia geniculatū, è quo in latere quo folia per-  
forantur ramuli exeunt, ex singulis foliorum  
finibus, striati. Umbellam in caulium ramulo-  
rumque summitatibus gerit, racematim disse-  
ctam, floribus albicantibus, semine haud bras-  
sicae simili, sed rotundo, anguloso, & in acutum  
desinente, colore ex flauo nigricante, sapore  
acuto

In cap. 65.  
lib. 3.

Matth. in  
cap. 65. lib. 3



*Vires.*  
*Temper.*  
*Lib. 3. c. 65*

*Lib. 27. c. 13*

*Lib. 2. Ali.*

*Lib. 8. sim.*

acuto & amariuscule, pediculis longis striatisq;. Quare indicat smyrniū suum multo propius ad smyrnij Dioscoridis historiam accedere. Veri smyrnij radix, herba & semen vim habent calfaciendi, inquit Dioscorides, olerum modo comedantur folia muria macerata, & aluum sistunt, radix serpentium moribus pota succurrit. Tussis & orthopnoas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Illita recentia cedemata, phlegmonas, & duritias discutit, & vulnera ad cicatricem perducit, seruesceta & subdita abortus facit. Semen eius lienis, renum & vesicę vitiis prodest, menses & secundas pellit. Commodè ischiadicis cum vino bibitur, inflationes stomachi mitigat: sudores & ructus ciet. Potum peculiariter hydropicis, & febrium circuitibus prodest. Eadem & quædam alia huic tribuit Plinius his verbis. Vis eius calfacere, extenuare, vrinam & menses cient folia & radix, semen aluum sistit, radix collectiones & suppurationes non veteres, item duritias discutit illita. Prodest & contra phalangia & serpentes, admixto cachry, aut polio, aut melissophyllo in vino pota, sed particulatim, quoniam vniuersa vomitionem mouet, quæ de causa aliquando cum ruta datur. Medetur tussi & orthopnoæ semen vel radix item thoracis, aut lienis, aut renum, aut vesicę vitiis. Radix autem ruptis conuulsis. Partus quoque adiuuat, & secundas pellit. Datur & ischiadicis cum crethmo in vino. Sudores ciet & ructus: ideo inflationem stomachi discutit, vulnera ad cicatricem perducit. Exprimitur & succus radicis, vtilis sceminis, & thoracis præcordiorumque desiderijs: calfacit enim, purgat, & concoquit. Semen peculiariter hydropicis datur potu, quibus & succus illinitur, & malagmate è cortice arido. Et ad obsonia vtuntur cum mulso & oleo, & garo, maxime in elixis carnibus. Quidam, Plinium putant in exemplari Græco vnde hæc sumpsit pro ἐνδομήματα, legisse ἐπιδομήματα, id est, remedia admouenda thoraci & præcordijs. Galenus de Smyrnio scripsit vt alimento, & vt medicamento. Smyrnum, inquit, non est insuaue, ideoque Romæ plurimum varnit. Multo autem acrius est & calidius quam apium, quin & odorati quippiam habet. Quapropter efficacius vrinam, quam apium, hipposelinum, sum, & mulieribus menses mouet. Veris tempore caulem producit, qui crudus edendo est haud aliter quam folia, quæ sola per hyemem inhaerent plantæ nondum caulem habenti, sicut neque tunc apium habet. Postea verò caule accedente tota planta iucundior redditur, siue quis crudam ipsam, siue coctam mandat, siue ex oleo & garo, siue acetum, siue vinum velit adicere. Et alio in loco. Smyrnum quidam hipposelinum agreste cognominant. Ex eodem genere & ipsum cum apio est, & petroselino, apio quidem validius, petroselino autem imbecillius. Menses itaque & vrinam mouet, calidum & siccum tertio ordine. Cilices in Amano monte natum, Petroselinum vocant, minus verò petroselino & smyrnio (nimirum hipposelino, quod & Smyrnum) vocant: acre est. Proinde & vlceribus imponi potest, quia sine molestia desiccat. Sed & digerere quæ indurata sunt potest. Reliqua vis eius apio & petroselino similis est, quare & semine eius vtimur ad menses, vrinam, & asthmata.

## S I S O N.

## CAP. IX.


*Nomina*  
*Lib. 3. c. 55.*  
*Forma.*



VOD Græcis σίσων, Latinis quoque Sison dicitur, Hippocrates vocat Sinona. Scribit Dioscorides semen esse paruum in Syria proueniens apio simile, oblongum nigrum, seruens. Huius seminis plantam docti quidam herbarij iudicant esse eam, quæ hic depingitur, & à Dodonæo petroselini Macedonici nomine describitur, ab aliis petroselinum exterum nuncupata. Foliis est longiusculis, in plura scissis, profundius incisis lateribus, & toto ambitu crenatis, caulibus gracilibus bipedalibus, in quibus umbellæ parvæ albicant.



SISON seu Petroselinum  
Atacdonicum Dodonai.



albicant: semen est fuscum hortenſi apio ſimile, ſuauius tamen, odore magis aromatico & feruidiore, radix gracilis eſt, & multum fibrata. Locis aſperis, ſaxoſis, & incultis gaudet. Seritur etiam in hortis, in quibus menſe Iulio florer, Auguſto ſemē profert. Bibitur ad ſplenis vitia, inquit Dioſcor. vrinæ difficultatem, & ad ſuppreſſos menſes. Vtuntur ipſo incola pro condimento, cum cucurbita cocta & aceto ſumētes. Habet autem velut granula multa in cacuminibus. Eadem tradit Galenus. Sifon, aliās Sinon calidus, & ſubamarus guſtu eſt, quare vrinam mouet & concoquit, menſeſque prouocat omneſque viſcerum obſtructiones reſerat. Cornarij vetuſt Plinianus codex, Sinen habet, vbi in vulgariſ ſimul legitur, & quod ſequitur ad Sinon pertinens, ſmyrnio attribuitur. Locus iſt eſt. Sinon concoctiones facit, ſapore ſimilima piperi. Eadem in dolore ſtomachi efficax. Quod ſapore piperis eſſe ait, reſpondet voci πυρωτιδον, quam Dioſco. uſurpat, feruidum eſſe ſcribens.

Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 55.

Vires &

Temper.

Lib. 8. ſim.

Embl. 5.

Lib. 5.

Lib. 27. c. 13.

GINGIDIVM.

CAP. X.



RACIS γινγιδιον, & λεπιδιον auctore Dioſcoride, Latinis Gingidiū. Naſcitur copioſiſſima in Cilicia & Syria, inquit ille, herbula ſilueſtri paſtinacæ ſimilis, ſed tenuior & amarior (Græcè legitur λεπιδιον, id eſt, tenuior denſiorque, aut ſolidior. Cui lectio- ni retragantur interpretes omnes, qui πυρωτιδον id eſt, amarior conuerterunt, Galenum & Plinium ſecuti) radice ſubrotunda, amareſcere. Editur crudum & coctū, & ſale aſſeruatum. Eſt autem ſtomacho vtile: ciet vrinam, decoctum ipſius ex vino potum veſicæ prodeſt. Plinius non multò clariuſ id deſignauit, Syria in hortis operoſiſſima, indeque prouerbium Græcis, Multa Syrorum olera. Simillimam ſtaphylino herbam ſerit, quam alij gingidium vocant, tenuius tantum & amariuſ eiuſdemque effectus. Eſt crudum coctumque ſtomachi magna vtilitate. Siccatur enim exactos omnes eiſ humores. Galenus, Plurimum, inquit, in Syria Gingidium naſcitur & editur, ſimile apud nos ſcandifci. Eſt autem ſtomacho valde commodum, ſiue crudum, ſiue ſeruſ factum edere ipſum velis, longioreſ autem cocturam non ſuſtinet. Quidam edunt ipſum cum oleo & garo. Quidam etiam vinum aut acetum addunt, & multò magis commodum eſt, & auerſantibus cibum appetentiam facit, ſi cum aceto edatur. Eſt ſatis clarum hanc herbulam, medicamentum potiuſ eſſe quàm alimentum. Nam & adſtringendi vi, & amaritudine manifeſta non modica participat. De hoc itaque vt medicamento ruſſus agit hiſ verbis. Gingidium quemadmodum guſtu amaritudine & adſtrictione participat, ita temperamento caliditate & frigiditate. Iuxta ambas autem qualitates ſiccatur, & ſtomacho commodum eſt, eo quod non pauca adſtrictione participat. Caliditatem equidem non ita manifeſtam poſidet, ſiccatur autem ordine ſecundo. Gingidium igitur ex Syria venit in Græciam & Latium, Dioſcoridis, Galeni, Pauli; ætate notiſſimū olus, nunc vix vlli notum. Ruellius gingidium plantam eam eſſe cenſet, quæ vulgò

Nomina

Lib. 2. c. 131.

Forma.

Lib. 20. c. 5.

Lib. 2. Ali.

Lib. 6. ſim.


Lib. 2. c. 70.





Ca. 8. h. 11. Chærophyllo, Gallis Cerfeuil; Germanis Kerfel, & Kerfelkraut dicitur. Fuchsius eandem  
 In cap. 131. pro Gingidio pinxit & descripsit. Quibus Matthiolus refragatur, legitimūque  
 lib. 2. Gingidiū ex Syria allatum, & à Jacob. Anton. Cortuso ad se missum depinxit, de-  
 Forma. scripsitq; his verbis. Gingidium pastinacæ silvestri haud absimile est, amarius ta-  
 men, caule rotūdo, ramoso, sesquipedali, striato,

V I S N A G A, *Gingidium*  
 Matthiol.




Lib. 5. cap.

subnigricante, geniculatōque: umbella in cacu-  
 mine alba, minoribus circumquaque comanti-  
 bus foliis, è floribus semen prodit, quo mature-  
 scente umbellæ in sese contrahuntur, ut in pa-  
 stinaca, & tactu glutinosæ sentiuntur, radicem  
 habet candicantem, palmari longitudine, sub-  
 amaro sapore. Ex Syria in Italiam aduectum  
 semen iam in hortis feritur. Lobellius aliud  
 Gingidium foliis Baucis Syriacum mōstravit.  
 Hæc dodrantalis planta, inquit, Venetias Ale-  
 po Syriæ missa Sequini Martinelli opera: flos  
 illi albus & sapor Gingidij, folia verò Baucis  
 vel Elaphobosci minora. Tradit Matthiolus  
 non deesse qui velint plantam Vinsagam appel-  
 latam, vel legitimū esse Gingidium, in qua sen-  
 tentia sunt Dodonæus & Anguillara, vel eius al-  
 terum genus, quod folia quadantenus magis  
 Pastinacam referre videantur. Illorum opinio-  
 nem Matthiolus improbat, quod Vinsaga pla-  
 ta sit pastinaca longè maior, & grandes robu-  
 stasque gerat umbellas, adeo ut pediculi ex qui-  
 bus constat dentiscalpij iam multis in vsum ve-  
 nerint.



*VISNAGA* Gingidium,  
Dodonai.

*CEROFOLIUM* Gingid.  
multorum, Matth.



nerint. Quare Visnagam potius maiorem pastinacam siluestrem vocandam esse  
censet, quod eam non solum notis omnibus refert, sed etiam viribus. Hanc Pena In Ad. fol.  
324.  
vidisse se affirmat multis Italiae locis, praesertim via qua itur Pafaro Romam, &  
Aquitaniae Ageni secus Garumnam, & Burdegalam, tam bene congruentem de-  
scriptioni quam ceteras. Nam de gingidij umbella nulla in Dioscoride mentio.  
Foliis quidem caulibus geniculatis, floribus, & reliqua facie siluestri pastinacae si-  
milis est Visnaga: sed foliis tenerioribus, densioribus, minutius dissectis, caulibus  
gracilioribus & laevioribus, neque tota hirsuta quemadmodum pastinaca silue-  
stris, sed laevis & nuda, amaro gustu, flosculi in umbellis candicant velut in pasi-  
naca siluestri semine maturo, adeo rigida & lignea fit umbella, ut dentiscalpiis  
apta sit, radix candida est & amara. Ceterum cum Cerofolium nostrum in cibo-  
rum usum veniat, & suas quoque in medicina vires habeat, gingidijque species  
videatur, de eo hic differendum. Planta est nemini non nota, passim in hortis na- March. lbi.  
scens, fragilis ac tenera, senis ferè semper ex singulis pediculis emergentibus foliis,  
vulgaris petroselinii modo, in ambitu incisus, caulibus sesquicubitalibus, pingui-  
bus, subrufescentibus, inanibus, geniculatis: umbellam in summo caule gerit albis  
floribus ornatam, e quibus tenuia rectaque oriuntur cornicula, multa ex vno pe-  
diculo prodeuntia, pilosa, rufescentia, in cacumine aculeata, in quibus semè longi-  
sculum concluditur pullo colore, radix illi brevis, in multas diuaticata fibras. Tota  
planta dulcis est & odorata, acriusculo quodam sapore vix sensili, quod fit ut aliis  
oleribus addita, ea gustui gratiora reddat. Plinius. Rursus alio comitatu, aequi- Lib. 19. c. 2  
noctio autumnii feruntur coriandrum, anethum, atriplex, malua, lapathum, cha-  
rephyllum, quod paderota Graeci vocant. Nam quae sequuntur, & acerrimum sa-  
pore, &c. ad sinapi pertinent. Sed hoc Plinij Charephyllum à Cerofolio nostro  
planè diuersum est.



Nomina

Lib. 2. c. 13.

Vfus.

Lib. 8. sim.

Lib. 2. Ali.

Lib. 22. c. 22.

Lib. 21. c. 15.

Lib. 7. hist.

cap. 3.

Lib. 5. c. 52.

Lib. 24. c. 9.

T. 1. m. l.



Kαρίδις Græcis, Scandix Latinis, siluestre olus est, inquit Dioscorides, sub-acre, amarum, in cibi vsum veniens, crudum & coctum si edatur, ventri & stomacho vtile. Decoctum in potu, vesicæ, renibus, & iocinori prodest. Similiter Galenus, Scandix inquit, ex agrestium olerum genere est, subacre, & amarum, adeo ut in siccando & excalfaciendo, aut secundi sit ordinis intensi, aut tertij incipientis. Urinâ valenter ciet, & viscera obstructione liberat, ex dictis qualitatibus constans. Alio in loco gingidium Scâdici simile esse dixit. Vilcolus Scandicem esse Plinius ostendit his verbis. Scandix quoque in oleris siluestri à Græcis ponitur, ut Opcion & Erastistratus tradunt. Item decocta aluum sistit, semine singultus confestim ex aceto sedat. Illinitur ambustis, urinas ciet. Decoctæ succus prodest stomacho, iocinori, renibus, vesicæ. Hæc est quam Aristophanes Euripidi poëtæ obicit ioculariter, matrem eius ne olus quidem legitimum vendidisse, sed Scandicem. Eiusdem meminit. Reliqua vulgatum in cibo apud eos herbarum nomina Chondrylla, Hypochæris, Caucahis, Antriscum, Scandix, quæ ab aliis Tragopogon vocatur. Qui locus mancus est: legendum enim, Scandix, quæ ab aliis Tragopogon vocatur, &c. Theophrastus Scandicem inter ἐπερσίδεα, id est, ea quibus caulibus per humum prorepit, enumerat, sed vulgata exemplaria habent ἐπερσίδεα & Theodorus annicaules conuertit. Locus is est. καὶ τὸ ἐπερσίδεα πάντων τῶν ποδῶν ἢ τοῦ δῆ. τὰ δὲ γὰρ ἐστὶν ὀρθόκαυλα, καὶ νευρόκαυλα, τὰ δὲ ἐπερσίδεα, καὶ ὀρθόκαυλα, καὶ νευρόκαυλα, καὶ ὀρθόκαυλα, καὶ νευρόκαυλα. Id est, Communis omnium herbarum differentia est, quod alie recticaules sunt & neruicantes, aliis caulibus per humum repit, ut malua, scandici, cucumeri siluestri. Hæc scandix notissima olim Græcis omnibus, quæ toties Athenis in theatro risum & plausum excitauit, plebis cibus, & quotidianum pulmentum, vix hodie à quoquam cognita est, tantum ex capitum in Dioscoride confectione, & stirpium collatione, & ex Galeno Aëtioque gingidio similem esse intelligimus. Sunt qui gingidium Matthioli, Scandicem esse putent.

## SCANDIX.




Alij herbam hic depictam, quæ radice est pastinacæ siluestri similis amara & subacri, eodem fere sapore qui & in radice smyrnij siue Petroselinij Macedoniciprehenditur: foliis pastinacæ siluestris latioribus, ad apij folium magis accedentibus, candidis, minime hirsitis, è caule per interualla sic prodeuntibus, ut in corticofam membranam dilatatum prope caulem folium alterum intra se concepiat, & foras protrudat: caule striato, cubitali: flore in umbella candido, non fœniculi modo & aliarum id genus plantarum, quæ umbellam gerunt, pediculis rotatim constructa, sed quamplurimis apicibus ex candido herbaceis velut coagmentata, peculiari quadam compositione, in nullis aliis herbis vix perspecta. Alij, in quibus est Dodonæus, herbam quæ scanaria, Acus pastoris, & Acula vulgò dicitur, Gallis *Aiguille de Berger*, Plinio pecten veneris, proceritate, cauliculis, foliis, floribus, cerefolio nostro haud multum dissimilem, sed grato illo odore destitutam. Cauliculis est rotundis, duris, foliis cerefolio grandioribus, magis infle-





gis insectis, magis ad fuscū vergentibus, floribus candidis in umbellis, deinde emicantibus ab eodem capitello multis acuminatis rostellis inter se disjunctis, quæ acus seu pectines planè referunt, quibus mulieres linum depectunt & concinnant, radix est alba, digitali longitudine. Veneris pectinem, inquit Plinius, appellant à Lib. 24. c. 19

*SAXIFRAGA Umbellifera, Anglorum.*



similitudine pectinum, cuius radix cum malua tusa omnia corpori infixæ extrahit. Sed pecten Veneris, inquit Pena, fumariam gustu, foliis & vfu representat: vulgus pharmacopœorum etiā Venetiis putat & vlrpat. Acrimonix verò & amaroris eiusdem momenti sunt argumenta, qualia sunt Galeni de fumarix acrimonia. Quā sententiam merito docti viri vellicant, & res ipsa reclamation. Sic chelidonij minoris, ari, & ceparum multò mitiorem experimur acrimoniā, quam illis tribuerint antiqui. Qui verò Saxifragam Percepier Anglorum probè perspectum habet, superiorum duarum stirpium vtrius simile esse sciunt, & neutiquam iisdē viribus secundum, amaror etiam & acrimonia in eo percipitur, & passim valetudinis causa pro oleremanditur, figura ei cerefolij proxima, sed herbula semper est dodrantem alta, nusquam adultior, toto anno suapte sponte erumpit, arido & trito solo luxuriat, sine caule, flosculis herbaceis, vehementer & repente vrinas ciet, muria condita seruatur, & ex ea aqua stillatitia magno vfu elicitur. Hanc plantam Pena proponit magis

In Ad. f. 324



quam affert, ut pote quæ herbariis non valde nota sit, neque iam, quod sciam, ab ullo alio descripta. In Anglia tamen frequentissimo apud mulierculas usu recepta. Huc accersenda Saxifraga umbellifera Anglorum, facie Sefelis pratensis Montpelienisium. Hanc ab eximia virtute frangendi calculi sic Angli nominarunt, pratis vdis familiarem, foliis fœniculi, latioribus, pratensis Sefelis minoribus. Radix odora, foris nigra, intus alba, Pencedani facie: flores in Umbellis candidi, semē fœniculi, caulis cubitalis & sesquicubitalis est.

## CAUCALIS.

## CAP. XII.

Nomina



Auxgalis Græcis, ita Latinis Caulalis nominatur, fortassis à seminum effigie, quæ vascula oblonga & semisphærica imitatur, aut quod præ arida strepitum edunt hæc semina ventis concussa vindemiis exactis, quemadmodum caucalia vasa sonum edunt, dum aqua confertim egreditur aëre exeunte, & contra strepitum edunt dum implentur. Gaza in Theophrasto Pedem gallinaceum conuertit, nonnulli, auctore Dioscoride, daucum siluestre vocat. Caulalis inquit ille, cauliculus est dodratalis, aut etiam maior, subhirsutus, foliis apio similibus, fœniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; vel densis, ut alij reddunt (Sic Ruellius secutus vitiatum codicem, qui habet. *φύλλα ἔχον σελίνου ἐμπερή, ἐπ' αὐτῶν ὁμοειδῆς πολυχῆλη, διασπῶν*. Verum in exemplari veteri, atq; in recentiorum compluribus legitur, *φύλλα ἔχον μαρόθρον ὁμοειδῆς πολυχῆλη*. Id est, folia habet fœniculo similia, multifidaq; Quæ lectio congruit plurimum constitutioni caucalidis) candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum coctumve oleum modo estur, vrinam ciet. Theophrastus caucalidem inter oleracea recenset.

Lib. 1. cap.

Forma.

Lib. 7. hist.

cap. 7.

Lib. 2. cap. 19.

CAUCALIS, Matthioli.

Lib. 2. cap. 1.

Lib. 7. sim.

In cap. 133.

lib. 2.




& Ananienfi tractu in Tridentino agro, nullis reclamantibus notis. Petrosello saluatico vulgò vocant. Quippe quod folia quæ per ima prope radicem exeunt, apium quadantenus effigie referunt, quod vulgò petrosello vocant, etsi quæ superiore parte prodeunt, per ambitum sint fœniculi modo capillamentis diuisa. Caulem mittit


Pastin



CAUCALIS, Dodonæi.



CAUCALIS, Penæ.



Pastinacæ, in cacumine umbellæ gerit floribus  
candicantem, odoratam, dauco non abfimilem.  
Caucalidem flore rubro latioribus foliis vocat  
Lobellius, qui etiam aliam pinxit vulgarem  
floribus candidis, foliis minoribus, sed caule  
proceriore. Caulalidem aliam exhibet Dodo-  
naus, huiusmodi nimirum plantam, à Pastinaca  
siluestri parum distantem, foliis coriandro ferè  
similibus, magis dissectis. In caulium summirate  
umbellæ rotundæ, floribus candidis decoratur,  
quorum extrema folia sunt ampliora: semine lon-  
gum, hirsutum, veluti Pastinacæ siluestris, cumi-  
ni semine maius. In campestribus provenit.  
Iunio mense floret, paulo post semen maturum  
est. Plantam aliam pro caucalide exhibet An-  
guillara, foliis apio minimè similibus. Eam à se-  
iundiu collectam Penæ asserit in præruptis. S.  
Specus vocati ad sanum Magdalenæ in provin-  
cia Narbonensi, & liberum facit quid cuiuslibet  
ea de re videatur statuere. Hic ex Penæ appin-  
gendam curauimus. Est hæc, inquit, caule ter-  
nuculi, & foliis & diuisura, cubitum alta: umbel-  
la albet, & odorata est. Radix unica, recta, humi  
pacta, candida, sapore pastinacæ. Verum hoc  
magis placent vulgares caucalides, inquit Penæ:  
quia sunt caule, foliis, umbella & semine hispi-  
dis, eoq; magis congruunt verbis Dioscoridis.  
Duæ namq; sunt in nostris vinetis & segetibus  
differentiæ: altera candida, foliis minoribus, sed  
caule proceriore, & hæc Matthioli. Altera pur-  
purascens umbellis seu floribus. Folia habet latio-  
ra & crassiora, semine maius. Est istud semine argu-  
tum & elegans: nam triquetrum, & spinulis horridum  
habet glutinam, glycyrrhizæ quadammodo simile,  
vestibus mordicus hærentem. Ea exuta granum ob-  
longum, auenæ exenteratæ modo cernitur, haud  
gustu insuaue, qua quidè satis expressa nota insi-  
gnit caucalides Dioscorides, & à similibus  
discreuit. Matthiolus caucalidè suam longè pluri-  
bus pollere facultatibus scripsit. Est enim cordi  
utilis. Succus calculos & arenas pellit, iocinoris,  
lienem, renumq; pituitas extenuat. Semine potum  
oculorum aciem acuit, & menses foeminarum  
adiuuat. Datur viris contra seminis profluuium

cum aspleno & viticis semine. Steriles facit prolificas assidue ex vino potum.  
Præstat aduersus trygonis, draconis, & scorpionis marinorum ictus, vulnere illi-  
tum. Herba tota ex aceto masha, & vomitione reddita ventrem purgat, appetitum lan-  
guescens excitat, & nausæ fastidia discutit. Melancholicos iuuat tum herba ipsa in  
cibus deuorata, tum succus potus, tum semen, quemadmodum totius plantæ decoctum.  
Quare datur vtiliter quartanariis & scabiosis: quinetiam morbo gallico affectis.



Nomina

Genera

Lib. 25. c. 9.



Αὔκος Græcè, Daucus Latinè, Daucum & Daucium nominatur, Arabicè  
*Dacu, Gezar, siue Giezar.* Dioscorides tria Dauci genera recenset, Creticum,  
 Selinoides, tertiū foliis coriandri. Plinius, Dauci, inquit, genera quatuor  
 fecit Petronius Diodotus: quæ persequi nihil attinet, cū sint differentia duæ.  
 Probatissimum in Creta, mox in Achaia, & in siccis vbicumque natum, sceniculi  
 similitudine, candidioribus foliis & minoribus hirsutisq; caule pedali, recto, radi-  
 ce suauissimi gustus & odoris. Hoc in saxosis nascitur meridianis. Reliqua genera  
 vbique nascuntur terrenis collibus, limitibusq; nec nisi pingui solo, foliis corian-  
 dri, caule cubitali, capitibus rutundis, sæpe pluribus quam ternis, radice lignosa,  
 sed cum inaruit, superuacua. Semen huius cumino simile, prioris milio, album,  
 acre: odoratum omnibus, & feruens. Secundum priore vehementius est, ideoque  
 parcè sumi debet. Si iam maximè tertiū genus facere libeat, est simile staphylino,  
 quod pastinacam erraticam appellant, semine oblongo, radice dulci. Omnia hæc  
 & hyeme & æstate sunt intacta quadrupedi, nisi post abortus. Ex aliis vsus seminis:  
 ex Cretico radice & succi, sed magis ad serpētes est. Bibitur è vino drachma vna.  
 Datur & quadrupedibus percussis. Hæc Plinius: qui habet de primo genere fo-  
 lia candidiora λευκότερα, quæ Dioscorides λεπτότερα, idest, tenuiora. Eadem descri-  
 psit his verbis Dioscorides. Daucum Creticum folia habet sceniculo similia,  
 minora & tenuiora, caulem palmi altitudine, umbellam Coriandro similem, flores  
 albos, & in his semen acre, album, hirsutum, in mandendo odoratum. Radix est di-  
 giti crassitudine palmi longitudine. Nascitur in petrosis & soli expositis locis.  
 Aliud est eius genus siluestri apio simile, acre, aromaticum & odoratū, gustantiq;  
 feruidum. Præstantissimum est Creticum. Tertiū eius genus folia habet corian-  
 dro similia, flores albos, caput & semen anetho similia, & in capite umbellam pa-  
 stinacæ similē, semine oblongo refertā, & acri velut cuminū. Tria hæc Dauci ge-  
 nera inueniri affirmat Matth. quorū illud Italis frequentius esse, quod siluestrem

Forma.

Ca. 69. li. 3.

DAVCVS, I. Matthioli.

DAVCVS, II. Matthioli.



pastinacam



pastinacam emulatur. Est enim in Senensi agro praesertim in maritimis frequen-  
tissimum. Creticum autem legitimum ex Creta tantum afferri existimat. Id verò  
quod coriandri foliis provenit, semine cumino simili, non solum in multis Italia,  
sed etiam Germaniæ Bohemiæq; locis reperiri. At primum illud Creticum non  
solum in Creta nasci Pena asserit: non modo enim Germanicas Alpes, sed etiam

In Ad. fol.

DAUCUS II. genus, Dalech.



DAUCUS III. genus.  
Dalechamp.



Genuensium colles, & Genevensium circa Iurā  
rupes hoc Cretico abundare, indeq; Lugdunū  
& ad alia emporia hodie venum deferri: eoq;  
pluris emi etiam Veneris, quia ad Theriacam  
& similia antidota efficacius est quoniam alio  
congenere Dauco. Eius folia exilia, inter fe-  
niculum & carotam media sunt, umbellæ can-  
didæ, flores anethi, copiosum semen, oblongū,  
ut cumini, sed lanugine albidum, gustu acre,  
odorum, & cuius usus potissimum. Vni etiam  
radix pastinaca minor, gustu feruidiore, &  
odoratior. Huic quo minus sit Creticū, si quid  
deest, solum calumve erit. Sanè effigie nihil,  
viribus autem perparū abest. Daucū secundū  
Marth. Veneti pharmacopœi saxifragiā dicunt  
illiq; cōsimiles vires frequentē experimento tri-  
buunt. Nihil tamē obstat quin sit Daucus alter  
Diosc. Foliis enim est coriandri aut petroselinī  
semine in umbellis oblongo, anguloso feniculī  
modo. Radix albicat, aroma olet, suavisque gu-  
stanti est, superneq; comata est Mei modo.  
Daucus Selinoides secundus dicitur Lobellio,  
Rosmarinū siue Libanotis prima Theophras-  
ti, folio apij palustris, Italis *Valdeboma*, vulgò  
& Saxifragia Venetorum. Vltimior Daucus  
Officinarum Italiae, Galliae, Germaniae, est Pa-  
stinaca silvestris Dioscoridis, siue Carota silue-  
stris vulgi, ut paulò post dicemus. Istud fre-  
quentius Cretici penuria usurpant, duplumq;  
nonnulli substituant, freti Galeni sententia,  
tamen non parū facultatibus & effigie à  
Dioscoridis Daucis absit. Dodonæus pro Dau-  
co tertio eandem Carotam silvestrem descri-  
psit & depinxit: Alia ab iis Dauci genera ex  
Dalechampij opinione hīc proponimus. Se-  
cundum scilicet, hippofelino simile, quod  
ἀρκεν σέλινον dici Dioscorides auctor est. Caule,  
folio, radice, quamvis qua parte apio silvestri  
simile sit hoc Dauci genus, Dioscorides non  
expresserit. Folium tamen in illo profundius  
incisum quam in hoc Dauco, cetera pariter  
carnosum & crassum. Gignitur in glareoso  
campo quem Drausus irrigat prope Gratiano-  
polim, radice alba, odorata, acri, paleis in sum-  
mo capillata, caule cubitali, nonnunquam al-  
tiore

Lib. 2. c. 87.

Lib. 1. cap.  
de hippof.



tiore, anguloso, folio prope radicem terræ instrato, latiore, hippofelino simili, in exilibus ramulis tenuiore, magisq; dissecto apij modo, umbella apij, flore candido, copioso, semine minuto, oblongo, acri, odorato. Tertium Dauci genus in saxoso colle Gratianopoli imminente nascitur, quem indigenæ *Chalemont*, idest, calidum montem vocant, quod apricus & ad meridiem situs solis radiis assidue tepescat, & interdum æstuet: quamobrem insignium plantarum feracissimus est. Huius igitur plantæ radix ex flauo candicat, brevis & exilis, festucis in summo villosa. Folia prope radicem coriandro similia, quanto sunt propiora caulis & ramulorum summitati, tanto tenuiora, adeo ut in plantæ vertice ad tenuitatem foeniculaceorum anethinorumve gracilescant: quod est, *καρλὸν δὲ ἔχει χαρπὸν ἕκαστα τῶ ἀνῆθου*. Caulis apij, flos in umbella candidus, anetho pastinacæve siluestri similis: nam pastinacæ siluestris umbellam cum anetho comparat Dioscorides, semen oblongum, anethini æmulum saporis acris, qualis in cumino gustanti percipitur.

Lib. 3. cap.  
de past.

*DAUCVS Pratenfis, Dalech.*



Lib. 3. c. 69.  
*Umbelliferæ  
Temper.*

Li. 26. ca. 15.  
Li. 6. simpl.

reddidit Daucum & menses & secundas potu facillimè pellit, quasi qui *δὲ Νέραν* legisset pro *ἐμέρων*. Dauci herbæ semen, inquit Galenus, exalfaciendi vehementer facultatem habet, adeo ut inter prima efficax sit, tum urinæ mouendæ medicamen, tum mensibus prouocandis. Multum etiam digerere per halitum foris impositum potest. Ipsa verò herba similem quidem vim obtinet, tamen semine infirmiore, nimirum ob aqueæ humiditatis mixtionem, quamquam utriusque & ipsa calida sit temperie.

#### PASTINACA.

#### CAP. XIIII.

Nomina



**G**RAECE *καρυλινος*, Latine & Italicè Pastinaca, Arabicè *Iezar, Giezar*, seu *Giezar*, Germanicè *Pastenej*, & *Pastnachen*, Hispanicè *Cauatoria blanqua*, Gallicè *Pastenade*. Pastinaca verò à pascendo dicta videtur, quia sponte in agris nascitur, eamq; plebs sapissimè depascitur, quemadmodum etiam *καρυλινος*, à radice scapo bryoniae (quæ etiam *καρυλος* dicitur) non ita absimili, appellationem sortita videtur. Dioscorides duo Pastinacæ genera facit

Lib. 3. c. 52.



facit, siluestrem & satiuam. Plinius quatuor. Ex his Pastinacæ vnū genus agreste sponte prouenit, Staphylinos Græcè dicitur. Alterum feritur radice, vel semine primo vere vel autumnno, vt Hygino placet Febuario, Augusto, Septembri, Octobri, solo quàm altissimè refosso. Annicula utilis esse incipit, bima utilior, gravior autumnno, patinifq; maximè, & sic quoque virus illi intractabile est. Hibiscum à Pastinaca gracilitate distat, damnatum in cibis, sed medicinæ utile. Est & quartum genus in eadem similitudine Pastinacæ, quam nostri Gallicam vocant, Græci verò daucum: cuius genera etiam quatuor fecere. Meminit & alibi Pastinacæ pratensis. Hanc quidam eandem esse cum ea, quam hibiscum nomine cum althæa communi vocant, alij diuersam putant. Vt res hæc habeat, hæc Pastinaca à siluestri Dioscoridis distat. Quartum eiusdem genus Carota nostra videtur esse, Dauci quartū genus ab eodem proditum, vt diximus. Pastinaca siluestris, inquit Dioscorides, folia Gingidij habet, sed latiora, subamara, caulem rectum, asperum, qui vmbellam gerit Anetho similē, in qua flores candidi, & in medio purpureum quiddam exigit, gum, veluti crocum referens. Radix est digiti crassitudine, palmi longitudine, odorata, quæ cocta estur. Satiuam notis nullis Dioscorides expressit, sed tantum ad eadem pollere, inefficaciorem tamen esse, & cibo aptiorem scripsit. Eam tamē quæ hic picta est, inquit Pena: quia posteritatis consensu, & multo vsu recepta est,

**PASTINACA Satiua**  
vulgi, Matthioli.



vt genuinam agnoscunt herbarij. Similis est Sisaro facie, similior tamen Elaphobosco, quæ siluestrem Pastinacam siue Bauciam Officinæ dicunt. Lutei namq; sunt Bauciae flores: radix concolor, & eiusdem saporis. Siluestris similis est tota Carotis seu Dauco Staphylino cui Pastinacam siluestrem succedanea faciunt pharmacopœi, vt paulò ante monuimus. Umbellæ densæ & satis magnæ sunt, flores candicant. Ea scateant agri & sara: sed minor multò superiorem est: radix eundem gustum, sed medicatū exhibet, minùs tamen cibis expetita. Satiuam scribit Matthiolus in Italia frequentissimè in hortis feri: & Ruellium reprehendit, qui Carotas vulgò vocatas, satiuas esse Pastinacas crediderit. Erratica in campis & incultis sua sponte nascitur. Vtraq; albicantibus constat radicibus, quæ coctæ manduntur. Satiuam etiā Allobroges & Sequani in hortis colunt, & seruatis Latini nominis vestigijs Panetæ vocant. Lobelius Pastinacæ satiuam hic posita, Pastinacam domesticam vulgi appellat, Pastinacam satiuā Dioscoridis, Daucum Theophrasti, Gallorum Pastenades & Carottes iannes. Pastinacam silue-

stem Dioscoridis, Carottam siluestrem vulgi, Carotte, ou Pastenade sauvage, quæ Daucus est officinarum, cuius iconem hic videtis. Satiuæ vero Pastinacæ Dioscoridis, siue Carottæ luteæ siue Dauci lutei edulis iconem habetis, cap. de Carottis, apud Matthiolum, ca. de Sisaro nomine Sisoris secundi. Pastinacæ siluestris semen potum & impositum menses mouet auctore Dioscor. Conuenit etiam in potu vrina difficultate laborantibus, hydropicis, pleuriticis, & à venenatis bestiis ictu morbis ve. Eos verò qui id præsumpserunt negant ab illis iniuria vlla affici: conceptus adiuuat. Radix vrinas ciet, venerem stimulat, partus apposta enicit. Folia

Genera  
Lib. 2, c. 5

Lib. 2, c. 5

Cap. de  
Dauco  
Lib. 2, c. 5  
Forma


Cap. 2, c. 3

Vires  
Temper.

tritæ



Lib. 20. c. 5.

*PASTINACA Siluestris,*  
*Mathioli.*

trita cum melle imposita phagedænica vlcera purgât. Plinius vtriusque Pastinacæ vires multo fufius persequitur his verbis. Alterum est genus staphylinos, quod Pastinacam erraticam vocant. Eius semē contritum & in vino potū, tumentem aluum & suffocationes mulierum doloresq; lenit, in tantum vt vuluas corrigat, illitum quoque è passo ventri earum prodest: viris verò prodest cum panis portione æqua tritum, ex vino potum contra ventris dolores. Pellit & vrinam, & phagedænas vlcera silit recens cum melle impositū, vel aridū farina inspersa. Radicem eius Dieuches cōtra iocinoris ac lienis, ilium, lumborum & renum vitia ex aqua mulsa dari iubet. Cleopantus & dysentericis veteribus. Philistio in lacte coquit, & ad stranguriam dat radices vncias quatuor: ex aqua hydropicis, similiter & opisthotonicis, & pleuriticis & comitialibus. Habentes eam ferri à serpentibus negantur: aut qui ante gustauerint nō ladi. Percussis imponitur cum axungia. Folia contra cruditates manduntur. Orpheus amatorium inesse staphylyno dixit, fortassis quoniam

niam venerem stimulari hoc cibo certum est: idē cōceptus adiuuare aliqui prodiderunt. Ad reliqua & satiuā pollet: efficacior tamē siluestris, magisq; in petrosis nata. Semen satiuæ quoque cōtra scorpionum ictus, ex vino aut posca salutare est. Radice eius circūscalpti dentes dolore liberantur. Hæc Plinius. Staphylinus satiuus imbecillior, inquit Galenus, agrestis ad omnia potentior est. Vrinās menselq; prouocat: cum herba quidem tota tum maximē semen ac radix. Habet porrō etiā absterforium in se quidpiam: quāmobrem vlcera phagedænica quidam foliis eius cum melle, quo pura reddant, illinunt.

Li. 8. simpl.

*ELAPHOBOSCV M.**CAP. XV.*


Lib. 3. c. 66.

Li. 22. c. 22.



ΕΛΑΦΟΒΟΣΚΟΝ Græcè, sic Latine Elaphoboscū, & Cerui ocellus dicitur, significat autem Elaphoboscum cerui pabulū, quod hanc plantam Ceruæ monstrarint auctore Plinio. Est autem caulis, vt tradit Dioscorides, Libanotidi aut fœniculo similis, angulosi foliis latitudinis duorum digitorum, satis longis velut terebinthi, circumfractis quodammodo asperis. Habet & adnata multa ipse caulis, umbellas anetho similes, flores subluteos, semen anetho simile. Radix est longitudine trium digitorum, vnius crassitudine, alba, dulcis, edulis. Sed & caulis olerum modo editur dum recens est. Idem sic describit Plinius. Elaphoboscum ferulaceum est, geniculatū, digiti crassitudine, semine corymbis dependentibus simili effigie, sed non amaris, foliis olisatri: & hoc laudatum in cibis. De hoc veterum Elaphobosco dubitant Herbarij. Pharmacopœi, id quod etiā Pena tradit, duas Pastinacæ siluestris species statuunt. Vnam Dioscoridis, cuius superiore capite meminimus, alteram Arabum, quam Bauciam vocant, quæque supradictæ dissimilis est, quia foliis, facie, floribus, & caule simillima est domesticæ, nisi quod radice est minore, gustu tamē magis vegeto, & medicato, paucioribusq; foliis. Hanc si attentius expendas, inquit Pena, & cum Elaphobo





Elaphobosco Dioscoridis conferas . nihil prorsum erit quod requiras. Eandem Elaphobosci nomine pinxit Dodonæus. Sunt qui Pastinacam pratensem Plinij esse velint, quam etiam Hibiscum Pastinacam appellat, & *μαλαχὴν ἀγροίαν*. Lugdunenses rustici hodie vocant, *Panetz sauvage*, idest, Pastinacam siluestrem, & eius radice vescuntur ut hortensis. Matthiolus scribit herbam quādam se vidisse tum in Tridentino, tum in Goritensi agro, cuius picturam hic damus, quæ ita notis omnibus Elaphobosco respondeat, ut aut legitimum Elaphoboscum, aut plātam illi similem esse credat. Cuius descriptio ab eo prætermissa hæc est. Gignitur in asperis locis, duorum cubitorum altitudine, radice crassa, odorata, foliis Angelicæ, in singulis pediculis ferè quinis aut septenis, venosis, crassiusculis, toto ambitu divisis: flore in caulis vertice ex luteo pallescente, in umbellis multis, dispari altitudine euectis, his procerioribus, illis summissioribus, vno tamen ex loco, nempe caulis fastigio sese attollentibus, eleganti quadam figura, quæ in aliis umbelliferis non conspicitur. Incidendi, attenuandi, detergendi, obstructions aperiendi facultatem inesse sapor odorque demonstrant. Tradunt ceruas, inquit Dioscorides, Elaphobosci herbæ pabulo resistere serpentium moribus. Vnde & semen eius morsus à serpentibus datur cum vino bibendum. Plura tradit Plinius. Quippe etiam conditum prorogatur, ad vrinam ciendam, lateris dolores sedandos, rupta, conuulsa sanāda, inflationes discutiendas, coli quoque tormenta. Cōtra serpentū omniumq; aculeatorū ictus. Quippe fama est hoc pabulo ceruas resistere serpentibus. Fistulas quoque radix nitro addito illita sanat. Siccāda autē in eos vsus prius est, ne succo suo madeat, qui contra serpentium ictus non facit eam deterio-  
Lib. 5. c. 39.  
Lib. 21. c. 15.  
Lib. 19. c. 5.  
Li. 20. ca. 4.  
Ca. 66. li. 3.  
Li. & c. 22.

CAROTAE.

CAP. XVI.

**P**ASTINACAM satiuam duplicem statuit Lobellius. Priorem, Pastinacam satiuam Dioscoridis. Carotram nostram luteam. Alteram Pastinacam satiuam ex atro rubentem, quam alij *Carottes* simpliciter. alij *Pastenades*, & *Carottes rouges* appellant, à colore radice ex atro ru-  
Nomina




bescente, atriore:que eius succo. De priore paulò ante diximus, nunc de altera. Carotis nomenclatura indita fuisse videtur, inquit Pena, ab illa quam cum Carui similitudine & cognatione sortita fuerunt. Mediæ videntur inter Daucum & Pastinacas naturæ, utrique congeneres, neutra tamen dici possint: quam naturam

CAROTA Vulgaris.



CAROTA, Marb. altera.



Li. 6. simpl.

Lib. 9. hist. cap.

nullus significantius expresseit quàm Galenus, qui Carotam Daucum Staphylinum appellauit peritiorum herbariorum sententia. Item hæc quæ Carotis cum Daucis intercedit similitudo, fecit ut Theophrastus Carotam Daucū nigrū appellauerit. Καὶ διακρινόντες τὴν παλαιὰν διαφέρειν τὸ τοῦ τετρακλινὸν φύσιν ἵκαν ὅτι ἐχὼ μέλαν. Id est, & Daucum in Patrensi agro prestantius: huic vis excalfaciendi, radix nigra. Carota folia fert nigricantia, dissecta, cerefolij folijs proxima, sed magis fusca, maiora, & minutius incisa, cauliculos rotundos, parum hirsutos, cauos, in quibus umbellæ magnæ flores candidos ferunt, deinde semen hirsutum, Aniso specie haud dissimile, radix crassa, longa huic flaua, illi rubra, tam internæ quàm externæ, admirandæ interdum tum crassitudinis, tum longitudinis. In hortis seritur. Iulio mense floret, Augusto semen fert. Radices frixas vel elixas vulgus elitat satis magno gulæ irritamento, oleo, sale, & aceto additis.

## SISARVM.

## CAP. XVII.

Nomina

Genera

In Ad. fol.


317.

Forma.

**G**RÆCE Σίσιρον, Latine etiam Sisarum & Siser dicitur, nonnullis Seruillū, Seruilla, vel Cheruilla, Gallis Cheruy, Germanis Gerlm, & Gierlm. Plinius duo facit Sisari genera, satium & siluestre, quod Dioscorides omisit. Huius historiam veterum nullus, quod sciam, literis mādauit, quia vulgaris esset cognitionis, eaque causa fuit cur id quod illis fuerit notissimū, nobis hodie sit ignotum, nisi ex vestigijs appellationis & similitudine Sionis aut laueris, & radicum coniectura, inquit Pena: ideo quod vulgò frequens Narbonēsi agro (nō perinde in Italia, aut alibi) vescēdi causa alitur, legitimū putatur. Sapor illi quàm domesticæ Pastinacæ gravior, cui facie similis est, aut laueri, sed in radicibus maius discrimen: sunt enim ex vna quasi radice basi pendula, bulbosa, cenanthes asphode



SISARVM *Maius, Matth.*



asphodelive modo, quæ quia sunt edules, non sine ratione docti quidam ambigunt, sintne illæ quas stultis Hesiodus exprobrat, scribens nescire eos quanta, in Malua & Asphodelo sit utilitas. Nam Dioscoridis Asphodelus non homini, sed pecori potius aut sui in alimentum cedat. Matthiolus multis rationibus adductus plantam eandem hic pictam Sisarum esse censet. Primum, inquit, quod Sisarum apud veteres plantam sit Pastinacæ congener. Plinius enim post Pastinacam mox de Sisere tanquam cōgenere tractauit, quemadmodum & hoc nostrum Pastinacæ domesticæ cōgenet videtur esse. Deinde quod eius radix, ut Plinius ait, neruum seu matricem intus habeat, quæ eximitur cum cocta fuerit. Præterea quod seatur frequētius, auulsis à radice agnatis, ut Inula, Liliū, Arum, quam semine, quod semine satum non nisi tertio anno esui idoneum proueniat, radice verò quotannis. Id quod fecisse veteres de Sisere ratione testatur Marcellus & Ruellius: quod innuit Columella sic scribens. Pastinaca & Siser, atque Inu-

Ibidem.

Ca. 107. lib. 2.

Lib. 20. c. 5.

Lib. 2. c. 48.

Lib. 1. c. 3.

la conualescunt alio pastinato & stercoreato loco, sed quam rarissimè ponenda sunt, ut maiora capiant incrementa. Quæ si diligentius expendantur, radice seu Siser, non semine facile constabit: quin etiam quod numerosa sit radice Asphodeli modo, rarissimè idem poni oportere, ut latius radices fundantur, & incrementum capiant. Nam quod crassiores, eo gustui suauiores. Ad hæc scribit Dioscor. decoctam Sisari radicem, & ori gratam esse, & stomacho utilem, quod in huius plantæ radicibus perspicue deprehenditur, cum prius elixa, deinde butyro in patellis farina circumlita figuntur. Vnicus superest scrupulus, quod in nostrate Sisaro nulla percipiatur amaritudo, cum tamen Galeno & Plinio auctoribus, Sisarum amarore non vacet. Verum id à sententia nos abducere non debet, quod certum sit regiones sæpe plantis immutare saporem. Siquidem Cæpa, quamquam sui natura acris admodum sit, tamē in Caietano agro ubi omnium maxima prouenit, nulla acrimonia prædita est, id quod multis locis in Raphano videmus, & in Aro, ut Galen. inquit, quod in Cyrenaico agro nascitur. Sisari radix cocta, inquit Dioscorides, ori grata est, & stomacho utilis: urinam ciet, & appetentiā excitat. Plinius, inter medica dicendum Siser: & ipsum Tiberius princeps nobilitauit, flagitans omnibus annis à Germania. Gelduba appellatur castellum Rheno impositum, ubi generositas præcipua. Ex quo apparet frigidis locis conuenire. Inest longitudine neruus, qui decoctis extrahitur amaritudinis tamen magna parte relicta, quæ mulso in cibis temperata, etiam in gratiam vertitur. Et de siluestri fusius. Siser erraticum satiuo simile est: & effectum stomachum excitat, fastidium absterget: ex aceto laserpitiato sumptum, aut ex pipere & mulso, vel ex garo, urinam ciet, ut Opon credit, & venerē. In eadem sententia est & Diocles. Præterea cordi conuenire cōualescentium, & post multas vomitiones perquam utile. Heraclides contra argentum viuū dedit, & veneri subinde offensanti, (aliàs offensa, id est, languescēti) ægrisq; se recolligentibus. Hicetius ideo stomacho utile videri dixit, quoniam nemo tres Siseres edendo continuaret: esse tamen utile cōualescentibus ad vinum trāsuntibus, Satiui priuatim succus cum lacte caprino potus, sistit aluiū. Hæc Plinius. Galenus hæc de eodem. Sisari radix cocta stomacho grata

Lib. 2. c. 107.

Vires.

Lib. 19. c. 5.

Lib. 20. c. 5.

Lib. 8. sim.



est, & urinam mouet, secundo ordine excalfaciens, adiectam habens amaritudinem quandam cum leuicula adstrictione.

## SISER PALVSTRE.

## CAP. XVIII.

Nomen.  
Forma.



**I**s subiungenda plāta quam herbarij Siser palustre vocant. Ea in cœno pigrarum aquarum nascitur, radicibus multis, breuibus, subnigris, carnosissimis: foliis propè radicem multis, in terra stratis, apio similibus, latioribus, crassiusculis, in caule paucis, tenuibus, fere capillaceis, qualia in apij hortensis iam adulti summo vertice conspiciuntur: caule pedali flore in umbella candido, semine odorato.

## ANGELICA. CAP. XIX

Nomen.

In Ad. fol.  
316.

Genera

Ca. 4. hilt.

Li. 2. ca. 93.

Ca. m. li. 4.

Forma.

ANGELICA Sativa  
Matthioli.



Locus.

**R**ECENTIORES omnes vno ore plantam hanc Angelicam, Sancti spiritus radicem, à diuinis & im- mēsis aduersus grauissimos morbos & venena facultatibus, & à suauissimo radicis odore appellant, Galli *Angelique*, Germani *Angelick*, & *Deschedigengests wurtz*, siue *Brustwurts*. Vix autem credi par est, inquit Pe-

na nostrates Angelicas indicis deliciis aut præsidiis neutiquam posthabendas, antiquitati notas fuisse, nisi sint apud auctores veterinarios Gallorum laeserpicia memorata: nec enim siluissent illi tam diuinam fragrantia gratiam, & vicarias diuine beneficentia vires, siue Angelicas nostratis Angelicæ. Duo eius genera statuunt

Fuchsius & Dodonæus, vnam satiuam, altera agrestem. Matthiolus plura. Alia satiuæ est, inquit, alia domestica, alia siluestris, alia in aquis proueniens. Pena triplicem facit. Satiuæ & procerioris folia sunt lata, hipposelini myr- niuæ amula, per ambitum ferrata, ex viridi in pallidum languescentia, mollia: caulis binum ternumve cubitorum, striatus, cauus, pallefcēs, serulaceus, umbellæ fœniculi, aut pastinacæ satiuæ, lutei flores, semina foliacea, rotunda, compressa & albida, acris gustus, & odoris eximij, radix crassa, & aliquantum supernè tuberosa, multis appendicibus humi mersa, intus candi- cat, foris pulla, odore perquam suauis, aromati- co, pinguem, gummosum, flauumq; succum remittens. Scribit Pena: Nonnullis in hortis Londini Antuerpiæq; conspici aliam, quæ to- ta minor est, cuius suauiore odorem radix spirat, prope quam folia ima ex purpura ru- bescunt, superna autem ex rubore virescunt, umbellæ, ceteraq; semina similia. Celsos vtraq; montes, gelidâq; amat iuga, veluti Imperato- ria, cum qua in hortis colitur in Anglia, Belgio,





Belgio, Gallia. Angelica silvestris sativæ similis est, nisi minora folia haberet, acriora, pauciora, minus incisa, caulem graciliorem & brevior, umbellæ magis albicant, radix pluribus fibris, odorq; cæteris multò minore est, gustu tamen non ingrato, & ferè Pastinacæ. Rarius hortis, sed sæpius vlginosis & pratensibus locis frigidis gaudet. Iulio & Augusto mēibus floret. Quidā Phellandryon esse putant

ANGELICA Silvestris,  
Matthioli.



à Plinio memoratū, cap. 12. 27. In palustribus nascens. Apij folio, cuius semē bibitur propter calculos, & vesicæ vitia. De alio Phellandryō dicemus in lib. de palustribus. Excalfacit & desiccatur ordine secundo completo, aut tertio incipiente. Aperit, extenuat, discutit. Vnicè venenis aduersatur. Pestilentia popularim seuientis arcet contagia. Corpora à lue pestifera vindicat, si tantum, vt affirmant, in ore teneatur. Per hyemem ciceris magnitudine cum vino, per æstatem ex stillatitio rosarum liquore sumpsisse satis est: Nec sensurum eo die contagionem pollicentur quo quis deuorarit: nam vrina & sudore venenum abigit. Lentiriā pituitæ digerit: quapropter tulsī quam frigus excitat, medetur. Crassa quæ in thorace coe rint, discutit. Herba ipsa in aqua & vino cocta, vulnera interna glutinat, concretum sanguinem resoluit, stomachum esu corroborat, cor recreat, pituitam ventriculi deiicit, fastidia ciborum discutit, & languescētem inuitat appetentiam. Rabiosi canis morsu, aut serpentis ictu liberat, si contrita cum ruta

Tempus.  
Temper.  
Vires.



& melle folia indantur, deinde cocta in vino bibantur. Libidinem extinguit ore ieiuno sumpta. Lasitudines reficit, thoracem expurgat. Supra febricitantis caput imposita fertur ad se feruorem elicere. Valere contra fascinationes affirmant, si quis eam secum gestarit. Radix in puluerem trita animi deliquiis, & ceteris cordis affectibus summo opere opitulatur. Datur radice semidrachma vna cum theriace drachma ex stillatitia ipsiusmet aqua iis qui peste laborant, deinde sudare coguntur, idemq; reperitur eodem modo post septem horas. Maniâ radix & dentium cauis imposita, eorum dolorem sedat, anhelitum adeo commendat, vt præsumpti alij odorem occultare facile possit. Siluestri in Anglia libenter vtuntur, inquit Ad. fol. 371. Petr. Pen. quia aptior eduliis condiendis: corrigit enim prouentum saburrâmq; crassorum & viscidorum humorum, atque foetidum halitum emendat terri spiritus ex praua concoctione manantis, copiosior etiam & grator est. Est & alia

*ARCHANGELICA, Dod.*

Lib. 5. c. 25.  
Forma.



Vires.

quædam Angelicæ Aquaticæ species Matthioli & Gesneri, quam Archangelicam Dodonæus appellat, cuius hæc est descriptio. Hæc, inquit, Est foliorum amplitudine, satua laud inferior, sed tamen singularium frequentia numerosior: in plurima enim folia, huius diducuntur. Caulis crassus, quâdoq; vnâ cū foliorum pediculis rubens, geniculatus quoque, valdè ramosus è singulis liquidem articulis tres aut quatuor alas promit, multis idcirco vndequeque umbellis cingitur, quorū flores candicant: semen latum, longius & crassius quàm Angelicæ. Alta radix & albida, exigui odoris, maioris tamen, quā folia vel caulis, quæ nullius aut admodū obscuri. At Angelicæ, & quidē maioris radix, cuius est vsus, excafaciens ac reficcans est ordine secundo inteso, aut tertio incipiēte. Proinde aperit, extenuat digerit, & sudores mouet: venenis resistit: pestilētes morbos curat si tēpestiuè exhibeatur. Datur autē pulueris eius drachma cum vino tenui: aut si febris vehementior, cū Cardui Benedicti, aut Tormentillæ stillatitia aqua & exiguo

aceti, & per se quidē, aut addita Theriace ex viperis, à cōtagio deinde horū & præseruat, in ore detenta, aut cōmanfa solūm. Lentos crudosq; humores eadē ad concoctionē perducit: crassorū, quæ pulmonibus thoraciq; inhærent expurgationē facile procurat: hepar & lienē aperit: Virginū remorātes mēses euocat: secundas expellit: aduersus rigores febriū huius decoctū ex vino prodest. Valere etiam cōtra fascinationes radicem affirmant, si quis eam secum gestarit, vt Fuchsius ait.

*IMPERATORIA.*

CAP. XX.

Nomen.

Forma.



Baras & præstantes facultates Augusto nomine Imperatoricæ plantæ hæc donata fuit. Dicta est etiam Ostrutium & Astrantia, Laferpitiū à Fuchsio, Smyrniū à Trago, est afuinior facie satiuæ angelicæ quàm siluestri. Folia tamen propius sphondylium aut hipposelinum amulantur, vt plurimum terna, statim ab humo cauliculis subnecta, robusta, hirsuta, aspera. Caulis sesquicubitalis, aut bicubitalis est purpurascens, rotundus, nodosus, hirsutusq; in cuius cacumine umbellæ floribus candidis ornatur, ex quibus semen prodit angelicæ siluestris, vel anethi, odoratum. Radix digitum æquat, crassa, rugosa, lignosa, multis fibris in terrâ sparsa, foris fusca, intus albicans, siue subuiridis, multo



IMPERATORIA,  
Mattholi.



multò vehemētioris & acrioris facultatis & odoris quàm angelicæ. lisdem gaudet natalibus. In Ananiensibus montibus supra Tridentum frequentissima Matthiolo auctore. Tradunt recentiores Imperatoriæ radicem excalfacere tertio excessu completo, vel quarto incipiente, siccare verò secundo. Discutit hæc mirificè tum ventriculi, tum intestinorū, tum etiam vteri flatus, quapropter coli cruciatibus, & ventris torminibus maximè utilis est. Cit menses & vrinam, fouentur vtiliter eius decocto dentes, præsertim si in vino austero radix decoquatur. Eadem ex vino pota vteri strangulationibus prodest, conceptum adiuuat quem frigiditas intercipit, concoctionem roborat. Communis est præstantissimus apophlegmatismus, vt quæ efficaciter cerebri pituitam expurget. In puluerem trita & è vino pota, frigidis succurrit morbis. Quare resolutis, comitialibus, conuulsis auxilio est. Aiunt nonnulli quartana eos sanari, qui pulueris cochlearij dimidium hora vna ante accessiōem ex mero biberint. Oris habitum commendat, & omnes roborat sensus. Epide-

Locus.

In ca p. 65.  
lib. 3.

Temper.

& Vires.

miis morbis, venenis fermè omnibus, ac venenatorum animalium tum morsibus tum ictibus opem præstat. Asthmaticas iuuat, obstructiones aperit, aqua intercure laborantes & lienosos sanat. Denique excalfacit vniuersas corporis partes quas frigus occuparit. Ex quibus perspicuum est herbam istam tot tantisque viribus præditam non immeritò Imperatoriæ nomen sibi adscriuisse.

LASERPITIVM.

CAP. XXI.



QVOD Græcis Σίλφιον, Latinis Laserpitum nominatur, Mauritanis Silsion, caulis eius Dioscoridi μάσπετον, Oribasio μαστίηρον, Latine similiter maspetum & mastierum, Arabibus Mastastes, Theophrasto & Plinio non caulis, sed folium maspetum. Quare quidam, inquit Dioscor. caulem σίλφιον, radicem μαγνύλαρον, folia μάσπετα vocauerunt. Succus ex silphio laser appellatur teste Plinio, ex caule χαυλίας Theophrasto, ex radice ρίζιας, hunc radicularium, illum scaparium conuertit Gaza. Brevis extat silphij apud Dioscoridem descriptio his verbis. Laserpitum in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur, caule ferulaceo quod maspetum vocant: foliis apio similibus, lato semine. Theophrastus multò fusiùs id descripsit. τὸ δὲ σίλφιον, inquit, ἔχει ρίζαν μὲν πολλὴν καὶ παχύναν, τὸν δὲ χαυλὸν ἡλίον νάρθηξ, χειρὸν δὲ τὸ παχὺ παραπλήσιον τὸ φύλλον δὲ χαλδῶν μάσπετον ὅμοιον τῷ σελίνῳ. σπέρμα δὲ ἔχει πλατὺ, φυλλῶδες, ὅιον τὸ λεγόμενον φύλλον. ἐπεὶ τὸ χαυλὸν δὲ τὸν ὥσπερ ὁ νάρθηξ, αἶμα μὲν σὺν τῷ ἡεὶ τὸ μάσπετον τὸ το ἀφίησιν. ὁ χαυλὸς τὰ πρὸ βατὰ, καὶ παχύνει σφόδρα, τὰ κρεὰ θάυματ' ἀποιεῖ τῇ ἢ διονῇ μετὰ σιν. δὲ ταῖς χαυλὸν ἐσθλὰ πάντα τρόπον (adde ἀγαθὸν ex Gaza, vt & constet sensus) ἐφθόν, ὅππῃ χαυλὸν δὲ τούτου φασὶ τὰ σώματα τετραράκιοντα ἡμέρας. ὅππῃ δὲ διττὸν ἔχει, τὸν μὲν ἀπὸ τῆς χαυλὸς, τὸν δὲ ἀπὸ τῆς ρίζης. διὰ χαλδῶν τὸν μὲν χαυλίαν, τὸν δὲ ρίζαν, ἢ δὲ ρίζαν τὸν φλοιὸν ἔχει μέλανα, τὸ τοῦτον ὡς μαυροῦσιν. ἔστι δὲ ὡς περ μέλα τῶν ριζοτομιῶν αὐτῆς, ἐξ ὧν ὁ πόσον αὐτὸν διουκὸς συμφέρειν ταμιχόμενοι πρὸς τὰ νομῆς, τὸ δὲ ὑπάρχον τέμνουν. ἐκ ἑστὶ γὰρ

Nomina

Lib. 3, c. 78.

Forma.

Lib. 6, hist. cap. 3.



οὕτε παρὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ὥστε πολλοὶ τῶν τετραγώνων, καὶ γὰρ διαφθείρεται, ὅτε σπένεται τὸ ἄργον  
 ἐν χρόνῳ. Καὶ ἐργασίαν δὲ ἀγροῖς εἰς τὸν περὶ τὴν τὸν δὲ τὸν τρόπον, ὅταν βάλλωσιν εἰς  
 ἀγροῖς, καὶ ἀλλὰ μὴ ὥσιν, σβένουσιν χρόνον συχνόν, ὅθεν καὶ τὸ χρώμα λαμβάνεται, ὅτε ἐργασίαν  
 ἀσπλην διαμένει. τὰ μὲν οὖν καὶ τὴν ἐργασίαν καὶ τομὴν ὥσιν ἔχει. τὸν δὲ πολλὸν ἐπέχει  
 τῆς Λιβύης. πολλὰ γὰρ φησὶν ἢ τετρακισχίλις (lege πολλὰ γὰρ φασὶν ἢ τετρακισχίλια γὰρ, sic  
 Lib. 19. c. 3, enim Plinius) τὰ πολλὰ καὶ γενέσθαι περὶ τὴν σύρτιν, ἀπὸ τῶν ἐν σπέρματι (lege περὶ τὴν  
 Ibid. legendum suadet Plinius) τὸν δὲ φεύγειν γῆν ἐργασίαν, καὶ διὰ τὴν σπέρματι, καὶ  
 αὐτὸ συνημερομένης ἐξαναχωρεῖν, λειομένου ὡς ἐν Ληλυθῶτι θεραπεύεται, ἀλλ' ὅλος ἄργος.  
 φασὶ δὲ οἱ Κυρυσταῖοι φανῆναι τὸ Σιλφίον ἔτεσι πρότερον ἢ αὐτοὶ τὴν πόλιν ὠκισαν, ἐπὶ τὰ  
 οὐκ οἶσι δὲ μάλα παλαιὰ βίαια εἰς Σικωνίδην ἀρχόντῃ Αθήνησιν. οἱ μὲν οὖν τὸ τοῦ λέγουσιν.  
 οἱ δὲ τὸ Σιλφίον τὴν ῥίζαν φασὶ γενέσθαι πηχυαῖαν, καὶ μικρὴν μίσθον. αὐτὴν δὲ ἔχει ἐπὶ τῇ μέ-  
 σῃ κεφαλῇ, ὃ δὲ μετεωρότατον ἐστὶ, καὶ χεῖλον ὑπὲρ γῆς. ἐξ ἧς διὰ τὴν τμηθείσης βῆτι γάλα-  
 μετατάσσεται δὲ ἐκ φύσεως τὸν καυλόν, καλεῖται δὲ τὸν Μαγύδαρον, καὶ τὸ καλεῖται φύλλον.  
 τὸ δὲ εἶναι σπέρμα, ὅταν νύκτος λαμπρὸς πνεύσῃ μετὰ κύμα διακρίπτειται ἐξ ὧν φύεται τὸ Σιλ-  
 φιον. (Quæ, cum ex iis quæ in vulgatis codicibus leguntur sensus idoneus vix  
 elici possit, ex Plinio sic videntur emendanda. ἐξ ἧς διὰ τὴν τμηθείσης βῆτι ὅσον ὡς γάλα-  
 μετὰ ταῦτα δὲ φύεται τὸν καυλόν, καλεῖται δὲ τὸν Μαγύδαρον, καὶ τὸ καλεῖται φύλλον.  
 χρυσοειδές. τὸ δὲ εἶναι σπέρμα, καὶ ὅταν νύκτος λαμπρὸς πνεύσῃ μετὰ κύμα, διακρίπτειται ἐξ  
 ὧν φύεται τὸ Σιλφίον) τὸ αὐτὸ δὲ ἔχει, τὴν δὲ ῥίζαν γίνεσθαι, καὶ τὸν καυλόν. ὅθεν τὸ τοῦτο ἴδιον.  
 ὅτε γὰρ τῶν ἄλλων, ἐκ τούτου λέγουσιν, ὅτι ἐκ φύσεως μετὰ τὴν ἐκείνην, καὶ τὸ δὲ ἴδιον, καὶ  
 διαφέρειν τοῖς πρότερον. ἐτι (Sic enim legendum non ὅτι) φασὶ δὲ τὸν ὁρμήσειν ἐπὶ τὸν ὅσον.  
 ἐκ τῆς ἐκείνης, φέρειν πᾶν τὸ σπέρμα, καὶ τὸν καυλόν. χεῖρω δὲ γίνεσθαι καὶ ταῦτα, ὅτε τὴν ῥίζαν. ὁρμήσειν  
 δὲ βελόνες γίνεσθαι διὰ τὸ μετὰ βάλαντα τὴν γῆν. ἐκ τῆς δὲ τῶν φεύγειν τὴν ἐργασίαν ἐκ φύσεως  
 καὶ τὰς ῥίζας προσφάτως, καλεῖται ἐκ φύσεως εἰς ὅσον. τὸ δὲ φύλλον τὴν χρυσοειδὲς εἶναι, ἐκ τῆς  
 καὶ τὸ καλεῖται τὰ πρότερον τὸ φύλλον ἐκ φύσεως φασὶ γὰρ καὶ τὸ ἦρος ὅτε χεῖμωνος εἰς ὅσον  
 ἀφίεται. νέμεσθαι δὲ τὸ τῶν καὶ ἔτερον ὅμοιον ἀφροδίτῃ, θερμοκρασίᾳ δὲ ἀμφω δισκίται εἶναι. ὅτε  
 θαρσύνει μὴ οὐ ποιεῖν ἀναζητεῖν, καὶ συμπεπνέσθαι. ἐκ τῆς δὲ τὸν νοσῶν, καὶ κακῶς ἔχον ἐκ τῆς πρὸ  
 βατον, ἐκ τῆς ταχέως, καὶ ἀποθνήσκον, ὡς δὲ ἐπὶ τὸ πολλὸν σώζεσθαι μάλλον. ταῦτα μὲν οὖν ὁ πο-  
 τέρως ἔχει σκεπτόν. ἢ καλεῖται Μαγύδαρος ἔτερον ἐστὶ τὸ Σιλφίον (γένος deest, quod ostē-  
 dunt Dioscorides & Plinius) μανθέρων δὲ καὶ ἡτλόν διρμύ, ὅτε τὸν ὅσον ἐκ ἔχει. διακρίπτει δὲ  
 ἐστὶ καὶ τὸ ὅσον καὶ τοῖς ἐμπέτρους (sic enim legendum, non ἐκ τῶν) γίνεσθαι δὲ περὶ ἐκείνην,  
 καὶ ἐκ ἐν Κυρυστῇ. φασὶ δὲ καὶ ἐν τῷ Παρνασίῳ ὅσον πολλόν. ἐκ τῆς δὲ Σιλφίον τὸ καλεῖται. ἐκ τῆς  
 φεύγει τὴν ἐργασίαν, ὡς περὶ τὸ Σιλφίον, σκεπτόν. ὡς αὐτὸς δὲ καὶ ἐκ τῶν ὁμοίων ἢ παραπλήσιον ἔχει  
 φύλλον δὲ περὶ, καὶ καλεῖται, καὶ ἐκ τῶν ἀφροδίτῃ τι δάκρυον. Quæ Gaza sic interpretatus est.  
 De Laferpitio nunc iudicandum est. Laferpitio radix multa crassâq; caulis quan-  
 tus ferula, & crassitudine ferè proximus, folium quod Maspetum vocant, apio si-  
 mile est, semen latum, foliaceum scilicet quod folium appellatur, caulis annuus si-  
 cut ferula. Ergo vere ineunte maspetum hoc exit, & pecus eo purgatur, pingue-  
 scitq; vehementer, & carnes mirabilem in modum suas redduntur. Post hæc  
 caulem edit hominum cibo idoneum omnibus modis elixum, assûmque corpora  
 eo quoque purgari ferunt quadraginta diebus. Succus capitur duplex, alter ex cau-  
 le, alter ex radice, qua de causa alterum scapariû, alterum radicarium vocant. Ra-  
 dix nigro cortice tegitur, quem detrahare solent. Sunt veluti certæ mensuræ ca-  
 dendæ radicis, quibus quantum conferre putetur ad futuram cæsuram referuan-  
 tes, reliquum abscindunt. Nec enim de iue (alio pacto, fortè melius) neque plus  
 constituto ordine cadere licet: corrumpitur enim putrescitque si diu mansit. (si  
 in exercitatu aut iners diu mansit, ex Græco) Præparant id conficiuntque in Py-  
 ræum portum adiectum hoc modo. Cum in vasa coniecerint, farinamque admi-  
 scuerint, quatiunt crebrò & diu hinc etiam colorem capessit, & conditum iam  
 incor



incorruptum perdat. Præparatio casuræque ita se habet. Locum Africæ amplum occupat, ampliore quàm quatuor stadiorum millia. In hortis hesperidum ferunt eius magnam partem colligi, sed maiorem apud Syrtis. Peculiare huius ferunt fugere loca proditur, quamobrem si colatur, mitescatque solum, deuiat (in culta fugere loca proditur, quamobrem si colatur, mitescatque solum, deuiat) in deserta fugit, rectius ex Plinio) atque omnino degenerat, utpote natura culturæ aspernans, ferocitatisque constans vernaculum (ferum ac contumax vertit Plinius) Cyrenenses annis septem prius quàm ipsi urbem habitarent, laserpitium exitisse affirmant, habitant verò annos maximè trecentos usque ad Simonidæ Athenis magistratum. Illi sic referunt. Alij radicem laserpitij cubitalem esse tradunt, aut paulò maiorem. Hanc in medio extuberare in caput, quod sublime penitus extat, ut ferè supra terram esse appareat. Vnde (ἐξ ἧς, sub. κεφαλῆς, id est, ex quo capite) primum quod lac appellant erumpit, dein caulis assurgit, Magydarin vocant, ex quo nascitur id quod folium nuncupant, folium id semen est, quod cum auster ingenuè (λαμπρὸς, vehemens melius) post caniculam flauerit, disscitur, atque ita laserpitium nascitur, eodémque anno radix consummatur & caulis. Sed hoc haud quicquam peculiare notatur, nam aliis quoque idem tribuitur, ni dixeris, quod dissectum id protinus nasci potest, ortum peculiarem fortiri, supradictisque propterea diuersum intelligi posse. Adhæc circumfodiendum id quotannis censent. Nam si cultura ea prætermittatur, semen vniuersum caulémque totum profertur, & deteriora tam hæc quàm radicem reddi existimant. Defossa autem fieri meliora scilicet solo subactò, benèque gluto. Sed huius contrarium illi volunt, qui culta recusare inquit (vel ex Græco, hoc autem repugnat eorum sententiæ, qui culta fugere volunt). Mandi quoque radices ex aceto recens decisas referunt, folium colore aurum æmulatur. Contrarium etiam quod pecora folio esitato purgari minimè iudicant (Sic vertendum ex Græco, Alienum etiam quod pecora folio esitato purgari narrant.) Nam & vere & hyeme pecus ad montem dimitti affirmant. Cibus non solum hoc, sed etiam altero quodam abrotono simili administratur. (Dilucidius sic, depasci verò à pecore non solum hoc, sed etiam alterum quoddam abrotono simile aiunt). Vim ambo calfactoriam fortiri planè videntur, & purgandi quidem vim non habere: exficcare autem & concoquere vnicè posse. Quod si qua pecus ægrescens, aut alias minùs benè se habens ingressa sit, mox eam sanari, aut mori aiunt, sed magna ex parte posse seruari. Hæc igitur vtro tandem sint modo, quærendum. Quod verò magydarin vocant, nimirum à laserpitio differt (legendum ut emendauimus, alterum est silphij genus) tenerius enim minùsque vehemens id sentitur, & sine lasere est, nec non & aspectu manifesta experto homini constat (Sic melius, Expertis verò vel ipso aspectu & figura planè dignoscitur). Nascitur in Syria, nam apud Cyrenem (non apud Cyrenem, ex Græco & Plinio) & monte Parnaso largè prouenire eandem affirmant. Sed quidam laserpitium id appellant. An culta quoque laserpitij modo fugiat, quærendum. Quin & si quid simile aut proximum habeat, ad folij caulisque rationem, & si quam vllò pacto emittat lacrymam id inuestigandum. His verbis Theophrastus laserpitij historiam luculentissimè exposuit, à quo Plinius hæc mutuatus est. Ab his proximum dicitur auctoritate clarissimum laserpitium, quod Græci silphium vocant, in Cyrenaica prouincia repertum. Cuius succum vocant laser, magnificum in usu medicamentisque, & ad pondus argentei denarij pensum. Multis iam annis in ea terra non inuenitur, quoniam publicani qui pascua conducunt, maius ita lucrum sentientes depopulantur pecorum pabulo. Vnus omnino caulis nostra repertus memoria, Neroni principi missus est. Si quando incidit pecus in spem nascentis, hoc deprehenditur signo: oue cum comederit, dormiente protinus, capra sternuente. Diuque iam non aliud ad nos inuehitur laser, quam quod

Lib. 19, c. 3



quod in Perside, aut Media & Armenia nascitur largè, sed multo infra Cyrenaicum, id quoque adulteratum gummi, aut sagapeno, aut faba fracta, quò minùs omittendum videtur C. Valerio, M. Herennio Cofs. Cyrenis aduecta Komam publicè laserpitij pondo .xxx. Casarem verò Dictatorem initio belli ciuilib, inter aurum argentumque protulisse ex arario laserpitij pondo cxi. Id quod apud auctores Græciæ euidentissimos inuenimus natum imbre piceo repente madefacta tellure, circa Hesperidum hortos Syrtimq; maiorem, septem annis ante oppidum Cyrenaicum, quod conditum est vrbs nostræ anno cxi. Vim autem illam per quatuor millia stadiûm Africæ valuisse. In ea laserpitium gigni solitum, rem feram ac contumacem: & si coleretur in deserta fugientem: radice multa crassaque, caule ferulaceo, haud simili crassitudine. Huius folia maspetum vocabant, apio maximè similia. Semen erat foliaceum, folium ipsum vere deciduum (Theophrasto, nascens.) Vesci pecora solita, primòque purgari, mox pinguescere, carne mirabilem in modum iucunda. Post folia amissa, (rectius emissa,) caule ipso & homines vesciebantur decocto, assò, elixòque: eorum quoque corpora quadraginta primis diebus purgante à vitiiis omnibus. Succus duobus modis capiebatur, è radice atque caule. Et hæc duo erant nomina, rhizias, atque caulias, vilior ille ac putrescens. Radici cortex niger, & ad mercis adulteria. Succum ipsum in vas coniectum, admisto furfure, subinde concutiendo ad maturitatem perducebant, ni ita fecissent, putrescentem. Argumentum erat maturitatis, color, siccitàque sudore finito. Alij tradunt laserpitij radicem fuisse maiorem cubitali, tubérque in ea super terram. Hoc inciso profluere solitum succum ceu lactis, supernato caule, quem magydarim vocarunt, folia aurei coloris pro semine fuisse, cadentia à canis ortu, austro flante. Ex his laserpitium nasci solitum, annuo spatio & radice & caule consumantibus sese. Hoc & circumfodi solitum prodidere, nec purgari pecora, sed ægra sanari, aut protinus mori, quod in paucis accidere. Persico (rectius, Cyrenaico.) silphio prior opinio congruit. Alterum genus est quod magydaris vocatur, tenerius & minùs vehemens, sine succo: quod circa Syriam nascitur, non proueniens in Cyrenaica regione. Gignitur & in Parnaso monte copiosius, quibusdam laserpitium vocantibus: per quæ omnia adulteratur rei saluberrimæ vitiosissimæque auctoritas. Probatio sinceri prima, in colore modicè rufò, & cum frangitur, candido intus, mox translucente: gutta aqua saluàq; liquefcit. Vñs in multis medicaminibus. Hæc Plinius. Strabo succi Cyrenaici defectus causam in Barbaros non in publicanos reiiicit his verbis. Cyrenis finitima est regio quæ silphiû gignit, & Cyrenaicum succum, quem silphium posterius effert vertendum quem liquorem Silphium fundit. Interpretes enim non viderunt eo loco *ὁ πρὸς τὴν ὁπλίστην* duci, nec aduerbium esse. Idem Strabo lib. 15. scribit Alexandro ab Arachosia transeunti ad Bactrianos per iter nudum arboribus, copiosissimum Silphium occurriffe. Id propemodum defecit, cum aliquando Barbari odio quodam ingruissent, ac radices eius pene omnes eruiissent. Ex hac varia apud veteres Silphij historia, iudicatu perdifficilè est quænam sit hodie planta quæ laserpitium dici possit. Attamen Pena quantum inspectione assequi potuit, id candidis lectoribus impertitur his verbis. E regione Mafsilæ, inquit, & non procul insulis quas videtur Dioscorides vocasse Stœchadas, inter multas raras plâtas nascitur ferulacea & visenda plâta, cuius radix prægrandis, intus alba, foris cineritia, succo prægnans mollis, pinguis, odorata, maior quàm thapsiæ aut ferulæ: caulis proceritate & crassitudine ferulam æquat, folia Eleoselini, sed crassiora, rigidiora. Umbellæ prægrandes, ferulæ, aut latiores quàm anethi, semen angelicæ foliaceum, rotundum, compressum, odoratum, colore buxæ, quam hic expressimus. Nec minor est de silphij succo inter rei herbariæ studiosos ambiguitas & controuersia, aliis contentibus

Geograp.  
lib. vii.

Laserpitium  
è regione  
Mafsilæ  
reperitur.







potus (habetur in veteri non cum thure, sed *συν ὀνηρόν*, hoc est cum ruta) Tetano & opisthotono detentis oboli pondere cera oblitus deuorandus datur. Hirudines gulæ adhaerentes si cum aceto gargariseretur, auellit. His qui lac in grumos concretum intus habent, & comitialibus cum aceto mulso sumptus opitulatur, mentes ciet cum pipere & myrrha potus, cœliacos adiuuat in acino vix sumptus. At cum lixiuo potus, conuulsa & rupta repentiè sanat. Dissoluitur in potiones amygdalis amaris, aut ruta, aut calido pane. Caterùm foliorum succus eadem præstat, sed multò inefficacius. Editur hic cum aceto mulso ad expediendam arteriâ, maximè in voce retusa. Hæc Dioscorides. Plinius etiam vsum silphij medicû multis verbis exponit, multa ex Dioscoridis sententia præscribens, in eo præsertim discedens medicamêto, quod ad dentium dolores facit, ait enim, Non censuerim quod auctores suadent, cauernis dentium in dolore inditum cera includi, magno experimento hominis qui se ea de causâ præcipitauit ex alto. Quippe tauros inflammant naribus illitis: serpentes auidissimas vini admistum rumpit. Ideo nec inungi suaferim cum Attico melle, licet præcipiant. Hæc Plinius. In hoc tamen medicamento Dioscorid. nō cera, sed thure includit. Breuius sic Galenus Silphij liquor calidissimus est, imo & folia, & caulis & radix sat strenuè excalfaciunt. Sed omnia flatulenta magis essentia sunt, ac proinde coctû difficilia: foris tamen imposta corpori efficaciora, & omnium potissimùm liquor, admodum trahentem facultatem habens, attamen & excrementas amolendi, & liquandi vim quandam propter propositam temperiem obtinet. His omnibus, præsertim viribus diligentius perpêsis atque examinatis, planè assentiendum iis, qui Asam Laferpitum esse censent, quod vt variis nomenclaturis Græci Silphium plantam vocarunt, eius folia maspeton, caulē Magydarin, semen φύλλον, & Latini succû Lafer, quod Officinæ balbutientes Asam pronuntiant: sic Arabes plantam appellarunt *Aniden*, & *Angeiden*, succum verò *Althit* & *Antit*, Auicennas etiam *Almharut*, Indorum populi & *Imgu*, & *Imgara*: quamuis interdum *Althit*. succi nomen plantam etiam significet, vt Serapioni, qui sub hac appellatione historiam Laferpitij Græcorum tradidit. Lafer duplex etiamnum Indis cognoscitur: alterum sincerum & pellucidum, coloris puri, electro similis, odoris validioris, maioris pretij, quod ex Guzarate, Patane, Mandon, Chitor, Dely regione admodum frigida, & ad Chiruum usque protensa afferri putant: alterum impurum & turbidû, minus odoratum, quod ex Corasone Ormusium Persiæ conuehi narrant, atque in Pegu, Malacam, Tanasarin, & prouincias vicinas, illinc portari. Sincerum Baneanes Cambayæ olim Philosophi, nunc mercatores ab animalium esu abstinentes, quod institutum secutus est Pythagoras, pro suarum facultatum modo comparant, ac suis iusculis & oleribus immiscent, confricato primùm eo lebeate, nec alio condimento in cibis vtuntur, sapore ipsis & odore iucundo, nec aliis quamuis inassuetis, fastidiendo. Gustus eius non nihil amarus principio, vt oliuæ conditæ, deinde si diutius mandatur, valde gratus. Impuro baiuli & tenuioris fortunæ homines qui solo pane & aqua vitam plerùmque tolerant, tum ad medicinam vtuntur, tum ad condimentum, pretij magnitudine deterriti, ne sincerum emant. Sordidum id Baneanes, qui rationem tractandarum & interpolandarum hoc genus mercium callent, defæcant, & purgant, nec nisi ea diligentia curatum in cibos admittunt. Laferis vñ ventriculum roborari, discutiq; flatus Indis persuasum est, tum etiam venerè concitari. Solent & cum dētes erosi dolent, ad cruciatum leniendum cauernis eorum indere. Narrauit quidam mercator Indus Garcie, ex cuius historia nos hæc transcripsimus, Lafer è caule plantæ inciso elici, cuius folia corylo similia sint, id quod ab Angelicarum nostrarum foliis non ita discrepat, si auulsa seorsum singula contempleris, nulla situs ordinis ve ratione habita. Addebat & mercator ille, collecti

Lafer



Laſer in corium bubullum illitum ſanguine cum farina tritici permixto, incolas prouinciarum apud quos Laſerpitium naſcitur, conicere, vt melius atque diutius conſeruetur, atque ideo ſi quid in laſere fabæ lomento ſimile cōſpiciatur, non vitium adulterari hoc eſſe, ſed inditium potiùs bonitatis & puritatis. In Officinis noſtris duo Laſeris genera viſuntur: alterum frequentius, vilius, colore ruſo, gummoſis offis, laxis, non ſolidis, guſtu principio amaro, deinde acri, vehementiori acrimonia quàm in altero genere, diutius in ore & faucibus perdurante, odoris ingratoris: alterum rarius & commendatius, colore ad flauum magis inclinãte, denſius & compactius, intermixtis micis quamplurimis candicantibus, ſimilibus amygdalarum fructulis exutis cortice ſuo, ammoniacive guttis lacteis, quamobrem Amygdalatum Laſer iſtitores vocant, guſtu minus amaro & acri, odoris lenioris & ſuauioris. Vtrũque pertentans cum guſtaſſem, frigido celo & flante Borea, poſt exiguam ambulationem mador ſtatim per corporis trũcum, brachia & caput diſfuſus eſt. Accidit & paulò poſt prãdenti mihi, vt vix vnquam libentiùs cibum ſumpſerim, quæ Laſeris viribus apud Dioſcoridem omnia congruunt. Quare rectè ſcribit Garcias vehementer errare eos qui Aſam foetidam & Laſerpitium diſferre putant, quod Laſerpitium veterum in cibos admiſſum eſſe aiunt, Aſam verò foetidam medicamenti ſolùm vtilem, idque raro: in cibis verò planè damnari ob terribilem odorem: quia nullum medicamentum ſimplex per totam Indiam maiore eſt in vſu quàm Aſa foetida, tum in medicina, tum in condiendis cibis.

Lib. 1. Aro.  
In cap. 3.

## SPONDYLIVM.


## CAP. XXII.

**Φονδύλιον** Græcis, & Latinis Sphondyliũ & ſpondylium dicitur. Fortaſſe ob odoris grauitatem, à ſpondyle inſecti genere, odoris grauis, vt Pena tradidit. Sed parum hic digredi liber, & Lectori ex Dalechamptio indicare, quod cuius fortaſſe notũ non eſt. Sphondyle, ſue Spondyle Theophrãſti, minime ſerpens eſt, vt Plinius credidit lib. 27. cap. 17. ſed vermis in terra profundius deliteſcens, inſtar blattæ flexuoſus, mouens ſeſe quaſi ver-  
tebris, aluo candida, rubeſcente parte quæ capiti proxima eſt, atque inde naſcentibus vtrinque pedibus quatuor, ore nigro, dentibus firmiſſimis, quibus radices vitis præcipuè, rodit, arborũque nedum herbarum. Lugdunenſes ruſti ci vocant *Vn Turc*, quaſi Turcam. Huic ſubiungere duo alia plantis malefica & infeſtiſſima animalia alienum non fuerit. Vnum eſt quod Praſocouris à tondenda radice porri vocatur. Lugdunenſes *Courterole*, ἀπὸ τοῦ κουρῶν nomen indiderunt: cæteri Galli *Taillepré*, quaſi Pratife-  
cam nominant, quod etiam herbarum in pratis naſcentium radices proſcindat. Alterum mus exiguus, pilo fuſco, roſtro acuto, vt talpa & mus araneus, cæcus vt talpa, & perinde terram ſuffodiens, cauda curta, olitorum inimiciſſimus hoſtis & inſidiator, vt qui carduorum & cinararum radices occultus depaſcatur. Ruſtici vocant *Ratecourte* quaſi *ῤατῶν κούρῳ*. Redeamus nunc ad ſpondylii hiftoriam. Herba eſt,

**Nomina**  
Lib. 3. c. 74.  
**Forma.**

Lib. 9. hift.  
cap. 14.

SPONDYLIVM, Matth.





inquit Dioscorides, folia habens platano quadantenus similia, ad Panacis folia accedentia, caules cubitales aut etiam maiores, fœniculaceos, semen in cacumine simile fœli, duplex, sed latius & candidius, & magis paleaceum, & grauis odoris: flores albos, radicem albam, raphano similem. Nascitur in palustribus & aquis locis. Penz & Lobellio Panax Heracleum, Heraclea fronde Smyrniij vel Imperatorij. Plinius ubi de Panace egit, Ab hac ferula, inquit, differt quæ vocatur spondylium

## SPONDYLIVM,

Vulgaris.



Ca. 25. hist.

Lib. 3. c. 54.  
Vires &  
Temper.

Lib. 24. c. 66.

Lib. 8. sim.

Dioscoride, pituitosa per aluum excernit, sanat etiam potu hepaticos, ictericos, orthopnoicos, epilepticos, & vteri strangulationem. In profundum somnum delatos suffitu reuocat, cum oleo commodè infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum, item capitis doloribus, cohibet etiam herpetas cum ruta illitum. Radix datur icterici & hepaticis. Derasa & indita fistulorum callos consumit. Recentis floris succus ad vlceras purulentasque aures conuenit. Eundem spondylii vsum præscribit Plinius his verbis. Sphodylum infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum: item capitis doloribus longis. Cum oleo vetere bibitur, & in iocinorum vitiis, morbo regio, comitialibus, orthopnoicis, vuluarum strangulatione quibus & suffitu prodest. Aluum mollit. Illinitur vlceribus serpentibus cum ruta, flos auribus purulentis efficaciter infunditur. Radix derasa & in fistulas coniecta, callum earum erodit. Auribus quoque instillatur cum succo. Datur & ipsa contra regium morbum, & in iocinoris vitio & vuluarum. Capillos crispas facit peruncto capite. Galenus verò facultates ita tradit. Spondylii fructus acris & secantis est facultatis. Quare ad asthma & morbum comitalem aptum est medicamentum, prodest & icterici. Radix similis facultatis ad eadem conuenit, sed & insuper fistularum callos tollit, sed imponere eam circumrasam oportet. Porro flores etiam succus ad diuturniora aurium vlcera conueniens reponitur.

CORIAN



CORIANDRVM. CAP. XXIII.



Κοριανδρον Græcis & κορίανδρον, Latinis etiam Corion & Corianum, vulgò *Nomina*  
& Officinis Coriandrum, Arabibus *Cusbor*, *Kusbero*, & *Kuzbara*, Italis  
*Coriandro*, Germanis *Coriander*, Hispanis *Culantro*, Gallis *Coriandre*. Corio  
nomen fecisse cimices verisimile est, quos folia & caules eius olent:

CORIANDRVM

*Satiuum, Matth.*



CORIANDRVM Alterum  
*minus odorum, Lobell.*



κορις enim Græcis id insecti genus est, quod La-  
tinis Cimex dicitur. Dioscorides & alij vete-  
res Coriandri vnius duntaxat meminere, &  
Theophrastus Corianum in iis numerat, qui-  
bus generis diuersitatem deesse scribit Plinius  
quòq; Coriandrum inter siluestria inueniri ne-  
gat. Tamen Nicandri Scholiastes duo Corian-  
dri genera posuit, vnum satiuum, alterum silue-  
stre, quod Myconus medicus Barcinonensis  
peritissimus vna cum raris aliis plantis depi-  
ctum & descriptum ad nos misit. Coriandro  
satiuo caulis est exilis, rotundus, ramosus cubita-  
lis aut sesquicubitalis, folia candicantia, multū  
incisa, inferiora seu primū erumpentia cere-  
folio aut apio proxima, superiora & quæ in cau-  
libus sunt, tenuiora & magis diuisa: fumariæ si-  
milis: flores in umbellis candidi, ex quibus ra-  
cematim semē oritur, rotundum, cauum, striat-  
um. Radix est breuiuscula, lignea, neq; admo-  
dum fibrata. Totus plantæ foetidus est ac cimi-  
cum odor, at semē siccum odoratum redditur,  
& ad multa vtile. Alterum, minus odorum pin-  
xit Lobellius, ima folia habens multum incisa,  
& semen habet ius, copiosum, in pluribus spita-  
meis procumbētibus cauliculis. Alitur in hor-  
tis. Siluestri coriano radix est singularis, tenuis,  
non altius demissa, cui radiculæ aliquot tenues  
adnascuntur. Hæc caules multos edit, quinq;  
angulis constantes, solidos, geniculatos, ramu-  
li incerto ordine similiter solidi ē singulis ge-  
niculis prodeunt, folia ferentes summis prio-  
ris Coriandri foliis similia, sed minora, in quo-  
rum cacuminibus umbellæ veluti in altero co-  
riandro, floribus ex purpureo candicantibus  
refertæ, quibus discussis semen oritur rotun-  
dum, id peculiare habens, quod in singulis pe-  
diculis duplex sit, atq; vnum alteri iunctum.  
Odor totius plātæ grauior quàm satiui Coriā-  
dri, & caput magis tentans. Nicandri Scholia-  
stes istud siluestre satiuo simile depinxit, sed la-  
tioribus foliis, & multò longius, multa habens  
adnata, multas radices, multosque flores. Cu-  
ius cum latiora folia esse dicat, soli naturæ id tri-  
buendum censet Myconius, qui minora huius  
folia depinxit. Nascitur locis quadantenus sic- *Locus.*

*Genera.*

Lib. 7. hist.  
cap. 4.  
Lib. 20. ca.  
20.

*Forma.*

In Alexip.



## CORIANDRVM

*Silueſtre, Myconi.**Tempus.**Lib. 3. c. 61.**Vires.**Temper.**Lib. 20. c. 20.**Lib. 7. sim.*

cis, marginibus & limitibus terrenis. Vberius tamen pullulat, & altius adolescit solo humidiore. Sativum non nisi satum pronenit, & terram amat pinguem Palladio teste. Sed & macro solo nascitur. Iulio & Augusto mēſibus floreret, autumnō dum semine pręgnans est, carpitur. Deinceps de Coriandri viribus eō diligentius differendū, quo maior est de iis inter probatissimos auctores cōtrouersia. Primum Dioscorides auctor est id refrigerandi vim habere. Quare illitum cum pane aut polenta erysipelata & herpetas sanare item epinyctidas, testū inflammationes, carbunculōsque cum melle & vua passa: cum faba fresa strumas & tubercula discutere. Lumbricos semen cum passo potum pellere, & genituram augere, largius autē sumptum mentem nō sine periculo mouere, quapropter copiosiores & continuum eius vsum cauere oportere. Succum cum cerussa & lithargyro, nec non aceto & rosaceo illitum, arduentes in summa cute inflammationes iuuare. Hęc Dioscorides. Quibus consentanea fere scribit Plinius his verbis. Coriandrum inter sil-

uestria non inuenitur. Pręcipuum tamen esse constat Aegyptium: valet contra serpentium genus vnum, quod Amphibēnas vocant, potum impositū. Sana & alia vulnera: epinyctidas, pustulas tritum. Sic & omnes tumores collectionesque cum melle aut vua passa, panos verō ex aceto tritum. Seminis grana tria in tertianis deuorari iubent aliqui ante accessiōem: vel plura illini fronti. Sunt & qui ante solis ortum cernicalibus subiici efficaciter putent. Vis magna ad refrigerandos ardores viridi. Vlcerā quoque quę serpunt sanat cum melle, vel vua passa: item testes, ambusta, carbunculos, aures: cum lacte mulieris epiphoras oculorum: ventris & intestinorum fluxiones semen ex aqua potum. Bibitur & in cholericis cum ruta. Pellit animalia interaneorum, cum mali punici succo & oleo semen potum. Xenocrates tradit rem miram si vera est, menstrua contineri vno die, si vnum granum biberint fœminę, biduo, si duo, & totidem diebus quot grana sumserint. M. Varro Coriandro subtrito cum aceto carnem incorruptam æstate seruari putat. In quibus duo potissimum tanquam absurda reprehenduntur. Vnum quod refrigerandi vi Coriandrum pręditum esse, alterum quod strumis prodesse aiunt, quę calidis & digerentibus, minimē verō frigidis curantur. Quare sic scribit Galenus. Vetusiores Gręci Corianum nominant, recentiores omnes medici Corion, sicut & Dioscorides, refrigeratoriā esse herbam dictitans, sed perperam. Siquidem ex contrariis constat facultatibus, plurimū habens amarę essentię, quam ostendimus esse tenuium partium & terrenarum, nec modicum etiam aqueę humiditatis obtinet, quę est facultatis tepidę. Habet autem & adstrictionis pauxillum. Ex quibus omnibus variē quidem agit ea quę scribit Diosco. & non tantū ex refrigeratione. Quibus aliquanto post subiicit. Itaque ne id quod refrigerato iam erysipelati auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides Corianum, quod vt ipse ait, cum pane aut polenta illitum erysipelas sanat. Nam quod exquiritum est erysipelas, & iam vtiq; inflammatum & flauum nequaquam cum pane sanabit Corianum, sed illud quod iam refrigeratum est. Porro quod longe a refrigeratione



geratione absit Coriandrum, vel ex iis quæ ipse Dioscorides scripsit discere licet. Nam strumas, inquit, cum faba fresa discutit. Quod verò nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit discutiendis strumis, vel ipsum Dioscoridem non dubitare arbitror, ut qui sexcenta scripserit medicamenta strumas sanare potentia, quæ omnia temperie calida & actionibus digerentia esse confessus est. Hactenus Galenus. Cui apertè refragatur Auicennas his verbis. Scripsit Galenus Coriandrū Lib. 2. c. 148 diuersis facultatibus constare, nempe terreum in eo ceteris excellere, esse simul & in eo quādam aqueam tepidam, & aliam adstringentem paucillam. At mea quidē sententia, aquea ipsius qualitas frigida est, non tepida, nisi & forsan admisceatur aliquid exalfacientis substantiæ, quæ ab eo confestim euanescat. Quapropter dixit Hunaym, remouet Galenus frigiditatem à Coriandro, & contradicit Dioscoridi. At id Archigenes, Rufus & alij posteriores frigidum esse testati sunt, frigidum igitur est in fine primi ordinis vsque ad secundum: siccum in secundo. Ego verò sentio siccum esse, & ad caliditatem exiguam vergere. Galenus verò censet ex omni parte calidum esse, quod fortasse ipsum dixisse putandum, ob tenuem quādam ipsius caliditatem, quæ dum bibitur aut editur, facillè dissoluitur. Aliter enim non necesse foret, si homines necat frigiditate sua, multam succi eius quantitatem exhiberi. Quibus paulò post subiicit Auicennas. Inquit Galenus, si Coriandrum strumas dissoluit, quomodo frigidum erit? Cui respondeo, Potest Coriandrum id agere occulta quādam qualitate aut forma, aut quod in eo tenuis quādam insit facultas, quæ in profundum penetrare possit, frigida exterius relicta. Sed cum bibetur, caliditas illa resoluitur, quo fit ut sola frigida remaneat, & in corpora agat. Hæc Auicennas non sine ratione. Quæ, ut tota lis dirimi, statuiq; certi aliquid de iis possit, distinguenda, & diorismis explicanda videntur hoc modo. Coriandri herba tota, aut semen vsu frequenti in medicina vsurpatur, & ea quidem aut arida, aut virescens adhuc. Iam verò multiplici experimento, & antiquorum certissima obseruatione compertum est, eius expressum succum, aut herbam confusam illitu tumorum feruores compescere, semen multis de causis stomacho perutile, præsertim siccum, concoctionem iuuare, vaporum sursum eruptionem, flatuumq; impetum sistere, temperataq; qualitatis alimentum esse: vnde ad sanguinis seminisque incrementum, ac ne quidem correctum prodesse, ut immerito eius vsum quidam damnent, vehementerque illos errare scribant, qui eo tam frequenter ad roborandum caput cui insensissimum est, vtantur, cum pharmacopoli aut etiam plebeculum caput cui insensissimum est, vtantur, cum pharmacopoli aut etiam plebeculum, quotidianis epulis aut medicamentis correctum misceant, nullo vnquam cuiuspiam detrimento. Plerumque etiam illud saccharatum Officinarum neutiquam correctum est, nisi putes saccaro igneque. Igitur non aceti frigiditate, sed seminis siccitate & tenuitate, virus fœtidumque spiritum abstergeri putandum. Quare Coriandri herba præsertim succo frigida est, ideoque nonnullis in locis, Arabiū testimonio, eius succus epotus exitio est, quod de Hiurca siue Iucea America recentiores etiam exploratum habent. Herba etenim vesca est, & boni alimentum, succus hominem necat. Quapropter & erysipelatis illitis Coriandri succus reprimer inflammationem exceptus polenta aut panis medulla, quam Galenus haud reiciet, ut qui, libello de paratu facilibus, ex antiquis doceat hordei farinam, polentam, panem & similia addi solita, non tam vt agant, quàm vt succorum qui agere debent vires excipiant. Tamen si videntur etiam iuuare digerendo & siccando, vt hordeacea, aut etiam demulcendo, vt panis medulla. Atque hinc responsio eruenda de strumis. Multa namque sunt minimè calida, quæ strumas incipientes discutere valent: eoque hic farinam fabæ fresa addi vult Dioscorides, tum excipiendo medicinam, tum iuuando actionem, digerit enim faba, &

Pena in  
Ad. fol. 314.



- cum Coriandri succo mixta moderatè repellit exsiccando, quæ etiam vi phlegmonas testium iuuat. Sicca enim id optimè præstare, modo modice refrigerent, & discutiant, præsertim initio, methodus Galeni docet. Sic plantago etiam Dioscoridi, sic capilli veneris strumas discutunt. Addi potest & his strumarum varietas, quæ interdum sunt genera phlegmones, exquisitæ, spuria ve, ac ideo talia remedia postulant. Quod verò Dioscorides scripsit semen Coriadræ largius sumptum non sine periculo mentem mouere, id Auicennas de succo tradit, qui vnciarum quatuor pondere potus interficit: tristitiâ enim adfert & syncopen parit. Denique à liberaliore eius vsu abstinendû. Sed Diosc. de semine recenti & viridi intellexisse videtur, qui & alibi dixit generatim Coriadræ potû vocè exasperare, & insaniam inducere similè iis, qui ex ebrietate læsi sunt. Præterea scribit Dioscor. Coriandri semen genituram adaugere, contra Auicennas, quod ex eo humidû est, & quod siccû, inquit, frangit virtutè coitus, & erectionè virgæ desiccando sperma. Et Serapio ex auctoritate Alcanzi ait: Quando Coriadræ siccû infunditur in aqua, & bibitur aqua eius cum saccharo, abscindit erectionem virgæ, & desiccatur sperma.

## PANACE S. CAP. XXIIII.

## Nomina



RAECIS πᾶναιες & πᾶναις dicitur, Latinis Panaces & Panax, nomen multis plantis cōmune, quæ neq; facie inter sese, neq; viribus similes sunt, magnæ tamē ad morbos cōmendationis, quod plurimis scateat remediis, ἀπὸ παν & ἀκος, id est, ab omni medela siue remedio nūcupatæ.

## Lib. 4. c. 49.

## Genera.

## Lib. 9. hist. cap. 13.

## Lib. 1. c. 48.

## Forma.

## Locus.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c. 50.

## Ibidem.

## Lib. 1. c. 49.

## Lib. 9. hist. cap. 12.

## Lib. 3. c



radicem longā. Plinius sine generū distinctione de Panace hæc scribit. Panacē & vnguentis eadē (Syria) gignit, nascentē & in Psophida: Arcadia: circaq; Erymāthi fontes, & in Africa, & in Macedonia: ferula sui generis, quinque cubitorum, foliis primo quaternis, mox senis in terra iacentibus, ampla magnitudine rotūdis, in cūmine verò oleagineis, semine in muscariis dependēte, at Ferula. Deinde alio in loco eiusdem genera exponens ait. Panaces ipso nomine omniū morborū remedia promittit, numerosam, & Diis inuentoribus adscriptū. Vnum quippe Asclepiū cognominatur, quoniam is filiam Panaceam appellauit, &c. Alterum genus Heracium vocāt, & ab Hercule inuentū tradūt. Alij Origanum Heracleoticum siluestre, quod est Origano simile, radice inutili. Tertium Panaces chironium cognominatur ab inuentore. Foliū eius Lapatho simile, maius ramē & hirsutius. Flos aureus, radix parua. Nasce pinguibus locis. Hæc Plinius: in quibus multū à Diosc. dissidet, & Theoph. magna ex parte assentitur, à quo & sua mutuatus est. Sed quam dixit Theophr. radicē Chironij, *μακρὰν*, Plinius *μακρὰν* legit, id est, parua, Dioscor. *λεπτήν*, id est, tenuem, vt fortassis Theoph. exemplaria hic mendosa sūt. Panaces Heracleū in Apulia frequēns nasci scribit Marth. quemadmodum in Apenninis iugis, & in Argentario promontorio in maritimis Senensibus. Colitur & in Italia viridariis: quod ex eodem pictū hic dāmus Dodon. idem depinxit. Aliud Panax Heracleum statuunt Lobellius & Pena, caule bicubitali, lanugine quadam incauo, folis quadatenus Smyrnijs aut Impera oria, sed lacinis ambituq; magis circinato, in viridi pallentibus, rigidis & leuiter hirsutis, floribus in umbella lata luteis, (albos in Belgij viretis se vidisse, ait Lobellius) radice Ligustici vel Angelicæ, non perinde succulenta. Hanc Dodonæus Spondylium alterum appellat, supra descripto similem, sed rariorem & maiore, cui plures sæpe caules assurgunt, crassiores altioresq; folia ex tribus ferè composita, maiora, & ficulneis similia, aspera nonnihil, atque vnà cum caulibus hirsuta: flores, semen, radix, vt prioris. Hoc genus, inquit Dodonæus, non Sphondylium alterum, sed Panaces Heracleū creditur. Desideratur tantum floris color, quē Dioscorides luteum esse ait. Folia aspera ficulneis respōdent: caulis hirsutus, radix multiplex, quale Heracleum scribitur esse Panaces. At hic de florum colore scrupulus facillè extinguitur. Nam in Belgij viretis flores albi sūt, teste Lobellio qui etiam Venetijs in Franciscanorū horto se luteos vidisse refert, & luteos flores

Lib. 25. c. 26.

Lib. 25. c. 4.

Ca. 48. li. 7.

Li. de succ. ca. 9.

In Purg. hist.

PANACES *Herculeum Mar.*



PANACES *Asclepium, Mart.*





esse scribit Pena eiusdem sponte enata in illo saxoso colle, qui Frontignano re-  
deunti Monspelium ad læuam est. Panaces Asclepium ex eodē Matthiolo hic  
exhibemus, quod diuersi generis non est à Ferula, inquit Pena, nec item figura  
disimile, præsertim istud doctioribus verum putatum, forte quale in Matthiolo  
pictū videtur. Sed id tantum se vidisse ait Mat-  
thiolus, effigiēque eius pinxit omīsis notis  
omnibus. Scribit autem Pena Ferula simile ef-  
se effigie, sed multò minus, semine non fœni-  
culi, sed vt Ferula, lato, foliis & floribus haud  
disimilibus: caule & radice magnitudine & si-  
militudine Anerthi, odorato. Ab hoc differt  
id quod ex aliis herbariis hīc depinximus in  
asperis locis & tumulis propè Monspeliū pro-  
ueniens, radice Apij, candida, tenui, acri, odo-  
rata, folio tamen Apij, aut Coriandri potius  
quàm fœniculi, hirsuto, flore luteo in umbellis  
circinata rotunditatis. Pro Chironio scribit  
Matthiolus quosdam plantam ostendere, quæ  
flos solis nuncupatur, quorum sententiæ mini-  
mè suffragatur, sed in Symphytorum genere  
esse putat. Aliis Panaces Chironium videtur  
esse Bupleuri species, Monspelienfibus Auri-  
cula leporis dicta, folio longo, rigido, latiuscu-  
lo in medio, supernè in angustum desinente,  
ferè lanceolata, multis striis quasi costis distin-  
cto, nonnihil concauo aut inflexo, vnde illi  
Auriculæ leporinæ nomen: caule, procerò,

In Ad. fol.  
350.

PANAX Heracium, Lobelij.  
Sphondylium alterū Dod.

Ibidem.



PANACES Asclepium  
alterum, Dalechamp.



PANACES Chironium  
sive flos solis, Matth.



genicula



PANACES Chironium,  
quorundam, Dalech.



PANAX Chironium,  
Dodonæi.



inditus. Visum acuit oculis illicitus. Cum pice mixtus optimum est emplastrum aduersus rabiosi canis morsus. Radix derasa & vuluæ admota partus euocat. Facit & ad vlcera vetera, & ossa denudata carne obducit trita inspersa, & cum melle illita. Semen cum Absinthio sumptum menses pellit, cū Aristolochia prodest aduersus animalia

geniculato, in ramulos superiore parte diuiso, umbellis in summitate pusillis, sparsis, luteolis floribus, semine Anisi, aut Anethi, oblongo. Alij Daphnoscum nominant. Quidam Buprestin Plinij esse putant: Ammi verò vulgare descriptū supra, cap. 5. Bupleuron. Theophrasti autem Chironium Pena coniicit esse Herbam Auream Narbonensem, foliis Limonij, aut Lapathi, aut sanè vnum eorum quæ Plinius ad Theophrastum retulit, vt Pharmaceū, Panaci Chironio hæc subiungens, li. 23. ca. 4. Quartum genus Panacis ab eodem Chirone repertum Centaurium cognominatur, sed Pharmaceum in controuersiam inuentionis à Pharnace Rege deductum, &c. De hac Herba Aurea Lobelij & Penæ fusiùs tractauimus in Umbrosis, capite de Virga Aurea. Diuersam à superioribus Panacis speciem pinxit Dodonæus, quæ peregrina stirps est, foliis amplis, multiplicibus nonnihil hirsutis & asperis, quorum singula Lapathi folia æmulantur, sed minora sunt: caulis duorum, trium, aut quatuor cubitorum altitudine: flores in umbellis luteis: semen planum, latum, & subflauum: longa & candida radix. Panacis speciem esse, inquit Dodonæus, semen demonstrat, in Panacis lacryma repertum, ex quo Petro Condébergio Antuerpiensi Pharmacopœo primùm enata stirps est. Ex incisa radice Panacis Heraclij, inquit Dioscorides, nō Asclepij, vt vult Plinius, colligitur succus recens adhuc germinantibus caulibus, qui dicitur Opopanax, Officinis Opopanacum. Colligitur & ex caule per messes inciso: qui hodie ad nos ex Alexandria Egypti conuehitur, Officinis notior, quā ipsa Panacis genera. Vim habet, auctore Dioscoride, calfaciendi, molliendi, attenuandi. Quare febribus per circuitus repetentibus, rigoribus, vulsis, ruptis, laterum doloribus, tussi, torminibus, stillicidio vrinæ conuenit: contra vesicæ scabiem ex aqua mullâ, aut vino bibitur: ducit menses, & foetus enecat. Inflationes vteri & duritias discutit cū melle dilutus. Illinitur ex eo ischiadicus dolor. Admiscetur acopis & medicamentis capitis, carbunculos rumpit. Podagricis cum vua passâ illitus subuenit: dolore dentium liberat: cauis

Li. pargan.  
& de flor.

Viresco  
Temper.  
Lib. 3. c. 48.



- animalia quæ venenum ei aculantur, & contra vuluæ stragulat in vino bibitur.
- Li.8.simpl. Galenus de eodem sic scribit. Ex Panace Heracleo fit Opopanax, radicibus eius & caulibus scilicet incisis. Porro Opopanax ipse longè est ad plurimos vsus aptissimus, utpote excalfaciens, emolliens, & digerens: ponatq; ipsum quispiam in calfaciendo tertij ordinis, in desiccando verò secundi. Cortex radice exsiccatum simul & excalfactorium est medicamentum, sed minùs quàm succus. Quin & nonnullam habet abstergerendi facultatem. Quare eo quoque utimur ad nuda ossium, & ad vlcera maligna & contumacia. Fructus calidus & ipse est, ac mensibus utendis medicamen accommodum. Theophrastus Heraclij radicem utilem esse scribit contra morbum comitalem coagulo vituli marini admisto ad quartam partem, & contra tormina è vino dulci: utilem etiam ad vulnera sicca, ex melle ad madida. Mesues his & multis aliis dotibus adiicit succo huic vim inesse purgandi pituitam crassam & lentam clam à remotis partibus, cerebro, nervis, sensorijs, iuncturis, thorace. Ob id prodesse harum partium affectibus frigidis inde natis, visui imbecillo, tussi antiquæ, difficultati spirandi, ischiadi, gonagræ, podagræ, quam purgandi vim Græci tacuerunt. Panacis Asclepij flores & semina, auctore Dioscoride, vim habent aduersus vlcera, tubercula, & phagedænas, si trita cum melle imponantur. Contra serpentes cum vino bibuntur, & cum oleo illinuntur.
- Li.8.simpl. Id semen Heraclio minùs est calidum, ait Galenus. Quare floribus & semine melle mistis ad vlcera, phymata, & phagedænas vtuntur Theophrastus Asclepiũ suũ valere scripsit ad serpentes, si bibatur dera sum, & ad lienem, cū sanguis circa eum constiterit: ex mulso, & capiti, tritum ex oleo, & inunctũ, & si qua alia parte obscura laboret quis, & ventris doloribus ex vino rasum, posse etiam & longas ægritudines depellere. Insuper & vlceribus, humidis quidem siccum aspersum, elorumq; vino calido. Siccis etiam ex vino subactum, & aspersum. Chironij verò radix, pota, inquit Dioscorides, serpentium venenis resistit: illita coma eadem præstat. Id similem Asclepio facultatē habet, inquit Galenus. Theophrastus Gaza interprete. Utuntur ea aduersus viperas & phalangia, & tineas vestium, & cætera reptilia, data ex vino & vnctæ oleo. Vipera autem morsui inspergitur ex acido, & potui datur. Valere aiunt & ad vlcera ex vino & oleo, & ad tubercula ex melle: quo Theophrasti loco exemplaria Græca habent τὸς ὄσσης, Gaza conuertit tineas vestium, vulgarem lectionem secutus: & sunt quidē ὄσσης vermes, qui vestes & libros corroderunt. Verum aduersus hos quomodo Panaces Chironium cum vino bibatur, aut cum oleo illinatur? Quare legendum τὸς ὄσσης, aduersus sepsas. Est autem, vt Lucanus ait,

*Osæque dissoluens cum corpore tabificus seps.*

Serpentis genus, ex cuius ictu partes putrescunt, atque ipsi icti intra tres aut quatuor dies pereunt: de quo Dioscorides & Aëtius scripsere. Ex iis quæ diximus perspicuum est, quam variæ sint etiam Classicorum auctorum de Panacis generibus sententiæ: de quibus hæc doctissimè cōmentatus est Dalechampius. Certum est, inquit, Dioscoridi tria genera Panacis constitui. Primum Heracleum, cuius succus Opopanax est, non Panacis Asclepij, vt Plinius scripsit, ca. 4.25. magna instantia, & obliuione, cum cap. 26.12. plantam quæ Opopanacem fundit, notis Heraclæi delineasset. Secundum Panacem Asclepion, cortice salso, & crasso, Theophrasto, non multo, vt vertit Plinius. Tertium Chironium, Amaraci folio Dioscoridi: Lapathi Theophrasto. Præter hæc tria famosa, Dioscorides Origanum siluestre, siue Cunilam bubulam, quæ Cunilæ gallinacæ, siue Origano Heraclæotico similis est, Heraclæon Panaces dici tradit: quineriam ligusticum, Panaces, & Panaceam: quod & Plinius affirmat: Centaurij quoque magni radicem Panaceam, quam & Panaceam, & Pharnaceum, vocari docet etiam Plinius: quamvis in hac re sapere



scire qui se se putant, arbitrentur Ligustici cognomen id apud Dioscoridem spurium esse, quoniam in exemplari Græco non extat, & quæ de Centaurij radice ad finem capitis leguntur, non esse Dioscoridis, sed adiectitia, audacius eo loco inculcata. Alterum genus (Panacis) inquit Plinius, cap. 4. 25. Heracleon vocat, & ab Hercule inuentum tradunt. Alij (nimirum Crateus, cap. 8. 19.) Origanum silvestre Panaces Heracleon vocant, quod est Origano simile (Heracleotico, scilicet, dicto ab Heraclea vrbe Cretæ, non ab Hercule.) Sic restituendus locus ille corruptus Plinii, qui Panacis nomine appellauit, Heracleon, Asclepion, Chironium, Origanum silvestre, Ligusticum, Centaurij magni radicem, vt Dioscorides, & insuper Achillei Sideritum, cap. 5. 25. Theophrastus cap. 12. 9. Hist. Panacis genera recenset Syriacum, Heracleon, Asclepion, Chironium, & alia præterea duo, alterum folio tenui. λεπιδόφυλλον, alterum crasso, παχύφυλλον, non πλεόφυλλον vt vulgò legitur: idemq; Heracleon, Asclepion, Chironium describit luculenter. Syriaci verò se paulò ante meminisse, inquit, nimirum eiusdem libri, cap. 7. cū ait, ex India & Arabia ad vnguentorum confectiones odoras aduehi, vnguētis autem ferè immisceri Casiam, Cinnamonum, Nardum, Neron, siue vt quidam legūt, Maron, Ballimum, Iridē, Nardamomum, tam, siue vt quidā legunt ex Dioscoride Narcaphthō, Costū, Panaces, nō vt Gaza, Ligusticum, Crocum, &c. ac rursus ca. 11. Panacis, inquit, varij sunt vsus, nec ad eandem rem omnes. Seminis quidem ad prouocandos abortus, neruorum distensiones, & dolores id genus, ad morbos auriū, & vocis exercitationes: radicis verò ad partus accelerandos, ducenda muliebria, & morbos veterinorū. In Syria Panaces gignitur, & per messem inciditur. Hæc Theophrastus de Syriaco, in quibus nulla eius nota deprehenditur. Quodnam id sit docti ambigunt. Plinius cap. 26. 12. Heracleum fuisse declarat, quoniam cū Panaces vnguentis Syriam gignere Theophrastum secutus dixisset, mox subiicit, nasci in Phocide Arcadia, (nō Psophide) Africa, Macedonia: Ferulam sui generis esse quinque cubitorum, (caule Ferulæ, altissimo, Diosc.) foliis primò quaternis, mox senis, (lego, primò ternis, mox quinis, sic enim oriuntur:) (in ambitu quinque partitò diuisis: Diosc.) in terra iacentibus, ampla magnitudine, rotundis, (ad ficulnea multum accedentibus, Diosc.) in cacumine vero oleagineis, (circa caulem minoribus: Diosc.) semine in muscatis dependente, vt Ferulæ: (vt Anethi: Diosc.) Excipitur succus inciso caule melsibus, radice, Autumno. (τέμνε) περὶ πυραμίδον. Theoph.) Laudatur candor eius coacti. Sequens pallido statera (Sequitur pallor siccato. Diosc.) &c. quæ omnia Heraclei descriptionem continent, alibi nusquam traditam à Plinio, quod illic diligenter explicasset. Opinionem Plinii laudo & amplector, legēdumq; apud Theophrastum: Πανάκη ἢ χαλδίσι, πρῶτον μὲν τὸ ἐν Συρίᾳ, ἡ δὲ καὶ ἐν, περὶ δὲ μικρὸν πρότερον εἶρη: ἄλλα δὲ, τὸ μὲν χαλδίον χαλδίον, τὸ δὲ ἀσιλίπρον. ἔχῃ δὲ τὸ μὲν χαλδίον, &c. vt superuacua reliqua ab inconsiderato quodam infarcta sint, Syriacum Panaces præter illa tria pro quarto numerante, nisi fortasse putet aliquis Heraclei descriptionem quæ postrema est, amouendam suo loco, & præponendam historiæ Chironij & Asclepij, vt ordine procedat philosophi oratio. Pari dubitatione de Leptophyllo Panace & Pachyphyllo queritur, ea quænam sint. Dodonæus Pachyphyllon esse iudicat Cētaurium magnum, cuius radicem etiam Panaceam vocari testatur Dioscorides, Leptophyllon verò, Centaurium minus, vt vtrumque Centaurij genus Panacis cognomine velut decoretur, quoniam nomine promittit omnia morborū remedia. Ego verò, cum extra dubium sit Origanum silvestre, & Ligusticum, Panaces vocari, nullus autem de Centaurio minore id prodiderit, probabilius esse credo, Origanum silvestre παχύφυλλον eo loco à Theophrasto dici, Ligusticū autem, λεπιδόφυλλον, non obscura in foliis eorum hac differentia.

LIGV



Nomina

Lig. ca. 51.

Locus.

Forma.

Lib. 3. ca. 51.

Lib. 19. c. 8.



ΙΓΥΣΤΙΚΟΝ Græcis, Galeno vnus literæ immutatione *λεγεται* *λεγειν*, nisi mendosi sint illius codices, Latinis quoque Ligusticū, quod nascatur plurimū in Liguria, inquit Dioscorides, in Apennino al-  
pibus contermino. Vocant autem incolæ Panaces, non sine ratione, quoniam & radice & caule Panaci Heraclio simile sit, & viribus iisdem præditū. Gignitur in altissimis asperisq; ac vmbrosis montibus, maximè circa scrobes. Cauliculum profert tenuem, similem anetho, geniculatum, circa quem folia sunt meliloti foliis teneriora, odorata, propè summum caulem graciliora, & magis di-  
uisa: in cacumine vmbella est, in qua semen nigrum, solidum, oblongum ad sceni-  
culi semen accedens, gustanti acre & aromaticum. Radix candida Heraclei Pana-  
cis similis, odorata. Sic Ligusticum depinxit Dioscorides. De quo breuiter hæc Plinius. Ligusticum siluestre est in Liguria: suæ montibus: seritur vbiq;: suauius fa-  
tium, sed sine viribus. Panaces aliqui vocant. Crateas apud Græcos Cunilam  
bubulam eo nomine appellat Ligusticum ex Matthiolo hîc pictū Siler est monta-  
num: Officinarium, quod multi esse Sefeli Malsilienſe existimarunt, tamen magis  
placet etiam Dodonæo Ligusticum esse. Folia enim ad meliloti folia accedunt,

LIGUSTICVM,  
Matthioli.LIGUSTICVM  
alterum, Lobell.

ipsis tamen molliora & angustiora: semen crassum, fordido Cumini colore subni-  
gricans, quò maius & acius. In Liguria montibus gignitur. Lobellius Ligusticum  
alterum Belgarum ostendit, plantam non inelegantem multis iam annis à se re-  
pertam in Taurinis collibus, non procul à Padi fluentis. In hortis Belgicis alitur,  
caulem ferens cubitalem & sesquicubitalem, quem ambiunt folia rutacea, Sileris  
montani latiora, rotundiora, absinthij fruticis ferè paria: flores & semen rotundū,  
nonnihil aromaticum in Vmbellis Smyrni Cretici. Hæc Lobellius. Ex quibus  
perspicuum est leuisticum vulgò vocatum à Ligustico prorsus distare. Nam hoc  
caule



Li. 7. simpl.

C. A. P. XXV I.

Lib. 25. c. 9.

R r




his secutus. Sed inter primas, inquit, celebratur Peucedanum laudatissimū in Arcadia, mox Samothrace. Caulis est ei tenuis, longus, Fœniculo similis, iuxta terrā foliosus, radice nigra, crassa, granis odoris, succosa. Gignitur in montibus opacis fodiunt exitu Autumni. Placent tenerrimæ & altissima radices. Hæc conciduntur in quaternos digitos osseis cultellis, funduntq; succum in umbra, capite & naribus rosæo perfusis, ne vertigo sentiat. Et alius succus inuenitur caulibus adherens, incisq; manat. Probatur crassitudine mellea, colore rufō, odore suauiter graui, feruens gustu. Et hic in vsu, & radix, & decoctum eius pluribus medicamentis. Succo tamen efficacissimo, qui resoluitur amaris amygdalis, aut ruta, bibiturq; contra serpentes, & ex oleo perunctos tuetur. Hæc Plinius. Theophrast. radicem solam probat, semen inutile esse dicit, itemq; succum his verbis. *Περικανθίου ἔστι τὸ πρῶτον περὶ αὐτοῦ, ἀλλ' οὐδὲν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔστιν ἰσχυρὸν, ὡς περὶ ἐξ ἄλλων. Νισσοῦ δὲ καὶ τὸ πρῶτον δὲ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, ὃ δὲ ἀπὸ τοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον, ὅδε ὁ δὲ περὶ αὐτοῦ, γινέται. Ἡ δὲ ἐν Ἀρκადίᾳ. Quod in Arcadia nasci ait, habet etiam Plinius, & Samothracē addit. Quare etiam in Dioscoride pro Σαμοθρακὲ legendum videtur Ἀρκαδίᾳ. Matthioli Peucedanū in An-nien-sibus montibus copiosissime provenire scribit, cum aliis notis, tum radice*

Cap. 21. 9.  
hist.

Ca. 77. li. 3.

PEUCEDANVM,  
Matthioli.



PEUCEDANVM,  
Dodonæi.



In Ad. f. 31.

Dioscoridis Peucedano simillimum, quam habet crassam, nigram, succi plenam, grauius odorem. Multum crescit, inquit Pena, in Hetruria æstuosis, & Narbonensis Gallia glareosis collibus, præsertim in luci Gramuntij aditu, & circum, inter sentes & dameta. Radix profunda nigricat foris, intus virescens, succumq; remittit gummeum, flauū, odoris grauis & fortentis, comatq; supernè denso capillitio, fulco, ambiente caulem gracilem, sesquicubitalem multis interdū ab imo linculis diuisis in folia terna, fœniculi modo, quàm ferula duplo latiora, longiora, minùs crassa. Umbellæ latiores luteis flosculis prægnantes, semine angelicæ haud absimili, ingrato. Sic & purgandi vi donata fuit radix herbæ, sed propter fœtorē vtriusq; minùs in vsum deducta. Peucedanum Italicum, inquit Lobellius, est Narbonen-



PEUCEDANVM *Maius*  
*Italicum, Lobell.*



Narbonensi quadruplò maius omni sui parte. Prouenit copiosè in collibus Lauretanis & agri Romani. Dioscorides & Galenus succo radicique vires insignes attribuunt his verbis. Succus ex aceto & rosaceo illitus prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: omnibus in vniuersum vitiis neruorum ex oleo & aceto illitus prodest. In vteri strangulatione olfaciendus naribus admouetur, & sic quoque in soporem altius delatos reuocat. Suffitu serpentes fugat. Aurium doloribus commodè ex rosaceo instillatur, & ad dentium dolorem cauernis inditur. Facit & ad tussim cum vino sumptus. Subuenit difficultati spirandi, torminibus & inflationibus. Aluum leuiter emollic, & lienem liquat. Difficiles partus egregiè adiuuat. Et ad dolores & distensiones vesicæ & renum potus facit. Aperit etiam vterum. Radix ad eadem utilis est, sed minore efficacia: bibitur autem ipsius decoctum. Eadem arida trita purgat sordida vlcera, & ossium squamas remouet, & vetera ad cicatricem perducit. Miscetur ceratis & malagmatis calfacientibus.

*Li. s. simpl.*

Galenus, Peucedani, inquit, radice, quidem maximè, sed tamen etiam succo & liquore vrimur. Sunt autè omnia hæc eiusdè specie facultatis: sed valentior succus, admodum exalfaciens & digerens. Quare affectibus omnibus circa neruos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone, thoraceq; ex crassitudine & viscositate humorum prouenientibus. Atque nitro quidem in corpus sumptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro quod incidat & extenuet, sæpe etiam dentium perforatorum dolores cauitati impositus, protinus sedauit, quia videlicet tenuium est partium, & exalfaciens. Quinetiam lienes induratos iuuat, nempe incidendo, digerendo, atque extenuando crassos humores. Sed ad hæc & radice vti liceat, quæ & squamas ab ossibus celerrimè detrahit, quia videlicet validè desiccet, minus tamen quam succus exalfaciens. Et vlceribus contumacibus aptum est remedium arida illita: ipsa enim expurgat, carnem inducit, & ad cicatricem perducit: exalfaciens quidem ordine secundo iam completo, desiccans verò tertio iam incipiente. Plinius easdem atque alias etiam vires describit variis in locis. Peucedanum pectoris doloribus subuenit. Pituitam & bilem detrahit Peucedani radix. Eadem decocta lieni & renibus prodest. Perungunt & radice sudoris causa eliciendi, quoniam caustica vis ei est. Peucedano ad recentia vulnera tanta vis est, vt saniem ossibus extrahat. Cum semine cupressi bibitur, si sanguis per os redditus est, fluatque ab infernis. Strangulatus vuluæ nidore vstum recreat, laxanturque suffocationes eo, sed quidam admiscunt in vino semen cupressi contritum. Potum cum coagulo vituli marini æquis portionibus comitiales sanat. Succus infantum ramici, & vmbilicis eminentibus iungitur. Stranguriæ cum melle medetur. Item semine lethargici excitantur, & vt perhibent, ex euphorbio, naribus tactis Peucedani succo.



## Nomina

L. 24. c. 19.

&amp; lib. &amp; c.

22. &amp; l. 13.

ca. 26. &amp; l.

27. cap. 7.

## Genera

## Forma.

Cap. 43. li. 2.



VAR. planta σέσελι Græcis, similiter Latinis Sefeli nominatur, Arabibus *Sisabos*, Barbaris *Sifelios*. Plinius *Sili* videtur appellasse multis locis: in quibusdam etiam Sefeli vocat. Dioscorides tria Sefeleos genera ponit, σέσελι θ' *μασσυλασίον*, id est, Sefeli Malsiliense, Officinis *Siler montanum* dictum, σέσελι *αιθιοπικόν*, Sefeli *Aethiopicum*, & σέσελι *πελοποννησιακόν*, Sefeli *Peloponnesiacum*: quibus quartum addit in alio capite, σέσελι *κρητικόν*, Sefeli *Creticum*, *Fordylium* nominatū. Quæ singillatim sic deliniat. Sefeli Malsiliense folia habet fœniculo similia, sed crassiora, caulem vegetiorem, umbellam anecho similem, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acriter radix longa est, odorata. Matthiolus Sefeli Malsiliense, ita depictum exhibet, & in omnibus


SESELI Malsiliense,  
Matthioli.SESELI Aethiopicum  
Matthioli.In Ad. fol.  
352.

ferè Tridentinis montibus colligi ait, quod tamen legitimum esse negat Pena, quid verò sit, inquit, cum Matthiolus non descripserit, nobis ignorandum: illud tamen is asserit se in Tridentinis alpebus hanc plantam nuspiam vidisse, ac ne in Baldo quidem monte longè illis feracior. Genuinum verò Sefeli Malsiliense passim & copiosè crescere illis in tractibus qui Malsilia Aquas sextias ducunt, tranque Rhodanum in Monspeliaci agri asperis. Se etià id collegisse via qua Roma Senas itur propè colles oppidi Montiascone dicti. Radix illi alba, fœniculi effigie & magnitudine, altè humi depacta & euulsu difficilis, quàm fœniculi odoratio & calidior: caulem ut plurimum sesquicubitalem, ferulaceum, hinc inde alis multis ex geniculis prodeuntibus reflexum emittit, prædurū, rigidum: folia pauciora, sed firmitiora, crassiora quàm fœniculi, & albida sunt: umbellæ cōfectæ, anethi, floribus candidis, & semine aniso similiore quàm fœniculo, gustu suavi, acri, & medicato, Mei aut Panacis gustu. Planta illic yaldè nota est fœniculi tortuosi nomenclatura. Neque quantum illic locorum est Malsiliæ circumlustranti, vllā plantam videre



videre est, quæ magis quadret Sefeli. Hanc plantam descripsimus & pinximus fœniculi tortuosius nomine. Istud Sefeli Mafsilienfe diximus Officinis Siler montanum vocari, & Sifeleos: cū tamen hoc ab illo multū diuersum fit. Est enim Siler montanum, inquit Pena, duūm cubitorum ferulaceus caulis, radix odorata, Ligustici, folia terna, non modo fœniculo, vt Mafsilienfi Sefeli, maiora, sed vel

FOENICVLVS Tortuosus, Dalechamp.



SESELI Mafsilienfe, Pena.



peucedano latiora, ac paulò minus Ligusticū, vel coronarium rosmarinum æquantia, mollia: umbellæ prægrandes, Angelicæ, quibus semen foliaceū, longius cumino, colore pallido, quod gustu, etiam saccharo conditum, acrius quam Æthiopicum est, tanto magis quā Mafsilienfe, cui acrimonia præfert Æthiopicū. Quare qui Pharmacopœis & recentioribus suaserūt Siler montanum, siue Sifeleos nihil aliud esse quam Dioscoridis Sefeli Mafsilienfe, eos quidem hac in re fefellerunt, quātum verò ad vires attinet, minime. Est enim planta multò maioris acrimoniae & efficacia quā vllum Sefeli: eoque mensuris ciendis valde cōmoda. Id suprà pictum dedimus, cap. de Ligustico, ipsius Ligustici Dioscoridis nomīne. Sefeli Æthiopicum, vt tradit Dioscorides, folia habet hederæ similia, minora, oblonga, ad foliorum periclymeni similitudinē. Frutex est magnus (nam emendatiores codices habet, ῥάμνος δὲ μέγας ἐστίν, quod & Hermolaus expressit, non ῥάμνος ὁ μέγας ἐστίν, vt conuertit Ruellius, frutex nigricat) palmittibus in bina cubita extensis, in quibus rami sunt duorum palmorum, & capitula velut anethi: semen autem nigrum, dēsum velut triticū, acrius ac odoratius quam Mafsilienfe, ac vehementer iucundum. Ruellius facit etiam semen hoc amarum, quod neque ex vulgari, neque ex veteri codice constat. Additur autem ad finem eiusdem capitis in codice antiquo: ὁμοῦ δὲ τὸ αἶμα, id est, easdem vires habet. Huius Sifeleos imagines duas dat Matthiolus. Vtraque enim, inquit, verum representare videtur. At prius à Sefeli Æthiopico multū distat: est enim herba quam recentiores libanotidem Theophrasti prodiderunt, eoq; nomine descripta & depinxit Dodonæus, viribus & figura alienā à Sefeli Æthiopico, quem fruticem, adeoque magnum Dioscoridis correctior codex statuit esse, vt suprà diximus. Alterum igitur verum Æthiopicum sufficere debebat in locum illius herbae, cui videtur postposuisse: quod Pena graphicè sic depingit. Id laxeis illis & deaexis Mafsilie maritimis, tum etiam ad Celsi montis celsi radices, qua in stagnum vergit, fruticat

Lib. 3. ca. 3.

Cap. 33. li. 3.

In Ad. fol. 281.


Lib. 2. c. 84.

Ibidem.



*SESELI* *Aethiopicum* *verum*.Fig. ca. 13.  
Forma.Locus. *SESELI* *Peloponnesense*,  
Mat. h. iol.

Cap. 33. Fig.

In Ad. f. l.  
377.Viresc.  
Temper.  
Lib. 3. ca. 53.

se, cum ramen antea nonnulli thapsia speciem suspicati fuerint. Ab hoc sola magnitudine discrepans Peloponnesense. Sesele maius exhibuit Lobellius, in Belgij hortis ex Hispano semine ortum, altero tanto maius, maioribus latioribusq; foliis & semine. Id Thapsia est latifolia Clusij & quorundam. Malsiliensis Seseleos semen & radix exalfaciendi vim habent, inquit Dioscorides, potu stranguriae & orthopnoe

vberi prouentu Iulio & Augusto, spectatu valde elegans. Multis constat virgultis rectis, ligneis, nigricantibus, rigidis, binos ternosve cubitos altis, in varios furculos diductis, folia crassa, rigida, & laeua, viridia vt hederæ, figura oblonga, propiora periclymeno prominentibus. Luculentas in summis gerit umbellas, luteis floribus anethi, quas semen stipat fuscum, oblongum, copiosum, sceniculo maius. Non solum semen, sed etiam vniversus frutex gustanti aromaticis saporem acrem, medicatum & subamarum, sed gratum imprimit, suauemq; odorem spirat à summo ad imam vsq; radicem, quæ lignosa est. Eximia vis est etiam semen ad theiacam, quod etiam, vt Dioscorides innuit, Malsiliensi multo odoratius & efficacius est. Sesele Peloponnesense, vt scribit Dioscorides, folia habet cicuta similia, latiora (vulgaris enim codex habet *ωλδισπερα*, legitur in vetusto *τραχυλπερα*, id est, asperiora) & crassiora, caulem maiorem, quam Malsiliense, ferulaceum, in cacumine umbellam, in qua semen latius odoratum, & carnosius. Nasceitur in asperis locis, humidis, & collibus, & in Ida. Eisdem viribus præditum est. Hoc Matthiolus sic pinxit. Longè aliud proposuit & descripsit Pena his verbis. Ad mortem Lupi, & iuxta ades sacrificuli in decliuitibus salebrosis insulae montis Cestij, qua mare se pandit, est planta quidem copiosa, sed non ubiq; obuia, cuius radix magna, intus alba, foris nigricans, recta & altè porrecta, ferule thapsie modo, odorata, & aliquantum acris. Caulis digitum æquat crassitie, sesquicubitum altus, ferulaceus, à quo promittur alæ turionesve complures in ambitum sparsi, vbi folia multa, cicuta magnitudine, sed incurua, pilosa & crispa, rugataque. Umbellæ multæ anethi luteæ sunt, semen latum foliaceum, compressum, angelicæ figura & magnitudine, color illi ex pallore hauescit, odor suauissimus, Aethiopici adeo similis, vt statim odoratu, cum primum vidisset ille, Peloponnesense coniectarit, quæ coniecturam certiore exploratione notatum & virium, Doctores Monspelienfes fulcierunt, vt nullus iam ambigat vel um esse Sesele Peloponnesense, cum ramen antea nonnulli thapsia speciem suspicati fuerint. Ab hoc sola magnitudine discrepans Peloponnesense. Sesele maius exhibuit Lobellius, in Belgij hortis ex Hispano semine ortum, altero tanto maius, maioribus latioribusq; foliis & semine. Id Thapsia est latifolia Clusij & quorundam. Malsiliensis Seseleos semen & radix exalfaciendi vim habent, inquit Dioscorides, potu stranguriae & orthopnoe



SESELI PELOPON.

folio cicutæ, Pena.



orthopnææ medentur, profunt etiã vteri, strangu-  
lationibus & epilepticis, menses & partus tri-  
hant, ad omnia terna mala polleat, & tussis ve-  
teres sanant. Semen cum vino potum conco-  
quit, & tormina discutit: hepialis febribus vti-  
le, & contra frigora in itineribus cum pipere  
& vino bibitur. Datur etiam capris, & ceteris  
pecudibus ad partus faciendos. Plinius de ceruis Lib. 8. c. 32.  
loquens, feminam ante partum, inquit, purgan-  
tur herba quadam, quæ Sesele dicitur, faciliore  
ita videntes vtero. A partu duas habent herbas,  
quæ aros & Sesele appellantur. Et alibi. Simpli- Lib. 25. c. 8.  
cius ceruæ mōstrare elaphoboscum, de qua  
diximus: item Sesele enixa à partu, quod apud  
Aristotelem sic habetur. ὅταν τὴν, ἡ ὁ. Et τὸ Lib. 9. h. 2.  
χορὸν πρὸς, ἢ ἐπὶ τὴν Σέσσην ὅ τρέχουσιν, ἢ παρὰ  
σὺν οὖλῳ ἐρχομένη πρὸς τὴν αἰνῶν. Galenus Lib. 8. lib.  
scribit Seseleos & radicem & fructum vsq; adeo  
excalfacere, vt admodum urinam mouere queat.  
Sed & tenuium esse partium, & comitiali mor-  
bo, & orthopnææ competere. Supradictis ge-  
neribus subiunxit Dioscorides σέσσην καὶ ῥιζὴν Lib. 3. c. 54.  
quibusdam dictum, & τὸ ῥιζὴν, Paulo γαρδύλιον,

Latinis etiam Tordylium, & Sesele creticum, Ordalion, Nicandri Anguillare. Her-  
bula est succulosa, inquit Dioscorides, semine rotundo, duplici, scutulis simili, lib-  
acri, aromatico, iuxta Ciliciam in Amanio monte nascitur. Hanc esse censet Do-  
donæus teneram herbulam, hic appictam, sesquipedalem, surculis exilibus & te-  
neriusculis, in quibus folia pauca, minitius infecta, coriand-  
rinis similia, inferioribus latioribus, & minus incis, su-  
perioribus tenerioribus, & magis infectis. In surculorum  
cacuminibus umbellæ albicant, semine rubrum, rotundum,  
compressum, circulo velut limbo candido circumdatum, Lib. 1. c. 86.

TORDILYVM,

Dodonæi.




Forma.  
Tempus.  
Locus.  
Teneriusculis, in quibus folia pauca, minitius infecta, coriand-  
rinis similia, inferioribus latioribus, & minus incis, su-  
perioribus tenerioribus, & magis infectis. In surculorum  
cacuminibus umbellæ albicant, semine rubrum, rotundum,  
compressum, circulo velut limbo candido circumdatum, Lib. 1. c. 86.  
duplex: alterum enim alteri iungitur, singula scutulis si-  
milis, radix gracilis est, tenera, annua. In hortis seduli her-  
barij colunt. Iulio mense floret, Augusto semen maturum  
profert. Diuersum ab hoc Tordylium Sesele creticum mon-  
strat Lobellius. Hoc, inquit Pena, passim in segetibus Nar-  
bonensis Provinciae & secus vias occurrit, succulosa, hirti-  
ta, rigida, aspera planta, folio rotundiore, ceterisq; um-  
bellis albidis, purpureis, paruis, quibus succedunt semina  
copiosa, circinata, quasi toreumatis elaborata, vnde forte  
nomen peculiare, orbiculata, compressa, ex geminis val-  
uulis, vt ferulae semen constata, clypeoli speciem referen-  
tia, gustu Myrrhidis. Lobellius addit aliud Tordylium si-  
ue Sesele Creticum maius, fruticosius multo, longioribusq;  
foliis & bicubitalibus caulibus in pratis Laterensibus Mon-  
speliensis agri, & Lugdunensis Galliae per fœniscia occur-  
rit. Belgis hortense est. Calidum siccumque secundo or-  
dine. Hoc bibitur ad urinæ difficultatem, inquit Diosco-





*SESELI, Pratense.*  
*Lobellij.*



Lib. 3. c. 23.

*Seseli*  
*Prat.*

*Forma.*



rides, & ad menses ducendos. At succus caulis  
 & seminis adhuc viridis trium obolorum pon-  
 dere potus cum passo dies decem, nephriticos  
 sanat. Radix efficax est ad educenda que in pe-  
 ctore hærent, si cum melle delingatur. Ea-  
 dem Paulus gordyllo attribuit. Tamen alibi ad  
 sugillata Tordylium recipit his verbis. Ad diu-  
 turna sugillata & liuida Tordylii partes duas,  
 terræ sarniæ partem vnam cum melle impone,  
 animaduertens ne locus exulceretur. His ad-  
 dunt Luteriani & Monspelienfes studiosi, in-  
 quit Pena, plantam illam quæ in pratis fre-  
 quentior occurrit, saxifragæ tenuissimæ simi-  
 lis, quam pratense Seseli vocant. Radix illi  
 dauci vel pencedani, foris nigra, odora: caulis  
 bicubitalis, folia sileris montani, minora, an-  
 gustiora, rigidiora, umbella candida, semen  
 Mei, nigrius & maius quàm fœniculi, omnium  
 fœteleon minimè odoratum, eoquæ perparum  
 acre, quamobrem putarunt olim quidam  
 Monspelienfes esse malsiliense Seseli Diosco-  
 ridis.

FERVLA



## FERULA.

## CAP. XXVIII.



**F**erula Græcis, Ferula Latinis nominatur. Quemadmodum autem *Nomina*  
 ἄνηθ' thyrsium, virgultum, bacillum Græcis significat, ita Latinis Pe-  
 rula a ferendo dicta est, quod illius scapi pedamenta fruticibus, &  
 Lib. 3. c. 75.  
 Formæ.  
 senibus baculi ac scipiones essent. Hanc sic breuiter deliniat Dio-  
 scorides, Ferula caule sæpe proferit ternum cubitorum, folia fœniculo similia, lon-  
 gè crassiora & maiora (codices vulgares habent & rectè quidem παχύτερα ὅτι πολὺ  
 ὑπερέχονα. Ruellius conuertit longè asperiora & latiora, perinde ac si legisset παχύ-  
 τερα δὲ πολὺ ὑπερέχονα) qua ab imo caule vulnerata sagapenum efficitur. *Plinius*, Lib. 15. c. 12.  
 Et ferulam, inquit, inter externas dixisse conueniet, arborumque generi adscripsis-  
 se: quoniam quarundam naturæ, sicut distinguemus, lignum omne corticis loco  
 habent, hoc est forinsecus, ligni autem loco fungosam intus medullam, vt sambu-  
 ci: quædam verò inanitatem, vt harundines. Ferula calidis nascitur locis, atque  
 trans maria, geniculatis nodata scapis. Duo eius genera. Nartheca Græci vocant, *Locus.*  
 affurgentem in altitudinem, nartheciam verò semper humilem. A' genibus exeun-  
 tia folia maxima, vt quæque terræ proxima. Caterò natura eadem quæ anetho, &  
 Genera.  
 fructus similis. Nulli fruticum lenitas maior: ob id gestatu facilior baculorū vsum  
 senectuti præbet. Hæc breuiter Plinius, quæ Theophrastus fusiùs explicauit his  
 Lib. 6. hist. cap. 2.  
 verbis. Λεπίον ὑπὲρ νάρθηκος τὴν νάρθηκιν. ἔτε τοῦ αὐτοῦ γένος ἔστιν ἀμφοῖν, διαφέρουσι τε καὶ  
 μέγεθος, ἔτε τοῦ ἑτέρου, ὥσπερ τινὲς φασιν ἢ δὲ οὐ φαίνεται φύσιν ἀμφοῖν ὁμοία, πολλὴν καὶ τὸ  
 μέγεθος. ὁ μὲν γὰρ ἀνάθηθ' γίνεσθαι μέγας σφόδρα. ἢ ὅτι νάρθηκιν μείζονα. μόνον μὲν ὅτι ἀμφοῖν, καὶ  
 γούλαδην. ἀφ' ὧν τὰ τε φύλλα βλαστάνει, καὶ καυλοὶ τινὲς μικροὶ. βλαστάνει δὲ παραλλάξ τὰ  
 φύλλα, λέγον ὅτι παραλλάξ, ὅτι ἐκ ἐκ τῶ αὐτοῦ μέρους τῶν γούλων, ἀλλ' ἐναλλάξ. πρῶτον εἰληφ-  
 ταὶ δὲ τὸν καυλὸν ἐπὶ πολὺ, καθάπερ τὰ τῶ χαλάρου. πολλὴν ἀποκεκλιμένα ταῦτα μέγαν, διὰ  
 τὴν μαλακίαν. Ἐτὸ μέγεθος. μέγα γὰρ τὸ φύλλον, καὶ μαλακόν, ὅτι πολυχυλόν. ὥστε εἶναι ῥι-  
 χώδες. ἔχει δὲ μέγιστα τὰ χαλάρου πρὸς τὴν γῆν, καὶ αἰεὶ καὶ λόγον. ἄλλος δὲ μελλομένης, ἀμφο-  
 ῖν χαρπὸν ὅτι παρόμοιον τῷ ἀνήθῳ, πολλὴν μείζονα. ἐξ αὐτοῦ ὅτι χαλάρου, καὶ ἔχει τινὰς ὁμογενεῖς καυ-  
 λὸς, ἐπὶ αὐτῷ δὲ τὸ τε ἄνθος. Ἐὸ χαρπὸς. ἔχει δὲ καὶ ἄνθος χαρπὸν, καὶ ἐν τοῖς παρακαυλίεσσι δι-  
 ὀλες, καθάπερ τὸ ἀνήθον. ἐπεὶ εἰς καυλὸν δὲ καὶ ἢ βλαστῆσις τῶ ἥρος, πρῶτον μὲν τῶν φύλλων,  
 ἔπειτα τῶ καυλοῦ, καθάπερ τῶν ἄλλων. ῥίζαν δὲ ἔχει βαθεῖαν. ἔτι ὅτι μόνον ῥίζαν. ὁ μὲν οὐκ ἔχει  
 ἄνηθ' τοιοῦτος. Id est, Dicendum de ferula & ferulagine, siue idem est vtriusque ge-  
 nus, & magnitudine duntaxat differant, siue diuersum, vt quidam putant. Perispi-  
 cum est igitur vtriusque naturam similem esse, præterquam magnitudinis ratio-  
 ne, Ferula enim valde grandis assurgit, ferulago humilis. Sed vnicaulis vtraque, &  
 geniculata, ex geniculi folia & cauliculi erumpunt: ac folia alternatim exeunt, di-  
 co alternatim, quod non in eadem geniculorum parte, sed ex aduerso sita sint, cau-  
 lem magna ex parte amplexa, vt in harundine, nisi quod hæc inclinata magis sunt,  
 mollitiei, magnitudinisque causa, est enim folium ferulæ magnum, molle, & mul-  
 tum incisum, vt capillaceum ferè sit, maxima sunt inferiora & terræ proxima, &  
 sic deinceps proportionem, flos est melinus, semen fuscum, anetho simile, sed ma-  
 ius, ferula in cacumine finditur, & cauliculos quosdam habet, in quibus flos & se-  
 men, gerunt autem adnati cauliculi & florem & fructum veluti anethum, annuo  
 caule constat. Vere germinant primùm folia, deinde caulis, vt & cæterorum, pro-  
 fundam agit radicem & singularem. Talis ferula est. Ex his liquet duo ferulæ ge-  
 nera esse, vnum ἀνήθ' alterum νάρθηκιν, quam ferulaginem vertit Gaza. Sunt  
 etiamnum hodie, inquit Pena, duæ in herbariorum hortis huius crassiss, naturæ &  
 similitudinis plantæ, quas idcirco furulagines vocant. Ex videntur tantum dista-  
 re cultura, statura, elegancia, & succi copia, vt nocte fuerint radices aruum aridum,  
 In Ad. fol. 348.  
 In ca. p. 75. lib. 3.  
 alibi,



FERULA, *Math.*In Ad. fol.  
348.NARTHECIVM, *Theophr.**Ferulago Gaze.**Viresc.*  
*Temper.*  
*Lib. 19, c. 9.*

tibus & coeliacis prodesse, & contra viperarum morsus dari in vino, & sanguinis  
 è naribus eruptiones inditam sistere. Semen potum torminosis auxiliari: moue-  
 re & sudores si cum oleo illinatur. Caules si edantur, capitis dolorem facere, mu-  
 ria condiri. Plinius ferulæ duo genera in peregrinis fruticibus diximus. Germen  
 eius

alibi, ferulam ex Matthiolo hic pictam damus, cuius Apulia maximè ferax est, inquit, frequens etiam prouenit in agro Romano, Thyreni maris cõtermino, præsertim apud Centumcellas, & in vniuersis Hetruriz maritimis. E quibus prima tantum germinatione corculum quoddam pastores eximunt, qui luteum induratum referens, quod sub cineribus assatum, prius tamen charta aut linteo conuolutum, deinde pipere & sale conspersum, non modo gustui gratissimus est cibus, sed etiam ad excitandam uenerem valentissimus. Plurima etiam & proceræ, auctore Pena in Gallica prouincia & Narbonensi Gallia, præsertim illis rupibus præruptisque saxis prope subterraneas cryptas, via qua Monspelio Frontignacum itur, itidem in cellis squallidisq; saxorum sinubus, qui soles æstiuos feruidos exceptos totum ferme fouent diem. Quinque cubitorum caulis est, radix magna, recta, & altè in saxorum commissuras hiantes descendens, euulsu difficilis, candida, lacteo pinguiq; succo turgida, odorem vehementem vibrans, folia fœniculo maiora, pinguiora, crassiora, ut & caulis: umbellæ prægrandes anethi, Iunio & Iulio flosculis luteis defluentibus. Semen foliaceum, compressum, oblongum, rotundum, angelicæ ferme, duplo maius. *Næphthov* Theophrasti, ferulago Gaze, in iisdem locis nascitur, in quibus & ferula. Ad hominis altitudinem ea crescit, radice dodrantali, pro magnitudine plantæ totius exigua, & graciliore candida, parum fibrata, gustu subacri, non nihil odorata cum manditur: caule fœniculi, latriato, ramoso, inani, folio fœniculi, ampliore, minore quàm in ferula, ad ramorum exortus prodeunte, alternis nunc ex hac, nunc ex illa parte, gustu subdulci & suauis: flore luteo in umbellis, amaro & subacri, odorato: semine oblongo. Peruenustam plantam Lobellius ostendit Galbaniferam ferulam, quæ orta est in Belgicis hortis, semine copioso, lato, foliaceo, aromatico, reposito Antuerpiæ in galbani lacryma. Tota facie ferulam refert: folia exilia: flosculi in umbellis hilarioribus: radix crassa, succo prægnans. Hæc Lobellius. Scribit Dioscorides ferulæ adhuc viridis medullam potam sanguinem spue-



GALBANIFERA

Ferula, Lobell.



eius in Italia cibus est. Conditur quippe durans, in vrceis, vel anni spatio. Duo eius genera: caules & racemi. Corymbiam hanc vocat, corymbosque quos condiunt. Et alibi, ferula semen simile anetho habet. Quæ ab vno caule diuiditur in cacumine, femina putatur. Caules eduntur decocti, commendanturque musto ac melle, stomacho vtiles. Sin plures sumpti, capitis dolores faciunt. Radix denarij pondere in vini cyathis duobus bibitur aduersus serpentes. Et ipsa radix imponitur. Sic & torminibus medetur. Ex oleo autem & aceto contra fadotes iumodicos, vel in febribus proficit. Succus ferulæ aluum soluit fabæ magnitudine deuoratus. E viridi ferula ramusculus vtilis est ad omnia ea vitia. Ad sanguinem sistendum decem grana seminis bibentur in vino trita, vel medulla. Sunt qui comitialibus morbis dandum putant luna quarta, sexta, septima, ligule mensura. Natura ferularum murænis infestissima est, tactæ siquidem ea moriuntur. Castor radicis succum & oculorum claritati cōferre multum putauit. Vt autem murænis infestissimam esse ferulam scripsit Plinius, sic asinis

Lib. 11. 23.

Lib. 2. 1.

gratisimam, Ferula, inquit, asinis gratisima sunt in pabulo, cæteris verò iumētis præsentaneo veneno, qua de causa id animal Libero patri assignatur, cui & ferula. Galenus eius vires generatim & breuiter sic declarat, ferulæ semen exaltat & attenuat. Caterum medulla adstringentis qualitaris particeps est, quo nomine sanguinem spuentibus & cœliacis conuenit.

Lib. 8. 11.

THAPSIA

CAP. XXIX.



Thapsia Græcis, ita Thapsia Latinis nominatur, Arabibus *Iantum*, *Driz*. Dicta est autē Thapsia quasi Apsia auctore Dioscoride, quod in Thapso eiusdem nominis insula primum inuenta sit. Potuit etiam dici Thapsia, inquit Pena, propter flammæ calorem quem corpori admota inurit, adeoque minus, præsertim aduerso flatu spectanti. Tota natura ferulæ similis est, ita describente Dioscoride, gracilior tamen ipsius caulis est, folia feniculo similia, in cacumine umbellæ singulis furculis insident anetho similes, in quibus flos lotæus, semen latiusculum, ferulæ simile, sed minus, radix intus cædida, foris nigra, magna, crasso cortice, acris. Ex hac vulnerata succus colligitur, vel ex eadem contusa exprimitur, quidam etiam folia simul exprimunt, sed debilior est hic succus. Qui succum colligit stare debet non obuersus vento, aut potius cum dies apricus est, & à vento silet: quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, & nudæ partes pustulas contrahunt. Quare liquidis ceratis adstringentibus nudas partes ante illinere oportet, & ita ad opus accedere. Plinius his consentanea scripsit. Semen ferulæ Thapsiam quidam vocauerunt: decepti eo quoniam ferula sine dubio est Thapsia, sed sui generis, foliis feniculi, inani caule, nec excedente baculi longitudinem. Semen quale ferulæ, radix candida, incisa lacte manat, & contusa succo: nec corticem ab dicant, omnia ea venena. Quippe etiam fodientibus nocet si minima aspires aura, intumescunt corpora, faciēque inuadunt ignes facit: ob id cerato prius illinunt. Matthiolus tradit Thapsiam plurimā nasci in Apulia, præ

Nomina

Lib. 4. fol.

51.

in Ad. fol.

100.

Lib. 4. cap.

Forma.

Lib. 13. c. 22

Cap. 17.

lib. 1.

lia, præ



THAPSIA, *Matthioli.*In cap. 157.  
lib. 4.In Ad. fol.  
350.

Ibid.

Lib. 4. c. 157.  
Vires &  
Temper.THAPSIA *Pena, vera.*

Lib. 13. c. 12.

lia, præsertim Gargano monte, inter permultas alias ferulacei generis plantas, atque etiam in maritimis Hetruriæ, ferulæ adeo similem, vt non nisi à peritis herbariis vna ab altera vix discernatur, spectari etiam hodie in hortis. Sed hæc vulgarior est thapsia Officinarum verior existimata, auctore Pena, & veræ thapsiæ radice non parùm adsimilis. Tamen certum est longius à Dioscoridis descriptione abesse. Est enim foliis potius Carotæ, siue Dauci agrestis quàm ferulæ, ex Italia iandiu hortis Belgicis & Francis vulgaris notitiæ. Genuinam verò hæc depinxit ille, valdè similem toto habitu & viribus ferulæ, tametli vsu multò præstantiore, atque purgatrice vi. In Aquitaniæ macilentioribus montibus, & squallidis inuenit præstantissimus medicus Rondelletius, propè vadum quâ traicitur in Hispaniam, tum ad radices Pyrenæorum, non procul Perpignano vrbe. Crassior est radice cortex, fusco foris colore, intus albido, succoq; multo manat lacteo, gummeo: caulis Petcedani, gracilior quàm ferulæ, folia fœniculo latiora, breuiora, in umbellis semen ferulæ minoris, oblongum, angustius, mōtani Sileris. Huius plantæ vires tum perutiles, tum noxias his verbis explicat Dioscorides. Vim purgandi habent tam cortex radice quàm succus, & lacryma in aqua mulsâ pota. Nam sursum ac deorsum bilem purgât. Dantur radice oboli quatuor cum seminis anethi drachmis tribus: succi oboli tres, lacrymæ obolus vnus, quod amplius assumitur periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit asthmaticis, laterum diuturnis doloribus, sanguinis reiectionibus. At his qui difficulter vomunt in cibis & obsonio exhibetur. Tam radix quàm eius lacryma ex omnibus simili facultate præditis, vel maximè vim habent corporis miscellam transmutandi, vbi quid ex alto attrahere oportet, aut meatuum statum immutare. Vnde alopecias illitus succus, aut radix viridis affricta replet. Sugillata item liuoréque tollit radix trita, aut succus cum pari portione thuris & ceræ. Sed non vltra duas horas sinere oportet, postea aqua marina calida fouere. Delet quoque maculas à sole contractas cum melle illitus succus, lepras tollit, tubercula rumpit cum sulphure perunctus. In diuturnis affectionibus pulmonum, laterum, pedum, articularumque vtiliter illinitur. Valer ad præputia inducenda iis qui non ex circumcisione curti sunt, tumorem excitans, qui cum perfunditur, & pinguibus emollitur, præputij defectum explet. Hæc Dioscorides. Quibus ferè consentiunt quæ scribit Plinius. Quibusdam tamen morbis



morbis auxiliari dicunt medici (radicem thapsiæ sub.) permiscant aliis. Item in alopeciiis, fugilatisq; ac liuentibus, cum verò remedia desint, vt scelera contrectent. Sed ista prætexunt noxio instrumento : tantumque impudentia est , vt venenum artis esse persuadeant. Thapsia est in Africa vehementissima. Quidam caulem incidunt per menses, in hoc disider à Dioscoride, qui radicem tantum incidi scripsit, & in ipsa excavaunt radice, quo succus confluat, arefactumque tollunt. Alij fossiliâ, caulem, radicem tundunt in pila, & succum in caule coactum diuidunt in passillos. Nero Cæsar claritatem ei dedit initio imperij, nocturnis grassationibus conuerberatam faciem illinens sibi cum thure cerâque : & secuto die contra famam cutem sinceram circumferens. Ignem ferulis optimè seruari certum est, easq; in Aegypto præcellere. Et alio in loco, Ad lichenas & thapsiæ radice vinctasq; in Aegypto præcellere. Theophrastus quoque de thapsiæ viribus hæc tradit. ἡ δὲ θάψια τριτάτου μelle. Θεοφράστου περὶ αἰσθητικῆς καὶ ἀνὰ τὴν ἐκείνην φύσιν τὰ περιωμματα ψιὰς ρίζα ἐμελιον. εἰν ὅ τις χεῖραυτῇ, χαθαίρει καὶ ἀνω τὸ κάτω διότι αἱ τὰ περιωμματα ψιὰς ρίζα ἐμελιον. οὐδ' ὅστις χεῖραυτῇ, χαθαίρει καὶ ἀνω τὸ κάτω διότι αἱ τὰ περιωμματα ψιὰς ρίζα ἐμελιον. οὐδ' ὅστις χεῖραυτῇ, χαθαίρει καὶ ἀνω τὸ κάτω διότι αἱ τὰ περιωμματα ψιὰς ρίζα ἐμελιον.

Quæ sic conuertit Gaza. Thapsiæ radix vomitoria est, & si quis continuit tam superius quàm inferius purgat. Ad hæc liuida tollere potest. Suppurationes tamen alias exalbidas facit (Græcè legendum, ὑπώπια τ' ἄλλα ἐκλιδυγ, Id est, fugillata alia alba reddit), Succus eius validior est, & quidem tam superius quam inferius purgat. Nullus feminis vsus. Nascitur tum alibi, tum in terra Attica, in qua pecudes incolæ eam non tangunt, peregrinae verò depascunt, & aut alijs soluitur, aut intereunt. Galenus breuius & accuratius de iisdem scripsit. Thapsia, inquit, acrem habet, ac valenter excalfacientem facultatem cum humiditate cōiunctam, quamobrem ex alto violenter extrahit, & quod extrahit, digerit. Verum plusculum ad ea efficienda tempus postulat, vt quæ larga humiditate impleta est, cuius etiam vitio fit vt celeriter corrumpatur. Merito desit, inquit Petrus Pe. ex istius succo purgandi antiquorum consuetudo, vt quò multum noceatur præcipuis visceribus, & tormina dira interdum excitentur. Idem tamen ex triplici Officina rum turbith, id quod cineritum dicitur à colore, vulgaris thapsiæ radicem esse censet.

Lib. 26. c. 4.

Lib. 9. hist.  
cap. 22.

Lib. 6. sim.

In Ad. fol.  
350.

*PS EVD OCOSTVS.*

C A P. X X X.

**S**CRIBIT Matthiolus esse impostores qui ex Gargaro Italiae monte quotannis deferunt pseudocosti cuiusdam radices amari saporis, quæ facie quadantenus rhodiam radicem representant, easque pro legitimo costo pharmacopœis rei herbariæ ignaris vendunt, easque pro legitima domestica maioribus, densioribus, crispis & asperioribus, humi accubantibus, caule rotundo, fœniculaceo, geniculato, bicubitali, è geniculis ramuli oriuntur in vniuerso caule, in quorum summitatibus umbellæ spectantur melino colore, nudo semine, & subrotundo. Radice nititur vegeta, crasso cortice carnosore vestita, colore cinereo splendente. Commendant hanc herbarij qui ex Apulia deuehant, ad omnes capitis neruorumque affectus frigidos, ad pectoris vitia, ventriculi cruciatus, viscerum omnium obstructions, & ad renum, vesicæ, & veteri morbos. Quare diuturno capitis dolore affectis, vertiginosis comitialibus, stupidis, veteriosis, conuulsis, resolutis, asthmaticis, tussientibus, ictericis, hydropicis plurimum conferre pseudocosti radicem affirmant. Præterea flatus expellere, vermes necare, viinas & calculos eiicere, menses, secundas, & partus educere, siue bibatur ipsa radix, siue decoctum eius, aut si in fomentis.

In cap. 15.  
lib. 1.

*Forma.*

S s



In Ad. fol.  
34. 18.



Nomina

Lib. 2. c. 84.

Forma.

Lib. 2. c. 84.

In Ad. fol.  
34.

Lib. 2. c. 84.

Ca. 8. hist.

balneis; aut decoctionibus addatur. Praferunt eandem ad coli cruciatus, decocto eius clystere infuso, & aduersus articulorum morbos, & coxendicum dolores. Nam cum amara sit, nonnihil odorata, & acrimonia quadam praedita, hæc omnia præstare posse credibile est. Hanc nouam & perelegantem plantam addit Pena, ab herbariis Illyricis sæpius ostensam, quæ nihil Costo dignum habet, sed potius facie est elaphobosci. Costum Illyricum hodie vocant. Folia sunt lineamentis Pastinacæ maioris, terram ferme radentia, & in ramulis caulem sesquicubitalem, feniculaceum amplexa, umbellæ summæ in congerie ramulorum, lactei flores sunt, radix pollicem crassa, admodum amara.


MEVM CAP. XXXI.

**M**eu & Meum Græcis, Latinis Meum similiter dicitur, Arabibus *Me*, Officinis *Meu*, quod describitur à Dioscoride caule & foliis anetho simile esse, sed crassius anetho, ad cubitos duos assurgens, sparsis tenuibus radicibus, obliquis & rectis, longis, odoratis, linguam excalfacientibus. In Hispania & Macedonia plurimum gignitur. Plinius, *Meu*, inquit, in Italia non nisi à medicis feritur, & iis admodum patcis. Duo genera eius. Nobilius Athamanticum vocant, illi tanquam ab Athamante inuentum, hi quoniam laudatissimum in Athamante reperitur, foliis aniso simile (corrupta hæc videtur lectio, anetho enim legendum pro aniso) & caule aliquando bicubitali, radicibus multis & obnigris, quibusdam altissimis. Mei veri plurimas plantas sæpiissime se vidisse affirmat Pena in Germaniæ, Galliæ, Italiæ, Hispaniæq; locis alpinis. Radix est odore suauis, spica, vel angelicæ, caule & foliis anethi, umbellæ candidæ. Iunio & Iulio fleret, semen hippomarathri, odoratum. Eadem reperitur in celsissimis montium iugis, sterilibus Seuenæ, loco præsertim cui nomen Gallicè *Lesperon*, Latine Calcar, monticulis Siestre nuncupata vernaculo nomine, vti Platearij & Pandeçarij auo, cui nulla doctorum omnium suffragio deest nota veri Mei Dioscoridis. Hanc Dodonæus perperam libanotidis primum genus facit, *Beoruurtz* Germanis dictam, propter capillatam radicem, inquit Fuchsius, aut quia vteri dolosem qui iisdem *Bernuter* appellatur, sanat. Matthiolus in postremis commentariis eandem plantam herbariorum quorundam diligentia repertam esse scripsit, quæ legitimum Meum refert, quibus assentitur, sed inuitus, quod huiusce plantæ radices odorem non usque adeo gratum spirent, sed quadantenus grauiter oleant, nec tenues sunt, ut vult Dioscorides, nec folia anetho similia, sed potius asparago. Hanc Apuli Imperatricem vocant. Hæc Matthiolus. At Imperatricis nomine, inquit Pena, ubiq; ferme locorum ignara herbarum plebs solita est alicuius incognitæ plantæ eximium & gratum odorem & vires insignes signare. Sic enim vulgò etiam Angelicam Imperatricem vocant: alioqui angelicæ aut Imperatoricæ cum Meo nihil est affinitatis, nisi odoris, qui in Meo perinde iucundus est. Et sunt folia situ & similitudine anethi, non asparagi, ut asserit, cui etiam si similia essent, tamen asparagum ipsemet feniculo assimilat,



MEVM, *Math.*

MEVM, *alterum Spuriū  
Italicum, Lobel.*



asimilat, & anethum adeò simile Fœniculo suo capite asserit, vt plerumque col-  
ligentes fallat. Idem Matthiolus scribit in secunda cōmentariorum editione plan-  
tam secundo loco appictam ( eius tamen pictura in omnibus editionibus omissa  
fuit) à quibusdā pro Meo vsurpari, quod magis Anethum quàm altera referat, quo-  
rum sententiam nō improbat, quia priori po-  
tius Asparagi quàm Anethi folia insunt. Hanc

*Meum  
aliud.*

MEVM, *Aliud.*



plātam cuius picturam à Matthiolo diximus  
omissam fuisse, ex Lobellio hīc exhibemus, quæ  
superiori Meo, inquit ille, facie non est absi-  
milis, sed folia, caules cubitales, umbellæ, cras-  
siora & habitiora, subuirosi odoris. Radix  
item maior, foris pulla, Peucedani facie & con-  
cretionem, terri & iniucundi cū odoris, tum  
saporis. Meum spurium Italicum vocat Lobel-  
lius. Sunt herbarij qui Meum aliud hīc depi-  
ctum pro genuino habeant, quod in Allobro-  
gum & Sequanorum montibus frigidissimis &  
altissimis nascitur, radice dimidio pede lon-  
giore, foris nigra, dauci cretici modo, intus cā-  
dida, brachiata, odorata: cauliculis multis, ner-  
uosus instar fœniculi, tres aut summū quatuor  
digitos altis, foliis breuibus, capillaceis, fœnicu-  
lo similibus, flore candido in umbellis densis,  
semine minutissimo, amaro & suauiter olente.  
Radices Mei, auctore Dioscoride, coctæ in a-  
qua vel tritæ citra coctionem & potæ præclu-  
sorum renum, & vesicæ vitia mitigant. Urinæ

*Locus.*

*Forma.*

*Ibid.*

*Vires &  
Temper.*



difficultati subueniunt, stomachi inflationibus, torminibus, vteri affectibus, articu-  
lorum doloribus. Pectoris fluxionibus trita cum melle in eclegmate auxiliatur,  
sanguinem pellunt per menses deflexionibus decocta. Infantium publi illita vri-  
nas mouent. Quod si plus quam deceat ex his bibatur, capitis dolorem inducunt.  
Plinius eundem vsum medicum docet, sed is quoque corruptus est: sic enim legi-  
tur in vulgatis exemplaribus. Ciet vrinam in aqua potum, radice trita vel decocta.  
Inflationes stomachi mirè discutit, item tormina, & vesicæ vitia, vuluarumque ar-  
ticulis cum melle, infantibus cum apio illitum imo ventri vrinæ mouet. Qui sic  
integer legi debet, vuluarumque, & dolentibus articulis prodest. Thoracis item  
fluxionibus cū melle, infantibus cum apio, &c. Mei radices ait Galenus, sunt cali-  
dæ tertio ordine, siccæ secundo, quare vrinam mensq; ciete volentes hoc vtun-  
tur pharmaco. Sed si pluscūlū sumatur, capitis dolorem mouet, vtpote cum plu-  
scūlū sit calidum quā siccū, quippe cū humiditatem crudiūscūlū etiam-  
num & flatuosā caliditatem ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat lædātque.

## MYRRHIS.

## CAP. XXXII.

Nomina  
Lib. 4. c. 111  
Forma.

Lib. 24. c. 16.

Lib. 26. c. 11

In cap. 111.  
lib. 4.



Myrrhis vel *myrrha* vocatur, Latinis Myrrhis, recētiōribus cicutaria dici-  
tur, quod cicutæ simillima sit. Nam caule & foliis cicutam refert, vt  
scribit Dioscorides, radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo  
non insuauis. Plinius eadem ferè tradit. Myrrhis quam alij Smyrni-  
zulam, alij Myrrham vocant, simillima est cicutæ caule, foliisque, & flore, minor  
tamen & exilior, cibo non insuauis. Alio in loco cum Geranio odore confundit  
his verbis Geranium aliqui myrrhin, alij merthrida appellant. Similis est cicutæ,  
foliis minutioribus, & caule breuiori, rotundo, saporis & odoris iucundi. Marthio

## MYRRHIS, Matthioli.

Cap. 198 hi  
flor.




In Ad. fol.  
2. 13.

lus scribit nasci plantam in multis Italiæ locis  
cicutæ specie, minorem tamen, minimèque  
grauolentem, cicutariam vocatā, à quibusdam  
pro legitima myrrhide censeri. Alios pro myr-  
rhide angelicam vsurpare, alios, vt Manardum,  
illud oleris genus, quod cerefolium vocant.  
Tandem concludit, si myrrhis in Italia proue-  
niat, nullam sese offerre plantam, quæ propius  
illa referat quam hæc cuius effigie hîc damus.  
Fuchsius eam myrrhidem esse censet, quæ re-  
centioribus, vt diximus, Cicutaria, Gallis *Ci-  
câtare*, & *Perfil d'asne*, Germanis *Vuldercoffel*,  
Belgis *Vildekeruel*, id est, siluestre cerefolium  
nūcupatur. Est enim foliis & caule cicutæ qua-  
damtenus similis, folia minutissimè incisa sunt  
quandoque, albis maculis signata, caules rotun-  
di, bipedales aut tripedales, in quorum cacu-  
minibus umbellæ rotundæ, & in iis flores can-  
didi, semen magnum & longum, radix subest  
rotunda, longa, gustu ferè pastinacæ. Tota her-  
ba & prima præsertim folia breui quadam la-  
nugine vestiuntur, suntque & odore & sapore  
cerefolio proxima. Pæssim in hortis & pratis  
nonnullis prouenit. Maio mense, loca in quibus prouenit, huius floribus quasi  
candescant. His assentitur Pena scribens odoratam hanc siue salubrem & esculentam  
posse vocari cicutam, quam myrrhidem, siue myrrham, propter suaueolentiam  
quiddam



MYRRHIS, *Fuchsj.*

MYRRHIS *Altera parua, Lob.*



quiddam myrrhæ resipientem dixerunt. Nec hæc perinde frequens aut procera occurrit, sed rarior, & in pratis vel graminæosis marginibus, etiã olitoribus ad vesendum, in Belgio multa colitur & esitatur in iusculis cerefolij vice, cuius nomen

MYRRHIS *Lappa,*  
*Dalechampi.*



apud Germanos asciuit, vt dictum est, quod odore saporisq; suauitate cerefolium imitatur, etiam facultatibus diureticis: facie verò est cicutæ, albicantibus ramis & foliis tenella hirsutæ, pastinacam satiuam aut agrestem referente, radix prægrandis, altè depacta, proluxa, nec facilis euulsu, ferulæ, aut pastinacæ esculentæ, quam sapore & odore, sed magis medicato, & ad smyrnium accedente representat, semen admodum longum, cerefolij duplò maius, striatū, angulosum, fuscum, odorum. Lobellius Myrrhidem alteram paruam ostendit, quæ Daucoides minor est cordi Cicutariæ odore siue Myrrhidis affinis admodum foliis & ramosis umbellis minoribus, delicatoribus tamē semine oblongo, Dauci Cretici, exiliore, non hirsuto, nec ita dissimili sapore. In Geneuæ & Salenæ vicinis montibus reperitur. Hæc Pena. Radix myrrhidis auctore Dioscoride, pota cum vino punctis à phalangiis auxiliatur. Purgat menstrua & secundas educit. Eadem cocta tabidis vtiliter in sorbitionibus exhibetur. Aiunt eandem in pestilentialibus cōstitutionibus bis tēve die potam in vino, à morbo seruare incolumes. Plinius eadē & quædam alia addit. Ciet

*Vires &*  
*Temper.*  
*Lib. 4. c. 111.*

menstrua & partus cum vino. Aiunt quoq; eandem potam in pestilentia salutarem

*Lib. 24. c. 16*



Lib. 7. fin.

esse. Subuenit & phthificis in sorbitione. Auiditatem cibi facit. Phalangiorū morsus restringit. Vlcera quæq; in facie aut capite succus eius in aquā triduo maceratus sanat. Myrrhis, inquit Galen. radicem habet odoris iucundi & dulcem, quæq; mens moueat, tum ea quæ thoracē ac pulmonem degrauant purget. Itaq; ex secundo ordine fuerit calfacientium admista quadā partium tenuitate. Dalechamphio Myrrhis lappa nominatur ea herba, quæ in frumentariis agris, pingui vliginosoq; solo nascitur, radice candida, apio hortensi simili, cum manditur: suauiter olente, modice fibrata, foliis coriandri aut caucalidis, plerumq; latioribus, caule terete, cubitali, nonnunquam breuiore, læui, flore in umbella candido, suis flosculorum fertis velut continuata, non vt in fœniculo dispersa, sambuco palustri, quem ille ob fragilem molliem Thraupalum Theophr. esse putat, simillima, inæqualiter flores edente: nam qui exteriorem umbellæ partem occupant, panduntur & explicantur, compressis reliquis in medio iacentibus, fructum fert rotundum, exigua clauæ nō dissimilem, instar pilularū platani spinosum, & cum inaruit asperitate sua pratereuntium vestibus adhærescentem, flos tritus myrrhæ odorem validum ac iucundum naribus afflat, huic plantæ peculiarem, quam ob causam myrrham vocant. Hunc florē saccharo conditum rosarū violarumq; modo Rondeletius sæuiente peste dabat, quotidie ieiunis iuglādis magnitudine prospero successu, sēminē quoq; ex vtero suffocatē eo remedio statim reuocantur. Suppressi virginū menses, ac propterea languidarū ac pallidarum eodem remedio aliquot diebus manē sumpto ciuntur.

## LAPPA BOARIA. CAP. XXXIII.

Lib. 26. c. 11

Lib. 21. c. 17.

Lib. 7. hist. cap. 14.



ANC plantam herbarij lappam boariam esse volunt à Plinio memoratam, hac ratione ducti quod huius fructus vestibus adhæreat, quemadmodū aparines, quam lappā vertit Plinius, quo loco hæc ex Theophr. interpretatur. Notabile & in lappa quæ adhærescit, quoniam in ipsa flos nascitur nō euidēs, sed intus occultus, & intra se germinat velut

LAPPA BOARIA,  
Plinij.

Forma.

bus inhærescente, semine nigro, ad fructus figuram formato, gracili.

animalia quæ in se pariunt. Quæ sic Theophrastus. Ἰδὼν δὲ τὸ περὶ τὴν ἀπαρίνην, ἢ τῶν μελίων ἀντέχειν διὰ τὴν σαχύτητα, & ἐπὶ δυσσαφείρων ἐν τούτῳ γὰρ ἐγγίνεσθαι τῷ τραχεῖ τὸ ἄνθος, οὐ ὡρμῶν, ἀλλ' ἐκ πόρων, ἀλλ' ἐν ἐσθλῷ πετρήμενον, ἢ σπερμιόγονον, ὥστε παρόμοιον εἶναι τὸ συμβαῖνον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν γαλέων & κρηνῶν (corrupte κρηνῶν pro ἐχιδνῶν) ἐκ τῆς τε γὰρ ἐν ἐσθλοῖς ὡτοκοήσεως ζωογονεῖ. & αὐτὴ τὸ ἄνθος ἐν ἐσθλῷ καλεῖσθαι, καὶ πέτρεα καρποδοχεῖ. Id est, Propiū & hoc est Aparinæ, quæ asperitate sua vestibus adhærescit, vt difficile auellatur, flos enim in eo quod asperum est, nascitur, nō exiens, neque euidens, sed intus maturescens & semen pariens, vt illi simile sit quod galeis & viperis euenit. Illa enim cum oua intra se pepererint, animalia gignunt. Et hæc florem in se cōtinens cōcoquensq; fructum deinde parit. Nascitur hæc herba in agris pinguibus & stercoratis, radice apio hortensi non dissimili, odorata cum manditur, caule palmū alto, foliis coriandri, per obliquum valde & crebro incisfis, flore in umbella ex albo & subluteo subrubescente, fructu oblongo, spinoso, pratereuntium vestibus inhærescente, semine nigro, ad fructus figuram formato, gracili.

LIBA







foliis. Idem Dioscorides priorem frugiferam folia fœniculi habere tradit, huic alteram frugiferam & sterilem in omnibus similes. Theophrastus sterilem folia habere lactuæ amaræ similia, sed candidiora & asperiora, radicem breuem. Primam

Ca. 72. li. 3.

Dioscoridis fertilem Libanotidem ex Matthiolo hîc pictam damus, quam Vene-

*LIBANOTIS, siue Ros-*  
*marinum, Matth.*

Lib. 2. c. 84.



*CACHRYS Verior,*  
*Libanotis Galeni.*



Li. 2. c. 84.

Ca. 85. hist.  
Ibidem.

milibus, maioribus tamen, latioribus, & carnosioribus. In caulium cacumine umbellæ flores candidos ferunt, deinde semē odoratum, latiusculum, ferē angelicæ: radix foris nigricat, intus candicat, superiore parte capillata, resinam aut thus redolens. Est Lobellio Libanotis minor. Idem Dodonæus Theophrasti Libanotidē frugiferam

tiis se vidisse ait, quæq; satis frequens nascitur in agro Goritienfi suprâ Salicanum in monte Gargaro. Alias duas neque depinxit, neque descripsit. Extot Ferulaceis, quæ vulgò Libanotides putantur, nullam Pena arbitratu melius conuenire descriptioni, ea quâ Patavinus hortus olim habuit, caule quinum & senum interdum cubitorum, fœniculi aut ferulæ nitidum, obscurè virentem, alis multis diuisum, è nodosis geniculis exeuntibus: foliis crebris, fœniculi crassioribus, Cotulæ maioribus, aversa parte in viridi cæsiis, umbellis per æstatem latioribus, ferulæ aut Thapsiæ: floribus luteis, semine fraxini, foliaceo, oblongiore quâ ferulæ, & cucumeris semine maiore, cōpressiore, striato, aceroso, resinaceo: thuris odore dum friatur, dum manditur os Rosmære & thuris sapore complente, acriore: reliqua planta tenera, calidiuscula, sed nō ingrato oleraceo Smyrni gustu, quo facilè dignoscitur à ferula: alioqui lacte turget vt ferula, sed candidiore & feruido minùs, aut graui odore, imo potius odorato. Est potius, inquit Lobellius, Rosmarinum alterum ferulaceum Dioscoridis. Cachrys verior semine est tereti, oblongo, nucleo pini subpari, bipartito ferulæ ritu, gustu aromatico selseli Æthiopici resinaceo, caule cubitum & sesquicubitū æquante. Folia fœniculo crassiora, pallide virentia. Quidam Selseli Malsiliensē statuerunt: & sanè facultates respondent, vt & Rosmarino fecundo, cuius semen Cachrys dicitur, & appositè substitui possunt. Belgis hortense est. Hæc Lobellius. Dodonæus primū Libanotidis genus id esse perperam existimauit, quod Meum esse paulò ante ostēdimus, quodq; Fuchsius Daucū Creticū Dioscoridis esse credit. Secundum Libanotidis genus Dodonæus id depinxit, quod Fuchsius tertium Dauci genus facit, Germani Schunartz hirtzuurtz, idest, radicem ceruinam nigram vocant, descripsitq; his ferè verbis. Caule est procero, nodoso velut fœniculi, foliis cerefolio, aut cicutæ non ab-

Li. 2. ca. 84.



LIBANOTIS II. Dod.

Dauci III. Fuchf.



frugiferam hanc exhibuit, quam diximus à Matthiolo pro Sefeli Æthiopico priore loco depictam. Caulem fert rectum, inquit Dodoneus, geniculatum folia apij palustris, maiora, flores in umbellis sicut in supradictis semen longum, crassum, asperum, acre, radicem crassam, spissam, candidam, summa parte villosam, thuris aut resinæ odore. A qua sententia haud valdè alienus est Pena. Hæc scribens. Non multum videtur abesse à Theophrasti Libanotide

In Ad. fol.

313.

planta foliis hipposelini, paucioribus, parum in ambitu serratis, semine in umbella foliaceo, lato, oblongo, odore & sapore angelicæ, radice ferulæ, quæ comam promittit villosam, furcam, Peucedani fermè vel Dauci, alba intus, foris pulla, odorata, medicata, fermè filuestris angelicæ. Ea Dauci alterum genus est Fuchfio, quæ Germanis dicitur *Veiszhirtzuurtz*, idest, radix ceruina alba. Libanotis Theophrasti Lobellio. Sterilis Libanotis Theophrasti foliis lactucæ filuestris, orba caule, flore, & semine vix cuiquam hodie nota. Aliam Libanotidem Theophrasti maiorem monstrat Lobellius, fo-

liis magis carnosus, rotundioribus, amplioribus, nitetibus, semine cristato: cetera similia & reuera eadem superiori. Hæc secundū est Ligusticū Matthioli. Herbarij quidam Libanotidem aliam quam minimam vocant, statuent, hic depictam, quæ iisdem in montibus & locis in quibus thlaspi montanum, prouenit, radice crassa,

LIBANOTIS III.

Dodonei.

DAUCI Alterum

genus, Fuchf.



in multas





*Vires*  
*Temper.*

Li. 24. c. 11.

Li. 7. simpl.

in multas partes diuisa candicāte, supernè capillata, odorata, thus redolente, foliis circa radicē densis, humi stratis, tenuibus, fœniculaceis, paucis in caulibus, tribus aut quatuor, lœuibus, palmū altis, per interualla nonnihil foliosis, flore in umbella candido, semine exiguo, suauiter olente, acri. De istarum plantarum viribus variis & eximiis quibus quæq; partes præditæ sunt, auctores hæc tradunt, ac primū Dioscorides. Trita omnium herba, inquit, & imposita cōmuniter hæmorrhoidas sistit, sedis inflammationes & condylomata mitigat: strumas concoquit, & abscessus, qui ad maturationem ægrè perducuntur. Siccæ radices cum melle vlcera purgant, torminibus medentur, contra serpētium morsus cōueniunt cum vino potæ, menses & vrinas cient. Discurtiunt & veteres tumores impositæ. Tam radices quæ herbæ succus cum melle mixtus & illitus visum exacuit. Semen potum eadē præstat. Auxiliatur comitialibus & antiquis thoracis affectibus: regio item morbo, si cum pipere & vino datur: sudores mouet cum oleo perunctum. Confert & ruptis, conuulsis, podagrisq; tritum impositum cum loliacea farina & aceto. Vitilignes quoque deterget permixtum cum aceto acerrimo. Semine in potionibus vtendū est eius Libanotidis quæ cachryn non fert: acre enim illud est, & arteriam exasperat. Eundem vsum medicum Plinius docet his verbis. Radix vulnera sanat viridis imposita, & sedis procidentia, condylomata, & hæmorrhoidas. Succus & fruticis & radicis morbum regium, & ea quæ repurganda sunt. Oculorum aciem exacuit. Semen ad vetera pectoris vitia datur potui: & ad vuluas cum vino & pipere. Menses adiuuat. Podagris illinitur cum ærina farina: purgat & lentigines, & quæ ex-calfacienda sunt, aut cum sudor quærendus, illitum: item conuulsis. Auget & lac in vino potum: item radix. Ipsa herba strumis cum aceto illinitur: ad tussim cum melle prodest. Galenus tres Libanotides esse scribit, vnam sterilem, duas fructum ferentes, omnes verò eiusdem facultatis emollientis & digerentis. Succum tum radicis tum herbæ mixtum melli, obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine emendare. Cachrys semen vim habet calfaciendi & vehementer exsiccati, anctore



anctore Dioscoride: quare ineguat is commodè admiscetur. Contra oculorū flui-  
xiones capiti illinitur, & tertio die defricatur. Dicitur autem canchrys quod cum  
vrentis sit facultatis, similera inarit escharam curiatque pilula canchrys: ita enim  
vocat pilula inquit Plinius, in medicina vrendi vim habens. Estigitur nomen  
id multis commune, id quod & testatur Plinius scribens, Cachrys multa genera  
habet, ut diximus, Sed hæc quæ ex rore supradicto nascitur, si fricetur, resinosa  
est. Aduersatur venenis & venenatis præterquam anguib. Sudorem mouet, tor-  
mina, discunt, lactis vbertatem facit. Hæc Plinius: qui cum dixit cachryn resino-  
sam esse, vetit vocem *πυλιν* apud Dioscoridem, ut & paulò ante cum dixit semē  
resinaceum, quod de odore intelligendum est. Theophrastus fructifera Libano-  
tidis radicem vtilem esse tradit ad vlcera, & ad mentes ducendos potam in vino  
austero nigro. Semen ad vrina stillicidia, & ad aures & argema, & lippitudines, &  
ut lac mulieribus inducat. At sterilis radix purgat, sursum ac deorsum. Quod enim  
ad germen est purgat sursum quod ad terram, deorsum. Prohibet etiam vermes  
vellibus interposita.

Ibidem.

Lib. 16. c. 8.

Li. 24. c. 11.

Lib. 9. hist.  
ca. 14.

## CRITHMVM MATTHIOLI. CAP. XXXV.

**C** RITHMUM & Κριθμὸν Græcis, Latinis Crithmum & Crithamum, vel  
Crethmum & Crethamum, & Batis Plinio. Fruticosa est herbula, ut  
depinxit Dioscorides, quamvis herbula nomen parū conueniat cu-  
bitali plantæ, ac fruticosa: vndique foliola, cubiti fere altitudine, na-  
scens in petrosis & maritimis locis, foliis referta pinguibus & subalbicantibus,  
portulacæ foliis similibus, latioribus tamen & longioribus (vetus codex habet nō  
*ωχρὸς*, sed *ωχρὸς*, id est, crassioribus: quæ lectio maxime conuenire videtur  
fœniculo marino, si id Crithmum est, quia folia habet præpinguia, albicantia, &  
portulacæ foliis similia, multò tamen crassiora, strictiora & longiora, falso gustu.  
Flores habet albos, & fructum ceu Rosmarini, odoratum, mollem, rotundum, qui  
siccatu rumpitur, & intus semen habet, ceu granū tritici (veteres enim & recentes  
Dioscor. interpretes *ὡς πυρὸν* legunt, conuerterunt enim ut triticū & tritici mo-  
do, & tritici figura. Plinius tamen *πυρὸν* legisse videtur, conuertit enim semen  
feruens. Et si quis *πυρὸν* legat, ut fere Græca exemplaria habent, & fuluum semen  
accipiat, etiam sic ad tritici semen similitudo aliqua fuerit: quanquam ad tritici  
fracti candorem referendam eam similitudinem pleriq; putant, ex eo quod Pli-  
nius intus nucleum candidum dixit. Radices digitali crassitudine tres aut quatuor,  
odoratas, iucundas. Eadem est & apud Plinium & clarissima huius pictura. Eadem  
vis Crethmo ab Hippocrate admodum laudato. Est autem inter eas quæ eduntur  
siluestrium herbarum. Hanc certe apud Callimachum apponit rustica illa hecale:  
speciesq; eius est Batis hortensis. Caulis vnus palmum altus, semen feruens, odora-  
tum, ceu Libanotidis, rotundum, siccatu rumpitur: habet intus nucleum candi-  
dum, quem aliqui cachryn vocant. Folia pingua albicant veluti oliuæ, crassiora  
& falso gustu: radices digiti crassitudine tres aut quatuor. Nascitur in maritimis  
petrosis. Istud Crithmum Matthioli, Dodonæi, & plerorumq; aliorum sententia  
planta ea esse cõsetur, quæ Officinis Creta marina, voce ex Crethmo corrupta di-  
citur, Gallis *Crete marine*, *Bacille*, & *Fenouil marin*, Italis *Finochio marino*, & *Herba*  
*di Sanpiero*, Germanis *Bacillen*, Hispanis *Perrexil de la mar*, Emperum Rondelletij.  
A quibus dissentit Pena: nam si attentius expendamus herbarum descriptiones ab  
antiquis traditas, videbimus huc fruticosam dici plantam à Dioscoride, foliis pin-  
guibus, longioribus, & latioribus quàm portulacæ, albicantibus, salis, &c. Cui de-  
scriptioni portulaca marina melius congruit quàm fœniculus marinus, cunctis  
semè herbariis hodie Crithmum putatum. Verùm fœniculus marinus neutiquā  
portulacæ

Nomina

Li. 2. c. 22.

Forma.

Cor. Emb.  
in lib. 2.

Lib. 16. c. 8.



CRITHMVM *Matth.**Batis Plinij.**Vires  
Temper.*

Lib. 26. c. 8.

Li. 7. simpl.

Servatur etiam in muria præcipui usus ad stranguriam folio, vel caule, vel radice ex vino. Colorem quoque corporis gratiorem facit: verum æquo largior inflationes. Aluum soluit decocto, urinamque, & à renibus humorem trahit. Galenus Crithmum scribit falsum esse cum paucula amaritudine: quamobrem vim eius esse exsiccatoriam & absterforiam: utramque tamen in eo imbecilliorum esse quam in amaris. De duobus aliis Crithmi generibus à Matthiolo traditis diximus in libro de Maritimis.

## STRATIOTES MILLEFOLIA. CAP. XXXVI.

*Nomina*

ΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ὀχλιδόφυλλος Græcis, Stratiotes millefolia, & militaris millefolia Latinis dicitur, Gallis *L'herbe militaire* à *Millefeuilles*. Stratiotes verò Græcis idest, militaris dicta est, quod vulnera ferro sanet, atque ideo in militia & castris multus eius usus sit. Dioscorides aliquot nomine affines

*Genera*  
Cap. 4.

Li. 4. ca. 98.

*Forma.*

plantas militares, siue millefolias constituit. De Stratiote militari aquatico diximus nostra, quam describit ille fruticem esse paruum, palmi altitudine, aut etiam maiorem, folia habentem pennis auicularum similia. Alij pro *veσt' ὀλερῶν*, legunt *veσ' τῆ ὀλερῶν*. Idest, recenti ac tenellæ filici. Sunt autem exortus foliorum valde breues & fissi: maximè verò similia sunt folia breuitate & asperitate cumino agresti, atque etiam breuiora: umbella huius densior est ac plenior: in cacumine etiam festucas paruas habet, in quibus umbellæ sunt anethi modo, flores parui, albi. Nascitur in agris asperis, & maximè circa semitas. Hanc Stratiotem terrestrem Matthiolus & periti alij herbarij plantam esse censent, quæ Officinis & vulgò Millefolium nuncupatur, Gallis *Millefeuille*, Germanis *Garben*, & *Tausenblatt*, & *Scaffripp*, longè diuersam à nigriophyllo de quo paulò post dicemus. Dodonæus Achilleæ, Fuchsius Stratiotæ millefoliæ nomine exhibuit. Matthiolus scribit huius Millefolij genus quoddam nasci in agro Goritiensi, Saluatino monte, quod superius vincit magnitudine, sicut ex effigie hîc picta videre licet, ut meritò Millefolium maius appelleret. *Pena*

Ca. 98. li. 4.

Li. 4. ca. 100.

Cap. 277.

hist.

Ibidem.



STRATIOTES *Mill. folia*  
*maior, Matth.*



STRATIOTES *Millefolia*  
*minor, Matth.*



siluestris, & fœniculi. Alium Stratiotem aquaticum ἀδωδῶν pingit Dodon. cap. 99. lib. 1. & nos in lib. de palustribus, vt diximus. Aliud est nomine quidem affine, sed re diuersum Millefolium, dictum Græcis μυριόφυλλον, à numero decem milliū foliorum, & μαρὰ θρόνον teste Dioscoride, idest fœniculifolium, quod ita ab eodem delineatur. Cauliculus est singularis, tener, vnica nixus radice, circa quam

Pena priorem Millefoliam, Stratiotē, siue Millefoliam terrestrem Dioscoridis cū multis esse credit, quæ sideritidi Achilleæ tum figura, tum effectū valdè affinis est, inquit, tamen terrestris Stratiotes minor est, furculis rectis, foliis verò alatis, pennatisve inter filicē, atque filipendulā, sed minoribus multò, & quā Achilleæ breuioribus. Umbellæ ex disparibus ortu furculis, gracilibus circinantur atque cōstantur, plurimūm & passim pratorum & aruorum marginibus candidæ: sed præter hæc etiam purpurascētes, & luteo aspectu micantes umbellas in Narbonensis Gallia montosis, squallidis, editis, sed æstuosis se inuenisse affirmat, & ad Magdalenæ saxum specum prouinciæ Gallia, & Italia Genuensis asperis, vbi cinereo colore & lanugine pubet tota. Idem Pena ingeniosè admodum subodoratus est mutilam, aut depravatam fuisse capitis de Stratiote millefolio lectionem, qua Dioscorides modo folia Stratiotis millefolij pennis auicularū comparat, modo foliis cumini siluestris, suspicatusq; est Stratioten Millefolium, à fluuiatili Aëizoeide diuersum duplicem hīc proponi ex confusa vel anticipiti descriptione, nempe vnum terrestre, filicis folio, & alterum aquaticū, cumini siluestris, duabus fortè plantis vnam in descriptionem congestis. Quamobrem cum diligentius perpendisset, tandem visum illi fuit hanc repetitā foliorum Stratiotis myriophylli cum cumino siluestri collationē, aptius nulli quadrare posse, quā alteri Stratioti myriophyllo, in aquis nascenti, eiusdem cum terrestri speciei & figuræ, cuius folia quā plurima à medio ad imum scitè exprimunt cuminum siluestre, aut coriandrū: superiora verò sunt fœniculi, sed tenuiora, delicatiora, molliora, vt aptè etiam quædam habet lectio, nō amaraci (vt falsò legūt) sed marathri: reliqua minora, sed similia supernè floribus millefolij. Hunc Matthiolus Stratioten aquaticum semperuiuo simile fecit postremis commentariorū editionibus, eoq; nomine perbellè pinxit, cū tamen perspicuum sit neutiquam esse foliis semperuiuo maioribus, magisq; refrigerantibus, sed potiùs coriandri aut cumini

Ibidem.

Ca. 97. li. 4.

Li. 4. c. 110.  
Forma.

T t



*STRATIOTES Millefolium*  
*aquaticum, Matth.*

*Locus.*  
*Li. 24. c. 16.*



& diuisura fœniculi pullulantis, aut corrudæ, mollioribus, colore ex viridi fusco, molliusculo, teneroq; caule in aquis fluitante, eq; radice exigua, euulsu facili, pallidula: lutea umbella emicat, gustu quadamtenus palustris equiseti. Myriophyllum alteru ex Matthiolo hic appinximus, quod idẽ est cū Viola aquatica Dodonæi,

*MYRIOPHYLLVM.*  
*prius, Matthioli.*



*MYRIOPHYLLVM.*  
*alterum, Matthioli.*



*à nobis*



à nobis depicta & descripta in lib. de palustribus. Singularum vires nunc sunt ex-  
pendendæ. Stratiotes millefolia, auctore Dioscoride, valde utilis est ad sanguinis  
eruptionem, ad vlcera vetera, recentiaq; & ad fistulas. Stratiotes terrestris, inquit  
Galenus, nonnihil habet adstrictionis: quare & vlcera glutinare potest, & vulneri-  
bus esse utilis. Sunt qui eo ad sanguinis eruptiones vtantur, & ad fistulas. Scribit  
Matthiolus dari vtiliter Millefolij succum ad sanguinis reiectiones. Idem præ-  
stare sicci farinam ex symphyti maioris, aut plantaginis, aqua potam. Eandem  
naribus inditam sanguinem inde fluentem compescere: dysentericis vtiliter in-  
fundi cum ipsius succo. Herbam recentem tusam, & suppositâ, pubiq; illitâ men-  
sium profluua cohibere. Eandem, cui candida inest vmbella, cum floribus tusam,  
& cum suis aqua, aut caprino lacte potam: guorrhœam in viris, in fœminis al-  
ba vteri excrementa sistere: idq; valentius efficere, si cum corallio, succino, & ebo-  
ris scobe propinetur. Mirum in modum conferre eiusdem farinam ad sanguinis  
mictum, si vnicæ pondere cum armenia terra drachma ex vaccino lacte potui  
detur ieiunis, diebus tribus continuis. Commanducata folia præsertim recentia,  
dentium dolorem mulcere: idem efficere commanducatam radicem, & diu sub do-  
lente dente retentam. Dari herba decoctum cum labruscæ floribus vtiliter po-  
tandum contra vomitum. Myriophyllum verò tradit Dioscorides, vulnera recen-  
tia ab inflammatione liberare, vel viride, vel siccum ex aceto impositum. Bibitur  
etiam ex aqua & sale ad casus ex alto. Myriophyllum, inquit Galenus, vsque adeo  
desiccatoria facultatis est, vt vulnera glutinet. Plura Plinius tradit. Cum aceto bi-  
bitur ad difficultates vrinæ, & vesicæ, & suspiria, præcipitatq; ex alto: efficacis-  
sima eadem ad dentium dolores. Hetruria

*Vires &  
Temper.*  
Li. 4. ca. 8  
Li. 8. simpl.

Ca. 9. li. 4.

Li. 4. c. 110.

Li. 7. simpl.

Li. 24. c. 16.

**STRATIOTES**

*Lutea, Clusij.*



hoc nomine appellat herbam in pratis te-  
nuem, à lateribus capillamenti modo folio-  
sam eximij vsus ad vulnera. Boum neruos ab-  
scissos vomere solidari ea, rursusq; iungi addita  
axungia affirmans. Pinximus & alterum My-  
riophyllum ex Matthiolo, sed non vmbellife-  
rum, quod Dodonæo secundum genus est Po-  
tamogeitonis, & quorundam herbariorum iu-  
dicio, Potamogeiton Castoris apud Plinium,  
ca. 8. 26. folio tenui, velut equinis fetis, thyrsô  
lôgo, & læui, in aquosis nascens. Stratiotes alia  
à Clusio pingitur & describitur palmari ma-  
gnitudine, duobus tribusve ab eadem radice  
cauliculis, quos folia vulgaris Stratiotis foliis  
similia ambiunt, molliora multò & tenuius in-  
cisa, flores in vmbellis alteri forma similes, sed  
lutei: radix vnicæ, dura, furculi tamen alterius  
Stratiotis & chamæmeli modo serpunt, & ra-  
dices agunt. Crescit in Murciano regno, & su-  
pra Auenionem itinere Nemausensi lapidoso  
& sterili solo. Floret Maio & Iunio. Potest &  
ad Achillæam Dioscoridis referri, quia flore  
luteo inueniri scribit, vt sit minus eius genus.

Tt 2



Nomina

Lib. 4. c. 32.

Forma.



ΧΙΛΛΕΙΟΣ, & ἀχιλλεῖος σιδιρίτις Græcis dicitur, Latinis Achillea, & Achillea sideritis, ob id sideritidis generibus à Dioscoride subdita, Plinio Millefolium. Virgas fert palmi altitudine, ita describente Dioscoride, aut etiam maiores, fusorum effigie, & circum ipsas foliola tenuia ex obliquo crebras

ACHILLEA Sideritis,  
Matthioli.

Lib. 25. c. 5.



Ca. 32. li. 4.

ACHILLEA Montana, Pena.

Lib. 4. c. 32.

Lib. 1. c. 1.



incisuras habentia, coriandro similia, subfulva (legitur in veteri codice non ὑπερπύρρα, sed ὑπερπύρα, id est, subamara) viscida, odoris multi, non iniucundi, sed medicati: umbellam in cacumine rotundā, flores albos, purpureos, & aureo colore. Prouenit lato solo. Plinius sic descripsit. Inuenit & Achilles discipulus Chironis, qua vulneribus mederetur, quæ ob id Achilleos vocatur. Hac sanasse Telephū dicitur. Alij primum aruginē inuenisse vtilissimā emplastris, ideoq; pingitur ex cuspide decutiēs eā gladij in vulnus Telephi. Alij vtroque vsum medicamento volunt. Aliqui & hanc Panacem Heracleō, alij Sideritim, & apud nos Millefolium vocāt, cubitali scapo, ramosam, minutioribus quā sceniculi foliis vestitam ab imo, &c. Quibus verbis, Plinius Stratiotē myriophyllū de quo proximo capite diximus designasse potius videtur, quā Dioscoridis Achilleā. Videtur & Millefolij nomenclatura suasisse quibusdam vulgare nostrū Millefoliū Achilleā esse, quæ sententia facili refelli potest, quod Millefolium vulgare neque coriandro similia folia habeat, neque sceniculo minutiora. Vera autē Achillea ex Matthiolo hic proponitur, quā in Hetruria prouenire scribit, & in Goritienſi agro, scapis ferē cubitalibus, foliis coriandro proximis, odore quadamtenus graui, non tamen ingrato, umbella in cacumine rotunda, amplaq; colore in purpura albicante, punctis quibusdam aureis picta. Coma huius trita, vt tradit Dioscorides, cruenta vulnera glutinat, & inflammationem arceat, sanguinis eruptiones inhibet, & eas quæ ex vtero fluunt apposita in pectore. Sed & decoctum ipsius paratur ad infellus mulieribus fluxione laborantibus. Bibitur ad dysenteriam. Et Galenus. Quidam, inquit, vocant Achilleon Sideritim, quæ proposita quidē viribus est nō dissimilibus, ceterum adstrictione exuperat. Quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias, & muliebres profluium congruit. Achilleam aliam Pena depinxit, montanam, Artemisia tenuifolia facie, perelegantem, & parum frequentem, nisi celsioribus Calcaris & horti Dei montium Narbonensium



bonensium iugis. Radice est pusilla, senecionis: cauliculis multis, pedibus, gracilibus, foliis quam superioris tenuioribus, habitioribus, succulentioribus, viridioribusq; umbellis in summitate Millefolij aureis: semine oblongo, tanacetij, aut abrotonij. Floret Iulio & Augusto.

BOLBOCASTANVM. CAP. XXXVIII.

**A**LEXANDER Trallianus empyematicis victus rationem prescribens, inter permulta alia *Βολβοκαστανών* meminit. Quo loco Goupylus vocem hanc deprauatam fuisse à descriptoribus annotauit, quod castanea, neque ex bulborum genere sint, neque bulbis simile quicquam habeant, ex glandium enim genere sunt, ex quo coniicit veterem scripturam fuisse *Βαλβονκαστανών*. Sed cum natura plantas proferat habitu & figura radices, bulbos, sapore gustuque castaneas scitè exprimentes, visum est Dalechampio Tralliani lectionem non immutare, & plantas hic expressas Bolbocastana ab eo nuncupari, sexu discreta, ut vnum sit mas, alterum femina. Bolbocastanum in pratis vdis & riguis nascitur, radice bulbosa, nobis extuberante, extrinsecus in nigro rufescente, intrinsecus candida, gustu castaneæ. Prælongum quoddam & gracile veluti filum ex se mittit, sæpius intortum, paulatim crassescens in

Lib. 7. ca. 2.


Nomina

Genera

Forma.


BOLBOCASTANVM

mas, Tralliani.



BOLBOCASTANVM

femina, Dalechamp.



caulis originem: caulis cubito maior est, rotundus, in quo folia pauca, fœniculo similia, veluti & caulis, ex articulis prodeuntia. Umbella in summo candida, semen oblongum, apice gemino conspicuum, subacre. Dodonæo est Bunium Dioscoridis, in Historia stirp. in Bolbocastanum in Purgant. Historia, Lobellio Nucula terrestris perperam Oenanthe Matthiolo. Bolbocastanum femina in siccaneis pratis oritur, radicibus multis, bulbosis, his auellandarum, modo rotundis, illis



## BOLBOCASTANVM

*grandius, Dod. Bunium.**L. 11. 2. ca. 4.*

BUNIVM.

CAP. XXXIX.



RIMVM Lector mouendus est in quibusdam etiam veteribus Graecis Dioscoridis exemplaribus libro secundo capiti de lampfana, caput de Bunio non recte subditum fuisse à descriptore, nominum τῶν βυνίων, id est napi, & τῶν βυνίων similitudine decepto, cum tamen re ipsa diuersissimæ sint plantæ. Nam præterquæ

BUNIVM, Dalechamp.

*L. 11. 2. ca. 4.**L. 11. 4. c. 120.*

oblongis, dulcibus, castaneæ sapore, fibris quibusdam inter eas & ex iis nascentibus, caule anguloso, cubitali à radice mox crassiusculo, non tenui filo, ut in altero genere cum radice connexo, rubro, foliis fœniculi, paucioribus quàm in mare, & minùs densis, sed carnosioribus, umbella candida, semine paruo, coactuato, cum nouellum est, rubescente, subacri, extantibus in singulis seminum apicibus, binis tanquam aculeis. Potest & planta alia hic picta Bolbocastanum grandius rectius appellari, quàm Bunium, ut Dodonæus vocat, quod caule est læui, anguloso, cubitali. Folia imarapij vulgaris folia referunt, nisi quod minora sunt, & minutius incisa, quæ in caule sunt anethi foliis haud absimilia. Flores candidi in umbellis anethi similibus, semen exiguum, odorù, cumino, aut fœniculo non multum dissimile, sed minùs radix rotunda est parui mali instar, sulcata foris, intus cãdida, gustu Pastinacæ. Locis multis Hollandiæ & Zelandiæ crescit interrata & secus vias, & copiosius in Anglia. Iunio flores & semen profert.

quod absurdum fuerit eiusdem plantæ historiã diuersis libris à Dioscoride conscribi, certè raporum, raphani, naporum, & ceterorù id genus olerum descriptio, & natura, à Bunio & pseudobunio herbis insigniter medicatis omnino dissidet, nec recte coniungi potest. Quare ex vetustiorum etiam codicum fide rectè Bunij & pseudobunij Historia in librum quartum reiecta est. Eadem nominum affinitas multis etiam doctis herbariis erroris causa fuit: primùm Plinio qui Bunium napi genus facit his verbis. Naporum duas differentias, & in medicina Græci seruant. Angulosos foliorum caulibus florentis, & quod Bunium vocant, &c. Deinde Ruellio qui capite de pseudobunio φάλα βυνίων φάρμακον, folia napi conuertit: item Oribasij interpreti, qui βύνιον napum interpretatus est. Huc etiam impegit Matthioli, Bunium napum siluestrem vocans, cum napus siluestris βύνιον sit, non βύνιον. At Bunium neque Banius est, neque eadem figura, neque iisdem viribus, aut



aut classe, cum buniade. Verum autem bunium Dalechampij iudicio hic pictum est, quod locis saxosis, asperis, & à sole illustratis prouenit, radice candida, surculosa, odorata, festucis in summo villosa, foliis proximè radicem tam facie similibus, apio hortensi, vt spectantes fallant, tenuioribus ad coriandri folia accedentibus, caule quadrato, procero, minimi digiti crassitudine, flore umbellæque anethi, semine odorato, quàm in hyoscyamo minore. Est hic obseruandum nec in nostris exemplaribus Græcis, nec in Oribasio in bunij caule ramulos minutis foliis ac floribus scaterere, item folia apio quidem similia legi, sed non proximè radicem. Quare necesse est aut verba hæc redundare, aut Ruellium alio exemplari quàm nostro vsu. Pena verum bunium esse bolbocastanum suspicatur. Bunium, vt tradit Dioscorides, vrinam ciet, excalfacit, secundas educit, spleni, renibus, & vesicæ vile. Tam humidi quàm sicci, expressique succi caulibus, foliis, radicibusque vsus inualuit ex aqua mulsa. Galenus bunium, inquit, adeo excalfacit, vt & vrinam moueat, & menses prouocet.

Forma.

In Ad. fol.

71.

Lib. 4. c. 19.

Vires &

Temper.

Lib. 6. iim.

ELICHRYSUM. CAP. XL.

**E**λίσχυρον Dioscoridi, Theophrasto ἐλίσχυρον, aliis ἡλίοχρυσον, Gale- no ἡμάραντον, Latinis quoque elichrysum, eliochrysum, & Heliochrysum nominatur. ἐλίσχυρον verò & ἐλίσχυρον, quod locis aquosis & palustribus, quæ Græcis ἐλῆ dicuntur, proueniat. ἡλίοχρυσον quod ad solis qui ἥλιος Græcis est, repercussum aurea luce flores huius plantæ fulgeant, quæ ob causam Aureliam vertit Theodorus. Elichrysum quo deorū simulacra coronabant, tradit Dioscorides, ramulum habere candidum, virentem, rectum, solidū, folia ex interuallis angusta, ad abrotoni folia accedentia, comam aureæ lucis, in orbem, umbellam rotundam velut corymbos aridos, radicem tenuem. Nascitur in asperis & torrentium alucis. Plinius inter vernos flores elichrysum recenset, paulo post ait, Heliochrysos florem habet auro similem, folium tenue, cauliculum quoque gracilem, sed durum. Hoc coronant se magi: atque si vnguenta sumantur ex auro, quod apyron vocant, ad gratiam quoque vitæ gloriæque pertinere arbitrantur, quod & repetit aliquanto post. Heliochrysum quod alij Chrysanthemū vocāt, ramulos habet candidos, folia subalbida, abrotono similia, ad solis repercussum aureæ lucis in orbem veluti corymbis dependentibus, qui nunquam marcescunt. Qua de causa Deos coronāt illo, quod diligentissimè seruauit Ptolemeus Rex Aegypti. Nascitur in frutetis. Quæ omnia ex Theophrasto mutuatus est hoc præsertim loco. ἐνδοξεὶ ὅτι καὶ ἐάν τις τὸ ἐλίσχυρον τῷ ἀνθεὶ στεφανῶται, μύρω βράντων ἐκ χρυσίου ἀπύρου. ἔχει δὲ ὁ ἐλίσχυρος τὸ ἀνθος χρυσοειδὲς, φύλλον ὅμοιον. (Plinius legit λεπιδόν, conuertit enim tenue, Dioscorides στενόν, id est, angustum,) καὶ τὸν καρπὸν δὲ λεπιδόν (legendum καρπὸν pro καρπὸν, iisdem auctoribus, quod Theodorus non animaduertit) καὶ σκληρόν. ῥίζαν δὲ ἐπὶ πλάγιον ἐλεπιδόν. χρῶνται ὅμως πρὸς τὰ δαιμόνια ἐν οἴνῳ, καὶ πρὸς τὰ πυρελῆστα, καὶ χαλκῶσαιες & μίξαιες μέλιτι. Id est, Qui etiā elichrysi flore coronantur, vnguento ex auro ignis expertè insperso gloriam & famam bonam assequuntur. Habet elichrysum florem auro similem, folium tenue, caulem tenuem & durum, radicem per summam terram vagantem & tenuem. Hoc vtuntur aduersus serpentium morsus in vino, & ad ambusta igni, si crementur, & melli miscantur. Sunt qui plantam quæ Officinis Stæchas citrina nominatur elichrysum Dioscoridis esse volunt, sed proculdubio hallucinantur. Nam folia illi tenuia, abrotoni modo non sunt, sed longa, albicantia, & hirsuta, caules palmares aut maiores, lanuginosi & incani, in quorum summitatibus flores quidē sunt aurei, sed globosi, odorati, & in umbellæ diuulsæ modum sese pandentes. Dodonæus eliochrysum Theophrasti ab elichryso Dioscoridis permultum distare existimat,

Nomina

Lib. 4. c. 12.

Forma.

Lib. 21. c. 11.

Cap. 25.

Lib. 6. hist.

c. 7. & lib. 9

cap. 21.

Marth in

c. 51. lib. 4.

Lib. 1. c. 60.



illudq; stœchadem citrinam Officinarum esse, minimè verò Dioscoridis elichry-

*ELICHRYSUM,*  
*Matthioli.*



*ELICHRYSUM Italicum,*  
*Matthioli.*

*Vires &  
Temper.*

Lib. 4. c. 52.

Lib. 21. c. 25.




tias & inflammationes discutit. Ambustis cum melle imponitur, contra serpentium ictus & lumborum vitia bibitur. Sanguinem concretum ventris aut vesicæ absumit cum mulso, folia eius triū obolorum pondere sistunt profluvia mulierum in

sum. Genuinum autem elichrysum siue eliochrysum, Matthiolus id esse putat, quod copiose provenit in Hetruriæ pratis, gracili solo, incultisque locis ac sitientibus collibus, nec non etiam in fluminum alveis, caule constat recto æquali, & lignoso, cubitalem longitudinem non excedente, foliis per intervalla emergentibus, abrotoni æmulis, comantibus in cacumine floribus, aureo colore fulgentibus, & in orbem in umbella coherentibus, corymbacea facie, qui exsiccati colorem aureum diutius retinent. Quare commodè hyeme cum flores defunt, puellæ siccum elichrysum coronis suis inferunt. Idem approbare videtur Pena his verbis. Eliochochryso aurei floris decus coronamentis, ut Theophrastus innuit, addi solitum, & ad radiorum solis repercussum coruscant lucem intuentibus vibrantes corymbi, nomenclaturam speciosam reliquerunt, nobisque signarunt certissima illius cognoscendi indicia, qualia in isto vulgari cernuntur, umbellæ corymbaceæ multis è bullis extantibus circinata, & aureo aspectu micantes, tanacetum & ageratum diurnam coloris gratiam servantes in rectis virgibus, gracilibus, virentibus pedem & cubitum altis, durialis & foliis per intervalla, abrotoni, vel artemisiæ tenuifoliæ, exili & lignosa radice. Nicææ ad Thyrrhenum mare, Genue Ligusticæ, & in Gallicæ provinciæ asperis, macilentis conuallibus, & desertis incultis fruticat. Poller multum ad podagras & vlcera maligna, humorum impetum illuc ruentem reprimendo, lotium deriuando, & copiam humorum vehementius impellendo, & eadem fermè quæ millefolium promittit. Hæc ex Pena. Dioscorides verò tradit contra serpentium ictus, coxendicum dolores, vrinæ stillicidia, ruptaque comode comam è vino potam auxiliari, ciere menses, grumos sanguinis in ventre aut vesica liquare cum vino mulso pota, cohibere quoque defluxiones è capite triū obolorum pondere ieiunis datam in vino albo diluto. Inferi etiam vestibus, ut eas ab erodentium iniuriis tueatur Plinius eundem usum medicum partim ex Theophrasto, partim ex Dioscoride descripsit. Ciet vrinas è vino pota & menses. Duritias & inflammationes discutit. Ambustis cum melle imponitur, contra serpentium ictus & lumborum vitia bibitur. Sanguinem concretum ventris aut vesicæ absumit cum mulso, folia eius triū obolorum pondere sistunt profluvia mulierum in



ELICHRYSUM Creticum  
Matthioli.



in vino albo. Vestes tuetur odore non ineleganti. Sed quod Dioscorides dixit, *ἑλὶχρὺς* & *ἑλὶχρῶν*, Plinius tantum ad foeminarum profluvia contraxit, quod mirum videri potest: nam quamvis *ἑλὶχρῶν* communis quidem defluxionibus omnibus sit appellatio, tamen propriè defluxionem siue destillationem ex capite in os & gulam, & hinc in ventriculum significat. Galenus elichrysum non habet, sed amarantho tribuit, quod Dioscorides elichryso. Amaranthum, inquit, facultatis est incidentis & extenuantis. Coma igitur eius cum vino pota menses educit. Sed & grumos sanguinis liquare ac soluere creditur non solum in ventre, sed & in vesica. Sed tunc potius cum vino bibenda Et omnes simpliciter fluxiones pota desiccant, stomacho infesta. Est altera planta, inquit Matthiolus in Italia nascens; quam Elichrysum alterum vocare voluit, quod folia illi sint etiam angusta, & aurei in summitate flores. Addit & Elichrysum Creticum sine vlla descriptione.

Lib. 6. sim.

AGERATVM.

CAP. XLI.



*Ἀγέρων* Græcis, Latinis etiam Ageratum dicitur, quasi non senescens. Ex eo enim nomē accepit, teste Dioscor. quod flos diu in sua specie perseveret. Herba est fruticosa, vt idem describit, palmi altitudine, humilis, simplex, maximè similis origano, umbellam gerens in

Nomina

Lib. 4. c. 54.

Forma.

Ibid.

AGERATVM, Matth.



qua flos aureis bullis similis, minor elichryso.

Plinius non multum à Dioscoride dissidens,

Lib. 27. c. 4.

Ageratum, inquit, ferulacea est, duorum palmo

rum altitudine, origano similis, flore bullis au-

reis. Huius vltæ nidor vrinam ciet, vuluamque

purgat, tanto magis insidentibus. Caula nomi-

nis non hæc, sed quoniam diutissime nō mar-

cescit. Dioscoridis Ageratum Matthiolus cum

In cap. 54.

lib. 4.

multis herbariis eam esse herbam censet, quæ

Italæ Herba *Gulia* dicitur, quæque à Mesuæ

Lib. 2. sim.

cap. 25.

Eupatorij nomine delineatur. Passim nascitur,

inquit, in Hetruria, foliis origano proximis, flo-

ribus aureis, in umbella micantibus elichrysi

modo. Huic sententiæ subscribit Pena ex floribus

In Ad. fol.

207.

aurea gratia senectam non sentientis, umbel-

lisque corymbaceis, elichrysi æmulis nostrum

Ageratum esse Dioscoridis genuinum iudicās.

Quin & decoctum & folium Narbonensis Age-

rati gustanti valde acre & amarum sentiri alle-

rit, & ad ciendas vrinas intro sumptum, forisq;

suffitum admodum efficax esse, odorem etiam

suauem quadantenus Romani chamæmeli fra-

grantia



*AGERATVM, secundum  
& tertium, Matth.*



*AGERATVM, Aliud  
quorundam.*



Lib. 2. c. 4.

Lib. 4. c. 54.

Lib. 6. sim.

mollire. Eadem Plinius tradidit, vt diximus. Galenus verò Ageratum esse διαφοριστικόν, & ἀπρέμα πῶς. Legit quidam ἐπιπλεγμέντος, leuiter vrendi, & inflammandi, quod conuenit voci Dioscoridis πυρωτικῆς. ἀπλεγμέντος, id est, vim habere discutiendi, & leuiter inflammationes arcendi. Quæ vis contraria videtur ei quam

Diosco

gratia, indicem certiore esse facultatis emolliendi vuluæ duritias, vrinâsque odore eliciendi, quas Dioscorides in Agerato suo requirit. Præterea, inquit, collatio cum origano hic valde oportuna est, siue totum fruticem & umbellâ, vt Dioscorides, siue etiam reliquam plantæ faciem perpendas, sunt enim bullatæ umbellæ elichrysi & origani, quas inter se confert Dioscorides, qui tamen hic foliorum non meminit, vti neque chrysocomæ, quam hyssopo assimilat, hyssopum autem origano. Quod si etiâ origano foliis assimilasset, propterea istud nostrum in Ageratū periisset: neque enim adeo procul absunt folia ab origano, quinimo quibusdam Narbonæ locis, & Hetruriæ squalidis, sed depressis, videri ait Agerati fruticis exigui, folia multò minora, & tantillum crenata, rigida, dura, plurâque virgulta, origanis variis ibi fruticantibus, toto habitu non dissimilia. Ageratum etiam spectari interdum illic specioso candore nitentibus floribus bullis, haud tamen cetera ab illo diuersum. Præterea cultu humidiorē adhibito, vel cælo septentrionali algidiorē, valde variare quod colunt vireta Gallica, Germanica, Belgica, latius proceriusque fruticans, maioribus ramis, latioribus, longioribus foliis, & altius multò crenatis, flaccidis, ad Galli cristam herbam accedentibus. Sed Angliæ hortis vicius nihil isto etiam Narbonensi semine satō, ramis caducis, magisque serratum foliis, diu persistans, admodum diuersum. Quæ varietas, opinor, fecit vt quam Dodonæus Balsamitam minorem vocat, Itali herbam Iuliam, Ageratum Dioscoridis, & Mesues eupatorium esse neget. Tam multa de Agerato Pena, in quibus mirum ab eo scriptum de Chrysocomes foliis nihil à Dioscoride proditum fuisse, cum is disertè & apertè tradit ei plantæ comam esse κορυμβοειδῆ, corymborum bullis insignem, hyssopo similē. Herbariorū quidam collationem Agerati cum origano, ad ramulos tantum non ad folia pertinere iudicant, qualem cap. de Symphyto petraeo legimus, vt foliorum similitudo minimè sit requirenda. Scribit Dioscorides decoctum Agerati vim habere feruidam, ipsam herbam suffitam vrinâs ducere, & duritias circa vterum



Dioscorides *πρωσιν* dixit, id est, feruidam & inflammantem. Quidam legendum censent *πρωσιν*, ad fots vtilem. Matthiolus postremis editionibus vero Agera to alia duo adiunxit, secundum candidis floribus hîc etiam picta: quibus aliud etiâ addunt herbarij, quod aridis gaudet, feréque semper è parietum rimis prorumpit, radice candida, tenui, breui, capillata, ramulis multis, pedalibus, canis, folio stecha- discitrinæ, angustiore, longiore, ex interuallis per caulem emergente, albicante, corymbis in caulium & ramulorum vertice aureis, qui tandem in molles pappos abeunt. Agerata alia duo à nobis alibi descripta sunt.

Lib. quæ in  
Alper. c. 56.

STOECHAS CITRINA. CAP. XLII.

**Q**UAE in Officinis Sticas citrina, siue Sticados citrinum dicitur, qui- busdam Tinearîa & luteus amaranthus, Germanis *Mottenblumen*, & *Rheinblumen*, Dodonæo Theophrasti Eliochrysum, & Dioscoridis Ageratum esse creditur, cuius sententia neque Matthiolo, neque multis aliis placet. Cauliculos fert graciles, duros, candicantes, lanuginosos, palmum al- tos, aut maiores, folia parua, angusta, hirsuta, mollia, figura & similitudine folio- rum hyslopi vulgaris. In cauliculorum verticibus flores sunt aureo colore fulgen- tes, globosi, umbellæ diuulsæ modo sese pendentes, odorati, amariusculi, haud facie- le marcescentes, radix est breuis, gracilis, subnigra. In asperis & montosis squalli- disq; prouenit. Iunio & Iulio floret. Hanc stæchadem Pena & Lobellius veram & hæctenus herbariis incognitam Dioscoridis Chrysocomê, cui conspicua florum corymbaceorum aurea coma nomen dedit, esse autumant, quam etiam luteum amaranthum vocarunt Græci à colore & fulgore penè immarcescibili, cuiusmodi in istius plantæ floribus esse quiuis agnosceret. Hanc illi sententiam suam confirmât collatione corymbaceæ comæ hyslopi veræ Dioscoridis, quam Pena se ostendisse, putat, cum corymbis stæchadis citrinæ. Præterea reliquis descriptionis & virium notis sic à Dioscoride traditis ex Ruellij conuersione. Chrysocomæ palmi altitu-

Nomina

Lib. i. c. 60.

Forma.


Chrysoco-  
me vera.

In Ad. fol.  
212.

Lib. 4. c. 53.

STOECHAS Citrina, Matth.

STOECHAS Citrina, altera



dine



dine fruticat, coma specie corymborum, hyssopo simili, radice hirsuta, veratri nigri modo tenui, cyperum æquante, gustu non iniucundo, ex dulci subaustero. In petrosis opacisq; nascitur. Radix calfacit & adstringit, his conueniens quos iecur aut pulmonis inflammatio malè habet: contra purgationes vuluæ decocta cum hydromelite assumitur. Hæc Dioscorides quæ stæchadi citrinæ optimè quadrât. Sunt enim huius corymbaceæ umbellæ rotundæ, multisq; quasi florum bullatis glomis sparsim tumultuarieq; conditæ, origani non absimiles, aut hyssopi Dioscoridis ab ipso Pena data, lucente nitenteq; per maturitatem coma aureo fulgore, & molliusculo vellere, pusillo intus semine maiorana, sed exiliori, ruffo, acri, odorato, in cauliculis rectis, albidis, nonnihil incanis, palmum & sesquipalmum altis, foliis oblongis, angustis, leui hirsutie incanis, stæchadis, vel linariæ osyridis, quam doctiores minùs rectè Chrysocomen autumarunt, radix fibrosa, gracilis nigra foris, gummi elemnium, vel cyperum rotundum Syriacum redolens, vti flores & tota plâta, gustu etiam aromatico, medicato, acuto & feruente non nimio feruore, subadstringente. Iam verò quam vim Chrysocomæ tribuit Dioscorides, eandem admodum insignem sese expertum fuisse testatur, nempe ad iocinoris ex glutinosis succis, ac vaporib; crasis intra tunicas discursantibus diuturnos affectus, pulmonibus verò inflammatis non impunè dari, sed affluxu pituitæ acidæ, ferose vel falsæ calefactis, vel erosis. Quare Ruellium melius conuersurum fuisse ἡπατοὶς & πνευμονοὶς ἀρμόζουσιν, hepaticis & pulmonariis vel peripneumonicis, quam iis quos iecur aut pulmonis inflammatio male habet. Præstantiorem autè esse & speciosiore Narbonensis Galloprovinciæ, & Hispaniæ aridis & petrosis, vbi odoratissima & plurima, æstate, radice perenni. In Germania ad Rhenum, reliquæq; Gallia paucior, & inefficacior. Quapropter nihil quominus hæc stæchas, vera chrysocome statuenda sit, obstare videri, nisi verbum vnum aut alterû, quibus subesse mendi quidpiâ Monspelienfes Doctores, qui hanc chrysocomen vocabant, iamdiu subolfecisse ait, ex Pliniana & codicis calamo exarati cōiectura. Sic enim legunt, ῥίζαν λευκὴν ὡς ἐλλέβορον μέλαιναν, id est, radicem densam tenuem, & nigram vt ellebori, & Lib. 21. c. 8. nigra sane est foris, & ita Plinius habet. Chrysocome siue chrystitis non habet Latine appellacionem, palmi altitudine est, comantibus fulgore auri corymbis, radice nigra, &c. Mox Dioscorides κυπέρω ἀρμόζουσιν, vel ὁμοίᾳ ἐν τῷ γλαυκῇ ὑπαύς ηἴρα, id est, cypero respondentem gustu, ex suaui austero, quæ tam odori & saporis huius quam quod ne maximè congruere illis visâ fuere. Idem Pena Nemausi & Monspelij se vidisse affirmat alteram superiori similem, sed graciliorem totam, nigriorem, squallidiorem, cineritiam, pluribus cauliculis viriceis pedibus, radice exiliore, minuscq; fibrata quia rarò nisi in rimosis ruderibus & maceris vrbium victitet, fusca foris, minimùm odora: florum corymbi singuli in singulis caulibus, nec aggregati vt superiores: semen tamen simile, exile, fuscum. Rarius hæc alia multo eodem Pena auctore occurrit in ilicetis cocciferis inter *Sommieres* & *Möspelium*, tota pulchella, facie stæchadem citrinam præferens, folia tamen sunt latiora, incana, vti tota planta: cauliculis palmaribus, in quibus flores iidem stæchadis alterius citrinæ, grâdiores, longiores, lactuca agrestis quadâtenus, radix nō magna, lignosa, inodora tota: minùs nota, peruia aut inuentu facilis, ideò nondum vires cognoscuntur. Prolixè quidem & copiosè Pena hæc omnia disseruit, quorum summa est, stæchadem citrinam Officinarum, esse chrysocomen Dioscoridis, Hyssopo similem corymbis, non vulgari quidem nostro, quod Hyssopum minimè veterū est, sed Maiorana Anglica quam verum Hyssopum esse credit: qua in re primùm examinandum est, an Hyssopum nostrum vulgare legitimum sit, deinde qua sui parte Hyssopum chrysocome referat, & an stæchas flaua sit. Hyssopum nobis duorum generum cognitum est ac frequēs, alterū satium, amariū, flore caruleo spicato alterū sylvestre,

Lib. 21. c. 8.

Stæchas citrina altera Pena.

Stæch. citrina altera inodora Pena.



sylvestre, minus amarum flore, puniceo. Qui Hyssopum esse negant hac ratione mouentur, quod vtriusque folium oblongum, & angustum origani generibus simile non sit, nepe minimè rotundum, & ab Amaraco, Pulegio, Dictamno, quorum folia cum origanis comparant, valde discrepet. Hic sanè scrupus molestus, & difficilis herbariorum ingenia multorum torquet, quibus nondum innotuit tertium Hyssopy genus à me depictū & descriptū in libro de Odoratis, quod reliquis generibus simile, foliorum figura rotunda, & origano Amaracove simili, hyeme etiam florem caruleum gignens, spicatum, vt reliqua duo genera. Hyssopi species illa si omnibus hoc argumentum tractantibus comperta fuisset, euocanda non erat è Britannia planta quæ Hyssopi veri locum vsurparet, cum ea suum iam habeat, vt origani sylvestris genus sit, satū & cultu nonnihil mutatum ab eo quod passim occurrit. Verum nullis corymbis, imo potius florum aceruo cumalato, vt in origano sylvestri sponte nascente, cui corymbos nemo vnquam assignauit. Extricato hoc nodo sequitur, vt dispiciamus an stœchas citrina chrysocome sit. In hac planta nulla sese offert similitudo foliorum cum alterutro Hyssopo, siue quod rotunda folia mittit, siue quod oblonga: præterea coma, nempe foliorū ramulorū rotunda folia mittit, siue quod oblonga: præterea coma, nempe foliorū ramulorū

In Horto.  
cap. 56.

## STOECHAS

viridis, Dalich.



mihi visum est, tacitū nolui in chrysocomes natura declaranda, doctioribus iudicandi arbitrium liberū esto. De primæ stœchadis citrinæ facultatibus ex Dioscoride, & Penæ & aliorū experientia diximus quibus assentitur Plin. scribens. Chrysocomæ radix calfacit & stringit. Datur potui ad iocinorū vitia: itē pulmonum, vuluē dolores in aqua mulsa decocta. Ciet mēstrua, & si cruda detur, hydropicorū aquam. Eadem tradit Galenus. Chrysocome vocatur & Chrysites. Radix vincentes habet acrē simul & adstringentē qualitates: quare nō multi vsus est. Vsi tamen est decocta in melicrato peripneumoniis & morbis hepaticis. Sed & mēstruē purgationis prouocandę vim quandā habet. Addūt recentiores decoctos flores aut in vino maceratos iocinoris obstructions aperire, quare darivtiliter eorū decoctum, aut dilutū, regio morbo, aut malo habitu affectis, idē potum interaneorū vermes necare, totā plantam meri omnibus cerebri morbis à frigida causā proueniētibus, nepe pituitosis fluxionibus, diuturnis doloribus, comitialib⁹, resolutis, & id genus aliis, siue eius decoctū sumatur in potu, siue herba ipsa in puluerem trita ex rhodomelle bibatur, aut oxymelite. In lixiuio addita non solū supradictis morbis subuenit, si eo caput abluatur, sed fursures etiā absterget, & pediculos necat. Datur cum herba ipsa, tum eius decoctū ad vrinæ suppressiones: renes enim expurgat, & vrinam pellit. Adduntur flores fomen-

Lib. 21. c. 20

Lib. 8. sim.

Marth in  
c. 52. lib. 4.



ris, quæ ad vteri morbos frigidos & obstructions paratur. Addo storchadem viridem a Bauhino missam, quæ tota iucunda viriditate nitet, foliis per intervalla in caule multis, duobus longis, aliquot aliis multo brevioribus, capitulo in caulis summitate longo, rotundo, cum duobus in summo foliolis, ex quo lutei flores exeunt.

## OENANTHE.

## CAP. XLIII.

Nomina  
Cap. 2. & 3.  
Cap. 108.



Icōnes nomine prisca tria designarunt: primū labruscæ florē, deinde plantam flore cōmendatā, quā memorat Theophrastus cap. vii. lib. 6. Historiæ, tū herbā de qua Dioscor. lib. 3. & nos hīc tractamus. Cum autē dicātur dicta

FILIPENDULA, cōnāthe multorū.

fit ἀπό τοῦ οἴνου id est, vino, & ἀνθή id est, flore, quasi flos vinosus, sic illæ plantæ nūcupatæ sunt, quod florū decore, odore & quidamtenus colore non sint viri dissimiles. Dioscoridis verò cōnāthen quidam etiam dictam putant, quod cum vice floreat, leucāthon verò (sic enim etiā appellari scribit Dioscorides) à florū quos producit candore. Hanc sic ille deliniat, folia habet pastinacæ, flores albos, caulē crassum, palmi altitudine, semen velut triplex, radicē magnā, capita multa rotunda habentē. Nascitur in perris, folio pastinacæ, radice numerosa. Herbarij varias plantas, ex quarum radicibus capita multa pendent, pro cōnāthe aut eius generibus proponunt. Fuchius & recentiorū pleriq; eam quæ vulgò filipēdula vocatur à numerosis illis & rotundis in radice capitibus tuberibusve, quæ quasi ex filo quodam pendere videntur, Gallis *filipende* & *filipendule*, Germanis *Rostembrech*, id est, Saxifraga rubra. Quorū sententiæ refragatur Matthioli, quod filipendula, inquit, nusquā magna radice nitatur, quæ rotundis extuberet capitibus, quod semen nō ferat triplex, quod deniq; nō in perris, sed in pratis & loto ubiq; solo proveniat. At si, inquit Pena, filipendula radicē & flores etiam suavius multo spirantes quā vitis silvestris germinationes, præsertim tractibus quibusdā Linguagorticis & Aquitanicis, sæpius naribus admouisset: præterea si verba Dioscoridis accuratius expēdisset, & locis aridis petrosifq; plurimam eruisset, illorum sententiam haud reprehendisset. Nam in Anglia nō procul Bristoia, ad Vincetij rupes & cautes deuexas, etiā in Germaniæ aridis plurimā Iunio & Iulio mensibus reperiri asserit, floribus cadidis, exiguis, stellatis, cōfertis, bryonia & rutæ situ, semine muscofo, squamoso, rotundo, pimpinellæ, cui foliis etiā similis sit, pastinacæq; silvestris diuisura, caulē cubitū & sesquicubitū alto, radice nō altē infusca, sed latē sparsa & amplā, ē pēdulis fibris multis, pilularū cyperi, aut præoniæ fœminæ, aut asphodeli modo, quæ perbellē delineationi Dioscor. cōueniunt.

Fuch. cap.  
iii. h. l.


Lib. 3. c. 108.  
Ib. d.

Forma.  
Lib. 2. c. 14.

Cap. 2. u. h.

In cap. 108.  
lib. 3.

In Ad. fol.  
379.



OENANTHE. I. Matth.





ueniunt. Nam μεγάλην ῥίζαν, radicem magnam, amplam, fusamque ex rei cogniti-  
 one, & aliis collaris locis Pena interpretatur, καυλὸν παχὺν, caulem crassum sanè ha-  
 bet pro altitudine sui, quam palmarem facit, cuiusmodi est filipendula nonnullis  
 glareosis & montosis. Denique κεφαλὰς ἑχούσα τρογγύλας, id est, capita multa rotun-

ΟΕΝΑΝΤΗΕ. IIII.  
 Matthioli.



da habens, cuiusmodi planè hæc sunt. His adde  
 quod filipendula easdem quas œnanthe vires  
 habeat, vt dicemus. Idem Matthiolus quatuor In cap. 118.  
 œnanthes genera post filipêdulam hic expref- lib. 3.  
 sa pinxit. Quorum primum quod tuberosa est  
 radice, multis notis genuinam Dioscoridis œ-  
 nanthen referre putat, cætera radicibus & vm-  
 bellis filipendulæ cognata. Verùm Pena illud In Ad. fol.  
 primum genus aristolochiæ rotundæ & adultæ 325.  
 perquam similem specie radicem tātū ab œ-  
 nanthe distare putat, quantum bunium à fili-  
 pendula. Neq; enim tuberosam œnanthes radi-  
 cem, sed capita multa rotunda habere scripsit  
 Dioscorides. Secunda & tertia Matthioli œnā-  
 the, filipendulæ nomē etiam sunt affecuta, in-  
 quit Pena, quæ vt œnanthes non ita dissimiles, Ibid.  
 ita hîc cōmodè referendæ. At si natalia spectes,  
 minimè œnanthen dicas. Alterum quippe plu-  
 rimum solo vliginoso & pratensi, tamen Mat-  
 thiolus istis nomē adscripsit œnanthes, filipen-  
 dulæ ademit, quæ præterquam quod viribus,  
 etiam natalibus montosis & saxeis, vt diximus,  
 magis quadrabat, etiam recentiorum consensu.



Tertia quæ minor, & verâ cenanthe similior, radicibus amplis, globulis oblongis, prolaxis fibris pendulis, turiones promit, inâque folia apij hortensis, teneriuscula, saturè virentia, cubitalem & sesquicubitalem caulem, geniculatum, alis, foliisque & umbellis anisi vel coriandri: flores sunt albi, pusilli, astute in conualibus herbis, & verrucis pratensibus Angliæ. Monspelij etiam propè pontem Celle nouæ, Magalonæ inter narcissos, & circum Granuntiam siluam. Hæc Pena, qui rariorem multò hic depictam filipendulam à nullo scriptore hæcenus memoratam in lucem protulit. In cellorum montium verticibus, vt Narbonæ ad Vegini in Dei paradiso vocato, calcari contermino hanc ipse eruit. Radix non æquè fæsa aut ampla, aut cirrhosa, sed proximè caulem bulbosis, teretibus, longiusculis, æqualibus ferè processibus, modicè protuberantibus, corrudæ annuonæ paribus, pæoniæ modò radicata. Caule assurgit sesquipalmū alto, crassiore, rotundo, non nihil striato & sulcato, imo medioq; sui folia alterno situ emittente, inter filipendulæ folia millefolij, media, exigua, cornu cerui diuisura, extremum florum thyrsum, album, spinosum amplexa cuculatis galericulis, crebris, spissis cōflatam, in Cristæ galli, vel Cynosorchis, vel nappelli speciem. Aliam idem Pena hic quoq; pictam exhibuit, neque etiam admodum notam nisi borrealibus præsertim Angliæ, vbi erūpi riuiulis, lutulentisve & riguis ripis, vbi paludarium, cui foliis non absimilis, vel rute pratensis similior, multo pullulatu, viro tetro, colore & facie cicutæ. Caules bicubitales spargit è radice in pares asphodeli albi bulbos multiplicata, & quasi brachiata, nullius fibræ vinculo aut interuentu (secus Matthioli) cōtinuos, teneros, gustu acres & ingratos, succo lacteo primū, deinde flauescente viroso & exulcerante prægnantes, umbella cicutæ, cui affinem autumant, qui maleficio parem se expertos asserunt. Vfos namq; in acetariis nihil factum fuisse propius, quàm vt interirent, aiunt alios qui esitassent vertigine tenebricosâ palantes, nutantes, attonitos, & in gyrum se versantes vidisse. Et certè tam non est cenanthe quàm abrea distat ruta pratensis vel cicuta. Hæc Pena. Præterea annotauit Dodonæus sij min⁹ genus in hortis vel alibi nō in loco palustri satum à Matthiolo quartam cenanthen fieri, ab cenanthe tamen multum differentem, id quod etiam lib. de Palustribus cap. 78. indicabimus. Alias duas cenanthes species Dalechampi exhibuit, quarū prior Scrophularia

• *OENANTHE*, siue *filipendula*  
*altera montana, Pena.*




*OENANTHE*, alia *Pena*  
*Cicuta facie.*





OENANTES Species,  
Dalech. amp.



OENANTHE, Myconi.



vas in folliculo relinquit ferè rotundum, quo semen coërcetur, minutum, in nigrū vergens. Radices habet candidas, quandoque rufescentes, rotundas, ex radicis fibris pendulas, modo plures, modo pauciores, vt quandoque viginti inueniantur, digiti longitudine, crassitudine minori. Harum sapor subdulcis, & nonni-

ria vocatur à quibusdam. Haud procul Montepelio nascitur, radice multa, rotunda, & oblonga, nigra capitula habente; caule crasso, anguloso, pedali, folio pastinacæ agrestis, flore in umbella candido, semine oblongo, nec lato, minime atriplicis simili, qua nota ab œnanthe Dioscoridis distat, cæteris satis aptè cōgruentibus. Altera eiusdem œnanthe in Montepeliensis agri asperis gignitur, radice magna, non numerosa vt Plinius ait, sed numerosa multave capitula habente, folio pastinacæ agrestis, caule crasso, palmum alto, semine atriplicis modo lato. Perdoctus & bonus Myconus medicus Barcelonensis tot œnanthes generum numerum quoque auxit, duobus aliis ex Hispania misis, quarum nec nomina nec vsus adhuc innotuerunt. Hæc in montibus & petrosis nata, folia propè radicem per terram spargit, minuta, incisa, læuia quadantenus hederæ modo, multò tamen minora, vt foliorum hîc depictorum magnitudinem vix excedant, inter se coniuncta & congesta, atq; idè coriandri foliis aut pastinacæ similia, è longis pediculis pendentia, caule enatis cubitali, ab imo rubescente, paucis geniculis cincto, terete, læui, fere striato, & aliquantulum cauo. Radices subsunt multæ vt in asphodelo, septem aut octo, quandoque pauciores, coniunctæ crassæ, foris luteæ, intus cādicantes, ex quarum extremis radiculae tenues & longæ producuntur. In summo caule flores velut in umbella pendent, candidi, ex quinq; foliolis constantes, in medio muscosi, quibus pereuntibus, in vascularibus seu siliquis semen maturescit, foliorū & caulis sapor subdulcis, item radicum cum leui quadā adstrictione, corticis verò earum amarus. Altera in altissimis montium iugis, frigidisque, solo tamē pingui, sed inter saxa prouenit: folia habet alia humi strata, alia in caule surrecta, minuta, variè incisa, pastinacæ satiuæ, aut potius filipendulæ: eius enim folia ita refert, vt quod ad ea attinet, hæc ab illa vix internoscas. Caules profert quandoque duos, sæpius vnicū, dodrantalem aut maiorem, rotundum, solidum nonnihil hirsutum. In eius vertice flos è folliculo veluti ex vesicula quadam prodit, extrorsum se exerens è candido purpurascens, qui defluens



OENANTHE Alia,  
Myconi.Viresc.  
Temper.  
Lib. 3. cap. 18.

Lib. 7.

Fuch. c. 211.  
Hist.

hil acrimoniae primo occurfu dum gustatur, habens, quæ statim euanescent: foliorum in caulibus subacris, nonnihil adstrictionis præ se ferens, floret Iunio mense. Hanc Myconius filipendulæ genus esse indicat ex foliorum & radicis similitudine, eodémque sapore. Nunc oenantes & filipendulæ facultates inter se conferamus. Oenantes fructus, inquit Dioscorides, caulis & folia cum vino mulso bibuntur ad secundas eiiciendas. Radix è vino vrinae stillicidio conuenit. Additur in veteri codice *de le pois*, id est, & iætero, sicuti & legit Paulus, verba hæc Dioscoridis sic transcribens. Dioscorides aliam describit oenanthem contrariis duntaxat viribus, unde secundas eam eiicere, & vrinae stillicidio, morboque regio mederi tradit. Filipendula amara admodum est, ita vt non temere hanc recentiores calidam & siccam esse in tertio ordine statuunt, expertiq; sint eam in lotij stillicidio & vrinae remoratu, neque non renum doloribus, atque lapide eorundem conuenire. Eandem stomachi inflationes discutere, mederi suspiriosis & anhelantibus, & omnibus morbis quos causa frigida concitauit: farinam eiusdem cibis comitialium inspergunt.

## PIMPINELLA SAXIFRAGA.

## CAP. XLIIII.

Nomina

Lib. 3. cap. 18.

Lib. 7.

Lib. que in

apert. c. 8.

Genera.

Forma.

Locus.

In Ad. fol.


321.



T Pimpinella & saxifragæ nomina de multis plantis dicuntur, vt ex superioribus intelligere licet, in quibus de Pimpinellis sanguisorbis, & saxifragis aliis diximus. Hic de Pimpinella que ab odore, vt volunt, hircina cognominatur, & Officiis saxifraga seu saxifragia, ab expellendorum è renibus calculorum facultate, Simoni Ianuensi *Petra sindula*, Gallicis *Saxifrage*, Germanis *Bibernell* & *feldmorem*. Eam herbarij duplicem statuunt, maiorem & minorem. Maior caulem profert longum, cauum, geniculatum, folia ex atro viridia, quæ ex foliolis multis in vno pediculo constant, pastinacæ satiuæ similia, toto ambitu serrata, flores candidos in umbellis, semen exiguum, apij hortensis seu vulgaris, calidius, & magis linguam vellicans: radicem vnicam, longam vt in apio hortensi gustu acrem, & linguam zingiberis modo exalfacientem. Pimpinella saxifraga minor superiori caulibus, foliis, floribus & semine similis est, sed omnibus partibus minor, maiore verò & acrimonia & feruore. Radix huic etiam est longa, simplex, gustu acris, & linguam vrens. Thalictrum Rondelletij, Natrix Plinij, Guiland. & Anguillara. In siluis, inquit Pena tota maior & umbrosis pratis, sed minus acris feruida que quàm minor, & folio longo propius exprimit apium quàm Pimpinellam. Creberrimus vsus apud Belgas vtriusque feminis & radicis calculo frangendo, lotioque proliciendo: vehementius siquidem vtrumque præstat. Herbariorum quidam esse volunt pseudobunium Dioscoridis, quod palmi altitudine in Creta fruticat, foliis Bunij, non Napi, vt vertit Ruellius, cuius quatuor ramuli ex aqua poti sanant tormina, vrinae subtilum, & laterum dolores: strumas quoque discutunt cum vino & sale repentes impositi. Alij potius esse credunt Phellandryon Plinij, de quo supra dictum est capite de



*PIMPINELLA Saxifraga*  
*maior, Matthiol.*



*PIMPINELLA Saxifraga*  
*minor, Dodon. & Lobelij.*



de Angelica, & ca. 78. lib. de palustribus. Hircinā autem nequitiam à viroso odore hircūque olente sic dictā esse scribit Pena. (Dauci namq; <sup>Ibidem.</sup> pastinacæ, vel ligustici quiddā nec insuaue redolet,) sed quia illa, vt adulti hirci, eo quo docent practici modo sanguis & caro, eximiū sit calculosis præsidium, etiamq; ictericis & hydro-picis. Petriūndula verò vocatur etiā eadē prærogatiua. Minor autem hircina Pimpinella, seu Bipinella, vt idē tradit, sic dicta est quod foliis Pimpinellæ adeo similis exit, vt eadem planē putetur: nec eas semper pilis discernere licet, inquit, vt putat verificator, Pimpinella habet pilos, Saxifraga non habet villos. Nam eodem proximē loci tractu se vidisse ait Saxifragiā foliorum interna superficie pilosa, nullos tamē in Pimpinella sanguisorba, vel hortensi, videri: An ne, non foliis innatos, inquit, sed inter frangendum tractos villos, tenuissimāve & fermē araneosa stamina innuit, qualia in scabiosa animaduertas? In caule rotūdo, glabro, cauo, geniculato, flores in umbellis albi, dauci semē acre, vel cari, sed calidius, acrius: radice multo acriore, candida, dauci siluestris, Germaniæ, Belgii, Galliæ, Angliæq; in pratis siccis & secus sepes. Hæc Pena, his cōsentanea quæ ab aliis herbariis de iisdē stirpibus literis madata sunt: nimirū Saxifragā hanc cū acrimoniā non exiguā in gustu præse ferat, haud dubiē in secūdo ordine calidā & siccā esse, imo ad tertiū vsque accedere. Semē eius & radicē, aut eorū decoctū cū vino potū ciere vrinā, renū & vesicæ calculū cōminuere, earūdem partium obstructionibus, & vrinæ difficultati summopere auxiliari. Radix menstrua ciet, secūdas & fœtum mortuum expellit eodē modo sumpta. Eiusdem siccæ farina cum saccharo ventriculū calfacit & roborat, concoctionem iuuat, torminibus ventris & colico dolori medetur, flatus discutiendo. Radix & semen mirum in modum profunt cōuulsis, apoplecticis, & iis qui febribus diuturnis à frigida causā excitatis vexantur, iisq; qui venenū aliquod hauerunt, aut à serpētibus cōmorsi sunt. Cum vino & aceto pota pesti medetur, ore retenta eius arcet cōtagia, & putrido aëri resistit.

*Temper.*  
Fuch. cap.  
221. hist.

*Vires.*  
Dodon. l. 2.  
ca. 88.

Commanducata phlegmatis multi, crassi & viscidī copiam à cerebro trahit, dentium dolorem mulcet, & apoplexia detentis vocem restituit, foliorum succis faciei maculas omnes exterit, cutemq; nitidam reddit, vlceribus putridis inditus ea terget. Eadem præstant folia trita & imposita. Aqua eius stillatitia aut sola, aut cum aceto instillata oculis, eorum caliginem discutit.



## Nomina



ΩNEION Græcis, Cicuta Latinis dicitur, Arabibus *Sucaram*, Germanis *Vurtzerling*, *Schirling*, & *Vuetterich* quasi tyrannus, quod hominem interficiat, si intra corpus sumatur, Gallis *Cigue* & *Cocue*, Hispanis *Ceguda*. Nominatur autem κύνδον, παρὰ δ' κύνδον διὰ τὸν γνῶμον εἰληγμένον καὶ σκοτεινὸν τοῖς πῖνεσι, idest, à circumuertendo, quod vertiginem & imaginem earum rerū quæ aspiciuntur tanquam circumagantur, ac tenebras inducat iis qui eam biberunt, vt fufius declarat Nicander. Cicuta, ita describēte Dioscoride, caulem profert geniculatum, vt fœniculum, grandem, folia ferulæ similia, sed angustiora & graueolentia, in cacumine adnascētes ramulos & umbellas gerit, florem subalbum, semen aniso simile, sed candidius. Radix caua est & nō profunda. Plinius, Cicuta quoque venenum est, inquit, publica Atheniensium pœna inuisa, ad multa tamen vsus non omittendi. Semen habet noxium. Caulis autem & viridis estur à plerisq; & in patinis. Leuis hîc & geniculatus, vt calami, nigricans, altior sæpe binis cubitis, in cacuminibus ramosus: folia coriandri teneriora, graui odoratu: semen aniso crassius: radix concaua, nullius vsus. Hæc Plinius. Notissima

In Ale-  
xiph.

Li. 4. c. 74.

Forma.

Li. 25. ca. 13.

## Locus.

CICVTA, Math.

In Ad. fol.  
326.

Li. 4. ca. 74.

Vires &amp;

Temper.

Lib. 25. c. 13.

Embl. 67.  
lib. 4.

omnibus hæc planta passim in pratis, locis incultis & umbrosis, circa sepēs & dumeta fruticat, omniumq; regionum indigena est, inquit Pena. Figura cerefolij, siue pastinacæ agrestis, aut myrrhidis. Iulio mense flores & semina profert. Dioscorides eius vim exitiosam, & multū in medicina vsum sic declarat. Cicuta in letalibus est medicamentis, sua frigiditate necans. Remedio est meraci vini potus. Succus exprimitur ex eius cacuminibus contusis, priusquā semen & coma arefcat, expressusq; in sole siccatur. Multus aridi ad medendi rationem vsus est. Miscetur vtiliter collyriis, quæ leuandi doloris gratia adhibentur. Herpetas & erysipelata illitus restinguit. Herba cū coma trita, & testibus circumlita, libidinum in somno imaginationibus auxiliatur, sed genitalia illita resoluit, lac extinguit: mamas in virginitate crescere prohibet: puerorū testiculos tabescere facit. Pleraq; his cōsentanea tradit Plinius, his verbis. Semini & foliis refrigeratoria vis, quæ si enecat, incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est priusquam perueniatur ad vitalia, vini natura excafactoria. Sed in vino pota irremediabilis existimatur. Succus exprimitur foliis floribusq;: tunc enim maximè tempestius est. Succus trito semine expressus. (Melior semine trito expressus, Cornarius emendat ex veteri codice,) & sole densatus in pastillos necat, sanguinem spissando. Hæc altera vis. Et ideo sic necatorum maculæ in corporibus apparent. Ad resoluenda medicamenta vtuntur illo pro aqua. Fit ex eo ad refrigerandum stomachum malagma. Præcipuus tamen est ad cohibendas epiphoras æstiuas, oculorumq; dolores sedandos circumlitus. Miscetur collyriis, & alios omnes rheumatismos cohibet. Folia quoque tumorem omnem doloremq; & epiphoras sedant. Anaxilaus auctor est mamas à virginitate illitas, semper staturas. Quod certum est, lac



est, lac puerperarum mammis imposita extinguit, veneremq; testibus, circa pubertatem illita. Galenus, Cicuta, inquit, quod extreme refrigerantis sit facultatis, omnes norunt. Sed non ubiq; similiter perniciosam esse tradunt auctores. Plinius, Maxima vis, inquit, nata Sufis Parthorum (Cornarius legit, Finibus Parthorum. Sufa enim vrbs fuit inter Persidem & Babyloniam sita, non vrbs Parthia. Tamen Theophrastus scribit Thrasyam Mantinensem ad venenum conficiendum censuisse sumendum Cicutam, *ἐχ' ὅθεν ἐβύχανεν, ἀλλ' οὐ σέσωκεν*, idest, non vndeliber, sed ex Sufis. Et paulò ante dixerat Homeri testimonio, *Κάνθρον ἀειστον ἔναι περὶ σέβρα*, καὶ ἐν τοῖς ψυχροῖς τοῖς τόποις. Idest, optimam esse Cicutam circa Sufa, & in frigidissimis locis) mox Laconica, Cretica, Asiatica: in Græcia verò Megarica, deinde Attica. Matthiolus non adeò exitiosam esse in Italia tradit: eamq; si in Hetruria Asini depascantur, profundissimo somno & torpore corripì, vt non tantum stupidi, sed planè mortui videantur. Id quod aliquando rusticos fefellit, nam dum asinis quos mortuos credebant, pellem detraherent, accidit, quod in medio ferè operis asini sint expectecti, non sine magno excoriantium terrore, & ingenti spectantium risu.

Li. 3. ca. 13.  
Ibidem.

Lib. 9. hist.  
ca. 17.

Cap. 15.

CICVTARIA.

CAP. XLVI.

**A**SIMILITUDINE quæ huic plantæ est cum Cicuta ab herbariis Cicutaria nomina est, quàm duplicem faciunt. Prior in pratis montium frigidorum luxuriat, radice candida, ramosa, scæniculi modo carnosâ, nunc cocta, nunc in furculos diuisa, odorata, acri: foliis oblongis, in ambitu valde incis: caule cubitali, anguloso, ramoso: flore candido in umbellis: femine longo, nigro, gemino, filis duobus prætexis munito, acri, odorato. Cicutaria altera quæ rubra dicitur in pratis etiam montium vlginis ad fontium scaturigines, & riuorum margines fruticat, radice crassa, nigra, geniculata, confi-

Nomina

Genera.

Formæ.


CICVTARIA Alba.

CICVTARIA Rubra.



brata:





brata: foliis quàm in superiore latioribus, pallidioribûsque: caule pedali, ferula-  
 ceo: flore ex albo rubente, in umbella compressa: semine similiter oblongo, ni-  
 gro, gemino, fila duo tenuia protendente, acri, & suauiter olente. Cicutarias

*CICVTARIA Altera*  
*latifolia fœtidissima, sine*  
*flore, Lobell.*



alias profert Lobellius, Cicutariam maxi-  
 mam fœtidam, cuius caulis ad hominis  
 proceritatem allurgit, crassitudine est qua-  
 tuor digitorum, foliis, semine & radice Se-  
 felis Peloponnesis longè maioribus. For-  
 tasse est Thapsia tertia Salmaticensium à Clu-  
 sio descripta quidem, sed non picta. Profert  
 etiam Cicutariam latifoliam fœtidissimam,  
 perperam Sefeli Peloponnesis quorundam,  
 qui nondum inuento gemino Peloponnesi  
 Sefeli folio Cicutæ latiore & crassiore (cuius-  
 modi huius sunt) Sefeli Peloponnesis folio  
 Cicutæ dixere. Facultates tamen reclamant.  
 Vniuersa namque planta simul, ac tangi-  
 tur, virus halat, qua nota à Peloponnesi  
 discernitur. Radice crassa & tota facie Myr-  
 rhidem odorem vescam quadamtenus expri-  
 mit: sed folia latiora, longiora, nigriora,  
 & semen breuius Angelicæ vel maximæ Ci-  
 cutariæ fatuæ, par in umbellis latis excusso  
 candido flore. Caulis alis brachiatus, sesqui-  
 cubitum & duos cubitos æquans. Florem, se-  
 men, caulem seorsum depinxit.

PERFO




PERFOLIATA Altera.

CAP. XLVII.



ANTHRISCVS, Plinij.



**H**æc ad cubiti altitudinem attol-  
litur, caule rotundo, folio deor-  
sum mutante & incuruo, crasso,  
venoso, pallido, perfoliatae prio-  
ris simili, per cuius imam partem & caulis &  
rami traiciunt, sicuti ferè in priore perfolia-  
ta, hoc dempto: quod non sic folium rotun-  
do alueo caulem vndiquaque ambit, sed veluti  
inferne fissum per rimam transmittit, flore in  
vmbella, prodeunte ex cauo plantæ vertice,  
foliis, quæ alibi simplicia sunt, illic gemina-  
tis, & tanquam lacunam efficientibus: semine  
paruo, nigro, rotundo. De Perfoliata prio-  
re tractauimus in lib. de iis quæ in vmbrosis

Cap. 55.

ANTHRISCVS. CAP. XLVIII.

Lib. 21. c. 15.

**P**LINIVS Anthriscum inter vul-  
gares apud Aegyptios in cibis  
herbas numerat cum phōdrylla,  
hypochoeri, caucalide & scādice. Li. 22. c. 22.  
Alibi de scandice scribens, ait. Eadem erat  
Anthriscus, si tenuiora folia, & odoratiora  
haberet. Anthriscum plantam esse hic pi-  
ctam contendunt herbarij quidam, quorum  
sententia nec refragor, nec suffragor. Gigni-  
tur in pratorum marginibus, præsertim si ge-  
lidis aquis rigantur, & ad riuorum præter-  
fluentium alueos, radice fœniculi, intus alba,  
odorata, acri, foliis apti per oras oblique  
dissectis, in singulis pediculis ferè semper qui-  
nis, caule cubitali & interdum proceriore,  
anguloso, flore in vmbella candido, semine  
oblongo, gemino, apicibus duobus præ-  
fixis, exilibus, acri & odorato. Qui-  
dam pertinaciùs contendunt  
esse Chærephyllum  
nostrum.

Locus.

Forma.

HISTOR





# HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER SEPTIMVS,



*In quo describuntur & ad vinum depinguntur  
Plantæ, quæ flore placent.*

DE FLORIBVS ET CORONIS, CAP. I.

Lib. 6. hist.  
cap. 7.  
Flos quid.

Plin. li. 17.  
ca. 25.



Lib. 6. hist.  
cap. 7.  
Florum di-  
uisio.  
Verni flo-  
res.

VM VMBELLÆ flores sustineant plantis umbelli-  
feris eas quæ flore placent merito subiungemus, quas  
ἀνθια vocasse videtur Theophrastus, & floribus dica-  
ta conuerit Theodorus. Est autē ὁ ἀνθος, Latine flos,  
veluti iuuenescientium plantarum quasi vernatio, vel  
futuri fructus indicium, & gaudium herbarum arborum-  
q. Concipiunt enim variis diebus, & pro sua quæq;  
natura grauida partus gerunt, quod germinatio ideo  
vocatur. Pariunt cum florent, hōsque ruptis constat  
vtriculis. Sed educatio in fructu est. Quamquam flo-  
rere quasdam arbores tradunt, fructum tamen nullum edere: ac contra fructiferas  
esse quasdam flore omni destitutas. Cerasi quidem genus est, quod florem rosæ  
modo foliis multis stipatum, ideoq; formosum profert, nullum tamen fructum  
præbet, velut exhausta secuturi fructus materia in floris ornatum, & dēsam folio-  
rum congeriem. Ilices verò fructu onerantur, quem nullus flos antecedit. Est &  
genus violæ flammeæ & chamæmeli leucanthemi, quod florem densum & multi-  
plicem edit, nec semen gignit. Præterea tristes quasdam sint plantæ, quæ nullo  
flore à natura decorantur, vt adiantum, hemionitis, polypodium, filix, trichoma-  
nes, Medium, quibus tamen floris loco quidpiam natura concessit, vt filici & tri-  
chomani pensiles in auersa foliorum parte vermiculos. Flores Theophrastus an-  
ni partibus quibus emergunt, distinxit, vt sint ἀνθη ἐαρινὰ, ἑαρινὰ, μελοπωρινὰ, idest,  
Flores verni, æstiuæ, autumnales, rigida hyeme, nullo flore celebri. Vernos flores  
hos recenset. Τῶν δὲ ἀνθῶν ὁ μὲν παλαιὸν ἐκφαίνεται ὁ λευκοῖον, ὅπως μὲν ἀπὸ μαλακώτερος,  
εὐθύς τῷ χυμῶνος, ὅπως δὲ σκληρότερος, ὕπερον, ἐνιαχὺς τῷ ἥρος. ἅμα δὲ τῷ ἱῶ ἢ μικρότερον τι  
γέρων τῷ φλογινὸν χαλκίμυρον, ὃ ἀγρίον (quem locum deprauatissimum esse veliphi  
asterisci indicant. Quare legit Gaza, ἅμα ὃ τῷ ἱῶ, ἢ μικρόν τι ὕπερον κρίνον τῷ φλογι-  
νόν. Plinius verò, ἅμα ὃ τῷ ἱῶ, ἢ μικρόν τι ὕπερον ὃ πορφυρενόν) ταῦτα ἅν οἱ φεφανοπέ-  
κοι χρωῖ, πολὺ ἐντρέχει τῶν ἄλλων. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ νάρκισσος, ἢ ὁ λείριον, τῷ τῷ βάλαν-  
κώδιον. ἐμπλέκονται ἔνιοι καὶ τὸ εἰς τὸς φεφάνους. ἐπὶ ὃ τῷ τοῖς ἢ ἀνάνθη, τῷ μελάνθιον, καὶ  
τῶν ἀγρίων, ὅτε ἐλθὼν κρυσός, τῷ τῷ ἀνεμώνης ἢ λευκῶνία χαλκίμην, τῷ ξίφιον, καὶ ἰσάνθος, καὶ  
χεδὸν ὅσοις ἄλλοις χρωῖ τῶν ὀρεῖων. τὸ δὲ ῥόδον ὕπερ τῶν, καὶ τελευταῖον μὲν φαίνεται  
παλαιόν







τῇ ὑακινθῳ, ὃ ὕτερος ἀχρῶς, λαλῶς. ᾧ χρῶν) περὶ τὴν τάρσιν, καὶ χρῶνι ἄλλοις ἴσται. ἀλλὰ  
 δὲ, καὶ ἡ ἑστὶ τῆς γῆρας, καὶ τὸ τρεῖς καὶ ἑκατὸν καὶ ἑκατὸν τὸ αὐθιός, ἀσπὶν δὲ, μὲν τὰς  
 ὃ τὸ λείπον τὸ ἑτερον, καὶ ὁ κερδὸς ὅτε ἀρδνός, ἀσπὶν, καὶ ὁ ἡμερος. Id est, Æstivi flores sunt,  
 Lib. 21. c. 11. lychnis, Iouis flos, cerinthum, iphyum (Plinius legit pro cerintho, alterum genus  
 lilij, & pro iphyum, Tiphyum) & amaracus phrygius, atque pothos duplex, vnus  
 cui flos hyacintho similis, alter decolor, albus, quo circa sepulcra vtuntur, hic ve-  
 rò diuturnior est. Floret etiam iris æstate, & struthium, flos quidem aspectu pul-  
 cher, sed sine odore. Autumno verò florent lilij alterū genus & crocus, tam mon-  
 tanus inodorus, quam satius. Athenæus hunc Theophrasti locum citans ab eo  
 Li. 15. dipn. nihil variat. Ex eodem Theophrasto hæc descripsit Plinius. Succedunt illis æstiuī,  
 Lib. 21. c. 11. lychnis, & Iouis flos, & alterum genus lilij: item tiphyum & amaracus quem phry-  
 giū cognominant. Sed maximè spectabilis pothos. Duo genera huius: vnum cui  
 flos hyacinthi est, alterum candidius, qui ferè nascitur in tumulis, quoniam for-  
 tius durat. Et iris æstate floret. Abeunt & hi marcescuntq̃. Alij rursus subeunt au-  
 tumno. Tertium genus lilij, & crocum, in vtroque genere vnum hebes, alterum  
 odoratum. Hic est, vt diximus, ex Theophrasto ortus florum temporum ratione  
 distinctus ordo: quamquam, inquit, nullum intermittitur tempus, nec ipsa hyems  
 floribus orbata est. Nam etsi propter immodicum frigus sterilis videatur, tamen  
 flosculos habet, autumnalibus prorogatis. Quod si ipsa clementior fuerit, multò  
 magis. Verū eniμuerò in Græcia dūtaxat, atque dum Theophrastus viueret, præ-  
 clarosq̃ illos de plantis libros conscriberet, supradicti illi flores coronarij habe-  
 bantur, hoc sæculo multò plures gratissimi iucundissimiq̃ celebrantur, quos ora-  
 tione prosequemur, vt delicias nostras posteritas agnoscat, nec dedignetur, iis in-  
 terim non omisis quos Theophrastus recensuit, & quorum præsertim vsum re-  
 tinuimus. Atque vt à vernis exordiar. Primus omnium flos consiliginis, quam  
 Verni flo- Pseudoelleborum nigrū vocant, herbaceus in hortis nostris profilit statim à bru-  
 res nostri. ma & Ianuario ferè toto durat, non odoris suauitate, non coloris venustate expe-  
 titus, sed hoc nomine tantum, quod vel inuito brumæ rigore existat, atque erum-  
 pat, & alios omnes anteat. Huic proximum est leucoium bulbosum, Ianuario &  
 Februario florens, mox leucoium flammeum, bulbos vomitorius, viola purpu-  
 rea: caltha quæ hyemauerit, primula veris genera, belides fatiua, leucoia candida,  
 purpurea, punicea, anemone limonia, bulbina, chelidonium minus, fumaria bul-  
 bosa. Ianuarij, Februarij, Martij ineuntis hæc plerumq̃ fertura est. Progrediente  
 Martio luxuriant phlox, vinca peruinca, cenanthe, hyacinthi, lunaria odora & in-  
 odora, narcissus duplex, alter orbiculo medij floris rubro, suavis odoris, alter gra-  
 uis olens, luteo, chamæleuce, siue farranum Plinij, cardamine minor (has enim  
 fertis & coronis non excludunt) flore violæ, è puniceo candicante, nam & altera  
 minor humiliorq̃ est, flosculo candido, exiguo, inutili. Deinceps Aprilis hos lar-  
 gitur cynorrhodi læuis, præonia, iridis maioris cærulea & candida, gladioli, elio-  
 chrysi, violæ matronalis, cuius flos vt leucoiorum, candidus, puniceus, purpureus  
 spectatur, herba Carrachio similis quæ Galli *Baßmetz* vocant. Florent & hoc men-  
 se oxyacantha, & smilax aspera, quorum flore coronarios vtī scripsit Theophra-  
 stus. Ex hisce floribus perenniores sunt phlox, quæ tota ferè æstate florere non de-  
 finit, viola flammea, leucoia, violæ matronales, viola purpurea multiplex. Aprili  
 succedit Maius suorū quoque florum opibus & agmine diues: nam eo flores suos  
 expandunt hemerocalles siue lilium fuluum, lilium candidum, lilium martagum  
 nuncupatum, melanthium rubrum, caltha veris principio lata, rosa corneola, ias-  
 minum luteum, cyamis maior, purpureus, cæruleus, candidus, orcheon & ranicu-  
 lorum genera, phalangium flore niueo, caryophyllum sylvestre, satium, candidū,  
 rubrum, puniceum, vermiculatum, polyschides, viola barbata, flos Africanus,  
 polygona







- menta, quod Strabo tradit apud Vibonem in Brutiis repertum, in eumq; locum propter flores migrasse Proserpinam. Hæ & conuiuiis adhibebantur, & amâibus in deliciis erant, *τέφανος* Græcis corona dicta est, & *τέφος* & *τέφμα* à cingendo, Athenæo teste. Corona verò Latinis à choro dicta videtur, etiam si citra aspirationem nunc scribatur: tamen Apion in libro de lingua Romana, vt scribit Athenæus, choronam cum aspiratione diu appellatam fuisse tradidit, quia chori ductores ea antiquitus in theatris vterentur. Nostri non solum flores in coronarum vsum venerunt, sed etiam in ferta digeruntur, quæ ferentes & intueantur, & naribus obiciant: aut in fasciculos componuntur, quos in vasis aut vrceis encaustro picturatis & aqua plenis merfos, super cœnaculorum abacis, cubiculorum mensis, fenestrisq; asseruant ad pascendos recreandosq; oculos. Coronas ac fertis herbarum flores ferè inferuiunt, arborum minimè, præterquam mali aureæ, citriæ, punicæ, & myrti. Fasciculis verò & arborum, & siluestrium herbarum obuios quosque flores immiscent, modò vel forma, vel colore arrideant, vt malorû, pyrorum, achradum, oxyacanthæ, vacciniorum, persicorum, padi, thraupali, tetragonie, violæ calathianæ, silymbrij siluestris, & reliquorum id genus nullo ferè dempto. Sed coronas prisca non tantum capiti imposuere (hoc ipsarum vsum reperto, auctore Athenæo, ob dolorem capitis cû post liberaliorem meri potum his fortè veluti vinculo capiti adhibitis, eius grauitatem, vel sublatam vel leuatam sensissent, præsertim si hedera, myrto, lauro, rosâ caput cingerent) sed etiam collo adalligare in pectus demissas, *ὑποθυμίδας*, vel *ὑποθυμιάδας* dictas. Athenæus. *ὑποθυμίδας δὲ καὶ ὑποθυμιάδες τέφανοι παρ' αἰολῶσι τῶν ἰωσν, ὡς περὶ τὸς τραχὺλῶς περὶ τὸν ἰωσν, ὡς ἔρως ἐστὶ μαθεῖν, ἐν τῷ ἀλκμῆς τῷ ἀνακρέοντος ποιήσεως.* Id est, Sunt etiam hypothymis & hypothymiades coronæ quædam apud Aeoles & Iones, quas circum colla gestabant, vt ex Alcai & Anacreontis poemate discere licet. Has autè ita gestasse tradit Athenæus, quod cor vitæ sedes cum in pectore sit, non solum coronas hanc principem corporis partem ornandam esse iudicauerunt, sed etiam vnguentis pretiosis illinendam ac exhilarandam. Et hypothymides, siue hypothymiades dici videntur, quod earum *ὑποθυμιάς*, id est, halitus & odor in nares expiraret. Morem eum Sequani etiamnum retinent, sæpius ex indusiorum lineorum deiectis vinculis ferta florum suspendentes, quàm gestantes manu. Ad hæc non omnes eadem de causa coronas sibi aptabant, neque eandem earum deligebant materiam, sicut neque nos nostro saculo, neque texendarum coronarum eadem omnibus occasio. Religionis causa & oraculi iussu Cares vitice coronabantur auctore Athenæo, Lacedæmonij calamo ἐν τῇ τῶν πορομαχίων ἑορτῇ, id est, in festo antesignanorum, & palma, auctore Sosibio, quæ in Gymnopodiis festo Laconico monumentum erat victoriæ ad Tyræam partæ. Naucratiæ myrto, Ægyptij papyro, quam ideo coronariâ vocabant, quod eius flore deos coronabant, Plinio teste. Samiæ Iunonis æditui, sacerdotes lauro, qua ceteri Græci vtebantur, vt ait Philonides, ad discutiendam post immo dicum potum capitis grauitatem, Romani verò triumphantes bellicæ virtutis insigni. Præterea non religione tantum moti homines sibi coronas aptarunt, sed deorum etiam simulacris, quod hodie quoque fit diebus festis laribus publicis & priuatis, manibus & sepulcris. Mitto celebres illas Græcorum coronas ex apio, pinu, populo, oleastro publicis ludis Græciæ in virtutis præmium viris fortibus dari solitas, & Romanorum triumphales, obsidionales, ciuicas, murales, vallares, nauales, ouales, & laureas, aureas, gramineas, iligneas, querneas, myrteas, vtpote quæ ad florum & plantarum naturam ac contemplationem nihil conferant: item futes, quæque ex assuto malabatro nardové fiebant, vel serico pingebantur opere phrygio, natiuos flores imitante serici tinctura & varietate. Dicamus hic potius de patibilibus coronis, quarum summa fuit auctoritas, sic nuncupatis, quod ex floribus & herbis

Lib. 15.

Ibidem.

Coronæ  
variæ, &  
earum va-  
rius vsus.

Lib. 15.

Lib. 15.

Lib. 15. c. 11.



herbis coronariis compactæ essent, Græci *σπεπλὰς* & *ἐλαφὺς*, idest, totiles, & *καυ-  
ενός* vocarunt, quod *philyra*, idest, tilia cortici in taniis dissecto flores impinge-  
rentur. Fuerunt etiam *ἀσπιδιοί* coronæ ab Ægyptiis appellatæ: loci flore ibi nascen-  
tis æstatis tempore in stagnis, cuius duo reperiuntur colores, alterius candidus ro-  
sæ speciei ex qua componuntur coronæ Antinoiæ propriè nominatæ, alterius cæ-  
ruleus, ex qua textitur coronæ *ἀσπιδιοί*. Fuerunt & *ἀσπιδιοί* coronæ ex Acino plâta nexæ,  
quarum meminit Andron medicus apud Athenæum. Floribus coronariis suprà  
memoratis præsci alios adnumerarunt teste Athenæo, vt *cosmosandalum*, *Thesiū*,  
*philadelphium*, *chelidonium* fronde albescente. His adde veteres nectendarum &  
gestandarum coronarum adeo curiosos fuisse, vt quo tempore flores terra negat,  
cornuum ramenta in florum speciem tingerent, quemadmodum & nostri homi-  
nes hodie pennis auium lignorum ramentis & charthis artificiosè dissectis tin-  
ctisq; vernos flores ementiuntur in hybernas coronas: ex medulla quoque iunco-  
rum gypso illita auiculas formantes, quas fertis & coronis addunt lemniscorum  
vice, quibus & laneis & aureis veteres vsi sunt. Hactenus de coronis & floribus co-  
ronariis vniuersè. Deinceps de singulis dicendum, non illis quidem supradictis  
omnibus, quorum plantæ aliæ aliis libris descriptæ, aliæ aliis libris describendæ, ne  
similes à similibus dissociarentur, sed de iis quæ maximè placent nobis & arridēt,  
hodieq; vsu frequentiore vsurpantur quarum loci natales, ortus tempora, tum exi-  
mix præstantissimæq; in medendi arte potestates singillatim explicabuntur. Atq;  
ab his quæ omnibus notiores sunt & vulgatiores exordiemur.

Lib. 15.

Ibidem.

VIOLA PURPUREA.

CAP. II.



ON Græcis & *ἰὼν μέλαν* Theophrasto & *μελάγιον*, Dioscoridi *ἰὼν πορ-  
φυρεῖν*, Latinis *viola nigra*, & *purpurea*, & *viola Martia*, Officinis *vio-  
la*, herba ipsa *violaria*, Arabibus *Seneffigi*, *Sonofrig*, siue *Beneffigi*, Italis  
*Viola porpurea*, & *Viola mammola*, Germanis *Mertzen-violen*, Hispanis  
*Violeta*, Gallis *Violette de Mars*. Nicander in Georgicis, vt Hermolaus refert, *Ion*  
vocatam credit *Violam*, quia *Nymphæ* quædam *Ion* florē eum *Ioui* primū de-  
dere muneri. Alij Græci *ἰὼν* dictum putant, quod cum *Io* in vaccam à *Ioue* cōuer-  
sa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit, vt Latini quoque dētrita, t, li-  
tera *Violam* quasi *Vitulam* imitatione Græca videri possent appellasse. Eadem  
occasione *Seruius* *Violam* Latinis etiam *vaccinium* dici refert, locum hunc enar-  
rans *Vergilij*:

Nomina

*Alba lignustra cadunt, vaccinia nigra leguntur.*

Ecl. 2.

*Vergilius* tamen alio in loco *vaccinium* à *viola* differre ostendit.

*Et nigra viola sunt. & vaccinia nigra.*

Ecl. 10.

Li 7. archi.

*Vitruuius* quoque *Violam* à *vaccinio* distinguit. Nam ex *Viola* *Silis* attici colorē,  
ex *vaccinio* *purpuram* elegantem fieri memorie prodidit. *Petrus* *Pe.* *ἰὼν ἀπὸ τῆς  
ἰέως*, quasi ire aut prouenire, aut primū prorumpere dictum putat: veris enim  
præuia est *Viola*, *purpura* autē nigricans, seu in nigro *purpureus* color causa fuit  
cur *Viola* *purpurea* *Theophrasto*, Græcisq; aliis scriptoribus & *Vergilio* *nigra* di-  
ceretur. Nec solū ex saturata *purpura* lucent *Violæ*, sed etiam quædā sunt *albæ*,  
eæq; vulgatiores, frigidis & viginosis locis nascētes, nullo aut sanè languido odo-  
re. Vtriusque alia est fatiua, alia siluestris. Præterea *Viola* *purpurea* fatiua, tum can-  
dida in hortos trāsata, maximè loco aprico insolata, flore q; sæpius vulto, alioq;  
cultu, denso foliorum stipatu ferè globosa fit, ideo duplex Gallis dicta, *Violette de  
Mars double*, quā olitores delitiis alunt. Pena tradit nusquam in Europa cultu lu-  
culentiores, magnitudine, fragrantia, colore, prouentu spectari, quā in *Antuerpiæ*  
Officinis quæ parant cæruleum violaceum syrupum ex pluribus infusis saccharo

Genera



Ca. 117. li. 4.

In Ad. flo.  
266.Li. 4. c. 117.  
Forma.*VIOLA Purpurea, Matth.*

Lib. 21. c. 6.

*Locus**Tempus.**Vires.**Temper.*

Li. 4. ca. 117.

addito, soli viginti aut triginta dies expositis. Sed is florū luxus Violas semine priuat, fraudato feminis genio, quæ si rursus negligantur, nec frequentius transplacentur, ad ingenium redeunt. Matthiolus arborecentem Violam è Baldo monte ad se mittam depinxit, nempe Matrem Violarum, à nobis describendam paulò post fusiùs, quæ ad duorum cubitorum altitudinē adolefcit, multis ab vna radice sublatiis ramis, flore regalis consolidæ floribus ferè simili. Ea nihil aliud est, inquit Pena, quàm Viola purpurea in nemorosis, vmbrosis frigidarum regionum, qualis Anglia, Belgium, vel calidiorum montibus arduis, quales Vegani, & Narbonenses alij montes, ramosos cauliculos emittens, sesqui palmares, teneros, & ex intervallis folia oblongiora, altiùs serrata, filiquasq; in tria dehiscētes, longiores: flores còcolores, inodoros, nonnihil toto ortu & positu Violam flammeam imitata, neque tamen specie aut natura à Viola purpurea diuersa, quā sic descripsit Dioscorides.

Folium habet minus tenuiusq; quàm hedera, nigrius tamen, nec dissimile: cauliculus statim à radice medius profilit, in quo flosculus suauiter olens, purpureus. Nascitur in asperis & vmbrosis locis. Hanc nostram esse Violam Martiā nemo ambigit, tum floris venustate, tum suauissimo odore plebi & Officinis frequentissimam & vtilissimam, ad delicias & summas vtilitates. Hæc enim humilis per terram repit fragrant modo, folia fundens à radice multa, lata, venosa, per ambitum leuiter serrata, hedera foliis minora, rotundiora, tenuiora, nigrioraq; præsertim parte superiore, inter quæ medijs exeunt pediculi tenues, teneriusculi, singuli singulos flores ferentes, pulchros, odoratos, colore in nigro purpureos, nonnunquam pallidiores, nonnunquam candidos, ex quinque foliolis còpositos, ac deinde pensiles folliculos, vasculave rotunda per maturitatem in tres partes dehiscētia, semen minutum, album, in rotunditate oblongū, miliaceum, medullosum completentia: radices tenues sunt & fibratae.

Hanc solam Plinius Græco nomine Ion appellari tradit his verbis. Violis honos proximus. Earum plura genera, purpureæ, luteæ albæ: plantis omnes vt olus sacra. Ex iis verò quæ spòte apricis & macris locis proueniunt, purpureæ latiore folio statim ab radice carnosâ exeunt, solæq; Græco nomine à cæteris discernuntur, appellata Ia, vt ab his ianthina vestis. Locis opacis iuxta dumos, muros, agrorū, hortorumq; margines pingui solo plurima frequenq; emicat. Multiplex hortensis est, quæ floribus est pallidioribus, minutq; odoratis. Nascitur etiam locis opacis, ac secus vias & margines agrorum, verū arido steriliq; solo. Floret perpetuò, vt diximus ex Theophrasto, si cultus adhibeatur, sed vere præsertim, & inter vernos flores ferè prima. Folia verò toto anno virent. Viola refrigerandi vim habet, Dioscor. auctore. Folia eius per se & cum polenta illita stomacho æstuant, oculorum inflammationibus, sediq; procidentis auxiliantur. Præterea id quod in flore purpureum est, cum aqua potum angina correptis, & comitiali in pueris morbo mederi affirmant. Quam postremā sententiam quidam hinc expungunt tanquā supposititiâ, nec eam Ruellius conuertit, quod eadē capite de Aftere legatur. Alij còtra Plinium & eos auctores ex quibus illa descripsit, sequēdos iudicant, idq; de Viola







## Nomina

Lib. 6. hist. cap. 7.

Lib. 2. c. 31.

## Genera.

In cap. 117. lib. 4.


## Forma.



VAE hîc pingitur viola à florum tricolori varietate Viola tricolor, & herba siue flos trinitatis nuncupatur, ab aliis Iacea, ab aliis Viola flammea, quibus phlox Theophrasti esse videtur, quam violam flammeam Plinius & Gaza interpretati sunt, quamquam nostra exemplaria non *φλωξ*, sed *φλογιδον* habeant, quod idem esse puto. Phloga Theophrastus scribit vere cum viola, aut paulò pòst exire, siluestrem esse, plurimùmque durare, quæ de tricolori viola verè dici possunt. Est enim silvestris, inodora, vere aut paulò pòst erumpens. Alij contendunt phloga herbam esse à Dodonæo pro heranthemo demonstratam. Anguillara amaranthum purpureum esse putauit. Sed is nec verus, nec coloris flammei. Viola hæc Gallis *Pensees*, & *menues pensees* vocatur, Germanis *freycampkraut*, quæ cum silvestris sit, in hortis tamen hodie colitur. Eiusdem duo obseruauit & depinxit genera Matth. alterum maius, alterū minus. Viola flammea foliis constat exiguis, initio rotundiusculis, deinde oblongioribus, per ambitum serratis, caulibus angulosis, infirmis, tenuibus, geniculatis, reptantibus, ex quibus inter folia exoriuntur pediculi longiusculi, quibus flores insident purpureæ violæ forma & magnitudine ferè pares, similiter in quinque foliola diuisi, lingua triplici colore variegata, purpureo videlicet, luteo, candidoque vel cæruleo, summis foliolis purpureis, mediis candidis, infimis luteis nigris intercurfantibus lineolis. In hortis hos flores etiam cum pallido, cæruleo, purpureo, luteo promiscuos videmus, ea colorum varietate ob solam venustatem, nulla odoris gratia commendata. At in Vellauiorum montosis pascuis propè cænobium, quod monasterium Diui Chasfredi vocât, hîc flos totus luteus spectatur copiosissimus insigni prorsus de hac re historia. Montibus enim altissimis frigidissimis, niue sex ferè menses opertis, eo potissimum iugo vnde manat Ligeris fons, per æstatem tanta copia is

VIOLA FLAMMEA siue

Tricolor maior, Matth.



VIOLA FLAMMEA minor,

seu Iacea altera, Matth.



Hos



flos prodit, vt terrę cōspectum intuentibus eripiat: collectum verò & in faccis  
conditum incolæ Mafiliam perferunt, vnde post nauibus in Alexandriam & Ae-  
gyptum vehitur. Eum fama est Aegyptios comparare, vt in aqua, quam solam bi-  
bere per religionem fas est, macerantes, & coquentes, salubriorem potum confi-  
ciunt, ad caducum morbum pulmonisque & thoracis vitia decoctum id prodes-  
se arbitantes: tam procul ad eos morborum sitisque remedia nos mittimus. *φλο-  
γα*, quasi flammeam dictam volunt ab huius sylvestris luteo colore, quem Flam-  
meum appellarunt veteres, & qui in hortis cultu mutatur. Semē exiguis & rotun-  
dis folliculis coercetur, quæ eo maturo dehiscunt, radices multis fibris constant.  
Minoris huius violæ flores, inquit Matthiolus, minores sunt, & duobus tantum  
coloribus splendentes, nempe caruleo ac candido, aut lateo & albicante. In aruis  
multis locis nascitur, & sitientibus pratis sua sponte, atque in hortis silvestri spe-  
ciosior & elegantior. Vere cum viola purpurea aut paulo post emicat, æstate de-  
inde tota, & maxima autumnii parte, nonnunquam etiam hyeme floret. Dodonæus  
in stirpium historia violam flammeam siccam, calido frigidoque temperatam esse  
tradit, in libro de floribus frigidam quidem obscuram habere qualitatem, sed hu-  
midam manifestiorem, lenti glutinosique succi, vt malua participem, emollientis  
ea de causa facultatis, verum minùs quàm illa, prodesse, vt recēiores aiunt, feбри-  
citatibus maximè pueris & infantibus, quorū conuulsionibus ac comitialis mor-  
bi accessionibus subuenire creditur, commendatur item ad pulmonis pectorisque  
inflammationes, & ad scabiem corporisque pruritus: vlcera quoque glutinare  
fertur. Pena calidam, gustūque totam subacrem esse asserit.

*Locus.*

*Tempus.*  
Lib. 2. c. 2.

Cap. 2.

In Ad. fol.  
266.

*Locus.*

*Tempus.*  
Lib. 2, c. 2.

Cap. 2.

In Ad. fol.  
266.

LEVCOIV M. CAP. IIII.

**H**oc *λευκοίς* nomen, quamvis Græcis albam violam significet, si eius vocabuli compositionem spectes, aliarum tamen violarum præter melania cuiuscunque coloris sint, naturam indicat, etiam lutearum quas Arabes nunc *Cheiri* vocant nunc *Alcheiri*, præposito articulo, Germani *Vioisyaal*, Hispani *Violetas amarillas*, Galli *Gyofliers jaunes*. & candidarum, & carulearum, & purpurearum, ut quatuor sint in totum hæc genera sola florum varietate discrepantia, autore Dioscoride. Alia enim candida, alia lutea, alia purpurea, alia carulea quamquam multi de carulea dubitent, putentque leucoium caruleum in Dioscoridis græcis codicibus ascititium esse, etsi in cunctis pariter legatur, tum quod nusquam leucoium caruleum viderint, tum quod Marcelli egregiæ antiquitatis & fidei Latinus Dioscorides Lōgobardis literis scriptus, tres tantum colores illos omnibus notos numerat, quartus hinc caruleus nullus in eo sit. His addit Fuchsius Plinij auctoritatem, qui violæ genera enumerās, purpurea, lutea, albæ duntaxat meminit: neque plures leucoij differentias recenset Oribasius, neque Serapio hoc Dioscoridis caput ad verbum describens. Minimè tamen hinc violam purpuream aut candidam intelligas eam quam *ῥοι* Græcis propriè vocatam diximus, Latinis violam, quam diximus etiam esse purpuream & candidam: Homines enim illorum florum capti venustate & fragrantia, inquit Pena, ut usum ad coronamenta, sic nomen commune sanxere, posteaque magis consuetudinem, aut florum similitudinem quam rationem secuti, multos & varios flores violas nuncuparunt, idem nomen variis atque longè diuersis plantis, quales sunt violæ & leucoeia imponentes. Hæc enim ab illis qualitate facultatibusque differunt: ideo Dioscorides locis atque familia disiunxit. Est & apud Theophrastum leucoium bulbosum. Quæ omnia suis locis declarantur. Leucoium album ut Dioscoridis ætate, sic etiam hodie vulgò notum, non à florum candore, neque enim semper candidos ha

*Nomina*

Genera

Lib. 3. c. 121.

Cap. 173. hi.  
Lib. 21. c. 6.

Lib. 7. hist.  
e. cap. 15.

Forma.

dos ha



LEVCOIVM,  
Album.LEVCOIVM Album  
& purpureum, Matth.

dos habet, sed à foliorum canitie cinericiòve colore dictum, caulem habet bipeda-  
lem aut tripedalem, duru n, rectum, ramosum, rotundum: folia oblonga, candida,  
mollia, & veluti lanuginosa verbasci ritu: flores odoratos, ex quatuor foliolis con-  
gestos, in superiore cauliculorum parte, ex pediculis exeuntes, aut candidos aut ru-

LEVCOIVM Aureum,  
Mattholi.

Lib. 2 c. 4.  
& hist. flo.  
cap. 3.

Cap. 117.  
hist.

Tempus.

Locus.  
Leucoium  
luteum.

Forma.



bètes, aut ex purpureo puniceos, aut cineri can-  
didiori proximos: siliquas angustas, oblon-  
gas, in quibus semen latum & rotundum: radi-  
ces validas, fibratas. Hoc minus leucoium po-  
nit Dodonæus, quod non forma sed magnitu-  
dine sola differt, caules foliaque similia gerit,  
sed minora, flores etiam vel candidos, vel ru-  
bentes, vel puniceos, siliquas & semina similia.  
Fuchsius violæ matronalis nomine depinxit.  
Purpureum huic planè simile est caulibus, fo-  
liis vtraque parte canescentibus, solo florum  
colore distat. Quare Matthiolus vtrumq; ea-  
dem pictura expressit. Leucoia ista vere florent,  
& tota propemodum æstate. In hortis & cultis  
locis proveniunt. Leucoium luteum, Græcis  
λευκόδιον, & λευκόδιον μέλιτον, Plinio viola lutea,  
Arabibus & Officinis propriè Keyri, Gallis Gy-  
roflee jaune, vel Violier jaune, Germanis Gel-weiel,  
Italīs Viola lalla, caulibus est ramosis, lignosis,  
virentibus, foliis oblongis, angustis, in viridi ni-  
gricantibus, glabris, numerosioribus, longiori-  
bus, magis in acutum desinentibus, quàm supe-  
riora. Flores bene lutei, venusti, valde odorati  
fumos




summos ramulos ornant: deinde siliquæ minores, in quibus semen compressum, luteum. Sponte è rimis peruetustorum murorum saxorumque apricis, & radiorum folis repercussu intalescentibus emicat, atque etiam è ruderibus, feritur etiam & colitur in hortis. Sed illud mense

*VIOLA LUTEA,*  
*multiplex.*



*LEUCOIVM,*  
*Puniceum, Fuch.*



Februario & Martio floret, præsertim hyeme clementiore, hortense seriùs. Leucoium luteum veriùs dici *ιον φλογινόν* Theophrasti, quàm florè trinitatis, periti herbarij autumant, quod totus flos flammei sit coloris, idest, lutei: luteum enim florem flammeum à Latinis dici declarant hæc Plinij verba. Lutei video honorem antiquissimum, in nuptialibus flammeis totum feminis concessum. Flamma enim in humido flaua est: in sicco verò rubra fit, & à flammeo flauove colore discedens rubra cum splendore cernitur. Sui similis & vna dütaxat, inquit Pena, quæ plurimum albos, sæpe purpureos, interdum, præsertim annotina flores exoleti coloris in caruleum vinaceum languescens fert, cornicula quanta & cuiusmodi cornuti papaueris: geminum autem seminum ordinem membranula secundum ordinem intercurrit: folia accedunt ad calendulam albicantia è radice lignosa. Hæc nõ perinde feruet gustu. Alia viola lutea hic proponitur spectanda verè polyanthes vel multiplex cognominanda, flore nimirum densissimis foliolis stipato & congesto, præstantissimi atque suauissimi odoris, nullis siliquis, nullo semine, abeunte nimirum in floris amplitudinem eo succo, quem siliquarum & feminis materiam esse oportebat. Cultu & mangonio talem euadere aiunt, præsertim si tenellæ plantæ antequam floruerint sæpiùs transferantur. Præterea leucoium puniceum hic appinimus, reëtius sic appellatum quam violam matronalem puniceam, quo nomine Fuchsius pinxit. Dioscorides lutei leucoij præcipuum in medicina vsum esse tradit. Huius aridos flores decoctos in defensionibus valere contra vuluæ inflammationes, & menstrua expellere: cerato exceptos rimas sedis sanare, cum melle feruida oris vlcera, semen ipsius duarum drachmarum pondere cum vino potum, aut cum melle appositum menses, secundas, partus extrahere, radices cum aceto impositas lienem reprimere, & podagricis prodesse. Plinius eadem habet. Viola alba & lutea extenuant, menstrua, yrinam ciēt, minor vis est recentibus: ideòq; aridis post annum vtendum. Lutea dimidio cyatho in aquæ tribus, menses trahit. Radices eius cum aceto illitæ sedant lienem: item podagram, oculorum autem inflamma

*Locus.*

*Lib. 21. c. 8.*

*In Ad. fol. 141.*

*Viola lutea.*

*Forma.*

*Cap. 17. hi. Lib. 3. c. 121. Vires & Temper.*

*Lib. 21. c. 19.*



inflammationes cum myrrha & croco, folia cum melle purgāt capitis vlcera cum  
 Lib.7. sim. cerato rimas fedis, & quæ in humidis sunt, ex aceto verò collectiones sanant. Gale-  
 nus eadem distinctiùs explicat his verbis. Leucoij frutex vniuersus extergentem  
 facultatem habet, ac tenuium partium, plus tamen flores: & inter hos qui sunt sic-  
 ciores magis quam virides, adeò vt & oculorum cicatrices crassas extenuent, tum  
 menses quoque eorum decoctum mouet, & secundas partiumque emortuum eli-  
 cit: ac si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum vt si quod aliud, ama-  
 rum. At si quis virium eius vehementiam multa aqua admista retundat, aut id ge-  
 nus aliquo, habebit & ad phlegmonem non malum medicamentum. Sic decoctum  
 eius si non merù fuerit vteri phlegmonas identidem perfusum sanat, potissimum  
 quæ diuturno tempore ad scirrhi modum induruerit. Sic cum cerato vlcera aegrè  
 ad cicatricem peruenientia curat. Sunt etiā qui cum melle ad aphthas adhibeant.  
 Semen cum eiusdem sit facultatis, aptissimum est duarum drachmarum pondere  
 potum: tum mensibus ciendis impositum conuenire creditur, partiumque viuen-  
 tem interficere, ac mortuum eiicere. Radices similis quoque facultatis, nisi quod  
 crassioris sunt essentia, & magis terrenæ, cum aceto lienes induratos sanant. Non-  
 Lib.3. anti. nulli verò & phlegmonas in articulis induratas iis curant. Mesues oleum de Key-  
 ri, id est, ex floribus lutei leucoij conficit vt chamæmelinum, quod tenuat, digerit:  
 ob id dolores thoracis, renum, neruorum, mensurarum sedat.

*VIOLA MATRONALIS. CAP. V.*

Nomina

Lib.21. c.7.



*VIOLA* matronalis vel viola damascena & marina, Gallis *Violette de damas*, & *Gyrofflee de damas*, vel *Violette & Gyrofflee des dames*, Germanis *Vwinteruiolen*, hoc est, viola hyberna siue hyemalis. Quidam ob odoris præstantiam violam moschatellam vocant, alij Hesperida Plinij, notum magis olentem, inde nomine inuento. Dicitur autem viola matronalis quod

*VIOLA Matrona-  
lis, alba.*



*VIOLA Matronalis,  
purpurea.*



cam



eam matronæ colere soleant. Damascena tanquam ex Damasco delata. In floribus huius differētia est. Vnam Fuchsius depinxit floribus candidis, alteram purpureis nomine leucoij albi & purpurei. E' radice fibrata, densa, ampla, caules emittit re-ctos, cubitales & sesquicubitales, ramosos, in quibus folia longa, lata, subnigra, per ambitum leuiter crenata, crebra, drabæ, aut erucæ, minùs laciniosa, in caulium sum-mitate flores pulchri, quadrifolij, odorati, leucoijs similes, sæpius candidi, aliquan-do rubelli, aliquando diluta purpura, semen in siliquis oblongis & rotundis coër-ctetur, paruum, acre, fuscum aut rufescens. Quamuis marinam & damascenam tan-quam exoticam vocitent, inquit Pena, tamen in Nitribrigum montosis, & Vega-nij siluosis, etiãque in pratis Angliæ fruticat, vnde horti habuerunt, in quibus nij siluosis, etiãque in pratis Angliæ fruticat, vnde horti habuerunt, in quibus culta floret Aprili, Maio, & Iunio mensibus, folia gustu acia & calida sunt, quin potiùs erucam, thlaspi, aut Rapunculum gustu tota sapit, quibus idcirco affinis na-tura & facultatibus proxima putatur. Prouenit & sponte in Sequanorum vallibus, qua cenus fuit, sub sepibus.

Genera.  
Cap. 13. hi.  
Forma.

Locus.

Tempus.  
Temper.

VIOLA LATIFOLIA. CAP. VI.

**V**M HUIUS plantę floribus magna sit cum violæ & leucoij floribus affinitas, eam herbarij violarum ambitu comprehenderunt, & vio-lam latifoliam, aut peregrinam nominarunt. Diximus enim nomine Græco τὸ βυ, & violæ Latino, plantas multas intelligi, quas florum similitudo potius quàm ratio similes fecit. Quidam atque etiam Officinæ voce

Nomina

VIOLA, Latifolia.



barbara *Bulbonac* ceu *Bolbonac* rectiùs videntur appellasse à radicibus bulbosis: recentiorum plerique Lunariam, alij Lunariam Græcam vo-cant, alij perperā Rhaphanum siluestrem, Bra-banti *Percininkblamen*, id est, florem nummi, à si-liquarum figura nummum quadantenus refe-rente. Hæc planta caules proferit duos, rotun-dos, furculosos, folia oblonga, latiora multò quàm violæ matronalis, virentia, in ambitu pa-rum crenata, flores Leucoij purpureos & sub-ceruleos, quos sequuntur lata, planę, & prope-modum rotundæ siliquæ, vel orbes foliacei, ex membranis tenuissimis veluti laminis compa-cti, pellucidi, semina quaterna aut quina com-plexi plana, lata, obscuri coloris, forma quo-dammodo *Archolus* lunæ, inter quæ media ia-cet tertia membrana, radices sunt bubosæ, ob-longæ, cæcidæ prorsus, carnosæ, sparsæ, quadan-tenus asphodeli, aut præoniæ, sed minùs protu-berantes. Hæc, inquit Pena, in Alpini Gallo-prouinciæ, conterminisq; Pedemontij oritur,

Forma.

In Ad. fol.  
137.  
Locus.

apud Fracos verò Flandros & Anglos in hortis tantum colitur, radicibus hîc exi-lioribus quàm illic, flaccidioribus, minùsque protuberantibus, sed similibus. Primo lioribus quàm illic, flaccidioribus, minùsque protuberantibus, sed similibus. Primo vere floret, in hortis Aprili mense, altero à quo facta est anno. Huic aliam similem esse tradunt Dodonæus & Pena, foliis latis, & siliquis planis ac rotundis, vtrisque paulò minoribus, caulibus durioribus, breuioribus, floribus dilutioribus, radice pe-renni ac hyeme non marcescente, fibrosa, non autem bulbosæ, quæ in hortis repe-ritur, ac floret æstate. Viola latifolia calido acrique gustu est, præsertim semē, quod

Tempus.

De fl. c. 6.  
fol. 137.



*Temper.* siccum est, radices acrimoniæ cuiusdam, sed non multæ participes sunt. Lobellio abstergit, modicè calefacit, vrinas cit vt rapunculus. Eduntur in acetaris, vt rapunculi, & aliæ nonnullæ. Dodonæo & aliis quibusdam veterum thlaspi secundum esse videtur, quod & sinapi persicū dicitur, & thlaspi Crateus. Nam, vt Dioscorides scribit, Alterum thlaspi tradit Crateus *παρασπυλλον, καὶ μεγαλόφυλλον*, id est, latifolium & magnis radicibus, qualis viola hæc latifolia esse videtur. Quæ sententia Petro Pei non placet, quoniā huius radices non perinde acres sunt, vt Crateus thlaspeos radices traduntur, quarum vsus ischiadicis vtis, illarum acrimonia inefficacior. Idem neque istam, Armoraciam, siue siluestrem raphanum Dioscoridis esse putat.

### CARYOPHYLLI NOSTRATES. CAP. VII.

*Nomina*



*Cap. 12. hist. In Cap. 7. lib. 2.*

*Lib. 2. c. 7. Lib. 2. c. 8. Pet. Pe. fol. 188.*

*Lib. 2. c. 149*

*Lib. 6. hist. cap. 7.*

*Lib. 1. cauf. cap. 10.*

*Lib. 8. c. 6. hist. cap. 7.*

*Genera. Forma.*

Vlco celeberrimi & notissimi florum elegantia, & suauissimo caryophyllorum exoticorum odore, caryophylli dicuntur, seu caryophyllei flores, quibusdam Ocellus, à floris specie, & Ocellus Damascenus, & Ocellus barbaricus, & Barbarica, Gallis *Gyroffles*, & *Ocellus* similiter ab odore & forma, Italis *Garofoli*, Germanis *Negellblumen* etiam ab odore, & *Grasblumen*. Fuchsius betonicæ alterius speciem facit, & Betonicam alteram, seu Veronicam coronariam vocat, quod eius in coronis penè nimius sit vsus. Mattheolus cum aliis Veronicam coronariam, Officina detractis duabus prioribus à betonica literis, Tunicam seu Tunicem, tamè Bernardus Gordonius Tunicam polemonium esse tradit. Dodonæus Veronicā alilem & coronariam appellat. Pena Cantabricam, quam Plinius in Hispania inuentam refert per D. Augusti tempora à Cantabris repertam, nasci vbique caule iunceo, pedali, in quo sunt flosculi oblongi veluti calathi, in his semen perquam minutum. Alij cantabricam potius esse volunt Hispanorum *Scorzoneram*, contra venena omnia famosissimam, de qua nos alibi. Alij iphyum Theophrasti, quod esse ait herba graminæ simile, siccum esse, radice lignosa, semine feri, æstate florere. Est autem à Tiphys seu Tiphys ductum, quod animaduertendum est diligenter, ne tanta vocum affinitas imprudenter fallat. Iphyum enim coronariū est. Tiphys verò in coronarum usum non veniunt. Præterea Tiphys hoc ferè peculiare, quod prima statim germinatione ante foliorum ortum florem promant, quod in Bechio ac pefasite videmus accidere, vt non immerito quidam existiment à Theophrasto ea Tiphys nominari. Anguillara lotum asphodelum iphyum esse suspicatus est. Alij cum Ruellio caryophyllos nostrates veteribus incognitos fuisse existimant, mirum creditu tam celebrem florē, tam iucundum, fuisse à veteribus silentio prætermisum, qui amplitudine, pulchritudine, varietate rosa non inferior videri possit. Caryophyllus alius satius, alius siluestris, hic minor, ille maior, qui foliis est longis, carnosus, duris, angustis, in extremo acuminatis, incanis, cauliculis multis, iuncea, rotundis, geniculatis, lauibis, cubitalibus aut altioribus, coeuntibus pyridatis internodiis, in quorum & iis adnatorum cacuminibus calices sunt longi, teretes, glabri, orbiculo superiore denticulati, è quibus flores omnium speciosissimi prodeunt, ex senis foliis, qui simplices sunt, ex multo pluribus multiplices, per extremas oras scitè fimbriati, caryophyllorum odoratu, sed longè suauissimo, colore alias purpurascēte dilutiū, alias intensiore rubore nitente, alias candido. Sunt & non pauci albi & purpureis punctis aspersis versicolores qua coloris varietate & odoris suauitate cum rosis de principatu certant, ex flore medio staminei exeunt gemini apices candidi: semen in oblongis vasculis minutum & nigrum, radix promissa, simplex, geniculata. Minor siue siluestris caryophyllorum species, priori simillima est caulibus, sed humi stratis foliisq; sed dum colitur in areis hortorum, latioribus, vtrisque tamen minoribus, ex





bus, ex oblongis quoque paruis & teretibus calicibus flores promit minores, non ita foliosos, per ambitum quoque dissectos ac fimbriatos, candidos aut purpureos, nec odore perinde fragrant ac superiores. Caryophylli maiores in hortis coluntur, speciosissimi in fistilibus vasis. Seruntur frequentius auulsis exiguis cum foliis furculis, semine rariùs. Nam è semine nati ad naturam agrestem redeunt, floresque, minores & simplices, etiamsi prius multiplices fuerint, producant. Siluestris caryophyllus plurimus vbiuis reperitur in saxosis, montosis & siluosis marginibus calidarum & frigidarum regionum, seruntur etiam in hortis. Non desunt qui olitores credant furculis stylo perforatis caryophylla aromatica inferuisse, quo iucundum illum odorem flores illicerent, & caryophyllorum suauitatem expirantes naribus repræsentarent, vt ex flore minùs odoro quàm odoratissimù, & ex ferra siluestriq; herba mansuetam facerent, quæ iucundo odore caryophylli suauitatem mentiretur. Quod si verum est, siluestris à satiùo nisi cultu & mangonio differt, quod tamen nonnulli inficiantur. Florent tota æstate & autumno, viuace horum planta, multisque annis durante, si hyeme à frigoris iniuria defendatur. Sæpe, inquit Ruellius, in cellis vinariis tota planta fruticare visâ hyeme, fauente loci tempore, & flores interdum parere. Aliud tradit non omittendum, sæpe visam herbâ vno anno florem parere candidum, altero purpureum, tertio colorum varietate promiscuum: & quod mirabilius videri possit, ramum eundem niueum & vermiculatum proferre florem, tam prona huius herbæ natura, vt flos albus in purpureum, & purpureus in candidum studio cultus, aut vbertate commutantis soli degeneret. Calidum siccumque esse odor & sapor amariuscule demonstrant. Tradunt recentiores flores præsertim purpureos ad animi deliquia, & cordis tremorè valere, ad vertigines, epilepsiam, paralyfim, conuulsiones, ex betonica vel amaraci decocto potos: Saccharo conditos perinde ac rosas, vtiles non solum ad supradicta, sed etiam aduersus venena omnia, & venenatorum animalium morsus, & ictus. Dari etiam ad interaneorum animalia necanda, & ad pestis contagia. Valentiùs tamen succum id præstare ex tota planta expressum: haustum enim quatuor vnciâ-

*Locus.*

*Tempus.*

*Lib. 2. c. 149*

*Temp. &*

*Vires.*



rum pondere, à morbo qui iam inuaserit liberare. Siluestrium radices trium drachmarum pondere haustas ex mero, à vipera demorsos sanare. Eorundem succum calculo atterendo & educendo, nec non comitali morbo laborantibus vtilem esse, fit ex altium floribus detractis vnguibus acetum iis in eo insolatis, quo naribus illito reuocantur animi deliquio consternati. Idem quoque vtile est pestilenti auræ arcende, naribus, arteriis, manibus quotidie eo irroratis.

## ARMERIA.

## CAP. VIII.

**Nomina**

Lib. 2. c. 149  
& lib. 3. c. 77  
Lib. 2. c. 7.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.

**Forma.**

Cap. 19.  
Cap. 132. hi.

Ibid.  
Armeria  
Dodo.



CARYOPHYLLORVM siluestrium siue minorū species videntur esse, quæ Gallis *Armoiries*, Ruellio *Armeriæ* & *Armerij* flores dicuntur. Primam Dodonæus *Vetonicam* coronariam seu altilem minorem vocat, Germanis *Mut-vuillen*, quidam *Hochmut*, id est, Superbam, Belgæ *Pluymkens* à florum foliolis fimbriatis & plumarum ritu dissectis. Caryophyllo altili caulibus, foliis, floribus similis est, sed multò minoribus, folia sunt longiuscula, angustiora, cauliculi tenues, nodosi, pedales & cubitales, in quibus flores odoris suavis, superioribus similes, sed simplices, ex quinis, aut senis foliolis, altioribus & angustioribus crenulis fimbriati, candidi, aut purpurei, deinde siliquæ acuminatæ semen comprehendentes. Elegantiæ & odoris causa in hortis habetur. Hanc idem

Dodonæus in florum historia caryophylleum minorem, atque etiam *Vetonicam* altilem, seu coronariam minorem vocat, Fuchsius *Betonicam* siluestrem alteram. Primum verò *armerium* florem Dodonæus in florum historia eum facit, quem Germani *Dondernegele*, *feldtnegele*, Belgæ *Keykens*, quasi dicas fasciculum florum, in quibusdam Picardiæ locis *Cuydereles*, vocant, qui cauliculos habet rotundos geniculatos veluti caryophyllei flores, circa inferiora genicula sæpius rubetes, cubito breviores, folia oblonga, sed aliquanto quàm maioris caryophylli latiora, colore herbaceo virentia, flosculos in summis cauliculis paruulos, exiguis caryophylleis similes, verum minores, plures simul in quandam veluti umbellam congestos, particu-

ARMERIA VETONICA,  
Coronaria.

ARMERIA Prima Dodonæi, siue  
Caryophyllus minor siluestris, Lob.



latim



latim frequentius prodeunt, & semper ferè cocci rubore splendentes, punctis interim candidis circa medium interdum variegatos, rarissimè candidos. Ornat hic flosculus Belgicorum hortorū areas, apud Italos & alibi locis incultis & aridis exit. flosculus Belgicorum hortorū areas, apud Italos & alibi locis incultis & aridis exit. Istam, in stirpium historia Dodonæus, Vetonicā veram, seu herbam Tunicā nuncupat. Fuchsius Betonicam siluestrem vnam. Armeria secunda siue siluestris Dodonæo est siluestris Vetonicæ species, Gallis *Armoiries sauvages*, Germanis *Gauchblum*, id est, flos cuculi, Belgis *Cracynblœmkens*, id est, cornicis flores. Armeriæ seu Vetonicæ altit affinis est, cauliculis geniculatis, foliis brevioribus, latioribus, & multò magis candicantibus quàm caryophylli, aut armeriæ primæ folia, flores frequentius rubent, interdum candidi sunt, altius crenati, simpliciores, inodori, semē in oblongis siliquis continetur. Exit passim in pratis vliginosis, & locis riguis herbidisque, Maio & Iunio mensibus. Quibusdam odontitis Plinij cap. 12. 27. inter fœni genera: cauliculis densis, ab eadē radice, geniculatis, triagulis, nigris. In geniculis folia par-

Lib. 2. c. 7.  
Cap. 132. h.  
Armeria  
silue.  
Lib. 2. hist.  
cap. 7.

Nomina  
Forma.

Tempus.

ARMERIA Secunda siue  
siluestris, Dodon.



MISCIPVLA siue  
Armeria altera.



ua habet, longiora tamen quàm iolygonon. Semen in alis hordeo simile: florem purpureum, pusillum. Nascitur in pratis. Decoctum cauliculorum eius in vino austero, quantum manus capiat, dentium dolori medetur, ita vt contineatur ore. Hanc venenis cōmendant, inquit Pena, qui putant Tunicem esse, nec prorsus falluntur, quia nō frustra opem experiuntur, & nonnullis practicis Arabibus etiam Tunix vocatur, non secus atq; polemonium Belgarum, siue Ocimastrum, quod est Gordonij Tunica. Tertia quædam est Dodonæo in florū Historia, Armeriorum florū species, cauliculis rotundis, geniculatis, tactu glutinosi, pedis altitudine: foliis ex singulis geniculis binis, oblongis, angustis, acuminatis, in virore candicantibus & quasi cæsiis: floribus in umbella similiter pluribus, simul congestis, pulchris, Armeriis similibus, verū minoribus & rubentis dilute purpureæ colore: semine in oblongis vasculis pusillo: radicibus tenuibus & fibratis. Seritur in Hortis: floret à Maio aut Iunio mense in autumnū vsq;. Quidam volunt Limonij, aut Behen vulgò nunc dicti speciem aliquam esse. Est Lobellio Lychnis siluestris altera, & Behen rubrum

Locus.

Vires.



Salamanticum Clusij. Dicitur etiam à Lobellio Muscipula seu Armorata altera, fortasse flos Constantinopolitanus alter minor Gesneri.

*VIOLA BARBATA MAIOR. CAP. IX.*

*Nomina*

*Genera.*

*Forma.*



SIMILITVDINE floris violas appellant herbarij plantas hinc depictas, easque duum generum. Vna enim viola barbata latifolia, alia viola barbata angustifolia dicitur. Viola barbata latifolia radicibus nititur longis, nigricantibus, tenuissimis fibris capillaris, huc illuc repentibus, furculosis, caulis in cubiti altitudinem assurgit, nonnunquam breuior proceriorve, pro foli pinguis macrive natura, geniculatus, septem plerumque aut octo internodiis constans, rotundus, folia bina ex singulis internodiis exeunt, latiora quam in cæteris huiusmodi violarum generibus, venosa: in caulis cacumine quindecim aut sexdecim, interdum etiam pluium vaginularum coaceruatur fascicu-

*VIOLA Barbata,  
Latifolia.*



*Locus.*

*Locus.*

*Tempus.*

*VIOLA Barbata,  
Angustifolia.*



lus, extantibus vndiq; veluti barbæ pilis elegantissimè ornatarum, vnde viola barbata nomen positum fuit. Hæ particulatim florent sub finem Aprilis, vt ex tanto numero quinque aut sex duntaxat dehiscat, flos puniceus, albis punctis plurimis & minutissimis distinctus, quinque foliolis constat, eminentibus, in medio tenuibus filis propemodum caruleis, eximiaq; sui pulchritudine oculis inuentium arridet. Semen in oblongis vasculis maturefcit. Sponte in pratis humidis, & riguis pascuis

nascitur, colitur etiam in Hortis ob floris venustatem. Viola barbata angustifolia radice est breui, candida, modicè fibrata, foliis gramineis, sed longioribus, nigrioribus, aliquantum hirsutis, propè radicem multis, in caule paucis, binis per interualla, ad caulis nodos alarum modo iunctis, caule nunc singulari, nunc multiplici, geniculato, pedali, furculis ex alarum sinu non binis ex aduerso, sed singulis ex altera tantum parte prodeuntibus, in quorum fastigio caliculi multi, longi & graciles in multos veluti barbæ pilos extremo orbe diuisi, vnde barbatam appellarunt. Flos est puniceus, elegantissimus, sed minimus, coloris tamen nitidissimi, & imprimis viuidi. Sabulosis, macris, lapidosi, sed aprici gaudet. Floret Maio & Iunio mensibus.

*CALTHA*



CALTHA HORTENSIS. CAP. X.



QVÆ Calendula recentioribus dicitur, quod singulis ferè mensiū calendis floreat, Italis eadem de causa *Fior d'ogni mese*, Hetruscis, Matthiolo teste, à floribus colore *Fior raucio*, Germanis *Ringelblumen*, ab intorto, & in circulum acto semine, Gallis *Soulfi*, idest, Solis equiū, quod sub vespera flos contrahatur, non est tamen heliotropium, multò minus scorpioides, sed veterum præsertim Poëtarū Caltha, dicta fortasse à calathos, qui qualis illis Latinis, Seruio teste, poculum & calix est, cuiusmodi ostendant calendulae florum

Nomina

In cap. 186. lib. 4.

CALTHA Poëtarum.



pocula flaua. Caules tres aut quatuor gerit striatos, fungosa intus medulla, in quibus folia oblonga, ex angusto in latius se expandentia, mollia, nonnihil lanuginosa, flores in summis caulibus pulchri, cum grauitate quadam odorati, qui Occidente Sole contrahuntur, manè eodem Oriente explicantur, singuli in medio sui orbem circinatum vmbonemve gerunt luteum croceumve permultis foliolis luteis, vel aureis stipatum (vnde Chrysanthemū Dioscor. vocat Lobellius) in medio multa, breuia, simul compressa, lutea vel subnigra stamina: semen à singulis floribus numerosum, recuruum: radices fibratae. Cur autem hanc herbam Caltham esse credant herbarij, facit imprimis Plinius, qui Caltham odoris grauis esse scribit, deinde Vergilius, qui de ea sic cecinit.

Forma.

Lib. 21. c. 6.

Ecl. 2.

*Mollia luteola pingit Vaccinia caltha.*

Lib. 10.

Et Collumella,

*Candida Leucoia, & flauentia lumina caltha.*

Quæ de Calendula rectè dicuntur, cum grauitate quadà odorata, & auri luteo colore splen-

dente. In hortis & cultis copiosissimè, & in multis aruis Galloprovinciae & Narbonae & incultis fruticat. Calendulae flos calidus est secundo propemodum ordine, præsertim exsiccat. Creditur cor roborare, venenis resistere, & aduersus pestilentes febres quoquomodo sumptus efficax esse. Fuchsius ex vino potum mentes citare, & suffitum secundas elicere, item ad capillos flauos reddendos conducere scripsit. Herbae folia calidiora sunt, acrimoniam enim quandam feruidam habent, sed quæ propter humiditatem ei coniunctam non protinus se exerit, ob quam in olere sumpta aluum mouent & leniunt. Fuchsius succum dentium dolores sedare tradit, si os eo colluatur. Alij ad idem puluerem foliorum cum xylino dentibus admouent. Sunt etiam qui herbam acetariis admisceant. Calendula auctore Matthiolo, excalfacit, extenuat, aperit, digerit, & prouocat, quamuis gustu adstrictione non carere deprehendatur. Constat sexcentis feminarum experimentis eandem valere plurimum ad menses ducendos, præsertim epoto eius succo, aut herba ipsa recente diutius deuorata. Datur quoque succi vncia addita lumbricorum terrestrium pulueris drachma vtiliter morbo regio laborantibus. Sunt qui dicunt herbæ huius vsu acui indies oculorum aciem. Constat autem stillatitiam floride plantæ aquam oculorum ruborem & inflammationem arcere, si oculis instilletur, aut si linteola in ea macerata superponantur. Quidam Caltham, esse Theophrasti Cerinthum, quasi *κρηανθή*, cereum florem, à Cerinthe Plinij diuersum, credunt:

Locus.

Temper.

et Virtus.

Doson de

lib. 21. c. 6.

Cap. 14.

hitt.

Ibidem.

Ca. 186. li.



conueniente colore floris, ac florefcendi tempore. Nam circa Februarij exitum fata, incunte Iunio florere incipit, florem in hyemem vsque prorogans, ac si hyemis rigorem pertulerit, siluestris præsertim, cum Leucoio bulboso & Viola flamma, siue cheiri, florem renouat.

## MELANTHIVM.


## CAP. XI.

- Nomina** **M**ELANTHION Græcis & Μελάνθεριον teste Plinio, Gith Latinis, Officinis Nigella. Melanthium autem & Melanspermum, & Nigella à nigro seminis colore hæc herba dicta est, Arabibus *Xanim*, *Snnis*, seu *Sunizi*, Gallis *Poyurette* & *Nielle*, Germanis *Schuuartz Rommich*, seu *Schuuartz kumel*, Hispanis *Negmillia*. Apud Dioscoridem & alios veteres vni duntaxat Melanthij mentio extat. Posteriores quatuor eius differentias obseruunt. Nigellam satiuam vulgarem, Romanam, odoram, & Nigellam à citreo seminis colore citrinam Officinis vocatam, alioqui illi persimilem: cui persimilem pinxit Lobellius solo floris amœna duplicatione distantem: Nigellam siluestrem duplicem. Melanthium satiuum frutex est paruum, ramulis tenuibus, altitudine palmorum duorum, vel maior, foliis paruis, senecionis herbæ similibus, multò tamen tenuioribus, capitulo in cacumine exiguo, ceu papaueris, oblongo, quod interius membranas intercurrentes habet, quibus semen includitur, nigrum, acre, odoratum. Qua descriptione Dioscoridis, Melanthiū satis apertè nobis innouit. Caulem enim fert in hortis nostris sarculosum, pedalem, folia dissecta, fumarie ferè, sed magis virentia. Flores in ramulorum verticibus coloris cerulei diluti, singulos in quinque foliola diuisos rotæ parue instar, iis discussis capitula in summo corniculata, singula intrinsecus quinque aut senis loculis discretæ, in quibus semen continetur ce parum semini simile, acre, odoratum. Eadem planè est Nigella citrina, si seminis colorem exceperis. Eadem folia, capitula, membranulis intersep-

MELANTHIVM  
satiuum, Matth.NIGELLA Citrina, flore  
albo multiplici.

tibus





MELANTHIVM  
 Silueſtre alterum. Matth.



tibus diſtineta, flores purpurei pallētes, ſemen multum, odorum. Idem odor, ſapor, viſ, vſus. Melanthium ſilueſtre duū generū caulibus eſt hortenſi ſerē ſimilibus, quemadmodum & floribus diſſert tantū foliis tenuioribus, multifidis, capillaceis, & odoris præſtantia, acrimoniaq; vincitur, ſed in ſilueſtri ſecundo loco depicto flores & capitula ſunt, quā in ſatiuo maiora, in eo quod priore loco depicatum eſt, longiora, & veluti in quinque cornutas ſiliculas diuiſa, cornibus in ambitum repandis retrō flexis cuiuſmodi Aquilegia fert. Melanthium ſatiuum non niſi in hortis ſatum prouenit. Nigella citrina ex Syria aliſq; Orientis emporiis aduecta, Anglicis iam & Germanicis hortis copioſior eſt quā Italicis, vbi quæ cæteris antecellit, Romana vocatur, alioqui Romæ vel in hortis pauca. Silueſtria Melanthia inter ſegetes, & in agris aliſ proueniunt. Iunio menſe florēt, Iulio & Auguſto ſemen edunt. Melanthij ſemen panibus inſpargitur, vt ſcribit Dioſcorides, capitis doloribus illitum fron-

Locus.

Tempus.

Lib. 3. c. 78.

Vires.

Temper.

ti, & incipientibus ſuffuſionibus cum irino tritum & naribus inſuſum prodeſt. Tollit lentiginēs, lepras, œdemata vetuſta, duritiāq; cum aceto illitum: circūſcari ficatos clauos excutit cum vetere vino impoſitum. Dentium doloribus cum aceto & teda decoctū, ſi eo colluantur, ſuccurrit: rotundos ventris lumbricos expellit ex aqua vmbilico illitum: tritum autem & in linteo ligatum & olfactum catarrho laborantes



laborantes adiuuat. Pluribus diebus potum vrinam, menses, & lac prouocat: difficultatem spirandi cum vino potum. Finit (Andr. lac legit in antiquo codice, *πρόβρον δὲ πλεῖστος ἡμέρας, ἐμμηνα, καὶ ὄρα, καὶ γάλα, τὸ ἐλμυθὸς ἀγὰ. πάλιν δὲ καὶ διόσπειρον μετὰ νίτρος πῶθεν.* Id est, Potum autem pluribus diebus, menses, vrinam, lac & lumbricos educit: quod si bibatur cum nitro, sedat respirationem difficilem) Phalangiorum moribus drachmæ pondere cum aqua haustum auxiliatur: suffitu serpentes fugantur. Tradunt largius potum enecare. Eadem ferè Plinius tradidit. Gith ex Græcis alij Melanthium, alij Melanspermum vocant. Optimum quàm excitatissimi odoris, & quàm nigerrimum. Medetur serpentium plagis & scorpionum. Illini ex aceto & melle reperio, incensoq; serpentes fugari. Bibitur drachma contra araneos. Destillationem narium discutit tufum in linteo olfactum. Capitis dolores illitum ex aceto, & infusum naribus mitigat. Cum irio oculorum epiphoras & tumores lenit: dentium dolores coctum cum aceto. Vlcera oris tritum & commanducatum. Lepras & lentigines ex aceto tritum emendat: difficultates spirandi addito vino potum: duritias tumoresq; veteres, & suppurationes illitum. Lac mulierum auget continuis diebus sumptum. Colligitur succus vt hyoscyami. Oculos purgat, vrinam & menses ciet. Similiter largius venenum est, quod miremur, cum semen gratisimè panes etiam condiat. Quinimo linteo alligatis tantum granis triginta, secundas trahi reperio. Aiunt & clavis in pedibus mederi tritum in vrina: culices suffitu necare, item muscas. Galenus eius temperamentum & vires accuratius distinxit his verbis. Melanthium excalfacit & desiccatur tertio ordine. Videtur etiam tenuium esse partium: hoc enim nomine catarrhos sanat in linteo admotum, atque assidue olfactum. Quinetiam si intrò in corpus sumatur, vel maximè flatus extinguit: vnde constat ipsum essentia esse tenuis, & ad vnguem à caliditate elaborata: propterea sanè etiam amarum est. Itaque mirum non est si lumbricos interimat, non esum modo, sed etiam foris impositum. Neque sanè etiam mirandum si lepras, clauos, myrmecias eiiciat. Sic verò etiam orthopneam iuuat, & menses prouocat, qui ob crassitudinem aut viscedinem retenti fuerint. In summa vbi incisione, extersione, desiccatione, excalfactione est opus, præstantissimum id remedium est. Hæc Galenus. Symeon Sethi his addit, si cum melle fermentetur, & ex calida aqua hauriatur, calculos in renibus & vesica minuere, vrinam ciere, menses ducere, & veluti remedium contra venena esse, si quis ipsum ieiunus assumat. Scribit Petrus Pe. Melanthij semen pingue oleo efficacissimo reddendo aptum quo puerperæ mulierculæ excludendo partui, atque symptomati hysterico propellendo multum vtuntur, vocitantq; vulgi persuasionem Nardinum, nempe odoris suauitate & efficacia haud dispari. Istud oleum prælis expressum, nigro, sed limido colore, pauca quantitate haustum splenis tumores duritiesq; demollitur, sicq; foris illitum. Citrina Nigella Itali multum vtuntur etiam in condimenta, in placentas, sinapiq; addunt. Siluestrium feminum nullus vsus, quia meliorum copia superpetit.

## LYCHNIS.

## CAP. XII.

Nomina

Lib. 3. c. 17.  
Lib. 10.

VAM Græci Lychnida vocant, Gaza Lucernulam vertit, Athenienses terpres modo Ballariam, modo Genicularem, alij Vallariam. Hæc multis aliis nominibus tamen inter notha relatis nuncupatur, & θάλασος enim dicitur, id est, immortalis, quod diutius venustatem suam retineat: item ἀκυλόνιον, βαλλάρειον, γερανόπεδον, id est, gruis pes, κορυμβίον, & hanc esse corymben Ruellius esse iudicat, cuius Columella hoc senario meminit.

*Nunc veniat quamuis oculis inimica corymben.*

Coronis enim inserta igneo micans aspectu oculorum aciem obtundit. Iam & Lychnis



Lychnis ista Taurion dicitur. Alia tamen, inquit idem Ruellius, quæ Taura, siue Tora vulgò dicitur venenata herba est. Nominatur præterea & σκῆπτρον, item μαδῆιον. Dioscorides Lychnides duas breuiter perstrinxit, & φανουλίχην, idest, coronariam, & ἀγρίαν, idest, siluestrem. Herbarij plures adnumerant, omnes à floribus flammeo colore, lucidave, aut sanguinea purpura fulgentibus, quasi lucidos luculentosve flores dicas, vel quod tomentosis earum foliis veteres ad lucernarum usum pro ellychniis vterentur, λύχνος enim lucernam, & ἐλλύχνην lucernæ feniculum significat. Lychnis sativa siue coronaria, Ocellus, Gallis *Oeillet* dicitur, & *Oeillet* Dien, Parisiësisbus *Passerofes*, Germanis *Franuenroszlin*, *Marienroszlin*, & *Himnenroszlin*, idest, dominarum rosa, mariana rosa, Cæli rosa, & cæli flos, Belgicè *Christus ooghen*, idest, oculus Christi. Lychnis silvestris, Gallis *Oeillet sauvage*, Germanis *Margenroszlin*, & *Waldemargenroszlin*, Belgis *Senettekens*. De utraque Lychnide succinctè hæc Dioscorides. Lychnis coronaria flos est leucoio similis, sed purpureus, qui in collaras nequitur. Lychnis silvestris sativa prorsus similis est. Plinius de rosa tractas,

Lib. 3. c. 97.  
Genera.

Lib. 3. c. 98.

Lib. 21. c. 4.

LYCHNIS Coronaria,  
Matthioli.



Est & quæ Græca, inquit, appellatur à nostris, à Græcis Lychnis, nō nisi in humidis locis proveniens, nec vnquam excedens quinque folia, violæ magnitudine, odore nullo. Idē aliquanto post de floribus singulorum anni temporum agens, inter æstivos flores Lychnida recenset ex Theophrasto, vt initio diximus. Ex hac Lychnidis cum rosæ & violæ floribus collatione, peritorum herbariorum cōsensu Lychnides veræ sunt, quas hīc pinximus. Ex his sativa caules profert cubitales, teretes, canos & lanuginosos, geniculatos, ramosos, folia oblonga, magnitudine foliorum leucoij vel saluæ, staccida, incana, tomentosa, vti Æthiopis in singulis cauliculorum & ramulorum summitatibus: flores emicant ex calicibus crenatis, Pseudomelanthij æmulis, aspectu pulchri, sed inodori, violæ matronalis floribus maiores, rosea purpurea rutili atque nitore splendentes, oculorumq; aciem interdum præstringētes Pyropi, aut Lychnidis lapidis modo, vnde nomen vtrique cōmune fuit, ex quānis sapius, rariùs ex senis foliolis congesti, in quorum mediō apices sunt acuti & pungentes. Radix longiuscu-

Cap. 11.

Forma.

la, tenuis, fibrata. Reperitur etiam in hortis cui flores candicant, aut dilutè rubent, sed rariùs, & illic neglectæ. Sed illa, vt omnium pulcherrima, inquit Pena, ita sedulo colitur sola, ideoq; flores adeò confertos & multiplices fert, vt postea semine orba sit, exhausta nimirum formæ vi, & pabulo in florum cōmodum absumpto, vt de viola Martia diximus. Sunt qui hanc Lychnidem, *Ἰδὸς ἄνθος*, idest, Iouis florē esse credant, qui faciliè Theophrasti auctoritate refelluntur, inter æstivos flores separatim Lychnida & *Ἰδὸς ἄνθος* recensentis, quod & facit Plinius eadē Theophrasti verba referens. Lychnis silvestris geniculatis caulibus, foliisq; mollibus supra dictæ Lychnidi satis similis est, minùs tamen cana & lanuginosa, foliis item angustioribus, & caulibus gracilioribus, tenerioribusq; ac magis surculosis: floribus etiam minoribus, candidis, aut rubentibus, magis infectis, nullis in medio apicibus, calicibus tamē maioribus, rotundis, hirsutis, alioqui similibus: radix longa est,

Locus.

Lib. 6. hist.  
cap. 7.  
Li. 21. ca. 11.

& digiti



Lib. 3. ca. 9.  
hist.*LYCHNIS Siluestr.*  
*purpurea, Dodon.**Locus.*

planta plurimum differt. Siluestris duæ priores iuxta prætorum aruorumq; margines, & iuxta satorum sepes exeunt. Transuectæ verò vtriusq; ue in hortos cultu,

Fol. 142.


*LYCHNIS Multiflora*  
*Anglica, Pena.*

describemus. Prima geniculatos habet cauliculos, in multas calas diuisos, pedales aut maiores: folia in singulis geniculis bina, ternave, interdum plura, angustiora quam reliquarum, in virore candicante & quasi cæsia: flores in summis ramulis, ex quinis, non pluribus foliis bifulcis congestos, interiore parte candidos, exteriori purpurascens aliquantulum, & antequam omnino tabescant, sese contrahentes & circumuoluentes: calices duos admodum, breues & subrotundos, semen paruum,

& digiti sæpè crassitudine. Huic alia prorsus similis est, auctore Dodonæo, atque eadem foret, nisi minor esset, & radix breuior, flores semper purpurei. Istam Lichnidem, ocinoides purpureum multi esse putant: superiorè item Ocinoides album. Alia Lychnis siluestris ex Dalechampio hic proponitur nõ ei dissimilis, quæ post hac tertia Clusij est, radice breui, candicante, modicè fibrata, foliis circa radicem multis, in orbem humi stratis, oblongis, angustis, acuminatis, nigricantibus, lanuginosis, plantaginis minoris propemodum figura, caule nunc singulari, nunc multiplici, palmum alto, nodoso, villosa, foliis per caulem semper geminis, pari intervallo exeuntibus, gustu farinis, & subausteris, flore Lychnidis satius minore, purpureo, semine copioso in folliculis turbinatis, qui multis lineis virgati sunt, & lacteo viridiq; colore distincti. A Lychnide siluestri purpurea Dodonæi, quod ocinoides purpureum multi esse autumant, hæc

inquit Pena, flores adeo fertura luxuriant, ut maximè Africanū florem, vel rosam æquent, vel superent. Lychnidem aliam siluestrem ex Mycono hic proponimus, quæ radicè est fibrata, palmum longa, nigricans, neruū intus habens, in profundum acta, sapore dulci cum adstrictione. Ex ea ramulos fundit multos, rotundos, villosos, incanos, vix palmum excedentes, in quibus folia angusta, pilosa, incana, per cauliculos incerto ordine distributa, leuiter adstringentia in summo caulium vertice flores exeunt campanellæ similes, quales in conuoluulo, rotundi, ex candido nonnihil purpurei. In montibus & locis maximè siccis prouenire Myconus ait, nec alibi à se visam quam in montibus D. Mariæ à Monteferrato. Floret Maio mense. Lychnidis speciem ident Myconus appellauit à foliorum figura, & florum quadam similitudine: quamquam non tam calida sit ac reliquæ Lychnides à Dioscoride & Galeno explicatæ. Sunt plures Dodonæo Lychnides siluestris, præter quas aliquot alias obseruauit Clusius, quas ex eodem





LYCHNIDIS Siluestr. alte. Clusij,  
 Papauer pumū quorundam.




paruum, rotundum papaueris rhaadis, sed cinereum continentes: radicem satis crassam, candidam, multifidam, sed non perennem. Altera caulibus est superiore crassioribus, rotundis atque etiam geniculatis: foliis per genicula semper binis, ordine dispositis, superioribus colore similibus, sed multò maioribus: floribus pluribus in umbella congestis, pulchris, rubris, quinquepartitò etiam diuisis, non tamen bifidus, semen in vasculis tenerioribus superiori simile continetur: radix crassior est, magisq; fibrosa, hyeme tamen vt illa perit. Tertia caulis est geniculatus, sed paucioribus alis concauus: folia etiam bina ex singulis geniculis prodeunt, sed superioribus magis virentia, & firmiora, flos in singulis alis, secundæ similis ferè, sed maior & obsoletioris coloris, cuius etiam foliola bifida sunt: calix crassior quàm in superioribus, tunica siue membrana dura & valde striata tegitur, cinerei coloris, in quo semen cinereum reliquis maius: radix est singularis, non admodum fibrosa, quæ etiam hyeme perit. Quarta ex singulis geniculis pedales ramos profert, geniculatos, folia priori ferè similia, sed aliquantulum latiora, & intenso virore ferè nigricantia: flores ex quinque etiam foliolis constantes, rubentes: semen in caliculis simile superioribus, sed minus & subnigrum: radix crassior secundæ similis, hyeme etiam perit. Quinta multi caules ex vna radice pro-

Zz

LYCHNIDIS Siluestr. I. Clusij  
 Behen album & almantinu.





*LYCHNIS Siluestr. III. Clusij**Cauliculus striatis.**LYCHNIS Siluestris*  
*V. Clusij. Hirta Lob.**LYCHNIS Siluestris**IIII. Clusij.*

deunt etiam geniculati & rotundi, sed lanuginosi, longiores, infirmiores, & in terram procumbentes: folia in singulis bina, oblonga, mollia, & lanugine quadam canescentia, inter quæ flores alternatim secundum ramulorum longitudinem nascuntur, superioribus forma similes, sed maiores & dilutiore colore rubescentes: semen in valvulis superioribus simile, sub-rufum: radix crassa, & fibrosa. Sexta omnium minima, cauliculo assurgit circiter palmum alto, geniculato, tenui, lanuginoso: foliis ad singula genicula binis, oblongiusculis, exiguis, lanuginosis: flores inordinati, & alternatim ex singulis geniculis prodeunt, parui & pulcherrimo rubro colore purpurascetes, & caliculo oblongo lanuginosoq; insidentes: radix tenuis & inutilis. Nascuntur sponte quatuor priores in aruis, & inter segetes pingui solo, pleriq; castellæ veteris locis. Belgij in hortis florent à mense Maio in Autumnum usque. Omnes cum adoleuerint, lento quodam & glutinoso humore superiore parte illarum videntur: quarta maximè, cui plerumque culices, muscæ & formicæ tanquam visco capte adherent. Quinta in marginibus quorundam agrorum istuc inuenitur: floretq; quo reliquæ tempore. Sexta collibus Salmanticæ vicinis inter saxa prouenit, & Maio mense floret. Duas priores Salmaticenses Behen appellabant, albū videlicet & rubrum, tertiā ocimoides. Sed omnes ad Lychnidis siluestris

mica tanquam visco capte adherent. Quinta in marginibus quorundam agrorum istuc inuenitur: floretq; quo reliquæ tempore. Sexta collibus Salmanticæ vicinis inter saxa prouenit, & Maio mense floret. Duas priores Salmaticenses Behen appellabant, albū videlicet & rubrum, tertiā ocimoides. Sed omnes ad Lychnidis siluestris



LYCHNIS *Siluestris*  
*minima, V l. Clusij.*



siluestris genus commodius referri posse Clusius existimat, cui valde similes sunt, notisq; ferè omnibus conueniunt. Sunt qui alteram & quartam inter Armerios flores numerant: semen tamè Lychnidi simile & minimè planū, aliāq; notæ eorum sententiam conuellunt. Quinta Lychnidi Myconi satis similis. Sexta ad Saponariam nostram minorem satis accedit, de qua paulò post dicemus. Hæc ex Clusio. Lobellius Lychnidem siluestrē alteram incanam cauliculis striatis pictura hac expresit. Papauer spumeum quorundam. Dodrantalis est herbula, Lychnidi marinæ facie proxima, (nusquā nisi in Galloprovinciæ & Italiæ campestribus & vinetis se reperisse ait) quinis & fenis sesquipalmaribus ramulis & foliorum gemino positu, effigie & hortu, humile Nigellastrum apprimè refert, sed quini striati confertim stipati semen claudentes florum caliculi, Lychnidis marinæ. Vniuersa planta albicat, gustu præficcò, & nonnihil calido. Videtur quarta esse Clusij suprà descripta. Siluestres plurima æstatis parte, & in autumnum vsque

florent. Lychnidis satinae semen, auctore Dioscoride, cum vino potum à scorpionibus ictis auxiliatur. Siluestris semen duarum drachmarum pondere potum biliosa per aluum ducit, ictis à scorpione conuenit. Aiuat huius herbæ appositum scorpionibus torpescere, & inertes prorsus reddi. Galenus Lychnidis coronariæ semen scribit calidum esse secundo quodammodo ordine, aut iam etiam tertio, ficcum sanè eodem modo.

Tempus.

Vires.

Lib. 3. c. 98.

Li. 7. simpl.

FLOS CONSTANTINOPOLITANVS.

CAP. XIII.

**L**YCHNIDIS generibus, est planta illa Chalcedonica miniata, siue Constantinopolitana, quam Constantinopolitanum florem vocant, alij Hierosolomitana, alij Creticum: cui caules sunt multi, bicubitales, graciles, teneri, geniculati, asperi, ex singulis geniculis folia bina, neruosa, alarum instar caulem amplectentia, in acutum desinentia, latiora propè caulem, nullo pediculo subuecta, oblonga, quandantenus Lychnidis siluestris, sed nonnihil viridiora, hirsutiora, asperiora, flores in latis umbellis multi simul congesti, quinque bifidis foliolis constantes, colore floris calendulæ, vel lilij purpurei, aut cocci, sed viuidiore, aspectu pulcherrimi, cæterum inodori, adeò vt quemadmodum multi alij coronarij, florum voluptate duntaxat arrideant, & merito Lychnis omnium pulcherrima sit habenda: Semen in oblongis & acuminatis vasculis exiguum, & nigrum: radices oblongæ, in radículas multas diuisæ, gustu aliquantum acres. Peregrinus est flos, qui fertur in hortis. Iunio & Iulio mensibus floret altero à satione anno. Esse & huius alteram & minorem speciem refert Dodo. cubitalem aut paulò altiore, rarioribus floribus, quæ primo anno flores profert, Gesnero teste. Hæc plantæ struthium siue

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

De flo. c. 2.



## FLOS Constantinopolitanus.



lanariam, Arabum *Condifi* non esse (id quod tamen nonnullis visum fuit) demonstrant Theophrastus & Plinius, qui struthium spinosam siue aculeatam esse stirpem tradunt, qualis huius floris stirps non est, neque isti radix magna, nec olea folia vti struthio sunt. Lanas tamen expurgat saponariae ritu. Dodonæus in eorum sententiam inclinare videtur, qui florē hunc *πρόιον* veteribus dictum esse suspicantur, quod *πρόιον* florem Theophrastus, Plinius, Athenæus inter æstivos recenseant, duorumq; esse generum referant, vnum hyacintho similem, alterum *ἄχουῖον*, idest, non coloratum siue candidum. Constantinopolitanus autem æstivus mensibus floret, & colore vel hyacinthum quem purpureum lilium vocant, proximè refert, vel candidus est. Quæ magnam floris Constantinopolitani cum *ποθο* similitudinem ostendunt.

## AQVILEGIA. CAP. XIII.

Nomina

Forma.



**AQVILEGIA**, Aquileia & Aquilina recentioribus dicitur, veteribus ignota, alioqui coronaria illis futura. Est enim nō vulgari nec inuenta flori elegātia, Gallis *Ancolye*, Germanis *Agley*, & *Ageley*, quibusdā Columbina. Aquilegia folia fert ampla, lata, chelidonij maioris, paulo tamen rotundiora, duabus tribusve incisuris, toto reliquo ambitu crenata,

## AQVILEGIA, siue Aquilina.



candidiora, & veluti ex viridi cærulea, quæ vulnerata, necluteum, nec vllum alium lucum emittunt: caulem cubitalem, tenuem, rubentem & leuiter hirsutum, in cuius & surculorum verticibus flores erumpant, qui duplici foliorum genere constant, quinis videlicet foliolis paruis & angustis in stellæ modum radiatis, & quinis aliis ex inferiore parte, vt in consolida regia, corniculis cauis, sursum reflexis, gracilitate ceruicem & rostellâ columbarum referentibus, vnde Columbinæ nomen: quod de simplicibus intellige. Nam in hortis culta hæc stirps multò pluribus densioribus & nitidioribus, corniculis: flores multiplices stipantur, colore aliàs albi, aliàs purpurei, aliàs cærulei, aliàs rubentes, nonnunquam varij, & cæruleo candidoq; permixtis relucētes exuntibus è medio staminibus, à quibus parui apices dependent: siliquæ recurvæ vt in melanthio, coniunctæ post singulos flores surgunt, in quibus semen paruum, nigrum & lucidum: radices subsunt crassæ fibratæ viuaces. Eandem cum



cum multiplici hortenſi Aquilinam Lobellius pictam dedit, plenis & multiplis  
 aſpectu ſuauiſſimis floribus inuerſis. Frigiduſculos meridionalium tractus amat,  
 inquit Pena, pratenſis etiam eſt Franciæ & Angliæ, ſed ſquallidior, miniſq; hilari  
 aſpectu non culta. In Germania teſte Dodonæo, & alibi in apricis collibus, ſiluo-  
 ſis montibus, & pinguibus pratis gignitur. In Belgij & Galliæ hortis plurima.  
 Maio & Junio menſibus flores videntur. Scribit Tragus ſemen drachmæ pondere  
 cum croci obolo in vino potu iocinoris obſtructione & morbo regio laboranti-  
 bus vtiliter dari, ſed cum qui aſſumpſit, diligenter opertum in lecto ſudare oportere.  
 Petrus Pe ſemen hoc guſtu eſſe tantillum aſtringente, temperate ex calore  
 ſiccitatis, ideoq; ad faucium, pharyngis, & tracheæ incendium & vlcuſcula eo vul-

Locus.  
fol. 39.

Tempus.  
Li. 2. c. 42.  
Vires.

AQVILINA, Plenis &  
 multiplex floribus, Lob.

AQVILEGIA Minor,  
 Dalechamp.



gus vti. Multi Aquilegiam hanc Theophrasti *ῥέον* esse putant, id est, Iouis  
 florem. Aquilegia minor ex Dalechampio hinc exhibetur, radicibus multis, tenui-  
 bus, candidis, tenerrimis ac maximè fragilibus. foliis Aquilegiæ, minoribus, supra  
 terram parum extantibus, densis, cauliculis exilibus, quaternorum digitorum alti-  
 tudine, flore violæ, candido, suaviſſimi iucundiſſimiq; odoris. In umbrosis, nemo-  
 rum recessibus, ad primum faunij statum cum hyacinthis inter saxa & lapides  
 ineunte vere provenit, ut haud procul Gratianopoli, in querceto qua itur Her-  
 beſcum Episcopi Gratianopolitani arcem.

Forma.

Locus.

SAPONARIA.

CAP. XV.



VLGVS Saponariam vocat herbam hanc ab extergendi potestate, Nomina  
 qua Saponis ritu pannos eluit purgatq; , nihilominus in coronariis  
 habenda, ob floris tum suaviſſimum odorem, tum summam pulchri-  
 tudinem. Virgas fert multas, teretes, graciles, glabras; crebrò genicu-  
 Form.

Zz 3



latas cubitales, & sesquicubitales: folia lata, venosa, crassa, pingua, cruciatæ aut plantaginis latifolia: foliis similia, è singulis geniculis bina, deorsu reflexa: flores in summo cauliculorum, & circa superiora genicula multi, odorati, colore alias pulchro roseo rubetes, alias dilute purpurascentes, aut candidi, qui ex oblongis & teretibus cauliculis Lychnidis modo, aut floris Costantinopolitani exeunt, ex quinque foliolis compositi, è quorum medio exigua quadam stamina: radices crassæ, longæ, oblique serpentes, quibus fibræ quadam adhærent. Secus herbidas amnium conualles, & depressos vdorum apricorum margines fruticat. Colitur in hortis regionum Septentrionalium, vbi non perinde sponte obuia fit, in quibus diutius durat. Iunio & Iulio mensibus floret. Hæc saponaria calida est & sicca temperie, facultate autem abstergerendi non exigua prædita, à qua et si Saponaria hæc & quadam alia struthia vocari possint à verbo *σφουδις*, quod Græcis lanas purgare & candidas facere significet, tamen nostram Saponariam antiquorum struthium non esse,

*Locus.*

*Tempus.*

*Temper.*

*& Vires*

*SAPONARIA*

*Maior.*



*PSEUDOSTRUTHIVM*

*Maritimum.*



Lib. 6. hist.  
ca. 3.  
Li. 19. ca. 3.

neque Arabum *Conditi*, tum ex Theophrasto & Plinio liquet, quemadmodum supra ostendimus, ex iis quæ sequuntur. Struthium Græcorum, Latinorum Radix siue radiculari: in Syria vbiuis colitur, ideoque Columella Syriacam radicem, ac eius semen Syrium vocat, Gaza Lanariam herbam. Gignitur & ibidem sponte in asperis & saxosis locis. Radix magna, gustu acris & feruida sternutationes irritat. Folium oleæ, spinosum: caulis lanuginosus, tenuis, ferulaceus, indigenarum cibus expetitur, tingens quidquid sit cum quo decoquitur: flos aspectu gratus, inodorus, æstate prodit. Carere semine Plinius tradit. Semen edere Columella testatur hoc versu in Horto,

*Iam Sifer: à Syriâque venit que semine radix.*

Ac rursum cap. 3. n. cum præcipit Rapi, Napi, Radicis Syriacæ Febuario semen obrui, si æstiuus fructus expectetur. Serapio ex Dioscoride refert Struthij radicem esse



esse acrem, longam, & teretem, quæ in nostris exemplaribus desiderantur. Arabes *Condes*, *Condifum*, & *Aslengi* nominant. Bellunenſis radicem eſſe ſcribit, plan-  
te foliis ſpinofæ carduorum modo, craſſitie pollicis, intus ſubſtantiâ, nigram  
foris, odore & gultu acrem: eius decocto lanas, laneoſque pannos ſordidos ab-  
ſtergi Damascenos ſeplafarios eius decoctum immiſcere confectionibus paratis  
è melle ac ſapa, idque candoris tantum conciliare, vt ex Amylo & ſaccarho puriſ-  
ſimo conſtare videantur: quinetiam ſic durare, vt tenaciores ſint, & vix morſu  
indiuellantur. Conſtat eius radice in globos coacta ſyros veſtium, linteorum, in-  
duſiorum ſordes ac inquinamenta eluere, ſaponis aut lixiuij modo. Ab hoc igi-  
tur Struthio ſiue Arabum condifo, Saponaria tum facultatibus, tum notis multis

*STRUTHIVM,*  
*Fuchſij.*



*SAPONARIA Minor,*  
*Dalechampij.*



differt: eam tamen Fuchſius pro Struthio depinxit. Saponariam aliam à qua-  
dam ſimilitudine cum ſuperiore hîc depictam facit Dalechampius, & minorem  
cognominat, quæ in aſperis & ſaxoſis fruticat, radice craſſa, longa, nodofa, bra-  
cognominat, quæ in aſperis & ſaxoſis fruticat, radice craſſa, longa, nodofa, bra-  
chiata, è rufo nigricante, ramulis multis, amplum terræ ſpatium occupantibus,  
gracilibus, nodofis, prolixitate ſua & copia terram operientibus, foliis ad genicu-  
lorum interſticia prodeuntibus, aſina ſimilibus, acutioribus, villoſis, flore vio-  
læ aut ſaponariæ, puniceo, numeroſo, procul intuenti nitente, ſemine copioſo in  
vaſculis oblongis, ocimoidis minoris figura, floret Maio menſe. Totius plantæ  
ſapor amarus eſt.

Cap. 299.  
hiſtor.  
*Forma.*



Nomina



INTER stirpes quarum flores calathi siue campanulae effigiem expriment, nulla sane est quam hac coloris venustate non superet, quæq; iustiore de causa inter coronarias sit habenda. Calathiana viola Plinio dicta peritorum herbariorum sententia, & viola autumnalis, Gallis

Lib. 2. hist. c. 151.

CALATHIANA, Viola.

In c. 3. lib. 3.

Forma.



Lib. 21. c. 6.

CALATHIANA Verna,  
Dalechamp.

violette d'automne, Germanis *Blauvulkeken*, id est, caeruleum lilium. Cordi Pneumonante, quam à Germanis *Lungenblumen* vocari refert. Eadem Ananienfibus vulgò *Pettimborsa* vocatur, Matthiolo teste, cum *Metimborsa* dicere debuissent, quod tot viribus polleat, ut non aliter quam gemina crumenis sit asseruanda, aut quod tot viribus præstet, ut ex eius usu medici auri & argenti copiam in crumenis reportent. Eam is graphice depinxit, & gentiane minoris speciem facit, gentianam minimam appellans. Caules edit dodrantes, tenues, geniculatos, folia oblonga, angusta, bina ex aduerso sita, ex quorum sinibus, idq; in verticibus cauliculorum, speciosi flores exeunt, longi, caui retroflexi, sursum hiantes, inferius angusti, superius latiusculi, calathi seu campanulae speciem, in cartileo saturato purpurei, alicubi candidi, duobus tribusve staminibus candidis: semen exiguum in rotundis & oblongis capitulis. Radices tenues, longae, numerosae, & in plures diuisae. In totum verò sine odore, inquit Plinius, minutòque fo-

CAMPANULA,  
Pratenfis.

lio cala



lio calathiana, munus autumnī, ceteræ veris. Nascitur campestribus vliginosissq; locis, & in pratis, atque etiam in excellorum montium siluis carentium, opacis, ac meridionali sole non illustratis partibus, sine Augusti mensis & Septembris floret. Calathiana viola calida est, gentianæ cuius species videtur, facultate quodammodo similis, multò tamen imbecillior. Recentiores efficacem esse aiunt aduersus pestilentes morbos, & ad virulentorum animalium morsus & ictus. Huic iungimus ex Dalecham pio istam, quæ calathiana verna iure dici debet, siue Thylacitis, à floris figura, *Θύλακτις*, id est, saccum culeum, folliculūve referente. In pratis editissimorum iugorum luræ montis prouenit, radice breui, gracili, candida, parum fibrata, caule singulari, palmum alto, nodoso, foliis paucis, centaurio minori similibus, paulò longioribus, binis semper caulem ex aduerso complectentibus, veluti cauo alarum sinu anagallidis modo, ex interiore sicut pediculus vnus, interdum geminus prodit, florē sustinens, calathio vel folliculo similem, è caruleo purpurascentem, albis intus staminibus, floret Maio & Iunio mensibus. Ad idem genus referenda Campanula pratensis, in pratis & riguis locis proueniens, radice breui in fibras multas diuisa, è luteo subfusca. Cauliculis multis fruticat, pedalis: folia longa & angusta ex iis prodeunt, ex aduerso inter sese ordine disposita, alarum modo explicata, quod in aliis Campanulæ generibus non conspicitur: flos purpureus violaceus in caulium vertice micat, sæpius simplex & vnicus, interdum geminus, aliis campanulis similis: sapor vt & in aliis egregiè amarus.

*Locus.*

*Tempus.*

*Temp. &*

*Vires.*

Calathiana alia, seu Thylacitis.

*Locus.*


MARIANA VIOLA CAP. XVII.

**B**ELGAE plantam hanc violam marianam, vulgò *Mariettes* appellāt, & *Violettes de marie*, quod illi muneri, inquit Pena, elegantie florum causa, primi dederunt Mariæ Hungaricæ heroinæ illi bellicis facinoribus nobilitate: vel, vt scribit Gesnerus, hoc nomine recenti sic nuncupata est, a Diua virgine propter pulchritudinem floris consuetudo, folia primum

*Nomina*  
fol. 17.

In Hort.

VIOLA Mariana,  
Medium Proseridis.



habet longa, lata, aspera nonnihil hirsuta, vulgaris buglosi foliis nigriora, minora, minusq; aspera. Caules deinde profert secundo anno culta in hortis rotundos, rectos, ramosos, aliquantum etiam hirsutos, circa quos folia similia, sed minora, flores in summis virgis erumpunt oblongi, caui, venusti & suaves per oras incisuris quinque diuisi, colore sæpius ex caruleo purpurei, nonnunquam candicantes, in quibus duo triaue stamina candida, hi priusquam dehiscant quinquangulares sunt, subnascuntur capitula rotunda, breuia, aspera, quinque etiam angulis constantia, concaua, superiore parte latiora & retusa, in quorum medio semen concluditur exiguum, colore castaneæ, radices sunt longe, crassæ, candidæ, obliquas radículas spargentes, non ingrati saporis. Nasci in aridis, saxosis, & opacis locis testatur Matth. calidioribus Italiæ, & Galliæ inferioris infrequens est. Belgæ in hortis colunt. Iunio, Iulio & Augusto mensibus flores producit, semen interea maturescit, neque enim simul, sed particularim floret. Matthiolus cum multis aliis plantam istam

*Forma.*

*Locus.*

In cap. 6. lib. 4.

*Tempus.*

Medium



Lib. 4. c. 18.

In Ad. fol.  
137.

De flo. c. 7.

Medium Dioscoridis esse existimat, qui in vulgatis Dioscoridis & Plinij codicibus falsò folia iridis legi in describendo Medio censent, cum in aliis codicibus & Oribasio feridis folia legerent. Medion, inquit Dioscorides, in petrosus & opacis nascitur, folia habet ὀμοία σίελου (sic legitur in veteri codice teste Andrea Lac.) id est, similia feridi, caulem tricubitalem, florem grandem, purpureum, rotundum, semen cnici, minutum, radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbam. Eadem prorsus Oribasius habet. Ex qua descriptione sic emendata, violam marianam, ut si quæ alia planta, medion referre censent, cui lectiōni & sententiæ Penalubens assentitur. Nostra enim memoria, inquit, cultu hortensi florum calathis longè speciosissimis tantam magnitudinem hæc viola assequitur, ut instar calicis aut poculi poturis voluptatis causa vinum contineant. Sunt namque nolæ oblongæ effigie, nonnullis laciniosis crenis, cærulei, aspectu venusti, interdum purpurascētes, interdum dilutiores & candicantes, emergentes ab imo calice, quibus reflexis aut elapsis, in vtriculis aut florum basi rapunculo aut trachelio simili, clauduntur triquetra semina, numerosa, acetosæ colore, figura & magnitudine. Bicutales caules toti, & alæ hirsutæ ab imo folia habent longiora, latiora, quàm Tunica, villosa, rigida minùs quàm Lycopsis aut pulmonaria vulgaris, intybi seu feridis potiùs domesticæ quàm silvestris, quæ laciniosa est. Radix autem tenera candida, osculenta, palmū longa, rapunculi similitudine, uti semen & flores, sed duplò maior, nec gustu multum dispari: siquidem in acetariis rapunculi modo esitatur. In Belgij & Angliæ siluosis frequens nascitur, sed minor & strigosior culta in hortis passim eo postea incrementi progreditur, ut longè maior, adultior, suauiorque edendo sit. Calidioribus Italiæ & Galliæ inferioris infrequens magis figura ad Medium quàm facultatibus alludit, siquidem dulcis acriusculaque est, minimèque adstringens percipitur. Dodonæus descriptioni Medij, violam marianam non admodum respondere arbitratur, ac potiùs verum Dioscoridis Rapum siluestre videri.

## CAMPANULA CÆRULEA. CAP. XVIII.

Nomina

Forma.

Campan.  
siluest.

Forma.

Locus.

Tempus.

Lib. 1. hist.  
cap. 21.

VLGVS Campanulam vocat, quidam *Belvedere*, quamquam ab Italo-  
rum *Belvedere* prorsus distet, Germani *Blauwullockkens*, id est, cæruleam  
campanulam, Galli *L'herbe aux cloches bleues*. Campanula hortensis, fo-  
lia promit circa radicem & imum caulem oblonga, angusta, oblique  
virentia, inter quæ caulibus surrigitur striatus concavus, bicubitalis, tricubitalisve,  
circa quem folia & flores ad vertices in singulis pediculis singuli, similes, sed ma-  
iores & patentiores quàm rapunculi, calathi vel cāpanulæ specie, ambitu & quasi  
unico folio constantes, sexangulo, sæpius cærulei, interdum candidi, in quibus &  
candida aliquot stamina. Capitula succedunt rapunculi capitibus satis similia, sed  
paruis foraminibus peruia, in quibus semen perexiguum: radices candidæ, te-  
nues, fibratæ. Cauliculis & foliis vulneratis lacteum succum remittit. Est huic planè  
similis Campanula silvestris, nisi minor omnino esset, & prima folia terræq; pro-  
xima lata essent & pauca, violæ nigra foliis satis similia, non tamen tam magna,  
alia verò folia oblonga & angusta, flores similes, cærulei, radices tenues. Lac quoq;  
hæc copiosius fundit. Campanula minor rotundifolia à Lobellio & Pena dicitur,  
atque ita expressa est. Prior in hortis voluptatis causa, & ad coronas feritur, altera  
iuxta aruorum incultos margines & sepes nascitur. Illa Iunio & Iulio mensibus  
flore, hæc etiam Augusto. Campanula hortensis Iasione Theophrasti videtur  
esse, sic enim is scribit de florum differentiis tractans. ἦν αὖ δὲ καὶ μονόφυλλα φύλλα,  
διωγραφὴν ἔχοντα μόνον τῶν πελιδνῶν, ὥσπερ δὲ τῆς ἰασιώνης. ἡ γὰρ κεχάριται ταύτη ἐν τῷ  
ἀνθεὶ τὸ φύλλον ἔχουσα, ὃ δὲ δὴ τοῦ χεῖρὸς (lege χεῖρὸς) δὲ χεῖρὸς μέρος, ἀλλ' ἐκ τῶν ἀκραιῶν  
ἀποφύ





ἀποφύεσι γωνιώδεις. Id est, nonnulli flores etiam vnico folio natura constans, delineationem tantum plurium ostendentes, vt flos Iasionis. Non enim singuli flores in folia diuiduntur neque sanè conceptaculi pars inferior distinguitur, sed ex superiore parte proiectura angulosa exeunt. Quæ Plinius non satis perspicue conuertit his verbis. Iasione vnum folium habet, sed ita implicatum vt plura videantur. Quidam legunt, Iasione vnum folium in flore habet, & cætera. Theophrastus enim non ait Iasiones folium implicatum esse, sed indiscretis foliis sic designatum, vt plura videatur, quamuis vnicum sit, qualis figura floris est in campanulis, trachelis, digitalibus, & voluuli generibus, cuius speciem esse quidam idè suspicantur, quod eodem Plinio auctore, Iasione

Lib. 21. c. 17.

LACTESCENS Campanula  
 maior, Lobell.



olus siluestre habeatur, in terra repens, cum lacte multo, florem fert candidum, concilium vocant. Sed hæc etiam campanula competunt. Nam eius flos vnico folio absolvitur, quamuis plurium similitudinem præferat, & huius superior pars angulosa est, præterea olus esse potest cum sit edulis: repunt & in terra radices, quare citissime stirps vna propagatur. Iam verò hortensis florem interdum candidum esse diximus, siluestris verò vt hortensis candidum esse posse quis negauerit? Matthioli campanulam pro phyteumate pinxit, quod id, semen, campanula verò capitula perforata

Lib. 22. c. 22

In Cap. 125  
 lib. 4.



*CAMPANVLA Lutea*  
*Linifolia, Pena.*



forata habeat. His dñs alias campanulas subiungemus ex Lobellio & Pena. Prior est Campanula lactescens maior, Pyramidalis Luteriana, quod plus aliis omnibus lactis fundat lactescens meritò dicta, cuius ima folia Solani hortensis, & Violæ martiæ media lanua, ex atro virentia, radix fibrata, Violæ marianæ, turgida lacteo succo, adeò viuaci, vt vel tårillo frustulo infosso repullulet. Caules emittit tenues ternum & quaternum cubitorum, à medio summo tenus foliis angustioribus, longioribus, copiosis, floribus amœnis, cæruleis, campanulæ cæruleæ maioribus, nolas item exprimentibus cinctos, in acumen Pyramidis ritu fastigiatos, vnde Pyramidalis dicta. Belgio est hortensis nullius vsus adhuc compertus. Hæc Lobellius. Alia est Campanula Penæ, linifolia, palmaris herbula, perelegans, in deuexis montis Lupi, qua ad Septentrionem vergit, folio lini aut polygalæ: flore luteo peramæno, volubilis, maior quàm pro plantæ magnitudine. Rara est herba, & digna cognitu. Hæc Pena.

## GENTIANELLÆ.

## CAP. XIX.

Nomina

Forma.



## GENTIANELLA,

*Minima latifolia.*


Locus.



ENTIANELLAS has à facie & facultatibus gentianæ similibus Dalechampus appellauit, alteram latifoliam, quæ quorundam est Helleborine siue Epipactis, alteram angustifoliam. Potest & hæc thylacitis minor dici, illa thylacitis maior, quæ radículas mittit, breues, ex albo in luteum vergentes, fibratas: cauliculos humiles, angulosos, ex vna radice multos, folia centaurij minoris, aut Anagallidis, maiora, nonnunquam gentianæ aut veratro albo in ea paruitate non absimilia, vnde Gentianellæ & elleborines nomen: florem speciosissimum, ianthinum, calathi figura, ad plantæ portionem amplum, lineis quibusdam velut æratis intus virgatum, apicibus vt in liliis, exstantibus, sed purpureis, obeliscum candidum cingentibus, minutis seminibus plenum, ac eius supremum tegumentum pileo simile sustinentibus. Crescit in aridis, niuosis, perflatibus, montosis. Amarissimus est totius plantæ sapor, ideoque iocinoris vitiis nempe regio morbo & obstructionibus auxiliatur, pari cum gentiana facultate, cui amaritudine non cedit. Allobroges Reperet nominant, vt & proximè describendum, aiuntque etiam nolentes pedere qui sumpserint, vi efficaci ad flatibus discutiendos, quod & de asinis onopordo patris tradit



QVÆ FLORE  
GENTIANELLA  
*Angustifolia.*



PLACENT, LIB. VII.

829

tradit Plinius. Gentianellæ angustifoliæ radix Lib. 27. c. 12  
latius spargitur, & furculosior est, folium ob-  
longum, angustum oleæ simile: flos ex oblon-  
go & herbaceo calice profertur angustior &  
breuior quàm in superiore, foris cæruleus, al-  
bis lineis virgatus, in quinque foliola diuisus,  
ambitu serrato. Caterum idem sapor, ama-  
rissimus scilicet, idem nomen, *Reperet* enim  
vt superiorem vocant, eadem vis ac facultas:  
ad colicos enim dolores, ad tormina, regium  
morbum, cachexiam à rusticis laudatur, flo-  
ret vtrâque mense Aprili. Eandem esse opi-  
nor, quæ à Clusio Gentianella verna minor  
nominatur, à quibusdam cantabrica.

TRACHELIVM. CAP. XX.



N IIS quoque numeranda plan- *Nomina*  
tæ hîc depictæ, quæ flores campa-  
nulæ siue nolæ specie habent, & ob  
venustatem coronis inferuntur, à

veteribus silentio prætermisâ, à recentioribus Trachelij nomine designatæ. Est  
autem Trachelium Germanis *Halskraut*, id est, Ceruicaria, à ceruicibus collique  
partibus vicinis, internis & externis, quibus tumefactis & vlceratis multum opitu-  
latur, vnde Vuularia ab vna etiam dicitur, à Fuchsio Campanula, ob florum simi-  
litudinem, qui campanam planè referunt, quibusdam Archangelica, Gallis *Gante-*  
lee, vel, *Gans de nostre dame*. Est autem trachelium duplex, maius, & minus. Maius

Cap. 16.  
hist.

Forma.  
Dod. lib. 2.  
cap. 20.

Forma.

TRACHELIVM,  
*Maius.*



caulem profert quadrangularem, hirsutum,  
rubescens: folia oblonga, hispida, rigi-  
da, ad imum latiora, supernè acuta, & ambi-  
tu crenata, vrticæ habitu & superficie: flores,  
secundum caulem calathi aut campanæ figura,  
rapunculo similes, aut violæ marianæ, minores,  
per ambitum quinque simpliciter incisuris, sed  
profundioribus diuisos, intus aliquantulum hir-  
sutos, candidos plurimum cæruleos, interdum  
dilutè purpureos, in medio luteum quid pro-  
minens obtinentes. In summo caulis vertice  
primi flores apparent, deinceps versùs inum  
exoriuntur, quibus marcescentibus semen in  
rotundis capitulis exiguum & cinericiū pro-  
uenit vt in rapunculo. Radix est candida, & va-  
rie intorta. Trachelium minus caule superio-  
ri simile est, sed breuiori: folia sunt longiuscu-  
la, minora, candidiora, nec tam altè crenata, ra-  
punculi aut saluicæ, pilosa: flores pulchelli, cala-  
thi aut campanulæ figura, ianthini, & dilutè  
pupurei in summitate caulis exeunt, magis con-  
gesti quàm in superiore, rapunculi sapore, pri-  
mòque vere acetariis etiam adduntur. Trache-

AA



HISTORIÆ OMNIUM PLANTARVM,  
TRACHELIUM,  
Minus.

Locus.

Tempus.

Temp. &

Vires.

Dod.lib. 2.

cap. 20.

Fuch. 1. ca.

163.



Nomen

Lib. 30. c. 2.

CYNOCEPHALVS,  
Plinij.

Locus.

Forma.



lium vtrumq; gignitur in aridioribus locis fecus pratorum margines, & crebrò senticosis locis. Seritur etiam in hortis florum gratia. Iulio, & Augusto mensibus floret. Gustu adstringit, atque ob id exsiccandi vim illi inesse coniiciendum. Quare decoctum ipsius in aqua vnicè ad dolores & inflammationes colli & faucium internas, & ad oris exulcerationes, aliæque eiusdem mala quæ adstringitione indigent, confert. Vtilis etiam haud dubiè ad alia quævis vlcera ob insignem quam obtinent in exsiccando facultatem.

CYNOCEPHALVS.  
CAP. XXII.

**P**LANTAM hanc cynocephalum ideo vocant herbarij, quod feminis conceptaculum caluam canis cute & carne exutam representet, siue ea sit cynocephalia à Plinio memorata, qua ad euocandas mortuorum umbras utebantur, ob id fortasse, quod caput canis apud Aegyptios sanctissimi & loco numinis habitum, feminis huius plantæ locus, ut diximus, referat, ac propterea diuinam ea gens existimaret, & ad incantationes, & contra omnia veneficia valere crederet, siue alia quævis herba à veteribus non descripta. In agri Monspelienensis sepibus, dumetis, aggeribus, parietinis nascitur, radice fibrata, caulibus multis, cubitalibus, teretibus, ramosis, ex intervallis rami subiecto latiore folio è caule prodeunt, folia in furculis temere & nullo ordine disposita, nigricantia, longa, angusta, acuminata, sed minime pungentia: flos calathio similis aut labro, luteis feminibus plenus, sic fissus ut superior pars quasi duorum foliorum coalitum ostendens, inferiore productior appareat: color floris venustus, & in roseo candicans, qualis in malua & alcea flore spectatur. Vasculo copiosum semen continetur, antrorsum oblongo, retrorsum lato, duobus veluti narium foraminibus, & tanquam porrecto rostro, eaq; figura caluam canis prorsus exprimente, vnde & nomen. Quidam antirrhinum verum esse volunt.

DIGI



DIGITALIS.

CAP. XXIII.



ETERES plantæ huius non meminisse id indicio est, quod Græco *Nomina*  
Latinoque nomine destituta sit, quamobrem Fuchsius Digitalem ap-  
positè nominavit, quod digitalis, siue munimenti digiti in suendo  
speciem flores præbeant, Germanis *fingerhuet*, & *fingerkraut*, Gallis

DIGITALIS, Purpurea.



*Digitale*, *Gant nostre dame*, & *Doigtier*, nonnulli cam-  
panulam siluestrem, & *nolam siluestrem*. Duùm  
est generum. Vna purpureos flores habet, quæ digi-  
talis purpurea, altera luteos, quæ digitalis lutea  
nominatur. Duas alias species, addidit Dodonæus,  
digitalem floribus candidis, aliam floribus sublu-  
teis, seu pallentibus. Vulgarissima est digitalis pur-  
purea, folia habens longa, lata, ambitu serrata, dilu-  
tè virentia, verbasci quodammodo similia, minora  
tamen, minùsq; lanuginosa: caulem rectum, ro-  
tundum, cubitalem, aut bicubitalem, à cuius medio  
sursum versus vno ex latere duntaxat eleganti serie  
flores multi deorsum versus dependent, calathi ob-  
longi figura, dactylothece propemodum similes,  
ex rubro purpurei, punctis quibusdam candidis pi-  
cti calathive, quos vascula sequuntur rotunda, in  
quibus semen, gustu ingrato, & odore putridiuscu-  
lo. Radix fibrata est, viscida, nigricans. Huius digi-  
talis feracissima sunt regiones, quæ ad Aquilo-  
nem sunt: meridianis calidioribus ferè deest. Sed  
in Francia, Belgio, Anglia vbivis nota, in mōtib;  
vmbrosis & saxosis locis proveniens. Seritur etiam

*Genera.*

Fuch. 2. 102.

De flo. cab.

*Forma.*

*Locus.*

Pena

fol. 245.

*Tempus.*

DIGITALIS Purpurea,  
aut alba Lobelii.



DIGITALIS,  
Lutea.



AA 2



*Tempus.* in hortis. Floret Iulio potissimum mense, deinde semen producit. *Digitalis* lutea  
*Digitalis* folia habet angustiora, venosa, glabra, saturata virore nigricantia, auersa tamen  
*luc.* parte candidiora, per ambitum nonnihil ferrata, flores luteos, forma superioribus  
*Forma.* ferè similes. Non desunt qui digitalem verbasci speciem faciant, & *θρυαλλίδα*  
 nominent, quæ & *λυχνίτις* dicitur. Sed Lychnitis siue Thryallis folia habet pin-  
 guia, crassa, & hirsuta, ad ellychnia in lucernis apta qualia minimè digitalis, quæ  
*Temper.* tam crassa & hirsuta non habet, ut in lucernis ellychnij vice esse possint, cum per-  
 quam amara sit hæc herba, calidam siccamque esse & abstergentam perspicuum  
*& Vires.* est, ita ut ubi opus est extenuatione, absterfione, purgatione, obstructionis libera-  
 tione, efficax esse possit. Hodie tamen nullus huius in medicamentis est vsus. Flos  
 solus sola venustate & forma placet.

## VINCA PERVINCA.

## CAP. XXIIII.

*Nomina*

AE vulgò vinca peruinca, Officinis peruinca, Gallis *Pervinche*,  
 Italis *Prouenca*, Germanis *Ingrien*, quòd semper vireat nominatur, à  
 peritis herbanis ea esse existimatur quæ Dioscoridi clematis prior,  
 & clematis Daphnoides, aliis myrsinoides, & polygonoides di-  
 citur. Clematis quidem, ut & ceteræ clematides, à viticidarum sobole sarmen-  
 tosa, quæ *κλῆματα* Græci vocant: Daphnoides à foliorum lauri, quam folia eius ha-  
 bent, figura; vinca peruinca, quòd humi serpat, & se in modum funiculi porrigat,  
 vicina quæque vinciens, auctore Fuchfio. Vix tamè reperias hanc viticulosis vit-  
 Lib. 24. c. 25. gis obuias plantas irretire. Plinius clematida Aegyptiam appellat. Alibi vincam  
 Lib. 25. c. 11. peruinca, & alio nomine chamædaphnem dici tradit, quòd scilicet humilis vi-  
 deatur laurus, ut nomen sonat. Non est autem cur eam chamædaphnem putes, in-  
 Cap. 24. h. quit Fuchsius, quæ Romanis Laureola aut Laurago dicta est. Hæc enim à vinca  
 peruinca genere & facultatibus diuersa est, & seorsum illam chamædaphnem de-  
 pingit Plinius, ut sit illi duplex chamædaphne, vna Dioscoridis & aliorum chamædaphne,  
 vna Dioscoridis & aliorum chamædaphne, al-  
 Lib. 24. c. 25. tera quam alio nomine vincamperuinca ap-  
 Lib. 4. c. 6. pellant. Clematis daphnoides, ut describit Dio-  
 Form. a. scorides, sarmenta habet exigua, iunci crassitu-  
 dine, (*μικρὰ* vulgata exemplaria, Oribasius &  
 Paulus, alij *μικρὰ* legunt, id est, lōga: & Plinius cle-  
 matidem hanc longam tenuemque dixit, quam  
 Lib. 24. c. 25. lectionem etiam proverbiū approbat, quo cle-  
 matidis Aegyptia ioco dici solebat in eos qui cor-  
 pore præter modum procero & gracili, atque  
 atro colore essent) folium paruum, lauro figura  
 & colore simile, sed multò minus. Plinius. Est &  
 alia clematis, inquit, Aegyptia cognomine, quæ  
 ab aliis daphnoides, ab aliis polygonoides vo-  
 catur: folio lauri, longa, tenuisque, aduersus ser-  
 pentes, ac præsertim aspides, ex aceto pota effi-  
 cax. Aegyptus hanc maximè gignit. Ex quibus  
 postremis verbis colligit Cornarius legendum  
 esse in Dioscoride, *φύεται ἐν ἀγύπτῳ*, id est, nasci-  
 tur in Aegypto, & non *φύεται ἐν τῷ γένει*, ut pu-  
 blici Dioscoridis codices habent. Nam alio-  
 qui temerè repperet Dioscorides in fine capi-  
 tis,



Embl. c.  
 lib. 4.



PERVINCA Maior,  
Lobellij.



tis, φέρται ἐν χέρσοις, id est, nascitur in terrenis incultis. Hanc plantam nostram esse vincam peruinca, etiam mulierculis notam tum facies, tum facultates testantur. Multas enim tenues, longas, teneras, flexiles, virentes viticulas humi spargit, & huc illucque serpit, folia laurea, sed minora, semper virentia, ex intervallis bina ex aduerso promit, flores cærulei ex cauliculis quinque foliolis distinguuntur, borraginis floribus quadantenus similes, sed maiores & inodori, aspectu tamen multo gratiores, idcirco in coronas præsertim hybernas adnectuntur, radix fibrata flavescit. Est & Clematis siue Peruinca maior, quæ peramœna florum duplicatione, inquit Lobellius, & incremento, coloris ex purpureo rubentis in Belgij hortis variat. Nemorosis umbrosisque tractibus, & senticetis, atque agrorum marginibus gaudet. Perpetuo virefcit, Martio tamen & Aprili potissimum floret. Clematidis folia cum caulibus in vino pota, auctore Dioscoride, alui profluuia & dysenterias sedant, subdita in pello cum lacte & rosaceo aut cyprino

Locus.

Tempus.

Lib. 4. c. 6.

Vires &

Temper.

dolores vulvæ sanant. Ipsa commanducata dolorem dentium finit. Imposita venenatarum bestiarum moribus opitulatur. Narrant & demorsis ab a pide auxiliari. Galenus eadem omnino tradit. Clematis daphnoides, quam quidam myrsinoides, alij polygonoides appellant, profluuiis alui & dysenterias cum vino pota prodest, dentiumque dolores mansa mitigat, tum vteri quoque doloribus in pello admota vsui est. Paulus siccandi facultati id tribuit, quod diarrhœam dysenteriamque sanet, & dentium dolores mitiget, & contra venenatorum morsus rectè imponi tradit. Easdem esse peruinca facultates gustus demonstrat: gustanti enim amara est, nonnihil calida, adstringens. Quare siccata citra mordicationem, & vt ex codice manuscripto citat Fuchsius, sanguinis ex naribus profluuium mirum in modum prodest: item iis qui sanguinem vomunt, aut spuunt. In summa omnem sanguinis fluxum sistere asserit. Quibus accedit pictura & descriptio eiusdem, quæ vtraque ad amussim peruinca nostræ respondent.

Lib. 7. sim.

Lib. 7.

Cap. 134. hi.

PRIMULÆ VERIS. CAP. XXV.

**Q**UOD primo vere erumpant & floreat primulæ veris Officinis dictæ sunt, & herbæ paralysis, & Arthetica, cum arthritica dicendum esset, Gallis *Brayes de cocu*, *Prime vere*, Germanis *Schlusfelblumen*, Italis *Bracche di cuculo*, & *fior di primavera*. Harum species & varietates multæ. Est enim quæ flores luteos profert, odoratos, Germanicè *Geel schlusfelblumen*, *Himeschlusfel*, & *Sanctus Peters schlusfel*. Est & quæ pallidos in luteo, odoris expertes, Germanicè *Vuelfhimelschlusfel*, & *Schlusfelblumen*. Hæ in hortos translata & culta florum multiplicata foetura & magnitudine variant. His addit Dodonæus aliam, primulam veris minorem. Pena & Lobellius filuarum primulam. Primulæ veris priori folia candicant, rugosa sunt, betonicæ

Nomina

Genera.

Lib. 1. c. 81.  
fol. 244.

Forma.



*PRIMULA Veris*  
prior, Matth.



*PRIMULA Veris*  
altera, Matth.



similia, sed maiora, nec ambitu incisa, digitalis purpureæ utunque similia, humi ferè strata, aut parum surrecta, è quibus mediis scapus erigitur tenuis, rotundus, nudus, incanus, palmaris & sesquipalmaris, in cuius nutante vertice flores è caliculis denticulatis umbellæ instar depèdent, lutei, odorati, ce-

*PRIMULA Hortensis Anglica,*  
Lobell. & Pen.

fol. 244.



ra novæ odorem & colorem referentes: deinde capitula, in quibus est semen. Radix candida est & fibrata. Huic similis est primula veris altera, nisi foliis esset grandioribus paulò, & latioribus, floribus iisdem, sed in album pallescentibus, aut ferè albis, odoris nullius. Sed quæ, inquit Pena, in hortis Anglicis & Northmanicis colitur, florum maiorum proventu & fectu multiplici, triplo aut quadruplo omnium primularum magnitudine & elegantia prima est. Hanc Lobellius sic expressit. Primula silvarum ex superioribus facile dignoscitur, differt enim floribus duntaxat, qui singuli languido pallore, pusilli, palmo breviores, singulis cauliculis summis insunt, folia, sapor, odor, vltus non dissimilia. Sæpius nemorosis, & umbrosis conuallibus gaudet, in Anglia, Delphinatu, Sabaudia, Belgis & Gallis hortensis. Eadem huic est, aut certè simillima, quæ Verbasculum minus Dodonæo dicitur, seu Primula veris minor, foliis parvis, albidis, primula veris alteri prorsus similibus, è quorum medio cauliculi erumpunt singuli singulos





gulos flores ferentes, odore, figura, colore eidē  
 Primulae similes. Aliam Primulam silvarum  
 Lobellius ostendit, floribus obscure virētibz,  
 fimbriatis, rugosisq; plicis, Londini hortis fre-  
 quentē, alioqui ceteris similem. His inferenda  
 ex Lobel. Primula veris flore gemino, altero  
 alteri innato. Præterea silvarum Primula veris flore specioso, multiplici, à Lobel-  
 io etiam depicta. Dioscorides verbasci differentiis quem φλογιον Græci vocant, Lib. 4. c. 99.  
 subiicit. Sunt (inquit) & phlomides duæ hirsutæ, rotundis foliis, similes: quas Ruell. Lib. 3. c. 12.  
 lius Primulas veris putauit. Ruellij iudicium sequuntur, Dodonæus & Fuchsius, Lib. 1. ca. 81.  
 Cap. 326.  
 hist.

SILVARVM *Primula floribz*  
*obscuri, Lobelij.*



SILVARVM *Primula veris,*  
*flore multiplici.*



AA 4



quibus Matthiolus haudquaquam assentitur, quod istarum Primularum folia non sint hirsuta, inquit, nec etiam rotunda, sed alteri lævia, alteri crispa, lactuca aut diplaci modo. Adde quod florum quos phlomides proferunt, neque Dioscorides, neque veterum vllus meminit, qui verbasci genera recensent, id quod in herba paralyti Dioscorides non prætermisisset, cum hæc omnium prima aureis floribus emiceret, verq; nouum nuntiet. At harum omnium folia, inquit Pena, cum sint ambitu rotundiore quàm maioris verbasci, & caulis nonnullarū foliaq; sint hirsuta, cur neget ille phlomidæ esse? Certè vires & tota facies planè thapsi contra suadent, consensusq; experimenti apud omnes regiones, quæ modo vna quampiā harum habeant, paralytis herbam vocant, quo nomine propter insignes facultates fuit etiam phlomis donatus. Igitur & hæc phlomides. Ea quæ luteos flores habet gustu non ingrato, in odore, placentulis, & acetariis admodū utilis capiti, nervis, & humorum ex decubitu putredini, aut inflammationi, eoq; vulneraria habetur. Hæc ex Pena. Verisimile est quod arbitrantur quidam hanc plantam esse verbascum sylvestre, ex Theophrasto memoratum ab Athenæo, lib. 15. inter flores vernos, vt Anemonen montanam, Anemonen pratensem, Herculis flammam, & Lychnida, quam interpretes genicularem vertit. Recentiores, inquit Fuchsius, verbasculis hos effectus assignant. Trita imponuntur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto vesicæ renumq; obstructiones solvuntur. Succus herbæ propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata, & liuentia. Quod verò hæc eadem possint, temperamentum eorundem palam docet: parum enim adstringunt: si gustaueris, amara, & modicè acria sunt, vt hoc nomine desiccandi & detergendi facultatem quam illis Galenus adscribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiam temporis herbarij calida & sicca esse statuunt. Mulieres formæ studentes, succo è floribus illorum expresso faciem illinunt, qui maculas rugasq; & alia eiusdem vitæ mirificè deterget. Primulis adnumeranda, quæ Sanicula à sanandis vulneribus, quibusdam Auricula vrsi, veriùs Arthritica, vel Paralytica nominanda, Lunaria arthritica Gesneri, Britanica Anguillaræ, Paralytica Alpina Sanicula Penæ & Lobellij, maximè, inquit Pena, propter peculiarem vim ad affectum Arthriticum quæ amolitur. Amat hæc summa montium præcella, & præruptarum rupium supercilia petrosa, qualia sunt in D. Claudij caucibus, Clauenæ & Oeniponti finitimis, vbi ferè totam æstatem perennat nix, qua inuita exacto verè mittit in singulari cauliculo, flores euectos pediculo molliore & inflexo, ferè puniceos, aut ex roseo albicantes, visum exhilarantes, suauiterq; spirantes: folia albida, virentia, crassiuscula, carnosa, & læuiora quam Primula veris, nōnihil repanda, & limbo crassiore tantillum fimbriata ac circinata: radix multum fibrosa, & cognata Primulæ: gustu pariter multum exsiccatè & adstringente, vulnerariis portionibus expetitur, & foris vulnera glutinat. Hæc in montibus arduis calidarum regionum

Sanicula.

*PRIMULA Veris Pachyphyllos, siue Auricula vrsi, Matth.*

Locus.

Forma.



cauliculos & folia emittit maiora, interdum longè minora, specie tamen aut natura minimè diuersa. Qui hanc bene norit, sequentes duas facillè cognoscet. Prior Paralytica



*PARALYTICA Alpina*  
*angustifolia, Lobel.*

*PARALYTICA Alpina*  
*minor, siue media, Lob.*



*AVRICULA Vrsi*  
*Myconi.*



Paralytica alpina Sanicula angustifolia maior, folia Gnaphalij mōtani longiora profert: flores multiplici fœtu umbellæ instar in pedali- bus & dodrātalibus mollioribus pediculis pur- purascētes, aut ex roseo & albo cōfusus mican- tes. Sanicula Alpina minor siue media, folio est minore, tantillum crenato, floribus nō dispa- ribus in cauliculo palmari & dodrātali: radix multum fibrata. Est & Sanicula Alpina omniū minima, vix vnciam & sesquiunciam æquans, foliis itē carnosiss, sed folij cotyledonis mino- ribus, summis oris fimbriatis & denticulatis. Flos purpurascit. Hæc Lobellius. Diuersam ab his plantā Auriculam vrsi vocauit Myconus à foliorum figura pilis multis obsitorum eamq; pinxit & delineauit his ferè verbis. Radices multas emittit tenues, ferè capillaceas, fuscas, petris inhærentes, gustu adstringentes, circa quas folia per humum repunt, borragini qua- damtenus similia, in ambitu nonnihil lacinia- ta, aspera, rugosa, crassa, neruosa, pilosa maxime prope radices: ex iis enim ad foliorū exortum magna pilorum congeries tomento cuidam & veluti iube adsimilis enascitur. Eadē folia tam supernè quàm infernè villosa sunt atque etiam in ambitu pili vbique rufescunt. Ex foliorū medio duo aut tres cau- liculi emergunt, rotundi, dodrantes, hirsuti, solidi, succosi, purpurascētes, cur- dulcedine adstringētes, in quorum fastigijs flores sunt cærulei, ex quinque folioli

*Forma.*

composit



compositi, & in horum medio stamina lutea, veluti ex vasculo grani hordei figura, sed maiore, in imo floris posito, exeuntia. Nascitur in vmbrosis montosisq; locis, nonnunquam etiam humidis. Aqua ex hac planta per organū vitreum destillata, ad frangēdum calculū siue in vesica, siue in renibus valde efficax est. Id quod Myconus vir bonus & doctus se experimento confirmasse asserit. Eadem aqua Hispani aduersus tulsim vtuntur: quam ob causam plantam hanc *Yerna Tussera* nuncupant: alij à foliorum copia, Peluda.

## LILIVM CONVALLIVM.

## CAP. XXVI.

Nomina

Forma.

Locus.

Tempus.

Li. 4. ca. 80.

Pena fol.  
61.

Lib. 2. c. 26.

Lib. 6. hist.  
cap. 7.

**L**ANTAE istius aspectu pulcherrimæ flores, tum odorati, tum venusti meritò inter coronarios locum sibi vendicant. Lilium conuallium à natalibus recentiores vocant, Galli *Grand muguet*, quasi *Musquet*, Germani *Meyenblumle*, & *Meyenrysz*, ab iisdem natalibus. Folia bina, aut terna promit virentia, læuia, latiuscula, lilij foliis similia, sed minora, caulem tenuem, palmarem, circa quem à medio sursum flores parui, rotundi, hiantes, per summas oras denticulati, ac reflexi. Arbuti Palmaeq; flori similes, candidi & odorati, relinquentes fructus rotundos, rubentes, non dissimiles baccis asparagi, sed minores, in quibus semen durum & subamarum: radices tennes, longæ, aliquantulum geniculatæ, repentes. In senticosis nemoribus, & vmbrosis conuallibus sponte provenit. Hortis etiam expetitur. Circa calendas Maij mensis florer, Iulio fructus profert. Non desunt qui sentiant Lilium conuallium esse ephemerū Dioscoridis nō letale, nullis profecto ephemerū à Dioscoride descripti notis huic Lilio conuenientibus: eo tamen nomine Fuchsius id depinxit ac descripsit. Nonnullis Hemerocallidam faciunt, sed perperam. Alij putarunt esse Lilium inter spinas memoratum à Solomone, propter suauissimum odorem, etiamq; florem Lilij, qui niueus & pulchellus, Lilio similis quadatenus est, & odore suauissimus. Dodonæus vernum Theophrasti Lilium, quod statim post violā purpureā florer: *ἐναχὶς τὸ ἦρος*, inquit, *ἀμα δὲ τῶ ἱππὶ μικρὸν ὑπερὸν τὸ κέλινον, καὶ τὸ φλόγινον*, &c. Sic enim

## LILIVM Conuallium.

Lib. 6. hist.  
ca. 7.Temper.  
& ViresFuchf. cap.  
ca. 88.

Gaza legit. Verè nonnunquam cum viola aut paulò post Lilium exit, & viola flammea. Quidam cenanthen Theophrasti à Dioscoridis cenanthe diuersam esse censent, flore albo, racemoso, instar labruscæ, suauiter olente, quam cum Theophrastus inter vernos flores numerasset, subiungit: *ἡ σάκκος δὲ καὶ ἡ ὀνείθη, καὶ τὸ τὸ ἀνθικὸν μὲν, ὡς δὲ τὴν φύσιν*. Sic enim legendum, vt diximus, non *ποῶδες*, vt legit Gaza. Id est, similiter cenanthe quoque ex florum genere est, suavis odoris natura. Et mox, *τὸ δὲ ἀνθος βοτρυώδες καὶ λευκὸν καὶ ἀπὲρ ἀμπέλου τῆς ἀρχίας*. Id est, flos cenanthes racemosus, albus vt labruscæ. Lilij conuallium flores & fructus calidæ siccatq; qualitatis participes sunt. Aiunt flores aduersus apoplexiā, neruorū resolutiones, vertiginem, morbū comitalē, atque alios ex cerebri frigida humidaq; intemperie morbos plurimū prodesse: cor roborare, iecur, cerebrum. Hinc est quod eius herbæ succū aut decoctum syncope, vertigine, morboq; comitali correptis, attonitis & phreniticis exhibent



beant. Cæterum incipienti elephantō, ne latius serpat, & altius radices agat, viam præcludere scribunt. Ocularij medici ad oculorum caligines discutiēdas ea etiam vtuntur. Quin & ictis & commorſis à venenatis animalibus præbent: item aggre parturientibus. Sunt qui recentes flores vino macerent, & in vitreo vaſe diu info-  
lent, additis lauandulæ, & roſmarini floribus, aliisq; nonnullis aromatis, ex quibus omnibus ſtillatitiam aquam vitreis organis eliciunt, qua ad ſupradictos omnes corporis affectus vtuntur.

Matthi. in  
ca. 120. li. 3.

CARYOPHYLLVS INDICVS. CAP. XXVII.

**A**SIMILITVDINE noſtri Caryophylli altilis, ſos hic exoticus Ca-  
ryophyllus Indicus appellatur, & ſos Indicus, Germanis *Indianiſch  
blumen*, & *Indianiſchnegelim*, ideſt, Indicus ſos, & Indicus Caryophyl-  
lus, Gallis *Oeillet d'Inde*, cum veriùs ſos Africanus Tunetanuſve di-  
cendus ſit, aut Caltha Africana, vt Geſnerus nominat, cognomine Indici nõ pro-  
bato, quoniam, auctore Dodonæo, primùm ad nos allatus ſit ex Africa, cum Caro-  
lus V. Tunetum traieciſſet: vnde Brabantis Flandriſq; vulgò *Thunisbloem* vocatur,  
Punica lingua Pedua, vt tradit idem Geſnerus. Cordus Tanacetum Perunianum  
nuncupat, à ſimilitudine ſorum tanaceri, & nomine Peru Americae prouinciæ, ex  
qua primùm in Europam illatus eſſe à Germanis creditur. Itali Othōnam. Huius  
ſpecies ſunt duæ Trago, maior, & minor: Matthiolo tres, ſloribus tantùm diſtan-  
tes. Maiori caulis eſt procerus, bicubitalis aut tricubitalis, reſtus, ſtriatus, è nigro  
ruſcens, nodofus ramoſuſq;: è ſingulis nodis bini exeunt furculi, folijs denſis, re-  
fert, oblongis, anguſtis, per totas oras ſerratis, Tanaceti, propemodum pennarum  
inſtar expaſis, & ex aduerſo ſitis, quæ ſoli aut lumini obieſta cribri modo perfo-  
rata cernuntur: quamobrem Othōnam Dioſcoridis quidam eſſe coniectantur.

Nomina

De ſlo. c. 18.


In Hort.  
Germ.  
Li. 1. pl. c. 17.

Genera.

Li. 2. ca. 146.  
In cap. 186.  
lib. 4.

Forma.

CARYOPHYLLVS Indicus  
maior, Matth.



CARYOPHYLLVS Indicus  
minor, Matth.



Flores in ſummis ramulis ex lōgis calicibus ampli, rotundi, numeroſiore foliolorū  
ſtipatu cōfertiores quàm in roſa, inferiore parte pallidè lutei, ſuperiore ſtauo ſiue  
aureo



aureo colore rutilantes, luteis in medio staminibus: semen villosum, nigricans, oblongum, compressum: radices fibratæ, per summam terram vagantes. Flos Africanus minor, superiori prorsus similis est caulibus, foliis, floribus, semine, sed omnibus partibus minor, & pedem aut cubitum vix excedens: flores duplici aut triplici foliolorum ordine saturè flauis, siue crocei, sic coloratum holosericum villosum æmulantes. Tertium genus omnium minimum flores superiori similes edit, sed longè minores. Omnium flores & folia, denique vniuersa planta terræ cominus odore

*Locus.* vibrat, sed manè minus foetet. In Africa, ut diximus, sponte provenit. In Italiâ, Galliâ, Germaniâ, cunctisque ad Septentrionem hortis colitur ad delicias & coronamenta, præsertim maior, qui non nisi Augusto mense & Autumno floret. Minor

*Tempus.* Maio & tota æstate. Fuchsius artemisiæ genus Tanacetum facit, corrupto nomine pro Tagete dictum, & huius generis esse putat herbam, quæ elegantissimos flores profert, Caryophyllos Indos vocatos, nullaque in re nisi floribus, qui sunt elegantiores & maiores ab illa distare, nisi quod hæc odore vincit: quare Tagetem Indicam appellat. Hoc Tragus non probat, tum artemisiæ seu Tanacetum non solum formam, sed etiam odor & sapor reclamant. Multo etiam minus tagetes, inquit, apud Apuleium fuerit, cum eius historia nulla apud eundem auctorem extet. Sunt qui velint florem Africanum, Petilium esse florem Plinij. Sed Petilius flos est Autumnalis, inquit Plinius, circa vepres nascens, tantum colore commendatus, qui est rosæ siluestris, foliis parvis, quinque, calice paruo, versicolore, luteum semen includente.

*TAGETES Indica, Fuchf.*



*Li. 2. c. 178.*

*Li. 4 simpl.*

Mirum est in eo flore inflecti cacumen, & non nisi retorto folia (floris nimirum) nasci. Andreas Lacu. & Itali, florem Africanum maiorem aurei fulgoris, & tanto pulchriorè, quiq; minus aut perparum terri odoris spirat, Othonniam Dioscoridis esse censent, quibus haud assentiantur multi periti herbarij, quod cum illius descriptione flos iste minus conveniat. Est enim Othōna, inquit Dioscorides, foliis erucæ, perforatis cribri modo, & velut à tineæ erosio, flaccidis, paucis, flore croceo, latifolio. At floris istius folia multa sunt, Tanacetum quàm erucæ similia, non verè perforata, sed quæ tantummodo soli obiecta, talia appareant. Galenus Lycopersij cuiusdam herbæ meminit cuius succum Centurio quidam ex Barbarica, circa Ægypti regione cõportauerat, odore adeo graui, atque inamæno, ut ne gustare quidem ausus fuerit ipse Galenus, sed letale esse coniiceret. Vtebatur autem eo Centurio ille ad ingentes articulorum dolores, atque ipsis etiam ægris refrigerandi facultate pollere visus est. Est autem, ut

Galenus ait, colore subflauo, odore tam graui quàm cicuta, nisi quod leuem quandam instar aromatum adferat gratiam. Nomen herbæ ex qua succus hic exprimitur, Lycopersium esse dicebat: quali autem præterea sit forma, Galenus non addidit. Quare an flos Africanus Lycopersium sit, decerni non potest. Videtur tamen illi si non idem, certè simillimus, inquit Dodonæus, quod folia & præsertim flores graui admodum & tetro præditi sint odore, & qualitate venenata, cicuta proxima, quod experimentis nonnullis sibi constare, idem Dodonæus, asserit, ut in puero qui flores mandere inceperat, labia & os inflata se vidisse, sicuti crebro iis accidit qui

*Cap. 18. de flor.*

*Ibidem.*



qui cicuta fistulas ludentes, aut modulantes intra labia aliquandiu continuerint: Feli etiam flores recentes cum calicibus recenti caseo permistos olim dedisse, quæ mox valde inflata, & paulò post mortua fuit: mures quoque qui semen arroserunt mortui feruntur reperti. Ex eiusdem esu porcis intumuerunt rostrum ac fauces, & nonnullis exitio fuit. Quæ omnia venenatam & deleteriam huius herbæ facultatem esse demonstrant, ut audiendi non sint, qui hanc tanaceti vel artemisiæ speciem, aut innoxiam stirpem esse autumant.

Pena fol.  
318.

PYROLA.

CAP. XXVIII.



VLGO à Pyri folio herba hæc Pyrola nominatur, Gallis *Pirole*, Germanis *Uintergruen*, quæ vox hyemis virore significat. Quippe æterno virore, inquit Pena, pene atra, aduersus brumæ rigores perstat, & *Holz mangolt*, & *Vualdmangolt*, idest, Beta siluestris, quoniam hortensi Betæ primum erumpenti haud dissimilis sit: ob id limonium quidam esse autumant, eoque nomine descripsit & depinxit Fuchsius. Alij Britanicam esse arbitrantur. Folia aliquot in imo profert, septena, octona, nouena, denaue, Betæ quadatenus similia, rotundiora tamen & minora multò, Pyro propiora, viridiora, nigriora, caulem dodrantalē aut pedale, floribus pulchellis, in summitate ornatū albis, & odore ad flores lilij conuallium accedentibus, è medio stamina apicēsve emittentibus: radix est exigua, tenera, subrufa, repens. Montosis, siluosis, & frigidis vdis gaudet, hortosque & mitiora viridaria aspernatur. Superiori & inferiori Germaniæ, adeoq; vniuerso Septentrioni nota, rarior Italis, & Gallis meridionalibus. Perpetuò viret: flores tamen Iunio & Iulio mensibus emittit. Tertio ordine sicca & secundo frigidam recentiores esse tradunt. Omnes enim eius partes adstrictionis vehementissimæ & euidentis refrigerationis esse sentiuntur. Quare eius decoctum interna & externa vulnera potum sanat, item fistulis, atque aliis malignis vlceribus medetur.

Nomina

Fol. 112.

Cap. 173.  
hist.

Forma.

Locus.

Tempus.

PYROLA.



ANEMONE.

CAP. XXIX.



NEMΩNH Græcis, similiter Latinis Anemone, quibusdam herba venti, Arabibus *Lackaiak*, *Anahamen*, & *Sakaikanheamen*. Plinius Phænon dici tradit, fortasse à splendore quem longè de se fundit, quam exemplaria etiam vetusta magna ex parte Fremium, & non Phænon habent, voce nihil, ut arbitror, significante: & Theodorus apud Theophrastum Anemonem vbique Fremium conuertit. Dicta autem est Anemone ἀπὸ τοῦ ἀνέμου, idest, à vento, quod flos nunquam se aperit nisi spirante vento auctore Plinio. Tamen cum hiare patereq; flantibus ventis per æstatem floribus multis vsuueniat, potuit non inconcinne dici Anemone, quæ eius flos caducus facili vento decutiatur, quemadmodum & papaueris rhœadis, cui affinis est. Ouidius Adonidis florem Anemonem vocare videtur his versibus.

Nomina

Lib. 21. c. 23.

Metam. 10.

*Sic fata, cruorem*

BB



*Nectare odorato sparsit, qui tactus ab illo  
Innumuit, sicut fuluo pellucida celo  
Surgere bulla solet: nec plena longior hora  
Facta mora est, cum flos de sanguine concolor ortus,  
Qualem qua lento cœlant sub cortice granum  
Punica ferre solent: brevis est tamen usus in illo.  
Namque male hærentem, & nimia leuitate caducum,  
Excutiunt iidem qui perflant omnia venti.*

Lib. 2. c. 172.  
Genera.

Dioscorides Anemonem duplicem statuit: ynam siluestrem, alteram satiuam (sic enim το ἄνερον melius vertas, quàm in cultis nascens, vt Plinius & eū secutus Ruellius interpretati sunt: nam siluestres plantæ etiam in cultis locis sponte, non satiu, nascuntur.) Satiua quædā puniceos fert flores, altera subalbidos, aut lactei coloris, alia purpureos. Plinius ex Dioscoridis sententia eadem genera tradidit his verbis.

Lib. 2. c. 173.

Anemonas coronarias tantum diximus: nunc reddemus & medicas. Sunt qui Phœnion vocent. Duo eius genera. Siluestris prima, altera in cultis nascens, vtræque fabulosis. Huiusque plures species: aut enim Phœniceum florem habet, quæ & copiosissima est, aut purpureum, aut lacteum. Sed coronarias Anemonas non rectè distribuit Plinius, & in conuertendo Theophrasti loco, quo Anemones meminit, lapsus est. Nam in Græcia, inquit, tardius etiamnum Anemone. Est autem hæc siluestrium bulborum flos, aliæque quàm quæ dicitur in medicinis. Sequitur cœnanthe, melanion, ex siluestribus heliochrysos: deinde alterum genus Anemones, quæ limonia vocatur. At Theophrastus vnus tantum Anemones hic meminit. Et paulo ante non Anemonem sed bulbi codion coronis inferi dixit, ex quibus duobus diuersissimis ineptè duplicem Anemonem Plinius statuit. Locum cum Plinij absque dubio corruptum quidam sic restituunt. Florum prima ver nuntiantium viola alba. Tepidioribus verò locis etiam hyeme emicat. Proximè flammea, quæ & flox vocatur, siluestris duntaxat. Bulbi codion bis anno, vere & autumno: æstates hyemisque fugit. Est autem siluestrium bulborum flos. Serior supradictis aliquanto

ANEMONE 1. Matth.



Forma.  
Ibidem.

Narcissus, & Liliū Theophrasto Lirium transmaria: in Italia, vt diximus, post Rosam. Nam in Græcia etiamnum tardius Anemone (nempe Limonia, siue pratenfis Theophrasti,) alia quàm quæ dicitur in medicinis. Postea viola quæ appellatur purpurea. Sequitur cœnanthe, &c. Recentiores quoque herbarij complures Anemones species agnoscunt. Anemones folia, auctore Dioscoride, coriandro similia tenuioribus incisuris, in terram inclinata, cauliculi lanuginosi, tenues, in quibus flores veluti papaueris, & media capita nigra aut carulea, radix magnitudine oliuæ aut maior, velut geniculis distincta. Siluestris per omnia maior est satiuæ, & foliis latioribus, ac durior: habet & caput oblongius, florem puniceum, radices tenues, & multas. Quibus descriptionibus satiuam à siluestri discreuit Dioscorides, primum radice in satiuæ tuberosa, velut geniculis distincta, in siluestri multis radicularum fibris capillata: deinde quod satiuæ minor foret, angustiore & teneriore folio, capite breuiore, flore vario: siluestris



ANEMONE II. *Matth.*



silvestris autem procerior, latiore & duriore folio, capite longiore, flore tantum puniceo. Ex iisdem colligere licet Anemonem Theophrasti, quam Pulsatilem esse volunt, a Dioscoridis Anemone diuersam esse. Ille enim hanc inter *πειρόφυλλα* reponit, idest, quæ propè terram & circa radicem tantum folia mittunt, in caule nulla, cuius notæ Dioscorides non meminit, omnesq; Anemones species quotquot ab herbariis proponuntur, statim ab radice & in caule & ramis foliosæ sunt. Plinius breuius sic descripsit. Harum trium folia apio similia sunt, nec temerè semipedis altitudinem excedunt, cacumine asparagi. Flos nunquam se aperit nisi vento spirante, vnde & nomen acceperunt. Silvestri amplitudo maior, latioribusq; foliis, flore Phœniceo. Præterea quoniã Anemonarum genera papaueri rhœadi & argemone floribus similia sunt, Dioscorides ideo diligenter harum differentias discreuit, hoc modo. Papauer & argemone colore puniceo minus saturato spectantur, & vtraque

Lib. 7. hist. ca. 9.

tardiùs floret. Adhæc argemone, croceum succum gustu admodum acrem reddit, Rhœas verò candidiorem & acrem. Insuper argemone & rhœas in medio capitula habent silvestri papaueri similia, verum Argemones caput supernè aliquanto crassius est, rhœadis subangustius. At Anemonæ neque succû remittunt, neque

ANEMONE III.

*Matthioli.*



ANEMONE IIII.

*Matthioli.*





ANEMONE V. *Maub.*ANEMONE Hortensis  
*Tragi.*

Lib. I. c. 49.

ce recta, laui, & digitum minimum crassa, caulem erigit teretem, & instar been albi, vt vocant, geniculatum, foliis herbacei coloris, usq; plurimum dissectis instar camomillæ vulgaris, aut cotulæ ad fastigium vsque, quod flore rutilo & quasi aureo forma argemonem planè referente nitet, vestitum. Dodonæus alias & diuersas descripsit & pinxit Anemonas. Prima folia habet pauca, sed in lacinias diuisa, ranunculi

codia siue calices habent, sed quasi asparagi cacumen. Quæ cum Græcè legantur, ὡς ὁπὸν ἀνέμοι, &c. Andr. Lacu. ὁπὸν non succum, sed lacrymam conuertitam succus, inquit, siue χυλὸς propriè dicitur is qui ex herbis tuis vi exprimitur, vt ὁπὸς vel lacryma, liquor ille qui ex plantis vltro destillat. Quare fieri non potest vt hic Dioscorides intelligat Anemonas nullum succum ex se remittere, quum superius dixerit Anemonarum succum infusum naribus, conferre purgando capiti: manare verò ab ipsis lacrymam, vt defluit a papauere opium, hic insiciatur. Hæc quamuis satis luculenta & distincta sit Anemonarum delineatio, tamen varij varias proponunt & cōfingunt Anemonas. Matthiolus quinque depinxit genera. Primum, inquit, folio prouenit coriandro simili, sed frequentioribus incisuris, caulibus lanuginosis, tenuibus, striatis, in quibus tenuiora per intervalla sunt folia, floribus siluestris papaueris magnitudine, quæ sena circum distinguunt folia, purpurascens, capitulo umbilico tenus emergente, nigro colore, nigrisq; capillamentis stipato, perinde vt in papauere: radix illi oleæ magnitudine, subrotunda, fibrataq; & sapore acri. Secundum foliis assurgit maioribus, & frequentius laciniatis cynoctoni aconiti modo, caulibus alteri similibus, sed aliquantò crassioribus, inanibus, & in rectum spectantibus; quibus flores infunt dilutiore purpura nitescens, capitulo circumquaque comato, perinde vt alterum: radicē habet breuiem, rapunculi ferè figura, fibris adnatis multis, acri etiam gustu. Tertium foliis crescit ranunculi primi æmulis, caulibus tenuibus, sequipalmaribus, rotundis, in quorum cacuminibus flores exeunt albi, quinque tantum foliis distincti, rosarū magnitudine, & nonnunquā tenui quadam purpura respersi, inferiore præsertim sede: radicem habet fibratā ac tenuem. Nascuntur in collibus. Sunt & Anemones genera alia duo, foliis laciniatis, floribus in altero purpureis, in altero aureis. Tragus Anemonas genus esse existimat plantam hic pictam Anemonem hortensem appellans, quæ ex radice



*ANEMONE I. Dodon.  
latifol. I. Lob. & Clus.*



*ANEMONE II. Dodo.  
tenuifol. III. Clus. siue Ge-  
raniifolia, Lob.*



ranunculum refert hortensifem, sed tamen minoribus, flos paulò maior senis ferè constat foliolis, candidus aut è purpura rubens, sed modò dilutiore, modò intensiore colore: capitula aspera, parua, nuda: radices tenuiores, sed obliquæ quoque, nihil aut parum geniculatæ, demissis deorsum aliquot fibris. Sexta quintæ similis

ranunculi hortensis foliis satis similia, sed minora. Flos in breui & palmum alto pediculo emicat ex vndecim aut tredecim foliolis angustis, oblongis, acuminatis, in quorum medio capitulum aliquot circumseptum staminibus, quod exili incanescit pilosò flore, cui subest semen. Radix initio oliuæ magnitudine, sed tempore adaugetur, & grandior facta, veluti geniculis articulatur, obliqua, non rectè descendens, fibris aliquot adhaerentibus. Color floris elegans est, in dilutiore purpura rubens, qui quandoque ab vtraque, aliàs ab interiore tantum relucet parte intensior, exterius remissior & inalbicans. Huius generis & albidì sunt flores, sed rariores. Clusius Anemones latifoliæ alterius pinxit. Lobellio Anemone tuberosa bolbocastani radice. An Anemone lutea Galeni. Secunda folia fert ranunculi hortensis similia, sed minora, trigemina cohærentia: flores ex tredecim aut quatuordecim foliolis, sed haud acuminatis, ac repandis compositos, colore cæruleos, & cyaneo flori còcolores, staminibus luteis medium orbiculū amplectentibus, quod nullis canescit pilis, sed veluti ranunculi, Asparagi æmulatur germen. Radix obliqua, crassa, genicula tuberaq; multa habet. Hanc Matthiolus non pinxit. Tertiæ Anemones folia maiora sunt crebrioribus ac tenuioribus etiam incisuris diuisa: pediculus similis, flos maior, cum papaueris rhœadis flore magnitudine ferè certans, septem aut octo foliorum tantum, pulchro violæ nigrae purpureo arridens colore, paulò tamen dilutiore: capitula huius pubescunt vt primæ: radix oblongior, crassior, similiter obliqua, crebrius geniculata, puniceo colore subnigricans. Et si verò Anemone secundæ Matthioli videtur vtcunq; similis, tamè multum differt. Est huius rubens quoque species, flore phœniceo, & vt rhœadis colorato: item tertia etiam candida. Quarta Anemone tertiam foliis, cauliculis & radicibus refert: flos mediocris quoque magnitudinis, Rhœadis colore, rubens, densis & frequentibus stipatus foliolis, multiplex, quorum decem aut duodecim exteriora maiora, interiora verò reliqua, exigua. Quinta species foliis


Li. 4. purg.  
ca. 7.



*ANEMONE III. Dodo.**Angustifolia, Clusij.*

est, foliis tantummodo floréque minor, eoque luteo, Ranunculi floribus concolor, radix similis quinta. Ranunculus nemorosus, quartus Fuchij lacteus & luteus, cuius meminimus in libro de Palustribus, cap. De Ranunculo. His adiecit aliam quandam tamen si foliis differentem. Neque enim coriandro aut ranunculo similia habet folia, sed potius Trifolij instar: coherent enim terna, non magna, lata, acuminata, indivisa, margine tantummodo crenato. Cauliculus palmum altus, cui flos insidet candidus, formam florum ranunculi æmulatus, qui marcescens nonnihil purpurei coloris contrahit. Radix etiam obliqua in propagines quasdam extuberat, non absque capillamentis fibrosis subnatis. Anemones quintum & sextum genus, inquit Dodonæus, in pratis & silvis, præsertim locis humidioribus ac umbrosis in Germania ac Belgio reperiri possunt. Reliquæ peregrinæ sunt. Omnes autem ad *inaptes*, id est, sativas, referendas esse censet. Silvestris enim species ab his differt, ut ex Dioscoride diximus. Clusius quoque ali-

quot Anemones genera observavit, non modò florum colore formæque, sed ipsis etiam foliis inter se dissimilia. Vnum foliis constat satis amplis, circumatæ ferè rotunditatis, per ambitum serratis, duris & firmis, longoque pediculo fultis, superne

*ANEMONE Latifolia**prima, Clusij.**ANEMONE IIII. Dodonæi.**Multiplex rubra, Clusij.*

intensius





intensiùs virentibus, infernè verò plerumque purpurascens Cyclamini ferè modo, feruidissimi gustus: radice tuberosa, oblongiuscula, Tormentilla vulgaris amula, fibris aliquot dependentibus, foris nigra, intus alba, solida, ingrati admodum saporis, quæque nauseam mouens quodammodo strangulet, deinde linguam aliquantulum vellicans. Lapidosis quibusdam

*ANEMONE Latifolia,*  
*flore multiplici, Clusij.*



Lusitaniæ collibus iuxta Tagum, atque etiam inter vepres Clusius se reperisse ait. Exilit Decembri & Ianuario. Alteram Anemonem latifoliam facit quam nuper diximus à Dodonæo primam statui. Tertiam tenuifoliam, quâ Dodonæus in Historia purga. secundam ponit. Quartam Anemonem tenuifoliam alteram, quam tertiam Dodonæi esse supra indicauimus. Aliam multiplicem rubram, quæ quarta est Dodonæi modo dicta. Alio in loco idem Clusius ad Anemones genera refert plantas duas minimè silentio prætereundas, quod elegantes sunt admodum. Prior multa ex vna radice promit folia, Anemones latifoliæ flore purpureo, aut Saniculæ haud multum dissimilia, dura, nervosa, in tres lacinias profundiores diuisa, deinde per ambitum serrata, supernè nigricantia, infernè candidiora, sapore feruidissimo, & si gustentur, ilicò linguam vrente, ante hyemem etiam germinantia, quemadmodum in reliquis Anemones generibus. Inter hæc caulis vnus aut alter prodit palmaris, nonnunquâ



*ANEMONE Tenuifolia*  
*flore multiplici, Clusij.*



bentia, quæ numerosa tenuiâque foliola Bellidis multiplicis flori perquam similia, & colore coccineo saturatiore, amplectuntur. Radix non admodum à superiore discrepat, oblongior paulò, foris etiam rugosa, nigricans, & tenuibus capillamentis fibrata, intus verò candida, & eiusdem cum superiore gustus, vtraque vere floret cum aliis Anemones generibus, quarum viribus etiam respondent. Constantinopoli delatas fuisse ait, Giul Catamer nomine: lingua autem Turcica Catamet siue Caremer plenum siue multiplicem significat. Anemone quædam folia producit nigra, & est acrior, inquit Dioscorides, vim habet vtraque acrem, quare succus radicis ipsius naribus infusus ad capitis purgationes utilis est, commanducata radix pituitam trahit, decocta in passò, & imposita, oculorum inflammationes sanat, eorumdem cicatrices & visus hebetudinem abstergit, expurgat fordida vlcera. Folia autem & caules cum prisana decocta, & in cibo sumpta lac attrahunt: in pessa apposita menses cient: imposita lepras eximunt. Plinius eundem vsum medicum tradit his verbis. Profunt anemonæ capitis doloribus, & inflammationibus, vuluis mulierum, lacti quoque. Et menstrua cient cum prisana sumptæ, aut vellere appositæ, radix commanducata pituitam trahit, dentes sanat decocta, oculorum epiphoras & cicatrices. Anemonæ omnes, auctore Galeno, extrahendi & attrahendi, & ora vasorum referandi facultatem habent. Itaque radix commanfa pituitam euocat, & succus ex naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper fordida vlcera anemonæ purgant, & lepras detrahunt, mensesque appositæ educunt, & lac trahunt.

Lib. 2. c. 172.  
*Vires & Temper.*

Lib. 21. c. 23.

Lib. 6. sim.

PVLSA



PULSATILLA.

CAP. XXX.



ARBARI pulsatillam nuncuparunt, quod huius comosi & tremuli  
seminum pappi huc atque illuc vel lenissimo quoque flatu pultaren-  
tur, id est, pellerentur, plerique herbam venti dixere, anemonem aut  
eius genus esse suspicari, & sanè merito: neque enim multum visa fuit

Nomina

PULSATILLA, Matth.



PULSATILLA Alba,  
Lobellij.



abesse à filuelli anemone quibusdam doctissi-  
mis. Quippe foliis est anomones tuberosa, bul-  
bocastani, aut coriandri, rigidioribus, hirsutio-  
ribus, nigricantibus, crassioribus, caulem palma-  
rem, & sesquipalmarem, hirsutum, geranij am-  
plexis, in quibus flores papaueris rhœadidis, aut  
potius anemones, quinis aut senis foliis in pur-  
pura cæruleis, è quorum medio exeriuntur api-  
culi, staminæ luea, Aquilegia, aut herba tri-  
nitatis, siue Trifolij hepatici, à quorum delapsu  
se prodit casaries villosa, cirris crebris, & cincin-  
nis calamistratis pēnas deliciores sericeas pul-  
li coloris implexas, aut carminatum bombacis  
pensum referentibus, cuiusmodi in caryophilla-  
ta, Scotino, & spongia Bedeguari, quibus condit-  
tur semen exiguum, asclepiadis: radice digi-  
tum crassa, non admodum acri nec feruida. Hac  
maior est, inquit Lobellius, foliis, maioriq̃ue  
elegantia floris albi peramœni. Huiusmodi pul-  
satillam flore candidam pallentem in Minde-  
nis montibus & Aruernis nasci Pena auctor  
est, sicut in Taurinensibus interdum luteam.  
Rubram etiam pictam dat Lobellius, qualem se  
habuisse ex Alepo Syria scribit Pena. Matthio-  
lus Fuchsum, erroris insinuat, quod anemones  
purpureæ loco Pulsatillam depinxerit, cui  
nulla cum anemone cognatio, inquit Mat-  
thiolus, illa etenim cum primum erumpit, folia  
emittit admodum hirsuta, minutimq̃ lacinia-  
ta, quæ sapore sunt perquam acri, adeo vt non  
minus exulcerent quam ranunculus & flammu-  
la. Flos in stellæ modum, similiter hirsutus in-  
cunte vere dehiscit, antequam folia erumpant,  
nigricanti splendet purpura, è cuius medio qui-  
dam aurei flosculi eos referentes qui ros inna-  
scuntur, in quorum umbilico floccus purpu-  
reus visitur, sericinum referens opus. Exteriori  
verò parte in caulis cacumine circa floris ba-  
sim villosus alter circumquaque se pandit floc-  
cus colore cinereo, sericino stamini mollitia ac  
læuore minimè cedens. Semen capillato inca-  
nòque capitulo iuglandis ferè magnitudine cō-  
tinetur. Radix illi subest pedali longitudine ex-  
sa nigri chamæleonis modò, cui sapor quidam  
subdulcis, non autem acris veluti foliis & cau-  
libus.

In Cap. 172  
lib. 2.



*PULSATILLA*  
*Rubra, Lobel.*

Lib. 4. c. 6.

Locus.

Forma.




libus. At hanc initiò dixit acrimonia esse ranunculi aut flammulæ. Dioscorides verò vult vtranque anemonem acrem esse, & acriorem illam cui folia nigra sunt, qualia sunt huius pulsatillæ, quæ crustas emarginat admotis foliis, quemadmodum de anemone dicit Dioscorides, qui intrò sumenda folia cum pissana elixat, quo deponant acrimoniam, ipsa verò radice, vt pote mitiore, cruda mansa pituitâ extrahit. Hæc Pena. Hic etiam alteram Dodonæi adiungendam censuimus, cuius hæc sunt verba. Apud Gallos locis incultis, inquit, gigni Ruellius scribit, nouoq; vere iis montes florere. Belgæ in hortis habent, apud Germanos satis frequens locis asperis & lapidosis, & subinde in ipsis rupibus, & quidem flore purpurei ex caruleo coloris: qui p locorū ratione aut intētor aut remissior. In syluis siquidē ac umbrosis dilutiore colore quasi in albicat flos, in Apricis coloratior est: Albidi floris Auerniæ & Narbonensis Gallia montes suppeditant: lutei Taurinenses Allobrogū: rubri floris ex Alepo Syriæ vrbe se habuisse Petrus Pena & Matthias Lobellius referunt. Galli *Coquelourdes*, Germani *Kuechen-schell* nominant: vulgò Pulsatilla, & à nonnullis Apium risus

dicitur. Nec est tamen herba Sardoia quæ propriè Apium risus dicitur. Nec etiam Ranunculi, neque Anemones species, vtrisque tamen, & præsertim facultatibus accedit. Est enim, vehementer acris quacumque contigerit corporis partem si trita imponatur. Cæterum siue Pulsatillam inter anemones genera collocemus, siue plantam sui generis esse placeat, ab anemone discrepantem, ex Alpium lætissimis pascuis, propinquis montium verticibus, & ob rosidos cæli madores multo plus herbæ aut fœni præbentibus, quàm si iuges aquas biberent. Dalechampi

*PULSATILLA*  
*Altera, Dodo.*



*PULSATILLA* 1. *Alpina,*  
*Dalechampi.*



tria





tria pulsatilla genera, luteo flore conspicua produxit. Primum radice crassa, nigra, *Forma.*  
 exesa, foliis apij modo dissectis, inter hæc tria genera latissimis, hispidis. Secun-  
 dum radice tenuiore, breuiore, minùs atra, foliis hortensi apio similibus, paulò la-  
 tioribus, hirsutis, radicem ambientibus, nullis in caule dodrantali, lanuginoso, me-  
 dia sui parte villoso glomo pubescente, ex quo prodit floris aurei pediculus. Ter-  
 tium radice quàm in superioribus graciliore, folio pastinacæ silvestris, apicibus in  
 medio flore coaceruatis, luteis, quos in seminis conceptaculum tandem formatos  
 spissa lanugo vestit. Hæc tria genera in monte Mura, oppidulo Allobrogum vi-  
 cino, reperiuntur.

PHALANGIVS. CAP. XXXI.



RACIS φαλάγγιον & φαλέγγις, Latinis similiter Phalangium & pha- *Nomina*  
 langites herba dicitur, quòd, Galeno auctore, demorsis à phalangis  
 auxilietur. Eam describit Dioscorides, ramulos duos aut tres aut plu- *Forma.*  
 res habere, à sese distantes, flores albos, lilio similes, cum multis inci- *Lib. 3, c. 13.*  
 suris, semen crassum, nigrum, vèut lentis dimidium ( In Græcis exemplaribus le-  
 gimus non πλατό, id est, latum, vt ex Plinio conuertit Ruellius, sed παχύν, hoc est  
 crassum, & in quibusdam non ὡς περ φακὸς ἡμῖνον, sed ὡς περ φακὸς ἡμισίον, id est, len-  
 tis magnitudine aut maiori, quæ lectio videtur probabilior) multò tamè gracilius,  
 radiculam paruam, tenuem, viridem, dum à terra extrahitur, postea enim contra- *Lib. 27, c. 13.*  
 hitur. Nascitur in collibus. Eadem ferè Plinius tradit. Phalangites à quibusdam  
 phalangium vocatur, ab aliis leucanthemum, vel vt in quibusdam exemplaribus  
 intuenio, leucacantha. Ramuli sunt ei nunquam pauciores duobus, in diuersa ten-  
 dentes: flos candidus lilio rubro similis, semine nigro, lato ad lenticulæ dimidiæ  
 figuram, multò tenuiore, radice tenui, herbacei coloris. Istud phalangium Dale-  
 champius esse censet herbam hîc expressam, quam reperit in terrenis collibus quâ  
 Lugduno



## PHALANGIVM,

Math.



## PHALANGIVM,


Dalechampij.



Lugduno Viennam itur, radice breui, carnosa, in multas radículas diuisa, cum eruitur pallida, vel sublutea: sic enim χλωρόν vertit ille, & non viridem, aut herbarci coloris, vt Plinius, & eum secutus Ruellius, postea autem cum herba seruatur, albescente, quam notam à Dioscoride traditam Ruellius omisit: sic enim habent Græca exemplaria. ριζὶον μικρὸν, λεπτὸν, χλωρόν ὅμοιόν τῷ ἐλευκασθῆναι ἐκ τῆς γῆς, ὕψερον γὰρ ἐκλευκάζεται, non συνέλεεται, vt in vulgatis, folia à radice multa, longa, graminii similia, latiora, virgata: caulis pedalis, nudus, in tres aut quatuor ramulos diuisus, florem sustinentes lacteum, lilio albo, non rubro, vt Plinius ait, omnino similem figura & colore, & croceis intus staminibus floris folia multis lineis in lōgum productis incisa conspiciuntur. Eandem plantam pro phalangio Pena & Lobellius representarunt. Eandem etiam Matthiolum quantum ex eius icone sola colligere licet: nam de plantæ habitu ac forma verbum nullum fecit. Ei aliud Lobellio Phalangium, quod ramosum nominat, Dodon. lib. 4. Hist. Stirp. Moly alterum Plinij, non satis rectè, vt multi censent: folia graminis habet humi strata, inter quæ caulis erigitur rotundus, læ-

## PHALANGIVM

Ramosum, Lobell.



uis, gracilis, circa summum in multos ramulos diuisus, quibus insident flosculi candidi, cariophyllis haud multum absimiles, sed multo minores: radices sunt longæ, graciles, valde fibratæ. In hortis colitur. Phalangium tertium Creræ Salonenfis Pena & Lobellius statuunt plātam superiori nō dissimilem, quæ copiosa nascitur in Gallo



in Galloprovincia planitie illa quæ vocatur *Craux de Salin*: cuius meminimus in Libro de Bulbosis inter Asphodelos. Phalangij folia, inquit Dioscorides, semen, flos cum vino pota contra scorpionum & phalangiorum ictus auxiliatur, tormi-  
na quoque discutiunt. Eadem prorsus Plinius tradit. Huius folio, vel flore, vel  
semine auxiliatur contra scorpionum phalangiorumque & serpentium ictus:  
item contra tormina. Galenus, Phalangites sic appellata est, quod moris à pha-  
langiis auxiliatur. Est autem facultatis tenuium partium desiccatis, quamobrem  
& tormina patientibus succurrit.

Lib. 3. c. 105

Lib. 27. c. 12

Lib. 8. simp

BELLIS.

CAP. XXXII.

**H**IC DE bellide fertis & coronis frequentissimè intertexta dicendum *Nomina*  
ex Plinio. Dioscorides enim, Galenus, atque alij veteres eam silen-  
tio præterierunt. Ab eodem Plinio etiam Bellius nominatur, à re-  
centioribus Consolida minor, & Herba margarita, à nonnullis Pri-  
mula veris, præsertim ea quæ minor est & silvestris, Gallis *Marguerites* & *Pasquettes*,  
Germanis *Maslieben*, & *Massfelen*, Italis *Primo fiore*, & *fior di primavera*. Potue-  
runt autem Belides funestæ illæ Beli Danai Regis filia quinquaginta, quæ toti-  
dem nuptæ maritis, eos qualibet suum iugularunt, his floribus nomen dedisse,  
quia multi visuntur vna gregatim & belluli, vnde vocantur vulgò *Marguerites*: sunt  
enim glomeruli multi florum quasi vniones siue margaritæ. Harum differentiæ  
aliquot reperiuntur. Fuchsius & Dodonæus species duas statuunt, alteram maio-  
rem, alteram minorem: quam iterum in hortensem & silvestrem partiuntur. Mat-  
thioli maior, mediam & minorem, atque huius differentias aliquot. Bellis,  
inquit Plinius, in pratis nascitur flore albo, aliquatenus rubente. Ex quibus per-  
paucis persuaserunt sibi herbarij eos flores, qui primo vere in pratis abundè erum-  
punt, bellides esse. Nec obstat, inquit Fuchsius, quod Plinius alibi bellio luteum  
flore esse tradat, quia non ad ambitum, sed ad di-  
scum medium floris, quod sanè luteum est, respe-  
xit. Præterea locus hic Plinij adeò corruptus est,  
vt in eo emendando frustrà hætenus desudarint  
docti viri. Sic enim in vulgatis legitur. Luteus &  
Bellio pastillicantibus quinquagenis quinis barbu-  
lis coronatur, pratenfes hi flores, & cætera. Vetus  
lectio habet teste Hermolao, Alij & Bellio pastilli-  
cantibus quinquagenis quinis barbulis coronan-  
tur: pratenfes hi flores. Legitur à quibusdam, Lu-  
teum & bellio, vt subaudiatur vox semen, quæ præ-  
cedit. Perottus non pastillicantibus, sed patuli-  
cantibus legebat, hoc est, aperientibus se, quod  
Hermolaus non probat. Sed ad Bellidum delinea-  
tiones reuertamur. Bellis maior, consolida media  
vulnerariorum folia profert ex angusto in latum  
desinentia, subrotunda, crassiuscula, virentia, cir-  
cumquaque crenata, circa radicem humistrata, in  
caulibus oblongiora, senecionis similia, caules à  
radice multos, graciles, teretes, lignosos, pedales &  
cubitales, in quorum summitatibus flores exeunt  
in medio lutei, in ambitu foliolis quamplurimis  
venustis, & candidis ornat, anthemidis similes, sed

Pet. Pe.  
fol. 199.

*Genera*  
Cap. 53.  
Lib. 2. c. 19.

In cap. 139.  
lib. 3.

Lib. 26. c. 6.  
Lib. 21. c. 8.

BELLIS Maior,  
Fuchsj.



*Forma*.

CC



*BELLIS Maior, Matth.**BELLIS Media, Matth.**BELLIDIS Minoris species tres, Matth.*

maiores, & inodori. Radix est sparsa multifidaque, & fibrata. Bellis media foliis est minoribus, nec tam altè incis, sed leuius serratis, in terra iacentibus, cauliculis tenuibus, flexilibus, rotundis, palmaribus, floribus superiori similibus, sed minoribus, radice tenuiore, tamen multifida. Bellidi minori hortensi folia sunt longiuscula, in summo subrotunda, leuius serrata, per humum in orbem strata, erumpentibus è medio pediculis crebris, teneris, pilosis, palmaribus, qui flores ferunt colore & magnitudine differentes. Est enim in quibusdà flos medio luteus, foliolis ambitu cãdidis, anthemidis, interdum saturatè rubentibus, in aliis versicoloribus, candidis scilicet & rubentibus, quæ frequentiores sunt & vulgatiores. Quotidam medio rubros,



QVÆ FLORE  
BELLIS *Siluestris,*  
*minor.*



PLACENT, LIB. VII.

855

dio rubros, ambitu aut albos, aut versicolores esse tradit Matthiolus, radix candida est & fibrata. Huic bellis siluestris minor persimilis est foliis: flosculi similiter ex radice exeunt pediculis breuibus, in medio lutei, toto ambitu foliolis candidis decori vt in bellide maiore, sed multò minores & inodori. Ab hac qua in hortis coluntur ad coronamenta, non differunt nisi cultu, inquit Pena. Annua enim & frequenti transplantatione maiores, habitiores confertiores, duplicati & triplicati, & elegantiores euadunt flores. Quinetiam præter magnitudinem tanta fertilitate luxuriant, vt ex primo flore pediculi surrigantur, quibus insideant alij & secundi flores. Galli ὑποκρησινῶς vocant *Margariton*. Idem & in Rosæ purpureæ flore aliquando prope Gratianopolin contigisse Dalechampus obserauit, pediculo è floris medio prodeunte, qui alterum florem post nascentem sustineret. Idem etiam vidit in eiusdem Rosæ flore, Lugduni in horto

fol. 199.

Rouillij. Est & Bellis Lutea, de qua diximus Libro de Umbelliferis. Bellis maior & minor in pratis nascitur, locisque aliis herbis & palustribus. Iam & in hortis feritur. Minor primo statim vere apparet, tota ferè æstate durat. Maior Maio potissimum mense floret. Bellidem vtramque calidam siccamque esse ex Plinio colligit Fuchsius tradit, qui illarum ad discutiendas strumas vsum esse scribit. Acidus tamen sapor quem in gustu minor præferat, aliquam frigiditatis portionem in ea esse monstrat, quamquam bellides exsiccare euidentissimū est. Omnes vulnerariam herbam esse nouerunt, valereque potissimum in fracturis capitis admotam. Succus etiam herbæ à vulneratis vtiliter bibitur. Laudatur etiam herba ad membrorum resolutionem, itemque ad podagras, ischiada, & aduersus strumas. Hæc Fuchsius. Dodonæus easdem facultate frigida siccaque esse scribit. Alio in loco bellidis minoris solia humectandi, refrigerandiq; vi prædita esse, & humectare quidem, ordine secundo intenso, refrigerare verò eodem remisso. Quod non probat Lobellius: constat enim temperaturæ frigida & sicca potius esse. Dolores omnes articulares, ac podagricos ex calido siccoque humore mitigare cum butyro recenti & infuso trita, ac locis dolentibus impolita, potissimum additis maluæ foliis. Eadem oleribus addita faciem aluum facere, (hoc Lobellio suspectum) & in caufonide febre, ac in intestinorum inflammationibus magna vtilitate clysteribus admisceri.

Locus.

Tempus.

Cap. 3. h.

Temp. &

Vires.

Lib. 2. c. 19.

De flo. c. 71.

PÆONIA.

CAP. XXXIII.



RAECIS παιονία, γλυκυσιδήν, seu γλυκυσίς, & πενθοροβος dicitur, ab Apuleio σεληνιον, διχομήμιον, θεοδόνιον, σεληνόγονον, Aglaophotis, Latinis Pæonia, ab Apuleio Herba casta, Arabibus *Feonia*, Gallis *Piuoine* Italis *Peonia*, Hispanis *Rosa del monte*, *Rosa albandeira*, Germanis *Peonienblum*. Pæonia verò ab eius inuentore medicinæ peritissimo Pæone appellata est, glycy side à Theodoro dulcisida, quod grana mali punici acinis similia habere videatur. Nam sidia mali punici grana à Bæotis nominantur. Ab eodem granorum cum eruo similitudine πενθοροβος Est enim ὀροβος eruum, quamquam & Græca Dioscoridis, & Latina Plinij exēplaria reperiuntur, in quibus non pentorobon, sed pen-

Nomina

CC 2



*PAEONIA Mas,*  
Matth.

*PAEONIA Mas,*  
Dalechampi.



*Genera.* roboron dubij lectionis & sententiae vox habeatur. Huius duo genera Dioscoridi, Lib. 3. c. 140. mas & femina. Dodonaeus his paeoniam feminam alteram addit. Paeonia mas folia ferruglandis, radice nitit ut digitali crassitudine, palmi longitudine, intus alba  
*De flo. c. 31.* & odorata, altè descendente, bifida aut trifida, gustu adstringente, caulis altitudine  
*Forma.*

*PAEONIA Femina*  
pr. or.



Lib. 25. c. 4.

sesquipedali adolefcit, comitibus multis stolonibus, qui, ut caulis, rubescunt. In summo caule flores emicant egregio rubore insignes, puniceis magnis rosis similes, extante in medio veluti corniculo, flosculis illis luteis capillis annexis circumuallato, quibus succedunt siliquæ foris lanuginosæ, amygdalis similes ternæ aut quaternæ, in quibus cum dehiscunt, multa grana exigua, rubra, acinis punici mali similia inueniuntur, & in medio nigra, purpurea, quinque aut sex. Fœminæ folia Smyrni modo diuisa sunt, superiore parte viridiora, inferiore magis albicantia: radix nigra, cui appendices veluti glandes septem aut octo inherent, ut in asphodelo: flores ut masculæ pæoniæ colore aliàs valde rubri: aliàs dilutè rubentes: semen in similibus siliquis & simile. Plinius in discutienda Pæoniæ vtriusque historia à Dioscoride dissidet. Verustissima inuētū pæonia est, inquit, nomenq; auctoris retinet: quam quidam pentorobon appellant, alij glycysidem. Hæc quoque difficultas est, quod eadem aliter alibi nuncupatur. Nascitur opacis montibus, caule inter



inter folia digitorum quatuor, ferente in cacumine veluti græcas nuces quatuor aut quinque. Inest iis semen copiosum, rubrum, nigrumque. Et alio in loco. Glycy-  
side, quam aliqui pæoniam aut pentorobon vocant, caulem habet duorum cubi-  
torum, comitantibus duobus aut tribus, subrutilum, cute lauri: folia qualia Ifatis,  
pinguiora, rotundioraque & minora: semen in siliquis, aliud grano rubente, aliud  
nigro. Duo autem genera sunt. Fœmina existimatur cuius radicibus seu balani lon-  
giores, circiter octo, aut sex adherent. Mas plures habet, quoniam non vna radice  
nexus est, palmi altitudine, candidaque. Ea gustu adstringit. Fœminæ folia myrrhæ  
redolent, & densiora sunt. Nascuntur in silvis. Hæc Plinius, quorum alia vt deprava-  
ta, corrigenda, alia ex vera plantæ historia ponderanda. Primum id falsum esse ma-  
rem fœmina plures habere radices, quoniam vnica nexus est, quod omnium qui  
pæoniam descripserunt testimoniis comprobatur. Hoc emendari negatione so-  
lùm transposita debet hoc modò. Mas plures non habet, quoniam vna radice ni-  
xus est. Quod verò sequitur, fœminæ folia myrrham redolent, & densiora sunt, in  
magna suspitione versatur, ne *σιμύρναι* pro *σιμύρνιον* agnouerit. Dioscorides enim,  
*ἢ δὲ θήλειαν ἀπὲρ χύσαι τὰ φύλλα ὡς περ σιμύρνιον*, inquit: nisi quis dicat cum smyrnium  
myrrham redoleat, perinde esse vtro modo dicas, vel fœminæ folia myrrham re-  
dolere vel smyrnium, densiora verò esse non sine ratione addit Plinius, etiamsi in  
Dioscoride id non legatur, quod fortasse suprapositis eiusdem verbis sit subden-  
dum, *ἀλλὰ πυκνότερα ἔχει*. Præterea non sibi constat Plinius, qui priore loco pæo-  
niam caule inter folia digitorum quatuor esse scribit, posteriore caulem habere  
duum cubitorum, cum ad sesquipedem aut palmos duos tantum assurgat auctore  
Dioscoride, id quod & planta ipsa testatur. Sequitur comitantibus duobus aut tri-  
bus subrutilum, &c. Legendum foret comitantibus multis stolonibus ex Diosco-  
ride scribente *παραφυάδας ἔχων πολλὰς*. subrutilum caulem verè scripsit, quod ta-  
men à Dioscoride prætermisum est, alij librariorum vitio id euenisse existimant,  
legendumque, *καὺλος ὡς δισπιθαμῖος, ὑπερῖος φύεται*. cauli verò cutem lauri saltò

*PÆONIA Fœmina*  
altera, Dodon.



tribuit, vt alicubi *φλοιὸν ἔχειν δάφνης*, pro *δάφνης* legisse videatur, cum caulium pæonia  
cortex daphnoidi multò similior sit quàm lau-  
ro. Quod autem folia pæoniæ Ifatidis esse ait, ex  
Dioscoride & plantæ effigie iuglandis repenti-  
to, illius enim folia iuglandis foliis haud dissimilia sunt, aliquāto rotundiora, minora & pin-  
guiora. Pæonia fœmina altera caules habet &  
folia priori fœminæ similia, sed in viore can-  
didiora, auersaque parte etiam albidiora: flo-  
res minores, dilutius rubentes, radices quoque  
glandulosas, sed singulas multò longiores ac  
tenuiores. Hæc pæonia, mare nōdum reperto,  
à nonnullis herbariis mas credebatur, inquit  
Pena, quam promiscuam, quasi vtriusque par-  
ticeps esset, & neutram appellant. Quippe  
quantum à solo extat si perpendas, marem di-  
das: si erutas radices intueare, fœminam iudi-  
ces, nisi quia pleniores & habitiores. His ad-  
iungitur à Lobellio Pæonia fœmina polyan-  
thes, Belgij hortis specioso florum incremen-  
to, qui duplicatione & fœtura, vti papauera,  
maximum Althææ hortensis florem æquant,



Locus.

PÆONIA Fœmina  
Polyanthes, Lobell.

fol. 309.

Vires &  
Temper.  
Lib. 3, c. 140

& interdum superât. Nascitur pæonia, vt scribit Dioscorides, in altissimis montibus & pręruptis: vt Plinius, in opacis montibus, & alio loco, in silicis: vt Apuleius in Crete & Sicilia montibus. Hac etate in horris colitur, & vulgarissima quidem semina prior, deinde altera, mascula rarissima. Pena marem & fœminam Geneuæ Alpinis, & Narbonæ arduis Veganij culminibus, & ibidē siluosis, nō procul alio celebri monte Lupi vocato se eruisse asserit, vere florentem, & ineunte aestate, ibique peracq; frequentem vtrāque hortis, tamen notiozem fœminam, eoque vſu frequentiozem. Fœminis à partu non purgatis datur radix, auctore Dioscoride, cit menses amygdalæ magnitudine pota. Ventris doloribus cum vino pota auxiliatur, regio morbo correptis prodest, renum ac vesicæ doloribus. Decocta in vino & pota aluum sistit, rubra grana decem aut duodecim in vino austero & nigro pota, rubentem fluxionem sistunt. Stomachicis & erosionibus comesta profunt.

A pueris pota & comesta initia calculorum

eximunt. Grana nigra nocturnis suppressionibus, ephialtas nominât, vuluæ strangulationibus, & vteri doloribus in aqua mulsâ aut vino quindecim pota auxiliantur. Eundem ferè vſum pæonię medicum tradit Plinius, his verbis. Hęc in edetur &

Lib. 25, c. 4.

faunorum in nocte ludibriis. Præcipiunt eruere noctu, quoniam si picus martius videat, ruendo in oculos impetum faciat. Et posteriore loco. Tradunt noctu effodiendas, quoniam pico martio impetum in oculos faciente, interdiu periculosum fit. Radix verò cū effodiatur, periculosum esse ne sedes procidat: magna id vanitate ad ostetationem rei fictum arbitror. Vſus in his diuersus. Rubra enim grana rſbentes menses sistunt quindecim ferè pota in vino nigro. Nigra grana vuluis mendentur, ex passo aut vino toridem pota. Radix omnes vëtris dolores sedat in vino, aluūmq; purgat: sanat opisthotonum, morbum regium, renes, vesicam: matricem autem & stomachum decocta in vino: aluum sistit: estur etiam contra malū mentis: sed in medendo quatuor drachmæ satis sunt. Grana nigra auxiliantur & suppressionibus nocturnis in vino pota, quo dictum est numero. Stomachi verò erosionibus & esse ea, & illinere prodest. Suppurationes quoq; discutiuntur recētes nigro semine, veteres rubro. Vtrunq; auxiliatur à serpente percussis: & pueris contra calculos incipiente stranguria. Quę Plinius faunorum in nocte ludibria vocat, eadem posteriore loco nocturnas suppressiones appellat, Dioscorides τῶν ἐφιαλτῶν ἀνγυμῖς.

Lib. 27, c. 10

Quid autem sit ephialtes, Latine incubus Paulus Aegi. declarat, aduersus quem epilepsiæ nuntium cum plurimum valeat pæonia, ephialtion hanc vocauerunt antiqui. Quod de pico martio tradit, Theophrastus sic declarat. Ἀλλὰ τὰ τοῖς αἰσιν ὥσπερ ἐπιθεῖται τὸ ὄφθῆναι, οἷον τὴν παχυντὴν καλῶσι, νύκτωρ κελεύουσιν ὀρύττειν. ἐὰν γὰρ ἡμέρας, καὶ ὁφθῇ ἢ ὑποδρυσοκοπάσου, τὸν μὲν χερπὸν ἀπολέγων καὶ δυνάμει τοῖς ὀφθαλμοῖς τὴν ὀρίαν τέμνειν φασὶν ἐκπίπτειν τὴν ἔδραν. Id est, Giza interprete, At illa veluti adiecitia, & è longinquo ducta appareant, castam enim quam alij dulcidam vocant, noctu effodiendam præcipiunt: nam si interdiu, & à Pico martio visus quisquam sit, fructum quidem legens oculis periclitabitur. Radicem autem

Lib. 3, c. 5.

Lib. 9, hist.  
cap. 9.

fecanti



secanti sedes procider. Sed vanissima sunt hæc: nā pæonia fructus & radix quavis hora diei & noctis sine periculo colligi & euelli possunt. Id annotasse præstiterit locum Plinij corruptū esse quo in vulgatis exemplaribus legitur, Sanat opisthotonum, morbum regium, &c. quem ex veteri codice sic restituit Cornarius. Sanat opisthotonum, morbum regium, renes, vesicam, arteriam, & stomachum decocta in vino: aluumq; sistit: estur etiā cum alimētis. Sed in medendo quatuor drachmæ satis sunt. Sed & præter codicis illius fidem, inquit Cornarius, Plinius nusquam alias matricis voce hac significatione, qua etiam hodie vulgus vti solet, vsus est: nec vsquam malum mentis pro aliquo peculiari morbo dixit. Alij insaniam, siue melancholiam morbum interpretantur. Præterea scribit Plinius, sanguinis profluvium sisti herbæ pæoniae semine rubro. Eandem & in radice vim. Et aliquanto post, Muliebribus morbis mederi maximè in vniuersum pæoniae herbæ semē noster, Galenus de eiusdem grum ex aqua mulsā. Eandem & in radice vim, menses cieri. Galenus de eiusdem facultatibus ita disserit. Pæonia radicem habet leuiter astringentem cum quadam dulcedine, ac si pluscūlū dentibus mandas, acrimoniam quampiam subamaram subesse percipies. Quare menses ciet ex melicrato amygdali pota quantitate. Expurgat etiam iccur obstructum ac renes: sed hæc efficit quā acris & subamara est: quā verò quiddam etiam adstrictorium obtinet, in ventre prouenientes fluxiones sistere potest. Caterū eam in vino quopiam austero decoctam potare conuenit. Est porro omnino & desiccatoria: quapropter haud desperauerim eam ex colo pueris suspensam meritò morbum comitalem sanare. Equidem vidi puellum quandoque octo totis mensibus morbo comitali liberum, ac postea fortè cum quod à collo suspensum erat decidisset, protinus denuò conuulsione corruptum, rursusq; suspensum in locum illius alio, inculpatè postea egisse. Porro visum est mihi satius esse rursus id collo detrahare certioris experientiae gratia: quod cum fecissem, ac puer iterum conuulsus esset, magnam recentis radiceis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus. Rationi consentaneum itaque erat, aut partes quaspiam à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas affectos ita locos curare: aut aërem à radice assidue alterari & mutari. Hæc Galenus. Selencus vetus auctor, apud Athenæum interprete Hermolao, glycyfiden pomi genus specie fici tradit, quod mulieres maximè deuitant infatuationis metu: ita enim, inquit, *ματρίσμον* interpretor. At Dalechampius Pæoniae radicem *ματρίσμος ποτίζω*, idest, *τῶν τοκῶν φθορὰν*, abortum facere, interpretatur: ideoq; feminas ab ea consultò cauere: quod verisimile est, cum purgationes à partu, mensesque ciet Dioscoridi.

Embl. 142.  
lib. 3.

Li. 26. c. 25.  
Cap. 15.

Li. 6. simpl.

Lib. 5.

ASTER ATTICVS. CAP. XXXIIII.

**A**STH P *ἀστὴρ* Græcis & *βελώνιον*, Aster atticus Latinis, idest, Stella attica, & Inguinalis. Est autem huic herbæ Asteris nomen à foliorū in floribus figura stellæ modo radiatorum, quā Græci Astera vocant: non quia noctu & in tenebris stellarum modo fulgeat. Adiecerunt illi ab Atheniensi agro notam veteres Græci, quod illic ob soli tenuitatem infrequentior aut melior fortè nasceretur. Bubonium ab iisdem dicta est, quod Inguinibus quæ bubonas illi vocant, tam præsentī remedio medeatur, vt alligata tantū medicinam in eo malo homini faciat. Aster atticus, vt describit Dioscorides, virga est lignosa, florem habens in cacumine purpureū luteūmve. (Sic enim habent vulgata exemplaria, tamen Matthiolus legendum censet *ἀνθος πορφυρεῖν καὶ κίτρινον*, idest, florem purpureum & luteum,) velut anthemidis capitulum, in

Nomina

Li. 4. ca. 115.

Forma.




Lib. 27. c. 5. ambitu incisuris diuisum, foliola stellæ similia: quæ verò circum caulem sunt folia, oblonga & hirsuta. Breuiter sic Plinius. Aster ab aliquibus Bubonium appellatur, quoniam inguinum præsentaneum remedium est: cauliculus foliis oblongis, duobus aut tribus in cacumine capitula stellæ modo radiata. Matthiolus legitimum Asterem atticum hîc depictum, floribus intus luteis, in ambitu purpureis, eundemque Vergilianum Amellum esse censet: quem duplicem floris colorem etiam innuit Dioscorides in fine capitis, his verbis, πορφύρεον τὸ ἔνθεον, idest, purpureum in flore, vt & doctissimus Marcellus interpretatur, scribens herbæ huius purpureum & luteum florem ad diuersas floris partes referendam esse: sunt enim, inquit, purpurei coloris folia, quod verò medium inter ea folia capitulum est chammeli modo lutescit. Asterem Italorum flore purpureo luteo vocat Lobellius: Matth. ibi. in Galloprovincia, Narbonensi Gallia & Longobardia reperitur. Herba ista caules ab radice mittit rectos, solidos, ac lignosos, colore fulco lutescente: è quibus circa cacumen ramuli oriuntur, in quorum summitate flores spectantur stellæ modo radiati, vt in anthemide, medio lutei, comantibus circumquaque foliolis dilata purpura nitentibus. Folia profert oblonga, acuminata, oleæ figura, minora tamen, hirsuta, aspera, nigricantia, subamaro sapore, in caule minora sunt: radicem habet multifidam, odore non ingrato, & nonnihil caryophylli respicientem.

Locus. Nasceitur in collibus, & nonnunquam in pratis & siluis. Floret æstatis fine, aut principio autumnii, vt Augusto mense & Septembri durantiq; in magnam autumni partem eius flores, qui tandem flaccescunt, & in pappos abeunt, semine paruo, oblongo,

ASTER Atticus, Matth.



ASTER Atticus alter, Matth.



intybo non multum dissimili. Matthiolus Asterem atticum alterum ostendit, Narbonensi agro prope pratorum margines & fluenta frequentem, auctore Pena, qui Monspelienfium Asterem vocat, quo nulla alia planta melius Asterem Dioscoridis designat. Florem enim edit æstate aureum, circumscriptum, compressum, nec admodum extuberantis rotunditatis Buphthalmi, aut Chrysanthemi, quem ambiunt quina senave foliola, angusta, mucronata, rigida longiuscula, stellâ marinâ, piscem



piscem ita nominatum non parum referentia: caules pedales, ternos aut quater-  
nos, duros, hirsutos, quibus totis insunt folia oblonga, Lychnidis aut verbasci Sal-  
ui folij tenuioris, hirsuta, rigidiuscula, viridia, in fusco obscura: radicem capillatam  
sparsam, sapore astringente, amaricante, non acri, nec ita ingrato: semen Anthemi-  
dis, Augusto vel Septembri maturum. In Franciæ, Belgij, Germaniæ, Galliæ hor-  
dis, Augusto vel Septembri nascunt quibusdam in locis florū foliola subtus. Eandem  
plantam pro Astere attico Lobellius pinxit. Prodest

*ASTER Purpureus  
montanus.*



astuati stomacho imposita, inquit Dioscorides, ocu-  
lorum inflammationibus, bubonibus, & procidenti  
fedi. Tradunt, quod in flore purpureum est, si biba-  
tur ex aqua angina correptis, & puerorum comitia-  
libus opitulari. Recens inguinum inflammationibus  
illita prodest. Sicca sinistra manu dolentis decerpta,  
inguini adalligata doloribus liberat. Plinius non  
eadem omnia habet. Bibitur, inquit, & aduersus ser-  
pentes. Sed ad inguinum medicinam sinistra manu  
decerpi iubent, & iuxta cinctus adalligari. Prodest  
& coxendicis dolori adalligata. Galenus, Aster atti-  
cus siue bubonium, non ob id tantum quod illitum,  
sed etiam quod suspensum bubones sanare creditur,  
habet quiddam digerens, & præterea quidpiam non  
minime refrigerans, ac reprimens, ut mixta sit potē-  
tia, quemadmodum rosa, verum id non adstringit.  
Merito etiam Aster dicendus, cognomento purpu-  
reus montanus, qui in sabulosis, aridis, & perflatis  
mōtium tumulis, ac cliuis gignitur, radice nigrican-  
te, lignosa ac dura, fibrata, foliis circa eam multis, hu-  
mi repentibus, oblongis, angustis, in ambitu non

*Vires &  
Temper.*

*Li. 27. c. 10.*

*Li. 6. simpl.*

*ASTER Atticus supinus, Clusij.*



*ASTER Conyzoides, Gesneri.*



*crenatis*



crenatis:caulibus dodrantalibus,parum foliosis: flore in caulis vertice anthemidi  
 caruleæ quam eranthemum vocant, simili, foliolis caruleis purpureisve, luteum  
 veluti oculum stellatim ambientibus. Hic addendi Asters duo. Prior erit Cony-  
 zoides Gesneri, facie, foliis, & furculis dodrantalibus Conyzæ minimæ similis, flo-  
 re Asteris obsoleto luteo. In pappos evanescente. In Anglia, Belgio, & agro Lo-  
 uanienfi reperitur. Alter est Aster humi iacens Clusij, radice perenni, cauliculis  
 multis ab vna radice exeuntibus, per terram magna ex parte sparsis, hirsutis: foliis  
 Asteri secundo Matthioli ferè si milibus, sed paulò viridioribus & numerosis. Sin-  
 guli rami durum & foliosum sustinent caliculum, in quo flos luteus circinate ro-  
 tunditatis, Buphthalmi aut Chrysanthemi æmulus, quo evanescente caliculi illi  
 in dura adè & lignosa capitula euadunt, vt vngue vix frangi possint, & semen  
 quod in eis continetur & firmiter hæret, erui. Inuenitur quibusdam Castellæ  
 nouæ locis.

## BUPHTHALMV M.

## CAP. XXXV.

Nomina

Forma.

Diosc. li. 3.

ca. 139.

Lib. 25. c. 8.

Ca. 52. hist.

Ca. 339. li. 3.



ΒΥΦΘΑΛΜΟΝ Græcè, Buphthalmū Latinè, & Oculis bouis di-  
 citur, Arabice *Bihar*, Gallicè *Oeil de bœuf*. Cauliculos proferit teneros te-  
 nuésque, folia fœniculo similia, flores luteos, maiores quàm Anthe-  
 mis, oculi speciem referentes, vnde nomē traxit. Circa oppida nasci-  
 tur, & in caestribus. Eadē ferè Plinius tradit. Est & Buphthalmos similis oculis,  
 folio fœniculi, circa oppida nascens, fruticosa caulibus, qui & manduntur decocti.  
 Quidā Cachlan vocāt. De vero Buphthalmo variæ sunt recētiōrū herbariōrū  
 sententiæ. Nōnulli putant herbā in pratis & agrorū marginibus nascētē, quam  
 Bellidem maiorem diximus, Buphthalmum esse, quod florescit intus luteo, foris

## BUPHTHALMV M.

Matthioli.



albis foliolis circumdato, anthemide maiore. Alij in  
 quibus est Fuchsius, eam quæ Officinis Cotula non  
 fœtida dicitur, cui, vt superiori, flos totus luteus non  
 est, cuiusmodi Buphthalmo esse debet, sed toto ambi-  
 tu candidus. Matthiolus aliud Buphthalmum, quod  
 legitimum esse censet, depinxit, toto flore luteo.  
 Dalechampius ab his diuersum ad Rhodani ripam  
 propè fossas marianas proueniens, radice breui, tenui,  
 candida, capillata, caule palmum longo, tereti, gracili,  
 subrubro, foliis fœniculi per ramulos, è caule pro-  
 deuntes sparsis, flore anthemidis, prorsus luteo, media  
 sui parte velut exculpto & cauo, oculi figura, vnde &  
 nomen ei positum. Idem videtur esse Chrysanthemū  
 Valentinum Clusij, quod ipsemet ad Buphthalmi ge-  
 nera potius referendum censet, nisi quis Achilleæ spe-  
 ciem esse malit. Lobellius etiā Buphthalmum tenui-  
 folium Narbonensē vocat. Dodonæus stirpem aliam  
 pro genuino Buphthalmo proponit, cui cauliculi  
 exeunt è radicibus, tenues, tres, aut quatuor, aut plures,  
 pedales, vel altiores, circa quos folia virentia, tenuiter  
 dissecta, similitudine foliorū fœniculi, sed multò quā  
 illius minora, flores in summo cauliculorum magni,  
 calendulæ satis similes, colore luteo magis dilutò, sta-

Maio





*BUPHTHALMUM*  
*Alterum, Pena.*



cum cerato. Galenus, Bupthalmum, inquit, sic appellatum est à floribus, qui figura quidem boum oculis videantur adsimiles, colore autem anthemidis floribus simillimi sunt, sed multò tum maiores, tum acriores, quare & vehementius digerunt, adeo ut & duritias sanent cerato misti.



Maio mense aut Iunio floret. Sunt qui velint stirpem hanc veratri nigri speciem esse, nonnulli consiliginem, quidam Scfamoides, alij Elleborastrum: cui nulla harum appellationum conuenire potest ut perspicue docet idem Dodonæus, sed solum Bupthalmi nomen, ut ille existimat. Pena idem Bupthalmum exhibere videtur, quod ex Dalechampsio hinc pictum damus. Alterum addit folio & facie Cotulæ foetidae, repertum secus Arantiorum lucos Olbiæ in Galloprovincia maritima. Caules promit flexuosos, cubitales, & duos pedes altos, quos ambiunt folia tenella Anthemidis, lætiora, Cotulæ foetidæ paria. Flores sunt radiati, lutei Chrysanthemi aruorum, aut Calthæ sponte nascentis. Hanc etiam se reperisse, ait in agro Romano. Bupthalmi flores, auctore Dioscoride, cum cerato triti œdemata & duritias discutunt. Aiunt si statim post exitum à balneo bibatur, bonum colorem morbo regio affectis ad tempus aliquod inducere. Breuius Plinius, hæc cum cera scirrhomata discutit: ubi suo more cum cera dixit pro σμῶν κηρός, id est,

Lib. 3. c. 119.  
*Vires &*  
*Temper.*

Lib. 25. c. 8.  
 Li. 6. simpl.

APHYL



Nomina

Li. 21. c. 16.



HEOPHRASTVS inter ἐπιφύλλα, idest, plantas quæ circa radicē folia fundunt, recenset ἀφύλλανθες: quo loco Gaza φυλλανθες legit, vertitq; fraudiflorā, deceptus fortēse deprauata Plinij lectione. Cum verò in omnibus ferè plantis ea sit florum constructio ac figura, vt foliorum certo numero quisq; flos constet ambitum floris occupantium, & medios apices velut circumuallantium, vt in leucoijs omnibus, & aliis ferè innumeris, nunc varia figura stamina, fila, & id genus alia in medio extantia amplexantium, vt in voluulo, lilio, & similibus, paucis id contigit, vt florem in foliola non explicatum & expansum fortita sint, quod genus Aphyllanthes Græci vocauerunt, quia flores foliis careant. Aphyllanthis species tres ex Dalechamio hîc depinguntur, & describuntur. Aphyllanthes primum radice constat breui, candida, parum fibrata, cauliculis multis, interdum cubitalibus, sæpius humilibus, angulosis, infernè rubentibus, hirsutis, foliolis multis per caulem totum sparsis, oblongis, angustis, gnaphalio vulgari similibus, flore in caulis fastigio singulari, cæruleo, non ex foliolis, sed ex apicibus, seu staminibus cæsis, densius congestis compacto, scabiofo florem æmulante, sapore in caulibus & foliis principio cum herba manditur, nullo, deinde

## APHYLLANTHES, I.

Genera.  
Forma.

## APHYLLANTHES, II.



## APHYLLANTHES, III.



subdulci



subdulci. In aridis & squallidis provenit. Floret Iunio mense. Hanc plantam Dodonæus tertium scabiosæ genus facit. Aphyllanthès secundum radice est parva, breui, candida, foliis propè radicem multis, saluæ, aut betonicæ, longo pediculo nixis, parum dissectis, caule pedali nonnunquam altiore, paucis in eo foliolis, flore in summo caulis vertice cæruleo, ex apicibus multis coagmentato, deorsum nuntante, sine vllis foliolis. Caulis & folia cum franguntur lacteum succum reddunt. Quidam morsus diaboli genus esse putant. Gignitur in pratis montosis. Tertium radice est parva, fibrata, alba, foliis circa radicem multis, humi stratis, ex viridi nigricantibus, subrotundis, bellidis, in caule paucis aut nullis, caulibus duobus aut tribus pedalibus, rotundis, flore in cacumine cæruleo, aliis generibus supra descriptis simili, paulò latiore, corymbi forma, sapore in tota planta amaro. Hanc Bellidem cæruleam vocat Pena, quæ à florum glomis globisve Globularia à recentioribus nominatur, præsertim à Monspelienfibus.

Locus.

Tempus.

Lib. I. ca. 7.

ONAGRA. CAP. XXXVII.



NΑΓΡΑ, ὀνοθήρα, ὄνυξις Dioscoridi, ὀνοθήρα Theophrasto, ὄναγρον, ὄνοθήρα, ὀνοθυξις Galeno, Latine similiter Onagra, siue potius Oenagra, & Oenothera, Oenotheris, Oenuris à vino dicta. Frutex est arboris specie, ita describete Dioscor. admodum magnus, folia habes amygdalæ similia, sed latiora, & lilij foliis similia, flores rosarum specie, magnos, radicem albam, longam, quæ siccata vini odorem reddit. Nascitur in montanis locis. Eadem Plinius tradit. Et œnothera, siue onuris hilaritatem afferens in vino, amygdalaceo folio, flore rosaceo, fruticosa, longa radice, & cum siccata est vinum olente. Hæc in potu data feras quoque mitigat: Quæ ex Theophrasto descripta sunt: ἡ δὲ τῆς ὀνοθήρας ῥίζα, inquit, ὁλοθεῖται ἐν οἶνῳ πρῶτον τῶν ἰατρικῶν ὀνυξίων. ἔχῃ δὲ ὁ ὀνοθήρας ὁ μὲν φύλλον ὁμοίον ἀμυγδαλῇ, πλεονέκτερον δὲ, ὅτι ἂνθος ἐρυθρὸν ὡς περ ῥόδον. αὐτὸς δὲ μέγας ὡς γάμνος, ῥίζα δὲ ἐρυθρὰ καὶ μεγάλη. ὅρα δὲ ἀναθεῖσθαι ὡς περ οἶνος (corrupte: legendum enim ex Dioscoride & Plinio, ὅτι δὲ ἀναθεῖται ὡς περ οἶνος) φαίνεται ὅρα καὶ χωρεῖ. Id est, Gaza interprete. Contra radix œnothere data in vino mitiores hilarioreſque mores reddit. Constat œnothera folio amygdalæ, verum maiore, flore rosaceo: loca adamat mōtosa. Omisit Gaza, αὐτὸς δὲ μέγας. &c. Oenothera magnus est frutex, radice rubra & magna, quæ siccata vinum olet. Stirpem hanc diu & multum quæsitam fortasse nondum repperunt herbarij: tamen eruditi quidam ex coniectura hanc exhibent, quæ frutex est prægrandis, ad hominis enim altitudinem assurgit, folio amygdalino, sed latiore longiorēque, siue saligno, quam ob causam quidam Salicariam appellarunt, caules inæqualiter distinguente, flore in summis caulibus rosaceo Dioscoridis & Theophrasti sententia, quorum hic ἂνθος ἐρυθρὸν ὡς περ ῥόδον requirit, ille ἂνθος ῥοδοειδῆ, quod de floribus expansis intelligendum: nam initio conclusi veluti spicatum coaceruantur: semen minutulum siliquis includitur, lanugine obductum. Radice nititur crassa, longa, surculosa, cortice è nigro rubescēte, intus candida. Qua ratione Theophrastum cum Dioscoride conciliabis, qui radicem candidam

Nomina

Lib. 4. c. 13

Li. 26. c. 11.

Lib 9. hist cap. 21.

ONAGRA.



DD



**Locus.** describit, Theophrastus rubrā. Nascitur in montibus. Aqua in qua radix maduerit in potu data auctore Dioscoride, feras mitigat, & cicures reddit: illita quoque maligna vlcera mulcet. Adiecit Crateuas, inquit Plinius, ænotheridem, cuius aspersu è vino feritas omnium animalium mitigaretur. Et, per se ænotheria effertantia sese vlcera sanat, ita *ῥηκώδη ἐλκην* Dioscoridis exponens. Huius radix, inquit Galenus, arefacta vinosum quiddam redolet. Sed & facultatis vini est maxime.

**Vires.**  
Lib. 4. c. 113.  
Li. 24. c. 17.  
Li. 26. c. 14.  
Li. 8. simpl.

## LINARIA RUBRA.

## CAP. XXXVIII.

**Nomina**  
Lib. 25. c. 9.  
Lib. 3. c. 84.  
**Forma.**  
Ibidem.

**P**LANTA hæc herbariorum quorundam iudicio Therionarca est Plinij, fruticosa, foliis subviridibus, flore roseo, at Delphinium Dioscoridis. Radicem mittit longam, subluteam, lignosam, singularem: caules multos, rubentes, ramosos: folia Linariæ, longa, angusta, candidantia, seu ex viridi pallentia, densius stipata, gustu acerbissima: flores violæ similes, puniceos, quatuor foliolis constantes, quæ totidem apicibus eiusdem coloris à sese dirimuntur: è medio fila extant pallida: semen paruum in siliquis longis, tenuibus, pappo plenis abditur. Eiusmodi planta cum hæc sit, à plerisque an Delphinium sit Græcorum non sine causa ambigitur, quod huius folia incisa non videantur, qualia Delphiniæ Dioscoride describuntur. At si diligenter notas à

## LINARIA Rubra.



**Locus.**  
Li. 24. c. 17.

Li. 24. c. 17.  
Lib. 25. c. 9.

Diocoride memoratas expendamus, à Delphiniæ historia parum distat, siue natales spectemus, siue caulium numerum & magnitudinem, siue folia *ἑπεχισμύνα*, idest, diuisa, non per ambitum insecta, sed ex vno veluti tuberculo multa exeuntia, deinde in longum pectinatim diffusa Pinastris modo, quo vocabulo in ea notione Theophrastus vtitur, siue florem leucioj purpurascentem, siue cum siliquis semen milio proximum. Similitudinem cum Delphino quidam in foliis obseruandam censent, Delphini rostrum acutum & oblongum imitantibus: Alij foliorum colorem Delphino similem esse interpretantur, quod glauca sint eius piscis modo. Fortasse quidem absurdum non fuerit Therionarcam Plinij & Delphiniū Dioscoridis eandem esse plantā existimare, præsertim cum eadem vtriusq; facultates ab illis auctoribus tradantur, vt deinceps dicetur: nec alibi Delphiniæ mentionem Plinius faciat. Planta ista prouenit in asperis & apricis, sicut & Delphinium Dioscoridis. Plinio in Cappadocia & Mysia Therionarca Magica, (non Nostras quæ ab ea differt) nascitur. Therionarca Magica omnes feras torpescere, nec nisi hyanæ vrinæ aspersu recreari auctor est Plinius. Et alio in loco, Serpentes necat, inquit, & cuicumque admota feræ torporem adfert. At cum Therionarca dicatur, quod sit *τῶν ῥηκῶν νόστος*, hac admota non feras omnes torpescere, & serpentes necari, sed venenatas tantum bestias, & morsu ictuue noxias, melius fortasse dixisset Plinius. De Delphinio verò scripsit Dioscorides, semine nihil vtilius bibi posse à scorpione percussis. Aiuntq; obiecta herba scorpiones resolui, atque ignauos torpescere: semota verò ea sese recolligere.

HELE



## HELENIVM.

## CAP. XXXIX.

**H**ÆNION, Latine Helenium & Inula, Apuleio Inula Campana, **Nomina**  
 Officinis Enula cāpana, Arabicè *Iasin*, siue *Rafen*, Italicè *Lella*, *Enola*  
 & *Enoa*, Germanicè *Alant*, Gallicè *Aunee*. Ab Helena lacrymis He-  
 lenium dictum esse volunt, ex quibus natum fabulantur. Alij quod  
 contra serpentes ex eo primum ab Helena remedium inuentum sit. Alij ab He-  
 lena insula, vbi longè optimum luxuriat. Folia habet, vt describit Dioscorides **Forma**  
 verbasci angustioris folij, asperiora, oblonga: caulem quibuscū in locis non emit-  
 tit: radicem subalbidam, interdum subrufam, odoratam, subacrem, vegetam, ma-  
 gnā, ex qua agnatæ propagines liliorum aut ari modo seruntur. Montanis vni-  
 brosis & siccis prouenit. Vulgati codices habent *ἀνθεμῖς*, idest, succis, alij *ἐνιχμοῖς*,  
 idest, humectis, idq; rectius. Hæ notæ omnes in Inulam vulgatam prorsus compe-  
 tunt, nisi quod folia ille comparat verbasco *τρυφύλλω*, nostræ autem Inula folia  
 non solum sunt verbasci *τρυφύλλω*, sed etiā *πλεθυφύλλω* multò latiora, vt hoc lo-  
 co Græcus codex mendosus sit, & non solum hoc, sed aliis etiam huius capitis lo-  
 co Græcus codex mendosus sit, & non solum hoc, sed aliis etiam huius capitis lo-  
 co Græcis exemplaribus. Quod igitur de floribus & aliis partibus illic deesse,  
 hic ampliore delineatione suppleri sic potest. Helenium folia profert grandia,  
 lata, verbasci latifolij latiora, longiora, hirsuta, in acutum desinentia, dorso promi-  
 nente: caulem inter hæc, duos, tres, interdum quatuor cubitos procerum crassum,

HELENIVM, *Marth.*

hirsutum: in summo florem luteū, siue aureū,  
 stellatum Chrysanthemi modo, sed maiorem:  
 semen verbasculo simile, tactu pruritum fa-  
 ciens: radicem vegetam, grandem, tortuosam,  
 exterius nigricantem, interius candicantem, sa-  
 pore amaro, subacri, ex qua agnatæ propagines  
 seruntur. Sicca multò acriore est odore & sa-  
 pore, magisque aromatico, quàm cum recens  
 adhuc est. Loca amat vliginosa, in montibus **Locus.**  
 etiam vmbrosis nascitur, & in siluis. Iunio &  
 Iulio mensibus floret, Augusto semen mature-  
 scit. Potum radice decoctum, auctore Diosco-  
 ride, menses & vrinas ciet. Ipsa in eclegmate **Tempus.**  
 ex melle prodest tussi, orthophnceæ, ruptis, **Lib. 1. c. 27.**  
 conuulsis, inflationibus, & serpentū moribus. **Vires &**  
 In summa excalfacit. Folia eius ex vino cocta **Temper.**  
 vtiliter ischiadicis illinuntur: radix & stomacho  
 vtilis est in passo condita. Trita potaque ad  
 cruentas excreationes efficax est. Plinius non  
 vno loco Inulam meminit. Breuior his est, sed **Lib. 19. c. 5.**  
 terosior, amariorq; Inula per se stomacho ini-  
 micissima, eadem dulcibus mixtis saluberrima.

Et mox illustrata maximè Iulij Augustæ quotidiano cibo. Superuacuum eius se-  
 men: quoniam oculis ex radice eius excisis, vt arundo feritur. Et Inula quoque à **Lib. 20. c. 5.**  
 ieiunis comanducata dentes confirmat, si, vt eruta est, terram non attingat.  
 Condita tussim emendat. Radicis verò decocta succus tineas pellit: siccata autē  
 in vmbra farina tussi, & conuulsis, & inflationibus, & arteriis medetur. Venena-  
 torum morsus abigit: folia ex vino lumborū dolori illinuntur. Galenus de eadem **Lib. 6. simpl.**



Matth. in  
ca. 27. li. 1.

ita scripsit, Helenij radix maximè utilis est, nō primo statim occurrū exalfaciēs, ac proinde non dicenda calida & sicca exquisitè, ceu piper tum atrum, tum candidum, sed cum recrementitio humore. Quapropter eclegmatis, quæ faciunt ad educendos ex thorace & pulmone crassos lentosq; humores idoneè commiscetur. Rubrificant quoque ea partes frigidis ac diuturnis vexatas affectibus, cuiusmodi sunt ischiades, & exiguae assidueq; articulorum procidentia ac luxationes. Hæc Galenus. Vinū quod ex Helenij radicibus passim in Germania paratur, frequenter in potu sumptum, mirificè visum acuit. Arida radice farina denarij pondere diebus aliquot ex vino vetere hausta spleniticos iuuat, Helenij radicū succus cum pari hyssopi succi pondere, & aquæ stillatitiæ tusilaginis triplicato pondere, sac-

*HELENIVM Minus,  
Dioscorid.*

Li. 1. ca. 123.

*Forma.*



*Locus.*

charique quantū sat fuerit, ad mellis spissitudinem decoctus, magnopere asthmaticos iuuat, si frequenter vtantur. Sicca radix foris utilis est, sin intro sumas humente adhuc, atque recenti vtendū, præsertim in pulmonis chronicis affectibus. Aliud à superiore Helenij genus in Ægypto gigni Cræteus tradit, auctore Dioscoride, quod plantæ hic depictæ aptius competere quàm vlli alij quidā existimant. Est enim radice palmum longa, supernè crassa, infernè gracili, multis fibris capillata, lignosa, cortice nigro subrubente, intus pallida, cauliculis plurimis, rotundis, humi quaquauersum fuis, serpilli modo, cubitalibus, foliis lentis serpilli, sed maioribus, longioribus, amplioribus, circa ramulos crebris, nonnihil villosis, flore violæ aureo, quinque foliolis constante, multis in medio filis extantibus, pallidis, antequam dehiscat corticoso loculo abdito. In aridis agris, lapidosi & sabulosis nascitur. Ab hoc Helenio secundo quod descripsimus Helenium Theophrasti *Φρυγανίδες* vt odoratum multum differt, quod Marum nostrum quidam esse putant, vulgò *Ma. Rich.*

*HELIANTHE.*

*CAP. XL.*

Li. 14. c. 17.  
*Nomina*

*Forma.*


*Locus.*  
Lib. 6. hist.  
ca. 12.



**HELIANTHEN** Plinius inter magicas recenset. Helianthen, inquit, vocat in Themiscyra regione & Ciliciæ montibus maritimis, folio myrti. Hac cum adipe leonino decocta addito croco & palmeo vino perungi Magos & Persarum Reges, vt fiat corpus aspectu iucundum: ideo eandem Heliocallidam nominari. Ex qua breui declaratione iudicare difficile est quænam hodie sit hæc planta. Plerique tamen Helianthen siue Helianthemum, id est, Solis florem esse putant, eam quæ hic picta est, interdum humi repens, interdum erecta, si pedamenta quibus fulciatur nacta fuerit: cauliculis numerosis, tenuibus & gracilibus: foliis oblongis, carnosiss, hyssopi hortensis ferè aut ledi, sed breuioribus, leuiter hirsutis, quibus lentus inest succus. Flores in cacumine exeunt exigui, veluti paruulæ quædam rosæ, sed minores, pares forma & magnitudine floribus Argentinæ siue Potentillæ dictæ, in vna candidi, in altera lutei: radices tenues, lignosæ rufescentes. Nascitur in asperis, siccis & apricis, tam campestribus quàm montanis locis. Æstiuus mensibus floret. Dodonæus & Tragus

Hyssopum





Hyssopum nemorensem vocant, Germanicè *Heyden yfop*, & *Feld yfop*, pleriq; Latine Gratiam Dei. Est tamen & alia herba Gratiola à recentioribus dicta. Cordus & pleriq; vt diximus, Helianthemum & Solis florem appellant. Clusius Cisti humilis nomine depinxisse videtur. Dodonæus quoque in florum historia ad Cisti ledi genus refert. Monspelij etiam Cisti parui speciem fecerunt. Quidam Chrysocomem, eam, scilicet, in cuius floribus luteus, sive aureus color relucet: cui tamen Chrysocomes historia parum competit. Alij Helenium secundum Crateuæ. Matthiolus plantam eandem Solis florem à recentioribus appellatam, quæ folium habet oblongum hyssopi ferè modo, surculos multos, tenues, lignosos, florem pentaphylli, sed maiorem, aureo colore, radicem lignosam, rufescentem, gustu adstringentem, à quibusdam pro Panace Chironio censeri refert. Sed cum Panaci Chironio Dioscorides tribuerit folia amaraco similia, radicem gustu acrem, illorum sententiæ non subscribit. Florem itaque Solis in Symphytorum genere esse censet: quoniam facile vulnera glutinat, & sanguinem manantem sistit: oris & pudendorum vlcera sanat: in vino decocta, si eo vlcera abluantur. Datur potui ad cruenta sputa, & ad dysenteriam vnà cum radicibus contritus: præterea ad mensium abundantiam. In summa ubi agglutinare, cohibere, & roborare opus sit, ea omnia perinde præstat, ac cætera Symphytorum genera, Matthiolo auctore. Aliam Helianthes speciem raram pingendam curauit Pena, ex iugis arduis môtis D. Bonauenturæ, non procul Aquissætiis erutam, radice lignosa, paulum inflexa, supernè & infernè nodosa, è qua emergunt, viticulæ palmares, iuncæ, rectæ, flexiles, albidæ, foliolis lentis aut coluteæ scorpioidis, ex glauco virgæ ab imo summo tenuis stipatæ, floribus aureis & caliculis Helianthes supra descriptæ: semine item non dispari, pusillo, Cisti ledi, amaro gustu.

Lib. I. c. 73.

Li I stirp.  
Hispa. c. 35.

Cap. 50. li 3.

Vires.



Nomina

Dodon.

Forma.

Locus.

ASPERVLA Carulea, Lob.

Tempus.

Vires &amp;

Temper.



VM florum venustate, tum grao  
totius plantæ colore inter corona-  
rias hæc meritò recensenda, quæ  
Latinis Asperula, tamen non nisi  
semine aliquantum aspera, & Aspergula, &  
Spergula odorata, & Herba stellaris, Gallis *Mu-  
guet*, Germanis *Hertsfreydt*. Quorumdam iudicio  
Alysson Plinij ab Erythodano foliis tantum  
differens & minoribus ramis: ab Alyssò Galeni,  
lib. 2. de Antid. etiam distans, quod est Marrubio  
simile, asperius, spinosius circū globulos: floris  
colore ad cyaneum vergente. Cauliculos mul-  
tos edit quadratos, geniculatos: circa singula ge-  
nicula septena vel octona folia, stellatim radia-  
ta, aparinæ, latiora, magisq; virentia, non  
aspera. In summis caulibus flores candicant,  
odore suavi, vt & tota planta: semen rotundum  
& nonnihil asperum. Rarò alibi quàm in hor-  
tis, vbi odoris commendatione colitur: alioqui  
locis opacis gaudet, & parietinis vdis. Maio  
mense floret, odoréque tunc est præstantiore.  
Caloris & siccitatis particeps est, gallio facul-  
tatibus proxima. Vulnere cicatrice obducere  
aiunt, & vino iniectum cor recreare, & secur  
malè affectum roborare. Carulea in Flandriæ  
hortis, teste Lobellio, interdum in agris visitur,  
sed inodora, foliis hirsutis Aspergulæ. Semen  
item & flores non dissimiles, sed carulei sum-  
mis stellatim digestis foliolis procumbunt: ra-  
dice rubente, tenui & oblonga Perperam Alyf-  
son Galeni.

AMARANTHVS PURPUREVS.  
CAP. XLII.

LOS eximia venustatis, & non  
solum recens, sed & exsiccatu diu-  
tius purpureum & flammeum co-  
lorem conferuans, ideo ad corol-  
las etiam hyeme conficiendas aptissimus, huic

herbæ nomen Amaranthi dedit, quod non marcescat, herbariis quibusdam no-  
stræ ætatis ex amore & anthos dictionem cõponi credentibus, flos amoris voca-  
tur, à Germanis hanc appellationē vsurpantibus, *Flor amor*, alias *Samatblum*, Gallis  
Li 2. c. 120. *Passelours*, indicantibus eo nomine, inquit Ruellius, sericum coccineum, quod  
Forma. Carmesinum nuncupant, cum quo de coloris principatu certat, superari: Italis *Fior  
veluto*. Caule est cubi tali, altiore, striato, prope radicem rubescente, laui, ramofo:  
circa quem folia oblonga, lata, acuminata, mollia, glabra, virentia, aut in virore  
nonnihil rubentia, inter quæ secus ramulos pro floribus exeunt spicæ aspectu  
gratissima, sed inodora, in purpura splendentes, coccum saturatum qui in holo  
serico



AMARANTHVS Purpureus, Matth.



serico villosio micat, referentes, ac quodammodo coloris gratia superantes, attritu simili ferè colore succum reddentes, quæ decerpæ diutius pulchritudinem suam retinent, aliquot etiam annis non marcescentes, vnde & nomen inuenit. Semen maturatis spicis insidet paruum, nigrum, & multum splendens. Radices breues sunt & fibratæ. Docti herbarij censent hunc esse amaranthum Plinij sic scribentis. Amarantho non dubiè vincimur. Est autem spica purpurea veriùs quàm flos aliquis, & ipse sine odore. Mirum in eo gaudere decerpi, & lætius renasci. Prouenit Augusto mense: durat in autumnum. Alexandrino palma, qui decerptus asseruatur, mirumque, postquam defecere cuncti flores, madefactus aqua reuiuiscit, & hybernas coronas facit. Summa eius natura in nomine est, appellato, quoniam non marcescat. Hæc Plinius. Est hæc planta Trago Circæa, phlox siue flamma Theophræ. Anguillaræ. Lobellius alium pinxit Amaranthum simplici spicata panicula, ab imo ad summum vsque singulis spicatis floribus coccineis, saturatè pun-

Lib. 21. c. 8.

cantibus luxuriat, omnia superiori non dissimilia, sed folia angustiora, exiliora. Item alium holosericeis, sanguineis, reticulatis floribus, hilariore aspectu. Is eximie venustatis & rarior in hortis Italicis colitur, vberè florum prouentu, eorum summis in arcum curuatis, colore rubro, vegeto, & planè cruento: semine copioso.

AMARANTHVS Angustifolius, Lobellij.



AMARANTHVS Holosericeus, Lobellij.





**Locus.** A mulierculis magna diligentia in hortis & ficilibus colitur, non solum ad ferra & coronas facitandas, sed etiam ad matricis renūque profluvia sanguinea, vlceraque sanie manantia. Aiunt enim recentiores facultate frigida siccaque esse, quare florem eius epotum cœliacis & dysentericis prodesse, mensum abundantiam cohibere, & albas vteri fluxiones. Præterea cruenta expuentes iuuare, præsertim cum in pectore aut pulmone vas aliquod ruptum fuerit, nec id sine ratione: nam Amaranti omnes, auctore Lobellio, refrigerant, adstringunt & siccant.

Matth. in  
c. 52. lib. 4.

## FRAXINELLA.

## CAP. XLIII.

**Nomina**

**Forma.**

**F**LORES quoque speciosi & suauissimè redolentes, imò totius plantæ pulchritudo hanc nobilitarunt, nec à Græcis, nec ab Arabibus fortasse cognitam, quæ à foliorum Fraxini similitudine Fraxinella dicta est à recentioribus, à nonnullis pumila fraxinus, ab aliis Dictamnium album. Caulem edit sesquicubitalem & bicubitalem, rotundum, asperum, folia Fra-

FRAXINELLA, Seu  
Dictamnium album.



**Locus.**

**Tempus.**

Lib. 4. c. 44

Dod. lib. 3.

cap. 21.

Pena fol.

410.

In cap. 44.

lib. 4.

In cap. 33.

lib. 3.

**Vires.**

xini, in caulis cacumine flores citrei mali non absimiles, odore cum quadam graueolentia iucundo, in purpura albicantes, ut in malua, è quo rum medio staminula quædam pendula porriguntur, radicibus nititur multiplicibus, albicantibus, mutuo amplexu hærentibus, minimum digitum crassis. Singulos flores delapsos quaternæ aut quinæ excipiunt siliquæ scabro exteriori cortice, tactu viscidæ, grauis odoris, ferè hircini, in quibus semen nigrum, læue, pellucidum. Nasceitur in collibus cliuosis & saxosis. Iunio & Iulio mensibus floret. Pena Tragium prius à Dioscor. descriptum lentisci facie, huic planè quadrare asseuerat, cum magnis rationibus, frustra dissentiente, ut is putat, Matthiolo. Cæterum videtur repugnare quod lacteum succum non mittit, id quod historia Dioscoridis postulat. Huius radicibus non temerè vsi sunt practici, eodem Matthiolo auctore. Attenuant enim, aperiunt, prouocant, abstergunt. Adduntur vtiliter antidotis quæ ad venena & venenatorum animalium ictus parantur, nec à interaneorum vermes drachmæ pondere hausta.

Dantur contra frigidos vteri morbos, menses, secundas, & mortuum foetum educunt, tum suppositæ aut cum pulegio suffitæ, tum ex vino meraco potæ drachmarum duarum pondere. Valent ad alui tormina, & ad renum calculos eiiciendos eodem pondere. Miscentur commodè potionibus internorum vulnerum, & foris admotæ vi epispastica præditæ sunt. Quidam iisdem vsi sunt ad morbum hispanicum drachmam quotidie præbentes ex Gaiaçi decocto, non sine magno ægroantium commodo. Datur quoque comitialibus, & in aliis frigidis cerebri affectibus. Præstant contra pestilentie contagia, quocunque modo sumantur. Siliquæ & flores tactu pruritus excitant, & in calidioribus regionibus cutem vlcérant.

CHRI.





CHRYSANTHEMVM,

*Matthioli.*



CHRYSANTHEMVM,

*Micani.*



VM multæ sint plantæ aureis floribus decoræ, ideo Chrysanthemu  
appellatione dignæ, difficile admodum iudicatu est, quænam planta  
verum Dioscoridis Chrysanthemum referat, præsertim quum quæ  
Dioscorides capite de Chrysanthemo refert, eadem omnia capite de

buphthalmo tradiderit. Præterea Plinius Chry-  
santhemi seorsum non meminit, nisi quod eli-  
chrysum quibusdã Chrysanthemum vocari di-  
xit. Nec Galenus, nec Aegineta quasi Chry-  
santhemum foret buphthalmu, aut nominete-  
nus distarent, vspiam Chrysanthemi memine-  
runt, sed buphthalmum iisdem quibus Diosco-  
rides verbis posteritati mandarunt, penèque  
persuaserunt commentitium vel spurium ca-  
put de Chrysanthemo esse, vel cuiuspiam li-  
brarij industria nominis & ordinis quadam  
consecutione illecti, illuc inter chrysogonum,  
chrysocomé, heliochrysum & ageratum apud  
Dioscoridem adscitum, eodemq; penè oratio-  
nis filo & viribus quibus buphthalmum. At  
id negat Matthiolus, & discrimen inter buph-  
thalmum & Chrysanthemum, & particulares  
vtriúsque notas has ostendit. Primùm inquit,  
folia buphthalmi sunt fœniculo similia, quæ  
planè capillacea sunt, Chrysanthemo verò te-  
nera, multifida, minutimq; per ambitum laci-  
niata. Deinde Chrysanthemi caules in cibis  
manduntur cæterorum olerum modo, quod  
de buphthalmo scribens ille omisit. Ad hæc  
flores buphthalmi anthemidis floribus com-  
parauit, Chrysanthemi verò luteos, & vehe-  
menter splendentes esse dixit. Iam verò buph-  
thalmi flores cum cerato triti tumores duri-  
tiasque discutere tradidit in vniuersum, Chry-  
santhemi verò flores steatomata discutere pri-  
uatim dixit. Cum igitur hæc sint plantarum di-  
scrimina caput de Chrysanthemo hoc pacto  
legendum censet Matthiolus. Chrysanthemu  
herba est tenera, fruticosa, læues proferens cau-  
les, & folia multifida, flores luteos, admodum  
splendentes. Eius caules manduntur olerum  
modo, flores cum cerato triti steatomata discute-  
re produntur. Cui descriptioni nulla pror-  
sus reclamatione nota inquit ille, huius plantæ quæ  
legitimum Chrysanthemum esse censet, quod  
frequentissimũ prouenit in Senensi agro, præ-  
terea in Bohemia, Moravia, & Austria, idq; in  
campis cuius foliis, infima plebecula in Hetru-  
ria pro olerè vescitur. Eandem Chrysanthemi  
segetum nomine pinxit Lobellius. Dodo-  
naus

Lib. 4. c. 55.

Lib. 3. c. 149

Pena fol.

345.

In Cap. 15.  
lib. 4.



- Nomina** nœus etiam Chrysanthemum vocat. Alterum Chrysanthemi genus vocat Myconus hîc depictum, à sapore, odore, figura florum, & naturalibus iisdem cum Matthioli Chrysanthemo. Castellani apud quos frequens nascitur. Giralda nominant, fruticosa est herba, multos ex radicibus proferens caules, cubitales, rubescences, solidos, lineis per longitudinem ceu striis distinctos, furculosos, in quibus folia longa, lata, digiti amplitudine, nervosa per ambitum serrata. In caulium summitatibus visuntur flores in ambitu lutei, pulchri, tam interna quàm externa parte Chrysanthemi superioris floribus similes: Radices subsunt candidæ lignosæ, multis capitamentis fibratæ, per summa terræ sparsæ. In pratis & campestribus passim provenit. Floret Maio & Aprili. Sapor idem qui Chrysanthemi.
- Forma.**
- Locus.**

CHRYSANTHEMVM PERUVIANVM.  
CAP. XLV.

**Nomina**  
**Locus.**

**P**LANTAS omnes aureo flore ornatas tum pulchritudine, tum magnitudine superat planta, quæ (Chrysanthemum Peruvianum nominatur, quod in Peru aliisq; quibusdam Americæ provinciis repertum fuisse dicatur, & inde ad nos delatum:) planta maxima dicitur ab aliis Solis flos, Sol Indianus, Lusitanis Gigante. Est enim procera admodum stirps, ut quæ in Hispania usque ad viginti quatuor pedes adolescat. Qualem autem vidi

CHRYSANTHEMVM Peruvianum,  
sive Planta maxima.

SOLIS FLOS  
Minor, Lobell.



- Forma.** Lugduni in horto Rouillij, talem hîc describo. Ad duodecim fere pedes accreuit, caule recto, rotundo, valde crasso, nodis multis referto, ex quibus pediculi enascuntur, præsertim à medio caule usq; ad summum, digitum crassi, pedem longi, sustinentes folia in exortu pedem lata, pedem & dimidium longa, acuminata, aspera, supernè ex atro virentia, infernè pallida. Caulis summitas in rotundum & tuberosum capitulum desinit, quod gliscente flore in scamas multas, densius congestas, veluti in cinara crassas, ex nigro virentes, valde acuminatas sed non pungentes dehiscit,



dehiscit, quæ florem circumplectuntur ex innumeris foliis densius stipatum, longis, crassis, acuminatis Lilij purpurei maioris quodammodo similibus, sed maioribus, & auri luteo colore splendentibus: quæ prorsus aperta & expansa discum, siue orbem ostendant pedem latum, initio luteum, deinde rufescentem. Totus flos deorsum valde nutat. Est & flos Solis alter minor, caule alis brachiato, foliis similibus, & florem minorem foliis in stellæ morem cingentibus

POLYANTHEMVM. CAP. XLVI.

**P**ολύανθεμον, & Latine Polyanthemum à nonnullis batrachium dicitur, id est, ranunculus, quod ranunculo persimilis sit, Gallis *Baſinet*, Germanis *Schmalzblum*. Duum est generum, simplex, & multiplex. Hoc caules habet graciles, folia nigricantia, incisa, ranunculi, tamen latiora, flores densos & duplices, auri obryzi colore nitentes, ob quam floris gratiam in coronariarum herbarum numerum ascita fuit: radicem multum fibratam. Denique ranunculum aureum prorsus referret, si folia nigris maculis signata haberet, & si ranunculi modo linguam vreret. In campestribus herbis crescit, in hortis etiam colitur. Aprili

Nomina

Forma.

Temper.

POLYANTHEMVM  
Multiplex, Dodon.

POLYANTHEMVM Simplex,  
Dodon. Chrysanthemum, Fuch.



menſe florer, ac deinde tota ferè æſtate. Polyanthemum ſimplex caules habet graciles, nudos, folia nigricantia, incifa, ranunculi non multum diſſimilia, latiora tamen, nec tam altè incifa, flores auri colore nitent, ranunculi aurei floribus prorsus ſimiles: radix eſt fibrata. Calida ſiccâque eſt facultate, non tamen æquè ac ranunculus. Dodonæus Plinij Polyanthemum eſſe putat, de quo hæc ſcribit. Polyanthemum, quam quidam batrachium appellant, cauſtica vi exulcerat cicatrices, & ad colorem reducit. Eadèmq; vitilignes concorporat. Dodonæus tamen ſcribit plantam iſtam batrachij modo linguam non vrere.

Temper.

Lib. 4. c. 74.

Lib. 27. c. 12

CHRY





**C**HRYSÆAM hanc vocant Herbari; ob floris aureum splendorem. Nascitur in montium pratis, radice subnigra, fibris multis capillata, caulibus multis, cubitalibus, geniculatis: foliis Solani, longioribus, acuminatis, per ambitum laciniatis, per intervalla ex caule erumpentibus, ex quorum sinu surculi vel florem sustinentes, vel foliis vestiti prodeunt: flore medio quodam ex albo velut tuberculo candicante, cætera prorsus aureo, sex foliis constante, quorum primum corniculo simile est: huic subiecta sunt duo alarum modo expansa, quibus & alia duo minora, rotundiorave subsunt: sextum violæ foliis simile oppositum corniculo ex aduerso marginem claudit, elegantissima certè & admiranda peculiarique structura. Hæc Dalechampius

FLOS COCCINEVS.

CAP. XLVIII.



**I**N HORTIS scribitur planta hæc voluptatis tantum causa. Radice assurgit breui, gracili, tenuibus fibris capillata: caule singulari, prope modum cubitali, foliis paucis ex intervallo per caulem dispositis, nervosis, alarum modo caulem amplexantibus, propè ipsum latioribus, paulatim in acutum finientibus, nullo pediculo subuectis, sed cauli adhærescentibus perfoliatæ modo, gustu amaris: flore in summo caule densius congesto, quinque foliolis bifidis constante, qui cocci splendore rutilat: quam ob causam florem Coecineum vocauerunt: semine minutulo, nigro, splendente, vasculis ocmoidis instar concluso, floris venustas ad herbam alendam olitores inuitauit.

HISTO





# HISTORIAE

## OMNIVM PLANTARVM

### LIBER OCTAVVS,

*Qui Plantarum Odoratarum exactam & dilucidam  
delineationem continet & complectitur.*

#### DE PLANTIS CORONARIIS. CAP. I.



ON SOLVM flores prisca fertis & coronis intexuerunt, sed etiam plantas quasdam totas, vel foliis picturatis insignes, qualis est Symphonia Plinij, vel ramulis frondeque suauem odorem spirantes, *τεφανωτικές* id est, coronarias Grecis dictas, quas Theophrastus τῶν φρυγανικῶν, id est, suffruticum generis esse tradit. Horum genus aliud silvestre, aliud satium esse cum dixisset, subiungit. *ὁλίγον γὰρ τὸ ἡμερον αὐτῆς (τῆς φρυγανικῆς ὀσίας subaud.) ὅπερ* *χεῖρον ἐν τοῖς τεφανωτικοῖς ἐστὶ. οἷον ῥοδωνία, ἰωνία, διὸς ἄνθος, ἀμάρρακος, ἡμεροκάλλες. ἔτι διὰ ἔρπυλλος, σισυμβρυον, ἐλένιον, ἀβρότονον. ἀπάντα γὰρ ταῦτα, ξυλῶδη, καὶ μικρόφυλλα, διὰ καὶ φρυγανικὰ. ἐπὶ τῶν λαχανηρῶν δ' ὁμοίως, οἷον ραφανίς, πῆγανον, &c.* Id est, Pars enim exigua huius generis (suffruticum subau.) satia est, quæ coronariis ferè constat, ut rosa, viola, iouis flos, amaracus, hemerocalles: item serpyllum, sisymbrium, helenium, abrotanum. Omnia enim hæc lignosa sunt, & parua folia habent, suntque suffrutices. Idem in oleraceorum genere similiter obseruatur, qualia sunt raphanus, ruta, &c. Deinceps de siluestribus disserit, quorum alia aculeata, alia non aculeata. Aculeatorum multa genera declarat. Non aculeatorum infinita & inexplicabilem esse naturam ait, sed hæc discerni foliorum diuersitate, magnitudine, paruitate, figura, & aliis id genus, ut cistum (nam pro *κισσός* in Theophrasto lege *κίσος*) melothrum, erythrodanum, smercam, cneorum, organum, thymbram, sphacelum (non phacum, ut in Theophrasti vulgatis codicibus legitur) saluiam, marrubium, conyzam, putlicariam vertit Gaza, melissophyllum, & quasdam alias, quæ neruoso & ferulaceo genere constant, ut marathrum, hippomarathrum, ferulam, ferulaginem, myophonium. Deinde ad satiuorum suffruticum naturam explicandam redit. *Τὰ δ' ἡμέρα,* inquit, *βραχέαν τινα ἔχει θεορίαν, ἔπερ ἐν τοῖς τεφανωτικοῖς ἐστὶ. τὰ δὲ χυθόλα πετρατέον* *περὶ τεφανωμάτων εἴπεν. ὅπως ἅπαν περὶ ληφθῇ δ' γένος. ἡ γὰρ τεφανωματικὴ φύσις ἐδύαν* *τινὰ ἔχει ἄξιν. ἐπιμυγνυμένη δὲ, τὰ μὲν τοῖς φρυγανικοῖς, τὰ δ' τοῖς ποώδεσι. διὰ αὐτὰ καὶ τὰ* *συμπερληπτόν, ἐπιμυγνυμένους ὡς ἂν ἡ ὁ καιρὸς, ἀρξαμένους πρῶτον ἀπὸ τῶν φρυγανικῶν.* *διὰ καὶ τὴν ταύτην διαίρεσιν, ἡ καὶ τὴν χεῖραν. τῶν μὲν γὰρ δ' ἄνθος χεῖσιμον μόνον, καὶ τούτων δ' μὲν εὐοσμὸν, ὡς περ ἰόν. τὸ δὲ ἄνοσμον, ὡς περ διὸς ἄνθος, φλῶξ. τῶν δὲ καὶ οἱ κλώνες, καὶ τὰ φύλλα, & ὅλως πᾶσα φύσις εὐοσμος, οἷον ἔρπυλλοι, ἐλενίς, σισυμερύς, καὶ τῶν ἄλλων.* Id est,

Lib. 6. hist.  
Cap. 1.

Lib. 6. hist.  
Cap. 6.

EE



Satiua verò breui quadam explicatione egent: coronariorum enim numero comprehenduntur. Vniuersè autem de coronamentis dicendum, ut totum genus complectamur. Coronariorum enim natura ordinem proprium habet, permixta quidem partim suffruticibus, partim herbaceis, quapropter illa quoque comprehendenda, horum mentionē faciendo cum occasio se obtulerit. Nunc à suffruticibus ordiemur. Diuiduntur illi bifariam vsus ratione, quorundam enim flores tantum vsui sunt, & horum alius odor, ut viola: alius inodorus, ut Iouis flos, phlox. Aliorum rami & folia, denique vniuersa horum natura odorata est, ut serpylli, helenij, sisymbrij. Ex quibus hæc quæ sequuntur de coronis Plinius mutuatus esse videtur. Et ferè peractis colorum quoque celeberrimis, transeat oratio ad eas coronas, quæ varietate folia placent. Duo earum genera, quando aliæ flore constant, aliæ folio. Florem esse dixerim genistas (namque & iis decerpitur luteus) item rhododendrum, item zizipha, quæ & Cappadocia vocantur, his odoratus similis olearum floribus. In vepribus nascitur cyclaminum, de quo plura aliàs, flos eius colossinus in coronas admittitur, folia in coronamentis simlacis & hederæ, corymbique earum obtinent principatum. Et mox. Ergo in coronamenta folio venere melothrum, spiræon, trigonon, cneorum, quod Casiam Hyginus vocat: & quod cunilaginem quæ conyza, melissophyllum quod apialtrum, melilotum quod fertulam campanam vocamus. Coronas ex hac antiquitus factitatas, indicio est nomen fertulæ, quod occupauit. Et paulò post folio coronat & trifolium. Tria eius genera, &c. Utuntur è ferulis & corymbis, & hederæ flore purpureo. In qua Plinij oratione pro trigonon repone origanum ex eodem Theophrasto, pro spiræon Theophrastus habet smeream, deprauatè pro spiræam. Deinde perperam hederam melothrum, spiræon siue spiræam, origanum, cneorum, conyzam, melissophyllum in coronariis numerat, quæ neque coronariæ sunt, neque in earum numero à Theophrasto recensentur. Triphylli verò genera ite in suffruticum quidem, neque in coronariorum generibus collocat. Præterea his plâtas addidit quarum Theophrastus non meminit, rhododendrum, & zizipha Cappadocia tum cyclaminum, melilotum, sed hanc non sine ratione: veteribus enim Græcis & Latinis ea gratia commendabatur. Nam & ex Cratino coronas Melilotinas Athenæus refert, & à fertis fertulam Romani vocarunt.

Lib. 6. c. 22. Et Theophrastus odorem in meliloto etiam cum exaruit, pertinacem esse tradit, ut in iride. At in eo reprehensione carere non potest Plinius, nec eum secutus

Lib. 21. c. 9. Gaza, quod cum in Theophrasto pro *κισσός* legisset *κισσός*, scripserit hederæ folia in coronamenta venire, eiusque corymbos in coronis principatum obtinere, coronariumque esse hederæ florem purpureum, in alio eius genere siluestribus rosis similem, quæ non de *κισσός*, id est, hederæ, sed de cisto Theophrastus tradidit: duo nimirum esse cisti genera, marem & fœminam, alteri folium maius, durius, pinguius: florem purpurascentem, vtriusque tamen siluestribus rosis similem, sed minorem & inodorum, quæ omnia de cisto vero dici, Dioscorides, & plantæ ipsius inspectio apertè demonstrant. Plantis illis coronariis à Theophrasto & Plinio enumeratis, permultas aliàs odoratas addere possumus, quarum etiam hodie in fertis & coronis vsus est frequentissimus, videlicet libanotidem coronariam, origanum tam satium quàm siluestre, tragoriganum, calaminthen, thymum, ocimum, chamæmeli genera, sampsuchum duplex, atque alias complures, de quibus omnibus hîc non agemus: harum enim quædam aliis locis magis idoneis explicantur, sed de iis potissimum quæ odore aliquo commendantur, à notioribus, ut semper fecimus, exordientes.

SALVIA.



**V**IVIS etiam ex imperita multitudine nota est non solum facie, sed etiam certissimis remediis herba Græcis ἐλελίσφακος, Latinis & Officinis Salvia vocata, Arabibus *Aelispachos*, & *Eliphacos*, Italis *Salvia*, Germanis *Salbey*, Gallis *Sauge*. Quæ cum retorrída semper & exucca videatur, factum est ut Græcis Elelispachon siue Elelispachos, quasi in tabem redacta, vel in syderationem flaccescens dicta sit, ἐλελίσσειν & σφάκος vocibus in vnam coalescentibus appellationem. Est autem ἐλελίσσειν intorquere, contrahere, & σφάκος, seu potius σφάκελος malum in plantis, quum per æstatem, & ardentissimum calorem æstivum vi solis altius penetrante, humoréque quo nutriuntur deficiente, languent & arescunt. Latini syderationem nominant. Potuit tamen æquè scitè dici, inquit Pena, à medendis sphacelo penè demortuis partibus, quibus calorem naturæ roburque insitum reuocaret, quæ pollet familiari facultate nostræ vitæ prius morbis benefica, unde Salvia Latinis dicta, quod saluos homines & incolumes efficiat. In nothis Dioscoridis & Apuleio legimus Saluiam Becion appellari. Et Galenus in confectionibus dolorem sedantibus, quæ tabescentibus & sanguinem reicientibus sunt commoda, βελίς βολάνης meminit, & βελίς simpliciter, quam herbam Cornarius Saluiam conuertit, & βηχίς pro βελίς substituendum censet, ut sit βήχιον vna aliqua appellatio ἐλελίσφακος, quam nos Saluiam dicimus. Et Plinius alteram bechij speciem saluiam appellari testatur. Saluiam vnicam Dioscorides descripsit: nota tamen sunt etiam vulgo duo eius genera. Salvia maior, Gallicè *Grande sauge*, & Salvia minor, quæ & Salvia nobilis, Gallicè *Sauge franche*, & *Sauge menue*. Theophrasto totidem sunt. σφάκελος ὅ, inquit, καὶ ἐλελίσφακος διαφέρουσιν, ὥς ἐν τῷ ἡμερῶν, τὸ ὅ ἀγριον. λειότερον γὰρ τὸ φύλλον τῶ σφάκελῳ καὶ ἐλαττον, τὸ ἡπλιον αὐχμηρότερον (legendum esse αὐχμηρον sensus docet) τὸ δὲ τῶ ἐλελίσφακῳ βαρύτερον. τραχύτερον lege ex Dioscoride. Id est, Sphacelus & Salvia inter se differunt, quod vnum sativum sit, alterum silvestre, sphacelo foliū laxius, minus, & non tam squallidum, salviae scabrius. Dodonæus species tres statuit, maiorem, minorem, & silvestrem. Hic accedit salvia bacifera Cretensis. Saluiam maiorem sic descripsit Dioscorides: frutex est oblongus, ramosus, virgas quadrangulas & subalbidas habens, folia malo cotoneæ similia, longiora tamen, asperiora, & crassiora (Serapio legisse videtur καὶ σφενδαμνῶν, addit enim & structiora) quæ sensim attritarum vestium modo hirsuta, subalbida, vehementer odorata, sed virosa sunt: semen in summis caulibus silvestris homini modo habet. Nascentur in asperis locis. Atque hinc in hortos translata, & ab omnibus culta Salvia maior vocata fuit, quæ nunc quoque, in vinetis Aquitanicis, inquit Pena, Linguathicis, & Pedemon-

Li. 7. med. locat.

Lib. 26. c. 6.

Genera

Lib. 6. hist. cap. 2.

Lib. 2. c. 6. &amp; 68.

Lib. 3. c. 14.

Forma.

Locus.

fol. 20.


## SALVIA MAIOR.





*SPHACELVS* Verus,  
Theophrast.

*SALVIA* Baccifera,  
Cretensis.



Lib. 2. hist. cap. 66. longa, angusta, subalbicantia minùs scabra, & minora multò quàm superior, ad imum aurita siue pinnata, quod Sphacelo peculiare est, cetera verò huic eadè quæ superiori, videlicet purpureus flos secus cauliculos, in aquilini rostri speciè falcatu: semen nigricans, radix lignosa. Salvia agrestis Dodonæi Saluiam hortensem specie & odore ferè refert, caules profert quadratos, nigricantes, tenui lanugine obritos, folia Salviæ maiori satis similia, sed paulò latiora, breuiora, & tactu leniora: flores item similes secus caules vno tantum latere ad summum vsque exoriuntur, quibus succedit semè rotundum, nigricans. Radix est fibrata. Iuxta sepes & in agrorum marginibus prouenit. Sphacelum Theophrasti vocat. Salvia Cretensis baccifera perpulchra, nostrati prorsus similis est figura, odore, sapore, & lignosis furculis. Sed hi instar gallarum rotundis excrementis pistaciorum magnitudine, forma, sapore minùs calido, magis adstringente, non insuauiter donatur. Plinius vocis parè lentem significantis affinitate deceptus, eleliphacum lentis siluestris genus facit. Est eleliphacos, inquit, dicta Græcis, ab aliis phacos. Est ea satiuu lente lauior, & folio minore & sicciore, & odoratiore. Est & alterum genus eius siluestris, odore graui, hæc mitior. Folia habet cotoneæ mali effigie, sed minora & candida, quæ cum ramis decoquuntur. Men ses ciet & vrinas, & paltinacæ marinæ ictus sanat

*SALVIA AGRESTIS,*  
*Sphacelus, Dodonæi.*



Pen. in Ad.  
uen.

Lib. 2. c. 26



nat. Torporem autem obducit percusso loco. Bibitur cum absinthio ad dysenteriam. Cum vino eadem commorantes menses trahit: abundantes sistit decocto eius potu. Per se imposita herba vulnorum sanguinem cohibet. Sanat & serpentium morsus. Et si in vino decoquatur, pruritus testium sedat. Et mox post hæc quasi alia esset veterum, alia sui temporis herbariorum eleliphacos, subdit hæc verba. Nostri qui nunc sunt herbarij, eleliphacum Græcè, Latine Saluiam vocant, menthæ similem, canam, odoratam. Partus emortuos ea apposita extrahunt, item vermes aurium ulcerumq;. Foliorum & ramorum Saluiæ decoctum, inquit Dioscorides, potu urinam ducit, menses & fœtus extrahit, pastinacæ marinæ icribus auxiliatur, capillos denigrat. Vulnerebus herba vilis est, sanguinemque compescit, intra vlcera purgat, pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum cum vino, si eo abluantur, sedat. De eadem fusiùs Aetius disserit. Tradunt quidam suffitâ Saluiam menses immoderatè fluentes, & omne muliebre profluuium compescere. Agrippa sacram herbam vocauit, quam prægnantes mulieres, si fluidæ laxæque fuerint, vtilissimè comedunt. Continet enim conceptum, vitalémq; reddit, si succi huius heminam cum modico sale quarto postquam à viri cōcubitu abstinuerit die, mulier potauerit, deinde viro misceatur, proculdubio concipiet. Aiunt in quodam Aegypti loco post sævas pestilentias, ab his qui supersunt ad eum bibendum succum mulieres cogi, plurimòsque inde produci fœtus. Dato, inquit Orpheus, sanguinem expuentibus succi Saluiæ cyathos duos ieiunis cum melle bibendos, sanguis illicò cohibebitur. Tabidis pilulæ in hunc modum parantur. Spicæ nardi, zinziberis singulorum drachmas duas, seminis Saluiæ assati, triti & cribrati drach. octo, piperis longi drach. duodecim, cum succo Saluiæ pilulas conficito, & manè ieiunis drachmam vnā exhibeto, eodémque modò vesperi, ac postea aquæ puræ quidpiam propinato. Eleliphacos, inquit Galenus, euidenter exalfacit, ac leuiter subaltringit.

Lib. 3. c. 14.

Vires &amp;

Temper.

Lib. 6. sim.

## MAIORANA.

## CAP. III.



VAE Maiorana Romanis dicitur; Gallis *Mariolaine*, Arabibus *Merzenius*, seu *Mersangius*, Hetruscis *Perfa*, cæteris verò Italis *Maiorana*, Germanis *Meyeron*, & *Meyram*, Græcorum *Sampsuchum* & *Amaracus* permultis esse creditur. Dicta est amaracus ab Amaraco Cynarae Regis Cypri puero, qui casu lapsus dum ferret vnguenta, fregit alabastrum, deinde cum nimio dolore contabuisset, versus est in sampsuchum, quæ ex eius nomine cœpta est appellari Amaracus. Sed sampsuchi & amaraci vocibus eandem rem significari, testis est Dioscorides, sampsuchum, inquit, optimū est Cyzicenum & Cyprium, secundum locum tenet Aegyptium. Appellatur autem à Cyzicenis & Siculis Amaracum. Item Plinius, Amaracum Diocles medicus & Sicula gens appellauere, quod Aegyptus & Syria sampsuchum. Et aliquantò post. Sampsuchum siue Amaracum in Cypro laudatissimum, & odoratissimum. Sed an Maiorana nostras sit sampsuchum siue amaracum, non æquè constat, quod ex descriptionibus ponderandum. Sampsuchum, inquit Dioscorides, herba est ramosa, per terram repens, folia habens hirsuta & rotunda, similia foliis calaminthæ tenuifoliæ, valde odorata, calfaciendi vi prædita, & quæ etiam in coronas necitur. Maiorana verò humilis & fruticosa est stirps, candicans, & suavis admodum odoris, sesquipedale aut pedem alta, furculis multis, tenuibus, fragilibus, quos folia penè rotunda tenella, incana, & leuiter villosa vndiquaque ambiunt, in quorum cacuminibus flosculi perpufilli ex spicis candidi emergunt, exiguis videlicet, oblongis, & squamatis compactis semen minutissimum, rufescens radix subest lignosa, multiplex

Nomen

Lib. 3.

Lib. 21. c. 11.

Ibid. ca. 12.

Forma.

Lib. 3. c. 42.



AMARACVS *sive* Maio-  
rana, *Math.*



AMARACVS *sive* Maiorana  
*tenuifolia*, *Math.*



Cap. 296.  
simpli.

& supernacua. Serapio describens eam ex Dioscoride, herba est, inquit, multas virgas habens extensas super facie terræ in ortu suo. At hæc non repit, sed in rectum & altum assurgit. Hoc quidē verum est, si crebrò tondeas, & luxuriatē coërcens, sed ea neglecta humi procumbunt & serpunt flexili mollitie nutantes surculi, &

AMARACVS,  
*Fuchsj.*

Maiorana  
tenuifolia.  
*Locus.*

*Tempus.*

*Sol.* 213.

Amaracus  
repens,  
*Pena.*



in terram curuantur. Quare tum hanc sampsi-  
chi speciem esse credunt, tum eam quam ma-  
ioranam minutam, seu moschatam vulgus no-  
strum vocat, *Mariolaine menue* & *musquée*, He-  
trusci *Persa Gentile*, superiori surculis, foliis, flo-  
ribus similem, sed tenuiorem, delicatiorē,  
odoratiorē. Passim in hortis & fœtilibus coli-  
tur. Gaudet autem locis vmbrosis, aqua, & fi-  
mo. Iulio & Augusto mensibus floret. Sunt qui  
maioranam Dioscoridis Marum esse arbitran-  
tur, quod negat Pena. Sed vt maioranam sam-  
puchi speciem esse, ita aliā se vidisse rariorem  
multò, & humi serpentem, quæ veriùs amara-  
cus dici debet, asseuerat. Ea non rectis erigitur  
aut fruticat ramulis, vt superior, sed in celsi-  
tē caducis serpilli modo, cui alioqui persimilis  
folio, effigie & magnitudine est. Fuchsius Sam-  
puchi delineationem à Dioscoride traditam  
Maioranæ vulgo dictæ fauere scribit. Est enim,  
inquit, surculis lentè rubentibus, foliis pilosis  
& rotundis, iucundo odore, semine copioso,  
quod bullulis quibusdam continetur, flore can-  
dido & exiguo. Serpit etiam per terram: verum  
id non







In Italia vt & alias quasdam herbas, ita & amaracum vidi, quæ odore multum à Maro superatur. Marum enim valde redolet, putaretq; aliquis sola nominis appellatione ductus, vnguentum amaricinum quod in Cyzico faciunt, amaraci plurimum capere, sicq; forsitan ab antiquis vnguentum conficiebatur, sed nunc solū Marum imponunt. Hanc herbam cum ipse aliquoties degustassem, & amarā quidem plurimum, acrem verò parū deprehendissem, hortatus sum quemdam eorum qui amaricinum conficere solent, vt amaraci tantum compositioni immitterent, quantum & Mari. At mihi visum est ad vnguentum minus quidem odoratum, nihil autem viribus inferius. Hæc Galenus. Quibus declarat Marum ab amaraco parum differre, sed odoratius esse & gratius, Quæ res multis suasit Marum nostram esse maioranam, vt diximus. In hac est sententia Dodonæus, quam confirmat maioranæ nomine, quod à Maro videtur derivatum, sed apertius ipsa Mari supra posita descriptione, quam exquisitissimè conuenire putat. Et substitutam sampsocho maioranam alienum videri non debere, quando & ipso Galeni tempore Marum sampsochi loco in amaricinum vnguentum fuerit immissum, vt ex Galeno modò diximus, quod præbuit occasionem posteris, vt Marum siue maioranā sampsochi loco habuerint, eiusque nomine appellauerint. Eorum sententiæ subscriberet Matthioli, qui Marum amaracum illam præsertim esse arbitrantur, quæ vehementiorem odorem spirat, maioremque amaritudinem gustu præfert, foliisq; est minoribus, candidioribus, & tenuioribus, nisi aduersaretur Galenus, inquit, qui loco iam citato testatur se in Italia amaracum vidisse, nulla, quod illic Marum viderit facta mentione, sed tantum quod in aliis ab Asia regionibus rarum oriatur. Ex quo colligere licet Marum in Italia non nasci. Quare

## MARVM, Matthioli.

Fol. 211. &  
213.

Lib. 2. c. 58.

Fol. 213.

Marū veterum.  
Lib. 3. ca. 25.  
Forma.

nomani *Mastic* appellant, vel quoniam lentore quodam interdum madescit, auctore Ruellio, maxime si pinguibus locis lætius assurgat, vel quod iucundum mastiches odorem spiret, Surculis multis, tenuibus, ramosis, rotundis, lignosis fruticatis, circa quos folia tenella ferè maioranæ: in summis cauliculis ex hirsutis calicibus



*MARVM Quorundam.*

calicibus flores perexigui exeunt, albi: radices tenues sunt & lignosæ. Tota herba odoratiores est & gratior quàm origanum, aut samfuchum, ut Galenus vult, marum. Quod si cui hæc minùs videatur maro congruere, saltem non respuat, inquit Petrus Pena, Syriacam, quæ gratissimò & vegeto est odore, imò & facie tota maioranam præfert, aut origanum, sed gracilioribus, nò breuioribus, pedalis & sesquipedalis sarmentis, minoribus capitulis & foliis, etiam decimum ferme annum, ex quo Veneriis Alepo Syriæ se habuisse ille affirmat, odoris fragrantiam retinentibus. Hoc Marum Syriacum ex Lobellio hic pictum damus. Superiorem Ruellius Tragoriganum Dioscoridis, & Heracleum origanum Plinij esse censet. Dodonæus Dioscoridis Clinopodium, cui tamen parum congruit, Penæ iudicio, ut dicetur. Non desunt qui eandem Helenium *φρυγανίδες* & odoratum Theophrasti esse credant. Marum auctore Dioscoride, vim habet sisymbrio similem: subastringit enim, & modicè calfacit. Qua de causâ impositum nomas sistit, & in calida vnguenta additur.

Li. I. Antid.

Fol. 213.  
Marū Syriacum.

Lib. 3. c. 25.

Lib. 3. c. 57.  
De flor. ca.77.  
Fol. 213.  
Lib. 3. c. 42.

Vires.

*MARVM Verum, vulgò Mastic.**MARVM Syriacum, Lobelij.*

ORIGA



## Nomina



RÆCIS *δέκτανος*, Latinis Origanus vel Origanum, in Officinis nomen suum retinuit, Mauritanis *Faudenigi*, *Fudenegi*, seu *Faudenegi*, Gallis *Origan* & *Mariolaine*, *bastarde*, Germanis *Volgemuth*, quasi dicas animi bonitatem aut lætitiā, & *Rottosten*, siue *Castentz*, Italis *Origano*, Hispanis *Oregano*. Origanum verò, quòd cliuofos, editos montosolq; natales amaret, nomen apud Græcos inuenit, ἀπὸ τῆς ὄρεος montem, & γένος gaudium significante, vel quod visum illustret & acuat, παρὰ τὸ ὄρειν, & γανού, idest, τὸ λευκώδην. Vel à πρῶτῳ ἢτ ῥήγανον, & redundante, ο, δέκτανον per antiphrasim, natura enim calidum est. De hoc tam diuersa auctores prodidere, vt difficile sit certi aliquid cōstituere.

Lib.6. hist.  
cap.2.

Genera.  
Li.21.ca.10.

Li.20. c.17.

Cap.16.

Lib.25. c.4.

Li.20. c.17.

Theophrastus, τῆς δέκτανος δὲ, inquit, ἡ μέλαινα ἀχαριος, ἢ δὲ λευκὴ χαριτιος. Idest, Origani genus quidem nigrum sterile est, candidū fructiferum. Ex quo hæc transcripsit Plinius, cum duo cneori genera posuisset nigri & candidi. Toridē & Origani in coronamentis species, inquit, alterius enim nullum semen. Id cui odor est Creticum vocatur. Et alio in loco, Origanum quod in sapore cunilam æmulatur, vt diximus, plura genera in medicina habet: onitin vel prasion appellant, non dissimile hyssopo. Et paulò ante hunc locum. Est alia cunila Gallinacea appellata nostris, Græcis Origanum Heracleoticum. Idem alibi de panacis generibus agens. Alterum, inquit, genus Heraclion vocant, & ab Hercule inuentum tradunt, alij Origanum Heracleoticum siluestre, quoniam & origano simile, radice inutili: de quo Origano diximus. Et Heraclium quoque tria genera habet, nigrius, latioribus foliis, glutinosum: alterum exilioribus, mollius, sampsucho non dissimile, quod aliqui prasion vacare malunt. Tertium est inter hæc medium minùs quàm cætera efficax. Optimum autem Creticum: nam & iucundè olet: proximum Smyrnæum, deinde Heracleoticum, ad potum vtilius, quod onitin vocant. Cæterum in tantum nominum, tum historiæ ambiguitate vnicum sequi Dioscoridem satius est,

ORIGANVM Heracleot.  
Matthioli.

Lib.3. c.28.

In Theri.

In Theria.



qui Origani genera seu potius cognomina tria esse statuit, nempe Origanum Heracleoticum, siue Heraclium ab Hercule Ponti ciuitate, quod illic probatissimum nasceretur, alterum Onitin, siue Onitida, quod ab asinis comedatur. Quare Nicander ονομαζόμενον Origanum cognominauit, idest, asinifolium, quod ipsis grato cibo carperetur. His adde siluestre, quod sine cultura & sua sponte prouenit. Hoc aliqui teste Dioscoride Panaces heracleū, alij cunilā vocant, ex quibus est Nicāder, πανάκεδόνε κυνίλην,

ἢ ἢ καὶ ἡρακλεῶν ὀρείγανον ἀμφενέπρασιν.

Hoc est. *Panaceamq; Cunilam.*

Quamque vocant quidā Heracleō Origanū inde. Origanum heracleoticum folium habet simile hyssopo, umbellam non in rotæ speciem, sed diuisam, semen in summis virgis, non densum. Onitis candidiore est folio, & hyssopo similior, & semen velut corymbos coniunctos habet. Siluestre folia habet Origano similia, ramulos dodrantes, tenues, & in his umbellas anetho similes, flores candidos: radix tenuis est & inutilis. Hæ igitur tres Origani species ab hyssopo



hyssopo non differunt nisi magnitudine & umbellis. Heracleoticum illud est Hyspanicum, inquit Pena, quod in Flandriam quotannis saccis plenis deferri, & ab infirmis distrahi solet. Utuntur enim vulgo piperis & satureiæ ritu in obsoniis. Belgæ hanc plantam colunt pedem altam, foliis & virgultis maiorem maioribus, quibus summis non in umbellam circinatam collecti sunt flores, sed in parvis

In Aduerf

## ORIGANVM Onitis.

ORIGANVM Vulgare  
silvestre.

thyrsis spicatis, ternis, hinc inde dissipatis, ut thymi, odore maioranam prouocantibus, præsertim in Lusitania & Lucania. Origani onitidis circa Monspelium, & in Galloprovincia notissima sunt duo genera, maioris & minoris discrimine duntaxat discrepantia, nisi quod minori amaraci facies & folia, sed minora & rotundiora, heracleotici fermè. Caules recti, pedales, fruticosi, ramulis & fastigiis breuibus, coactis, spicatis, confertim in umbellam collectis, floridum corymbum imitantibus, & per æstatem purpurascèntibus, admodum glutinosi. Maius fruticosius est, hirsutius, sed viribus, sapore & odore ignauius, alioqui perquam simile, & passim occurrens. Agrioriganum vocat Lobellius, hinc depictum Origani vulgaris nomine. Siluestri Origano longè optimo Veneti Pharmacopœi & medici è Syria aut Creta utuntur, cui cauliculi exiles, folia parua, capitula numerosa, collecta, ambitu umbellam imitantia, onitidi proxima, sed non perinde accumulata, albi flosculi. Herba est gustanti tota grata & aromatica, dictâni & piperis acrimonia. Origanum heracleoticum calfacit, auctore Dioscoride. Vnde decoctum eius cum vino potum venenatorum morfibz prodest, cum passo autem iis qui cicutam, aut meconium, cum oxymelite iis qui gypsum aut ephemerû hauserunt. Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico manditur. Aridum acetabuli mensura potum cum aqua mulsa atros humores per aluum ducit, mensq; ciet. Linctum ex melle tussibus medetur. Prurigines, scabies, regiumq; morbum decoctum eius cum in balnea descensum est, iuuat. Succus eiusdem adhuc virentis tonsillas, columellas, orisque vlcera sanat. Per nares cum oleo irino infusus mucus trahit. Cum lacte aurium dolores mitigat. Conficitur ex eo & capis & rhu obsoniorum medicamentum vomitorium, omnibus iis in aëre cyprio sub canis ardenti æstu per quadraginta dies insolatis. Herba verò substrata serpentes fugat. Eadem vis onitidi, sed multò inefficacior. Siluestre priuatim foliis & floribus cum vino potis venenatorum morfibz auxiliatur. Origanum Heracleo

Li. 3. ca. 28.  
Temper.  
& vires.



Li.8 simpl. Heracleoticum, inquit, Galenus, efficacius est onitide, sed agreite valentius utroque est. Omnia verò incidendi & tenuandi, & exsiccandi, calfaciendiq; facultatem habent, hæc q; tercio excessu.

## TRAGORIGANVM.

## CAP. VI.

## Nomina



PATOPITANON Græcis, & Latinis Tragoriganum, quasi hircinum origanum dicas, quod pabulo gratum sit hircis, ut onitis asinis, potius quàm quod hircum fœreat. Grata enim & mitis Tragorigani potio Dioscoride teste: qui & eius genera duo descripsit, prius fruticem parvum, origano aut serpyllo silvestri ramulis & foliis similem. Quibusdā in locis latius virentiusque inuenitur, & latioribus foliis, satis glutinosum. Alterum exilibus furculis & tenuibus foliis, quod aliqui prasium vocauerunt. Tragoriganum, inquit, Plinius, simile est serpyllo silvestri. Caterum quod Dioscorides Tragoriganum à nonnullis prasium vocari dixit, id nomen Plinius ad Onitum retulit, ut superiore capite diximus. Pro Tragorigano plantam hinc pictam Matthioli exhibuit, quæ in Foroiulienfi agro frequens nascitur, foliis serpylli amul-  
lis, sed gustu pulegij: quam Pena non Tragoriganum, sed calaminthæ speciem alteram esse ait. Tragoriganum alterum ex Dodonæo hic depictum est, furculis multis, lignosis, rubescentibus, foliis latiusculis, nigricantibus, vulgaris serpylli maioribus, parum asperis & lanuginosis, flosculis purpureis in umbellis cauliculorum summities occupantibus. Per multis Tragorigani species hæc creditur, quæ in agro Monspelienfi plurima nascitur, foliis origani silvestris, gustu acris, suauius olentibus, umbella floribus purpureis comante, in rotæ speciem non pro-  
fus circinata, summis caulibus insidente, ut in nostrate origano, præter quàm flores insuper caulem verticillatim ambiunt ut in calamintha ex interuallis qua folia prodeunt. Istud quoque Tragoriganum Nothum Herbariis dicitur, quod in

## Genera.

Lib.3. c.29.

## Forma.

Li.20. c.17.

Ca.29. li.3.

Fol.212. &amp; 217.

Trago.

Dodo.

Trago.

Monspel.

Trago.

Nothum.

## TRAGORIGANVM,

Matthioli.



## TRAGORIGANVM,

Dodonæi.



maritimis



**TRIGORIGANVM,**  
*Monspeliense, Dalech.*



**TRAGORIGANVM**  
*Nothum, Dalech.*



perpetuo virens. Prior multis Hispaniæ locis prouenit solo arido & petroso cum  
 stœchade permixta. Alterius vtramque speciem solo Valentino agro obseruauit  
 Clusius, Martio florentem & sponte nascentem. Quæ flore est purpureo, etiam in  
 hortis Belgicis colitur. Auctor est Dioscorides Tragorigana omnia excalfacere,

maritimis fruticat, radice nigricante, lignosa, pa-  
 rum fibrata, cauliculis multis, dodrantalibus, in  
 summo furculosis, foliis per caules & ramos inæ-  
 qualiter dispositis, longis, angustis, candicantibus,  
 hyslopi fere, ad maiorum exortum pusillis ali-  
 quot congestis, flore purpureo, specioso, in sum-  
 mis caulibus ex corticoso loculo prodeunte, seme-  
 ne minutulo. Pena inter multas plantas quas Tra-  
 gorigano aptare licuisset, nullas reperit sequenti-  
 bus duabus veriùs aut commodius illi quadrare.  
 Prius erit Cretense apud Venetos Tragoriganum,  
 quod furculis dodrantalibus, & foliis paulò quàm  
 thymi Cretensis maioribus, densis & rigidis, floribus  
 per interualla & verticilla purpureis clinopodij  
 modo fruticat: sapor illi feruens piperis aut thymi.

Fol. 211.

Alterius Tragorigani effigiem & facultates nulla  
 meliùs videtur exprimere, quàm herbula illa fruti-  
 cosa, capite, De Maro depicta, quàm à Cortuso ac-  
 ceptâ Matthiolus mari nomine donauit. Vide ca.  
 4. huius. Nam frutex est paruus, sesquipalmū altus,  
 albidus, multis cauliculis tenuibus, serpylli foliis,  
 vel illius Tragorigani proximè descripti, flosculis  
 subter foliis purpurascens, saporis acerrimi,

Ca. 42. li. 3.

odoris fragrantissimi atque vrentis: tritum namq;  
 digitis eminùs non secus ac flammula percellit  
 nares, & cerebrum ferit. Hæc Pena. Clusius duo-  
 bus Tragorigani generibus à Dioscoride traditis  
 duas persimiles plantas se vidisse ait. Vnam pedi-  
 aut semipedis altitudine fruticantem, multis te-  
 nuibus & lignosis furculis, circa quos folia minora  
 sunt quàm in maiorana, media inter organum &  
 serpyllum siluestre magnitudinis, incana omnino,  
 odoris iucundi, & gustu acri: flores verticillatim  
 extremos furculos ambiunt candidi, exigui: semen  
 minutum, nigrum, calyculis suis occultatum. Flo-  
 ret cum Thymo & Stœchade. Tota odorata est &  
 perpetua coma. Alteram furculis minoribus can-  
 didioribusq; foliis tenuioribus & longioribus, ali-  
 quantulum incanis, acri gustu, sed odore minùs  
 iucundo quàm prior: flores etiam verticillatim  
 circa summos ramulos nascuntur ex calyculis pro-  
 deutes, maiores aliis, & aliquo modo galeati, can-  
 didi. Radix alteri similis, lignosa, dura, multifida.  
 Eius genus neque forma, neque magnitudine dif-  
 ferens inuenitur, sed furculis nigrioribus, foliis  
 hispidioribus & atrioribus, flore purpureo. Vtraq;

Lib. 1. fol. 111.  
 111. 111.  
 111. 111.



Temper.  
& Vires


## TRAGORIGANVM

II. Clusij.

Embl. 30.  
lib. 3.

Li. 20. c. 17.

Li. 8. simpl.



cum de origani viribus dixisset, subiunxit, Tragoriganum habet attritionis etiam quidpiam.

vrinam ciet, ventri commoda esse, si decoctū ipsorum bibatur, biliosa enim deliciunt. Prodesse & splenicis pota cū aceto, & iis qui ixiam biberunt cum vino: quin & menses trahere, & ad tussim, & ad peripneumonias cum melle in eclegmate dari: gratam esse ipsorū portionem: quare cibum fastidientibus, & stomacho male affectis, & acidum ructantibus dari. Item iis quibus à maris iactatione nausea & hypochondriorum calor excitatur: Græce legitur, *αλυσος* & *αλυσος*, quæ Cornarius vertit, & in quibus anxietas & nausea. Est enim *αλυσος*, inquit, vox cum suis coniugis sæpè ab Hippocrate usurpata, & à Galeno in *Glosis* *αλυσος*, & *αλυσος* exposita Oedemata cum polëta illita discutiunt. Eadem tradidit Plinius. Vrinam ciet, tumores discutit, contra viscum potum, viperæq; ictum efficacissimum, stomachoque acida ructari & præcordiis. Tussicentibus quoq; cū melle datur, & pleuriticis, & peripneumoniis. Quod contra viscum dixit, id est, quod Dioscorides ait, iis qui ixiam vocarunt: ixiam enim viscum Plinius reddere solet. Galenus

## PULEGIUM.

## CAP. VII.

Nomina

Li. 20. c. 14.

Li. 1. de Di-  
urnat.  
Li. 12. epig.  
32.

Li. 20. c. 14.

Fol. 2. 4.

Lib. 3. ca. 30.

Genera

Li. 20. c. 14.

Forma

Locus.

Lib. 3. c. 30.

Temper.

&amp; Vires.

**P**ULEGIUM Latinis & Officinis dicitur, quod Græcis *πλήγων* & *βλήγων*, Mauritanis *Alnam*, *Alnegen*, seu *Alnegen*, Italis *Pulegio*, Germanis *Poley*, Gallis *Poullot*. Nominatū autem Plinio videtur Pulegium, quod flos recentis incensus pulices necat odore. Dicitur etiam Puleium extrita, gliterna Ciceroni. Nam & musculorum iecuscula bruma dicuntur augeri, & puleium aridam florescere ipso brumali die. Et Martialis:

*Quadrina nigri, nec corona Pulei.*

Blechon autem quod gustatum à pecore caprisque balatum concitat, Plinio & Dioscoride auctoribus, vel etiam, ut scribit Pena, quod pulmonibus pituitam crassam farctamque extundat. Dioscorides Pulegij genus vnum, idq; sativum facit. Plinius feminam & maremillam flore purpureo, hunc candido. Neuter verò ut herbam vulgo & omnibus notam descripsit. Vulgatum Pulegium hodie Regiū nominatum. Herba est humi repens, caulibus gracilibus, fragilibus, dodratalibus, foliis quadamtenus rotundis, ferè maiorana, paulò maioribus viridioribus, nigricantibus: Flores præsertim hortensis purpurei, eius verò qui in campis provenit candidi, in toto caule per intervalla propè foliorum exortus verticillatim prodeunt: radix gracilis, capillata, per humum sparsa. Nascitur humecto & vliginoso solo. Tota planta odorata est, & gustu acris, non sine quadam amaritudine. Quo magis mirum vulgare istud Pulegium à quibusdam pro legitimo respui, & secundam calaminthes speciem haberi, cum omnibus facultatibus, iisdemque efficacissimis præditum sit, quas Dioscorides Pulegio suo tribuit. Extenuat, inquit, calfacit, concoquit: potum menses, secundas, foetus eiicit, educit & ea quæ in pulmone hærent, cum Aloë & melle potum: (quem locum viciatum corrigi debere censet

Cornarius








inquit,atrenuat & calfacit vehementer: quapropter in humidis & crasis auxilia-  
tur,& in pulmone humida glutinosâq; detergit,& vt excreentur efficit. Cû vino  
albo coctum & calidè potum, sincerum menses prouocat. Extrinsicus illitum  
ischiadiceis,& aliis partibus frigore affectis auxiliatur. Hæc ille. Mos olim fuit af-  
feruare Pulegium in carnariis, ad multos annos, in coronæ circulum nexum:  
vnde quadrimam Pulegij coronam dixit Martialis. Et de eadem re Plinius hæc  
tradidit. Floret ipso brumali die suspensa in tectis arentis herba Pulegij. Et rursus.  
Miretur hoc qui non meminerit, ipso brumali die Pulegium in carnariis florere:

Lib.2. c.41.

Li.18. c.26.

Li.19. ca.8.

**PVLEGIVM Ceruinum.**

Locus.

Forma.

Vires.

adeò nihil esse occultum natura voluit. Et se-  
rendi igitur hoc signum dedit. Atque alio in  
loco. Congruit Pulegio, cuius natura in carna-  
riis reflorescens sæpius dicta est. Huiusmodi  
Pulegium quod in tectis ac carnariis in fu-  
mum suspensum est, Aetius *πυλγιον*, idest, vetus  
ac inueteratum vocare solet: item *γλῆγες* *πυ-  
ελσιώνη*, idest, Pulegium de superiore anno:  
quod tale non est, *ἀχαπνον*, idest, fumo non sic-  
catum. Pulegium alterum faciunt Monspe-  
lienses & Ceruinum cognominant: quod vt  
in agro Montspeliensi vbique obuium est, vli-  
ginosis potissimum & stagnantibus locis, ita  
rarò occurrit in Italia, aut Germania, aut aliis  
Galliæ regionibus: ideò paucis innotuit. Est  
autem radice longè latèque serpente, fibrata,  
candida, tenera, geniculata: caulibus multis,  
cubitalibus, geniculatis, & quàm alterius re-  
ctioribus & rigidioribus, foliis minoribus, ob-  
longis, densissimè congestis, hyssopo non  
dissimilibus, acris & iucundi gustus, odore Pu-  
legij regalis, flore purpurascente, & colore &  
situ florem Pulegij regalis imitante. Hoc,  
etiamsi magna superioris copia suppetat, vtuntur Montspelienses medici, quòd  
viribus sit, vt putant, efficacioribus, & probatoribus.

**DICTAMNVM ET PSEVDODICTAMNVM.**

CAP. VIII.

Nomina

**D**ictamnvm & Dictamnvm Græcis, vel *δίκταμνος* & *δίκταμος*, & *γλῆγων*  
*ἀργία*, similiter Latinis Dictamnnum & Dictamnnum, vel Dictamnus  
& Dictamnus, & pulegium siluestre, Arabibus *Mescatremfir*, *Anegeon*  
*Araba*, siue *Bari*, Italis *Dittamo*, Gallis *Dictā*. Vni Cretēsis Idæ montis  
portiuncula, quàm Dictāam vocāt, debetur Dictamni nomenclatura, inquit Pe-  
na, vel *ἀπὸ τοῦ τριτάτου* dici videtur, auctore Cornario, quòd *τὸ τριτάτον γυναικῶν βοηθῆται*  
promittat, aut vt Dioscor. ait, *ὁ ξυλόκιον ἐστὶ*. Tria ille Dictāni genera tradidit: Dictā-  
num verum, Pseudodictamnnum, & Dictamnnum aliud. Dictamnnum herba est Cre-  
tensis, inquit, acris, læuis, pulegio similis, sed maiora tomentoq; lanuginosa folia  
habet, & in ipsis spissos villos: neque florem, neque fructū profert. Pseudodictam-  
num multis in locis nascitur, antedictò simile, sed minùs acre. Adfertur è Creta  
altera Dictamni species, foliis *sifymbrio* similibus, sed ramis maior, in quibus  
flos origano siluestri similis, niger, mollis. Odor foliorum inter *sifymbrium* &  
saluam

Fol. 114.

Embl. 3. li.

Lib. 3. c. 31.

Genera.

Forma.



DICTAMNVM

*Verum.*



faluiam iucundissimus. Plinius eadem habet. Dictamnium, ut indicauimus, ostendere ceruæ vulneratæ, pastu statim decidentibus telis. Non est alibi quàm in Creta, ramis præternue, pulegio simile, feruens & acre gustu. Foliis tantum vtuntur. Plos nullus ei, aut semen, aut caulis. Radix tenuis ac superuacua. Et in Creta autem non spatiosè nascitur: mirèq; capris expetitur. Pro eo est & Pseudodictamnium, multis in terris nascens, folio simili, ramulis minoribus, à quibusdam Chondris vocatum. Minoris effectus statim intelligitur. Dictamnium enim minima portione accendit os. Qui legere ea in ferula vel arundine condunt, præligantq; ne potentia euanescat. Sunt qui dicant vtraque, nasci multifariam, sed deteriora in agris pinguibus, verum quidem dictamnium non nisi in asperis. Est & tertium genus Dictamnium vocatum, sed neque facie, neque effectum simile, folio sisymbrij, ramis maioribus, procedente persuasione illa, quicquid in Creta nascitur, infinitè præstare cæteris eiusdem generis alibi genitis. Quæ

Lib. 25. 68.

Plinius ex Theophrasto tranſtulit. Τὸ δὲ δικταμνον ἴδιον τῇ κρήτης, γαμασπὸν δὲ τῇ  
 διωάμῳ, καὶ πρὸς πλεῖστον χρῆσιμον, μάλιστα δὲ πρὸς τὰς τόκους τῶν γυναικῶν. ἔτι δὲ μὴ  
 φύλλον παρόμοιον τῇ βληχῶνι. ἔχει δὲ τὴν κατὰ τὸν χυλὸν ἐμπερές. τὰ δὲ κλώνια λεπτότερα,  
 λεπτῶν δὲ τοῖς φύλλοις, καὶ τοῖς κλώνοις, ὥστε τῷ χειρῶν. χρῆσιμον δὲ πρὸς πολλὰ μὴν καὶ ἄλλα,  
 μάλιστα δὲ, ὡς περ ἐλέχθη, πρὸς τὰς δυστοκίας τῶν γυναικῶν, ἢ καὶ δύτοκτιν φασὶ ποιεῖν, ἢ  
 πᾶσι γενεῖς πόνους ὁμοιογενήως. διδοῖ δὲ πίνειν ἐν ὕδατι. πᾶσι δὲ ἔτι, καὶ καὶ ὀλίγος ὁ τόπος  
 ὁ φέρων. καὶ τὸν αἰσθάνεται ἐκείνην, διὰ δὲ φιληθεῖν. ἀληθὲς δὲ φασὶν εἶναι καὶ πρὸς τῶν  
 βελῶν, ὅτι φαγεῖσθαι οὐκ ὀφείδωσι, ἐκβάλλουσιν. δὲ μὴ οὐκ ἀνίσταται τοῖς τοῖς γε, καὶ τοῖς αὐτοῖς  
 ἔχει τὰς διωάμους. τὸ δὲ ψευδοδικταμνον, τῷ μὲν φύλλον ὁμοιον, τοῖς κλώνοις δὲ ἑλαττον, τῇ δι-  
 ωάμῳ δὲ πολὺ λεπτότερον. βοηθεῖ μὴ καὶ πρὸς τὴν αἰσθάνειν, καὶ πρὸς τὴν ἀποσπένειν. ἔτι δὲ  
 δύσους ἐν τῷ σπλάχνῳ φανερά, ἢ τῇ δικταμνῷ διωάμῳ: γαμασπὸν δὲ ἀπὸ μικρῆς σφοδρῆς τιθέασιν δὲ  
 καὶ τὰς διωάμους ἐν νάρθηκι, καὶ χυλῶν, πρὸς δὲ μὴ ἀποσπένειν. ἀσθενέστερον καὶ ἀποσπένειν.  
 λέγουσι δὲ τινες, ὡς ἡ μὲν φύσις μία ἢ τῇ δικταμνῷ, καὶ ἡ τῇ ψευδοδικταμνῷ. διὰ δὲ δὲ ἐν ἀνι-  
 στροφίᾳ φύεται τόποις χειρὸν γινέσθαι, καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ, πλεῖστον τέττον καὶ τὰς διωάμους.  
 τὸ καὶ δικταμνον φιλεῖ χάραν τραχεῖαν ἔτι δὲ καὶ ἕτερον δικταμνον, ὡς περ ὁμῶνυμον, ὅστις τὴν  
 ἀνιστροφίαν, ὥστε τὴν διωάμιν τὴν αὐτήν. φύλλον τε καὶ ἔχει ὁμοιον τῷ σισυμβρίῳ, τὸς δὲ κλώνιας με-  
 λους. ἔτι δὲ τὴν χρεῖαν καὶ τὴν διωάμιν ἐκ ἐν τοῖς αἰσθάνειν. τὸτο μὲν οὐκ, ὡς περ ἐλέχθη γαμα-  
 σπὸν ἴδιον τῇς νήσῳ. φασὶ δὲ τινες ὅλας τῶν φύλλων, καὶ τῶν γάμων, καὶ ἀπλῶς τῶν ὑπερ-  
 νῶς, τὰ ἐν κρήτῃ διαφέρειν. Id est, Dictamnium Cretæ proprium est, admirabili facul-  
 tate, & ad multa vtili, maximè ad mulierum partus. Folio est pulegio simili, sapo-  
 re haud ab simile, ramulis tenuioribus: vsus est foliorum, non ramorum, neque se-  
 minis. Ad multa quidem valet, sed maximè, vt dictum est, ad difficiles partus mu-  
 lierum: aiunt enim vt faciliè pariant efficere, aut proculdubio dolores finire.  
 Dantur bibenda ex aqua. Rara est hæc herba: locus enim qui eam producit, an-  
 gustus. Eam capræ summa cum voluptate depascuntur: verum esse aiunt quod de  
 telis fertur, eas Dictamno deuorato sagittas quibus ictæ fuerint euicere, Tale est

Lib. 9. hist.  
cap. 16.



Dictamnium, & his viribus præditum. Pseudodictamnium illi simile est folio, sed ramulis minoribus, & viribus multum infirmioribus. Tamen ad eadem confert, sed multo inefficacius arque debilius. Vis Dictamni in ore statim percipitur. Excalfacit enim vehementer parua quantitate. Manipulos eius ferula aut arundine includunt, ne expiret: debilius enim redditur cum expiraverit. Existimant quidam naturam Dictamni & Pseudodictamni eandem esse, sed quia pinguioribus locis nascatur, deterius fieri, quemadmodum & alia multa, quæ loci ratione vires mutant in deterius: Dictamnium enim locis asperis gaudet. Est etiam aliud dictamnium velut homonymum, neque facie, neque viribus iisdem. Folium habet silymbrio simile, ramos maiores. Vñ & vis non iisdem competunt. Hoc igitur, ut diximus, mirum, simul & proprium est Cretæ Insulæ. Affirmant in vniuersum quidam herbas, frutices, deniq; omnia quæ ex terra oriuntur in Creta præstantiora esse. Hæc Theophrastus. Quæ ferè omnia à Plinio expressa vides, nisi quòd illic de ceruis dixit, & alio in loco, Dictamnium herbam extrahendis sagittis cerui monstrauere, percussis eo telo, pastuque eius herbæ eiecto, id Theophrastus de capris, & hoc prior etiam Aristoteles his verbis: καὶ ἐν Κρήνῃ παρὰ τὰς ἀγροὺς τὰς ἀγρίας ὄντων τοῦ Διτάμνου, ὅστις ἐν τῷ Διτάμνῳ. Δοκεῖ δὲ τὸ τοῦ Διτάμνου εἶναι τὸν τοῦ ξυμπίτου ἐν τῷ σάμνῳ. Id est, ferunt in Creta capras agrestes telis ictas dictamnium querere, quòd eo tela è corpore eiiciantur. Quos secutus Dioscorides, scripsit in Creta capras sagittis percussas dictamni herbæ pastu eas excutere. Id quod etiam cecinit Vergilius his versibus.

*Hic Venus indigno nati concussa dolore,  
Dictamnium genitrix Cretæa carpit ab Ida,  
Puberibus caulem foliis, & flore comantem  
Purpureo, non illa feris incognita capris  
Gramina, cum tergo volucres hæere sagitta.*

Præterea quas Theophrastus dictamni vires ad difficiles mulierum partus efficaces prodidit, eas etiam Dioscorides, & alias complures his verbis. Præstat omnia quæ satium pulegiū, sed multo efficacius: non enim potū modò, sed appositū & suffitum mortuos fetus expellit. Purgandi vim habet succus eius illicitus, aut cum polenta tritus. Herba ipsa apposita infixos pedibus, aut reliquo corpori aculeos extrahit. Facit & ad lienis dolorem, ipsum enim minuit. Radix eius gustu calfacit, & partus accelerat. Succus eius cum vino potus contra serpentium morsus prodest. Tanta huius herbæ vis est, ut olfactu abigat, & contactu perimat bestias venenum iaculantes. Vulneribus ferro illatis, & venenatorum morsibus infusus succus simulque in potu acceptus statim saniratem adfert. Pseudodictamnium eadem præstat, sed multo inefficacius. Tertia Dictamni species ad eadem quoq; valet, ad quæ præcedens, sed minùs nares ferit. Miscetur etiam emplastris & theriacis compositionibus. Eadem Plinius sparsim tradidit. Dictamnium potu sagittas pellit, & alia tela extrahit illitu. Bibitur ex aqua cyatho foliorum obolus. Proximè Pseudodictamnium. Vtraque etiam suppurationes discutit. Et aliquantò post de dolore vuluæ & strangulatu loquens. Sed præcipua dictamni vis est, inquit, menses ciet, partus emortuos vel transuersos eiicit. Bibitur ex aqua foliorum obolus: adeò ad hæc efficax, ut ne in cubiculum quidem prægnantium inferatur. Nec potu tantum, sed & illitu & suffitu valet: proximè Pseudodictamnium. Sed menses ciet cum mero decoctum pondere denarij. Et in fine capitis. Partus accelerat scordotis pora: dictamni folia præclare dantur ex aqua. Constat vel oboli vnus pondere: vel si mortui sint in vtero infantes, protinùs reddi sine vexatione puerperæ. Similiter prodest Pseudodictamnium, sed tardius. Galenus scribit dictamnium

Lib. 8. c. 27.

Lib. 9. hist.  
Animal.Lib. 3. c. 31.  
Vires &  
Temper.

Li. 26. c. 14.

Ibid. ca. 15.

Li. 6. simpl.



dictamnium tenuiore essentia constare quam pulegium, cetera illi simile esse. At Pseudodictamnium ad omnia imbecillius dictamno esse. Hac Galenus. Verum dictamnium maioribus nostris incognitum fuit. Non paucis enim ab hinc annis cum suo flore perrarum & charum erat: quippe perpaucum olim, idque floribus orbatum ex Creta adferebatur. Idcirco floribus carere Dioscorides, & veterum quidam credidere, non autem Theophrastus, qui fructum proferre ianuit, ergo & florem, neque Vergilius, ut ex versibus supra citatis liquet. Galenus etiam in Emplastro ex dictamno, quod acceptum refert Damocrati, dictamni florem habentis meminit. Hodie magna eius copia ex Creta Venetias defertur, unde emunt Officinæ omnes, floribus ornatum speciosis, purpureis, multis, qui elutunt. Quinimo Pisana ora & Licidis squamis spicarum & concoloribus emergunt. Quinimo Pisana ora & Licidis asperis deuexis satum creuisse audit Pena, & floruisse exili semine in plantam paris pulchritudinis, qualem ipse vidit, tertio tamen, vel quinto post anno in spurium abiisse. Pseudodictamnium Pisis à clarissimo medico Luca Guino ad

Lib. 5. cōp.  
med. gene.  
cap. 10.  
Petrus Pe.  
fol. 214.

PSEVDODICTAMNVM,  
Matthioli.



PSEVDODICTAMNVM,  
Dodonei.



Matthiolium missum caule est dodrantali, lanuginoso, albicante, folia ex caulibus erumpunt ex interuallis bina, dictamni tomento pubescentia, è quorum omnium exortu flores purpurei prodeunt, marrubij vel melissophylli modo, sapore pulegij, minus tamen acri. Pseudodictamnium aliud depinxit, & descripsit Dodoneus, caulibus rotundis, lenibus, villosis, geniculatis, è singulis geniculis folia bina exeunt, quadantenus rotunda, candida, lenia, hirsuta, facie pulegij foliis haud absimilia, nisi quod maiora sunt, prorsus candida, villosa, tactu molli non secus quam verbasci folia, inodora, gustu minimè acria, sed amara: flores dilutè cerulei cauliculis verticillatim coronant, ut in Pulegio & marrubio.

Lib. 2. c. 75.



## THYMBRA ET SATVREIA. CAP. IX.

Nomina

Lib. 19. c. 8.



VAE *ῥύμβρα* Græcis dicitur, Latinis etiam Thymbra, & Cunila quibusdam, & Satureia Plinio auctore. Thymbra, inquit, Cunilam: subaudi, vocant. Hæc apud nos habet vocabulum & aliud, satureia dicta in condimentario genere. Seritur mensē Februario origano æmula. Nusquam vtrunque additur, quippe similis effectus. Sed cunilæ ægypti um origanum tantum præfertur. In quibus Plinius eandem herbam thymbra, cunilam, & satureiam facit. Columella verò à thymbra cunilam quam satureiam vocat distinxit: sic enim ait. Tum etiam thymbra, vel nostratis cunilæ, quam satureiam rustici vocant. Et paulò post, & nostras cunila quam dixi satureiam. Rursus in carmine.

Lib. 9. c. 4.

*Et satureia thymi referens thymbraeq, saporem.*

Lib. 10.

Si igitur alia est thymbra Dioscoridis, alia satureia, videtur hæc hortensis seu sativa esse, herba vulgo nota, Gallis *Sarriette*, *sadree*, *Sauoree*, Italis *Sauoreggia*, *coniela*, *Peuerella*, Arabibus *Sabater*, seu *Sabatar*. Satureia à saturando fortè dicta, quod edulis frequenter indatur & incoquatur. Alij à satyris nomen ei positum fuisse putant, quod venerem stimulet. Martialis non satureiam, sed satureia dixit in plurali neutra voce, dum ait.

*Improba nec profunt iam Satureia tibi:*

Quamvis aliqui legant,

*Prodest iam Satureia tibi:*

Lib. 3. 38.

Sicut Aetius & *ῥύμβρα*. Verum ut Cunilæ vox quæ de multis plantis vsurpatur, minus pariat ambiguitatis & tædij, lectorem monendum censeo, Cunilam sine epitheto, Plinio cap. 8. 19. Columellæ cap. 4. 9. vocari Satureiam, siue sativa sit, siue sylvestris, cuius vtriusque meminit Plinius cap. 16. 20. deinde, origanum Heracleoticum Plinio cap. 16. 20. appellari Cunilam gallinaceam: origanum verò sylvestre, Cunilam bubulam, assentiente Dioscoride, tametsi hæc origani genera vocari cunilas tradat, absq; epitheto. In hac Cunilæ appellatione, Crateuas falsus est, auctore Plinio, cap. 8. 19. & cap. 15. 20. qui ligusticum, ab aliis Panaces dictum, Cunilam bubulam nominaverit. Præter has Plinius cap. 10. 32. Cunilam capitatam memorat, quam Cephaloten vocavit Serenus. Ea meo iudicio Polycnemon est, Cunilæ nomen adeptum, quia folio simile sit origanis, Cunilæ generibus, adiecto epitheto Capitata, quia caput suavis & acris odoris habet, corymbi specie. In Cunilorum explicatione vitio vertendum Plinio, quod cap. 16. 20. dum bubulam describit, ex historia Polycnemi depraavata eam prodat, semen habere Pulegij, utile ad vulnera, commanducatum, & impositum, ut quinto post die solvatur, cum Polycnemon Dioscoridi, cui plus tribuendum, caulem edat Pulegio similem, non semen, & agglutinandis vulneribus, recens, vel aridum, cum aqua efficaciter illinatur, ut tamen quinto die solui debeat: quibus locis ad hunc modum collatis apparet hæc perturbata Plinium confudisse. Idem scriptor Cunilaginem Conyzam nominat, distinctis etiam illius generibus, eodem prorsus modo quo apud Dioscoridem discernuntur. Is thymbra genera duo posuit, hanc sativam, illam silvestrem, & vtramque paucis notis delineavit. Silvestris gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, sed minor, & tenerior, ferens spicam floribus plenam, coloris herbacei. Sativa silvestri prorsus minor est. Harum neutra satureia nostras dici potest. Quare ex Matthiolo alterius imaginem hinc pinximus, quam Thymbra Dioscoridis maxime congruere putat. Hæc enim foliis ac cauliculis thymum adeo repræsentat, inquit, ut non desint qui pro thymo eam recipiant. Præterea thymo gracilior, longeq; tenerior est. Verum capitula thymi modo non profert siquidem cauliculi in spicatos processus desinunt, in quibus flores emicant parvi, sed purpureo colore. At hanc minime veram esse thymbra Dioscorida *Penn* existimat: videri etenim

potius



ODORATARVM,  
*THYMBRA*,  
*Vera, Pena.*



LIB. VIII.  
*SATUREIA* Dioscoridi,  
 & Matthioli.

327



potius polium feminam recentiorum : nec enim vlla spica donatur , aut in cibis commedatur : deniq; nullam nisi vagam & incertam est sortita notam. Genuinam autem sic depinxit, & hisce descripsit verbis. in Thyrrheni maris asperis, & salebrosis S. Iuliani Hetrusci, magno prouentu oritur. aspectu perquam elegans herbula, quam nullus non faceret satureiam veram : Pisanis etiam vernaculo idioma-

*SATUREIA, Durior.*



te *Thymra di Santo Iuliano* dictam. Virgultis est exilibus, palmum altis, sarmentosis, lignosis, foliis ab imo crebris, thymi Cretici, sed angustioribus, longiusculis, spica in summis cauliculis tereti, flosculo copioso intertexta, gustu acri & odore, quæ tota ex obsoleta purpura albicat, thymo maiore minor, minori ferè par. Hæc Dioscoridis germana videtur. Matthiolus plan tam ostendit, cui notæ omnes *Thymra* Dioscoridis maximè conueniunt. Etenim foliis ac cauliculis *Thymum* ita refert, ut nò desint qui eam pro thymo vsurpent: cauliculi enim in spicatos processus desinunt, in quibus flores emicant parui, subpurpurei. Præterea, ut Dioscorides ait, non solum sponte nascitur, sed etiam satiuæ est. Altera (si *Thymra* aut *Satureia* rectè dici potest) maior fruticosiorque est, & in hortis frequentior, quæ ex eodè Matthiolo hîc quoq; exprimitur. Sequuntur ceteræ duæ, etsi non spicata, vsu tamen saturiæ nomen adeptæ vulgo, quarum vsus in condimentis & lucanicis loco piperis est, eius præsertim, quæ in montosis & saxosis



saxosis Narbonensibus & Pedemontanis copiose provenit, Satureia duriore à Dalechamptio nominata, radice breui, fibrata, nigra, dura, caule lignoso, fragili, furculoso, foliis thymo longioribus hyssopo vulgari ferè æqualibus, densius stipatis quàm in satureia hortensi, in qua bina ferè ex aduerso sita sunt. Nam in hac quaternaria sapius conspiciuntur, minoribus duobus ex maiorum veluti sinu consurgentibus

*THYMBRA, Dodonæi.*

Lib. 2. c. 52



*THYMBRAE, Effigies, Dodonæi.*



per intervalla: inde flores promuntur copiosi, dilutè purpurei. Tota odoris est suavis, sed validissimi, gustus feruidi, & acris, ideò piperella quibusdam dicta. Thymbra non satureiam vocat Dodonæus, hic ab ipso & à nobis appictam, furculis multis, lignosis, gracilibus fruticantem, foliis parvis, angustis, flosculis purpureis aut candidis inter folia secus cauliculos exeuntibus, ab imo cauliculorum ad summum, qui dilapsi in spicarum viridiū speciem vertuntur, quibus semen valde minutum includitur, radix lignosa. Satureiam hybernā vocant, quod hyemem toleret, floret Octobri. Satureia nostra vulgaris raro ruri, frequentissimè in hortis visitur, herba æstiva, tenera, superiore maior ac fruticosior: ramulis multis furculosis, in orbem sese diffundentibus, gracilibus, rotundis, nigricantibus, in quibus folia per intervalla molliora & angustiora, pauciora quàm in superiore, hyssopi vulgaris foliis quadatenus similia, sed minora, ex quorum sinu flores pauciores emergunt, in cádido purpurei, odoris suavis: semen nigricat, radix tenera

*SATUREIA, Vulgaris hortensis, Matth.*



est



SATUREIA Lutea,  
Dalechampij.

est & fibrata. In hortis omnibus quotannis feritur, & moritur: Iunio mēse floret. Huc referenda quæ à nonnullis Satureia lutea nominatur, Vires & Temper. in umbrosis lucorum & siluarum marginibus & cliuis proveniens, radicibus paucis, exiguis, breuib; nigris: caule dodrantali, quadrato, in ramulos paucos brachiato, è foliorum alato sinu emergentes: foliis oblongis, angustis, minimè crenatis, angustis, hyssopo aut satureiæ similibus: flore paruo, oblongo, infra candicante, supra aureo, velut aperto quodam rictu & hianthe, gustu subamaro & austero, floret Maio & Iunio. Thymbra siluestris, auctore Dioscoride, eadem potest quæ thymum, si similiter sumatur. Lib. 3. c. 38. Non aptus eius sanis vsus. Satiua propter mitiorem acrimoniam commodior est in cibis. Huius Galenus in simplicium censu non meminit. Paulus eadē prorsus quæ Dioscorides de vtraq; scripsit. Satureia nostra vulgaris calida est & sicca ordine tertio. Farina eius in vino pota, vt ex antiquo herbario refert Fuchsius, medetur pulmonis, thoracis, & vesicæ vitii, ciet vrinas, menses pellit. Herba ipsa cum floribus lethargicos

excitat olfactu, aut coronæ modo capiti imposita. Succus cum rosaceo auribus infunditur: cum triticea farina coxendicibus illinitur. Satureiæ vsus marcescentes coitus stimulat, quare à satyris traxisse nomen putant. Stomachi concoctiones adiuvat: fastidia discutit: hebetes oculos exacuit.

## THYMV M.

## CAP. X.

**Q**UAECTIS ῥύμος & θυμόν dicitur, Latinis Thymus & Thymum, Arabibus *Hafce*, *Alasce*, Gallis & Germanis *Thym*, & *Rhomischquendel*, Italis *Thimo*, Hispanis *Tomilho salsero*. Thymus autem Græcis ab excitando, quod ῥύειν dicunt, nomen inuenit. Nonnullis placet potius hoc etymum, vt thymos quasi thyæmos, quod est sanguinem impellens dicatur. Dioscorides thymi vnius historiam tradidit. Sunt tamen qui credunt in epithymi historia thymum aliud agnouisse, quod illic ῥύμον σκληρότερον, id est, thymum durius vocat. Plinius species duas recēset. Totidem & thymi, candidum ac nigricans. Floret circa solstitium, cum apes decerpunt, & augurium mellis est. Prouctum enim sperant apiarum largè florescente eo. Læditur imbribus, amittitq; florem. Semen thymi non potest deprehendi, cum origani perquam minutum, non tamen fallat. Sed quid interest occultasse id naturam? In flore ipso satis intelligitur, satóque eò nascitur. Quid nō tentauēre homines? Mellis Attici in toto orbe summa laus existimatur. Ergo translatus est ex Attica thymum, & vix flore, vt dicemus, satum. Sed alia ratio naturæ obstitit, non durāte Attico thymo, nisi in afflatu maris. Erat quidē hæc opinio antiqua in omni thymo, ideóque non nasci in Arcadia. Tunc oleam non putabant gigni nisi intra CCC. stadia à mari. Thymo quidem nunc etiā lapideos campos in prouincia Narbonensi refertos scimus, hoc penè salo reditu, è longinquis regionibus pecudum millibus conuenientibus, vt thymo vescantur. Is locus ex Theophrasto transcriptus est, cuius declarandi gratia, ipsa Theophrasti verba adscribam. Lib. 6. hist. cap. 2.

## Nomina

Lib. 3. c. 37.

## Genera

Lib. 4. c. 172.

Lib. 2. c. 10.


Lib. 6. hist.

cap. 2.



adscribam. καὶ θύμον δ' μὲν λεῖον, τὸ δὲ μέλαν. ἐνανθές δὲ σφόδρα, περὶ τροπὰς ἀνθε-  
 γεινός, ἀφ' ὧ καὶ ἡ μέλιτ' λαμβάνει τὸ μέλι. καὶ τοῦτο φασιν οἱ μελιτ' ἔργου διήλον εἶναι πῶ-  
 τερον ἐυμελιτοῦσιν, ἢ δ'. χαλῶς γὰρ ἀπανθήσας, ἐυμελιτ' εἶ. βλάπτει δ' καὶ ἀπάλλουσι τὴν  
 ἀνθήσιν ὕδωρ, ἐὰν ἐπιγένηται σπέρμα δ' καρπικὸν ἢ μὲν θύμωρα, καὶ ἐτι μάλλον ἢ ὀρέγανος ἔχει  
 φανερὸν. τὸ θύμω δὲ ἔκ' ἐστὶ λαβεῖν, ἀλλ' ἐν τῷ ἀνθῇ ὡς ἀναμειχθῆται σπεῖρσαι γὰρ τὸτο,  
 καὶ ἀναβλάσκει. ζήσσει δ' ἔ' λαμβάνουσιν οἱ ἐξάγειν Ἀθήνησι βυλόμενοι δ' γένος. ἴδιον δὲ ἔχει  
 καὶ πρὸς ταῦτα, ἔ' χερδὸν πρὸς τὰ ἄλλα, καὶ ἔ' τὸς τόπους. ἔ' γὰρ φασὶ δύναιτο φύεσθαι καὶ  
 λαμβάνειν ὅπ' αὐτὴ ἀναπνοὴ διύκειται ἢ ἀπὸ τῆς θαλάσσης. διὸ ἔδ' ἐν Ἀρχιδίῳ γίνεσθαι θύμωρα  
 τε καὶ ὀρέγανον. καί τοι τοιαῦτα πολλὰ, καὶ πολλὰ χ' παραπλήσιον οὐδ' συμβαῖνον τῷ αὐτῷ  
 ἐπὶ τῆς ἐλπίας, ἔδ' γὰρ ἔδ' ἐκείνη δοκεῖ τεμαχοσίῳν σταδίων ἀπὸ θαλάσσης ἐπ' αὐτὴν  
 Id est, Thymum aliud candidum, aliud nigrum. Serò id admodum floret (non  
 ἐνανθές vt in vulgatis codicibus exaratum est, sed ὁφανθές legitur Gaza, ad sensum ac-  
 commodatius: mox enim sequitur ratio seræ florum productionis) Nam circa sol-  
 stitium æstivum floret, à quo mel apes colligunt, atq; ex eo præfagiri aiunt, an lar-  
 gior futurus sit mellis prouentus: nam si flos læsus fuerit, mellis copia deficit, læditur  
 autem & perit flos superuenientibus imbribus. Semen quidem fecundum thym-  
 bræ & origani perspicue cernitur, Thymi verò nullum videre licet, sed quodāmo-  
 do floribus ipsis permiscetur: flores enim serunt, atque ita oritur. Quærunt autem  
 atque inveniunt qui istud ex Athenis deferre volunt. Est etiam præter hæc ipsa, &  
 reliqua omnia, peculiaris thymo natalium conditio. Nam quo status è mari ne-  
 queat peruenire, illic nasci durareque posse omnino negant, quare neque thym-  
 bram neque origanum in Arcadia prouenire, quamquam talia multa & multis in  
 locis gignuntur. Simile igitur quod & oleæ vsuuenit: nec enim eā trecentis à mari  
 stadiis nasci posse videtur. Hæc Theophrastus. Repetit thymi genera Plinius ali-  
 quantò pòst. Thymum colligi oportet in flore, & in umbra sicari. Duo autè sunt  
 genera eius, candidum, radice lignosa, in collibus nascens, quod præfertur: alterum  
 nigrius, floribusq; nigri. Hos auctores secuti herbarij recētiōres duo thymi statuerunt  
 genera. Vnum Creticum cognominatum, quod in Creta copiosum nascitur, &

THYMV M, Creticum.



Lib. 3. c. 37.  
 Lib. 4. c. 172

Forma.

κεφαλῶν vocatur à capitulis spicatis. Hoc ma-  
 ius est, & candidum, foliis & furculis tanquam  
 lanugine siue puluere obductis & candicanti-  
 bus: alterum vulgatum, minus, & nigrum di-  
 ctum, quia saturo colore herbaceo virens ferè  
 nigricet. Prioris Cretici & candidi duntaxat  
 Dioscorides meminit, non solum de thymo,  
 sed etiam de epithymo tractans, doctorū her-  
 bariorum sententia, qui thymū nigrum Theo-  
 phrastr & Plinij serpyllum, zygidā Dioscoridis  
 esse non sine ratione opinantur, vt dicemus.  
 Thymum Dioscoridis frutex est parvus, furcu-  
 losus, foliolis multis & angustis circumdatus,  
 habens in summo capitula floribus purpura-  
 scentibus referta. Thymum vulgare humilis  
 est herba, furculis multis, fragilibus, lignosis,  
 foliis perpusillis, gustu acribus, superiori tum  
 facie, tum sapore haud absimilibus, sed non ita  
 candicantibus. Flores verò nō in capitulis aut  
 spicis, sed iuxta foliola purpurascunt, radices te-  
 nues sunt & lignosæ. Ex quibus perspicuum  
 est Plinium apertè hallucinatū fuisse, qui cum  
 legisset



THYMYM *Vulgare siue*  
*Durius, Dodon.*



legisset apud Theophrastum, alterum thymi genus nigrum esse, quod herbaceo virore & obscuro ferè nigricet, scripsit loco iam citato id floris esse nigri, qui flos in utroque purpureus est, sed in Cretico saturatiore, in altero dilutiore purpura. Thymum Creticum gracili solo & petroso provenit, non solum in Creta, sed etiam in Græcia & Syria, vnde Venetias asportatur: Nigrum frequens in Narbonæ maritimis collibus, & aliis incultis Narbonensis provinciæ locis, ut eius lapideis campis, quod ait Plinius, vulgò *Lacrau de Prouence*, atq; etiam in Hispania. Frigidioribus regionibus studiose colitur in hortis. Thymum, auctore Dioscoride, potum cum sale & aceto pituita per aluum ducit. Decoctum eius cum melle orthopnoicis & asthmaticis prodest. Lumbricos ventris, menses, fetus, & secundas pellit. Vrinam ciet. Mixture melle in eclegmate excreabilia facit thoracis vitia. Recentia oedemata cum aceto illitum discutit, sanguinis grumos dissolvit. Thymos & verrucas pefiles tollit. Ischiadicis cum vino & polæta impositum auxiliatur. Vtile est

Lib. 21. c. 21.

Locus.

Lib. 3. c. 37.

Vires.

Temper

etiam pro condimento in sanitatis usu. De eadem re hæc multò fusiùs tradidit Plinius. Vtraque oculorum claritati multum conferre existimantur, & in cibo, & in medicamentis. Item diutinæ tussi eclegmate faciles excreationes facere cum aceto & sale. Sanguinem concreescere non pati è melle. Longas faucium distillationes extra illita cum sinapi, extenuare item stomachi & ventris vitia. Modice his tamè utendum est, quoniam excalfaciunt, quamvis sistunt aluam: quæ si exulcerata sit, denarij pondus in sextarium aceti & mellis addi oportet. Item si lateralis dolor sit, aut inter scapulas, aut in thorace Præcordiis medentur ex aceto cum melle, quæ potio datur & in alienatione mentis, ac melancholicis. Datur ex comitialibus, quos correptos olfactus excitat thymi. Aiunt & dormire eos oportere in molli thymo. Prodest & orthopnoicis, & anhelationi, mulierumque mensibus retardatis, vel si emortui sint in utero partus, decoctum in aqua ad tertias. Et viris verò contra inflationes cum melle, & aceto. Et si venter turgat, testèsve, aut vesicæ dolor exigat. E' vino tumores & impetus tollit impositum. Item cum aceto callum, & verrucas. Coxendicibus imponitur & articularibus morbis, & luxatis tritum, ac lanæ inspersum ex oleo. Dant & potionem articularibus morbis trium obolorum pondere in tribus aceti & mellis. Et in fastidio tritum cum sale. Quibus qualitatibus hæc efficiant Galenus docet his verbis. Thymum incidit, & calfacit vehementer, ob id & urinam & menses prouocat, fetum euellit, viscera potum expurgat, educendis ex pulmone & thorace confert. Itaque in excalfaciendo exsiccandoque, in tertio ordine statuendum est. Præter quas vires, alias quoque ei tribuit Aetius sic scribens. Hæc experientia de thymo comperta sunt. Dato ieiunis articulari morbo laborantibus, thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyatho, bilem enim reliquosque humores, atque acrem saniem euacuat, facit & ad vesicæ affectus. Ventre autem inflato, ubi scilicet intumescere cœperit, drachmam vnam dato ieiunis cum cochleari aquæ mulsæ. Ad lumborum coxendicumque dolorem, laterisque, thoracis, ac hypochondriorum suspensiones, & inflationes, pon-

Lib. 21. c. 21.

Lib. 6. sim.

Lib. 1.



dere trium drachmarum cum oxymelite temperato, mensura cochlearij ieiunio exhibeto. Similiter etiam & melancholicis, & mente turbatis, timoreq; detentis drachmas tres cum oxymelitis temperati cochleari præbeto. Dato item ieiunis, & ante cenam, aduersus lippitudines, & vehementem oculorum dolorem. Præterea contra podagram, etiam quæ motum omnino interceperit, cum vino vtilissimè propinatur. Postremò ad tumefactos testes ieiunis trium drachmarum ponere exhibetur. Verùm ab atro thymo abstinere oportet: corrumpit enim temperamentum, bilēque gignit. Eligendum quod purpureo flore est: præstantius tamē quod album habet. Ex thymo manat oleum aurei coloris, inquit Matthiolus, quod vna cum aqua elicitur, dum per calentis aquæ balneum herba recens viridisq; distillatur. Hoc citreum malum respicit, gustu acerrimum est, & ad ea omnia vtile, quæ vehementer excalescere postulant.

In Cap. 37.  
lib. 3.

## SERPYLLVM.

## CAP. XI.

Nomina

Lib. 3. c. 39.

Ibid.

Genera.

Lib. 20. c. 2.

Lib. 6. hist.  
Cap. 7.

Ibid.


Lib. 3. c. 39.

Forma.


In cap. 39.  
lib. 3.

**S**ερπυλλος & Σερπυλλον Græcè, Latine Serpyllum, Officinæ Latinum nomen retinuerunt, Arabicè *Hemen*, Italicè *Serpillo*, Germanis *Querdel*, & *Hener Roel*, Hispanicè *Serpillo* & *Serpam*, Gallicè *Serpollit*. ἀπὸ τοῦ σέρπειν, auctore Dioscoride, nomen à Græcis inditum est, id est, à serpendo. Varro quoque auctor est ab eo quod serpat, tam Græcis quàm Latinis dictum esse, quoniā si qua eius particula terram attingat, ibi radices demittit. Dioscorides duo serpylli genera esse scripsit, hortense odore sampsuchum referens, & idem coronarium, quod serpit: ac sylvestre, zygis appellatum, quod fortè eo iugarentur vites. Συγείν enim Græcis interdum idem quod Latinis ligare, & vincire significat. Istud non serpit. Plinio de iisdem generibus cum Dioscoride conuenit, minimè verò in eo quod de proserpendo tradunt. Verba eius hæc sunt. Serpyllum à serpendo putant dictum. Quod siluestri euenit, in petris maximè. Satiuum non serpit, sed ad palmi altitudinem increscit. Pinguius volutarium, & candidioribus foliis, & ramis. Quod itaque Plinius de siluestri, id Dioscorides de hortensi dixit. Theophrastus vtriusq; etiam serpylli meminit, sed hortense non aliud illi videtur esse quàm siluestre in hortos translatum. Sic enim ait, καὶ γὰρ ἔστιν ὁ σερπυλλος ἐν ἀγροῖς, ὃν κομίζοντες ἐκ τῶν ὁρῶν φυτεύουσι, καὶ ἐν σκυῶνι καὶ ἀγῆνησιν ἐκ τῆς ἡμετέρας. παρὰ ἄλλοις δὲ ὁλως ὁρῆ παλίστην, καὶ τὸ πῶν, καὶ ἔπειρ ἐν τῇ θράκῃ, καὶ σισυμβριον ὃ καὶ τὰ ἄλλα θριμύτερον ἔχοντα τὴν ὁσμὴν. Id est, Etenim serpyllum est siluestre, quod deferentes ex montibus ferunt, vt Sycione & Athenis ex Hymetto. Apud alios verò, vt in Thracia, montes & alia loca serpyllo scætant, & sisymbrio, & reliquis acriori odore præditis. Rectius quàm Gaza, qui vertit, serpyllo scætant, sed sisymbrio reliquisq; odor acrior est. Quātum verò serpyllum, & quomodo serpere possit, declarat Theophrastus his verbis, τὸ δὲ σερπυλλος ἰδιος ἢ ἀνέξῃσις ἢ τῶν βλαστῶν διδύναται γὰρ ἐφ' ὅσον ἐν παροιναῖ καὶ μήκος, χάραι καὶ λεῖαν, ἢ πρὸς αἰμασταν φύσει γένηται, καὶ τὸ κατὰ χεῖρ ἰεμένον. Id est, Ramulorum serpylli proprium quoddam est incrementum, quippe cum possit in quantam volueris longitudinem trahi, arrepto pedamento aliquo, aut si prope sepēs plantetur, aut ex loco altiore demissum. Serpyllum hortense sic describit Dioscorides. Folia habet & ramos origano similes, (vel vt quidam legunt, tragorigano: nam Tragorigani folium cum serpyllo sylvestri idem confert) sed candidiores: ad sepēs demissum multò procerius assurgit. Siluestre non serpit, sed rectum ramulos emittit tenues, surculosos, foliis refertos rura similibus, vel, vt rursus legunt, Tragorigano: τραγοριγάνω, non παγιδάνω. tamen subangustis, oblongioribus, durioribus: flores gustanti acres, incundè olentes: radix inutilis. Nascitur in petris. Matthiolus serpyllum hortense in Hetruria haud negligi, sed in hortis feri, & diligenter coli tradidit. Siluestre duorum esse generum, vnum flore candido, odore citrij mali: alterū flore purpureo, gustu perquam acri, satureia simili.





SERPILLVM, Matthioli.



Saxifraga Dioecoris respondere putat. Lobellius pinxit. Narbonense Serpyllum foliis & facie perpusilli angustifolij Thymi nostratis, quod rarius est, in Ericetis

simili. Vtrumq; copiosissimè nasci apud Goritenses, in Saluatino mōte latissimū, & odoratissimū. Duo quoq; serpylli genera agnoscit Pena: quoddam satiuū, quod habitius & grandius est, quoddā siluestre incultis marginibus, sterilibus, & collibus gaudēs. Facies vtriq; thymi nostratis vulgaris: flores & folia similia, sed maiora, in cauliculis gracilibus, duris, lignosis, reptantibus: flosculi in capitulis, thymi vulgaris purpurea rubentes, nonnunquam albicantes. Serpyllū vulgare Dodonæus libro de floribus non tam serpyllo quā

fol. 181.



Egidij pagi, vulgò *S. Gilles*, agri Mospeliensis, Thymi angustifolij facie prouenias, lignosis & durioribus furculis repens, cuius radix & flores similes nostrati. Serpyllum quidem certè pauci hodie aut ferè nulli in hortis serunt, cum vbique copiosissimum nascatur, nec ideo tamen despiciunt. Nam ex eo cum floribus siccato & trito à permultis puluisculus fit, quem vocant *du Pouffet*, quo iuscula condiunt. Serpyllum verò zygida Dioscoridis, periti quidam thymum nigrum esse putant, quo Narbonensis scatet Gallia, & quod etiam hodiè Mospelienses *Serpolet* appellant, Auenionenses & accola, *Fargoule*, Parisienses *Thym*. Nam thymi nomine Dioscorides albi tantum & Cretensis meminit, stœchadis modo capitula spicata gerentis, vt diximus. Hanc etiam plantam, quia naturâ thymo proximam habet, à Theophrasto serpyllum *θυμώδες* dictam volunt, non thymum penitus redolens, vt conuertit Gaza, sed thymo figura, folio, rectis virgulis, flore, odore, viribus ac facultatibus simile, quas sic declarat Dioscorides. Serpyllum siluestre satiuo efficacius est, magis exsiccans, & ad medicum vsum aptius. Menses extrahit, & vrinas cit potu. Torminibus, ruptis, vullis, iocinoris inflammationibus auxiliatur, aduersus serpentes potu & illitum. Capitis dolores mulcet coctum, adiecto rosaceo, & aceto madefactum. Maxime verò lethargo & phrenitidi cõuenit. Sanguinis vomitus sedat succus eius quatuor drachmis cum aceto potus. Plinius eadem ferè habet. Aduersus serpentes efficax, inquit, maxime cenchrin, & scolopendras terrestres ac marinas, & scorpiones, decoctis in vino ramis foliisque. Fugat & odore omnes si vratur. Et contra marinorum venena præcipue valet. Capitis doloribus decoctum in aceto illinitur temporibus aut fronti cum rosaceo. Item phreniticis, lethargicis: contra tormina & vrinæ difficultatem, anginas, vomitiones drachmis quatuor datur. Ex aqua bibitur & ad iocinorum desideria. Folia obolis quatuor dantur ad lienem ex aceto. Ad cruetas excreationes teritur in cyathis duobus aceti & mellis. Serpyllum, auctore Galeno, vsq; adeo exsiccans, vt & menses & vrinas moueat, gustu multum est acre.

## CALAMINTHA.

## CAP. XII.

## Nomina



*Καλάνθη* Græcis, Latinis Calamintha, Officinis & Arabibus *Calamentum* dicitur, Italis *Calamento*, Gallis *Calamente*. Nominata verò est calamintha quasi vel bona vel utilis mentha: namq; odore suo serpentes fugat: quod testatur etiam Aristophanes his verbis. *ὅς ὅστις καλάνθη* *μύνης ορεως ἐλατύνει*. vel quasi elegantiore aspectu, odoreq; deliciarioris esset quam mentha, certè habitiore nitidiorq; habitu esse nullus inficiabitur, inquit Pena, qui Lib. 4. c. 36. Vincentinam & Veronensem viderit. Nisi quis putet à *καλου*, hoc est ligno, quasi lignosam appellari mentham. Dioscorides tria calaminthes recenset genera, calamintham montanam, alteram Latinorum nepetam, tertiam methastri similem. Lib. 20. ca. 14. Plinius prima duo genera in vnâ menthastri speciem confudisse videtur his verbis. Menthastrum siluestre mentha est, differens specie foliorum quasi figura ocimi, pulegij colore, propter quod quidam siluestre pulegium vocant. Quo loco falso pulegij colore, pro pulegij odore legitur, vt ex Dioscoride intelligere licet. Postea nepetæ vires seorsim exponit. Calamintham montanam describit Dioscorides Lib. 3. c. 36. foliis esse ocimi, subalbidis, ramulis & furculis angulosis, purpureo flore. Alteram pulegio similem, sed maiorem, quam ideo siluestre pulegium vocarunt, quod odore ipsi similis sit. Nepetam Latini vocant. Tertiam menthastro similem, foliis oblongioribus, caule & ramo superioribus maiorem, sed viribus inefficaciorem. Calamintham montanam sæpius à se visam scribit Matthioli in excelsis vallis Anania montibus, foliis albicantibus, ocimo similibus, caule quadrangulo, flore in purpurea rufescente. Hanc Lobellius Calamintham montanâ vulgarem vocat, mediam odoris

1 Calam.  
In cap. 36.  
lib. 3.



ODORATARVM,  
*CALAMINTHA Montana,*  
*Matthioli.*




LIB. VIII.  
*CALAMINTHA Altera,*  
*Matthioli.*



odoris suauitate & magnitudine inter suauiore Calaminthā & Nepetam. Quadrato enim cubitali & ampliore, alarum multis ramulis concauo caule fruticat, to-  
 liis rotundioribus nigrioribus, Nepetæ similibus, sed maioribus, hirtis nitidioribus,  
 & iucundioris odoris fragrantia, floſculis non disparibus. Cluiſis Angliæ, Germa-

*CALAMINTHA Montana*  
*preſtantior Pen. & Lobell.*



nia, Gallicæ, Italiæ ſponte oritur, vnde in viretis Belgicis alitur ad vſus medicos. Calamintham aliam montanam præſtantiorem oſtendunt Pe-  
 na & Lobellius Officinis omnibus nondū no-  
 tam, quæ eius vice cattaria vtuntur. Non obuia eſt omnibus iſta montana præſtantior, nec niſi in Narbonenſis Ceuenæ vmbroſis, ſaxoſisq; cliuiſ frequens, & in Romano Patavinôq; agro virgis quadratis, nitidis, cubitum altis, & quam menthæ gracilioribus, folia edētib; ocimi aut meliſſophylli, ſed minora, ſpecioſiora, hirtutiora, flore item meliſſæ, ſed purpureo, quauis cala-  
 mintha maiore, aſpectuq; hilariore, ſemine portulacæ minuto, odore amaraci, mentha ſuauiore. Alterius calaminthæ frequētioreſt vſus, quæ Romanis Nepeta nuncupatur. Hæc inculco ſo-  
 lo prouenit, vt ſcribit Matthiolus, ſecus itinera & ſepes, atq; etiam in collibus: foliis ſubrotundis, aliquātum hirtutis, in ambitu minutim inſectis, caulibus cubitalibus, anguloſis, hirtutis, floribus paruis purpuraſcentibus, à medio cau-  
 le vſq; ad ſummum verticillatim erumpētib; vt in pulegio, ſed in cacumine copioſioribus,

In cap. 36.  
 lib. 3.



radicibus tenuibus & numerosis. Hæc est quæ pulegio similem facit Dioscorides. Est enim foliis regalis pulegij, ut ait Pena, aliquantò maioribus, albidis, variegatis maculis, minoribus quam superioris calaminthæ ex pullo porraceis, odore pulegio simili, sed vehementiore ingratioreq; præsertim feruidioribus tractibus, ligu-

*CALAMINTHA Aquatica,*  
*Matthioli.*



Lib. 25. c. 6. *CALAMINTHA Secunda*  
*incana, Lobellij.*



lidis, cliuosis Italia, Narbonæ, & Galloprovinciæ, ubi nomine calaminthæ seu nepetæ Officinis usurpatur, & in reliqua Gallia Lugdunensi præcipue, ubi etiam totam æstatem flores purpurantes pallentesq; verticillatim virgas cubitales amicientes fundit. Est etiam Lobellij Calamintha altera, odore graui pulegij, foliis maculosis, Nepeta Dioscoridis, quam sic etiam vocasse debuit Matthiolus. Huius alteram speciem Calamintham secundam incanam ex Italiae colibus attulit, & pinxit Lobellius, gustu pulegij, foliis maioranæ duplò minoribus, candicantibus, uti tota planta in cubitalibus & pedalibus furculis. Exiliores flosculi calaminthæ siue Nepetæ Dioscoridis, odoris grauis pulegij. Cautibus Linguagotticis calidarumq; regionū oriunda, floribus albis ex collibus Picardiæ & Gallobelgij delatam calamintham secundam vidit Lobellius. Tertia calaminthæ species Gattaria non est, ut scribit Matthiolus, sed illa quæ in aquosis locis reperitur, menthastri æmula, magis tamē subalbidis foliis, & gustu acrioribus, cuius hanc Matthiolus picturam ostendit. Quidam non calaminthæ speciem, sed methastrum album appellant. Pena & Lobellius Polycnemum esse suspicantur, de quo in hoc libro tractabimus suo loco. Alij scordotim alteram Plinij, de qua ille: Scordotis est, inquit, & alterius generis, latioribus foliis, menthastro similis. Plurimos utraque ad vsus per se, & inter alia in antidotis. Alij Scordotim Plinij Saluiam agrestem Officinarum, siue Saluiam bosci esse aiunt, quam Dodonæus Sphacelum Theophrasti esse credit; alij, quorū sententia probabilior, Gallitricum Officinarum: alij Stachyn earumdem. Pena & Lobellius aliam methastri foliis aquaticam, hirsutam, calamintham tertiam Dioscoridis esse censent, cuius facilis dignotio menthastrum inuenienti, inquit Pena, utraque enim aquosis viret marginibus factorum aut pratorum. Huius caulis cubitum & sesquicubitum æquat, folia menthastri aut silymbrij edit, incana: flores methæ spicatos purpure obsoleta, odoris gravis silymbrij, nec gustu nimis calfaciente. Quidam sylvestre Silymbriū Dioscoridis esse putant. Hanc videtur Tragus nomine quartæ nepetæ agrestis depinxisse, plantam



**NEPETA** IIII. Tragi,  
*Calamintha menthastrifolia, Pena.*



**CALAMINTHA**  
II. & III. Dioscor.



calida est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet. Periclitantibus autem & corpori admoventibus extrinsecus imposita, primum quidē valde calfacit, & nonnihil mordet, cutemq; rodit, postremo etiā vlcus efficit. In corpus autē intrò assumpta

plantam grauissimi odoris, circa humida loca prouenientem, folia habentē origani, incana, gustu impenſe feruentia & amara, flores rubros caulem circundantes. Calaminthæ secundæ siue Nepetæ genuinæ ramulum, & Calamintham tertiam Dioscoridis, hic expressimus ex Dalechampio. Ac secundæ quidem pullegio similis foliis & albis notulis signatis delineatio, satis ex supradictis perspicua est. Tertiam verò sic descripsit. Nascitur ferè sub sepibus, in locis editis & pinguibus: radicibus multis, tenuibus, subnigris: caulibus tribus aut quatuor nonnunquam pluribus, quadrangulis, rubris, villosis, cubitalibus: foliis primæ Calaminthes, sed longioribus, & ad menthastrum accedentibus, per interualla binis, lanuginosis, ex quorum alis interdum foliosi surculi prodeunt. In caulium vertice, & eorūdem discretis spatiis verticillatim congeries, vt in Prasio, asperæ & hirtæ, ex quibus flos exit, non conferim, sed vicissim oblongus, supernè latus infernè angustus, nitidi ruboris. Gustus plantæ totius amarus principio, tandem subacer: odor grauis & ignauus. Omnium Calamintharum folia, auctore Dioscoride, gustu feruentia admodum & acria sunt: radix inutilis. Pota aut illita folia demorsis à serpente opitulantur. Decoctum potum vrinas & menses pellit. Ruptis, conuulsis, orthopnææ, torminibus, cholera, rigoribusque auxiliatur: præsumpta in vino venenis resistit. Regiū morbū expurgat. Lumbricos & ascaridas cū sale & melle pota enecat. Nec secus cruda cocta; & trita, elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis bibatur. Folia trita & apposita menses ducunt, & fetus interimunt. Accensa aut substrata serpentes fugant: nigris cicatricibus candorem reddunt in vino cocta & illita: sugillata tollunt. Ischiadicis imponitur, vt humorem ex alto euocet, meatūque transmutet summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus. Quæ omnia distinctiùs & fusiùs declarat Galenus his verbis. Calamintha essentia est tenui, & calida sicca; temperie, tertio quodammodo ordine vtraque qualitate. Horum manifesta sunt indicia partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris, & palam

Maghi, in  
ca. 121. li. 2.

Lib. 3. c. 36.  
Vires &  
Temper.

Li. 7. simpl.



tam ipsa per sese sicca, tum etiā cum melierato, perspicuè calfacit, & sudores ciet, omneq; corpus tum digerit, tum exsiccat. Ea ratione ducti quidā contra corporis concussiones, rigoresque per circuitū repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo incoctum toti corpori inungentes cum frictione non segni, intro verò assumētes, sicut dictum est. Quinetiam & coxēdicibus eam quidam in ægitudinibus ischiadicis tanquam strenuum remedium illinunt: trahit enim quæ in profundo hærent ad superficiem, totumq; articulū exalfacit, cutemq; nō obscure adurit, mentesq; tum epota, tum apposita admodum efficaciter prouocat. Bonū etiam est elephantiorū remediū, non eō tantum quòd strenuè tenuēs humores digerat, verū etiam quòd extenuet & incidat valenter crassos, qui talem morbū procreant. Sic & cicatricibus atris colorē reddit, & sugillata digerit. Præstat autē in huiusmodi, vbi in vino ipsam decoxerimus, emplastri ritu imponere, & viridem magis quā ficcā. Quippe arefacta vehementior redditur, & ad vrendum promptior. Porro talis cum sit ad venenatarum bestiarum morsus assumitur, velut etiam cauteria, & quæcūque medicamenta calida sunt, & acria, tenuiumq; partium, quæq; facili ex alto ad sese circumiacentem omnem humiditatem possunt attrahere. Ceterū, quæ illi inest amaritudo, planè exigua est, verū ad quædam tam efficax, quā quæ valentissima, nimirū cum coniuncta sit vehementi calori cum tenui essentia. Quare & ascaridas & lumbricos succus eius aut infusus aut epotus necat. Eadem ratione aurium vermes, aut si alicubi in corporis parte sinuosa aut rugosa quæ putredine tenetur, talis prouenerit affectus. Sic conceptum seu pota, seu admota interimit & elicit. Igitur incidendi quidem ei vis inest propter calorem eius, tenuitatem, & amaritudinem, abstergerendi verò propter vnicā amaritudinē. Itaque asthmaticis ob omnia antedicta prodest: ictericis verò potissimū ob amaritudinē, sicut omnia ferè alia amara, vtpotè abstergentia & expurgantia in iocinore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

## CATTARIA.

## CAP. XIII.

Nomina

HERBA Felix, Matthioli.



Genera.

Forma.

**Q**UÆ Cattaria, siue Mentha catti vulgò dicitur, Gallis l'Herbe au chat, Italis Gattaria, siue Herba Gatta, Germanis Katzenmuntz, Nepeta non est antiquorum, neque alia calamintha species, sed veluti inter calaminthā & melissam, antiquis fortè ignorata, tamen præstans viribus. Cattariā verò plebs vocauit peramœni spectaculi argumento. Vix dum enim conspectam vbi olfecerit Cattus, amplexatus & discussatus fuerit, lasciuiedoq; illi iam accedēdo, iam recedendo sese vtriusq; pedibus diu & multum affricuerit, colludendo tādē miris gestulationibus vniuersam auidē ligurit: sed auidiūs si ea ex agris in hortos fuerit translata: tenerior enim tunc est, odorēque non perinde vehementi. Est enim hortensis & agrestis, ambæ similes, caulibus quadratis, numerosis, rectis, incanis. Foliis per interualla binis, incanis, melissæ aut marrubij æqualibus, mollibus & subcandicantibus, præsertim aversa parte: floribus intra & circum superiorum foliorum exortus



*MENTHA* *Cattaria*  
*Peregrina latifolia, Lobel.*



*MENTHA* *Cattaria*  
*angustifolia, Lobelij.*



exortus ramulos ambientibus, & extrema spica caudata decorantibus, mentha aut menthaltri radicebus multifidis & fibratis. Nascitur in agrorum marginibus, secus vias, vliginosis etiam solo quemadmodum menthaltrum. Mentha duplicem peregrinam hic ex Lobellio proponimus, Latifoliam & Angustifoliam. Priori folia Cretici marrubij proxima, incana, flores candidi, copiosi Cattaria vulgaris, verticillatim caulem etiam quadratum ambientes, multis concavum alis, eiusque summum decorantes. Magis intensus eius odor, granior vires etiam aciores quam Cattariae. Altera distaxat angustioribus minoribusq; foliis variat, alioqui re ipsa vna & eadem quae superior. Vtraque semine Hispano lata. Strenue excalfacit & attenuat. Quare valet ad omnes capitis, pectoris, ventriculi, & vteri morbos, a pituitosis excrementis aut flatu genitos. Ideo diurno capitis dolore affectis, vertiginosis, veteriosis, stupidis, resolutis, convulsis, comitialibus, asthmaticis & suspitionis auxiliatur. Item medetur ventriculi torminibus a flatu provenientibus. Tota planta mentes elicit tam pota, quam in despressionibus addita. Eius usus steriles reddit foecundas, si sterilitatis frigiditas humiditasq; causa sit: valenter enim vterum excalfacit. Succus naribus infusus pituita copiam expurgat & visum acuit.

*Locus.*

*Temper.*  
*& Vires.*  
Menth. in  
cap. lib. 3.

*SCORDIVM.*

*CAP. XIII.*

**S**ΚΟΡΔΙΟΝ Græcis, Latinis Trixago palustris, Plinio Scordotis, Officinis ferè incognita, Germanis allusione quadam ad Romanam appellationem aptè *Uvasser Batenig* nominatur, Gallis *Scordion* & *Chamarraz*. Scordium autem à Græcis dictum fuit ab alliis, quia folia eius affricata alliij, quod Græcis σκόρδον vocatur, odorem referunt. Ab eodem mali & ingrati odoris sensu iisdem etiam δισκοριον appellata fuit. Ut verò palustris trixago dicta sit, tum similitudo fecit, tum natalium locus, Trixagini enim quæ Græcis chamædrys dicitur, similis est, & in humentibus ac palustribus locis nascitur. Scordium, ut depinxit Dioscorides, folia chamædryj similia habet, maiora tamen, nec sic in ambitu incisa, odore aliquantum alliium referentia, gustu adstringentia & amara, caules

*Nomina*

*Forma.*



Lib. 25. c. 6.

quadrangulos, in quibus flos subrubescens. Lenæus apud Plinium Mithridati ipsum adscripsit his verbis. Ipsi Mithridati Crateuas adscripsit vnam Mithridation vocatam. Et mox, Alteram Lenæus Scordotim siue Scordiū, ipsius manu adscriptam, magnitudine cubitali, quadrangulo caule, ramosam, quercus similitudine,

SCORDIVM, *Matthioli.*Pena fol.  
210.

Li. 1. Antid.



Lib. 4. c. 108.

Temper.

Vires

Li. 1. Antid.

Li. 8. simpl.

ne, foliis lanuginosis. Reperitur in Pōto campis pinguibus, humidisque, gustus amari. Hæc Plinius. Quod dicit quercus similitudine, de chamædri accipiendum videtur, cuius similia esse Scordij folia Dioscorides dixit, chamædryos autem quercū. Hæc herba tum allij retro odore, tum alexipharmaca vi apud veteres celebris, patrum nostrorum memoria Medicis & Sepalsariis ignota fuit, ei tam salutari atque omnibus putridis marcoribus, vt Galenus ait, aduersanti, siluestre allium substituentibus. In hunc autem errorem incidisse tum vicinitate nominū deceptos, quia Scordium à Scorodo, quod Græcis allium significat, non distinguerent, tum interpretis Auicennæ imperitia constat, qui in altera theriacæ compositione Scordium, in altera siluestre allium indiderit, quæ interpretatio fecit, vt Scordium & siluestre allium nihil inter se differre existimarint. Hodie verò recentiorum & peritiorum herbariorum opera omnibus verum innotuit, quod hîc pictum est, nec aliud in theriacos pastillos inferendum, iis nimirum viribus præditum quas

Dioscorides illi assignat his verbis. Calfaciendi vim habet, vrinam cit. Viride tritum & aridum cum vino decoctum contra serpentium morsus & venena letalia bibitur. Ad stomachi rosiones, dysenteriam, & vrinæ difficultatem pondere duarum drachmarum cum hydromelite. Purgat crassa, & purulenta è thorace. Facit ad veterem tussim, rupta, conuulsa cum nasturtio, melle, & resina in eclignate aridum commixtum. Hypochondriorum vetustas inflammationes cerato exceptū lenit. Succurrit podagris cum acri aceto circumlitum, aut ex aqua illitum. Menfes suppositum mouet, vulnera glutinat, vetusta vlcera purgat, & cum melle ad cicatricem perducit. Siccaturum carnem excrescentem reprimat. Succus præterea ex eo expressus ad prædicta vitia bibitur. Galenus tradidit scriptum esse à viris grauissimis, cum in bello interemptorū cadauera multos dies insepulta iacuisent, quæcumque supra Scordium fortè fortuna ceciderant, multo minùs aliis cōputruisse, ea præsertim parte qua herbam contigerant. Ob quā rem omnibus sanè persuasum est, tam putrefacientibus animalium venenis, quā medicamentorum deleteriis Scordiū aduersari. Præterea alibi de facultatibus scribens, ex diuersis tum saporibus, tum facultatibus ait constare. Nam amarum quid obrinet, & acerbū & acre, maximè Scorodo, hoc est, allio similis eius acrimonia, vnde sanè nomenclaturam sortitū est. Expurgat igitur, simulq; excalfacit viscera, tum menses vrinamq; mouet. Præterea conuulsa ruptaq; & laterū dolores ab obstructione & frigore natos sanat epotū. Deniq; viride quidē illitū magna vulnera cōglutinat, sed sordida purgat, & maligna ad cicatricē ducit, illitum aridū. Scordiū alterū Plinij quidam volunt esse Saluiam agrestem, quā Dodonæus facit Sphacelum Theophrasti, Cordus Scordianam vocat. De hac egimus capite secundo libri huius.

ILLIA



## ALLIARIA.

## CAP. XV.



T odore non ita facie nec facultatibus planta hæc scordium æmula-  
tur, quod folia eius trita ingratum ac planè Alliatum odorē referant,  
Alliaris siue alliaria dicta, à Pandectario. Pes asini, à Gallis *l'Herbe* *Nomina*  
*aux aulx*, à Dioscoride fortasse præterita. Propter sepes & in agrorū *Locus.*  
marginibus passim nascitur, foliis cum primū erumpunt, subrotundis, violæ si-  
militudine, aliquantō tamen maioribus, quæ cum adoleuerint in angulos exeunt,  
per ambitum serrata, melissophylli aut vrticæ quadamtenus similia, sed leuiora, *Forma.*  
nec ita rugosa, & à pediculo latiora, quæ digitorum attritu gustatūq; Allij odorem  
& saporem reddunt. Caulem profert bicubitalem, rotundum, flores albos, semen  
nigrum, minutum, tenuibus siliquis inclusum, radix alba, longiuscula, eiusdem  
cum foliis odoris. Huius plantæ delineationem non pessimè quadrare Plinij Ale-  
ctorolopho scribit Pena, quippe folia per initia circinata, hederæ terrestris, lon- *Fol. 228.*  
giora, altiusq; serrata euadunt, fimbriata, acutis in ambitu denticulis, tota planta

ALLIARIA, Matthioli.



ALLIARIA, Dodonæi.



vrticam referente, præterquàm siliquis, napi semine plenis nigricante, ut vult Pli- *Lib. 27. c. 5.*  
nius. Flores multi, albidī, irionis: alba radix multos caules bicubitales fundens.  
Tota gustu calidiusculo, humente, meliorēque odore & gratiore quàm Allij: quo  
fit ut mulierculæ, præsertim Angliæ, folia succulenta tula, fassamentis & intincti-  
bus frequenter misceant, multum ad incolumitatem annuam tuendam primo ve-  
re commedantes. Erysimum aut erucam facultate refert: quare tussientibus pro-  
derit, ut placet Plinio, de cuius Alectorolopho alibi diximus. Ex huius vi calfa-  
dioria & exsiccatoria colligi potest, crassos illam humores extenuare, & lentos in-  
cidere. Aiunt semen emplastri modo impositum, vuluæq; admotum mulieres vte-  
ri strangulatione oppressas liberare, & excitare.

ACINVS



**Nomina**Li. 21. ca. 15.  
& 27.

Lib. 7. hist.

cap. 8.

Lib. 21. c. 15.

**Forma.**

Lib. 3. c. 43.

Lib. 21. c. 27.

Lib. 3. c. 36.

Lib. 2. c. 60.

De flor. ca.

85.

**D**IOSCORIDI *ἀκινός* vel *ἀκινός* herba dicitur, item Plinio Acinos atque etiam epipetron, quam nunquam florere scripsit. Vnde suspitio oritur Acinon eandem esse, quæ in Theophrasto epimetron deprauatè pro epipetrō (Acini enim nulla apud eum mentio) nominatur his verbis *ἐντα δὲ καὶ ὁ λωγὸς ἀκινὸν, καὶ θάπτει καὶ δ' ἐπιπείρον*. Id est, quædam omnino non florent, quemadmodum epipetron: quæ sic transtulit Plinius. Acinos quam epipetron vocant, quæ nunquam floret. Censent tamen peritiores eas, duas & diuersas esse, ac sic legendum: Acinos: & quam Epipetron vocant, &c. Ex quibus conicias Acynon per, y, legendum esse, id est *ἀκον* sterilem. Est autem Acynos auctore Dioscoride, herba tenuium furculorum, coronaria, ocimo similis, sed hirsutior & odorata. A quibusdam in hortis colitur. Plinius eadem ferè tradit. Acinum & coronarum causa & ciborum Ægyptij ferunt: eademq; erat quæ ocimum, nisi hirsutior ramis ac foliis esset, & admodum odorata. Hanc à quibusdam siluestre basilicum dici scripsit Ruellius, Latinis ocimastrum, Gallis *Basilic sauvage*. Dodonæus eandem plantam ocimastrum nomine descripsit & depinxit. Et certè non solum persimilis, sed etiam congener ocimo videtur Acinos, vt verè ocimum siluestre cenferi possit, etiam si obstat mutila historia, si codex integer est, quæ illi flores adimit, quos inesse Dioscorides non negat. Quare fieri potuit, vt quod Plinio in Bechio, & Dioscoridi in Dictamnō contigit, idem vfluenerit Plinio, nempe vt nullum agnosceret florem in Acyno: quæ si coronaria fuit, verisimilius est flores habuisse. Sed quemadmodum Bechio & petasitidi, quia præproperè florent, & citissime deflorescunt, deesse florem quidam putarunt, sic fortè Acino, quia obscurius & serius flores promit, ac sæpius interdum cùm emerferunt amittit, intempestiua autumnii qualibet minima sæuitia, sicuti videre est in nonnullis pusillos &

ACINVS, Sive Clinopodium siluestre.



ACINVS, Matthioli.



ferotinos



ferotinos flores edentibus. Quare Acinos illa quam pinxit Lobellius, Pena descripsit, huic loco admodum congruam, flosculis purpureis, verticillatis, ramulis quadratis, siccis & exilibus, foliis hirsutis, lanuginosis, ocimi, multa secus sepes viuax fruticat, nonnihil aut perparum odora, gustanti multò sicciior quàm ocimum, tantillo odore subadstringente vt betonica. Eam infra pro Clinopodio primo Matthioli exhibuimus. Cum igitur iis quas diximus qualitatibus prædita sit, posse *Vires.* sistere menses, si ob partium imbecillitatem fluunt, posseq; igni sacro mederi perspicuum est, cum moderatè repellat digerendo, quas vires acyno Dioscorides assignauit. Aluum, inquit, & menses potu sistit. Panos & erysipelata imposita sanat. Contraria verò Plinius: Ciet, inquit, menses & vrinas. Dioscoridi Paulus assentitur scribens, Acynos ocimo similis mediocriter adstringendi vires habet: ideoq; aluum & menses pota sistit. Imposita verò panos & erysipelata persanat. Matthiolus ab aliis liberius dissentiens, reiecto ocimo siluestri, pro Acino calamentum illud inodorum viarum, ubiq; frequens, & contemptum, à Manardoiamdiu adductum, profert, illiq; sine vlla probatione præfert. At qui acrius, mēstruūq; ciendis aptum calamentum istud norit, neutiquam assentietur.

Li. 21. c. 27.  
Lib. 7.

Ca. 43. li. 3.

## ASARVM.

## CAP. XVII.

**A**ΣΑΡΟΝ Græcis & νάρδος ἀργία, Latinis Asarum, & Nardus siluestris, quibusdam vulgago, Arabibus *Asaron*, Italis *Asaro* & *Baccara*, Germanis *Hafeluurtz*, Hispanis *Asarabacchara*, Gallis *Cabaret*. Asarum autem vocitari dicit Plinius, quoniam in coronis non addatur, vel dici potuit quasi ἀσάριον quod in ornatum non veniat: aut velut *ἑς σφῆς*, idest, coronarum nexus ἕκ ἐλθόν: quibus refragatur Dioscorides scribens herbam esse *ὠάδι τετρανωμελῆν*, idest, odoratam coronariam: id quod plantæ ipsius natura confirmare videtur, cui semper virentia sunt folia, vitiles ramuli, flexiles pediculi, flores purpurei, odore nardi. Quare cum Asarum coronarium fuisse negat Plinius, intelligere potuit, inquit Pena, ex hac nullas aptari scopas lustrales verrennis, deorum aris, quales colligebantur ex verbenis, verbascis, & similibus comosis, & firmioribusq;. Asarum Dioscorides scribit folia habere hederæ, minora multò & rotundiora (Ruellius legit *μικρότερα*, antiquum exemplar *πικρότερα*, idest, densiora, utrobique deprauatè: etenim Asari folia, neque densiora, neque minora sunt hederæ foliis: quare *μαλακότερα* legendum censet Fuchsius, idest, molliora: quod partim Plinij testimonio, partim ipso iudice sensu comprobari potest) flores inter folia ad radicem purpureos, odoratos, hyoscyami cytino similes, in quibus semen Acino nō dissimile, radices multas, geniculatas, tenues, obliquas, graminis similes, longè tamen graciliores, odoratas, calfacientes, & linguam vehementer mordentes. In montibus vmbrosis prouenit, sed plurimùm in Ponto, Phrygia, Illyrico, & Italia Iustinensi agro. Breuius sic Plinius. Nardi vim habet & Asarum, quod & ipsum aliqui siluestre Nardum appellant. Est autem hederæ foliis rotundioribus tantum mollioribusq;, flore purpureo, radice Gallici nardi: semen acinosum, saporis calidi ac vinosi. Montibus in vmbrosis bis anno floret. Optimum in Ponto, proximum in Phrygia, tertium in Illyrico. Foditur cum folia mittere incipit, & in sole siccatur, celeriter situm sentiens ac senescens. Istud Asarum plantam esse omnibus Officinis Asari nomine notam nullus ambigit. De eo verò frustra rixantur recentes quidā rei herbariæ scriptores Baccar siue Baccarem, & Asarum à Plinio, & Baccaram siue Baccarem & Asarum à seplasiariis pro eodem haberi, atque ab illis & nomina & res ipsas confundi. Sed illi nominum affinitate falluntur. Nam Baccar si Plinio sit Asarum, & Baccara, Baccarus, Baccaris Officinarum, atque etiam Italarum, Hispanorumq; *Baccara*, & Gallorū *Cabaret*, leuiuscula metathesi à

*Nomina*

Lib. 21. c. 6.

Lib. 1. ca. 9.

Fol. 262.

Lib. 1. ca. 9.

*Forma.*

Cap. 3. hist.

*Locus.*

Lib. 12. c. 13.

HH



Lib. 3. c. 43.

Fol. 261.

Temper.  
et Vires  
Lib. 1. c. 9.

Lib. 2. c. 19.

Lib. 2. c. 22.

Cap. 9. lii.

Li. 6. simpl.

Lib. 7.



Baccara deductum, & scriptura dissimilitudine & re differt ab herba, quæ Dioscoridi *Βάχχαρις*, Latinis Baccharis dicitur. Consimilis error est in Cassia, quæ *κασιόλη* est Græcorum cum duplici sigma: cum simplici verò, Cassia, herba est coronaria, cuius meminit Vergilius. Hæc autem nominum similitudo diligenter animaduertenda & distinguenda est, ne fraudi sit nostræ cognitioni. Asarum verò Baccaram siue Baccharum fortè vocatum putat Petrus Pe. quod exiguis vaccis aut vacciniis lagenulas similes ferat: illam alteram *Βάχχαρον* siue *πύρχαρον* propter odoris commendationem. Asari vires nunc propius inspiciendæ: vis est Asaro calfactoria, auctore Dioscoride, & vrinæ ciens, conueniens hydropicis & coxendicæ morbo diuturno: radices cum aqua multa potæ pondere drachmarum sex ducunt menses, & veratri albi modo purgant. Asarum, inquit Plinius, iocinorum vitiis salutare esse traditur, vicia sumptum in hemina multi misti. Aluum purgat ellebori modo. Hydropicis prodest &

præcordiis, vuluisq; ac morbo regio. In mustum si addatur, facit vinum vrinis ciendis. Eiusdem inter medicamenta purgantia meminit Mesues his verbis. Asarum calidum est secundo, siccum tertio ordine. Tenuat, resoluit, obstructa aperit hepatis, lienis, & horum duritiem soluit, & affectus alios inde natos, febres putridas, & diurnas, icterum, hydropem præsertim vino infusum. Purgat vomitu & deiectione & vrinis bilem, sed pituitam manifestius, etiam ex ilibus, ischio, & aliis articulis: ob id harum partium dolores mitigat præsertim infusum, vel aliter exhibitum. Oleum Asari cum ladano spinæ illitum sudores mouet, & rigorem febrem inhibet: vrinæ mouet, semen augeat. Valentiùs agit cum sero lactis, spica, & hydromelite. Mustum his radicibus conditum post tertium mensem hydropas & splenem sanat. Mediocriter coqui & teri potest: quò tenuiùs est tritum, eò magis vrinæ mouet, minus autè, aluum ducit. Datur infuso ab aureis duobus ad drachmas quatuor: puluere autem à drachma vna ad aureos duos. Hæc Mesues. A quo fortasse edocti in Germania rustici inquit Matthiolus, tertianam febrem & quartanam curant, epoto Asari ex vino decocto, melle, maci, cinnamomo, & id genus aromaticis additis. Bibunt enim huius decocti calidi cyathum vnum, alij quotidie, alij alternis diebus, & sic aluum subducunt, quandoque bilem aut pituitam vomitionibus reddunt: accedere autem paroxysmo dorsi spinam, & plantas pedum inungunt oleo calido, in quo Asarum diu fuerit insolutum: deinde in lecto se componunt calido: sic enim horror minuitur, & sudor copiosus funditur. Ab his omnibus dissentit Galenus, scribens Asari radices viles esse, facultate similes radicibus acori, intensiore tamen, itaque ex his quæ de illis dicta sunt huius faciendam coniecturam. Eum secutus Paulus, ait Asarum similem acoro vim habere, sed magis intensam. At cum nulla acori radicibus purgandi facultas insit, & Asarum, Dioscoride & Mesue auctoribus, quotidiana etiam experientia suffragante, veratri modo purget, & bilem pituitamq; infernè ac supernè propellat, permirum sanè cur acori facultatibus Asari vires, Galenus & Paulus comparauerint. Asaro congenerem plantam scribit Matthiolus in Bohemiæ montibus nasci, quam ideo Asarinam





Asarinam vocat. Repit humi, folio Afaro rotundiore ac scabriore, leuiter in ambitu serrato: cauliculis villosis, floribus melinis Anthemidis modo, sed longè minoribus, non inodoris. Radices habet tenues, longas, per summa terræ repentes, acri gustu cum leuiscula amaritudine: id quod calidum siccumq; earum temperamentum esse indicat. Vim habet abstergendi modicā, sed attenuandi incidendi aperiendi maiorē. Pota drachmæ pondere ex mulso vel oxymelite aluū exoluit, ducitq; crassam pituitam & atros humores. Datur vtiliter hydropicis & regio morbo laborantibus. Sunt qui comitialibus & resolutis propinent, aut herbam per se aut eius decoctum. Cit vrinam & menses: vermes intestinorum necat. Legitur autumnno, & siccatur in vmbra cum radicibus. Aliam Asarinam sterilis Seu enæ Narbonensis agri ostendit Lobellius, cuius folia & flores dilutè purpurascens hederæ terrestri conueniunt, sed maiores & longiores. Rupibus & cautibus Veginio conterminis Seu enæ oritur. Cit vrinam.

BACCHARIS.

CAP. XVIII.

**H**XTAT apud Dioscoridem, Paulum, Oribasium ab asaro seorsum tradita Baccharis, aut *πάγχαις*, sic dicta, vt libenter credit Pena, propter eximiam fragrantia gratiam in radice cinnamomum redolente ex qua cum multa alia, tum vnguentum conficiebant, etiam Baccharis apud Comicos nominatum, auctore Athenæo. Galenus quidem in simplicibus Baccharim præterit, sed in Glossis Hippocraticis *βάκχαρον λυδίων τι μύρον* exponit. Vsurpat id Hippocrates, *καὶ παρθέσθω βάκχαρον, ἢ ἔλαιον λευκόν*. Baccharis autem, vt describit Dioscorides, plāta est odorata, coronaria, cuius folia aspera sunt, magnitudine inter violam & verbascum media: caulis angulosus, cubitalis, subasper, adnatas propagines habens: flores purpurei, albicantes, odorati, radices veratro nigro similes, odore cinnamomo proximo. Asperum squallidumq; solum amat. Oribasius iisdem planè verbis descripsit. Eandem herbam Baccharim etiam Vergilius, ex qua ferra & coronæ texebantur ranquam *ἀπὸ τρυφαιῶν* fascini ex nimia

Nomina

Lib. 15.

Lib. de nat. mulieb.

Lib. 3. c. 44.

Forma.

Locus.

Lib. 11.



Elog. 3. 7.

laude. Sic enim canit.

*At si ultra placitum laudarit, Baccharē frontem  
Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.*

Lib. 21. c. 6.

In Aduerf.

Ibidem:

Quare vehemēter errant qui Dioscoridis caput de Baccharē spurium, atque ideo expungendum censent, frustra; probare nituntur Baccharē & asarum eādem esse plantam, quia quæ de Baccharē diximus ex capite de asaro exscripta sint, ut vtriusque descriptio paucis quæ irrepsere demptis, eadem sit. Huius erroris causam quamvis superiore capite declarauerimus, tamen hinc euidētiōr omnibus esse potest, quod asaro folia sint hedere, multo molliora, calfactoriam vim habentia, vrinam cientia, vetusto coxendicum dolori vtilia: Bacchari media inter violā, putā nigram, & verbascum, aspera, adstringentia, inflammationibus & erysipellatis conuenientia, somnifero odore: radices huic veratro nigro similes, cinnamomi odore: illi geniculatæ, gramine proximæ, longè tamen graciliores. Adhæc asarum in vmbrosis montibus, Baccharis in aspero squallidoque solo provenit. Non parum etiam discrepant Plinio auctore, Bacchar quoque, inquit, radicis tantū odorata est, à quibusdā nardum rusticum appellatum. Vnguenta ex ea radice fieri solita apud antiquos, Aristophanes prisce comædiæ Poëta testis est. Vnde quidam errore falso barbaricam eam appellabant. Odor est ei cinnamomo proximus. Gracili solo nec humido provenit. Et mox. Sed eorum quoque error corrigendus est, qui Bacchar, rusticum nardum appellauēre. Est enim alia herba sic cognominata, quā Græci asaron vocant, cuius speciem figuramque diximus in nardi generibus. Quinimo asarum inuenio vocitari, quoniam in coronas non additur. Cum igitur Baccharis peculiaris quædam herba sit ab asaro diuersa, quæ nam ea sit nūc inquirendum. Leoniceus & eum secutus Brasauolus Baccharin esse putant plantam illam quam herbarij Sclaream siue Scarleam vocant, alij Matrifaluam. Hos reprehendit Matthiolus, eorūque Bacchari aliam substituit in Romanis agris nascentem ab Andrea Lacu. missam, quam pro vera & genuina ab eo pictam hīc exhibemus. Sed ne hanc quidem pro legitima habent Pena & Lobellius: quinimo

BACCHARIS, Matthioli.



hanc verbascum odoratum esse censent, cui interdum flores lutei, interdū purpurei ut blattariæ. Romæque cum valde is cupidus & fretus fide Matthioli complures sciscitaretur rei herbariæ peritos, nihil aliud esse quā verbascum respondisse affirmat. Quare aliam is adfert, eamque omnium maxime descriptioni Dioscoridis conuenientem, quam olim Barbarorū doctissimi genuinam putabant: multo enim propius quā illam Matthioli speciem verbasci odorati, ad Baccharē accedere certum esse. Etenim fruticosa est, appendicibus multis, foliis asperis, nigricantibus, primulæ veris, vel saluæ latifoliæ magnitudine, caule bicubitali, floribus purpura obsoleta glomeratis, in pappos abeuntibus cardui modo. Radix summo cespite spargitur, diffusis fibris, caryophyllatæ modo, cuius odorem præsentissimū habet, vel cinnamomi, cui contulerunt antiqui Baccharis radicem, qui caryophylla non nossent. Planta valde frequens, valdeque isto nomine nota circum Monspelium, & alibi non paucis locis.







STOECHAS, *Maritima.*

Lib. 2. c. 27.

Forma.

Li. 27. c. 12.

Folia.

STOECHAS *Capitulis foliatis.*


Vires.

Temper.

Lib. 3. c. 27.

Li. 27. c. 12.

Li. 3. simpl.

Li. 2. med.  
pur. cap. 13.

gniores vires eidē assignat. Tenuat, inquit, terget, purgat, resoluit, aperit hepatis & lienis, & aliorum viscerum obstructa, putredinē prohibet, omnes internas partium intemperies, præsertim cum materia, corrigit: cerebrū, nervos, cor, & alia viscera, partēq; omnes internas vi parum adstringere roborat. Purgat autē bilem atram, & pituitam etiam ex cerebro, nervis, & sensuum instrumentis, easq; partes roborat: omnibus frigidis affectibus est salubris, foru, balneo, poru. Oleū quoq; Stœchadis cerebrum

inde abstinet, sed è regione Olibæ sita sunt, vulgo *Hyre*, oppidulo olim tam lauto quam nobili, à quo etiam hodie insula Stœchades nomen retinent. Stœchadem breuiter perstrinxit Dioscorides. Herba est, inquit, tenuibus furculis similem thymo comam habens, sed longiore folio, gustu æris, & quodāmodo subamara. Breuius sic Plinius. Stœchas est odorata herba, coma hyssopi, amara gustu. Eam sic fusiùs & clarius delineauit Pena. Ex radice lignosiore cauliculos emittit cubitales, & sesquicubitales, lignotos, in quibus foliola oblonga, saturiæ hortēsis, longiora, albicantia, incana, angustiora & minora quàm lauandulæ, aut rosmarini coronarij: capitula spicata in summis virgis, thymi Cretensis, sed maiora, è quibus flores purpurei aut è cæruleo purpurei exeunt, summis capitulis eminent foliola, siue quædam veluti membranæ ligulæ cæruleæ aut purpureæ, interdum admodum longa, sæpius breviores, præsertim in Hispania. Et summi cauliculi interdum foliis stipantur in Gallia Narbonensi, interdum nudi cōspiciuntur. Semen subfuscul, vrticæ, aut lauandulæ. Non solū Stœchades insulæ, sed etiam colles Narbonæ, asperiq; tractus Galloprovinciæ tãto prouentu Stœchade simul & spica lauandulæ, thymo, & saturiæ a duriore scatent, vt etiam clibanis calfaciendis satis suppetant. Stœchadis decoctum auctore Dioscoride, hyssopi modo ad pectoris vitia efficax est. Antidotis commodè miscetur. Liberat ab obstructione, attenuat, extergit, & corroborat viscera omnia, & totum animantis habitū. Menses ciet potu, inquit Plinius, pectoris dolores leuat. Antidotis quoq; miscetur. Qua de re distinctius hæc Galenus. Stœchadis gustu quidē qualitas amara est, & mediocriter subadstringens. Caterum temperies cōposita, nempe ex terrena essentia frigida, exigua, vnde sanè adstringit, & extenuata altera terrena copiosiore, à qua amara est: ob vtrorumq; verò conuenientiam & coitum, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; tū viscera omnia, tum totum corpus ea potest. Mesues plures & insi-



cerebrū & nervos calfaciēdo, cū vitā illis restituit. Sumpta stœchas cum scilla, vel aceto scillite, epilepsia & vertiginē iuuat. Cum lapide cyaneo aut sale indo, aut aliis valentibus, cōfert melācholicis affectibus, quibus timor & mœror comes adest. Cū succo buglosi aut pomorū dulciū, affectus cordis melācholicos iuuat: dolorē neruorū, articulorū, musculorū sedat quouis modo adhibita: suffitu nariū obstructiōnē expedit. Syrupō vel alia forma stœchas sumpta, quartanis & reliquis diuturnis febribus pręsertim pituitosis succurrit. Calidis, siccis, biliosis, pręsertim quibus multa bilis flaua in vētriculo redūdat est noxia, quia turbat vētriculū, & sitim, vomitū, ardorēq; molestū excitat: ac quoniā imbecillius purgat, ipsi additur pars sexta salis cōmunis & salis gemmarum: additur & myrobalanus nigra, aut capula, vt valētior fiat eius vacuatio itē scilla, pręcipuē in capitis affectibus. Eadē sero lactis macerata, vel incocta fit potētior: cum vino autē, passis purgatis, succo pomarū dulciū cocta innocētior. Oleum vetus stœchade & pauca spica imbutum est magnarum virium. Pars stœchadis potior flos, paucam decoctionem sustinet, longiorem verō eius folia floribus ignobiliora. Potatur stœchadis decoctum ab vnciis quinque ad vncias septem: puluis autem à drachmis tribus ad drachmas quinque.

## LAVANDULA. CAP. XX.



DORATA & coronaria stirps quæ Officinis & vulgò herbariorum *Nomina*  
Lauandula siue Lauendula, politioribus *Pseudonardos* Græcè, & Pseudonardus Latine dicitur, quod non sit vera nardus, cuius Dioscorides, & alij veteres meminerunt, Italis *Lauanda*, Gallis *Lauande*, Germanis, *Lauander*. Lauandula autem nominata est, quod balneis & hominum laua-

LAVANDULA, *Femina*.

cris expetatur, elotāque omnia, si permisceatur, odoris suauitate commender. Hanc duplicem statuunt pseudonardum siue lauandulam: marem, quæ & spica à spicatis floribus, & Nardus Italica nuncupatur, Italis *Spigo*, Gallis *Aspic*. Pseudonardum feminam quæ lauandula vulgaris est, Gallis *Lauande femelle*. Hæc ramulos siue virgas profert tenues, quadrangulares, geniculatas, cubitales aut longiores, folia circa singula genicula bina, oblonga, carnosa, vtraque parte albicantia, rosmarini coronarij foliis multo longiora, latioraque, & in summo spicas oblongas, tenues, floribus refertas purpureis, aut ceruleis, interdum albis, benè odoratis, & odore caput replentibus: radices lignosas, in fibras diuisas. Huic simillima pseudonardus mas, siue spica à superiore differt, quod foliis sit maioribus, crassioribus, longioribus, & latioribus, stœchadis, fragrantia maiori, & grauiori, illa magis aromatico, & gratiore. Vtraque in Gallia Narbonensi & Hispania plerique montes & campi deserti referti sunt, in reliqua Gallia, Germania, & alibi in hortis seritur. Iunio & Iulio flores exiunt. Existimatur à quibusdam esse Cneorum album Theophrasti, & Higini Casia herba, odorata, cuius aliquoties meminit Verg. vt in Bucol. *Tempus.* Tum casia atque alijs intexens suauibus herbis.

*Mollia luteola pingit vaccinia caltha.*

Præter Lauandulas vulgares Clusius inuenit aliud genus rarum admodum & plañe nouum. Cubitali interdum assurgit altitudine, ramulis quadrangulis & hirsu-

HH 4





Temper.  
& Vires

tis, quos multifolia tenuiterque incisa ambiunt folia, lanuginosa, cinereque coloris, gustu acri & odore iucundo: flores in summis virgulis quadrangulis, nudis & lanuginosis, spicatum ut in Lauandula congesti, colore caruleo, odorati: spica autem aliquantulum contorta est, & in quatuor veluti versus aut ordines digesta, alia interdum ex alia nascens: radix dura, lignosa, multifida. Primum eam nascentem inuenit in colle quodam Malacæ vicino, Februario mense florentem: deinde circa Murciam Martio, nec alibi præterea. Odor multò mitior, neque ita caput ferit, uti Lauandulæ præsertim Spicæ. Quare credibile est eam non esse tanto calore præditam. Vtraque calida siccaque est ordine secundo absoluto, vel incipiente tertio, tenuium item partium, & ex multis æreis spirituosissq; partibus constat. Quare frigidis capitis morbis quouis modo adhibita cõfert, iis præsertim qui non ex copioso humore, se ex sola potissimum qualitate originem ducunt. Proinde & stillicitius eius liquor odoratus, & temporibus & frõti illitus, catalepsi, leuiori hemiplexia, comitali morbo, & syncope laborantes reficit. Sed ubi humorum copia adest, præsertim sanguini permistorum, non satis tutus huius vsus est. Lauandula in vino cocta potaque vrinam & menses ciet, secundas & fœtum expellit. Datur decoctum ex solis floribus, aut cum cinnamomo, nuce moschata, & cariophyllis incoctis, vtiliter potandum cordis tremore, & morbo regio affectis. Lauandulæ fœminæ semen & folia affectibus matricis magis commendantur tum fotu infusione, tum pulueribus dilutis, intrò sumptis, ad suffocationem, ex ascensu putridi vaporis natam, & ad partus accelerandos.

## NARDVS,

## CAP. XXI.

Nomina

**N**ΑΡΔΟΣ & νάρδος ἄχνη Græcis, Nardum siue Nardus Latinis & Nardis pica, Auicennæ & Arabibus *Cembul*, id est, spica, & *Cembul Indis*, id est, *Spica Indica*. Quod corruptè Matthæus Siluaticus *Simibel* & *Sumbel* profert, Italis *Spigonardo*, Hispanis *Azumbar*, *Esfigasil*, Gallis *Aspic d'outre mer*. Dioscorides duo nardi genera esse tradit. Vnam Indicam, alteram Syriacam, & Indicæ aliam esse speciem quæ Gangitis nominatur à fluuio Gange apud quem nascitur montem, præterfluente. Est etiam quædam Sampharitica à loco sic dicta.

Lib. i. c. 3.  
Genera



dicta. Syriaca nardus appellata est, non quòd in Syria inueniatur, sed quòd montis in quo nascitur altera pars ad Syriam conuersa est, altera ad Indos. Hæc nardus Syriaca melior, quæ recens & leuis est, multas gerens comas flauis coloris, valde odorata, cyperum redolens, paruam habens spicam, saporis amari, & linguam resiccantis, quæ satis diu in sua odoris gratia permaneat. Indica gangitis viribus imbecillior, quòd in aquosis locis proueniat, procerior est plurisque spicas habet, ab una radice comosas, & circumplicatas, ac grauiter olentes. Indica verò montana odoratior est, spicis mutila, odore cyperi cæteris Syriacæ dotibus. Sampharitica valde mutila ac brevis, magnas spicas habet, & caulem medium aliquando candidiorem, hircinum virus supra modum redolentem, quam improbare oportet. De nardo aliter scripsit Plinius his verbis. De folio nardi plura dici par est, ut principali in vnguentis. Frutex est graui & crassa radice, sed breui ac nigra, fragillique, quamuis pingui, situm redolente, ut cyperi, aspero sapore, folio paruo densoque, cacumina in aristas se spargunt: ideo gemina dote spicas ac folia celebrant. Alterum eius genus apud Gangem nascens, damnatur in totum ozanitidis nomine, virum redolens. Et mox In nostro orbe proximè laudatur Syriacum, mox Gallicum, tertio loco Creticum, quod aliqui agrium vocant. Dioscorides radicis tantum Syriacæ & Indicæ nardi faciem & naturam exposuit, Sampharitici verò fruticis & caulis formam. Plinius fruticis radicem, folia, cacuminum aristas depinxit. Idem & Syriacam nardum in Syria nasci putauit, non ut Dioscorides ait, in montis Indicæ parte quæ ad Syriam flectitur: hoc enim absurdum videtur. Nam cum India à Syria longissimè distet, multaq; inter has interiectæ sint regiones, deserta Arabia, Persis, Carmania, Gedrosia, Darangia, aliaq; nonnullæ, qui fieri potest, ut mons ille ad Gangem situs, altera parte Syriam tam facilè respiciat, ut nardus in ea proueniens, Syriaca dici possit? Hanc ob causam Matthiolus eam potius à Syastene regione quæ ad Indum fluuium est dictam suspicatur, quàm à Syria. Nam, si Ptolemæo credimus, mons est in India, qui à Gange fluuiio ad Syastenem extenditur. Galenus non solum Syriacæ nardi, sed etiam Creticæ meminit. Pena asserit legitimam è plerisque locis Aegypti & Syriæ in Europam asferri, non modò radicem qualem Galenus vult, sed etiam alias distinctas partes, nimirum radicem, spicas comasve, festucas & folia ipsa. Ima radix Nardi, exili & arido stamine à radícula siue

Forma.

Lib. &amp; c. n.

In cap. 6.  
lib. 1.Lib. 8. sim.  
Lib. 9. c. 4.  
me. loc. In  
Aduers.

## SPICA NARDI,

Indica.



torulo exit, cui innituntur spicatae comae confertique glomi quasi per cirros, torulos, nucleosve distincti, & conflati capillamentis ut in Meo, è quorū spatiis mediis emergunt nonnulla iuncea folia, marinae algæ modo, tametsi minora multò. Hasc siccas inter ingentes fasciculorum strues se vidisse refert Venetiis in ædibus periti Pharmacopœi Alberti Martinelli ad Angeli symbolum idè Pena, & his similes à nonnullis aliis studiosis Lugduni fuisse animaduersas. Huic veræ nardo aliam, simillimam, tamen spuriam, Narbonensem subiungit, quæ Gangitis meritò cognominanda est. In Gallia Narbonensi, inquit, à Gange oppidulo septem plus minùs miliaria disitus est mons perquæ amœnus & celsus, herbarum præstantiorum feracissimus, cui idcirco vulgò nomen, Dei Paradisus, inditum. In eius cliuo quæ ad meridiem maris mediterraneum vergit, hæc vberi protuentu erumpit, muscosis & vdis tractibus, infima radix pusilla, exilibus fibris, duris & raris, quæ subsunt spicatis comosisq; torulis, minimum digitum crassis, colore pallefcentibus ex fusco, ferè palmum altis, non valde mucronatis, sed quadantenus


fol. 43.



## NARDVS SPVRIA

Narbonensis, Pena.

Cap. 33.



tenus per extrema recisis: folio est viridi, rigido, iunceo, vix pedem alto, numeroso, quod ab ima radice ortum trans spicam comam imum caulem ambientem sese exerit: multæq; plātæ quasi vno cespitis ambitu implexæ, vnius effigie præferunt. Tota inodora est præter capillamenta spicea, multò crassiora quàm Indicæ, odore mu- sci querni, vel terrestri. Garcias, in Aromaticum Indicorum historia, refert nardum Indis vocari *Cahzagara* nasci q; in Mandon & Chitor prouin- ciis, Regnis Delli, Bengala, & Decan vicinis, iux- ta fluuium Gangem, quem incolæ Ganga appel- lant. Præterea non esse diuersa nardi genera, sed vnicum duntaxat sibi notū esse nardi genus, id scilicet quod ex memoratis locis adfertur. Pro- uenire quidem in monte quodā qui altera par- te Orientem spectat, altera Occidentem, ad quē scilicet Occidentem sita est Syria, multis regio- nibus ab India discreta. Sed tamē multis aliis re- gionis locis satum provenire, nec facile sponte nasci, neque vnam præstantiorem esse altera, spi- camve habere aliā altera multò longiorem. Ra- dix, inquit, spargit supra solum breuem virgulā, siue caulem, circiter tres palmos longum, cum longissimis, atque alias insuper vir- gulas multò breuiore: in summa radice spicæ producuntur, item aliæ per virgulas. Tali enim modo venditur in Cambaiete, Asurate, & Gogua, aliisq; portubus ma- rinis, vnde mercatores Arabes & Persæ petunt, potissimā tamen partem ad indi- genis absumi ferunt. Inuenitur interdum sordida & puluerulenta, villis ipsius plā- tæ in pollinem redactis. Emitur tamen ab iisdem mercatoribus. Eo pulvere manus ablui Garcias intellexit. Hac vnica nardo, inquit ille, quæ iuxta Gangem nascitur, quamq; in Occidentem exportant, vtuntur medici tum Indici, tum Turci, Persæ, & Arabes. Nam quod ex ingenti pretio, quo antiquitus, teste Plinio, emebatur, colli- gere quidam volunt nostram nardum non esse legitimam, hîc Garcias respondet, Indias nunc magis apertas esse, regionēsq; aromata gignētes, longē cultiores quàm veterum tēpore fuerint, idē multò plura aromata, maioriq; copia, & multò mi- nùs adulterata ad nos adferri, viliusq; emi quàm antiquitus: in quorum numero nardum reponit, quæ legitima & sine mangonio ad nos importatur, licet interdū aut maris humore sibi ascito situm contrahat, aut senio suaueolentiam illam amittat, qua initio prædita fuit. Cæterum fabulosum esse omnino indicat, quod An- dreas Lacu. suis in Dioscoridem commentariis scribit nardi vsum apud Indos esse periculosum, quoniam ex ea fiat veneni quoddam genus mortiferum, quod non modò haustum, sed etiam cuti in sudoribus inspersum, hominem statim necat, id- que toxicum Pison vocari. Nam cum multis in India annis medicinam exercuerit, & non modò versatus sit cum omnis generis medicis Asiaticis, sed etiam Regibus & Principibus familiaris fuerit, nunquam tamen hoc Pison vidit, aut eius nomen audiit. Id genus quod *Sepulveda Satiach* aut *Satiach* appellat, id esse putat, quod ex Sa- tigua adfertur, celeberrimo regni Bengala portu, & emporio ad fluuij Gangis ostia. Hæc Garcias de nardo literis prodidit. Ex quibus & aliis suprà memoratis in- telligere licet nardum cuius vsum est in medicina, radicem tantum & non aliam plantæ partem, eiùsq; radicis partes spicas appellari, quas hîc Dioscorides *ῥάχυν* vocat

Lib. & ca.  
12.

Lib. 2. c. 146



vocat, in alij radicibus ex multis particulis coagmentatis *ῥίζας*, & *ἀγλαῖας*, Theophrastus *ῥήγεις*, Plinius nucleos, Columella *ῥίπας*, Græci item *ῥιζας* & *σπείλλινας* vocant. Id confirmat Galenus sic scribens. Iubet Andromachus adicere nardum Lib. I. Ant. Indicam, ea verò est quam *ῥίπαν* vocant, non quòd *ῥίπα* sit, radix etenim est, sed quod *ῥίπα* formam referat. Præterea hos de Philonio antidoto versus

*Et drachmam dictæ falsæ radicis, ab ipsa*

*Terra, pissæo quæ loue clara manet,*

fic declarat. *Quin & nardi drachmam coniiciendam iubet, quam radicem falsi nominis appellat, quoniam spica nardi nominatur.* Vult autem eam Creticam esse, quum ait *ab ipsa Terra, pissao que loue clara manet,* autem ibidem à matre Rhea, ne & ipse à patre Saturno deuoraretur. Apposuit autem loui epithetum Pissai, quemadmodum multi extra poetica vulgò dicere solent, per Aesculapium Pissai, quemadmodum multi extra poetica vulgò dicere solent, per Aesculapium Pergamenum, per Dianam Ephasiam, per Delphicum Apollinem. Quidam verò non Creticam terram, sed Indicam indicatam fuisse aiunt, ex qua ebur adfertur: ex hoc enim statum louis in Pissa factam fuisse. Iam verò de eiusdem temperamento & facultatibus scribens perspicue radicem nuncupat. Nardi spica, inquit, exaltat ordine primo, desiccatur secundo iam completo. Composita est ex adstringente mediocriter substantia, & acri calida non multa, & quadam leuiter amara. Ex his constat facultatibus radix, & ad iecur & ad stomachum non sine ratione conuenit tum pota, tum extrinsecus imposita. Vrinam ciens, morbus stomachi sanat. Venæ ac intestinis consistentes fluxiones desiccatur. Ad hæc & eas quæ in capite & thorace. Valentior est Indica, quæ nigrior est, quàm Syriaca. Nardus, auctore etiam Dioscoride, vim habet calfaciendi, siccandi, urinam ciendi. Quare pota aluum sistit, & fluxiones ex vtero, ac serenos humores apposita cohibet. Auxiliatur etiam nauis cum frigida aqua pota, & stomachi moribus, & inflationibus, item hepaticis, ictericis, & nephriticis. Aquæ verò incocta, & pro foru ad infellum adhibita vteri inflammationibus medetur. Valet etiam ad oculorum palpebras largo humore manantes, cilia adstringens, & densiora reddens. Humidis corporibus inspergitur. Misceatur & in antidota. Reponitur ad ocularia medicamenta in vase nouo non picato, in puluillum detrita, ac cum vino in pastillos coacta.

Lib 8 fm.  
Temper.  
& Vires.

NARDVS CELTICA.

C A P. XXII.

**N**ΑΡΔΟΣ *κελτικὴ* Græcè, Latine Nardus Celtica, & Nardus Gallica, aut potius hodie nuncupanda Ligustica, quòd, vt olim Dioscoridis tempore, ita nunc quoque in Liguria Alpibus nascitur, eodem teste patrio nomine Saliunca dicta: perperam enim in exculis codicibus ἀλίγχα pro σαλίγχα legitur, atque eo corruptius vbi scribit, ἡ νάρδος κελτικὴ ἢ ἐνι σερένῃ ἐχάλεσαν. Id est, aut nardo Celtica, quam serinen aliqui vocauerunt. Dubium enim nō est, quin σαλίγχα pro σερένῃ scripserit Dioscorides. Nam Scribonius de eiusdem veneni remediis scribens, saluncam habet. Adinuantur, inquit, iam lesi ab eo salunca, id est, nardo siluestri quamplurima ex vino sæpius data. Arabes *Cembul Kumim* vocant. Nardus hæc, vt describit Dioscorides, frutex est exiguus, qui vnà cum radicibus in fasciculos manuales colligitur. Folia habet oblōga, subfrœua, florem luteum. Cauliculorum & radicum duntaxat vsus est, & odoris suauitas: ideo pridie aqua respersis fasciculis, & terra separata, in paumeto humecto charta subiecta ipsos reponere oportet, postridie verò purgare: sic enim quod vtile est cum acetoso & alieno non excutitur, quia propter humorem firmum est. Secretus igitur caules ac radices, si reponere voles, tere, vino excipe, & digere in patillos.

*Nomina*

11b.1.c.7.

Lib. 2. mc.  
leta. ca. de  
pharico.

Cap 195.

Lib. i. c. 7.

Forma.



**NARDVS CELTICA,**  
Matthioli.

Lib. &amp; c. 12.

Locus.

In c. 7. lib. 1.

fol. 132.



**NARDVS CELTICA,**  
Alterea Pena.

fol. 132.



Lib. 1. c. 7.

Vires &amp;

Temper.

Rondeletius nardi Gallicæ speciem esse coniiciebat, ex cuius Mei; radicem decocto paratam potiunculam cuidam ex illo cœnobio dysuria laboranti cum dedisset, vrinæ copiam elicuit. Nardus celtica, vt tradit Dioscorides, eadem potest quæ Syriaca, magis tamen vrinam mouet, & stomacho vtilior est. Prodest etiam inflammationibus

pastillos, quos nouo testaceo vase diligenter operto serua. Optima est recens & odorata, multarum radicum, non facile fragilis, plena. Quædam horum Plinius habet. Ex iis Gallicū (suba-nardum) cum radice vellitur, abluiturq; vino. Siccatur in vmbra, alligatur fasciculis in charta, non multum ab Indico differens, Syriaco tantum leuius. Pretium xij. In his probatio vna, ne sint fragilia & arida potius, quam sicca, folia. Prouenit, vt ex Dioscoride diximus, in Liguria Alpibus, atque etiam in Istria. Hodie quoque in Genuensibus Liguria; alpinis non procul Sauona vrbe. Eiusdem magnus habetur proventus, auctore Matthiolo, in Stiria, Austria, Carinthia, vbi Indemburgenses rustici è suis montibus quotannis innumeros comportant saccos fasciculis plenos, quos mercatoribus vendunt, qui in Syriam & Aegyptum merces conuehūt, quod Siriis & Aegyptiis nardus hæc maxime expetatur ad balnea quibus frequenter vtuntur. Vera Celtica nardus ex Matthiolo hîc depicta est, cui similem depinxit & descripsit Pena his verbis. Pusilla herbula est, aliquantum proserpens, deinde se surrigens, cauliculo palmum & sesquipalmum alto, ad quem imum folia cespites summos conflant, exigua, tenuia, gnaphalii montani, aut gentianellæ minimæ, pallida & sublutea, infernè angusta, qua radiceis ceruicis squarosa, aut squamulis tuniceis obsita, spicatim digestæ innituntur, subter quæ multæ fibræ fusæ villosæq; propagines, asari odore, & modo, in terram sparguntur, gustu acri, subamaro aromatico, spicam nardi spirante. Aliam multo elegantior, & multo similiorem gentianæ cruciatæ foliis, à se repertam scribit Pena prope cœnobium quoddam inter Dei viridarium, & calcaris montes, in agro Narbonensi magni & vulgati nominis. Radice est valerianæ maioris, paulò minore, geniculis daronici modo distincta, humistrata, acri sapore, erodente, aromatico & amaro, nardi æmulo, foliis saponariæ vulgaris, flaccidis ex flauo pallescentibus, senis, septenis ve, gentianellæ adeò cognatis, vt primo intuitu eandem putes. Caulis cum maximus, cubitum altus, mediocris sesquipalmum: flore radiato, aureo, bupthalmi æmulo. Hanc



mationibus hepatis, & ictericis, & stomachi inflationibus cum absinthij decocto pota, item aduersum lienem, renum & vesicæ vitia, & venenatos ictus ex vino. Miscetur etiam in malagmata, & potiones ac vngueta calfacientia. De eiusdem viribus eadem ferè Plinius tradit. Cōtexemus & Gallici nardi remedia in hūc locum dilata in peregrinis arboribus. Ergo aduersus serpentes duabus drachmis in vino succurrit. Inflammationibus coli vel ex aqua, vel ex vino. Item iocinoris & renum, suffusisq; felle, & hydropicis per se & cum absinthio. Sistit purgationū muliebrum impetus. Nardus Gallica, inquit Galenus, Indicæ facultatibus quadantenus similis est, sed ad omnia imbecillior, præterquam ad prouocandā vrinam: siquidem calidior illis est, sed minùs adstringit. Haud dubium est quin hæc in Liguria alpibus vernacula voce saliunca dicta, sit illa quam hi Maronis versus innuunt,

Lib. 21. c. 20

Lib. 8. sim.

Eclo. 5.

*Puniceis humilis quantum saliunca rosetis,*

*Iudicio nostro tantum tibi cedit Amyntas.*

Quam etiam hodie Valesij *Selliga* vernaculè quasi saliuncam vocant. Quibus aduersari videtur Plinius, qui cum de nardi gallici virib<sup>9</sup>, quæ suprà citauimus, dixisset, aliquantò post, eodem tamen capite, Saliuncæ radix, inquit, in vino decocta sistit vomitiones, corroborat stomachum, tanquam saliunca sit à celtica nardo diuersa, quam etiā seorsum à nardo gallica depinxit his verbis. Saliunca foliosa quidem est, sed brevis, & quæ necti non possit, radici numerosa cohæret, herba veriùs quàm flos, densa veluti manu pressa, breuiterq; cespes sui generis. Pannonia hanc gignit, & Norici, Alpiumq; aprica: vrbum Eporrhedia, tantæ suauitatis, vt metallū esse cœperit. Vestibus interponi eam gratissimum. At Plinius diuersas apud diuersos auctores nomenclaturas secutus, de nardo celtica & saliunca diuersis locis tractauit, tamen omnia de vna & eadem nardo celtica intelligi debent, quæ etiam saliunca nominatur, cuius Pliniana delineatio nardo celticæ bellè quadrat. Quod verò dixit, tantæ suauitatis vt metallum esse cœperit, vix dicas quomodo accipiendum sit, & quomodo metallum esse cœperit, quidā tamen exponunt, propter odoris suauitatem metalli loco expeti, vel vt metallum conqueri, quasi non sit minoris indicaturæ & pretij. Verus Cornarij Plinianus codex habet, vt melatum esse cœperit, quæ lectio etiam si nihil nobis significet, corruptum tamen locum esse indicat, vt mel atticum esse cœperit legēdum esse Cornarius suspicetur. Mellis enim attici, inquit idem Plinius, in toto orbe summa laus existimatur. Quidam exponunt in vestigali & reditu publico censerī, non aliter quàm metalli fodina.

Petrus Pe. fol. 132.

Lib. 20. c. 7.

Embl. 7. lib. 1.

Lib. 21. c. 10

*HIRCVLVS, Veterum.*



*HIRCVLVS CAP. XXIII.*

**D**IOSCORIDES refert nardū celticam adulterari herba simili, quæ vnā cum ipsa euellitur, quā ob odoris grauitatē *τρεῖς* appellant, id est, hircum, sed facilis est dignotio. Est enim herba sine caule & candidior, & minùs oblonga folia habet, neq; radicem amaram, neq; aroma redolentem, quemadmodum vera nardus celtica habet. Idem prorsus Plinius tradidit. Cum Gallico nardo semper nascitur herba quæ Hirculus vocatur à grauitate odoris & similitudine, qua maximè

*Nomina  
Forma.*

Lib. & ca. 12.



adulteratur. Distat quod sine cauliculo est, & quod minoribus foliis, quodq; radicis neque amara, neq; odorata. Hactenus Plinius. Huius rarissima plantæ, & vix dum vlli visæ cognitionem Carolo Clusio cognitionem acceptam referre oportet, qui in suis Aromatum Indicorum historia à Garcia medico descriptæ versionibus eam depinxit, & descripsit his verbis. Antuerpiæ inter aliquot nardi celticæ fasciculos plantulas quasdam inueni, quæ adamsim quadrabant cum Dioscoridis Hirculo, quem describit, eoq; nardum celticam adulterari refert. Nam plantula est nardo celticæ similis, candidior tamen, & veluti ex viridi cinerea, sine cauliculo, minoribus breuioribusq; foliis, villosa admodum secundum radicem & nigricans, nulla odoris iucunditate. Folia præmāsa nullum aromaticum saporem reddunt, sed lenta & viscida sunt: Nardi verò celticæ folia calida sunt, cum aliqua tamen adstrictione, & odore saporeque iucundo. Hæc ille, qui hirculi iconem hanc exhibuit.

Lib. l. c. 7.


## NARDVS MONTANA.

## CAP. XXIIII.

Nomina

Lib. l. c. 3.

Forma.



ΝΑΡΔΟΣ ὀρετὴ Græcis, ab aliquibus ὄρελῆς, & ὄρεϊς dicta, Galeno πνεῦμα, Latinis Nardus montana. Nascitur, inquit Dioscorides, in Cilicia & Syria, ramulos & folia eryngio similia habens, minora tamē, non aspera, neque spinosa: radices subsunt nigrae, odoratæ, duræ aut plures ceu alphodeli, sed graciliores & longè minores. Neque caulem, neque fructum, neque flores fert. In qua historia sibi ipse repugnat Dioscorides, initio scribens nardum hanc caule & foliis eryngio similem esse, in fine capituli neque caulem, neque fructum, neque florem ferre. Quem errorem Marcellus scriptorum incuriæ adscribit, qui vocū vicinitatē decepti κέρυλλος pro κλάδος, vel κλῶνας scripserunt. Verum cum hæc duæ voces ramos vel surculos designēt, qui arboribus potius quàm herbis conueniunt, sintq; rami iidem arboribus, qui caules herbis, videtur locus is ne sic quidem à mendo expurgatus. Quare legendum censet Matthiolus, ὅτε δὲ κέρυλλος, οὐτε κέρυλλος, οὐτε κέρυλλος συμπεριέσθαι. Id est, neq; caulibus, neque fructus, neque flos confert. Etenim radicis, quæ odorata est, vsus est duntaxat, non aliarum partium. Sed neque ex Cilicia, neque ex Syria nardus hæc ad nos adfertur, tamen nardum montanum hic depictam Matthiolus esse putat, quæ etsi folia eryngij non habeat, cum tamen cætera respondeant, præsertim radices odoris fragrantia à cæteris nardi generibus nō discrepantes, ab hac sententia haud abduci potest. Pena de ista nardo Anguillaræ iudicium & descriptionem sequitur, istamque plantam montanam esse putat, quam inuenit tum in montibus Mindeno conterminis, tum Veganiis arduis, & accliuibus. Natura paruula est, valerianæ minori persimilis flore & folio, sed purpurascens, erucæ diuisura & valerianæ maioris: radici bulbi bini, oblongique subsunt orchis ritu, è quibus caules seiquipalium alti. Nardi montanæ radix efficax est ad omnia, quibus nardus celtica conuenit.

NARDVS Montana,  
Matthioli.In cap. 8.  
lib. 1.

In Aduer.

Vires.

P H V.





VAE Græcis φῆ, & αἴψιος ῥάψλος vocatur, Latinis quoque Phu, & sil-  
uestris nardus, Arabibus Pu, Officinis & herbariis Valeriana maior, à  
multis quibus valet facultatibus, & Valeriana hortensis, & Theriaca-  
ria, Gallis *Grande valeriane*, Germanis *Groß Valerian*, Italis *Valeriana*  
*maggiore*. Phu, folia habet, inquit Dioscorides, hypophelino aut elaphobosco simi-  
lia, caulem cubitalem aut maiorem, læuem, tenerum, in purpuram vergentem, cauum,

Lib. i. c. 10.

Forma.

PHV., Magnum.



geniculis interceptum, flores ad narcissi flores  
accedentes, maiores tamen & teneriores, & ex  
albicante purpureos. Radix superior digiti par-  
ui crassitudine est, adnascens etiam radículas  
obliquas veluti iucus odoratus habet, aut vera-  
trum nigrum, inter sese implicatas, subflauas,  
bene odoratas, odore nardum referentes cum  
quadam virosa grauitate. De quo hæc breuiter  
prodidit Plinius. Tertio loco Creticum, quod  
aliqui agrium vocat, alij phu, folio olusatri, cau-  
le cubitali, geniculato, in purpura albicante, ra-  
dice obliqua villosaque, & imitante auium pe-  
des. Ex quibus delineationibus perspicuum est,  
valeriana nostratem hortensem siue maiorem,  
Dioscoridis esse phu. Caulem enim emittit cu-  
bitalem & bicubitalem, glabrum, concuum,  
eque geniculis folia prælonga, altius sinuata edē  
tem, erucæ aut pastinacæ diuisura. Flores sunt  
non inuenuisti, in summis ramulis umbellatim  
collecti, purpurascens per initia, odor: radix  
transuersa, humi immersa, crassa, pollicē æquat.  
Sola florum narcissi collatio obstat, qui in phu

Lib. & ca.  
12.Pena in Ad  
uer.

narcissi florum effigie esse debent, nō autem umbellæ vel muscarij, vt in valeria-  
na maiori, quamquam flosculi per se omnes qui umbellam conficiunt, forma nar-  
cissinos referat, in purpura albicantes, deinde longē narcisso magnitudine cedunt,  
quos tamen maiores esse Dioscorides ait. Sed hīc mendum esse rectē Ruellius  
quos tamen maiores esse Dioscorides ait. Sed hīc mendum esse rectē Ruellius  
coniciit, quod in magnitudinis designatione frequēs apud Dioscoridē & Theo-  
coniciit, quod in magnitudinis designatione frequēs apud Dioscoridē & Theo-  
phrastum esse solet, vt μακρὰ pro μικρὰ, ἡσσονα pro μείζονα legi debeat, vt & hoc lo-  
phrastum esse solet, vt μακρὰ pro μικρὰ, ἡσσονα pro μείζονα legi debeat, vt & hoc lo-  
co, quum reliqua omnia sic adamussim respondeant, vt nulla prorsus nota dissen-  
tire videatur. Apud Plinium floris nulla fit mentio. Quidam apud Dioscoridem  
non inconsideratē pro νάρκισσος, legunt κισσός id est, hederæ. Est enim Valeriana flos  
hederæ flori specie similis. Idem obseruarunt, quod est apud Dioscoridem, phu  
hederæ flori specie similis. Idem obseruarunt, quod est apud Dioscoridem, phu  
πλάσμα ἐπιήρηστα ἔχεν, καὶ ὁ ἀπὲρ χίονος ἢ ἑλλέβορον μέλανα, Plinium legisse apud quēdam  
ex vetustis herbariis, ἢ μελανπόδιον, & ita reddidisse, quasi legisset τοὺς τῶν ὀπιδίων  
πλάσας. Præterea facultates consentiunt. Phu enim auctore Dioscoride, vim habet  
πλάσας. Præterea facultates consentiunt. Phu enim auctore Dioscoride, vim habet  
calfaciendi, ciendi vrinas arida pota. Decoctum ipsius eadem præstare potest. Va-  
let etiam ad lateris dolorem, menses cit, & antidotis miscetur. Eadem ferē Plinius  
tradit. Eius verò quod phu eodem loco appellauimus, radix datur potui trita, vel  
decocta ad strangulationes, vel pectoris dolores, vel laterum. Menses quoque ciet,  
bibitur cum vino. Phu, inquit Galenus, odoratum quodammodo est. Huius herba  
radix Nardo viribus similis, sed ad plerāque infirmior. Vrinam plus mouet quàm  
Indica aut Syriaca nardus, similiter autem vt celtica. Sic valeriana maioris ra-

Lib. i. c. 4.

Lib. i. c. 10.

Temper.  
& Vires.

Lib. i. c. 10.

Lib. i. c. 20.

Lib. 8. sim



In ca. 10.  
lib. 1.

dix calidiuscula est & exsiccās, lotio ciendo efficax, suauelens nardum, sed tantilum grauitatis mixtæ prodit. Valeriana, vt tradit Matthiolus, ad venenatorū ictus ex vino pota valet, & aduersus pestilentiam, non modò hausta, sed etiam olfacta. Facit ad stranguriā decoctum eius potum. Datur quoq; anhelosis & tussientibus, præsertim cocta cum dulci radice, viuis passis, & semine anisi. Deuorata radix flatus pellit. Tota planta virens cum radicibus contusa, & capiti dolenti admota, eius dolores, & punctiones mulcet. Facit & ad oculorum vitia albo vino incocta, deinde oculo instillata. Miscetur potionibus vulnerum internorum magna vtilitate. De aliis valerianæ generibus diximus in libro de Palustribus, & in libro de iis quæ in asperis, &c.

## POLIVM.

## CAP. XXVI.

Nomina



GRÆCIS πολιον, Latinis similiter Polium, Mauritanis *Cahade*, *Iahade* seu *Grade*. Est autem polio nomen positum à canitie canisve capillamentis, & tomēto hirsuto, quæ nō modò capitula corymbacea, vt ait

Genera.

Forma.

Lib. 21. c. 1.

Lib. 1. hist.  
cap. 16.

POLIVM, Matthioli.



Lib. 4. c. 130

Lib. 9. hist.  
Cap. 21.

Lib. 21. c. 20

Dioscorides, sed etiam vniuersam plantam incanam reddunt, perinde ac gnaphalium. Dioscoridi duo sunt polij genera, montanum quod τεύθειον vocant: alterum maius. Prius tenuis est frutex, candidus, dodrantalis, semine refertus, capitulum in summo habens, corymbi specie, paruum, veluti capillatum, grauitè olens cum quadam suauitate. Alterum fruticosius est, nō vsq; adeò valens odore, & viribus inefficacius. De quibus hæc Plinius. Saliuncam vestibis interponi gratissimum. Sic & apud Græcos polium herbam, inclytam Musæi & Hesiodi laudibus, ad omnia vtilem prædicantium, superque cætera ad famam etiam ac dignitates: prorsusq; mirum, si modo, vt tradunt, folia eius manè candida, meridie purpurea, sole occidente cærulea aspicuntur. Duo genera eius, campestre maius, siluestre quod minus est: quidam tenthion vocant: folia canis hominis similia, à radice protinus, nunquam palmo altiora. Quod polium vestibis interponi Plinius ait, de Theophrasto mutuatus est, sic scribente, πολιον. τοῦτο δὲ καὶ πρὸς τὰς σήκας τοὺς ἐν τοῖς ἱματίοις ἀγαθόν. Id est, Polium quod cōtra vermiculos vestibis interpositum valet. Cæterum in eo Plinius hallucinatus est, quod polium cum tripolio confuderit. Non enim polio, sed tripolio euenit, teste Dioscoride, vt colores ter die mutet, neque id quidem à Dioscoride vt à Plinio foliis, sed floribus adscribitur. Præterea capitulum polio inest, canorum hominis instar capillatum, vt tradit Dioscorides, non folia. Quod verò de polio ex Hesiodo & Musæo citat, id Theophrastus scribit his verbis. καὶ ὡς δὲ φασὶ τὸ τρίπολιον καὶ Ἡσίοδος ἔμειναι, εἰς πᾶν πρᾶγμα σπένδουσιν χρησόμενοι εἶναι. διὰ τὸ ὁρῶντες αὐτὸ νύκτωρ, σκῆνην πηξάμενοι. Gaza sic conuertit. Adde polium, quod Hesiodo & Musæo auctoribus, ad omnem rem seriam, magniq; faciendā perutile prædicatur. Præterea quod addit, insuperque ad famam ac dignitates, &c. id etiam alio loco expresse: Polio Musæus & Hesiodus perungi iubet dignationis gratia, gloriaq; audos polium tractare, colere. Polium montanum quod hic depinximus, cādicans, foliis oblongis, leuiter



POLIVUM Luteum,  
Dalechamp.




In cap. 107  
lib. 3.

*Locus.*

Forma.

POLIV M Quartum, Clusij.



Lib. i stirp.  
Hispa. c. 65.



mulis exilibus, dodrantalibus, humi diffusis multa lanugine candida tectis, qui subinde ad nodos radices agunt: folia mediæ inter primum & secundum magnitudinis, breuiora tamen, denticulata, admodum tomentosa: quæ causa est, vt in tenellis foliis nulli denticuli conspiciantur, nisi diligenter obseruentur, capitula superioribus paulò minora, totaque tomentosa, in quibus flos purpureus. Hoc Polium vidit ille Murciano regno tantum, solo arenoso. Vulgus *amarilla* vocat, & *Chamæpityn* esse putat. Ab eo quintum genus solum modò differt, quod tenerius sit eo, & flores albos proferat. Vtrumque nihil ferè nisi tomentum sunt, & odoris suauitate reliqua genera superant. Hæc Clusius. Aliud Polium montanum

*POLIVM Montanum Supinum*  
*minimum, Lobellij.*

Lib. 3. c. 107

*Vires &*  
*Temper.*

Lib. 21. c. 20



Lib. 8. sim.

De iisdem hæc prodidit Galenus. Polium amarum est gustantibus, & modicè acre. Quare obstructione liberat viscera omnia; urinamque & menses ciet: ac viride etiamnum magna vulnera glutinat, & maximè species eius quæ fruticosa, aridum cum fuerit, rebellia vlcera sanat illitam, & magis hoc præstat quod minus est. Polium minus quo etiam vtimur ad antidota, & acrius & amarius est quàm maius, adeò vt ex tertio sit ordine deficcantium, ex secundo autem completo exsiccantium.

CLINOPODIVM. CAP. XXVII.

*Nomina*

Lib. 24. c. 15.

Lib. 3. c. 93.

*Forma.*

*Locus.*

Lib. 24. c. 15.

In cap. 93.

lib. 3.

**C**ΛΙΝΟΠΟΔΙΟΝ Græcis, Clinopodium etiam Latinis, quasi Lectipes, quod surculi cæcti pedum effigie referant. Dicitur etiam teste Plinio, Cleoniciu, Zopyron, quibusdam ocimoides. Clinopodium, vt describit Dioscorides, frutex est paruus, surculosus, duorum palmorum altitudine, folijs serpyllo similibus, flores lecti pedum speciem præbèt, ex interuallis marubio similes. Nascitur in petris. Plinius sic deliniat. Clinopodiu alij Cleoniciu, alij zopyron, alij ocimoides appellant, serpyllo simile, surculosum, palmi altitudine. Nascitur in petrosiss, orbiculato florum ambitu, speciem lecti pedum præbens. Duæ plantæ, inquit Matthiolus, ab herbariis pro Clinopodio ostenduntur. Prima folijs est serpyllo haud absimilibus, tamen latoribus, cauliculis quadrangulis, tenuibus, hirsutis, floribus purpureis, caules verticillatim ambiētibus. Hanc Pena & Lobel.




## CLINOPODIVM

Prius, Matthioli.



## CLINOPODIVM

Alterum, Matthioli.



& Lobel. Acinon faciunt, ut supra monuimus. Altera foliis est oblongis, in cacumine mucronatis, in ambitu serratis, floribus inter folia subpurpureis, balustij effigie. At illa, inquit, longe

magis quam hec Clinopodium refert, tum quod folia magis serpyllum exprimant, tum quod flores qui in summis caulibus sunt, lecti pedis

basim quadamtenus referunt. Verumtamen herba gustus eum a sententia deduxit. Cum enim Galenus scribat Clinopodium ex tertio

esse calfacientium & siccantium ordine, quæ qualitates in istis plantis haud percipiuntur, neutra verum Clinopodium dici potest. Hodie

notissima est herba Clinopodij nomine, ut scribit Pena, etiam Pharmacopœorū vulgò apud Monspelienfes & Lugdunenses, in qua ad veri

Clinopodij expressionem nihil desideres. Aridos enim & glareosos occupat tractus, furculis compluribus, sesquipalmo longioribus, radice

exigua, foliis parvis, serpylli foliis paribus & similibus, vel calaminthæ montana, vel ocimi minimi, nonnullis leuiusculis in ambitu crenis: cauliculi complures sarmentosi, crebri, ab

imo ad summum geniculati sunt, verticillis, & parvis alabastris, lamio similibus, quaternis, sed multò minoribus, crura diuaticata totidè

exprimentibus, purpureis flosculis calaminthæ. Calida planta calorem non ita magnum gustati præbet, sed siccitatem, odorem suauem spirat

serpylli quadatenus. Huius figuram si propius intueare, quæ melius Clinopodium exprimat reperies nullam. Nam *Mastic* Gallorum Maro

quadrat aptius quam Clinopodio, sicuti vult Dodonæus, nec verticillis aut floribus marrubij tam coccinè conditis vel digestis, nominis

argumentum, nempe lecticæ vel tricinij pedem refert. Illud Pena Clinopodium à Lobellio depictum est Ocimum silvestre, siue Acinos Dodonæi in florum Historia perperam Calaminthæ montana Tragi, Clinopodium alterum Matth. sed

Dodonæi & Lobellij pictura foliis additi pilis: quæ res facit ut Clinopodio Matthioli dissimile videatur. Bibitur herba hæc, auctore Dioscorido, aduersus serpentium ictus, cõuulsa, rupta, & stragurias. Menses educit & fetus. Pessiles quoque verucas eicit diebus aliquot potum. Alii sicut de-

Clinopod.  
Pena.

Li. 2. ca. 57.

Lib. 3. c. 93.  
Ves. 6.  
Temper.

Li. 24. ca. 15.

Li. 7. simpl.

coctum ad tertias, potumque, non febricitantibus in vino, febricitantibus in aqua. Horum quædam Plin. habet. Bibitur ad cõuulsa, rupta, stragurias, serpentium ictus. Itè decoctæ succus. Galenus tradit Clinopodium excalfaciendi vim habere, sed nondum adurendum esse verò essentia subtilis, & tertij ordinis tum excalfaciendum, tum resiccantium.



Nomina.

Lib. 3. c. 92.

Forma.

Li. 24. c. 14.



RAECE πολυκνήμιον dicitur, Latine Polycnemum, quasi multitrifidam aut multifuram dicas, quod multis geniculis intercepta sit. Frutex est furculosus, ut breuiter describit Dioscorides: folia habet origano similia, caulem ut pulegij, multis geniculis distinctum, non tamen habet umbellam, sed paruos in cacumine corymbos, cum acri quadam odoris iucunditate. Polycnemum, inquit Plinius, cunilæ herbæ simile est, semine pulegij, furculosa, multis geniculis, corymbo odorato, acri & dulci odore. Quæ lectio si recta est, in Dioscoride verbum ἀπέρμα deest, ut legatur, τὸν δὲ καυλὸν πολυγώνιον, ἀπέρμα δὲ ὡς περ γλῆχωνος. Id est, caulem multum geniculatum, semen veluti pulegium, ut non in caule, sed in semine Polycnemi ad pulegiū facta sit collatio. Huic succinctæ delineationi plantam appictam satis conuenire arbitratus est Dalechampius, quæ in aridis & æstuosis Corsicæ montibus, vnde ad eum allata est, gignitur, radi-

POLYCNEVM, Dalech.



POLYCNEVM, Lobelij.



ce breui, fibrata, nigricante, caulibus palmum altis, furculosis, crebro geniculatis, foliis tragorigani, hirtis, odoratis, acris, eximium ac suauem quemdam odorem spirantibus, flore non umbellæ specie, sed in summis caulibus oblongo, ex ceruleo rubescente, ac ex vasculo longo, & herbaceo emergente. Aliud esse Polycnemum opinantur Pena & Lobellius, scilicet Calamintham aquaticam Belgarum quem admodum capite de Calamintha iam monuimus, notis omnibus consentientibus. Est enim fruticosa & exigua planta, radice exigua, caule multiplici, incano, geniculato, quadrato, foliis origani vel pulegij, vnde pulegium agreste propter odorem & folia similia dicitur, floribus corymbi specie, caulis vel pulegij, verticillatim caules & furculos ambiētibus, & in summo instar corollæ vel corymbi cōgesti ex pluribus flosculis, veluti in pulegio. Vniuersa planta suauem spirat odorem, sed acrimonia quadam nāres ferientem. Inter verba nacta & sata, in marginibus agrorum & pratorum Belgij & Angliæ prouenit. Huius Iconē feliciter & verius expressam, quam



quàm capite de Calamintha additis floribus & pullis è radice surgentibus, ex Lobellio hic exhibemus. Polycnemum, inquit Dioscorides, recens vel aridū illitum Lib. 3. c. 92. vulnera glutinat, sed quinto die soluere oportet. Bibitur cum vino ad vrinæ stilli- Vires. cidia, ruptaq;. Quæ sic breuiter Plinius. Polycnemum ferro factis vulneribus Li. 24. c. 14. commanducata imponitur: quinto die soluitur.

## HYSSOPVM VVLGARE. CAP. XXIX.

**Y**ΣΣΩΠΟΣ Græcis, Latinis Hyssopus & Hyssopum, Arabibus Cyse, *Nomina*  
*lusa*, seu *Iabes*, Italis & Hispanis *Hissopo*, Gallis *Hyssope*, Germanis *Isope*.  
 Officinæ Latinum nomen retinuerunt. Vt Græca Dioscoridis Hyf- *Genera*  
 lopus, ita hæc Arabum & Mesuræ auctoritate dudum recepta, & in  
 Officinas deducta, duū est generum. Hortensis siue satiuæ, & montana siue sil-  
 uestris. Hyssopus hortensis, quæ in hortis non solum Officinarum, sed etiam culi-  
 narum causa colitur. Hyssopus Arabum Mesuræ & Officinarum, herba est siue fru- *Forma*  
 tex paruus surculis multis ab vna radice prodeuntibus, lignosis, sesquipedalibus,  
 Matth. in  
 ca. 26. lib. 3.  
 quos totos folia vestiunt circumquaque per interualla, oblonga, duriuscula, odo-  
 rata, gustu feruida & amariuscule, satureiæ vulgaris siue satiuæ similia, flores sur-  
 culorū summitates spicæ modo ornant in cæruleo purpurascentes, radix lignosa  
 & multifida. Eadem hortensis, vt affirmat Pena, in Anglia nullo mangonio dimi- Fol. 85.

HYSSOPVS Satiuus  
vulgaris.HYSSOPVS Vulgaris ex  
Codice Casareo.

radio sui, foliis & ramulis adeo candicat sine lanugine, vt quamlibet niuem aut cal-  
 cem facile prouocet, semisse altera viridi remanente. Huic similem aliam reperiri  
 quidam ferunt cauliculis breuioribus, & plurima parte humum versus reclinatis:  
 foliis paulo nigrioribus ac crassioribus: flosculis verò in cæumine in brevis spicæ  
 modum digestis, colore quoque pulchrè cæruleis, & superioris forma similibus.  
 Verum hæc species rarissima. Hyssopum hæc passim Officinæ & vulgò appellant.  
 Germani ac Belgæ *Isope*, aut *Ysope*, Itali *Hyssope*, Hispani *Isope*, Galli *Hyssope*. An autē  
 veterum



veterum legitima Hyssopus sit, non parum, nec temerè, ambigitur. Tameñ enim Hyssopum veluti omnibus cognitum, nullis notis Dioscorides exposuerit, extant tamen quedam de eius forma alibi, quæ vulgari Hyssopo nequaquam respondent. Origanum Heracleoticum folium habet Hyssopi similitudine: Chrysocome comam habet corymboidem, similem Hyssopo. Plinius lib. 27. cap. 12. Steechnadæ aut odoratam herbam, coma Hyssopi. Accedit icon ipsius Hyssopi, quæ in perquam vetusto Cæsareæ bibliothecæ exemplari reperitur, foliis latis, Origani similibus, & capitulis in summis virgis eminentibus. Atque ex his non esse legitimam, quæ vulgo pro Hyssopo habetur, manifestum est. Cæterum quod ad facultates vulgaris Hyssopi attinet, gustabilis huius qualitas aeris, cum nonnulla amaritudine coniuncta, calidam ipsam esse ostendit, & siccam tertio ordine, tenuis quoque essentia, ac expurgandi vim habere. Non inutiliter idcirco, imò efficaciter, ad omnes pulmonis ac thoracis frigidos morbos in eclegmate, aut alio modo vulgaris Hyssopus adhibetur. Obstructiones aperit, crassa incidit: lenta attenuat, & ut facilius expuantur, præstat. Cum carnibus bubulis decocta non insuauiter ex iure editur, ori ac ventriculo grata: vrinas verò etiā mouet, & ad vrinæ stillicidium vrilis est.

HYSSOPVS *Montana*,  
Fuchf.



HYSSOPVS *Arabum*, flore  
rubro, Lobellij.



Hyssopus montana coma & floribus, tota denique facie satiuæ similis est, folio tamen asperiore, gustu amariore, nec vsque adeo acri. Hyssopus duplex, inquit Lib. 2. c. 12. Mefues, horrensis & montanus. Ille semicubitalis, caulibus & ramis paucioribus quam thymus, foliis thymi, sed maioribus, flore purpureo. Hic breuior, & foliis minoribus. Hyssopus prior in hortis omnibus fructicat, montanus in Saluatino monte Comitatus Goritienensis teste Matthiolo, Penamasci aut in collibus asperis Romanæ & Veronenfis tractus, præsertim secus Athesim, & angustias faxorum & arcem munitissimam, quæ Imperatoriam à Venetorum ditione discriminat, e regione montis Baldi. Hyssopum Arabum flore rubro, & interdū albo alunt cultiora vireta Belgica, auctore Lobellio, sed floribus sæpius vnico tantum ordine digestis.



gestis. Hyssopus, auctore Mesue, calidus est & siccus ordine secundo, vel potius tertio. Pituitam crassam & putrem purgat, sed minus quam thymum. Thoracem & pulmones partesq; alias respiratorias pituita eadem, & humoribus aliis putribus & pure expurgat, & tenuando ac incidendo, tergendoque sputum facile reddit. Ob hæc asthmatici, cussi à materiis prædictis est salubris, & epilepsia pituitosa, cæterisque cerebri affectibus pituitosis præsertim sumptus syrupo, vel decocto, cum oxymelite scillitico, & cum origano, etiam in omni ætate expertus: coctionem quoque iuuat. Propter hæc respirationem leuat, & cutis colorem floridum efficit. Coctus cum vino hepatis, lienis, & aliorum viscerum tumores resoluit sumptus, & cum ficubus & iride, & nitro admotus. Lumbricos necat cum ficubus coctus: cum aceto vel oxymelite dolorem dentium sedat: suffitu aurium tinnitum dissipat. Nam tenuat, terget, digerit, flatus dissipat. Præstantior qui odore & sapore acerrimo est, præsertim qui habitior, & quo tempore florere incipit, quando etiam colligendus. Imbecilliter purgat nisi cardamomum & ius misceatur (ex Dioscoride legendum, nisi cardamum, id est, nasturtium, & iris misceantur: quamquam vulgati Dioscoridis codices *μυρρίδος καρδάμωπος* pro *καρδάμωπος* habeant) miscendum autem esse cardamum res ipsa indicat, & Macri verius:

*Cardama si iungas, his solus fortius alium.*

Aut cum manna, vel melle, vel uvis pasis purgatis, vel scilla coquatur. Mediocrè sustinet coctionem & trituram, vt thymum. Datur decocto à drachmis sex ad drachmas decem, puluere à drachmis tribus vsque ad drachmas septem. Scribit Matthiolus hyssopum tenuium esse partium. Ideoque incidere, aperire, attenuare, & abstergere. Aduersari serpentium ictibus, si cum sale & cumino tritum ex melle vulneri illinatur: ex oleo inunctum pediculos necare, & capitis pruriginem tollere. Iuuare comitiales quoquo modo sumptum, sed valentius id efficere in catapotiis hoc modo paratis. Sumuntur hyssopi, marrubij & castorei singulorum semidrachma, radicis pronia drachma dux, affre fetida scrupulus: teruntur omnia, &

Lib. 2. c. 18.  
Temper.  
& Vires.

Ca. 93. li. 3.

HYSSOPVS Folio  
Origan, Dalechamp.



cum succo eiusdem Hyssopi finguntur catapotia septem, è quibus vnum duntaxat quolibet vesperi deuorandum, cum dormitum se recipit æger. Hyssopum Dioscorides, vt herbam nulli non cognitam non descripsit, sed paulò post Origanum heracleoticum folium habere Hyssopo simile dixit tantum, de umbella enim circinata Hyssopi nulla sequitur mentio: deinde onitidem folio esse candidiore & Hyssopo similiorem. Hunc Hyssopum ex Dalechampsio hic exhibemus, folio rotundo, origani heracleotici, nihil odore, sapore, floris spica cærulea diuersum à vulgari, sed ea re tantum, quòd folium maioranæ pulegiõe simile ac rotundum in longum non porrigitur vulgaris modo. Lugduni colitur in hortis quibusdam. Pena longè diuersum Hyssopum genuinum Dioscoridis statuit, nimirum communem illam Maioranam, in Gallia & Belgio notam, quæ Maiorana crassa, & Anglica vocatur, quia in Anglia latior, & cibo aptior prouenit, præsertim in hortis. Quod, vt probet, ponit ex Dioscoride Heracleoticum foliis esse Hyssopi similibus, sed umbellam





bellam non circinatam vel turbinatam habere qualem Hyssopus: deinde Onitidē candidiore folio, & similiorem Hyssopo quā Heracleoticō: semen non esse quidem corymbos, sed ita coniunctum, ut speciem corymborum præbeat. Adhæc serpyllo omnibus notissimo folia & ramulos origani tribuit Dioscorides, cui origano Hyssopum assimilavit foliis & umbella. Præterea Maioranam hortensem Crateus, Iſaach, Serapio, Mesues Hyssopo similem faciunt. Quare cum communis illa maiorana Anglica siue crassa umbellā habeat circinata turbinatamue, densam & congestam ex multis flosculis purpureis: semina frequenti pericarpiorum serie ac coaceruatione coniuncta in corymbi modum, non secus atque in Maiorana, in origano onitide & vulgari: cum folia & tota effigies, odor suavis Origani heracleotici, acrimonia nitior, vires ipsę consentiant, nullam aliam plantam tot notis exprimere genuinum Dioscoridis Hyssopum censeat. Eam elegantiore pictura quā ea quæ capite de Maro posita est, ex Lobellio hic repræsentandam duximus. Hyssopus lutea in umbrosis lucorum & sylvarum marginibus ac cliuis gignitur, radicibus paucis, exiguis, breuibus, nigris, caule dodrantali, quadrato, in ramulos paucos brachiato, è foliorū alato sinu emergētes foliis oblongis, angustis, minimè crenatis, Hyssopo aut satureiæ similibus, flore paruo, oblongo, infra candicante, supra aureo velut aperto quodam rictu hiantē, gustu subamaro & austero. Floret Mayo & Iunio.

## ABROTONVM.

## CAP. XXX.

Nomina



**A**BROTONON Græcis, Abrotonum Latinis nominatur, Mauritanis *Cathsum*, *Kesum*, seu *Gaissum*, Italis & Hispanis *Abrotono*. Dictum est autē Abrotonū, ut testatur Nicandri interpres διὰ τὸ πρὸς ὅσον ἀβρόν, ἢ ἀπὸ τὸν φαίνεσθαι ἁλλωστε ἢ διὰ τὸ δουασθαι, *εἶναι*, hoc est, quod cōspectu tenerum, molle, & delicatū appareat etiā, aut quod grauem acremue, & difficilem halitum spiret. Abrotonum duorum est generum, veterū & recentiorū omnium sententia



ABROTONVM *Femina*,  
*Matthioli.*ABROTONVM *Mas*,  
*Matthioli.*

est lignosius, siccus, squallidus. Quæ si recta est Gazæ lectio & interpretatio, Plinius contrario planè sensu hæc conuertit. Præterea hæc verba, ὡς περ εἰς ἀδώνιδος κήποι, aliter legisse videtur, qui Adonium Latine reddiderit, perinde ac si herbæ cuiusdam peculiare nomen esset. Totū cum locum Plinij corruptissimū quidam

sententia. Mas & femina. Plinius marem campestre vocat, feminam montanū. Abrotonum femina Gallis *Petit Cyprez*, & *Cyprez de Jardin*, & *Garderobbe*, Germanis *Gurten Cyprez*, Italis *Santolina*. Frutex est arboris specie, subalbus, foliis circum ramulos minutim incisus seriphij modo, corymbis in summo aureis. Prouenit æstate, odoratus cum quadam grauitate, gustu amaro. Abrotonum mas, Gallis *Auronne*, Germanis *Stabuurtz*, sarmentosum est, gracili semine uti absinthium: λεπίδακρον enim legimus in vulgatis codicibus, Ruellius λεπίδακρον, id est, gracilibus ramulis. Plinius. Abrotonū odore iucundè graui, floret æstate. (Cornarius legit, Abrotonum iucundi odoris est & grauis, floret æstate: flos aurei coloris: vacuum sponte prouenit: vel, ut in vetustis codicibus legitur: in vacuis sponte prouenit. Cacumine se propagat. Seritur autem semine melius quàm radice, aut furculo: semine quoque nō sine negotio plantaria transferuntur. Sic & Adonium. Vtrumq; æstate: alsiola enim admodū sunt: & sole tamen nimio læduntur. Sed ubi conualuere, ritu vitis fruticant. Sic enim exēplaria vulgaria habent, cū ex Theophrasto, ut mox dicetur, ut ruta, vel rutæ vice legendum sit, non ritu vitis: quorum postrema ex Theophrasto mutuatus est.

Ἀβροτόνον δὲ μᾶλλον ἢ ἀπὸ ἀπέρματος βλαστάνει ἀπὸ ρίζης ἢ παρασπείδος (sic enim legit Gaza, & rectè, ut contextus aperte demonstrat, non ut in vulgatis codicibus exaratum est, ἀβροτόνον δὲ μᾶλλον ἀπὸ ἀπέρματος βλαστάνει ἢ ἀπὸ ρίζης, &c.) χαλεπῶς δ' καὶ ἀπὸ ἀπέρματος πορομυθολύμνον ἐν ὀφθαλμοῖς, ὡς περ εἰς ἀδώνιδος κήποι. ἀπέρμας τὸ γένος. δύσκολον δ' σφόδρα, καὶ ὅλως ἐπικνηρόν, ὅπερ καὶ ὁ ἥλιος σφόδρα λαμπρὸν ἐμπελάων δὲ ἀνέξηθεν, μέγα καὶ ἰσχυρόν τ' ἐνδράδες, ὡς περ δ' πύργον: πολλὴν ξυλωδέσθρον πολλὴ τ' ὄτο, τ' ἐνδράδες, καὶ ἀνχυλωδέσθρον, id est, Abrotonum radice aut auulso furculo potius quàm semine germinat. Semine verò difficulter exit. Ficilibus vasis depactum qualia sunt, in quibus Adonidis hortos instruunt. Seritur æstate. Est enim alsiolum vehementer, atque morbis obnoxium, etiam ubi sol splendide illucet: sed ubi conualuerit, creueritque, magnum ac robustum arborefcit, instar rutæ, nisi quod multo

Li. &amp; c. 21.

Forma.

Li. 21. c. 20.

Emb. 26. li.


Lib. 6. hist.

cap. 7.




lic resiliunt. Seritur autem viui radice, ac furculo, melius quàm semine: & semine quoque non sine negotio plantaria transferuntur: in Adonidis hortos, æstate. Vtrumque aliosum admodum est, & sole tamen nimio læditur: sed vbi conualuere, instar iute fruticant. Abrotono simile odore leucanthemō, flore albo, folioso.

*ABROTONVM Femi-  
na, Dodonæi.*



Ca. 334. p.  
bill.  
Lib. 1. cap. 9.

*ABROTONVM Mas,  
Dodonæi.*



Lib. 3. cap. 5.  
Viresc.  
Temper.

Li. & ca. 21.

Quin Gallorum pumila siue hortensis cupressus sit Abrotonum femina, minimè dubitandum: tum quia notis candoris, amaritudinis, fruticis arborei habitu, corymbis aureis, foliis minutissimè scissis scriphij modo illi quadrate videtur, tum quia viribus iisdem nec ignaviores polleat, quas Dioscorides & Galenus illi assignarunt. Non solum in hortis frequens colitur, sed etiam Gallia Narbonensis ut Nemausensibus vinetis, & campis patentibus fruticat plurima, sesquicubitus alta, ex virore cædida, corymbis bullatis, crebris, fuluo colore nitentibus mense Iulio, cætera hortensi similis, sed odoratior, lignosior, cuius semine lumbricos necant mulierculæ. Hanc plantam non Abrotoni femina, sed chamæcyparissi Pliniana nomine depinxerunt, & descripserunt Fuchsius & Dodonæus, quæ & Santolina nuncupatur, eiusque nullam à Græcis factam fuisse mentionē ait ille. Pro qua pictam dedit Dodonæus plantā quæ est Abrotonum silvestre, quod Fuchsius Abrotonum marem facit. Abrotonū verò feminā, idem Fuchsius absinthij speciem, de qua paulò post dicemus. Aurone Gallica, hortis ruriq; oriunda, Abrotonum mas meritò censetur, samentosum duriusque, seminibus tenuibus, odorum, subalbidum, amarum, foliis fœniculi modo minutim incisis, paulò latioribus ornandis hortis, & deambulacris concinnandis apta, flore luteo, absinthij, minore. Vtriusque Abrotoni semen feruefactū, ut scribit Dioscorides, itemq; crudum cū aqua potum, orthopnoicis, ruptis, conuulsis, ischiadicis, vrinæ difficultatibus, & suppressis mensibus auxiliatur. Potum in vino exitialium venenorum antidotum est, cum oleo, rigentibus illinitur. Serpentes lecto intratum & suffitum fugat. Cum vino potum aduersus eorūdem morsus, peculiariter autem scorpionum & phalangiorum prodest. Oculorum inflammationibus cum cotoneo cocto aut pane illitum subuenit. Tritum cum farina hordeacea, decoctumq; tubercula discutit. Plinius eadem ferè tradit. Vfus est & foliis, sed maior semini ad excalfaciendum: ideo neruis vile, tussi, orthopnoicis, conuulsis, ruptis, lumbis



lumbis, vrinæ angustia. Datur bibendū manualibus fasciulis decoctis. ad tertias partes: ex his quaternis cyathis bibitur. Datur & semen tulum in aqua drachma pōdere. Prōdest & vuluæ. Concoquit Panos cum farina hordeacea, & oculorū inflammationibus illinitur cum cotoneo malo cocto. Serpentes fugat. Contra idus earum bibitur cum vino, illiniturq̃. Efficacissimum cōtra ea, quorum veneno tre mores & frigus accidunt, vt scorpionum & phalangiorum: & contra venena alia potu prōdest, ē quoquo modo argentibus, & ad extrahenda ea quæ inhaerent corporibus. Pellit & interaneorū mala. Ramq̃ eius si subiiciatur puluino, venerem stimulari aiunt: efficacissimamq̃ esse herbam contra omnia veneficia, quibus coitus inhibeat. Galeus de iisdem distinctius sic scripsit. Abrotonum calidum est & siccū ordine tertio, cuius temperiem maximè ex gustu inueniemus: est enim admodum amarum. Itaque nō instrenuè calfacit & siccāt. Nam siue comā eius cum floribus (reliqua enim palea inutilis est) cōtusam vlceri puro illinas, mordax & irritans videbitur: siue eo in oleo macerato caput aut vētrem perfundere velis, admodum calfacere reperies. Quin & si qui per circuitus rigoribus capiuntur, eos ante inuasionē rigorum hoc voles cōfricare, minùs vtique rigore conuentientur: imò & sensus quidem protinus vbi ad motū fuerit, ipsum calfacere percipit. Porro quod lumbricos interimat, par est, nimirū cū sit amarum. Scies autē protinus quod & digerēdi, & incidēdi quādam vim habeat: sed & quod magis quam Absinthio id magis necessario insit, in promptu erit colligere. Primū quidem ex gustu (paucissima siquidē acerbitalis particeps Abrotonum est, nō paucæ verò absinthii.) Deinde ex eo quod inimicū sit stomacho Abrotonum, velut etiam Seriphii, gratum verò & amicum absinthium. Abrotonum vstum calidum siccumq̃ facultate est, magis etiā quā cucurbita sicca vsta, & anethi radix. Illa enim vlceribus humidis, simul & citra phlegmonē callo induratis cōueniunt: ac proinde maximè vltimis iis quæ in pudēdorum praputiis sunt cōpetere vidētur. Arcinis Abrotoni

ABROTONVM Odoratum.  
humile, Lobellij.



ABROTONVM Inodorum,  
Lobellij.





ulceribus omnibus mordax est: ac idcirco in oleo tenui, cicino scilicet, aut raphanino, aut sicyonio, aut veteri & maxime sabino, ad alopecias accommodatur: tum barbam tardius enascētem cum aliquo dictorū oleorum elicit, sed nec minus illis lentiscino maceratū. Quippe pro eo quod tenuium est partium, rarefaciendi vim obtinet, & mordax est, & calidum. Lobellius & periti alij Herbarij plantam aliam hic app. etiam Abrotoni speciem statuere: quia ei bellè quadrat. Est enim foliis nō absimilibus: sed viticulis densissimè stipatis fruticat sesquicubitalibus duorumq; pedum, tenuibus, lignosis, copiosis flosculis Abrotoni ex herbido luteis, odoratis: radice lignosa, flexuosa & proluxa. Belgis hortensis est. Item aliud Abrotonum insipidum & inodorum, figura, folio, flore & semine Artemisiæ tenuissimæ. E collibus Gallobelgij in hortis colitur.

## CHAMÆCYPARISSVS. CAP. XXXI.

Li. 24. ca. 15.  
Nomina

Forma.

**D**ENTI Chamæcyparissus, idest, humilis seu pumila cupressus, Dalechampio ea planta esse censetur, quam Rhotomagēses, in quorum hortis plurima nascitur, *Grande Camomille* vocāt, idest, magnum Chamamelū. Plāta est valde furculosa & sarmentosa, radice dēla nigra, lignosa, folio crispo, tereti, minutim discisso, obscurius virēte, ramulos squallidos circūdante, copioso flore, aureo, in rotundis corymbis. Resinosum & pingue quidpiam tota planta olet, vt & illius plāte flos quā pro pyretro siluestri pinxit Dodonæus. Magna quidē est huic plantæ cum Abrotono scēmina similitudo: quare ne quis hanc cum illa confundat, diligēter considerandæ sunt vtriūque notæ, quibus discernantur. Abrotonū altius se surrigit, hæc pumila, & breuitate magis coacta nō attollitur. Abrotono folia sunt lōgiora, incana, spissa, scissurisque magis hiantibus. Huic Chamæcyparisso breuiora, rariora, & ex maioribus interuallis, compressiora. Ad hæc odore discrepāt, qui validior grauiorque est in abrotono, lauidior & imbecillior in Chamæcyparisso, nō tamē admodum suauis. Aiunt Rhotomagi floris corymbum albis foliolis coronari anthemidis leucāthemi modo, eamq; ob causam chamamelum magnum ibi dici. Sed cum in hortis nostris satū adoleuisset, corymbum luteū absque foliolis, abrotono scēminæ similem genuit. Ad eadem omnia vtūtur Rhotomagenes Pharmacopœi, ad quæ & chamamelum vulgari, nec fallaci successu. Chamæcyparissus herba, inquit Plinius, ex vino pota contra venena serpentium omnium scorpionumq; pollet.

Lib. 3. c. 20.

Vires.

Li. 24. c. 15.

Nomina



**AB SINTHIVM** CAP. XXXII.  
**A**BSINTHION Græcis, & βαθυπικρον, vel βαρύπικρον, Latine Absinthium appellatur, in officinis appellationem suam retinuit, Arabicè *Affinthium*, Italicè *Affenzo*, Germanis *Vuermuet*, Gallicè *Alayne*, ab amaro sapore, vt aloës, & *Absinse*, siue *Absinthe*. Nomen Absinthij Græci ab αἴθερ, idest, contrectando per antiphrasim deflexerunt, quod nullum animal ob eximiam amaritudinem hanc herbam attingat: quam ob causam etiam bathypicron



bathypicron, seu barypicron nominata est. Veteres Græci ἀνθίσθιον, quoque simili etymo dixerunt quasi impotabilem, quod hanc nemo propter insignem amarorem bibere possit. Similiter Germani *Vuermmut* nominarunt, quasi prohibens hilaritatem & alacritatem, ob immensam amaritudinem. Quidam tamen exponunt hilaritatem & alacritatem, ob immensam ad venerem. Absinthij tria sunt genera Dioscoridi. Vulgare, Marinum, quod & Seriphium nominant, tertium Santonicum, in Gallia ad Alpes plurimum proveniens, quod vernacula voce Santonicum appellant, à Santonide regione ipsum producente. Totidem sunt Galeno, sic scribenti: Absinthij tres statuendae sunt species: quarum unam eodem cum genere ipso nomine appellant, cuiusmodi potissimum est Ponticum, alterum Santonicum, tertium Seriphium. Si verò aliud placet appellare Absinthium, aliud verò Seriphiū, aliud Absinthium marinum, quod quidam Seriphium vocant, &c. Fuchsius absinthiū vulgare depinxit, & Seriphium, quod est Dodona Thalietrum, ut diximus. Tertium Santonicum non pinxit, sed simile Absinthio esse ait, verum non adeo copioso semine, & subamarum. Dodonaus Absinthium Ponticum, Officinis Brabantiae Romanum appellatum, id primum proposuit, quod Fuchsius pro abrotano semina posuit: Secundum Seriphium seu marinum, cuius semen Officinis omnibus notissimum est, quod semen sanctum, semen lumbricorum, & semen contra nominatur. Tertium Santonicum, vulgare nostrum, earum genera non locis natalibus, sed forma ipsa & facie differre ait. Matthiolus Absinthium vulgatum primum depingit & describit: deinde aliud Ponticum, quod non solum in Ponto, sed etiam in Hungaria, Transilvania, & Bohemia nascitur, & omnibus plane notis Galeni Pontico convenire scribit: tum aliud marinum siue Seriphium, plene ab aliorum Seriphio diversum: item aliud Seriphium Aegyptium: postremo aliud, cuius semen lumbricos necans in Officinis venditur: ab illis enim dissidet, qui semen illud Absinthij marini semen esse censent. Pena veterum divisionem secutus, Absinthium nostrum vulgarissimum non esse aliud à Pontico & Romano censet. Id demonstrat Dioscorides, cum scribit: ἀνθίσθιον γινώσκουσιν ὅτι ποταμοῦ καὶ δὲ αὐτῆς βελτίον τοῦ ἐν τῷ Πόντῳ καὶ Καππαδοκίᾳ. Id est, Absinthium herba est nota: ex quo praestantius id est, quod in Ponto & Cappadocia nascitur. His enim verbis non indicat vulgaris herba, quaeque ideò delineatione non eget, speciei differentiam, sed natalium duntaxat dissimilitudinem, quod cum ubique obvia sit, tamen in Ponto & Tauro Cappadociae monte, utpote puriore caelo & aëre perfuso, commendatior, magisque aromatica sit, quemadmodum Iridem Illyricam & pleraque alia Dioscorides & Galenus eadem commendatione celebrarunt. Idem innuit Galenus his verbis. Absinthij tres statuendae sunt species: quarum unam eodem cum genere ipso nomine appellant: cuiusmodi potissimum est Ponticum, &c. Hinc absolute vulgare nostrum Absinthium vocat, quod in Ponto feliciter ex Dioscoride provenire indicat, sine ullo speciei vel generis discrimine. Quare vulgariter Absinthium Ponticum est, antiquis à praestantia, & regione cognomine sic dictum, tum recentioribus barbaris ab adstrictione, quam illi Ponticum sapore sua non Latina voce appellant, quam laudabant in Absinthio Pontico Dioscorides & Galenus. Inter Arabes Mesues cum Romano Ponticitatem vindicasset, id est, adstrictionem siccam, & valde medico usui opportunam, idem Ponticum & Romanum esse, nihil fortè huiusmodi meditati, verissime literis mandavit. Unde Pharmacopœorum tam sedula huius Romani conquisitio & exploratio etiamnum durat. Romanum enim id est optimum, uti Romanam camomillam ceteris praestantiores & genuinam expetunt. Et quod quidem nostro aëro in Romano agro antiquiusque rudibus passim visitur, non aliud



à nostro est, & vtrumque cum Pontico idem est. Quare id non descripsit Diosco-  
 rides, tantum indicauit quo loci præstantius nouisset. Nec itidem vllum speciei  
 aut figuræ discrimen assignat Galenus, sed Dioscoridis fidem secutus, vt plurimū  
 solet, vires præsentiores nō diuersas Pōticum habere scripsit, nec natura, sed loci  
 præstātia, quam etiam multis in regionibus vulgatum obtinet. Est enim vbi odore  
 nō insuauī, vbi odoratum, & vbi fœtidum percipias. Idem Galenus de Pōtico alibi  
 hæc scribit. Cū duplex in omni Absinthio facultas & qualitas sit, vtq; in Pōtico  
 adstringendi qualitas non parua est: in reliquis omnibus, idest, Seriphio, & mōta-  
 no, amara quidem qualitas est vehementissima, adstrictio verò (quam saltem gustu  
 agnoscas) aut planè obscura, aut planè nulla sentitur. Proinde Pōticum ad iecino-  
 ris, ventris phlegmonas eligi præstat. Porro, idest tum folio, tum flore lōgè quā  
 cætera Absinthia minore, odor quoq; huic nō modò nō insuauis, verū etia aro-  
 maticum quid præse ferens, reliquis omnibus planè fœdus. Quare hæc fugere cō-  
 ueniet, vt autem semper Pōtico. Hic folia Pōtici minora magnopere doctos tor-  
 serunt, inquit Pena, sed legisse asserit, codice & rei exploratione fretum Rondele-  
 tium, maiora, quæ metathesis vtī facilis, ita nimis familiaris fermè omnibus de  
 plantis scribentibus. Extat sæpe in Theophrasto, sæpius in Dioscoride, vt capi-  
 te de Helenio, Meo, & aliis interdū, & in Galeno, non suo sed ammanuensium vi-  
 tio. Præterea *Ὡδίας* obiectioni facilè respōdet. Nam si magis odoratum, odora-  
 tum erit & alterum. Et τῇ *Ὡδία* nō gratia odoris vel suauitas, sed fragrantia & ve-  
 hementia plerūque indicatur, vt in vngue odorato, myrrha, pice, aliisque. Hæte-  
 nus de primo Absinthij genere. Secundum est marinum siue Seriphium, copio-  
 sissimum in Tauro monte, iuxta Cappadociam, & in Taphosiri Ægypti: in quibus  
 hæc ἐν τῷ περὶ χερσπαδοκίαν τούτων ὅρις, idest, in Tauro mōte iuxta Cappadociā, aliena  
 esse ab hoc loco, & ex superiore Absinthio huc translata ac supposita fuisse putat  
 Cornarius: quod ostendit Plinius, qui ea particula relicta probatissimum in Ta-  
 phosiri Ægypti esse ait. Tertium Absinthij genus est Santonicum, γεννώμενον ἐν  
 τῇ καὶ τὰς ἀλπεὶς γαλιλίας πελάγῳ, ὁ ἐπιχωρίως σαυδόνιον καλεῖται. Idest, in Gallia Alpi-  
 bus finitima plurimum, quod patrio nomine Santonicū vocant. At Geographiæ  
 peritus nunquam Gallicas alpes in Santonum agro, vulgò *Saintonge* existere cre-  
 det, vbi crescat eiusdem nominis Absinthiū. Adhæc in Aldino codice nō σαυδόνιον,  
 siue σαυδόνιον, sed σαρδόνιον legitur, hoc modo: περὶ ἀψινθίς σαρδόνιος. ἔστι δὲ καὶ τεκτον  
 εἶδος ἀψινθίς γεννώμενον ἐν τῇ καὶ τὰς ἀλπεὶς γαλιλίας πελάγῳ, ὁ ἐπιχωρίως σαρδόνιον κα-  
 λεῖται, ἐπὶ ὧς τῇ γεννώσῃ αὐτὸ σαρδονίδι χώρα. Idest, De Absinthio Sardonio. Tertiū  
 est Absinthij genus, in Galatia ad Alpes plurimū proueniens, patrio nomine Sar-  
 donium nominatū, cognomine ducto à Sardonide regione, quæ ipsum fert. Ter-  
 tium hoc Pena vult ad alpes Asiaticæ Galatiæ nasci, quas Sardonidas vocant indi-  
 genæ, idè Sardinium vocatum: sic enim hodie legitur, & restituitur, facili intel-  
 lectione, & proximè sequentis capituli repetitione, vbi in Galatia Asiatica Abro-  
 tonum, vt potè cōgener, oriri dicit, vt duas Absinthij species, ex eodem Galatiæ &  
 Cappadociæ loco cōmendet Dioscorides, & nulla ratio sit hæsitationis, aut in Sa-  
 tonicum Gallicum deprauationis. Absinthium Pōticum, siue Romanū, siue vul-  
 gare, caule fruticat ramoso, foliis incanis, variè incisis, & figura artemisiæ, flosculis  
 rotundis, aureis, racematim cōgestis, semine rotundo, simul cohærente: radice di-  
 uulsa, firma, lignosa. Hoc absolutè Matthiolus Absinthium vocat. Dodonæus Ab-  
 sinthium Sātonicum. Absinthium Pōticum Matthioli folio, caule, flore, ac semine  
 cōstat lōgè quā vulgare Absinthium minoribus: sapore est amariuscule, cui non  
 parua adstringēdi vis cōiuncta est, odore etiā est nō insuauī. Aliud Pōticum ostē-  
 dit Lobellius, Tridētinum Herbariorū ex Pōti & Tauri mōtibus ipsi & Tridētinis  
 impertitum, cuius omnium minima folia sunt, albida, aromatica, adstringentia &  
 subamara.

Li. 6. simpl.

Li. 11. meth.  
ca. 16.

In Aduers.

Embl. 25.  
lib. 3.

Fol. 37.

Forma.

Cap. 23. li. 3.



subamara. Absinthium marinum siue Seriphium, vt describit Dioscorides, herba est pratenuibus furculis, minori abrotono similis, exiguis referta seminibus, subamara, stomacho noxia, graui odore, & cum quadā calfactione adstringens. Matthioli Seriphium hic pictū, quod in multis, vt ille ait, tam Tyrreni quam Adria-

*ABSINTHIUM*  
*Vulgare.*



*ABSINTHIUM Ponticum Tridentinum Herbariorum, Lobelij.*



*ABSINTHIUM Ponticum, Matth.*



*ABSINTHIUM Seriphium, seu marinum, Matth.*





*ABSINTHIUM Seriphium*  
*Aegyptium, Matth.*



Lib. i. c. 2.

Lib. i. c. 2.

In cap. 24.  
lib. 3.

men contra vocant, negat Matthiolus, quod legitima semen istud proferens planta à Cortuso ad se missa, à marino absinthio permultum distet, ut ex eius pictura quivis perspicere potest. Diversum ab his seriphium Dioscoridis, abrotoni feminæ facie ex Pena hic proponimus. Cum enim seriphium & abrotonum feminæ mutua collatione Dioscoridi assimilentur, accuratè examinatis notis quibus utraq; que dignosci queat, tandem naturæ cognatione ductus, & virium exploratione,

*SERIPHIVM Absinth.*  
*Dodonæi.*



*SERIPHIVM Verum, Pena*  
*& Lobellij.*



hoc




hoc genuinum absinthium seriphium esse statuit, quod in Gallica provincia, montis celsi Magdalene accliuibus, quæ S. Maximinum oppidum spectat, redeuntibus item Olbia maritima ciuitate, multum obuuium fruticat, exilibus, senibus surculis, item pedem altis. Radix albicans & proluxa furculos statim ab humo numerosos promittit, crebris foliis, minutim crenatis, incanis, teneriuscula lanugine uti gnaphalium ad summum usque obsitis, ubi extrema capitula aureis floribus bullata fulgent, semine paruo, copioso referta, similiter dine tanaceri, sed minore. Tota candida, sapore, & odore illius quod Romanum & Ponticum falso putatur absinthium Belgis, adeoque simillima abrotono feminae vulgari, ut haud facile utramvis ab altera discernere liceat, nisi quod hæc tota minor, odoratior, candidior, & tomentosa, id quod alteri deest, cui folia breuiora, sapor non adeo ingratus, aut vehemens. Santolina est Dodonæo. Santonicum maius Cordo. Tempore degenerat: fragrantia, tomento & candore exuitur in Angliæ & Belgii hortis. Absinthium Galatium siue Sardonium, perperam Santonicum vulgi, absinthio simile est, ut ait Dioscorides, non tamen ita semine refertum, sed amarum. Officinis absinthium Romanum falso creditum est, quod pro abrotono femina Fuchsius depinxit. Tota planta absinthio simpliciter dicto similis est, sed minor, minusque candida, seminibus non adeo multis, flosculis exiguis. Nonnullis Germaniæ locis frequens, in Flandria & Angliæ hortis copiosa, & usu multo expetita, illic vocata *Romsche Alfene* id est, Romanum ab-

ABROTONUM Femm.

Fuch. Absinthium Ponticum, Dodonæi.



SEMEN Sanctum, Matth.



sinthium, publica persuasione, quæ secutus Matthiolus in Hungaria Transyluania & Bohemia à se repertum prædicat. His addit Pena semen contra Officinarum, siue Semen sanctum, siue Santolinum, Gallis *Barbotine*, Italis *Semenzana*, horum trium absinthiorum nullum videri. Nam tamen nonnulla amaritudinis & figuræ similitudo illis insit, non tamen adeo plenè adulta sunt horum semina, aut horridè amara. Id semine est parui & peregrini fruticis, atque furculosi, tam copiosum, ut foliorum numerum superet. Hunc ex Matthiolo hic pictum damus. His addemus ex Lobellio Absinthium arborescens Absinthium del Comasco Anguillara, vulgari non ita foliis & flore dissimile, sed fruticis arborei habitus. Abrotoni modo ad hominis proceritatem assurgit, candidiore & minore paulo folio, semper virente, gustu amaro, aromatico, odore non ingrato. Item Absinthium album, rarius in Gallia, Italia, Anglia, Belgio à nullo adhuc scriptore memoratum, vni Clusio cognitam, & à Vienna Austria transmissum, folio

Cap. 2. hist.

In aduers.

Chrysan



*ABSINTHIUM* Arborescens,  
Lobellij.



*ABSINTHIUM* Album,  
capitulis scabris, Lobellij.



Chrysanthemi diuisura, Artemisiæ marinæ concolori, in cauliculo dodrantali: flos albus Parthenij in umbellis è senis foliolis. Gustu subadstringit, nonnihil amaricat. Lib. purgâ. Subiiciemus & Absinthium quod angustifoliû Dodonæus appellat. Ex absinthio & lauandula confusis miscellanea quædam stirps videtur, inquit. Cauliculi eius li-

*ABSINTHIUM* Angusti-  
folium, Dodonæi.

Lib. 3. c. 23.

Temper.  
& Vires



gnosi, teretes vt absinthij, flores similes, arque eodem quidem ordine, sed minores, folia verò oblonga, incana, qualia lauandula, odoris cit haud ingrati Lauandulam obscure referens. Plerique absinthium Santonicum esse volunt, alij Artemisiâ marinam, vt proximo capite dicemus. Nunc absinthiorum vires expendendæ. Absinthium, auctore Dioscoride, calfacit, adstringit, bilémque stomacho & ventri inhaerentem expurgat, vrinas cit. Crapulam præsumptû arcet. Inflationibus, ventrisq; ac stomachi doloribus cû fefeli & nardo Gallica prodest, fastidia discutit, morbo regio correptos dilutû aut decoctû eius per singulos dies cyathis tribus haustum sanat. Menses cum melle sumptû aut appositum euocat, strangulationibus fungorum ex aceto potû subuenit. Ixia, cicuta, muris aranei moribus, & draconi marino cum vino aduersatur. Anginis cû melle & nitro inungitur. Contra epinyctidas ex aqua, sugillata verò & oculorum caligines cum melle, similiter auribus ex quibus manat sanies, illinitur. Decocti eius vapor suffitusve dentium auriumve dolores lenit.



res lenit. Decoctum cum passo dolentibus oculis illinitur. Præcordiis, iocinori & stomacho dolenti, ac longo tempore affecto, cum cerato cyprino tritum illinitur. Stomacho autem cum rosaceo subactum. Cum ficis, nitro, & farina loliacea aquæ intercutem lienosâq; subuenit. Præterea vestiariis arcisq; inditum absinthium, vestes ab erodetium iniuria seruat. Culices cum oleo perunctum à corporibus abigit & arcet. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Par est etiam succum hæc omnia præstare, attamen in potionibus improbat: stomacho enim obest, & capitis dolores adfert. Absinthium marinum grauius olet, cum quadam calfactione adstringit, per se aut cum oryza tritum, & sumptum cum melle ascaridas & lumbricos rotundos necat, leniter aluum subducit. Potest cum sapa (alij edulio conuertunt) coctum eadem præstare. Pecora maximè pinguescunt hoc pabulo. Santonicum eadem quæ Seriphiû potest. De his fusiùs hæc & quædam alia tradit Plinius. Absinthij genera sunt plura. Santonicû appellatur à Galliæ ciuitate. Ponticum à Ponto, vbi pecora pinguescunt illo, & ob id sine felle reperiuntur, neque aliud præstantius, multoque Italico amarius, sed medulla pontici dulcis. De vsu eius conuenit dicere, herba facillima, atque inter paucas vtilissima, præterea sacris Romanis celebrata peculiariter. Siquidem Latinarum feriis quadrigæ certant in capitolio, victorque absinthium bibit. Credo sanitatem præmio dari honorificè arbitratis maioribus. Stomachum corroborat, & ob id sapor eius in vina transfertur. Bibitur & decoctum aqua, ac postea nocte & die refrigeratum sub dio, decoctis sex drachmis foliorum cum ramis suis in cælestis aquæ sextariis tribus: oportet & salem addi. Vetustissimè in vsu est. Bibitur & madefacti dilutû: ita enim appellatur hoc genus. Diluti ratio, vt (quisquis fuerit modus aquæ) tægatur per triduum. Tritum rarè in vsu est, sicut & succus expressi. Exprimitur autem cum primû semen turgescit, madefactum aqua triduo recens, aut siccum septem diebus. Deinde coctum in æneo vase ad tertias x. heminis in aquæ sextariis xlv. iterûmque percolatum lentè coquitur ad crassitudinem mellis, qualiter ex minore centaureo quaritur succus. Sed hic absinthij inutilis stomacho capitiq; est, cum sit ille decocti saluberrimus. Namque adstringit stomachum, bilēque detrahit, vrinam ciet, aluum emollit, & in dolore sanat. Ventris animalia pellit, malaciam stomachi & inflationes discutit cum seseli & nardo gallico, exiguo aceto addito. Fastidia absterget, cōcoctiones adiuuat. Cruditates detrahit cum ruta, & pipere, & sale. Antiqui purgationis causâ dabant cum marina aquæ veteris sextario, seminis sex drachmis, cum tribus salis, & mellis cyatho. Efficaciùs purgat duplicato sale. Diligenter autem teri debet propter difficultatem. Quidam & in polenta dedere supradictum pondus addito pulegio: alij contra paraly sin: alij pueris folia in fico, sic vt amaritudinem fallerēt. Thoracem purgat cum melle sumptum. In regio morbo crudum bibitur cum opio (lege apio) aut adianto. Aduersus inflationes calidum sorbetur ex aqua: iocinoris causâ cum gallico nardo, lienis cum aceto, aut pulte, aut fico sumitur. Aduersatur fungis ex aceto, item visco, cicuta ex vino, & muris aranei morsibus, draconi marino, scorpiionibus. Oculorum claritati multum confert. Epiphoris cum passo imponitur: suffragillatis cum melle. Aures decoctum eius vaporis suffitu sanat: aut si manat sanies cum melle tritum. Vrinam ac menses ciet tres quatuorve ramuli, cum gallici nardi radice vna, cyathis aquæ sex. Menses priuatim sumptû, & in vellere appositum. Anginis subuenit cum melle & nitro. Epinyctidas ex aqua sanat: vulnera recentia priusquàm aqua tangantur, impositum: præterea capitis vlcera. Peculiariter ilibus imponitur cum cypria cera, (legendû, Cerato Cyprino,) aut cum fico. Sanat & prurit. Non est dandum in febris. Nauseas maris arcet in nauigationibus potum: in guinum tumorem in ventrali habitum. Somnos allicit olfactum, aut in scio sub ca-

Lib. 27. c. 7.



pite positum. Vestibus insertum tineas arcet, culices ex oleo perunctis abigit, & fumo, si vratur. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas à mulculis tuetur: capillum denigrat absinthij cinis vnguento rosaceo permixtus. Est & absinthium marinum quod quidam seriphium vocant, probatissimum in Taphosiri Aegypti. Huius ramum Isiaci præferre solenne habent angustius priore, minusque amarum, stomacho inimicum, aluum mollit, pellitque animalia interaneorum. Bibitur cum oleo & sale, aut in farinæ trimestris sorbitione dilutum. Coquitur quantum manus capiat, in aquæ sextario ad dimidias. Hæc Plinius, qui quod pecora absinthio pinguescere dixit, ex Theophrasto sumpsit, cuius hæc sunt verba, ἐπεὶ καὶ τὸ ἀψίνθιον τὰ μὲν ἐν ταῖς ἀγροῖς οὐ φασὶν τινες νέμεσθαι, τὰ δὲ ἐν πότινι νέμεται, καὶ γίνεται πικρὸν καὶ χαλκίον, καὶ ὡς οὗ τινες λέγουσιν ἐκ ἔχοντα χολήν. Id est, Gaza interprete. Nam & absinthium pecora huius tractus pascere quidam negant, pontica autem nimirum pascunt, ut pinguiora atque pulchriora reddantur, & ut quidam volunt, sine felle. Quæ si vera sunt, hæc verba ad finem capitis de absinthio marino, λαμβάνεται δὲ μέγιστα τὰ πικρὰ καὶ νεμύμενα, in Dioscoride accreuisse & redundare videntur, aut ad superius absinthium ponticum referendus esse. Id verò quod Plinius dixit ponticum absinthium esse Italico multò amari, Matthiolus reprehendit, Pliniumque Galeni sententiæ refragari ait, quod ex attributis absinthio viribus à Galeno facilius diiudicabitur, de quibus ita scribit. Absinthium adstrictoriam & amaram, & acrem simul qualitatem possidet, exalfaciens pariter & extergens, & roborans & desiccans. Proinde biliosos ventris humores per egestionem infernè propellit, ac per vrinas euacuat. Magis autem quod in venis est biliosum per vrinas expurgat. Ob hæc contentam in ventre pituitam nihil adiuuat sumptum: sic nec si in thorace aut pulmone contineatur. Nam adstringens in eo facultas quàm amara valentior est. Porro quod insit quoque acrimonia, idcirco maiori portione calidum est quàm frigidum. At si opus est generatim comprehensam eius temperiem secundum primas qualitates circumscribere ac facultates (et si anæomeres dissimilareque sit) calidum ipsum dixerim primo excessu, siccum tertio. Succus eius longè quàm herba ipsa calidior est. Seriphium idem scribit non æquè ac absinthium adstringere, sed plus exalfacere, amaritudinemque quandam cum salsedine respere: ideoque stomacho inimicum esse, magis quàm absinthium lumbricos necare, siue foris impositum, siue intrò in corpus assumptum. Et sanè calfacere ipsum in secundo ordine intenso censendum, exsiccare in tertio. Si Ponticum absinthium tantoperè à Galeno laudatum ad bilem, ex Theophrasto, & aliis medicis, id potentius præstat cæteris, potentiore igitur pollet ea facultate, cuius ope potentius cæteris agit, quæ sanè est amaror. Eius enim vis est aperire, abstergere, vrinas ciere, bilem purgare, quæ quotidianis & infinitis propemodum etiam vulgi nedum medicorum experimentis scimus præstare istud nostrum intus forisque admotum. Vina hodie factitia ex absinthio optima sunt, & idcirco multis in locis Germaniæ plusquàm satis expetita, non Pontico, sed Germanico imbuta, foetorem nullus inculcat: quin potius siccum vino inditum odore est aromatico, viribusque recreandis apto. Quare ubi Galenus vtendum Pontico dicit, potius duo videtur respicisse, seriphium & santonicum, quàm istud quod simplici & absoluto nomine vocat absinthium. Si grauius olebat Galeno in Græcia, non foetet Romanum seu vulgare in Italia, Germania, Gallia, & Anglia. Quin cætera potius à foetore & putredine tuetur. Nec huius foetoris Dioscorides meminit aut Plinius. Absinthij vires & vsum perspicue declarat Mesues: Absinthium, inquit, cum sit multiplex, Romanum eligimus, foliis albis, leuibus & planis, non asperis, odore iucundo, absinthium marinum nihil imitante, lectum in terra libera, calidum ordine primo, siccum secundo, in quo etiam calet flos. Constat substantia duplici, vna

Lib. 9. hist.  
Cap. 18.

Lib. 6. sim.

Lib. 8. sim.

Penain  
Aduerf.

Lib. 2. c. 2.



vna calida, amara, nitrosa, purgante, obstructa liberante, altera terrea, styptica, partes cogendo roborante, largiore, præsertim siccatum. Cum autem substantia eius calida sit superficialia, vbi sumptum est absinthium, ab ea prior fit actio: à terra styptica posterior, per quam comprimendo soluere nonnulli malè sunt opinati. Bilem enim flauam & aquas à ventriculo, intestinis, hepate, venis vacuat, etiam interdum per vrinas. Pituitam enim non vacuat, aut maximè paucam, licet phlegmago gum quoque esse Auenzoar censuerit. Absinthium à putredine vindicat, præcipuè potu quotidiano vnciæ vnius vel duarum vini, aut aquæ cui infusum vel incoctum fuerit, vel aquæ ex eo sublimata. Siccum idem pannis interpositum à tineis vindicat, & tutos reddit. Partibus attritis aut contusis præcipuè cum melle aut vino, & pauco cymino calfactum, & appositum mirè confert. Si vino, aut aqua, aut oleo, cui absinthium & radix cucumeris agrestis incocta fuerint, spongia mersa & expressa temporibus alligatur, hemicraniam sanat. Auris quoque suffita vino aut aqua cui incoctum fuerit absinthium, dolore, tinnitu, surditate liberatur. Acetum autem aut vinum cui incoctum sit absinthium cum cortice citri, oris fetorem à gingivarum & dentium, vel materiarum in ventriculo putredine emendat. Idem præstat aqua eius distillata. Succus absinthij cum nucleis persicorum, vermes aurium & aliarum partium enecat, & educit, maximè verò hoc electuarium interficit. Absinthij vnciæ duæ, euphorbij drachma vna & dimidia, cornu cerui vsti vncia dimidia, mellis quantum sufficit. Ex absinthio, fumaria, pæsis vis purgatis, myrobalanis citreis potio fit comoda contra pruritus & scabiem. Absinthium ventriculum & hepar roborat, appetentiam excitat, obstructions tollit, & inde naros affectus, vt icterum, hydropem: febribus putridis etiam diuturnis confert. Absinthium innocèter sumitur, succo tamen lædit ventriculum, ob nitrosum saporem. Quia autem imbecilliter soluit, rosæ, fumaria, serum lactis, spica, vna passæ purgatæ illi miscentur, vt melius & tutius purget.

## ARTEMISIA.

## CAP. XXXIII.

**A**RTEMISIA Græcis, Artemisia Latinis & Italis, Gallis *Armoise*, & *Nomina*  
*L'herbe S. Jean*, Germanis *Berfusz* & *S. Iohans Gurtel*, Officinæ veterum  
 appellationem retinent. Nomen herbæ inditum putant ab Artemi-  
 sia vxore Mausoli Regis, quæ sibi hanc herbam adoptauit, cum ante  
 Parthenis, id est, Virginalis, quod virgo Dea illi nomē dederit, vocaretur. Non de-  
 sunt qui ab Artemide cognominatam arbitrentur, quod priuatim scæminarū ma-  
 lis, quibus *ἀρτεμις*, hoc est, Diana præest, medeatur. Artemisiæ tres sunt Dioscoridi  
 species. Vna latioribus foliis ramisque, altera tenuioribus, tertia ex quorundam sen-  
 tentia *λεπιδόφυλλον*, seu *λεπιδόφυλλον*, quam & *μονόκλωνον* vocant, quod ex eius radice  
 caulis vnicus assurgat. Artemisia prima herba est fruticosa, absinthio similis, maio-  
 ra & pinguiora folia habens. Et huius quidē alia est latior speciosiorq̃, latiora ha-  
 bens folia & virgas, alia tenuior, quæ flores paruos, tenues, albos habet, & grauius  
 olet. Quidam, inquit Dioscorides, in mediterraneis nascētem tenui furculo herbā,  
 caule simplici, admodum paruam, flore refertam, colore flauo, appellant artemisiā  
 monoclonon, id est, vnicaulem. Est hæc iucundioris odoris quā præcedens. *Pli-*  
*nius* vti de inuentoribus herbarum agit, Mulieres quoque, inquit, hanc gloriam  
 affectauēre, in quibus Artemisia vxor Mausoli, adoptata herba, quæ antea Parthe-  
 nis vocabatur. Sunt qui ab Artemide Illithyia cognominatam putent: quoniam  
 priuatim medeatur scæminarum malis. Est autem absinthij modo fruticosa, maio-  
 ribus foliis, pinguibūsq̃. Ipsius duo genera. Altera latioribus foliis, altera tenera,  
 tenuioribus, & non nisi in maritimis nascens. Sunt qui in mediterraneis eodem  
 nomine appellent, simplici caule, minimis foliis, floris copiosis, erumpentis cum

Lib. 3. c. no.

Genera.

Forma.

Lib. 25. c. 7.



ARTEMISIA, Prima  
vulgaris.

Lib. &amp; sim.

In Aduers.



in Libro de iis quæ in Asperis, &c. cui Leptophyllon aliam montanam adiiciunt, quæ in montibus nascitur, radice lignosa, nigra, principio recta & simplici, deinde in tenues fibras se diuimete, caulibus multis, infernè rubetibus, angulosis, pedalis, folio artemisie minore, vndique fimbriato. Tertia artemisia Dioscoridis lepto-

ARTEMISIA, Leptophyllon  
montana.ARTEMISIA Tertia  
Leptophyllon, Pena.

phyllos



*ARTEMISIA Monoclonos, alia.*

phyllos seu monoclinos, Penæ videtur esse herbula sesquipalmum cubitumq; alta, foliis minutis, abrotoni maris, similiter incisis, parvis, ex atro virentibus in ramulis lignosis, floribus seminibus quâ plurimo refertis, parvis, & ex viridi luteolis, flammescētibus. Prope cula & oliueta Mōpelij, aliisq; compluribus Narbonæ locis multa & nota, sed vulgò quodpiâ abrotoni genus credita. Hæc est, inquit ille, quam Dioscorides de quorundam sententia inter artemisias recenser, cui odor non abrotoni aut absinthij, sed artemisia prioris est, & prorsus eadē videtur quæ leptophyllos, idest, tenuifolia: seu leptocarpus proximè sequenti capite indicatur, quod in vetustissimis Latinorum Græcorumque codicibus desideratur, accreuitq; Dioscoridi inutiliter. Sunt tamen qui monoclonon aliam exhibent, quæ in maritimis Adriatici æquoris spontè crescit, in hortos verò translata feliciter crevit, radice breui, tenui, modicè fibrata, caule singulari, pedali, rotundo, furculoso, foliis artemisia vulgaris, nigrioribus, subhirsutis, flore pallescente, in summo caule copioso, velut racematim congesto, prominentibus tuberculis extante, semine minuto, copioso. Est alia quibusdā Artemisia Monoclonos, aliis Ambrosia, quæ folia habet Artemisia vulgaris & habitioris similia, sed longiora profundius incisa, & magis acuminata. Tota ubiq; feminibus scatet. Est & Artemisia marina à Lobellio

Cap. III.  
lib. 3.*ARTEMISIA Monoclonos quorundam, aliis Ambrosia.**ARTEMISIA Marina, Lobelij.*

LL 2



depicta, quæ frequens in maritimis reperitur, sarmētis multis fruticat ab vna radice lignosa, fibrata surrectis, alternis interuallis, cinericio colore, muscoloque semine, simili Abfinthio communi quàm Artemisiæ: flores lutei sunt & numerosi, folia ima & ferè humi strata, paucioribus sed maioribus incisuris. Media verò aut superna, angustiora, minora, interdū vna aut altera incisura portulacæ marinæ aut forniculo marino haud absimilia, carnosa, candicantia, vti vniuersa planta, quæ gratum odorem emittit, Abrotoni maris ferè sapor subsalsus, parum amarus, cuiusmodi Artemisiæ leptophylli. Hanc superiore capite pictam dedimus nomine Abfinthij angustifolij Dodon. nomine, sed in ea manifestas incisuras pictor omisit. Artemisia, auctore Dioscoride, calfacit, extenuat, seruata prodest ad muliebres infelsus, educēdos menses, secundas & fetus. Vteri præclusionem atque inflammationem iuat: lapides frangit, & vrinæ suppressionem tollit. Herba ipsa imo ventri illita copiosa, menses mouet. Succus eius cum myrrha subactus & admotus ex vtero elicit quæcunq; & infelsio. Bibitur etiam coma trium drachmarum pondere, eorundem ducendorum gratia. Plinius vsum eiusdē medicum sic tradit. Artemisia vuluæ medetur trita ex oleo irino aut fico, aut cum myrrha apposita. Eiusdem radix pota in tantum purgat, vt partus enectos extrahat. Menses & secundas ciet ramorum decoctum infidentibus: item folia pota drachma. Ad eadem omnia profunt vel imposita ventri imo cum farina hordeacea. Et alibi Artemisia quoq; datur contra calculos ex vino dulci, & ad stranguriam. Artemisia vtraq; excalfacit, inquit Galenus, & modicè desiccatur, & sunt, quod ad calfactionem attinet, excessus secundi, quod verò ad resiccationē, aut primi intēsi, aut secundi remissi. Sunt autē & modicè tenuium partium. Itaque ad renum calculos mediocriter commodæ sunt, & ad fetus vteri.

## BOTRYS.

## CAP. XXXIIII.

Nomina



ΟΤΡΥΣ. Græcis, Botrys Latinis nuncupatur, Officinis incognita, Gallis *Pymet*, Germanis *Trubenkraut*, id est, herba racemi. Botrys verò dicta est à semine, quod racematim ramulis adnascitur. Hanc Cappadoces Ambrosiam, alij artemisiam vocant, auctore Dioscoride, qui &

Lib. 3. c. 113.

Forma.

## BOTRYS.

Locus.

Tempus.



hanc sic delineauit. Herba est tota lutea, fruticosa, sparsa, multaq; alarum caua habens, semē totis ramulis adnascitur, folia cichorio similia habet: tota valde odorata est, ideoq; vestibus interponitur. Nascitur circa profluētes aquas & torrentes. Plinius ita planè describit, vt ex Dioscoride trāscripsisse videatur. Botrys fruticosa herba est, luteis ramulis, semē circa totos nascitur: folia cichorio similia. Inuenitur in torrentium ripis. Medetur orthopnoicis. Hæc Cappadoces ambrosiam, alij artemisiam vocāt. Hæc Plinius. In oliuetis Nemausenlib<sup>9</sup>, cæterisq; tepidiorib<sup>9</sup> & apricis aruis agri Narbonēsis & Nitiobrigū sponte fruticat, Flandris, Germanis, & Anglis in hortis. Augusto & Septēbri mēse maxime ad maturitatem peruenit, quibus etiam mensibus, vt Ruellius annotauit, venalis herba per Parisiæ urbem defertur, Parisiensibus matronis quàm Officinis & herbariis notior. Hanc enim odoris gratia vestimentis, pannis, ac linteis curiosè interponunt, vt odoris suauitatem cōtrahant. Botrys, inquit Dioscorides, cum vino orthopnceas



thopnceas mulcet. Ea, auctore Matthiolo, excalfacit, attenuat, incidit, expurgat, & aperit. Valet ad omnes pectoris & thoracis affectus pituitosos, & suppuratos adiuvat. Præterea asthmaticos & suspiriosos, tum herba ipsa ex decocto dulcis radice pota, tum ipsius herbe tantum decoctum, multis diebus haustum, addito violaceo melle, aut saccharo. Purulenta expuentibus mirificè auxiliari idem affirmat. Herba ipsa recens facit ad vteri dolores, si in tegula vino Cretico irrorata calfiat, & ventri imponatur. Ideo cum parthenio & anthemidis floribus, puerperarum cruciatibus succurrit, vbi simul omnia concisa in oleo liliorum in patella parumper frigantur, deinde ouis gallinaceis excipiantur, simul misceantur, coquantur in placenta formam, & calida ventri superponantur. Est enim hoc præsentaneum remedium. Suffiuntur eiusdem herbe vapore vtiliter fœminæ ad menses ciendos, & emortuos fœtus eiiciendos.

## M A T R I C A R I A. C A P. XXXV.

**H**ERBARIORVM vulgò matricaria herba dicitur, Gallis *Espargoutte*, & *Matricaire*, Italis *Matricaria* & *Amarella* ab amaro sapore, Germanis *Muotterkraut*, & *Meltram*. Dicta autè est matricaria, quod vteri, quem matricem vocant, morbis medeatur. Quenā verò apud veteres Græcos planta sit, quæ huic prorsus quadret, magna est inter rei herbariæ peritos contentio. Ruellius, Matthiolus, Dodonæus Partheniū Dioscoridis esse censent, eosque hallucinari, qui cotulam fœtidam vulgò dictam parthenium esse putant. Fuchsius secundam artemisiæ speciem λεπιδόφυλλον nominatam, matricariam facit, parthenium verò cotulam fœtidam, quæ lis ex Dioscoridis descriptione, & viribus parthenio attributis dirimenda est. Sed prius scire licet nomen hoc parthenium homonymum esse, sicuti etiam tradidit Galenus in Glossematis Hippocratis, quo auctore parthenium vocatur anthemis, helxine, linozostis, & amaracum, quod confirmat Plinius, Helxinen, inquit, alij perdicium vocant, nonnulli parthenium. Et Linozostis siue parthenium mercurij inuentum est. De parthenio planta alia intelligere etiam videtur, cum scripsit. Mulieres quoque hanc gloriam affectauere. In quibus Artemisia vxor Mausoli, adoptata herba, quæ antea parthenis dicebatur. De parthenio autem Dioscoridis videtur hæc intellexisse. Parthenium, alij leucanthemon, alij tamnacum vocant. Celsus apud nos perdicium, & muraliū. Nascitur in hortorum sepibus, flore albo, odore mali, sapore amaro, &c. Quo loco pro tamnacum, legendum ex Dioscoride & Galeno amaracum, & odore malo, non odore mali, nonnihil viroso: Dioscoridi. Verum hîc Plinius duas herbas in vnam confudit. Nam muralium & perdicium à Celso dictum, est quidè parthenium à Græcis appellatum, sed non hoc de quo hîc Plinius agere voluit ex Dioscoridis sententia, & cuius historiam accuratiùs expendemus. Parthenium, inquit, alij amaracum, alij leucanthemon vocant: folia habet coriandro similia, tenuia, flores per ambitum albos, in medio luteos, odore nonnihil viroso, sapore amaricante. Vtri hæc magis cōpetunt: an matricariæ, an cotulæ fœtidæ? Matricariæ folia coriandro similia non sunt, & λεπιδόφυλλον, id est, tenuia: sunt enim coriandro maiora, nedum tenuiora, artemisiæ: & absinthio propiora, pariaq; reliquæ partes, similes, demptis floribus, qui sunt anthemidis. At cotulæ fœtidæ & coriandri adulti in ramis media & summa folia contemplare, & fatebere collationem benè congruentem: imò omnia coriandri sunt: folia consimili diuisura, rami, situs, tenuitas, figura, præterquàm ima per pauca folia, quæ latiora sunt, apij, aut cœnanthes, eoq; scitè admodum λεπιδόφυλλον addidit, nimirum vt collatione non ad ima, sed ad media pluraq; folia faciendam innuerit. Præterea si gustum consulas, cotulam senties amarore inamœno esse, & perquàm ingratum vt parthenium. Verum hîc nulla exuperantiæ adiectione, fœtidam nonnihil vi-

*Vires & Temper.*

In cap. 113. lib. 3.

*Nomina*

Lib. 3. c. 69.

In cap. 138.

lib. 3.

Lib. 1. c. 11.

Cap. 13. hi.

Cap. 221.

Lib. 22. c. 17

Lib. 25. c. 5.

Cap. 7. 25.

Cap. 30. 21.

Lib. 3. c. 138.

*Forma.*

Pena in Aduers.



rosam, & amaricantem dixit, id est, *ωρεπιζον*, quo indicat non excellere amarore, sed quo anthemis leucanthemos, sapore amaricante esse, cui etiam quia simile erat parthenium, seu cotula, idē nomen factum leucanthemi. Iam verò si facultates & vium medicum respicias, non inficiaberis parthenium esse cotulam foetidam. Partheniū

*MATRICARIA* Par-  
thenium, *Matth.*



*PARTHENIVM* Σμικρο-  
φυλλον, *Myconi.*

*Forma.*



*Locus.*

*Tempus.*

*Lib. quæ in  
vmbre.  
Cap. 74.*

enim auctore Dioscoride, siccatum, cum aceto mulso aut sale potum, velut epithymum, aram-  
bile & pituitam deorsum ducit: anhelosis pro-  
dest, & melancholicis. Herba sine flore calculo-  
sis & anhelosis vtiliter bibenda exhibetur. Va-  
let decoctum eius in vtero indurato & inflam-  
mato ad infusus. Imponitur etiam erysipclatis  
& inflammationibus cum floribus. Sic doctorum  
medicorum experientia comprobatum est  
cotulam foetidam decoctis addita, serofos, adu-  
stos, falsos, melancholicosq; elephantiasecos, &  
mali mortui humores, per inferiora educere:  
succum etiam purgare aliquantum per se uscu-  
lis inditum, magnoperè in syrupo laudari, quia  
thoracis & pulmonis fæctus expedit: vrinam  
euidenter is ciet, tumores emollit, digerendi vi  
paulò quàm chamæmelū validiore. Matricariæ  
nulla prorsus ad huiusmodi humores purgan-  
dos, sed vt artemisiæ ad menses ciendos, dunta-  
xat vis inest, ad quos non parthenium cōmen-  
dat Dioscorides, sed tantum ad vteri duritiæ, &  
phlegmonas. Ex quibus perspicuum est parthe-  
nium Dioscoridis multo magis cotulæ foetidæ  
quàm matricariæ herbariorum competere: nisi  
dicas eam ob odorem vsuq; quibus virgineis  
matricis morbis opitulatur, parthenium etiam  
dici posse. Est autē matricaria fruticosa herba,  
foliis artemisiæ aut absinthij Romani, caulibus  
bipedalibus aut tripedalibus, in quibus flores  
copiosi, in ambitu albi, in medio lutei, chamæ-  
meli, grauitè cū vniuersa herba olentes, amari,  
odore cotulæ, semen chamæmeli, radix ligno-  
sa, fibrosior. Fruticat in siccis passim, viarum &  
hortorum marginibus ac squallidis. Iunio &  
Iulio flores edit. Matricaria in vino cocta, &  
vmbilico imposta mulieribus ab vtero præio-  
catis multum confert. Non desunt qui cotulam  
foetidam non parthenium Dioscoridis, sed par-  
thenium σμικροφυλλον Hippocratis esse velint,  
vt alibi diximus. At Myconus egregius medi-  
cus Barcinonensis aliud parthenium σμικρο-  
φυλλον esse suspicatur, quod ex Hispania mis-  
sum, & hic depictum doctis proponitur, vt de  
eo iudicent. Prouenit, inquit Myconus, frigidis  
in locis, & sitientibus, montosisq; sed imis. Her-  
ba est furculosa, sesquipalmi altitudine, radice  
parua,



parua, lignosa, candida, parum fibrata, ex qua cauliculi aliquot exurgunt rotundi, aliquantum rufescentes, in quibus ima praesertim, & terrae vicina parte folia sunt tenuia, foeniculacea, foliis abrotoni maris similia, ut ouum ovo magis simile non sit. In summis cauliculi umbellae, & in iis flosculi multi, albi, compacti, quales in vulgari millefolio cernuntur, ut insipientes prima fronte facile deludant, millefolium esse iudicatos. Plantae sapor amarus est, & odor grauis, similis vulgari parthenio quod marricariam vocant. Quare congeneres esse plantas Myconus putat. Sed quia huius folia parua sunt cum vulgaris parthenii, id est, matri-cariae foliis comparata, existimat si veteribus nota haec planta fuerit, parthenium esse *σμηρόφυλλον*, cuius meminit Hippocrates his verbis. Herba est paruis foliis praedita, cui nomen est parthenium *σμηρόφυλλον*. Haec verrucas de pudendo tollit. Quanquam id non asserit Myconus, sed doctis aestimandum relinquit. Quis enim sit eius usus, & quo nomine ab incolis nuncupetur, nondum scire potuit.

L. de vuln.

## TANACETVM.

## CAP. XXXVI.



**O**FFICINIS Tanacetum & Athanasia nominatur, Gallis *Tanaisie* & *Nomina* *Athanasie*, Germanis *Reinsarn*. Fuchsius tertiam Artemisiae speciem facit, quae Monoclonos dicitur, ab Apuleio Artemisia Tragites, aut Tagetes, Tanacetumque corrupto nomine pro Tagetem nominari scripsit, & a Germanis *Reinsarn*, quod filicis ferè speciem referat, alio nomine *Uumik*, aut, quoniam lumbricos ventre pellat. Athanasia ex radice lignosa, gracili, reptante, fibrosa, caules emittit cubitales & sesquicubitales, fuscos, rotundos, striatos, geniculatos, per summa alis diuisos: in quibus folia sunt longa, quae multis fo-

liolis constant, ex aduerso sitis, & pinnarum instar expansis, incis. In summitate cauliculorum umbellae insident, & in iis flores bullati, aurei, semenque, scirphij ablinthij, aut abrotoni semine, gustu subacte, & amaricis, cum graecolentia. Nascitur secus vias, sepes, & margines fossarum agrorum. Plantam etiam hic appictam Tanacetum Alpinum vocant Herbarij, Rhœti Iuliam Muscatam, quidam Anthemidem Alpinam. Crescit in altissimis & nivosis Alpium Rhœticarum iugis, radice breui, supernè crassiuscula, in acutum desinente, fibris quibusdam exilibus capillata: foliis densis, humi iacentibus, odore, forma, sapore Tanaceto non dissimilibus, suauius oletibus, in caule paucis: flore anthemidis, intus melino, per ambitum candido. Magno in pretio est apud Rhœtos Insubriae vicinos, & ad varias agnitudines commendatur, odoris suauitate insignem quandam vim certè promittens. Est & Tanacetum aliud quod lanuginosum vocant, in saxosis & apricis prope Monspelium locis, radice crassa, ramosa, nigricante: foliis prope radicem multis, coaceruatis, Tanaceto vel potius Stratiotae similibus, tam densa lanugine opertis, ut vix foliorum delineatio conspiciatur, odoratis: caulibus multis, aliquot foliis vestitis, inaequaliter per interval- la prodeuntibus: flore aureo in corymbis nitente, summo caulium fastigio incum-



bus Stratiotae similibus, tam densa lanugine opertis, ut vix foliorum delineatio conspiciatur, odoratis: caulibus multis, aliquot foliis vestitis, inaequaliter per interval- la prodeuntibus: flore aureo in corymbis nitente, summo caulium fastigio incum-



*TANACETVM Paruum alpinum.**TANACETVM Lanuginosum.**TANACETVM Minus,*  
*candidis floribus, Lobelij.**TANACETVM Cristatum*  
*Anglicum, Lobelij.*

bentibus. Athanasiam calidam esse secundo ordine, siccam tertio colligunt herbarij, ex odoris eius acrimonia, & amarore. Vtuntur ea recentiores ad ventriculi & alui flatu discutiendos, item semine præsertim ad vermes necandos, & ex ventre pellendos. Vtuntur & ad frangendos renum calculos, & aduersus stranguriam, sed eam viris tantum, sicut matricariam mulieribus commodam aiunt. Speciosius Tanacetum



Tanacetum cristatum Anglicū pingendū curauit Lobellius, quod in Angliā hortis in delitiis habetur, multo argutioribus simbrisiis, minutioribus, & latioribus foliis. Ostendit & aliud Tanacetum minus candidis floribus. Media planta est, inquit, inter Millefolium, Sideritidem Achilleam & Tanacerum. Etenim folia Tanaceto proxima odore & figura: cauliculi numerosi: radix fibrata Sideritidis. Flosculi verò candidi in umbellis Millefolij vulgaris. Belgio hortensis est.

## MELISSOPHYLLVM. CAP. XXXVII.

**M**ΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ Græcis, & μελισφυλλον, & μελιζελος, Latinis *Nomina*  
 Apiastrum & citrigo, Officinis Melissa, Arabibus Bederangie, Beda-  
 ringi, Bederenzegum, Turingens siue Trungiam, & Marmacor, Italis Melissa,  
 Hispanis Torongil, & Hierua, Cidreira, Gallis Melisse. Melissophyllum  
 dictū est, quia apes hac herba delectantur: neq; enim aliud quā apū foliū signifi-  
 cat. Meliphyllum verò, quā voce Nicander vsus est, mellis folium indicat, q; hinc  
 apes mellis materiam colligunt. Pari ratione Latini Apiastrum haud dubie dixe-  
 runt, quod hæc herba apibus gratissima sit. Citraginem autē ab odore citrij, quod  
 sinares consulas, citrium malum oleat, & cordi profit. Plinius Melissophyllum  
 apiastrum vocari scribit ab Hygino. Ipse rursus Melissophyllum apiastrū appel-  
 lat. Idem tamen inter ea quæ apibus gratissima sunt, seorsum Melissophyllū, seor-  
 sum apiastrum recenset. Varro autem apertē dicit & cytiso obseuisse & apiastro,  
 quod alij Meliphyllum, alij Melissophyllum, quidam melinon vocant. Apia-  
 strum folia & caules habet ballotæ similes, maiores tamen, tenuiores, non ita hir-  
 sutos, citrium malum olentes. Hac breui delineatione herbam Melissæ nomine  
 etiam mulierculis notam, & in hortis frequentissimam Melissophyllum esse cre-  
 dunt permulti: tamen cū nonnullis locis lecta quiddā pedoris aut cimiū sui odo-  
 ris gratiæ ascitum habeat, idcirco dubitatum est à multis verāne esset, an alius spe-  
 ciei nostras hæc, quæ nulli regioni in hortis deest. Quod fortasse Fuchsiū impulit,  
 ut Melissæ duo genera faceret, vnū verū: alter-  
 rum adulterinum, quod Germani *Vuamtzeh-  
 kraut* nominant, quia cimices olere videtur,  
 quæ nostras est Melissa passim in hortis pro-  
 ueniens, & qua perperam hodie Officinas pro  
 vera vti censet. Contra illius quam pro vera  
 habet, & cuius picturam hic quoque damus,  
 tam gratum odorem esse, ut in ædibus strata  
 eas gratissimo odore compleat. Fuchsiū secu-  
 tus est Dodonæus. Sed his respondet Pena,  
 Melissam nostratē in quibusdam Italicis &  
 Pedemontanis hortis meram suam sibi habere  
 gratiam, basilici, aut citrij, eximerēque quemli-  
 bet de odore scrupulum, nulliq; nō cognitum  
 esse debere, foliis menthæ aut ballotæ, aut Cat-  
 tariae, rugosis, asperis, sed viridantibus, ramulis  
 quadratis marrubij, edentibus orbiculatim flo-  
 res albidos copiosos, in verticillis, ballotæ aut  
 cardiacæ modo. Altera illa Fuchsi & Dodo-  
 næi Melissa est Calamintha montana præstan-  
 tior Penæ & Lobellij, multo accuratius depi-  
 cta, & fusiùs explicata, capite de Calamintha.  
 Folia Melissæ cū vino pota aut illira, ut scribit  
 Dioscorides

Li. 20. ca. 16.

Lib. 21. c. 9.

Li. 21. ca. 12.

Lib. 3. c. 16.

Forma.

Pena id  
Ad.Cap. 18. 9.  
hist.

Li. 2. ca. 70.

MELISSOPHYLLVM,  
Matthioli.



Lib. 3. C. 101.  
Vires &  
Temper.

**MELISSOPHYLLVM,**  
Fuchf. & Dodon.

Li. 21. C. 20.



Li. 20. ca. 11.

Li. 7. simpl.

Li. de med.  
cord.

Dioscorides, contra scorpionum phalangiorū canumq; morsus profunt. Decoctū eorūdem, si eo perfundantur, idem potest. In infestationibus ad ducendos menses vtile est. Dentes eodē in dolore colluuntur. Dysentericis iniectum prodest: fungorum stragulationibus folia cum nitro pora succurrunt. Torminibus auxiliatur. Dantur in eclegmate orthopnoicis. Illita cum sale strumas discutunt. Vlcera purgant. Articularios dolores illita mitigat. Vsum eiusdem sic tradit Plinius. Melissophyllo siue melitana si perungantur aluearia non fugient apes: nullo enim magis gaudent flore. Copia illius examina facile cōtinentur. Idem præsentsissimum est contra ictus earum, vesparumq; & araneorum, item scorpionum. Item contra vulvarum strangulationes addito nitro. Contra tormina ē vino. Folia eius strumis illinuntur, & sedis vitiis cum sale decocta. Succus fœminas purgat, & inflationes discutit, & vlcera sanat. Articularios morbos sedat, canisq; morsus. Prodest dysentericis veteribus, & cœliacis, & orthopnoicis, lienibus, vlceribus thoracis. Cali-

gines oculorum succo cum melle inungi eximium habetur. Plinius alibi. Apiastrū Hyginus quidem Melissophyllum appellat: sed confessā damnatione est venenatum in Sardinia, quo loco Plinius Apiastrum, non Melissophyllum ab apibus, sed Batrachium Sardonium, à similitudine foliorum Apij sic dictum significat: quam rectē, viderint perspicaciores. Melissophyllum marrubio facultate simile esse scribit Galenus, sed plurimū ab eo vinci: quamobrem nec eo vti quemquam. Superuacuum enim foret præsente marrubio, cuius tantus est vbique terrarum prouentus, velle vti Melissophyllo. Cæterū si cui forte ad manū marrubium nō fuerit, illo licebit vti ad eadem, modo quantum ab hoc superetur cognitū habuerit. Sed Melissæ alias facultates, easq; excellentiores tribuunt Mauritani. Scribit enim Serapio Melissophylli proprium esse animum hilarem reddere, humenti ac frigido ventriculo auxiliari, concoctionem adiuuare, cerebri obstructions referare, deficientem animum reuocare, cordis imbecillitatem roborare, eamq; præsertim quam somnus frequentius noctu intercipi solet: quin & eius tremorē reprimere, animi sollicitudines fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ tum ab atra bile, tum ab exusta pituita gignuntur. Quibus assentitur. Auicenna scribens Melissophyllū excalfacere siccareq; ordine secundo, exhilarare, vitaleq; facultates roborare odoris fragrantia, saporis austeritate, partiumq; tenuitate. Quibus facultatibus cæteris etiam visceribus competere. Vires deiectorias habere, nec adeo imbecilles, quin atrabiliarios vapores à spiritibus & à sanguine, qui cordi & arteriis inest, educere queat, quod in cæteris corporis partibus, ac etiam in toto corpore efficere nequit. Mulierculæ, inquit Pena, teneros turiones tusos excipiunt ouis saccharo & rosacea, placentulasq; pinguunt parturientibus, puerperis, & enixis, quibus vires impendio deiectionis fuerint, ac secundæ non probèeductæ. Stillatitiæ ad cardiacas confectiones multus vsus. Hic non omittendæ duæ venustæ plantæ, quarum vna Melissophyllum Turcicum, & Melissa Turcica, à Matthiolo Melissophyllum Constantinopolitanum dicitur, ab aliis Moluca læuis. Caules multos edit cubitales, circa



*MOLVCA, Siue Melissa*  
*Turcica, Dalechamp.*

circa quos folia multa, in ambitu profundis incisuris crenata, supra quæ flores orbiculatim ex amplis & patentibus acetabulis exeunt, colore candidulo, lamij floribus similes, attramen paulò minores. Altera Moluca spinosa dicitur, à Turcis *Maseluc*, quæ caules similiter multos & cubitales profert, striatos, quadrangulares: folia uti prioris: flores similes ex acetabulis quoque, sed angustioribus, oblongioribusq; & eminentes duras, & acriter pungentes spinas in ambitu habentibus. A Moluccis Orientis insulis vtraque nomen habet, in quibus primò repertæ creduntur. Clusius Molucam spinosam pro Galeni Alyssò pinxisse videtur, eiusq; delineatione asserit alyssò adamusim sic quadrare, ut quin illud ipsum sit, nullus iam sit dubitationi locus. Sic igitur Alysson Galenus describit. Alysson herba est marrubio similis, asperior tamen, & magis aculeata circa orbiculos: florem ad caruleum vergentem profert. Clusius verò sic. Herba est pedali altitudine, caule quadrangulo, statim à radice in multos ramos diuisa, omnino candidos, & veluti to-

Li. 2. Aitp.  
Hispa. c. 51.

Li. 2. Anti.

mento obductos, circa quos per singula genicula, bina folia inter se opposita semper enascuntur, marrubio similia, breuiora tamē & crispiora, magisq; incana, inodora & amara: caliculi per intervalla verticillatim ramos ambiunt, quinque ple-

*MELISSOPHYLLVM*  
*Constantinopolitanum, Match.**MOLVCA Spinosa,*  
*Doden.*

rumq;



*MELISSA Moldanica,  
Matthioli.*

*MELISSA Turcica  
Alia Dalechamp.*



rumq; aculeis horridi, candidi, è quibus marrubij flos exilit, sed colore ex cæruleo purpurascens: semen in aculeatis cauliculis subrufum, marrubio simile continetur: radix dura, lignosa, multifida. Primo intuitu marrubium esse diceret, nisi aculeati caliculi & flos ipse Alysson Galeni exprimerent. Vno duntaxat loco per Hispanias plantam hanc se vidisse ait Clusius, ad Elda videlicet pagum in cœmeterio, Valentino regno, florentem & semine pręgnantem mente Martio. Matthioli in postrema commentariorum in Dioscoridem editione Melissophyllū aliud proponit odore Citrei mali perquā iucundo, quod iisdem viribus pollet quibus vulgare nostrum Melissophyllum. Eius effigiem hęc expressimus.

*MARRUBIVM.*

*CAP. XXXVIII.*

*Nomina*

*Fol. 222.*

*Li. 10. c. 22.*

*Genera.*

*Lib. 6. hist.*

*ca. 2.*



QVOD Latini Marrubium vocant, Græci πρᾶσιον, Officinæ quoque Prasium, Galli *Marrube* & *Marrubin*, Itali *Marrobio*, Germani *Uveisz Andorn*. Videtur autem, inquit Pena, Prasinus viror, aut certe virosus odor appellationem dedisse Marrubio, tam nigro fœtido quod ballote dicitur quā albo odoro. Plinius frequenter errat, cum multis locis vertit ἀνιτὸς πρᾶσις, τὰ τὸ πρᾶσις folia, idest, pro prasij, porri folia. Idem duo Marrubij genera tradit ex Castore, nigrum, & quod magis probat, candidum. Toridē sunt Theophrasto. διὺο δὲ γένη καὶ τὸ πρᾶσις. τὸ μὲν ῥῆχ' αὖ ποῶδες τὸ φύλλον, καὶ μάλλον ἐπιεχαραγμύλον, ἐτι δὲ καὶ ἐντομὰς ἐνδηλὰς σφόδρα, καὶ βαθεύας. ὃ καὶ οἱ φαρμακοποῦλαι χρῶν' ὡς πρὸς ἑνα: τὸ δὲ ἕτερον ἑρμηνεύτερον, καὶ ἀνχμῶδες σφόδρα, καὶ ἀπὸ τὸ σφαιρὸν, καὶ τὰς ἐντομὰς ἀμεινῶς ἑρμηνεύον, καὶ ἐπιεχαραγμύλον ἦτον. Idest, Sunt & Marrubij duo genera. Vnū folio herbaceo, magis serrato, incisurilq; profundioribus, & proinde conspectioribus: quo pharmacopola ad nonnulla vtuntur: alterum rotundius, & valde squalidum, vt sphaceli, incisurilq; obscuriores habens, & minùs serratum. Quibus verbis Theophrastus prius Marrubij genus id intelligit, quo de hęc agimus. Alterum Dioscoridis Balloten, hoc ab illo discrepantem, quod plusculum ad viro



Li. 3. ca. 102.

*Forma.*

*Locus.*

*Tempus.*

*Viresc.*

*Temper.*

## A detailed botanical illustration of a plant, likely a species of Stachys or Salvia. The plant features a thick, knotted, and somewhat fibrous root system. Several upright stems arise from the base, bearing large, deeply lobed leaves with serrated margins. The leaves are arranged in opposite pairs along the stems. Small, star-shaped flowers are clustered in dense whorls at the leaf axils and at the tips of the stems. The illustration is rendered in a fine-line, engraved style, showing the texture of the leaves and the structure of the stems and roots.

Li. 20. C. 25.


Li. 8. simpl.

MM



sed & illitum detergit, ac digerit, ponatque ipsum quispiam in caliditate quidem secundi ordinis iam completi, in siccitate tertij medij, aut completi. Succo eius ad aciei oculorum claritatem vtuntur cum melle. Quin etiam & per nares auriginem purgant, & ad iurium dolores inueteratos adhibent, vtq; in quibus obstructione dissiicere, meatumq; ipsum, & ramos meningum expurgare est vius. Marrubij decoctum, inquit Matthiolus, datur commodè iocinorosis, & aqua intercutelaborantibus: eo quoque foliorum puluere necantur interaneorum vermes. Recentia folia cum veteri axungia trita & illita canum morsus persanant, & mammarum tumores resoluunt. Lichenas purgat, sanantque, ex aceto illita. Decoquuntur Marrubij duæ vncie cum buglosi, helenij, eupatorij radicum sesquidrachma, rhabbari drachma, & agallochi pari pondere, in vini albi generosi libris tribus ad tertias, sitq; hoc medicamentum præstantissimum ad icterum à vasorum obstructione prouenientem, si diebus decem continuis huiusce binas vncias potauerint ægri diluculo, addito sacchari tantillo, quod dulcorem addat. Verum si febris sit, ea omnia aquæ incoquenda sunt. Marrubium aliud Creticum pinxit Pena, quod caule fruticat contorto, gracili, rotundo, multis exilibus alis donato, polij montani non disparibus, & quàm prasij nostratis multò cãdioribus, teneriuscula lanugine obsitis: folia verò angustiora sunt, oblongiora, & leuiter ferrata, in angustum desinentia, Melissa Turcicæ æqualia: ex interuallis multò argutiora & minora verticilla, sideritidis aut tetrahit non disparia: inde flosculi prætenues emicant. Ibi, Marrubij, quod odore & lanugine refert. Lobellius aliud ostēdit Marrubium candidum Hispanicū, foliis longioribus magisque carnosiss, hirtis, albis, & suauius redolentibus, in Belgij hortis varium ex Hispano semine. A superiore Cretico differre non videtur.

MARRUBIUM  
Creticum, Pena.



nora verticilla, sideritidis aut tetrahit non disparia: inde flosculi prætenues emicant. Ibi, Marrubij, quod odore & lanugine refert. Lobellius aliud ostēdit Marrubium candidum Hispanicū, foliis longioribus magisque carnosiss, hirtis, albis, & suauius redolentibus, in Belgij hortis varium ex Hispano semine. A superiore Cretico differre non videtur.

## STACHYS.

## CAP. XXXIX.

## Nomina

Li. 3. ca. 103.

Forma.

Li. 24. ca. 15.

Ca. 103. li. 3.



TAXYΣ Græcis, Stachys Latinis dicitur, idest, spica, Officinis ignota. Stachys autem dicta est, quod verticillato ambitu florum, & orbibus spicarum caules cingentibus coronetur. Frutex est, vt describit Dioscorides, marrubio similis, sed altior, folia ferens plura, sed rara, hirsuta, dura, odorata, incana. Virgas ab vna radice plures emittit, marrubio candidiores. Plinius de eadem sic breuiter. Ea quoque quæ Stachys vocatur, porri similitudinem habet, longioribus foliis pluribusque, & odoris iucundi, colorisq; in luteum inclinati. Pellit menstrua. Quo loco Plinio euenit, quod iam antè minuiimus, vt πρᾶσον pro πρᾶσον agnouerit. Non enim porri similitudinem habet Stachys, sed marrubij, vt Dioscorides dixit, πρᾶσιον ἐμπερὺς, idest marrubio similis. Coniectura ex caulium spicatis floribus sumpta, non tam vera, quàm solerti, Anguillara Lauandulam Stachyn esse opinatus fuit. Matthiolus aliam Stachyn verā affirmat esse, quam hic pinximus, eamque quam legitimam antea putarat, pseudostachyn vocat. Hanc



STACHYS, *Matthioli.*

Hanc Lobellius Stachyn facit, Scordotin Plinij, superiorem Stachyn spuriam Flandrorum, Sphacelum Guilandino. Fuchsius diuersam Stachyn proposuit, eam nimirum quam Germani *Riechenderdorn*, & *Feldandorn*, idest, siluestre marrubium vocant. Est enim fruticosa planta, marrubiique similitudinem refert, nisi quod altior est, folia quoque plura, ac rara obtinet, item hirsuta, dura, odorata, & albicantia: virgulas denique, etsi pictura id non ostendat, ab vna radice plures emitit, candidiores quam marrubium: quibus omnibus florum purpureorum verticillatus accedit ambitus, ac orbes spicarum qui caules circumdant. Eandem Stachyn depinxit ac descripsit Dodonaeus. Asperis locis, montibus ac collibus prouenit. Floret Iunio ac Iulio mensibus. Hanc potius approbat Pena, quam Matthioli Stachyn, marrubio: quidem non ita dissimilem, sed neutiquam spicatam, nec adeo congruam, quam Germanorum *Ferdandorn*, idest, siluestre marrubium. Est enim marrubio

Cap. 292.

Li. 2. ca. 69.

Lob.

Temp.

Fol. 228.

persimilis, proceriore caule, quadrato, crassiore, candidiore, hirsutiore, foliis longioribus, nonnihil ad effigiem & incisuram Betonicae vel Ballotae accedentibus, aliquot ramulis quadratis, quos flores purpurei partim verticillato ambitu marubij aut Lamij ridentistingunt, partim superiora spicant hyssopi vulgaris aut

PSEVDOSTACHYS,  
*Matthioli.*STACHYS,  
*Fuchsy.*

MM 2



*STACHYS Lusitanica*  
*quorundam, Lobellij.*

Li. 3. c. 109.  
 Temper.  
 & Vires.  
 Li. 3. simpl.



Betonice modo. Hæc passim spontè in Narbonæ asperis non procul à pago Peraus & Magalona occurrit, interdum purpureis, aliàs luteis floribus, odoratior & multò gravior illa, quam Matthiolus priorem & genuinam ratus fuit. Stachys, inquit Dioscorides, vim habet calfaciendi acrem. Foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas. Stachys, inquit Galenus, frutex est marrubio similis, gustu acri & amaro, tertij ordinis excalfaciendum. Quamobrem non solum menses mouet, sed & abortum adfert, & secundas eiicit. His addit Lobellius Stachyn Lusitanicam quorundam, reptatricem Gnaphalij foliis & cauliculis sesquipalmaribus herbulam, candida lanugine stipatis & tomentosis verticillis, eiusdem coloris, perexiguis sub foliolis cinctis visum effugientibus, suauè spirantibus, vti vniuersa planta. Stachyn dixere Herbarij quidam non imperiti nonnulla de facie & viribus similitudine ducti. Hæc Lobellius.

## HORMINVM M.

## CAP. XL.

Nomina



PMINON Græcis, ita Latinis Horminum & Geminalis. Dictum autem est Horminum από τῆς ὀρμῆς, idest, impetu agi, & cieri in venerem, quod πρὸς τὴν συνίσταται ἀπορρῖμα, inquit Dioscorides, idest, quod ad venerem stimulet. Id duplex est Dioscoridi, & Plinio, sativum, & silvestre. Horminum herbam describit Dioscorides foliis marrubio similem, caule quadrangulo, semicubitali, circa quem eminentiæ filiquis similes prodeunt, ad radicem nutantes, in quibus semen diuersum: in siluestri enim rotundum inuenitur & fuscum, in altero nigrum & oblongum, cuius est vsus. Nusquam nisi in hortis cultu herbariorum visitur. Silvestre foliis est maioribus, & aliquantum laciniatis oris, blattariæ similitudine & colore: quadratis & paucioribus virgulis, sesquicubitum altis: per interualla flores verticillati in spicas longiores abeunt, deorsum inclinatæ, cæruleas, purpurascens, nigro semine, nec absumili priori glutinoso. Vtrique radix lignea. Sed illius odor nullus, huius verò sclaream redolent flores. Rudera & prætæ macilentæ amat. Silvestre Horminum ex Matthiolo hîc apposui: item ex Fuchsio, qui Horminum Orulam esse putat. Dodonæus eum secutus in stirpe. Historia: idem silvestre

Genera.  
 Lib. 3. c. 128.  
 Forma.

## HORMINVM M, Matth.

Locus.



Horminum



Horminum pinxit. At in Historia florū, id quartam Orualæ speciem posse dici tradit. Hormini semen cum vino potum ad venerem stimulat: cum melle purgat argema, & oculorum albugines. Idem illitum cum aqua tumores discutit, & aculeos extrahit. Herba illita eadem efficit. Siluestre vehementiori vi præditum est.

*HORMINVM Silvestre,*  
*Matthioli.*



*HORMINVM Silvestre,*  
*Fuchsi.*



De Hormino hæc tradit Plinius. Horminum semine, vt diximus, cumino simile est, cæterò porro, dodrantali altitudine. Duorum generum, alteri semen nigrius, & oblongius. Hoc ad venerem stimulamdam vtuntur, & ad oculorum argema, & albugines: alteri candidius semen & rotundius. Vtroque tuso extrahuntur aculei ex corpore, per se vel illito ex aqua. Folia ex aceto imposita panos per se, vel cum melle discutunt, item furunculos, priusquam capita faciant, omnesque acrimonias. Quo in loco rursus Plinius impegit, qui *πρασιν* pro *πρασιν* legerit, & porro pro *prasio*, id est, marrubio conuerterit. Hormini Galenus in simplicium censu non meminit, sed Paulus his verbis. Horminum marrubio specie simile est, calidum mediocriter, siccum & abstergens. Venerem stimulat, & oculorum crassitiam cum melle repurgat: œdemata discutit, extrahit aculeos. Siluestre domestico est valentius.

Li. 22. c. 25.

Lib. 7.

GALLITRICVM. CAP. XLI.

**S**PECIES Hormini videtur herba quæ Officinis Gallitricum, Centrum Galli, & Matrifalua, & Sclarea nominatur, Germanicè *Scharlach*, Belgicè *Sclardey*, quasi dicas oculum clarificans. Italicè *Schiaris*, Gallicè quadam ad horminum allusione *Orualle*, & *Toutebonne*. Attamen horminum non est, quo nomine descripsit & depinxit Fuchsius. Nam folia multò maiora edit, nempe verbasci, aspera, admodum hirta rugis, & quasi

Nomina

Cap. 214.

Forma.



*Locus.* verrucis nonnihil hirsuta Æthiopidis aut verbasci pube, silvestris hormini simi-  
*Tempus.* litudine, caules quadratos, & in iis flores caruleos & albicantes, saluix vel di-  
*Temper.* ctamni: semen in calicibus nigrum: radice parua, dura, & sublutea. Tota planta  
*& Vires* odorem spirat non ingratum quidem, sed tam vehementem vt capitis gravita-  
*In Aduers.* tem faciat. Seritur in hortis, & oritur anno post, Iunio & Iulio florens. Sclarea  
 calida siccaque est ferè ad tertium vsque gradum, menses & secundas pellit, ad  
 venerem concitat: quare minùs quin sit hormini species refragandum. Magno  
 est vsui, inquit Pena, quibusdam Septentrionalium, ad Zythi bieræq; confectio-  
 nem. Nam lupuli vel penuria, vel vegetioris potionis faciundæ causâ, cortinis  
 feruentibus addunt, fitq; temetum, quo non multis depletis poculis temulenti  
 fiunt, hilaritate propemodum insana, in nonnullis tamen risu quam miseratione  
 magis digna. Semen inter palpebram & oculum insertum, atque diutulè reten-


## GALLITRICVM,

Sive Sclarea.



## COLVS IOVIS,

Lobellij.



tum, quantum est sordium illic, illicò euerrit, & rapit quotidiano etiam vulgi  
 experimento. Huc meritò adducenda plenta, quam Herbarij quidam Colum  
 Iouis vocant, summo caulis fastigio colum flauo penso obuolutam represen-  
 tante. Videtur Oruala tertia Dodonæi in Histor. flor. (quatuor enim Or-  
 ualæ differentias tradit,) quorundam Horminum silvestre pingue, à pingui folio  
 odorato. E radice Lamij simili, inquit Pena, caules edit non multos, cubitales  
 & sesquicubitales, quadratos, hirsutos, quibus folia vrticæ aut Trachelij, albida,  
 ad basim sinuata, latiora, læuia, Gallitrici minora: flores in verticillis lutei,  
 Saluix, aut Gallitrici. Scaturigines vdsq; siluarum margines amat, Gallix,  
 Germaniæ, & Italiæ. Gustu nonnihil calido exsiccante.

ROSMA



## ROSMARINVM CORONARIVM. CAP. XLII.




RABEIS λεκανωτὶς ἑρπυριατικὴ, qua neſtentes coronas vtuntur, Latinis & Officinis Roſmarinus ſiue Roſmarinum coronarium, Arabibus *Elkiageber*, Italis *Rofmarino*, Germanis *Rofmarin*, Hiſpanis *Romero*, Gallis *Romarin*. Virgas habet graciles, vt deſcribit Dioſcorides, circa

ROSMARINVM, Coronarium.



ROSMARINVM Silueſtre ſiue  
Boemicum, Matth.



quas folia ſunt tenuia, crebra, oblonga, gracilia, intus candicantia, exteriore parte viridia, graui-ter odorata, florem, quod Dioſcorides omiſit, in candido cæruleum, radicem nigram, multis fi-bris capillatam. In Narbonenſi Gallia ſponte ſua prouenit tam copioſe, vt incolæ ligni alius loco id quotidie vrant. Bis anno floret, vere & æſtate. Roſmarinum, vt ſcribit Dioſcorides, cal-ſcit, regium morbum ſanat, ſi quis id in aqua decoxerit, & ante exercitia bibendum dederit: deinde poſt exercitia lauerit, & vinum potaue-rit. Libanotidis coronariæ quam Roſmarinum vocant, inquit Galenus, decoctum morbo re-gio laborantes potum adiuvat, omnes enim li-banotides abſtergentis & incidentis facultatis ſunt participes. Hiſ addunt recentiores roſma-rinum ad frigidos vetriculi affectus plurimum valere, ad cæliacum malum, & ad vomitum ci-bi, ſi cum pane deuoretur, aut bibatur in pulue-rem contritum, ex meraco: prodeſſe lienofiſ, & iocinoroſiſ, nō ſolū excaſtaciendo, extenuan-do, & obſtructiones reſerando, ſed etiam ad-ſtringente vi roborando: ſuccurrere capitis flu-xionibus, & omnibus frigidis morbis, epilepſiæ, ſtupori, veterno, partium reſolutioni: capitis lo-tionibus vtiliter miſceri, & articulorum fomen-tis: cohibere alba vteri profluua, ſi quotidie & diu ſumatur: Viſum acutere, ſi toto tempore quo floret quis ieiuus flores cum circumſtantibus foliis cum pane & ſale quotidie vorauerit. Man-ſum oris halitum commendat. Siſtit dentium & gingiuarum fluxiones in aceto & vino auſte-ro feruefactum, ſi hoc decocto calido os collua-tur. Sicci farina recentia vulnera glutinat, verū operepretium eſt prius vino in quo ipſum fue-rit coctum, ablueri, deinde farina inſpargere. Flores ſaccharo cōditi valent ad omnia prædi-cta, peculiariter autem ad frigidos cordis affe-ctus, ad pectoris vitia, & ad arcenda peſtilentia contagia: quin & herbam ſuſtitu tuſſim & diſtil-lationem ſedare tradunt, tutam præſtare in peſti-lentia domum, crematā nidore improbam aëris diluente perniciem. Aloſius Anguillara apud Theophraſtum Cneurum nigrū eſſe putat, Ca-ſiāque nigram Hygini, apibus gratiſſimam,

Nomina

.L. lib. 3, c. 73.

Forma.

Locus.

Tempus.

Lib. 3, c. 73.

Lib. 7. ſim.



& ideò prope illarum aluearia ferendam: nulla vsquam facta coronariæ Liban-  
tidis mentione apud Theophrastum: vt & Cneorum album lauandulam, siue spi-  
cam, vt iam monuimus. Matthiolus lib. 4. in Dioscoride Cneori quod verum Tho-  
phraſti eſſe credit, figuram hanc monſtrat. Scribit naſci in Bohemia plantam,  
quam ſilueſtre Roſmarinum appellat, quia Roſmarini coronarij faciem quadante-  
nus repreſentet. Cubitali eſt altitudine, frutiſoſa, virgis tenuibus, lignoſis, fragili-  
bus, ruſcentibus, minij ſerè colore, folia Roſmarini æmula, prona parte viridia,  
tranſuerſis vtrinque lineis diſpari ordine ductis ſignata, ſuperna verò ruſcentia,  
& rubro appenſa pediculo. In ſummis ſurculis corymbacea eſt coma rubra, vnde  
flores panduntur ſublutei: radix infirma & ſuperuacua, folia & flores Citreum ma-  
lum olent, guſtu etiam nonnihil aromatici reſpiciunt cum quadam adſtriſtione.  
Vtunrur hac Bohemi aduerſus blattas & tineas. Lobellius Ledon foliis Roſmarini  
alterum vocat.

ANTHEMIDES. CAP. XLIII.

Nomina

**D**E Chamæmelo vulgaris vſus ſiue ſilueſtri, in lib. De iis quæ in vmbro-  
ſis proueniunt, diximus: nunc de vero Dioſcoridis & odoratiore, quæ  
ἀνθεμὶς nominatur, atque etiam χαμαίμηλον, Latinis etiam Anthemis  
& Chamæmelum, Arabibus *Debonigi*, ſeu *Babunegi*, Officinis corrupto  
nomine Camomilla & Camomilla Romana, Italis *Chamomilla*, Germanis *Camillen*,  
Hiſpanis *Mauzauilla*, Gallis *Camomille*, Belgis *Roomſche Camilblæmē*. Chamæmelū ſanè  
id dictū eſt ab odore ſuaueolentis mali. Anthemidis genera tria proponit Dioſcor.  
floribus tantū diſtantia. Toridē Plin. Anthemis, inquit, magnis laudibus celebra-  
tur ab Aſclepiade. Aliqui Leucanthemida vocant, alij Leucanthemum, alij Eran-  
themum, quoniam vere floreant, alij chamæmelum, quoniam odorem mali habeant.  
Nonnulli melanthemon vocant. Genera eius tria flore tantū diſtant, palmum  
non excedentia, paruiſq; floribus vt rutæ, candidis aut melinis, aut purpureis. An-  
themidi, vt deſcribit Dioſcorides, ramuli ſunt  
dodrantes, fructiſoſi, alas multas habentes, fo-  
liola parua, tenuia, multa, capitula rotunda, flo-  
res intrinſecus auri colore, extrinſecus per am-  
bitum albi, aut lutei, aut purpurei, magnitudine  
foliorum rutæ. Naſcitur in aſperis & iuxta vias.  
Colligitur vere. Hæc vt ſuauius multò quā ſil-  
ueſtris aut vulgaris, de qua diximus, quiddamq;  
aromaticum amaraci aut abrotoni habet, ita  
multò ad aſpectum hilarior & comprior eſt, ea-  
dem ratione Romana dicta, qua præſtantioreſ  
plâtas baſilicas aut Romanas vocare ſoliti ſunt,  
vti abſinthium Romanum, & Baſilicum aſpara-  
gum. Tenellis cauliculis repit, inquit Pena, haud  
diuerſa foliis & floribus vulgatæ ſilueſtris, reſti-  
bili item fertilitate, & perenni radice, qua ſeſe  
iſtaurat, & fundit propagationes proculcati-  
onis contemptrices. In Angliæ hortis viret &  
colitur, alicubi etiam ſponte oritur. In Galliæ &  
Italiæ meridionalibus, tamenſi Romana dicta,  
rarior ſponte, in Belgio non niſi in hortis repe-  
ritur. Iunio & Iulio menſe floret in noſtris re-  
gionibus, quo tempore colligitur. Angliæ cul-  
tiores

Genera.

Lib. 4. c. 137.

Lib. 22. c. 21

Forma.

Lib. 3. c. 137.

ANTHEMIS Leucan-  
themum, Matth.

Locus.

Tempus.

In Aduerſ.

Locus.

Tempus.





*ANTHEMIS* *Leucanth.*  
*nivea Angloru. flore multiplici.*



tiores horti, vt scribit Pena, hanc eandem alunt, sed floribus adeò multiplici folio & radiata serie propagatis, vt candor eximius bullatum centrum prorsus operiat, nec alius aut odor, aut sapor illi. Anthemis Chrysanthemos Dodonæi Chamæmelo vero similis cauliculos profert tenues & inualidos, & in terrastratos, folia quoque tenuia, sed candidiora, & paululū minora, pro floribus capitula rotunda, siue orbiculos luteos tantū, nullis circumstantibus foliolis, habet, radicem similem. Idem Eranthemū sic depinxit & descripsit. Cauliculos profert à radice multos, in alas subinde diuifos, striatos, virentes, folia tenuia chamæmeli aut potiùs cotulæ foetidæ similia, flores non magnos, forma florum ranunculi, pulchros, minij colore rubentes, quos capitulum sequitur oblongum, ex multis collectum seminibus, rotundis, acuminatis, in virore subnigricantibus, radices fibrosas. Odore est herbaceo, aliquantulum graui, sed minùs quàm cotula foetida, chamæmeli verò odori nequaquam simili. Nascitur compluribus Europæ regionibus, in aruis cum zea tritico, aut aliis frumentis. Belgæ in hortis serunt, vocantque *Bruyennettekens*. Æstiuus mensibus floret. Essè autem

In Aduers.

Lib. 2. c. 29.

Lib. 1. c. 31.  
Cap. 68. de  
flor.

Forma.

Locus.

anthemidis genus, quod propriè Eranthemum dicitur, nemo facile affirmauerit. Nam eranthemo, teste Dioscoride, flos est forma chamæmeli, in medio aureus vel luteus, orbiculato verò ambitu purpureus. Istud autem florem quidem habet purpureum, sed medium eius non est luteum, quod non esse anthemidis speciem

*ANTHEMIS* *Chrysanthemos, Dodon.*



*ANTHEMIS* *Chrysanthemos, Pena & Lobell.*



ostendit.



*ANTHEMIS* *Eranthemus*,  
Dodonæi.

*ADONIS* *sive Anthemis*,  
Matthioli.



In cap. 137.  
lib. 3.

*ANTHEMIS* *Eranthemus*,  
*sive consolida regalis*, Fuchsij.

Lib. 10. Me-  
tamor.

Forma.

Locus.



ostendit. Fuchsij Consolidam regalem Eranthemum facit. Sed anthemidi neque foliis, neque floribus, neque odore similis est: neque flores rubent, sed caerulei sunt. Matthiolus & Herbarij multi eranthemum Dodonæi, Adonidis florem nuncupant. Sed Adonidis flos, inquit Dodonæus, anemone esse creditur. Nam Adonidis florem vento excuti Ouidius cecinit. Veni autem flos anemone est. Aliis  $\phi\lambda\delta\gamma$  Theophrasti videtur esse, à floris flâmco igne & ve colore. Diuersum est à superiore chamamelum eranthemum Dalechampi, quod hîc depictum est, foliis, ramis, capitulis grandius & amplius reliquis chamameli generibus, sed foliorum quæ capitula ambiunt orbe purpureo decorum, flos priusquam dehiscat, corticoso compactiliq; inuolucro propemodum tam crasso & euidente quàm in cyano coërcetur. Rara est hæc planta, nec herbarijs omnibus nota. In asperis locis prouenit. Nunc de viribus Anthemidum ex Dioscoride. Vim habent radices, flores & herba calfaciendi extenuandique. Poru & infelsione menses, fœtus, calculos & vrinam pellunt. aduersus inflationes & tenuis intestini dolores bibuntur. Bile suffusos expurgant, & iocinorosis medentur. Decocto earum vesicæ vitia fouentur. Efficacius ex omnibus generibus est, quod florem fert purpureum, ceteris maius, idque propriè Eranthemum vocatur. Quod verò Leuchanthemum & Chrysanthemum cognominant,



ANTHEMIS *Eranthemus, Dalechamp.*

sunt, & à febre liberabuntur. Ita Plinius planè ex superiorum sententia. Medici verè folia in pastillos digerunt: item florem & radicem. Dantur omnia mixta drachmæ vnus pondere contra serpentium ictus. Pellit mortuos partus, item menstrua in potu, & urinam calculosque: inflationes, iocinorum vitia, bilem suffusam, agilopia. Commanducata vlcera manantes in ore eruptiones sanat. Ex omnibus iis generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius & foliorum & fruticis magnitudo amplior est. Hoc propriè quidam eranthemum vocant. Quæ omnia accuratiùs Galenus declarauit. Anthemis, inquit, calcacit & siccatur primo ordine. Est & tenuium partium, ac proinde digerendi, laxandi & rarefaciendi vim obtinet. Et alio in loco. Est chamamelû tenuitate rosæ persimile, calore verò ad olei facultates magis accedit, animali familiares, ac sæ persimile, calore verò ad olei facultates magis accedit, animalis familiares, ac temperatas. Quapropter lassitudinibus, vt si quid aliud confert, doloresque, mitigat. Præterea tensa remittit & laxat, quæq; mediocriter dura sunt emollit, quæq; constipata condensatæ sunt rarefacit. Ad hæc febres, quæ citra viceris alio- cuius inflammationem infestant, dissoluit: præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate gignuntur. Quæ de re & ab Aegyptiorum sapientissimis Soli aut consecrata est, febriumque omnium remedium putatur. Verùm hæc quæ iam à veritate aberrant: solas enim quas diximus febres sanare potest, easque quæ iam concoctæ sunt. Iuuat autem pulchrè reliquas etiam omnes quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex visceris inflammatione ortæ. Nam & harum remedium chamamelum vel strenuissimum est, vbi iam concoctis adhibetur, quapropter & hypochondriis, vt si quid aliud, gratum est. Hæc Galenus. Anthemidis decoctum potum, inquit Matthiolus, lateris dolores sanat. Idem præstat aqua è floribus distillata.

ninant, vehementius urinam ciunt. Aegilopis illitæ medentur. Commanducata oris vlcera sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terentes ipsas ad pellendos febrium circuitus, quæ in Græcis sic leguntur. Χρῶνται δὲ τινες καὶ συγκλίσμασι μετ' ἐλαίου, λειοτριβοῦντες αὐτὰ πρὸς ἀνασιδῶν τῶν περὶ τοὺς πυρελλῶν, & intelligūt anthemidis vsum esse in infusis per clysteres. Sed hos falsâ lectione decipi putat Cornarius, legendū enim esse συγγείσμασι, vt accipiatur vnctio, siue illitio per totū corpus ad febres depellendas. Quod perspicuè traditur ab Aetio, ex sententia Nichepionis ita scribente. Nichepion Aegyptius chamemeli florē purum in summo vigore colligere iubet, & in mortario tūdere, ac probè contere, & pastillos mediocres fingere, eosque in vmbra diligentissimè siccare, ac reponere. Vsus autem tēpore vnum ex ipsis terere, oleo primario quod satis est affuso, indèque vniuersum corpus à capite vsque ad pedes illinere in omnibus febrientibus, ac ægrum stragulis coopertum fouere. Sudor enim, inquit, mouebitur bonus in his qui euasuri

Embl. 139.  
lib. 3.

Lib. 12. c. 21

Lib. 6. sim.

Lib. 3. sim.

In cap. 157.  
lib. 3.

RVTA.



**Nomina** **R**UTANON Græcis, Ruta Latinis nominatur, Mauritanis *Sadeb*, seu *Se-  
dab*, Italis *Ruta*, Gallis *Rue*, Germanis *Rautem*, & *Wueinrauten*, Hispanis *Arru-  
la*. Cur autem dicatur *πήγανον* declarat Plutarchus his verbis. *φασὶ δὲ καὶ  
τὸ πήγανον ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.* *πήγνυσσι γὰρ ξηρότητι διὰ θερμότητα τὸ σπέρμα, καὶ  
ἄλλως πολεμὸν ἐστὶ ταῖς κυσσίαις.* Id est, Aiunt à fa-  
cultate sua *πήγανον* dictum, quod siccitate & ca-  
lore coagulet & cōdenset semen. Hinc utrū ge-  
rentibus inimicū est. Dioscor. duo ruta genera  
primū statuit, *satiuā* & *agrestē*: deinde alio ca-  
pite aliam addit *rutā siluestrem*, quā *Harmalā*  
quidam vocāt, Syri *Besasan*, Cappadoces *Moly*.  
Ruta *satiua* siue *hortensis*, planta est perpetuū  
ferē virēs, foliis crassiusculis, subpinguibus, plu-  
ribus ab vno pediculo exeuntibus ex angusto  
exortu in latiusculum desinentibus, colore satu-  
ratē viridi. Ramos emittit copiosos, surculosos,  
duros, rotundos, & in horum summitate flores  
luteos, hyperici haud absimiles, ē quibus capitu-  
la siue calices oriūtur quadrati, in quibus semē  
pusillum, nigrum, radix lignosa, multiplexq; &  
intus lutea. Herba est acris & grauiſimi odoris.  
Siluestris ruta, inquit Dioscorides, *satiuę* similis  
est, ipsa acrior. Agresti ruta vires vegetiores, in-  
quit Pena, & odor vehementior multo, in tan-  
tum acer afflatuq; periculosus, vt interdum va-  
porem olfacientis vultui afflet, aut tangētis ma-  
nui inurat, qua si faciem attigeris erysipelas aut  
scabies excitetur. Alta cubitum est, caule horten-  
sis, minore, foliis fermē iisdem, exilioribus, sili-  
quala & semine non dispari. Sed frigoris est val-  
de impatiens, nec perennat, ne in hortis quidē  
Gallicis & Barauis sedulo culta, flosculis herba-  
ceis. Huic siluestri addit Pena aliam minimam,  
quam Peganion Narbonēse, siue Rutulam vo-  
cat, Lobellius Rutulam siluestrem, quæ maximē  
omnium virulenta est, angustifolia, tota pallido  
ferē virore albicans, empetri fermē habitu, sicu,  
& rigiditate, cetera non nisi magnitudine mul-  
to disparia. Ruta *satiua* passim prouenit in hor-  
tis: amat aprica loca, siccaq;. Matthiolus nasci ait  
siluestrem in Geritienſi agro copiosissimā, adeo  
vt qui circumstant montes ea vbique scateant,  
præsertim Saluatinus. Vtraq; siluestri etiam sca-  
tere aridos Monspelienſes colles, & saxeos decli-  
ues scribit Pena. Præter rutam siluestrem *satiuā*  
similem aliam tradit Dioscorides, vt diximus,  
quam quidam *Harmalā* vocant, Syri *Besasan*,  
Cappadoces *Moly*, quia radicem habet nigrā,  
florē candidum, Mauritani *Harmel*, & *Alharmel*.  
Hanc

## RUTA SATIVA.

**Genera.**

Lib. 3. c. 45.

**Forma.**

Lib. 3. c. 45.

fol. 390.


RUTA Siluestris,  
Matthioli.

Fol. 390.

**Locus.**

Ibid.


Lib. 3. c. 46.






*RUTVLA Siluestris, Pena  
& Lobelij.*

*RUTA HARMOLA,  
Matthioli.*



*RUTA Canina, Herba  
S. Antonij, Lobell.*



Hanc Matthiolus Cōstantinopoli ad se missam depinxit, figura ad descriptionē Dioscoridis apprimē congruēte frutex est multos à radice cauliculos emittens, foliis multò quā siluestris ruta longioribus, tenuioribusq; odore graui, floribus candidis, è quibus capitula in caulium cacumine oriūtur, paulò maiora quā satiuæ rutæ, quæ tribus maximè partibus cōstant, quibus triangulū semen, sub rufo colore, & amaro gustu, includitur, multi vsus. Recētiore alteri plantę Rutæ nomen indiderūt, & Caninā & fœtidam appellant, Dodonæus in stirpiū Historia Galiopsim aut Scrophulariā tertiam, quidā Herbam S. Antonij. Virgulis multis fruticat sesquicubitalibus: folia Papaueris Rhœadis aut Argemones incisura, minora, crassiuscula, ex viridi nigricant, vti & flosculi, æstate inanes, Antirrhini modo. Semen in exili pericarpio Rutæ ferè aut Blattariæ ritu, sed minore. Tota grauem & virosū, & rutaceo ingratiorem odorem spirat. Raro nisi locis siccis & feruidis, satis & marginibus oritur, vt Narbonæ, Rauēnæ, Romæ. Ruta tā satiuā quā agrestis prior, vt docet Dioscorides, calfacit, vrit, exulce-

rat, vrinā mouet, mensq; ducit. Aliū sistit pota & comesta. Letalium venenorum antidotum est, si semē acetabuli mēsurā in vino bibatur, folia per se ante cibū sumpta, & cum nucibus iuglādibus, aridisq; ficis, inefficacia venena reddunt. Cōtra serpentes similiter sumpta p̄sunt. Geniturā tam in cibo quā potu extinguit. Cocta cū

Lib. 3. c. 45.  
Temper.  
& Vires.

NN



anetho sicco, tormina sistit, facit etiā ad lateris thoracisq; dolores, difficultatē spirandi, tussēs, pulmonis inflātionem, coxendiciū, articularumq; cruciatus, rigores circuitibus certis repetētium febriū, vti supradictū est, pota. Ad inflātionē colī, vteri, & recti intestini decocta cum oleo & infusa. Vuluæ strangularū liberat trita cum melle, si à genitali vsq; ad sedē imponatur, feruefacta cum oleo & pota lubricos excutit. Articularū doloribus cum melle, aquæ intercutē quæ hypofarca dicitur, cum ficis illinitur. Eisdē pota auxiliatur, in vino decocta ad dimidias partes, & si ea abstergatur. Cruda saleq; cōdita ac comesta, visus aciei exacuit, & oculorū dolores cum polēta illita sedat. Cum rosaceo & aceto capitis doloribus succurrit. Sanguinis narium profluvia trita & imposita sistit. Testiū inflātionibus cum foliis lauri illita, & exāthematis cum myrto & cerato prodest. Cum vino autē pipere & nitro cōfricta, albæ vitiligini medetur: cum iisdē illita thymia & myrmecias tollit. Cū melle & alumine imposita lichenibus prodest. Succus in mali corio calfactus & instillatus, auriū doloribus succurrit. Oculorū herbetudinibus cum succo sceniculi & melle inunctus subuenit. Erysipelata, herpetas, & achoras cum aceto, cerussa, & rosaceo inunctus sanat. Ceparū & alliorum acrimoniā cōmanducata domat. De iisdē prolixius Plinius his verbis. Quæcunq; ruta & per se pro antidoto valet, foliis tritis & ex vino sumptis, cōtra aconitum maximē, & viscū: item fungos siue in potu detur, siue in cibo. Simili modo cōtra serpentium ictus, vtpotē cum mustella dimicatur: cum his, rutā prius edendo se muniāt. Valent & cōtra scorpionum ictus, & araneorum, apum, crabronū, vesparum aculeos, & cātharidas, ac salamādras, canisq; rabiosi morsus: acetabuli mēsurā succus ex vino bibitur, & folia trita vel cōmanducata imponuntur cum melle & sale, vel cum aceto & pice decocta. Succo verò perūctos aut eam habētes, negant feriri ab his maleficiis. Serpētēq; si vratur ruta, nidore fugare. Efficacissima tamen est siluestris radix cum vino sumpta. Eandē adiiciunt efficaciorē esse sub dio potā. Pythagoras oculis noxiā putauit falsō, quoniā scalptores & pictores hoc cibo vtuntur oculorū causā, cum pane quoq; vel nasturtio satiuā atq; siluestris propter visum. Vt aiunt, multi succo eius cum melle Attico inūcti disculserūt caligines, vel cum lacte mulieris puerū enixā, vel pauco succo angulis oculorum tactis, epiphoras cum polēta imposito. Lenit autē capitis dolores pota cum vino, aut cum aceto & rosaceo illita. Si verò sit cephalæa, cū farina hordeacea & aceto. Eadē cruditates discutit, mox inflātionē, dolores stomachi veteres. Vuluas aperit, corrigitq; cōuersas, illito cum melle, toto ventre, & pectore. Hydropicis cum ficu, & decocta ad dimidias partes, potaq; ex vino. Sic bibitur & ad pectoris dolores, laterumq; & lumborū, tussēs, suspiria pulmonū, iocinorum, renū vitia, horrores frigidos. Ad crapulæ grauedines decoquuntur folia poturis, & in cibo vel cruda vel decocta cōditāve prodest: item torminibus in hyslopo decocta, & cum vino. Sic & sanguinē sistit interiorem & nariū indita, sic & collutis dentibus prodest. Auribus quoq; in dolore succus infunditur, custodito, vt diximus, modo. E siluestri verò cōtra tarditatē & sonitum cum rosaceo, vel cū laureo oleo, aut cumino & melle. Succus & phreniticis ex aceto trita instillatur in tempora & cerebrū. Adiecerūt aliqui & serpyllū, & laurum, illinentes capita & colla, dederunt & lethargicis ex aceto olfaciendū: dederunt & comitialibus bibendū decoctā succū in cyathis quatuor: ante accessiones quarū frigus intolerabile est, aliosisq; cruda datur in cibo. Vrinam quoq; vel cruentā pellit, scēminarū etiā purgationes, secundasq; etiā emortuos paratus, vt Hippocrati videtur, ex vino dulci nigro pota. Itaq; illini & vuluarum causā etiā suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordeacea. Valet contra ileum decocta farina in oleo, & velleribus collecta. Multi verò & cōtra purulentas excreationes siccæ drachmas duas, sulphuris vnā & dimidiam summi cōfent: & cōtra cruētas, ramos tres in vino decoctos. Datur & dysentericis cum caleo

Lib. 20. c. 13.



caseo in vino cōtrita. Dederūt & cum bitumine infriatā potieni propter anhelitū. Ex alto lapsis seminis tres vncias illinūt ex olei libra, viniq; sextario. Illinitur & cum oleo coctis foliis, partibus quas frigus adusserit. Si vrinā mouet, vt Hipocra ti videtur, mirum est quosdā dare velut inhihentē potui, cōtra incōtinentiam vrinæ. Pforas & lepras cū melle & alumine illita emēdat. Itē vitiligines vel rugas, strumas, Pforas & lepras cū melle & alumine illita emēdat. Itē ignem sacri ex aceto & & similia, cum hircino & adipe suillo, ac taurino seuo. Itē ignem sacri ex aceto & oleo, vel psymnithio: carbunculū ex aceto. Nonnulli laserpitii vnā illini iubent, si- oleo, vel psymnithio: carbunculū ex aceto. Nonnulli laserpitii vnā illini iubent, si- ne quo epinyctidas pustulas cum cera. Testiū verō epiphoris cum ramis lauri teneris, adeo tuitæ eruptionibus cum cera. Testiū verō epiphoris cum ramis lauri teneris, adeo peculiari in visceribus his effectu, vt siluestri ruta cum axungia veteri illitos rami- ces sanari prodant, fracta quoq; mēbra semine trito cum cera imposito. Radix rutæ sanari prodant, fracta quoq; mēbra semine trito cum cera imposito. Radix rutæ sanguinē oculis suffusum, & in toto corpore cicatrices aut maculas illita emēdat. Ex reliquis quoq; quæ tradūtur, mirū est, cum feruentem rutę naturā esse cōueniā, fa- sciculum eius in rosaceo decoctū addita vncia aloes, perunctis sudorē reprimere, sciculum eius in rosaceo decoctū addita vncia aloes, perunctis sudorē reprimere, itemq; generationes impediri hoc cibo, ideo profluuiū geniali datur, & venerem crebrō per somnia imaginantibus. Præcauendum est grauidis, abstineāt hoc cibo, necari enim partus inuenio. Eadē ex omnibus facis quadrupedum quoq; morbis in maximo vsu est, siue difficilē spirātibus, siue cōtra maleficorū animalium ictus, in- fusa per nares ex vino, aut si sanguisugā exhauserint, ex aceto, & quocūq; in simili morborū genere, vt in homine tēperato. Hæc Plinius. A quo ciratus Hippocratis locus, is est: ὡθήγονον ἐρέσεια μέλλον, ἢ διαχωρέσει, καὶ συσπρίσιν ἐχέει τὸ πρὸς τὸ φάρμακον. Hoc est, Ruta vrinā magis quā aluum mouet. Ha- bet & vim quandā condensandi, & ad medicamēta noxia utilis est propinata. Sunt tamē codices qui vocem ὡσπινόμενον nō habeant. Galenus breuius vtriusq; vires sic tradit. Ruta agrestis ex quarto est ordine excalfaciētium & siccantiū, domestica ve- rō ex tertio. Est autē non solum gustu acri, sed & amaro. Ea digerere atq; incidere crassos lentosq; humores potest. Ob eandē vim & vrinas mouet. Quin & tenuium partiū, flatusq; extinguit. Quare ad inflationes cōpetit, ac veneris appetitū inhi- bet, digeritq; atq; exsiccāt sanē strenuē. Est enim ex eorū numero medicamētorum quæ valēter desiccāt. Harmalæ semen, auctore Dioscoride, cum melle, vino, croco, quæ valēter desiccāt. Harmalæ semen, auctore Dioscoride, cum melle, vino, croco, inquit Galenus, tenuiū est partiū & calida tertio ordine, quare crassos & lentos hu- mores diffecāt ac digerit, ac vrinam mouet. Scribit Serapio ex auctoritate Alhasari harmel purgari melācholiā & phlegma per aluum, & nullū esse aduersus epilepsia medicamentū valentius. Ex auctoritate Abugerig, prouocare vomitū & inebriare, si potui detur vini modo, id quod maximē cōfert in eo melancholiæ genere, quod illi Eros vocant. Vt autē vomitū prouocet, sic præparandū. Coniciūtur in morta- rium seminis eius grana quindecim prius clarissima aqua abluta, desiccātur, terun- tur in mortario, cribro transmittuntur. Deinde rursus in mortario pistillo ligneo, affusis aquæ fontanæ vnciis quatuor probē miscentur. Demum percoletur cremor, cui adduntur mellis vnciæ tres, olei sesamini aut amygdalini vnciæ duæ. Id omne propinatur melancholicis quibus excitat copiosas vomitiones.

GALEGA. CAP. XLV.

**B** EFFECTV & viribus potiùs quàm ab odore (nullus enim huic odor  
ruræ, sed leguminis, cui videtur similior) huic plantæ ruræ nomē indi-  
tū est. Est enim cōtra venena efficacissima. Dicitur aut ruræ capraria,  
& Galega ab herbariis, ab Italis quibusdā *Lauanese*. Caule & foliis: vi-  
ciæ siluestri quadātenus similis est, caule sesquicubitali, & bicubitali, rotūdo, duro,  
in quo folia à pediculis exeunt dena aut vndena, ferè vicie siluestris, sed lōgiora &  
maiora: flores in summitate cōgesti, dilucè carulei, aut cādidi, è quibus siliquæ erū-  
nt.

1  
NN 2



## GALEGA.

Locus.

Pena in  
Aduers.

Tempus.

Temper.  
& Vires

Ibid.



punt longa, graciles, rotunda, in quibus semen cōcluditur, radix satis magna, non facile emoritur. In scrobiū aggeribus, locisq; humetibus prouenit. In Pedemontana planitie iuxta Eridani fluēta, & Taurinū copiose luxuriat, passimq; alibi. In frigidioribus regionibus herbarij in hortis colūt. Iulio & Augusto floret, & semē maturat. Calida siccaq; est tēperie. Huic vis est maxima nō solum aduersus letalia venena, verū etiā aduersus ferarū omnium venenatos tum ictus tum morsus, succo eius epoto, vel herba emplastri modo vulneratis partibus imposita. Quare Veneti pharmacopœi, inquit Pena, atq; circulatorū illic fex, qui vyperas stipis colligēda causa circūferunt, simulatq; demorsū sunt, nihil certius hac aut pręstātius habent, eadē magis freti quā decantatis illis theriacis. Epotus recentis herbę succus datur vtiliter cochlearis mensura ad necādos intestinorū vermes. Idē pręstat herba ipsa in patella calfacta ex oleo amygdalarū amaram, aut ē lini semine, ac vmbilico adalligata. Laudant aliqui succū sesquiuncię pōdere

haustū pueris comitali morbo vexatis. Aduersus pestilentiam mirificē valet, quare hanc crudam quidem quotidie in acetariis vorant. Alij olerum modo coctam ex carnium iure edunt, nonnulli succum extrahunt, & ex vino hauriunt. Eiusdem succus datur in principio pestilentia affectis, aut eiusdem decoctum ex aceto, addita theriaca, aut armenia bolo. Sed ægros sudare oportet. Idem pręstat ad pestilentes febres, in quibus ex anthemata emerferint, pręsertim epoto herbę decocto ex aqua cum tormentillę radice, cardui benedicti foliis, & armenia bolo.

## ARISTOLOCHIA.

## CAP. XLVI.

Nomina



Lib. 3. c. 4.

Genera.


Lib. 25. c. 8.

Lib. 3. c. 4.

Forma.

Ἀριστολόχια Græcis, Aristolochia Latinis, Barbaris & Officinis corrupto nomine Aristologia, Arabibus *Zaraund*, *Masmocra*, seu *Zaraund*, Gallis *Sarrasine* & *foterne*, Germanis *Osterlucey*, & *Holtuurtz*. Dicta autem est aristolochia, auctore Dioscoride, quod sit ἀριστή τῶν δόχτων, id est, optima puerperis, nō grauidis, vt Plinius ait, quod remoratos menses, hærentes secūdas, & reliquias omnes à partu expellat. Sunt enim δόχται partus dolores, & ipsę mulieres parturiētes, & δόχια partus purgamēta. Dioscorides & alij Græci aristolochiæ tria esse genera statuūt. Vna est quę rotunda, & fœmina dicitur, altera longa & mascula, tertia clematidis, id est, fœmēritia appellatur. Plinius his tribus generib; quartū addit, ac pistolochiā & polyrrhizon vocat. Tria genera sic describit Dioscorides. Aristolochia rotunda, quę fœmina vocatur, folia hederacea habet, cum acrimonia odorata, subrotunda, tenera, multis ab vna radice germinibus, sarmenta illi sunt oblōga, flores candidi, pileolis similes, quod in ipsis rubet, grauiter olet. Radix est rotunda, rapo similis. Aristolochia longa mascula appellata, à nōnullis dactylitis, folia lōgiora quā rotunda habet, ramulos tenuēs, dodrātales, florē purpureum graeolentē, qui cum defloruerit, piro similis fit, radix digiti est crassitudine & dodrantalis, aut etiā maior. Tam huius quā prioris radix colore est intus buxœo, gustu amaro, & odore viroso. Tertia etiā longa, quę & clematidis vocatur, caules profert tenuēs foliis subrotundis refertos, (ἀστὴς μίση ἐμβόσι) habent vulgata exēplaria, id est, semperuiuo minori similib; sed legendū, vt annotat Dodon. ἀστὴς ἐμβόσι, μίση.



*ARISTOLOCHIA Femina,*  
*sive rotunda.**ARISTOLOCHIA Longa,*  
*Math. Clematidis Pena & Lob.*

do, prolixioribus tamē, & ex atro flauētib. Adhæc toto habitu aliquāto minor est: verū gratior eius odor multò, & magis aromaticus: nulla alia neq; folij, neq; florum aut pomorū differentia, vt neq; seminis. Clematidis radix est exilis, odorata, multò proceriore fruticat sarmento, viticeo, cubitali, flore luteo, caule cubitali, fructu ob-

μικρά, id est, asaro similibus, paruis. flores ruræ, radices longiores, tenues, cortice crasso & odorato vestitos. De iisdē & Pistolochia sic scribit Plinius. Inter nobilissimas aristolochiæ nomē dedidisse grauidē videtur, quoniā esset ἀεικνισσός. Nostri malū terræ vocāt, & quatuor genera eius seruāt. Vnum tuberibus radicū rotundis, foliis inter malū & hederā, nigrioribus, mollioribusq;. Alterū masculæ, radice lōga, quatuor digitorū longitudine, baculi crassitudine. Tertiū lōgissimæ tenuitatis, vitis nouellæ, cui sit præcipua vis, quæ clematis vocatur, ab alijs Cretica. Oēs colore buxæ, caulibus paruis, flore purpureo, ferūt bacculas paruas vt capparidis. Valēt radice tantum. Est & quæ pistolochia vocatur, quarti generis, tenuior quā proximè dicta, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidā Polyrrhizon cognomināt. Odor omnium medicatus, sed oblongæ radici tenuioriq; gravior: carnosus enim est corticis, vnguentis quoq; nardinis conueniens. Has quatuor aristolochias medici & pharmacopœi Monspelicienses dudum notissimas & vsu receptas habuerunt. Id quod etiā affirmat Pena. Ac primū, inquit, animaduertat rei herbariæ studiosus tantā esse triūm, rotundæ, longæ, & pistolochiæ Plinianæ in folijs, caule & flore similitudinē, & tam parem formā, vt ne perspicaciori quidē & excercitatori interdū liceat nō decipi. Nam foliū omnibus ferē rotundum, magnitudine fermè pari, è caule lento, flexili: floribus color partim ex luteo nigricat, forma omnibus eadē. Vnde discriminē vel attentius intuenti vix patet inter trēs istas aristolochias, nisi radix centiorē faceret. Rotundæ radix rapo similis, iam valde nota Italiæ & Galliæ Narbonēsi. Folia aliquantū rotundiora, & nigriora quā longæ aristolochiæ, nō pistolochiæ, vt plurimū: nam situ mutari possunt & solent, flores itidē vt folia, obscuriores: per menses turgent lagenulæ nuci muscatæ pares, semine fusco prægnates, ad basim cōpresso, & apice donato. Aristolochiæ lōgæ radix forma digiti cum pusilla, qualē videtur describere Dioscorides, cum verò prouecta, quadruplò maior, foris colore fusco vel atro, intus flauo, cœtaurij magni colore. Pistolochiæ radix multis est fibrata capillamentis ellebori modo,

Lib. 2. c. 3.

In Aduers.



longo, magnitudine parui oui, semine intus lato. Hæc in vineis plurima reperitur, & aruis frigidioribus reliquæ Gallia, ac Italia: Germania etiã & Flandria spõte natam habet. Matthiolus & Pharmacopœi genuinã longã esse cẽsent. Hanc falsõ mul-  
 ti crediderũt esse, quæ ab Andromacho & Galenõ ἀριστοχία λεπλή, id est, aristolochia tenuis dicitur, theriacis aptior, quæ est aristolochia polyrrhizos, tũ suavi odoris gratia, tum medicata efficaciore facultate præferẽda rotundã, & longã, nedũ clematidi, quæ viribus inferior est. Dodonæus Aristolochiæ species quinque cõstituit, Rotundã, Longã, clematitim, Pistolochiã, Aristolochiam Sarracenicã. Clusius quatuor. Rotundã quidẽ, Longam, Pistolochiã easdẽ, quas Dodonæus, Clematitim verò duplicẽ fecit, priorẽ eam quæ à Dodonæo Aristolochia Sarracenicã dicitur, alterã quæ eidem Dodonæo etiã est Clematidis. Rotundã vnicã speciẽ veteres fecerunt Anguillara plures inueniri scripsit. Clusius duas dũtaxat se obseruasse ait. Prior hie picta multis ex vna radice germinibus, cubitalibusq; interdũ palmitibus cõstat, quæ drangulis, quibus ex interuallis folia hæret mediæ inter maluã & hederã magnitudinis, mollia, venosã, ex viridi nigricãtia, breui pediculo: his incumbũt oblongi flores, cauitubẽ modo, ex purpura nigri teste Dioscoride (ἀνθη λευχὰ, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἐρυθρὸν δισσωδές, inquit Dioscorides, id est, flores albi, in quibus quod rubrũ est grauitè olet: qui florũ color sequẽti rotundã magis cõpetit) quorũ labrũ prominulum seu extima pars latior est quã in lōgã aut clematidis flore, & tũta nigricãs. His succedit fructus rotũdus, parui melopeponis forma, q̃ multa grana cõtinet ordine disposita, lata, nigricantia, Radix ampla, tuberosa, rugosa, cortice crasso, foris nigro, intus buxæo colore. Nascitur pingui solo, in pratis, & humidioribus agrorum marginibus. Hispaniã, & Gallia Narbonensis, atq; etiã Italia. Floret in calidiorib⁹ regionibus ineunte vere, alibi Maio & Iunio. Altera ramulis seu palmitib⁹ prioris, foliis ferẽ Lōgẽ forma & colore, sed maioribus, longiorẽq; quã superioris pediculo: flos longior, ex albo purpura scẽs, intus nigricãs, Longẽ flori similis: fructus priore lōgior, & piri modo turbinatus, gracilior tamen quã Longã, semine prioris, rufo, minore radice tubere, in reliquis superiori simili. Longam Clusius eandẽ quam Dodonæus & Pena,

ARISTOLOCHIA Rotunda  
 Dodon. & Clusj.



descripsit, cui cauliculi quadrati, duos palmos lōgi, interdum longiores, multis alis brachiati, & humi vti rotundã diffusi, folia quàm illius minora, firmiora, dilutiorẽ colore, longiorẽque pediculo, Soldanellæ ferẽ forma: flos oblōgus concavus, ex viridi candicãs, rotundã alterius effigie, sed extima parte colore magis herbaceo, intus vt in reliquis hirsutus, fructus piri instar turbinatus, qui per maturitatẽ reliquarum Aristolochiarũ modo dehiscẽs, semen ostẽdit latũ & rufum. Huius radix digiti est crassitudine Dioscoridi, & dodrãtali lōgitudine, quod de triẽnibus & iuniorib⁹ plãtis intelligendum putat Clusius: nam adularum longẽ amplior est magnitudo: multas enim se eruisse asserit, quæ crassitudine brachiũ, longitudine dimidiũ cubitũ æquarent. Adultæ verò omnes plerũque extrema parte obtusæ sunt, æquali ferẽ per totam longitudinẽ crassitie & citra extremũ ramosæ: iuniores gracilescunt, multasque fibras habet. Prouenit locis cãpestribus in Gallia Narbonensi. In longa etiam



*ARISTOLOCHIA**Longa, Dodon. & Clusij.*

etiam differentia quædã obseruari potest. Nam Hispanicæ (tamen si huic per omnia similis) flos diligentius inspicientibus nonnihil differre videtur, quippe cuius extima pars interiore parte purpureicoloris sit, qui in alia herbaceus est: radix item huius extrema parte, non ut alterius gracilis est in nouellis plantis, sed plerumque obtusior. Nascitur inter vites in Hispania, agro Valentino frequentissima, ubi Martio floret, & semen fert: alibi frigoris impatiens. Clematidis supradictas magnitudine superat, caule firmo, rotundo & striato, supra cubitali altitudinem assurgente: huius folia reliquis multo ampliora, ex viridi pallescentia, longo pediculo, forma Longa referentia: flos pallidus, copiosus, Longa propemodum forma, quo dilapso fructus subsequitur reliquis maior, exigui mali magnitudine, semen continens, ut reliquarum Aristolochiarum. Huius radix quæ reliquis cum grauitate quadam odoratior est, tenuis, & nunquam ad minimi digiti crassitudinem accedens, longè lateque serpit, & altissime mergitur, adeo viuax, ut etiam frustulatim coccisa facillimè renascatur.

Loca amat editiora, & nonnullis Gallie Narbonensis vinetis adeò frequēs, ut vina ab ea ingratum saporem contrahant. Inuenitur & in plerisque aliis Gallie, Hispanie, Germanie & superioris & inferioris locis. Floret quo reliquæ tempore. Hæc pro legitima Longa à plerisque usurpatur, Gallis *Sarrasine*, Narbonensibus *Foterne*.

*ARISTOLOCHIA**Longa, Fuchij.**ARISTOLOCHIA Sarracenicæ**Dodon. Clematidis prior, Clusij.*



Huc refert Clusius id Aristolochiæ genus quod circa Hispalim itinere Olyssiponenſi, plurimiſq; aliis Baticæ locis, vbi *Sarça parilla* nominat, in dumetis, vepribus, & vetustis quibuldā oliuetis obſeruauit, lōgis, venoſis, tenuibus, ſtriatifq; ſarmētis, quibus vicinas ſepes & interdū arbuſculas ſuperat, iis ſeſe cōuoluens & implicans cōuoluuli, aut lupuli modo. Folia illi Aristolochiæ generibus ſimilia, ſiue potiùs Hederæ, firma, in extremo acuminata, ſupernè læuia & viridia, infernè ex purpura albicātia, pediculo longo: flos Aristolochiæ lōgæ, recuruus, oblongus, ex purpura niger, intus tenui lanugine plenus, longiſſimo omnium pediculo inſidens: fructus reliquis Aristolochiis ſimilis, ſemē etiam ſimile: radix prælōga, ſarmēticia, Smilacis aſperæ modo (cui perſimilis eſt) nunc per ſumma ſerpens, nunc altè ſub terra ſeſe condens, colore pallido, nō ingrati ſaporis, ſed guſtu aliquantulum adſtringentis cū manifefto calore. Tota planta odorata eſt, ſemp̄q; iſtic viret, Ianuario, Februarioq; florēs. Naſcitur pingui ſolo, iis qui dicti ſunt loci. Huius neminem meminifſe ait Cluſius, præter Belloniū, qui in Creta ſe obſeruafſe ſcribit. Dodonæus tamen eandē Clematidis nomine depinxit. Piſtolochia Dodonæi & Cluſij eadē eſt, quæ

Li. i. Obſer.  
cap. 17.

*ARISTOLOCHIA Clematidis, Dodonæi.*



cauliculus magna ex parte pedales habet, nōnunquā maiores, anguloſos, ſtriatos, Aristolochiæ longæ modo ramoſos, ſed tenuiores: folia lōgæ ſimilia, nigriora, minora, rugoſiora, & aliquātulum in ambitu ſinuofa: florem rotundę priori ſimilem, minorem tamē,

*PISTOLOCHIA, Cluſij.*



*PISTOLOCHIA, Dodon.*




& aliquando



& aliquando nigrū, aliquando ex herbido luteū: fructū rotundæ similitudine, sed minorem, semen etiā simile. Dēsis est radicis capillamētis, iunci, vt Plinius ait, plenioris crassitudine, buxæ colore. Prouenit in oliuetis, & petrosis Hispaniæ Galliciæq; Narbonēsis locis. Serius floret reliquis Aristolochiarū generibus: ac hoc peculiare eius fructus habet, vt dū maturuit, ea qua pediculo adhæret parte dehiscat, Longæ verò ab extrema parte. Aristolochia rotunda, vt Dioscor. scribit, cōtra alia venena valet. Longa verò drachmæ vnus pondere cum vino pota & illita, aduersus serpentes & letalia. Menses, fœtus, & omnia in vtero cōsistentia partus purgamenta cum myrrha & pipere pota, & illita pellit. In pessō subdita eadem efficit. Rotunda ad eadē omnia ad quæ prædicta conducit, ampliusq; asthmatis, singultui, rigori, lienī, ruptis, conuulsis, laterisq; doloribus ex frigida aqua pota auxiliatur. Surculos & spicula extrahit: squamas osiū illita educit, putrescentia circū exest, ac veluti scarificatu separat, sordida vlcera expurgat: caua cū iride & melle explet: extergit gingiuas & dentes. Creditur & Clematis ad eadē prodesse, viribus tamē inferior est. Valent radice tantū, inquit Plinius. Rotunda cōtra serpētes. Oblonga tamen in summa gloria est, si modò a cōcepta admota vuluis in carne bubula mares figurat, vt traditur. Quæ polyrrhizos cognominatur, conuulsis, ruptis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua vtilissima esse proditur: semine pleuriticis & neruos cōfirmare, excalfacere. Et alio in locō. Plurimis modis Aristolochia prodest: nā & menses & secūdas ciet, & emortuos partus extrahit, myrrha & pipere additis, pota vel subdita. Vuluas quoq; procidētes inhibet forū, vel suffitu, vel subiectu, maximē tenuis. Et vulneribus capitis medetur Aristolochia, fracta extrahens ossa, & in alia quidē parte corporis, sed maximē capite: similiter pistolochia. Sed de his distinctius Galenus scripsit. Aristolochiæ radix ad medicationes vtilissima est, amara & subacris. Sed ex illis tenuissima est rotunda, & in omnibus efficacior. Aliarū verò duarū Clematis vocata magis odorata est. Itaq; ea ad vnguēta vtūtur, sed ad sanationes infirmior. Lōga verò minū tenuis est quā rotūda, sed nec ipsa inefficax: verū abstergēdi & calefaciēdi facultatem habet, minū tamē quā rotūda abstergit, atq; digerit, sed nō minū calfacit, imo fortassis etiā plus. Itaq; in quibus vsus est mediocriter abstergere, cōmodior est longa quemadmodū in carnis exulcerationibus, & in vteri fomentatu. In quibus autem crassum humorem validiū extenuare oportet, illic vsus est rotūda. Quapropter dolores ab obstructione aut crassitie crassorū flatuū natos magis curat rotūda, & surculos extrahit, & putredines sanat, & sordida vlcera expurgat, ac dētes gingiuasq; cādidas efficit. Auxilio est asthmaticis, singultietibus, comitialibus, podagricis cum aqua frigida pota. Ruptis etiā cōuulsisq; vt si quod aliud medicamentū, idonea est. Paulus Æginet. Aristolochiā Clematitim inter medicamēta simplicia quæ bilē purgāt, recenset. Ætius pituitā ac bilē vacuare scribit. Cū igitur Clematidis, inquit Clusius, huiusmodi facultatibus prædita sit, & illius vsus in omnibus ferē iis mōrbis commendetur, quibus vtilem suam *Sarzam parillam* scribunt Hispani: Clematidis itē illa peregrina, & Clusij iudicio legitima, multis notis cum Sarzæparillæ descriptione cōueniat, & eodem nomine ab incolis donetur, in ea ferē est sententia Clusius eam esse veram Sarzamparillam, aut illi congenerem plantam.

RHODIA RADIX.

CAP. XLVII.

 Græcis ροδια ριζα dicitur, à Latinis Rhodia radix ἀπὸ τῶν ρόδων, id est, à rosis, quarum odorem spirat, vt Latine Rosea radix dici possit, Gallicè *Racine sentant les roses*, Germanicè *Rosenwurtz*. Hanc paucis perstrinxit Dioscorides, Rhodia radix, inquit, nascitur in Macedonia, costo similis, sed leuior, & inæqualis, quæ cōrta rosas redolet. Hanc sic depinxit, & pluribus notis deliniauit Matthiolus. Caules edit rotundos, quadam

Lib. 3. ca. 4.  
Vires &  
Temper.

Lib. 25. c. 8.

Lib. 26. c. 35.

Lib. 25. c. 11

Li. 6. simpl.

Lib. 7.

Nomina

Li. 4. ca. 41.

Forma.

Ca. 41. li. 4.

tenuis



renus cauos, cubirales, à quibus circūquaque folia prodeunt longiuscula, in acutum desinētia, portulacæ aut sedi instar pinguia, minutimq; per ambitū ferrata.

*R H O D I A Radix.*



*Locus.*

*Lib. 4. c. 41.*

*Vires ☉*

*Temper.*

Etus, aut ex amaraci aqua fronti temporibusq; illinatur, præterea cū cerebrum roborēt odoris iucunditate, temperatis qualitatibus præditam esse verosimilius est, quā secundo excessu, aut tertio incipiente calidam esse.

*S A L I V N C A Neapolitana.*

*C A P. XLVIII.*



**S**ALIVNCAE hoc genus Neapolimissum, in Apulia montibus nascitur. Quidam folium odoratum esse putant, à Malabathro diuersum, quod apertissimè monstrat Iurisconsultus, lib. 39. Digest. Titulo, de publicanis & vetigalib. Cæterum eos falli ex eo perspicuum est, quod & folium & Malabathrum Indis peculiararia sint, & ad nos inde vehi soleant. Pharmacopœi quidam Itali eam pro folio Theriacæ immiscent, quā rectè, ij viderint. In tam exigua planta conspicua est radicis crassities, rugosa, utcūque flauescētis, in nodos extuberantis, fibris capillatæ ē quorū lateribus hinc inde folia prodeunt, ut ex ea figura serpere radicem, & æditis illis nodis sese propagare non abs re existimem. Folia illa oblonga sunt, angusta, plātagini utcūque similia, in fernē arcta, superne latiora. Saporē & odore planta ista Valerianam refert, ut non dubitem ob odoris

suauitatem, & saporis qualitatē egregiis aduersus morbos variis facultatibus præditam esse, ac folij loco substitui posse.

HISTO





# HISTORIAE OMNIVM PLANTARVM

LIBER NONVS,

*In quo planta omnes quæ in Palustribus proueniunt,  
probe describuntur & ad vinum depinguntur.*

IVNCI, CAP. I.



VSTRANDIS agris potissimū per messes conceptos ætus frigidis solemur vmbris palustrium plantarum, & earum quæ in umbrosis, vdis, vliginosis & pingui- bus gignuntur, quæ magna ex parte, aut foliū in me- dio carinatum, & tanquā ex foliis duobus coagmen- tatum habent, vt Arundo, butomus, cyperus, aut in- trinsecus amplo meatu pertusum, vt iuncus, animad- uertendo errore nostrorum exemplarium, in quibus apud Theophrastum legitur, cap. 16. lib. 1. Histor. καὶ τὸ μέσον οἶον τρύπις, ὅθεν τοῖς ἄλλοις, &c. cum legendum sit,

οἶον τρύπις ἐνδοθεν δὲ τοῖς ἄλλοις, &c. In hoc tamen secessu minimè simus otiosi, sed varias iis in locis plantas disquiramus, tum quæ à veteribus, tum quæ à recentiori- bus sunt obseruatæ, factæ ab iis quæ notiores sunt initio. Quæ autem plāta Iunco notior? Dicitur is Græcis Σχοῖνος à loris & funibus, sicut Latinis Iuncus à iungendo, Arabibus *Dis*, Gallis *Ionc*, Italis *Giunco*, Hispanis *Iunco*, Germanis *Bintzen*. Dio- scorides Iunci genera ponit his verbis. Iunci duo genera: vnum leuiss nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera. Vnum sterile, alterum fert semen nigrum, rotundum, & crassiore constat calamo, carnosioreq;. Tertius est Iuncus qui vocatur Holoschænos, &c. Galenus aliter ea genera distinxit. Schænos *ἑτα*, inquit, quædu oxyischænos, alia holoschænos nuncupatur (deprauatè tamen in vulgatis codicibus legitur oligoschænos) Graci- lior duriorq; oxyischænos, crassior laxiorq; holoschænos. At oxyischæni duæ sunt species, altera sterilis, altera semen fert, &c. Theophrastus verò sic: ἔστι δὲ αὐτῶ (χοῖνος) τέταρτον, καὶ ὅτι περὶ τῶν διωρισμένων. ὅτε ὁξύς καὶ ἀκαρπός, ὃν δὴ καλεῖσιν ἄρρενα, καὶ ὁ ἀκαρπός, ὃν μεγαγυρανὶ καλεῖσιν, διὰ δὲ μέγεθος τὸν καρπὸν ἔχον. παχύτερος δὲ τῶν καὶ ἀκαρπότερος καὶ τέταρτος τῷ μεγέθει, καὶ τῇ παχύτητι καὶ ἀκαρπία διαφέρων ὁ καλεῖσιν δόχοιμος. Quæ Plinius his verbis expressit. Tria genera eius (Iunci) acuti, sterilis, quem marem, & oxyn Græci vocant: reliqua fœminini, ferentis semen nigrum, quem melancranin vocant. Crassior hic & fruticosior: magisque etiānum ter- tius, qui vocatur holoschænos. Sunt igitur Theophrasto & Plinio, Iunci genera duo. Oxyischænos mas, Oxyischænos fœmina. Tertium holoschænos, vt non sit oxyischæni species. Ex quibus suspicari licet corruptos esse vulgares Dioscoridis codices, in quibus Iuncus in læuem & oxyischænum distribuitur: Oxyischænos in sterilem, frugiferum, & in tertium holoschænum. Hic enim tertia Iunci species statuitur

*Nomina*  
Lib. 4. c. 47.  
*Genera.*

Li. 8. simpl.

Lib. 4. hist.  
ca. 13.

Li. 21. ca. 18.







aquatici, alius est *λαῖος*, laevis, alius *τραχύς*, idest, asper : alius fastigio acutiore, alius obtusiore. Iunci palustris laevis & *ἀπὸ ξέως ἐπ' ἀκροῦ*, idest, in fastigio : acuti alius est oxyrchænos, alius holoschænos. Iam verò oxyrchænos duplex est. Alter mas nullo femine foecundus, alter foemina nigrum semen ferens, Melancranis nominatur. Ad hæc genera permultæ Iuncorum palustrium species referuntur: de quorum multis hîc tractabimus. Iuncus laevis oxyrchænos, vulgaris, foliorum loco stilos, seu culmos, seu virgas profert rectas, rotundas, tenues, laeves enodes, cubitū

Forma.

## IVNCVS Lævis &amp; Oxyrchænos. Dodo.



## IVNCVS Melancranis.



& sesquicubitum altas, herbaceo colore virentes nitentisque, acutis cuspidibus mucronatas, candida medulla refertas, ellychnium referente, & vsu supplete. Radiculæ ei quàm plurimæ, tenues, fibratæ, inter sese implicatæ. Mas nullum fert fructum, foemina paulò infra cacumen edit, ab vno latere findente sese Iunco, in parvis breuibûsque petiolis, coherentium parvarum vuarum modo, in quibus semen nigrum, exiguum, cuspidis effigie. Huic aliud Iunci genus proximum est, paulò brevius & crassius, ex quo medullam prorsus niueam extrahunt, tum ad lucernarum lumina, tum ad candelabra, aliaq; id genus ingeniosè confingenda, quod facillè in spiras duci, atque in se flecti & cōplicari possit. Hæc duo genera in quibusvis stagnantibus & palustribus aquis nascuntur. Iuncus laevis Dodonæi secundo loco hîc pictus est, alba quoque

Lib. 4. c. 52.

medulla plenus, longa, ad lucernas vtili. Iuncus oxyrchænos eiusdem priore loco depictus superiore paulò asperior & durior, parū medullæ intus habens & minùs solidæ atque inutilis, locis deliuiis & aquosis provenit. Iuncus oxyrchænos foemina quam non *μελαγκρανισμὸν*, vt corruptè legitur in vulgatis exemplaribus, sed *μελαγκρανίδα* Theophrastus vocat, Gaza atriferum vertit, alij haud foelicius atricipitem, radices capitatas profert, capis & gēthyis similes, non omnino rotundas, sed qua parte aliæ aliis adherent & incumbunt, leuiter compressas, cortice nigro obductas, quæ infernè & ad latera radículas emittunt, in vnum cespitem, sicuti in asparagis coaceruatas. Inde prodeunt scapi seu scirpi multi, sesquicubitales, nigra tunica propè radices coniecti, qui infra cacumen pedis ferè spatio extumescunt veluti clauā concipiunt, deinde pariunt ovo quid simile. Id porro hians petiolos multos emittit, in quorū vertice mēbranosa & rotunda vascula, oblique

OO



Lib. 4. hist.  
ca. 19.

Lib. 11. c. 18.

adnexa in quinque veluti radios fissa, fructum continent angulosum, nigrum, cuspidatum, minutissimis feminibus & luteis plenum, saporis aquei & subausteri. Hæc cum diligentissimè Theophrastus expresserit, non possum non eius verba adscribere, tum vt Theophrasti Melanranin à nobis hîc depictam, tum vt locum eiusdem leuiusculis aliquot mendis correctis & interpretatione nostra illustriorem factum fuisse omnes intelligant. Κορυὴν δὲ ὁ χαρπύμιος ἐχθρὸν (κορυμνὰ δὲ ὅλως ὁ χαρπύμιος falso habent exemplaria) ἐξ αὐτῆς τῆς γραμμίδος ἐξοδησας. κατεῖχε δὲ αὐτὴ καθὰ πρὸς αὐτὴν μὲν δὲ ὁ χαρπύμιος ἐχθρὸν τὴν περὶ τὴν ἀκρὴν μίχρως, ἐφ' ᾧ δὲ αὐτῶν παραπληγὴς τὰς τῶν ἀκρῶν ἐχθρὸν τὴν περὶ τὴν ἀκρὴν μίχρως (alii ἐπιχρῶσας legunt) ἐν τῇ τοῖς ἀκρῶν ἀκιδῶδες ἐστὶ μέλαν, πρὸς μέρους τῶν τῶν ἀκρῶν, πολλὴν ἀμυγνότερον. Quæ sic Gaza conuertit. Omnino frugifer in callum de regulari furculo ipso tumescens, mox veluti oua parit, circundantes enim spicatum pediculos Iuncu lineari affixos initio gerit: quorum summitatibus paululo laterales orbes vasculorum leuiter hiscentes inducit. His semen exiguum, effigie cuspidis sagittarum ingerit, nigrum, non absimile semini herbe inguinalis, verum exilius. Dilucidius verò sic. Fœcundus Iuncus virgato lineis fastigio extumescens, velut clauam in summo gignit, deinde quasi oua parit. Etenim ex vno principio, pediculorum virgas spicarum modo congeatas profert, & in earum vertice paulum à latere hiantia vascula rotunda, in quibus semen cuspidis figura, nigrum, asterisco simile, sed fugacius. Hactenus Theophrastus, qui de Iuncu fœmina adiicit. ἡ μὲν οὖν μελαγκρανὶς αὐτῆς τῆς χαρπύμιος, ὁ δὲ ὅξυς καὶ ὁ λοσχένος ἐκ τῆς αὐτῆς φύου: quæ Plinius sic transtulit. Melanranis sine aliis generibus nascitur. Oxys autem & holoschænos eodem cespite. At quæ de holoschæno mox subiicit. Fert fructum ouorum cohærentium modo, Theophrastus non de solo holoschæno fœcundo, sed etiam de oxyschæno frugifero dictum esse vult. Iuncus Melanranis nascitur in aquosis & pinguibus locis, sed pura & præterfluenta aqua ferè madentibus. Iuncum alium fœcundum

## IVNCVS Clauatus, Dalech.



hîc ex Dalechampio exhibemus, quem Clauatum meritò nuncupauit. Radix huic geniculata, graminis aut arundinis modo serpit, contra Iuncorum aliorum naturam, ex qua scirpi cubitales exeunt, in ipso exortu cortice rubro aut subrubro contexti, fungosa medulla, sed tenui pleni, extremo fastigio exiguum veluti clauam proferentes, plantaginis flori non absimilem, sed breuiorem & multò minorem, nec ita perspicuis granulorum notis distinctâ, quæ Maio & Iunio mensibus florem mittit villosum & candicantem. In cœnosis & stagnantibus aquis nascitur. Sapor totius plantæ aquosus & fatuus. Idem qui Lobellio Iuncus aquaticus minor capitulis equiseti dicitur. Holoschænus maior, crassior & carnosior est supra descriptus: cuiusmodi est qui hîc exhibetur, radice innixus crassa, lignosa, nodosa, infernè fibras infinitas producente, rufo cortice obducta, ex qua scirpi exeunt permulti, quâ radici inhærent capitati gethyorum modo, & ibidem rufa tunica operiti, duobus cubitis altiores, sæpe tricubitales, superioribus duplò crassiores, fungosa medulla farcti, in vertice valido mucrone pungentes, tribus digitis infra verticem scapi dissiliunt, petiolosque multos edunt, foris læues ac teretes, intus veluti canaliculati



## HOLOSCHOENVS.



## HOLOSCHOENVS

Altera.



prælatumq; inferius, tegumentisq; subrubris intectum constet. Ergo proprium his radicibus euenit, si quidem per annos exarescant, ac desuper generentur. Quæ fortassè rectius sic dici possent. Radicem longam habet holoschœnus, & multò crassiorē Iunco acuto, quæ omnibus annis intermoritur: deinde altera rursus ex Iunci capite renascitur: id quod cuius intuenti perspicuum est, alias nimirum

canaliculati, rotunda serentes capitula, quibus mense Iunio flos capillaceus & candicans infidet, egregiè desiccans cum læui adstrictione. Gaudet limoso solo stagnantibus aquis operato, quod æstate ficcari solet. Potest etiam verus Theophrasti Holoschœnos dici, qui hîc pictus datur, radice superiori simili, crassitudine ferè cubitali, cortice nigro intecta, intus candida, dulci, gustu castanearum, præsertim si quis tenella eius germina degustet, scapis proceritatem hominis æquantibus, sæpè excedentibus, minimi digiti crassitudine, medulla refertis. In summo prorsus vertice scirpi recluduntur, patefactiq; foras extrudunt petiolos intus canaliculatos, foris teretes vt in superiore genere, summo apice multos veluti iulos sustinentes, rufos, squamatim compactos, metæ figura, nimirum infernè latiores, supernè acuminatos, sæpè quinos, interdum plures, interdum pauciores, qui semen cōtinent milij magnitudine, altera parte cōpressum, altera do:so elato prominens, subausteri saporis. In perennibus aquis, interdum in solo arenoso prosilit. Qui natare discunt, huius scirpos in fasciculos colligunt, & alis subiiciunt, quos Galli *Nagei- res* vocant, quasi natantium, vel natare discantium adminicula. Theophrastus cum tam de holoschœno quam oxyechœno sæcundis, quæ suprà posuimus, dixisset, subiicit de holoschœni radice. *ρίζαν δὲ ἔχει μακρὰν καὶ παχύτην πολὺ τῆ ὀξύσχοινης ὥσπερ δὲ ἀνάνης καὶ ἑκάστου τὸν ἐν ἁλυσί. Εἰθ' ἑτέρα πάλιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τῆ σχοίνης καθεῖ.* τὸ δὲ καὶ ἐν τῇ ὀψὲ φανερόν ἐστιν, τὰς μὲν αὔρας, τὰς δὲ χλωρὰς καθεμέναις. ἡ δὲ κεφαλὴ ὁμοία τῇ τῶν κρομμύων, καὶ τῇ τῶν γηθύων, συμπεφυκῆ πῶς ἐκ πολλῶν εἰς ταὐτὸ, καὶ πολλὰ τεταγμένωθεν, ἔχουσα κελύφη ὑπὲρ ὅρα. συμβαίνει δ' ἀν' ἴδιον ἐπὶ τῶν ριζῶν, ὅτι ἀνάνης καὶ ἐν ἁλυσί, ἔῃ τῆ ἀνάνης πάλιν ἡ γένεσις. Id est, Gaza interprete, Radice lōga adhæret, multoq; crassiore quā acutus. Hac omnibus annis moritur, dein altera rursus à Iūci cacumine defigitur: quod vel visu percipi facile potest: quippe aliæ sicca, aliæ virides demissæ cernuntur. Caput cepis & gethyis simile, vt pote quod in vnum ex pluribus conglobatum

Lib. 4. hist. cap. 13.



radicum fibras aridas, alias virentes esse. Caput cepis & gethyis simile, ex pluribus coagmentatum, infernè latum, rubris tunicis opertum. Ergo his radicibus id peculiare est, quod singulis annis emoriantur, & rursus supernè ex radicis capite repullulent. Horum nonnulla Plinius, & eum, opinor, secutus Gaza rectè neque intellexisse, neque conuertisse videntur. Quas enim ille ex radicum capitibus radices quotannis exarescentes repullulare scribit, Plinius ait nasci ex semetipso cacumine in terram defixo. Grandis Iuncus in lacubus & stagnis nascens, Cordo holoschænos dictus, aliis Iuncus latus palustris, ex radice obliqua emergit, fibris permultis capillata, ex qua folia lata admodum, & scapi, in quibus folia

L. 21. c. 18.

## IUNCUS Latus.

Ca. 12. li. 4.  
Dioscor.  
Lib. 2. c. 18.In Coroll.  
cap. 55.  
Li. 4. Dios.Ibidem.  
Li. 16. ca. 37.

alia etiam lata per intervalla disposita, quò propius ad verticem accedunt, eò minora, omnia sensim in angustum desinentia, ensis figura. In summo scapo flores eminet, deinde semen. Hunc Iuncum Cordus Mariscum. Latinis dici putat, de quo Plinius. Similia præcipit & de Iunco quem Mariscum appellant, ad texendas tegetes. Alij eum qui proximè depingetur Mariscum esse censent. Est enim vterque prægrandis & ad texendum aptissimus, ductilis ac vietus. Hermolaus holoschænum Mariscum à magnitudine Latinis dictum putat, quemadmodum & Mariscas ficus, auctore Festo, quæ Græci Busyca, hoc est, grandiores & fatuas ficus. Huic adstipulatur Gaza, qui Theophrasti holoschænum semper mariscum interpretatus est. Cui verò Iuncorum generi scirpum adscribemus? Videtur, inquit idem Hermol. palustris Iuncus idem cum scirpo esse: de iis enim sic scribit Plinius. Nec in fruticulis, nec in veprium cauliumve, neque in herbarum, aut alio villo quàm suo genere numerentur iure scirpi fragiles palustresque, ad tegulum &

tegetes, è quibus detracto cortice candelæ luminibus & funeribus feruunt. Firmior quibusdam in locis earum rigor. Namque iis velificat non in Pado tantum nautici, verum & in mari piscator Africus, præpostero more vela intra malos suspendens. Et mapalia sua Mauri tegunt: proximèque æstimanti hoc videantur esse quo inferiore Nili parte papyri sunt usu. Hæc Plinius. Ob quæ, inquit Hermolaus, sunt apud nos qui scirpos, interpretentur, quos Græci biblos, id est, papyros vocant. Sed fruticosi generis sunt enodes, & sine fronde scirpi, laues procerique, ut Festus ait: unde proverbiū quoque natum, nodum in scirpo queri, quod in anxio dicitur, nimisque diligentem ac meticulosum, quo Terentius in Andria usus est: ubi Donatus, Iunci species est scirpus, inquit, lauis atque enodis. Haudquaquam silentio prætereundus est Iuncus ille eximius, ab aliis diuersus, quem Matthiolum à speciosis floribus Iuncum floridum appellavit, Dodonæus in Historia stirp. pro Sparganio depinxit, & descripsit, In frument. Hist. Gladiolum aquaticum seu palustre nominavit. Belgæ Unster lisch. Folia à radice multa emittit, acori palustris angustiora longioraque, inter quæ caulis medius exit, duos cubitos longus, lauis, æqualis, sine vllis geniculis, in cuius summo multi erumpunt flosculi, longioribus pediculis infidentes in purpura diluti, in quibus stamina exigua crocei coloris: sequuntur capitula purpurea, ferè rotunda paruarum pilularum instar, & in eis semen minutum. Radix crassa, cadida geniculata


Ca. 47. li. 4.  
Lib. 2. c. 38.



IVNCVS Floridus, Matth.



IVNCVS Asper, Dodon.



culata, quamplurimis fibris capillata. Nascitur locis palustribus in stagnatibus aquis, & lentè fluentibus rivulis. A Maio ad Augustū vsque floret. Lobellius & Pena Iuncum Cyperoidem floridum nuncuparunt, quia ad Cyperum accedit foliis & umbella. Iuncū aliū Bombycinū memorat Pena, De quo hoc ipso libro dicemus Lini pratensis nomine. Haecenus de Iunculo laui, deinceps de aspero dicendum. Iuncus asper meritò dicitur qui hīc exhibetur, foliis valde longis, tactu asperis penè triagulis, fungosa medulla plenis: radice densa, dura, fibras plurimas producente, & furculos ex obliquo, geniculatos, ex quibus flores & nouellæ plātæ prodeunt. Secus amnes, & in lacubus maioribus stagnisq; provenit. Hoc Iūci genere ad stoeas & tegetes texēdas sternendis hyeme cubiculorū paupmētis aduersus vim frigoris Belgæ uti solent: quas tegetes illi *Matten* vocant, Parisienses *Nattes*. Dodonæus hunc Iuncū papyri speciem, atque etiā arundinē texendis tegetibus aptā vocat. Vluæ grandioris genus quidā esse censent. Alij Iuncū Mariscū Plinij ad texēdas tegetes. Alij Bryon lacustre Theophrasti, lib. 4. Hist. cap. 12. Alij Caricem Latinorū. Iuncorum vsus ad nallas marinas, ait Plinius, vitilium elegantiam, lucernarū lumina, præcipua medulla, amplitudine iuxta maritimas Alpes tāta, ut inciso ventre impleat penè vnciarū latitudinē, in Ægypto verò cribrorū longitudinē, non aliās vitiliorem. Qui locus Cornario suspectus videtur, ut desit vnciarū numerus, deinde quā nā est ista cribrorū longitudo? Sic ergo ex coniectura restituendum iudicat: amplitudine iuxta maritimas Alpes tāta, ut inciso vētre impleant denūm vnciarū latitudinē, in Ægypto verò cybiorū longitudinē, nō aliis vitiliorē. Denūm vnciarū, id est, pollicū latitudinem dixit. Sunt enim aquæ duodecim pollices in pede Romano, sicut in libra duodecim vnciæ: & procliue fuit vocem penè pro denūm substituere. Deinde cybiorū longitudinē implere ait (vetus Cornarij codex cimbiorū vocē scriptam habet) eamq; longitudinē nō esse aliis quā cy-

Lib. 4. c. 54.

Vfus.

Lib. 2. c. 1.

Embl. 42.

lib. 4.

biis videlicet, vitiliorē, nimirū ut ipsis excipiatur ac colligatur. Cybiū autē appellari cōcisam pelamidē Plinius testatur. Hermolaus vulgare lectionē secutus penè vnciarū latitudinē legit, & cribrorū longitudinē nō aliās vitiliorem. Ob id, inquit, cribrū significaturi Ægyptij Iuncū pingūt, Horo auctore, qui & in Ægypto Iūcis scribi, nec aliter affirmat. Neque aliquid immutandū aut corrigendū videtur: nā seruata vetere lectione, Plinius intelligit tā amplos Iūcos, iuxta maritimas Alpes



nasci, vt inciso vëtre exempta medulla impleant vnciæ, idest, pollicis latitudinē, & in Ægypto tam procures esse, vt dū ex his cribra fiant, ad eorū longitudinē perficiendā Iuncorū quisque sufficiat. πρὸς τὰ πλεγμαία, inquit Theophrastus χρεσιμώτερος ὁ δὲ χραῖνος, διὰ τὸ σφικτῶδες καὶ μαλακόν. Quæ sic Plinius expressit. Vtilissimus ad virilia holoschœnus, quia mollis & carnosus est. Iūco Græcos ad funes vsos nominari credamus, inquit Plinius, quo herbā eam appellāt. Vnde etiā funābuli schœnobatæ à Græcis dicūtur. Democritus vbi reperiatur Iuncus, subesse scaturigines aquarū, ibiq; aquilegia strui posse testatur. Sed de Iunci in medicina vsu dicamus. Semen tā oxyfchœni quā holoschœni tostū, ex diluto vino potū sistit aluū, & rubra fœminarū profluuiā, auctore Dioscoride: vrinā cit, capitisq; dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera cōueniēter illinūtur aduersus phalangiorū morsus. Æthiopici Iunci semine somnus allicitur: sed modus in portione seruandus est, ne sopor fiat. Quæ postrema sic Græcè legūtur, φυλάττω τὸν ὕπνον ἐν ταῖς πόσεσι τὸ πλεονεξῆσαι, καὶ φοῖ δὲ λαν. Expēdere autē oportet semper quantitatem quam ex co propinabimus: quandoquidē est maximē soporiferū. Vel, vt transtulit Cornarius, Æthiopicus Iuncus somniferū semē habet. Sed vitāda copia est in portionibus, ne nimium soporē inducat. Est autē Æthiopici Iunci lectio suspecta: alij Euripici legunt ex Plinio. Inuenio etiā nūm, inquit, vnum Iunci genus, quod Euripicē vocant: alij Trepicē legunt, vt non minū hīc, quā illic mēdosus locus esse videatur. Galenus, Paul. Aetius holoschœni semen somniferum esse tradūt, itemq; oxyfchœni, sed minū quā holoschœni. Serapio qui ad verbum Dioscoridis caput trāscripsit, nullā Æthiopici seu Euripici mentionem facit, sed, vt Galenus & alij, tertij Iuncorum generis, idest, holoschœni, his verbis. Et fructus speciei tertiæ bibitus inducit somnū, & oportet quod caueatur multus vsus eius, quia facit subet. Tot igitur, iisq; probatissimis auctoribus in ea lectione consentientibus, minimē dubitandū esse puto, quin in Dioscoride legēdum sit holoschœni semine somnū allici, nisi fortasse æthiopici holoschœni semen id magis efficiat quā nostratis: quod tamen superiorum auctorū nullus, nō solū Æthiopici holoschœni semini non tribuit, sed eius ne meminit quidem. Quæ de eiusdem plantæ viribus à Plinio tradita sunt conferamus cum iis quæ ex Dioscoride exscripsimus. Iunci radix, ait ille, in tribus heminis aquæ decocta ad tertias, tussī medetur. Semen tostū & in aqua potū, sistit aluū & fœminarū menses, capitisq; dolores facit. At qui vocatur holoschœnos, eius quæ proxima sunt radicis, cōmanducātur aduersus araneorum morsus. Inuenio etiā nūm vnū Iunci genus, quod Euripicē vocant. Huius semine somnum allici, sed modū seruandū, ne sopor fiat. Quod de Iunci radice hīc scribitur, Dioscorides non habet: quæ mox sequuntur cōsentiant, nisi quod in aqua potū pro μετὰ κρέμας Plinius dixit: est autem κρέμα vinū aqua dilutū. Deinde προὐ ἐρυθρον menses, suo more interpretatur. Quod sequitur alienū est à Dioscoridis sentētia. At qui vocatur holoschœnos eius quæ proxima radici, &c. In quibus vox folia deest ex Cornario reponēda; & Dioscorides ea nō cōmanducari, sed imponi vult. Idem Plinius Iuncinum oleū ē Iunco fieri scribit, quod est rosaceo simillimum. Sed de Iunci temperamēto & viribus omnium optimē disseruit Gal. his verbis. Fructus holoschœni somnū affert. At oxyfchœni duæ sunt species, altera sterilis, cuius quidem in medicīna nullus vsus est: altera verò semen fert: cōciliat verò & huius semen somnū, sed minū quā holoschœni: quāquam tamen hoc caput tentet. Vtrumque si fructū cum vino bibatur, ventris fluxus desiccet, & muliebres profluuiū rubrum sistit. Ex quibus perspicuum est quod composita eorum temperies est, ex terrena videlicet essentia leuiter frigida, & aquea leuiter calida, vt & inferna desiccare possint, & sensim frigidos ad caput vapores submittere, quibus somnolentos efficiant.

CYPERVS



## CYPERVS.

## CAP. II.

**K**ΥΠΕΙΡΟΣ, Latine Cyperus & Cypirus, Plinius tamen cyperum à cypiro distinxit, qui cum Dioscoridis cypero idem esse videtur, nec Galenus, Aetius, Paulus alium vllum quàm cyperum nostrum agnoscunt. Cornelius Cels. quadratum iuncum vocat, Plinius iuncum triangulum, & iuncum angulosum: eius verò radicem oblongam Cyperida, vt mox dicitur. Gaza apud Theophrastum gladiolum conuertit. Galli *Souchet*, nominant, Germani *Vuidergalgan*, id est, siluestrem galagam, Arabes *Saherade*. Videtur autem κύπερος siue κύπιρος dici à radicis effigie, quæ pyxidulam aut poculum pusillum, vasculumve imitatur. Sic etiam apud Theophr. κύπερις τῆς πτελέας, id est, folliculus vlmī legitur. Cyperus Dioscoridi folia fert porraceis proxima, sed longiora & exiliora: caulem odorati iunci, cubitalem, aut maiorem, angulosum, in cuius cacumine minuta folia cum semine exoriuntur: radices, quarum in medicina est vsus, coherentes inter sese, oleis oblongis similes aut rotundæ, nigro colore, suaui odore, amaro gustu. In lacunosis & palustribus nascitur. Plinius cyperum iūci genus facit, ideoque iuncis subiunxit. Quidam etiam nūm vnum genus faciunt, iunci trianguli, cyperon vocant. Et paulò post. Cýperus iuncus est, qualiter diximus, angulosus, iuxta terram cæcidus, cacumine niger, pinguisq; , folia ima porraceis exiliora, in cacumine minora, inter quæ est semen, radix oliuæ nigra similis, quam, cum oblonga est, cyperidā vocant, magni in medicina vsus. Theophrastus cyperum inter orchomenij lacus plantas recenset, & ἡ ῥίζα, inquit, τῶν κυπερίου πολύ τι τῶν ἄλλων παραλάττει τῇ ἀναμάλει, τῶ δ' μὲν εἶναι παχύτι καὶ σαρκώδες αὐτῆς, τὸ δὲ λεπτόν τε ξυλῶδες. Id est, cyperi radix multum inæqualitate à cæteris distat, quod pars quædam crassa carnosaque sit, quædam gracilis atque lignosa. Ex his perspicuum est cyperum hunc nostrum ab illo non differre, folia enim ei sunt longa, angusta, dura, porraceis similia, longiora tamen & tenuiora: caulis cubitalis, aliquando maior, triangularis, alba intus medulla, vt in iunco, in cuius cacumine folia minora, quadantenus stellatim disposita, inter quæ semen prodit spicatum, herbacei coloris, radices subnigræ, coherentes, oblongis oleis similes, aut rotundæ, aliquando longæ, geniculatæ, summo cespite vagantes, succulentæ, suauißimo odore, inter sese implicatæ, fibris numerosis. Nascitur in palustribus & humecto solo. Solum est in caule & radicibus discrimen, reperitur enim caulis quandoque quadrangularis, vnde iunci quadrati nomen ei à Celfo positum. Dioscorides vtramque differentiam comprehendens, nec triangulum, nec quadrangulum dixit, sed angulosum. Præterea cyperi nostratis radices oblongas oleas non referunt, nec omnino rotundæ sunt, sed longæ sibi cohæsu mutuo implexæ, & multis fibris capillatæ. Sed hoc discrimen plures cyperi species esse, quàm à Dioscoride posita fuerint tantum arguit, minimè verò plantam à nobis hic depictam cyperum non esse. Est enim Cyperus peregrinus siue Syriacus rotundus maior & minor, auctore Pena. Nostras, longus odoratus, longus inodorus. His ad-

Nomina

Lib. 3. c. 21.  
Lib. 21. c. 18.

## CYPERVS.



Lib. 2. hist.

Lib. 1. c. 4.

Forma.

Lib. 11. c. 13.




*CYPERVS Longus*  
odoratior, Lobell.




dit Cyperum gramineum, & Veronenſium Traſos, cyperi congeneres, quos Cyperos eſcu lentos vocat, de quibus egimus in libro de Bul boſis. Lobellius tres Cyperos propoſuit. Primus eſt Cyperus longus odoratior, Belgis & Anglis *Uvilden Galegaen*, & Galingua dictus, Hiſpanis *Inucia olorofa*. Is maior, habitior, car noſior, & odoratior eſt: radices illi longæ, inter ſeſe implicatæ polypodij modo, ſuauiſſimi o doris. Alter eſt Cyperus aquaticus ſeptentrio nalis, qui in ſcrobib<sup>9</sup> & riulis ad Scaldæ amœ niſſima fluenta ponè nouam Antuerpiam vr bem, iſſdem foliis & iubata panicula prouenit. Radix nonnullas ſed paucas, teretes, oliuares, oblongiores, inſtar filipendulæ emittit glan dulas, guſtu adſtringentes, nulla odoris gratia. Tertius, Cyperus rotundus litoreus inodorus, in borealis Angliæ & Belgij fluminum litoreis lenitèrque fluentium riulorum & maris allu uionibus oritur, radicum longè latèrque ſparſa ſobole, multis & bicubitalibus implicatarum filamentis, cypero rotundo parium: folia angu loſa ſunt, caulis cubitalis & ſeſquicubitalis, ni tidus, triquetrus, in quo racemoſa iuba, congeſta. Guſtu ſubabſtringit: radix frigida & ſicca, odoris & ſaporis expers. Huc accerſit Pena Cyperum Gramineum, ſeu Miliaceum, ſuadente caule natalique loco. Eſt enim inodori cyperi quadantenus affinis, breuioribus tamen foliis, quæ ab imo orta medio tenus fermè caulem am-

*CYPERVS Aquaticus,*  
Lobellij.



*CYPERVS, Rotundus*  
inodorus. Lobell.



biunt



CYPERVS Gramineus seu  
miliaceus, Pena.

biunt pedalem, ternis angulis asperum, coma donatum sparsa, eleganti, & maiore quàm pro sui magnitudine, copioso milij aut iunci refer- ta femine, circum cuius imum aliquot foliola enascuntur, vt in Cypero. Collectus est ad Nec- carù flumen agri Heidebergenfis. Cypero ca- lida vis inest, vt scribit Diosco. Venarum spira- cula laxat: vrinam ciet: ad calculos, aquàmque subter cutem vtilissimè bibitur: aduersus scor- pionum ictus remedio est: perfrictionibus vul- uæ & præclusionibus fotu prodest: pellit men- ses, contra vlcera oris etiam si depascant, vo- réntque farina efficax est, malagmatis calfacien- tibus, & vnguentorum spissamentis benè adiu- ci solet. Galenus de eiusdem viribus ita scribit. Cy- peri radices maximè vsui sunt, excalfaciètes pa- riter & exsiccantes absque mordacitate. Itaque vlceribus, quæ præ nimia humiditate cicatricè difficilè admittunt, mirificè prosunt: habent enim quiddam etiam adstringens, quapropter vlceribus, oris conueniunt. Quin & incidendi vim quampiam illis inesse testificandum, quia & calculo vexatis congruunt, & vrinam men- scique prouocant. Hæc Galenus. Cyperi radicum farina, addita baccharum lauri ead- dem mensura, vrina impubis pueri excepta & illita, hydropicos mirificè iuuat.

Lib. 4.  
Temper.  
& Vires.

Lib. 7. sum.

Matth. in  
cap. 4. lib. 1.

## ASPHODELVS PALVSTRIS.

## CAP. III.



**S**VBIVNGEMVS iuncis plantã hîc appinctam, ob magnam quæ ei est cum iuncis quibusdam, præsertim cum aspero similitudinem. Eam vulgò anonymon, Dodonæus asphodelum palustrem vocat, quod caulis cum floribus anthe- rico similis asphodeli speciem esse ostendat, ta- mersi folia gladioli sint aut iridis, pulchrè viren- tia, aliquantulum striata, iunci asperi, aut iridis, aut gladioli similia, sed angusta & dodrante breuiora: caulis rectus, pedalis, asphodeli satis similis: flores è senis foliolis, exiguis stamini- bus in medio, veluti asphodeli, minores ta- men, colore è luteo pallentes: semen perexi- guum, in oblongis & acuminatis vasculis, ra- dix subest longa, geniculata, non absque fibris, quæ serpit graminis modo. Gaudet locis humi- dis, & palustribus. Æstiuis mensibus floret. Af- phodelus acorifolius, luteus, palustris à Lobel- lio & Pena dicitur.

Nomen.

Lib. de flo.

Forma.

Locus.

TYPHA



**Nomina**Pet. Pen. in  
Ad.

Lib. 3. c. 62.

In cap. 116.  
lib. 3.**Forma.**

Lib. 3. c. 116.



TYPHA Græcis, Typha Latinis, cui cylindri turbinatæque florum effigies quasi typhonis sese gyantis turbinem, aut gigantis staturam minacem signaret, nomen dedisse videtur, Galli *Masses* appellant, appositè, inquit Ruellius, quod sceptræ regum & clauas argenteas vel aureas, quæ ante primos magistratus gestantur, *masses* vulgò dictas perpolitus caulis lanosa floccorum densitate summatim fastigiatus æmuletur, Hetrusci *Mazza sorda*

TYPHA, Aquatica.



Ibid.

minari scribit Dioscorides, quamuis lanosam comam in milio, panico, arundine, & qualem in aruis complures herbæ, & in palustribus iunci gerunt, Græci generatim anthelen dixerint, Latini paniculam. In Dioscoridis exemplaribus Latinis legimus caulem typhæ album læuem esse, &c. At Græca omnia quæ videre licuit, vocem λακκὸν aut similem minimè habent. Sic enim in omnibus legimus. Τύφη φύλλον ἀνίστησι κυπερίδι ὅμοιον, καυλὸν λεῖον, ὀμαλὸν &c. Id est, Typha profert folium cyperidi simile, caulem læuem, æquabilem. Neque Oribasius aliter legit. Est & id annotatione dignum, quod scribit Theophrastus, cap. 11. lib. 4. Histor. ἰδιώτερον δὲ πάντων ἐστὶν ἢ τύφη, ὅ ἀφύλλον εἶναι, καὶ τῶ μὴ πολὺ ῥιζόν. Id est, Maxime peculiare hoc typha habet quod folio careat, & numerosas radices habeat. Quod cum absurdum sit, quod typha arundinis vel cyperidis folia habeat, necesse est locum hunc Theophrast. esse deprauatum. Quare legit Dalechampius τὸ ἀφύλλον εἶναι, quod flos teres, & tornatæ clauæ similis conspicitur, nullis foliis reliquorum more stipatus. Typha in iis est quæ in palustribus & stagnantibus aquis, amnibusq; leniter fluentibus nascitur, vel teste Theophrasto, ἢ ὅ τύφη, inquit, καὶ εἶνα τῶν ἐλκτῶν ἢ λιμνῶν ὁμοίως ἀδιάφρακτα ὀμαλῇ, καὶ ἀπὲρ χοῖνος. Id est, Typha autem & quædam palustria & lacustria, nullo intercedente nodo qui partes diuidat, æqualia sunt, qualis iuncus est. Iulio mense eius caulis lanosa floccorum densitate obducitur, Augusto in pappos abit. Typhæ flos, auctore Dioscoride, suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. Ex quibus colligi potest potissimū typhæ florem non euidenter calefacere, neque

**Tempus.****Vires.**

Lib. 3. c. 1. 6.

Fuch. c. 317.



neque refrigerare, & modicè abstergere atque exficcare. Typhæ lanugine, inquit Matthiolus, additis betonicæ foliis, gladioli & hippoglossi radicibus, omnibus in tenuissimum puluerem redactis, & assatis ouorum luteis exceptis vtuntur quidam fœliciter ad enterocelas, quod medicamentum quotidie exhibent ieiunis drachmæ pondere, triginta dierum spatio, eoque medicamento non modò pueros adolefcē-

In cap. 116.  
lib. 3.

TYPHA Minor,

Pena.



tesque, sed etiam eos qui ætate sunt consistente sanari pollicentur, si tamen interim optima ligatura & emplastris glutinantibus ima pubes probè muniatur. Sed id nō lanugini, verum betonica, hippoglossi, gladioli fortassè acceptū ferendum, satiusque fuerit hanc abesse, quæ suffocationis periculum minatur: mures enim sic enectos vel plebs nouit, & ineptiora cetera medicamenta efficit. Eadem lanugine quidam culcitras replent, & renibus, æstuantibusque lumbis haud parū cōmodi adferunt puluilli thorivæ eadem fæcti. In agro Gebennensi quæ confluunt rhodanus & arua, Typha pusilla, siue Typhula exit, planè iuncis culmis, enodibus, rigidulis, cubitum & sesquicubitum vix excedentibus, binoque fastigiolo floris tomentacei donatis: nempe in extremo, vno exiguo & semine eroso, cui adnascitur foliolum triticeum, & intorquetur: altero autem inferiùs relicto spatio, crassiore & corpulentiore iuncum ambiente, typhæ non dissimilem, sed multò minorem vti & folia, quæ ad imum sunt aliquantulum rigida: radix prolixius reptat.

Pet. Pen. in  
Ad.

Pena, ibid.

ARVND O.

CAP. V.

**A**RVND O Græcè ἄλυσμος vocatur, Arabice *Casab*, Gallicè *Canne*, vel *Roseau*, Italicè *Canna*, Hispanicè *Cannas*, Germanice *Korb*. Dioscorides quinque arundinum genera veluti notiora prodidit. Quædam nastos vocatur, id est, fæcta & solida, ex qua sagittæ fiunt, quædam fœmina, ex qua tibiæ linguas efficiunt. Alia syringias, quod fistulis addicta sit, cui multū inest carnis, crebris cinctæ geniculis, ad librorum conscriptionem accommodata. Alia crassa, concaua, apud amnes nascens à quibusdam Cypria, ab aliis donax appellata. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, candicans, vulgo cognita. Theophrastus arundinum differentias constituit, ex ipsarum corpore solido, cauo, ex breuitate, proceritate, crassitudine, gracilitate, foliorum multitudine, paucitate, natalibus siccis, aquaticis, denique ex ipsarum vsu, de quibus postremis Theophrasti ordinem secuti priùs tractabimus. Ac primū duo genera facit, ἀλυσμον, quam tibialem Plinius interpretatur, & alteram. Sed huius aliam esse χαρακίαν, cui nullum nomen Latinum dedit Plinius, *Gaza vallarem* seu vallatoriam interpretatus est, crassam & firmam, idè vallis & sepibus hortorum & prædiorum idoneam, vnde ei nomen inditum. Phragmitem Plinius alicubi vocauit. Aliam πολύκιμον, id est, textilem, eodem Gaza interprete, fortassè quod ex eius foliis storex, regetes, spira, atque alia id genus fierent. Theophrasti verba hæc sunt. Τοῦ ἄλυσμος δύο φασὶν εἶναι γένη. τὸν δὲ ἀλυσμον, καὶ τὸν ἕτερον. ἔν γὰρ ἓνα τὸ γένος τὸ ἕτερον διαφέρειν τῶν ἀλλήλων ἰσχύϊ, καὶ λεπρότητι, & ἀσθενείᾳ. χαλᾶσι δὲ τὸν μὲν ἰσχυρὸν, καὶ παχύν χαρακίαν, τὸν δὲ ἕτερον πολύκιμον.

Nomina

Genera  
Lib. 1. c. 9.

Lib. 4. hist.  
Cap. 12.

Lib. 16. c. 36

Lib. 32. c. 10.

Lib. 4. hist.  
Cap. 12.

Quæ



Quæ sic traduxit Gaza. Arundinis duo genera tradunt, tibialem, & reliquam: quippe vnum genus reliquæ deprehēdi, sed inter se inuicem differre firmitate, crassitate, tenuitate, exilitatēque. Crassam & validam vallatoriam vocant, alteram verò textilem. Ex qua traductione, tum ex ipso contextu perspicere licet emendatiùs hæc sic legi posse, διαφέρειν ὃ ἀλλήλων παχύτητι καὶ λεπρότητι, ἔχει δὲ ἀσθενεία, id est, differre inter sese crassitudine & tenuitate, robore & debilitate. Nec hīc prætermittendum est Plinium de eadem re tractantem non πολυκίμον, sed πολώϊαν legisse, scribit enim, Characian vocabant crassiorē firmiorēque, plotian verò subtiliorē. Qui locus aut mēdosus est, aut Plinius vocum affinitate dēceptus, cū hanc arūdinem legisset apud Theophrastum nasci ἐπὶ τῶν πολώϊων, id est, in insulis fluitantibus, πολώϊαν vocauit, quasi fluitantē, pro πολύκιμον. Addit Theophrastus, φύεσθαι δὲ τὸν μὲν πολύκιμον ἐπὶ τῶν πολώϊων, τὸν δὲ χαρακίαν ἐπὶ τοῖς κώμυσι, κώμυθας δὲ χαλδοὶ οὖν ἂν ἢ σιωνηροισμένοις χάλαμος, καὶ συμπεπλεγμένοις ταῖς ῥίζαις. τοῦτο δὲ γίνεται καὶ ἔς τὴν λήμνην ἐν γένει τῇ χωρίον. γίνεσθαι δὲ ποιεῖ τὸν χαρακίαν ἔδου ἀνληκίος, μακροῖον μὲν τοῦ ἄλλου χαρακίου, σκωληκώδεωρον δὲ. Id est, Textilem in insulis fluitantibus (Plinio interprete) nasci, vallatoriam in comythibus (Plinius dixisse videtur in ripis expatiantis lacus.) Comythas autem vocant, vbi coaceruata arundo mutuo implexas radices habet, quod fit stagnorum locis in quibus tellus pinguis fuerit. Nonnunquam vbi tibialis, vallatoria etiam gignitur, longior quidem alia vallatoria, sed à vermibus eroditur. Deinde Theophrastus tibialis arundinis ortum, naturam, & differentias prolixiùs exponit, tum plures alias, vt diximus, arundinum species recenlet, quæ ferè omnia Plinius transcripsit, & viginti nouem arundinis genera demonstrauit, in quibus calamum aromaticum numerat, de quo & arundine saccharifera, idoneo loco tractabimus. περὶ δὲ τοῦ ἀνληκίου, τὸν μὲν φύεσθαι δὲ ἐνναετηρίδος ὅπερ τινὲς φασί, καὶ ταύτην εἶναι τὴν τάξιν, οὐκ ἀληθές, ἀλλὰ δὲ μὲν ὅλον ἀνληκίσις γίνεσθαι τῆς λήμνης, ὅτι δὲ τοῦτο διοκῆς συμβαίνει ἐν τοῖς πρότερον χρόνοις, μάλασι δὲ ἐνναετηρίδος, ἔτι γένεσιν τῶν χαλμῶν ταύτην ἐποιοῦν, δὲ συμβεβηκός ὡς τάξιν λαμβάνοντες. γίνεσθαι δὲ, ὅταν ἐπομβρίας γενομένης διεμμένη τὸ ὕδωρ διελθῇ (non διελθῇ, vt vulgò legitur) τοῦλάχιστον, ἂν πολὺ καὶ χαλμῶν. ταῦτα δὲ μάλασι μνημονεύσιν γεγονότος τῶν ὕστερον χρόνων, ὅτε συνέβη ἔτι περὶ χερσίν εἶναι τούτων γὰρ ἐφαῖντο πλεονεχθῆναι τὴν λήμνην. μετὰ δὲ ταῦτα ὕστερον ὡς ὁ λοιπὸς ἐγένετο σφοδρὸς, πολλὰ θῆναι μὲν αὐτὴν. οὐ μέγα ἂν δὲ τῶν ὕδατος, ἀλλ' ἐκλελεῖσθαι τὸς χαλμῶν, ἔτι γένεσθαι τὸν χαλμῶν. φασὶ γὰρ, καὶ διοκῆς, βαθυωμένης τῆς λήμνης μετὰ τὸν μείναντα, vt in excusis legitur) τὸν ἐπὶ τὸν ἐνναετῆρον, ἀδρύνεσθαι, καὶ γίνεσθαι τὸν μὲν ἀδρυνθέντα ζώγιτην. εἰδὲ ἂν (non εἰδὲ ἂν, vt habent exemplaria) μὴ συμπαράμεσθαι τὸ ὕδωρ, βομβυκίαν. Id est, Tibialium quandam nono anno prouenire quidam aiunt, & hunc esse ordinem, quod falsum est. Prorsus enim aucto lacu nascitur, sed quoniam id superioribus temporibus nono potissimum anno euenire videretur, hunc quoque arundinis ortum esse putarunt, id quod fortuito eueniebat pro ordine sumentes. Gignitur autem copiosior meliorque, cū post frequentes imbres biennio, minimum, aqua permansit, quod maximè posteriore tempore factum meminere, quando infaustum illud Cheroniæ accidit. Antea enim aiebant annis pluribus lacum altitudine creuisse, postea verò cum vehemens pestis inuasit, impletum quidem, at cū aqua non permansisset, sed hyeme decreuisset, sic prouenisse arundinem. Fertur enim, & ita videtur, aucta altitudine lacus durante inundatione sequente anno crassiorē fieri arundinem, & crassiorē factam, fieri ζώγιτην (Caza armentariam vertit) bombyciā verò cū aqua non permanserit. Ex quibus Plin. hæc descripsit. Tertia arundo est tibialis calami, quem auleticon dicebat. Nono hīc anno nascebatur. Nam & lacus incremēta hoc tēporis spatio seruabat, prodigiosus si quando amplitudinē biennio extēdisset, quod notatū apud Cheroniā infausto Atheniēsum prælio, & apud Lebadiam sæpe notatur influente Cephisso. Cum igitur nono anno

Lib. 16. c. 36

Lib. 16. c. 36  
& Lib. 24.  
cap. 11.

Lib. 16. c. 36



anno permanfit inundatio, proficiunt in aucupatoriâ quoque amplitudinem: vocabantur zeugitæ. Contrâ bombyciæ maturius reciproco (subaudi lacu, id est, ripas deferente & in medium inundantes aquas recolligente, quarum profusione arundineta vigeant & augebantur) graciles. *Ζεύγη* igitur Plinius nunc eam quæ in amplitudinem aucupatoriam, nunc simpliciter aucupatoriam vocat. Dalechampi iugalem potius latine nominandam censet, vel quod ea vites in iugum alligarentur, quam nectædæ vitis rationem docet Columella, ad quem vsum etiam arundineta in Italia potissimum culta fuisse scribit Plinius, vel quod ex eius internodiis coniugatis compingeretur septenis, ut ait Ovidius, fistula cannis: *Ζεύγη* namque vocabant antiqui coniuncta arundinum paria, & *μεσογόνια* fabricandis musicis instrumentis idonea. Illud tamen scire etiam oportet, veteres *Ζεύγη*, seu *Ζύγες* appellasse τῶν ὀρνίθων βρόχους, id est, laqueos ad capiendas auculas destinatos, eisdemque calamis & amite in aucupiiis vfos fuisse, versiculo illo Martialis indicante.

Lib. 4. c. 17.  
Lib. 16. c. 36

*Galbula decipitur calamis, & retibus ales.*

Bombycia autem dicta fuisse videtur, vel quod ex ea βόμβυξ tibiæ genus fieret, vel quod bombyciis insectis corporis exilitate & strigoso habitu, arundo hæc similis sit. Præterea scribit Theophrastus, διαφέρειν τῶν ἄλλων χαλαρίων ἀφορίᾳ τινὶ τῆς φύσεως. ἀπληγέστερον γὰρ εἶναι καὶ ἀσπαρξέστερον, ὥστε διέστηλιν τῇ προσοφεί. καὶ γὰρ ὁ φύλλον πλεονέστερον ἔχει καὶ λευκότερον. τὴν δὲ ἀντήλην ἐλάττω τῶν ἄλλων. τινὰς δὲ ὅλως ἐκείνην. ὅς τε προσπαγορεύουσιν ἐνυσχίας. ἐξ ὧν ἀρετὰ μὲν φασὶν τινες γενέσθαι τὰ *Ζεύγη*. κατὰ τὸν δὲ ὁλόντα παρὰ τὴν ἐργασίαν. τὴν δὲ τομὴν ὁραίαν εἶναι παρὰ ἀντιγενέδω, ἥνιχα ἡνδυνῶ ἀπλάττωσιν ἀρετὴν βρομυμύωνος μινός. τὸν γὰρ οὕτω τμηθέντα σύχοις μὲν ἔτεσιν ὑπερον γίνεσθαι χρήσιμον, καὶ προχαυλήσεως διέσθαι πολλῆς. συμμύειν δὲ τὸ τῶμα τῶν γλωττίων, ὁ πρὸς τὴν διακρίαν εἶναι χρήσιμον. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν πλάσιν μετέστη, ἡ τομὴ μετεκινήθη. τέμνεται γὰρ διέσθιν τὸ τοῦ σκιρτήματος καὶ ἐκείνου βρομυμύωνος. ὡς περὶ τῶν τροπῶν μικρόν, ἢ ὑπὸ τροπῶν. γίνεσθαι δὲ φασὶν τε μὲν διέσθιν χρήσιμον, καὶ χαυλήσεως βραχυχίας διέσθαι, καὶ χαυλῶσπασματὶ τὰς γλωττίδας ἔχειν. τοῦτο δὲ ἀναγκαῖον τοῖς μετὰ πλάσματος ἀνθρώποις. Id est, Differre autem à reliquis arundinibus bombyciam alimenti natiui penuria: nam macilentior, gracilior, & facie plañe fœminam spectari, foliũque latius habere & candidius, & minũs lanuginis quàm ceteræ, quasdam etiam nihil prorsus habere, quas spadones appellant, ex quibus iuga optima fieri quidam affirmant, pauca tamen in opere bene succedere. Has tempestivæ cædi solitas ante Antigenem, cum adhuc simplicius tibia canerent sub arcæuro mense Septembri: sic enim cæsas multis post annis viles esse, multaque sonandi exercitatione indigere, sed ora linguarum connuere, quod erat illis ad res populo significandas vilius. Posteaquam verò varietas fictioque accessit, cæsuramutata est: cædunt enim nostra ætate mense Maio & Iunio ferè circa solstitium, aut sub ipso solsticio, & fieri in trimatu viles, & breui exercitatione egere, linguasque declives esse, & quasi deorsum flecti, quod his necessarium est qui sonos variè fingunt. Quæ Plinius paucioribus verbis sic explicavit. Contrâ bombyciæ maturius reciproco, graciles, fœminarum latiore folio atque candidiore, modica lanugine, aut omnino nulla, spadonum nomine insignibus. Hinc erant armamenta ad inclusos cantus, non silendo & reliquo curæ miraculo, ut venia sit, argento iam potius cani. Cædi solebant tempestivæ usque ad Antigenem, cum adhuc simplici musica vterentur, sub arcæuro: sic præparatæ aliquot post annos viles esse incipiebant, tunc quoque multa domandæ exercitatione, & canere tibiæ ipsæ docendæ, comprimētibz se lingulis, quod erat illis theatrorum moribus vilius. Postquam varietas accessit, & cantus quoque luxuria, cædi ante solstitia cæptæ, & fieri viles in trimatu, apertioribus earum lingulis ad flectēdos sonos: quæ inde sunt & hodie. His plura alia genera, ut diximus, subiungit Theophrastus differentiis vel sensui perspicuis distincta. Quædam enim densa tam carne quàm geniculis: quædam rara, paucisq;

Ibid.

Ibid.

Ibid.



- Lib. 16. c. 36 geniculis: alia caua tota, quam *σύνεργα*, siue *συνεργίαν*, id est, fistularem nominant. Plinius, Calamus verò alius totus concavus, quem syringiam vocant, vtilissimus fistulis, quoniam nihil est ei cartilaginis atque carnis. Orchomenius est continuo foramine peruius, quem auleticon vocant, hic tibiis vtilior, fistulis ille. At syrix Theophrasto dicitur non syringias, quod natura sua caua & inanis, medulla, carne, cartilagine vacua sit fistularum modo, non autem vt Plinius exposuit, quod fistulis vtilior sit, vt auleticos tibiis. Quare mirum est Plinium scripsisse calamum orchomenium auleticon continuo foramine peruium esse, cum id syringi tantum conueniat, & Theophrastus auleтики seu tibialis naturam diligentissime persecutus, nusquam id de ea tradiderit. Alia arundo solida, & tota penè intus repleta. Item alia breuis, alia procera, excelsa, crassaque: alia gracilis foliosaque, aliavnicofolio. Multae etiam differentiae pro natura vsusque intelliguntur, singulae enim ad singula vtilis. Donax (canna vocatur à Gaza, Columella fortasse exemplo, qui degenerem arundinem cannam vulgò vocari scribit, Plinius Græcum nomen retinet) communissima arundo, cōfertissima est, siue ex vna stirpe numerosa, *λογμωδέστατον*, fruticosissima vertit Plin. (Fruticosissimus qui vocatur donax, non nisi in aquaticis natus, quoniā & hæc differentia est, multum prælata arundine quæ in siccis proueniat.) Quibus verbis Plinius Theophrasti sensum non rectè exprestit, sic scribetis *διαφέρειν δὲ ὅμως πάντος χαλάμου πολὺν, τὸν δὲ ἐν τῷ ξηρῷ, καὶ τὸν ἐν τοῖς ὕδασι φυόμενον*. Id est, multum in quouis arundinis genere differre quod in sicco natum est, ab eo quod in aquis creuit, vt hic *διαφέρειν*, non præstare aut præferri, sed differre ac discrepare significet. *Τοξικὸς*, Creticam quidam appellant, sui generis est, nodis paucis geniculata, carnosior, flexumque maximè recipiens. Plinius. Suum genus sagittario calamo, sed Cretico longissimis internodiis, obsequentiisque quo libeat flecti, calefacto. Et aliquantò antè. Sed in hoc quoque, vt cæteris in rebus, vicit Italia, quando nullus sagittis aptior calamus, quam in Rheno Bononiensi amne, cui plurima inest medulla, pondusque volucre, contra flatus quoque pernix libra. Sunt & differentiae magnæ ex foliorum non multitudine aut magnitudine modo, sed & colore. Quippe quæ Laconica cognominatur, versicolor est. Item ex ipso situ atque annexu: quædam enim ab ima parte, foliorum magnam partem ferunt, ipsaque perinde atque è frutice se attolunt. Plinius. Differentias faciunt & folia, non multitudine, verum robore & colore. Valida Laconicis, & ab vna parte densiora: quales in totum circa stagna gigni putant, dissimiles amnicis, longisque vestitas tunicis, spatiosius à nodo scandente cōplexu. Ex quorum locorum collatione intelligere licet deprauatè legi in Plinio, Valida Laconicis pro Varia, & ab vna parte densiora pro ab ima. Sic enim habet Theophrastus. *ποικίλος γὰρ ὁ λακωνικὸς χαλάμενος*. Varius est foliorum color eius quam Laconicam vocant. Et, *κατωθεν γὰρ ἐνίοι πολλὰ φέρουσι τῶν φύλλων*. Id est, Quædam ima parte folia plurima edunt. Quidam discernenda lacustrium tantum genera ferè volunt, quod habeant vel nulla, vel pauca folia, & non nihil similia cyperi: phlei, algæ, butomi. Sic enim conuertenda hæc Theophrasti verba. *καθὼν ὅτι τινες φασὶ καὶ τῶν λιμναίων τὰν τὴν εἶναι τὴν διαφορὰν, πολὺφυλλον καὶ ὀλιγόφυλλον, ἔπαρῳσιον ἔχειν τρόπον τινὰ τὸ φύλλον τῷ τοῦ κυπέρου, καὶ φλεῶ, ἔβρυς, καὶ βυθίου*. Genus aliud arundinis ponit Theophrastus *ἐπὶ ἧστον*, id est, pumilum, quod non erigit caulem, sed super terram graminis modo spargitur, atque ita crescit, mascula solida est, fœmina inanis. Plinius. Est & obliqua arundo, non in excelsitatem nascens, sed iuxta terram fruticis modo se spargens, suauissima in teneritate animalibus. Vocatur à quibusdam Elegia, corruptè pro epigætos, vel Plinius legit in Theophrasto non *ἐπὶ ἧστον*, sed *ἐλέγστον*. Idem Plinius tradit arundines esse in India tantæ proceritatis, vt singula interodia alueo nauigabili ternos interdum homines ferant. Et alibi. Arundini Indicæ arborea amplitudo, quales vulgò in templis videmus. Nauigiorum etiam vicem præstant,



præstant, si credimus, singula internodia. Addidit piscatorias idem, & quæ chartis  
feruiunt arundines scriptorias, videri potest & adarcam his adnumerasse, his verbis.  
Est & in Italia nascens Adarca nomine, palustris: & cortice, tantum sub ipsa coma, Lib. 16. c. 36  
vtilissima dentibus: quoniam vis eadem est, quæ sinapi. Qui locus sic corrigendus  
videtur, palustris, in cortice calamorum tantum, & sub ipsa coma nascens, &c. Id Lib. 20. c. 22  
quod perspicue demonstrant eadem verba alibi repetita. Sinapis naturam effectuf-  
que eisdem habere traditur adarca, inter siluas tacta, cortice calamorum sub ipsa  
coma nascens. Verum Plinius adarcæ non ut arundinis, sed eius rei quæ in arundine  
nascitur, & ei insidet, cum de arundinibus tractauit, non absurdè meminit, eiusque  
naturam demonstrauit ab arundinum natura planè diuersam, id quod dilucidius  
declarat alio in loco. Inter aquatilia dici debet & calamochnus, Latine adarca appel Lib. 31. c. 10  
lata, nascitur circa arundines tenues è spuma aquæ dulcis ac marinæ, vbi se miscet.  
Vim habet causticam, &c. Quo loco calamachnè, id est, τῶν καλαμῶν ἄχνην legere  
oportet, nō calamochnum, ut in vulgatis exemplaribus legitur, & circa arundines  
tenuem, nō tenues, è spuma aquæ dulcis & marinæ, id est, salis, vbi se miscent, ut si  
quando in paludem lacumve foris salus sese exoneret, quod Lacui Carcassonæ op-  
pido vicino accidit, quem incolæ Marsonetam vocant, in quo cedentibus per astra  
tem aquis, & sal radiis solis coctus, & adarca scirpis ac iuncis inhærescens, æstu cō-  
creta colligitur. Ex tot arundinum generibus aliquot depingemus. Ac primum arū-

ARVND O Domestica,  
Matthioli.



dinem cōmunem, siue marem, siue vallatoriam  
Matthioli, quæ ad decem cubitorum procerita-  
tem adolescit, militaris hastæ crassitudine, robu-  
sta ac firma materia, intus inanis, compactis per  
interualla geniculis. Cortice vestitur squamoso,  
qui facillè detrahitur, aspero, subalbicante. Folia il-  
li sunt longa, milij Indici æmula, sed latiora ac  
longiora, aspera vbique superficie, & acuta. Pau-  
culas fert seu spicas milij modo sparsas, lanosa  
molliq; cæsaræ nutantes ac purpurascens, quæ  
hyeme in auras abeunt sine vlllo seminum vesti-  
gio: radix subest alba, dura, tuberosa, cōtorta, ge-  
niculata, ut in iride, sed longè maior ac robustior.  
In vinetis feritur, in hortis ac viridariis ad vitiū  
palos, ad sepes hortorum, & ad topiaria opera.  
Hæc arundo an vallatoria esset Dioscoridis, du-  
bitauit aliquando Matthiolus, quod ea Dioscori-  
di sit gracilis ac cādicans, hinc verò depicta cras-  
sior. Sed cum Theophrastus, inquit, scribat val-  
latoriam crassiorē esse ac firmiorem, credibi-  
le est hunc Dioscoridis locum deprauatum esse,  
præsertim cum septis, palis ac topiariis operibus  
crassæ arundines tenuibus sint aptiores. Hæc Pe-  
na & Lobellius esse censent, quæ Donax seu Cypria dicitur, satiuæ nostras, Gallis  
Canne, Italis Calami à far Conocchie, nullumq; in Dioscoride mēdum esse affirmat Do-  
donæus, cum scribit phragmitem gracilem esse, & cādicantem (Alij legunt ὑπόλεπ-  
τον, λευκόν, id est, aliquatulum gracilem, cādicam) esseq; χαράκιαν Theophrasti cras-  
sam ac firmam, quam Gaza vallatoriam conuertit, quamquam eadem est χαράκιος  
Theophrasti & φραγμιτης Dioscoridis. Vallatoria Dodonæi, Penæ, Lobellij, culmum  
seu scapum profert longum, crebris geniculis cinctum: folia multa, longa, lata, aspera:  
in summo caule effusa exit iuba, mollis, ac veluti lanuginosa, radices subsunt longæ,

Forma.

Lib. 4. hist.  
Cap. 12.

Lib. 4. c. 55



alba, geniculata, ac latè serpentes. Nascitur in pigris aquis, veluti in urbium fossis, & circa fluminum ripas, Belgio ac Germaniæ vulgaris, tenuis, candicans, præsertim vbi inaruit, non solum ad operiendas domos utilis, sed & sepimentis maximè idonea. Hæc Arundo Dodonæi est arundo palustris Matthioli, vt pictura & delineatio demonstrant. Est enim Arundo palustris Matthioli arundinis primo de-

lib. 4. hist.  
Cap. 3.  
De fra. ca.  
17.  
in cap. 97.  
lib. 1.

ARVND O Vallatoria,  
Dodonæi.



ARVND O, Epigæas.



ARVND O Palustris,  
Matthioli.



scripta modo: radices habet crassas, contortas, geniculatas, ex quibus culmi proceri, crebriorib<sup>9</sup> geniculis distincti, foliis ipsos ambiētib<sup>9</sup>, longis, latis, acuminatis: coma in summis culmis lanuginosa. Quæ quarto loco depicta est arūdo calamus est, humi sparsus graminis modo, quod de arūdine epigæo prodidit Theophras. cortice fuluo cōtectus, lineis squamatim cingentibus distinctus, cauliculos alios multos vtrinque producens densa cōgerie stipatos, simili cortice, similiterq<sup>ue</sup> squamoso virgatos, qui rursus & alios gignūt, p<sup>ro</sup>minētium veluti nodorū aut oculorum modo exsertos, plures superiore parte qua terrā nō attingit, pauciores inferiore qua terrā inesternitur, aspectu pulcherrima, densissima illa tenuium cauliculorum furculorumq<sup>ue</sup> congerie, cū cæteræ arundines folia tantum hinc inde mittāt, nullos autem præterea vel furculos vel calamos, folium nostræ arundini simile à nodis exoritur, sed numerosius magisq<sup>ue</sup> multiplex, & plures complexu inuolucrorum per ambitum tunicas inducit. Hæc arundo pumila in saccis magnis costo arabico & zinzibere plenis aliquando reperta veluti rara ac inusitata hic doctis & rei herbariæ



ARVENDO, *Minima.*

herbaria studiosis spectanda proponitur. Arundinem minimam plantam quinto loco hic pictam herbarij vocat: quidam gramen iunceum, alij gramen arundinaceum. Radix ei parua, candida, brevis, parum fibrata: caulis singularis, teres, pedali altitudine: folia graminis, pauca, longa, acuminata, angusta, gracilia, ex magnis intervallis caulem vestientia, in furculos valde exiles caulis fastigium finditur, in quorum summitate semē est exiguum, nigrum, velut in corymbos coaceruatum. Iisdē in locis provenit in quibus gramē aculeatum, & gramē stellatum alibi descripta, nonnunquam ex vno & eodem cespice. Est & Arundo seu Cāna Indica hodie nominata, quoniam ex America primū delata fuit, & eius stolones canarū seu arundinum ritu geniculati sunt, à nonnullis quia eius flos nodum apertus cancri chelas colore & forma refert, flos cancri, ab Hispanis & Lusitanis *Cuentas*, à numerando, quod ex istius fructu ut ex tenellis & deciduis malis arantiis spherulę precatorię fiāt, ab aliis cannacorus, ambigū inter canas & acorum naturę. Huic primū vnus, deinde plures stolones ex eadē radice prodeunt, cubiti vnus, interdum duorum aut

trium altitudine, digiti crassitudine, geniculati arundinis modo, quos circa genicula ambiūt folia multa, ampla, transversis filis nervosa, foliorum Mutę arboris specie, sed tenuia, herbaceo virore pallascētia, & in extremo acuminata, quę cū primū erumpunt chartaceorum corniculorum modo cōvoluta conspiciuntur, & gustata herbaceum quēdam saporem referunt primū, qui paulō pōst nōnihil acrimonię

ARVENDO seu Canna  
*Indica, Clusij.*ARVENDO seu Canna  
*Indica, Dalechamp.*



admixtum habet. In summo caule sunt flores, gladioli floribus forma similes, colore phæniceo pulcherrimè nitentes, capitulo cuidam hirsuto inharètes, quod cum flore nōdum aperto cancri seu locustæ marinæ chelam quadatenus representat, floribus dilapsis aut marcidis, capitula ista augètur, fiuntq; triangula & veluti spinosa, fructus ricini modo, in quibus semè per maturitatem fuscum & atrum, rotundum: radix nodosa, crassioribus fibris stipata, ex cuius nodis aliis adnascètibz radices aliæ procuràtur, matri similes. In Lusitaniæ monasteriis quibusdam frequètem vidit Clusius etiam media hyeme florètem. Hodie multis aliis in locis seritur & colitur à rei herbariæ studiosis in fictilibus, aut ligneis doliis, ut soli meridiano facilius exponatur: quoniam calore & apricatu valde gaudet, altioraq; planta boreæ statu & frigore maximè læditur. Huius folia esse putant, quibus massas gummi elemni obvolutas videmus in Seplasiis. Huc inferèda Arundo Saccharifera Indica, inter miliaceas & arundinaceas plantas media. Septenū octonūve pedum calamos proferit, pollice crassiores, densis geniculis interceptos, fungosa, succulèta, valde dulci candidaq; medulla farctos, folia binos cubitos æquant, angustiora tamen Donax

ARUNDO, Saccharifera.



Locus.

cis, scabra, & secundum longitudinem striata, numerosa, stolones eiusdem cum cæteris arundinibus coloris amplectètia, angustiora iis quibus Sacchari metæ inuolutæ passim apud insitatores cernuntur: flos in summo comosus, & quadatenus Melicæ. Radix ad cannæ radicem accedit, sed minùs lignosa, succulentior, dulcior: ex qua germina oriuntur quæ resecta factioni opportuna sunt. Panguntur etiam tales ex ima radice abscissæ, atque bello proficiunt in Gallia & Belgio, sed hyemis iniuria pereunt. Humenti solo gaudet, sed calidiore aère, & repidiore aura. Liquorem siue laticem fundit (Saccharum vocant) cuius satis celebrari nunquam potest tum lautitia, tum utilitas, in culinis, in Pharmacopœorū Officinis, esu, potu, in secunda & aduersa valetudine, in quavis ætate, sorte, regione. Et si prima, nō tamen sola huius ferax est India, sed etiam Madera & Canariæ. Est & iam Europæ multis ad Mediterraneum Oceānumq; mare tractibus inquilina, ut Hispaniæ, Lusitaniæ, Siciliæ, atque etiam in amœnissimis

Olbiæ in Gallica prouincia viretis, nō procul & è regione Stœchadum insularum teste Pena. Vallatoriæ arundinis radix, ut ad vires transeamus, trita per se, aut cum bulbis spicula aculeosq; corpore extrahit: luxata lūborumq; dolores cum aceto mulcet. Virètia folia tusa & imposita erysipelata & cæteras inflāmationes sanāt. Corticis cinere peruncta cum aceto alopeciæ sanātur, lanugo arūdinum in aures illapsa furditatem inducit. Eadem etiā cypria arūdo efficere potest. Eadem & quædam alia Plinius prodidit. Arundinis radix cōtrita & imposita filicis stipem corpore extrahit: item arūdinem filicis radix. Arundo cypria quæ donax vocatur, corticis cinere alopecias emēdat: item putrescètia vlcera. Foliis eius ad extrahendos aculeos vtuntur. Efficacius & contra ignes sacros collectionesq; omnes. Vulgaris arundo extractoriam vim habet, & recēs tusa non in radice tantum, medetur & luxatis & spinæ doloribus radix in aceto illita. Eadem recens trita & in vino pota venerem concitat. Arundinum lanugo illata auribus obtūdīt auditum. Et alio in loco. Phragmitis radix

Lib. 24. c. 11.

Lib. 32. c. 10.



radix recens tusa luxatis medetur, & spinæ doloribus ex aceto illita. Cypria verò quæ & donax vocatur, cortex alopecii medetur vltus, & vlticibus veteratis: folia extrahendis quæ infixæ sunt corporibus, & igni sacro. Panicula flos si aures intrauerit exurdat. Qua de re sic disserit Galenus. Calami phragmitis radicem cum bulbis aculeos & stipites ex alto extrahere quidam scripsere, seu trahedi quidam vis ei insit. Nos tamen eius rei periculum non fecimus. Verum quantum ex gustu licet conicere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeque aciem. Quinetiam folia ipsa abstergentis sunt facultatis: cortex verò eius cōbustus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiunctum habes absterforium quiddam, ut exsiccat & excalfaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen desiccet quam excalfaciat. Vitandus est eius flos quæ Anthelen vocant. Nam si in aures incidat, adeò tenaciter inhærens affigitur, ut auelli nō possit, auditumque vitiet, quamobrem sæpissimè exurdat. Hæc Galenus. Traditur à rei agrariæ auctoribus inter arundinem & filicem intestinum esse odium, quare arundinem vomeri alligatam filicem in agro destruere ac enecare prodiderunt. At eò maior arundini cum asparagis intercedit amicitia. Nam si serantur in arundinetis, ibi mirificè proueniunt.

Li. 7. simpl.

## GRAMEN.

## CAP. VI.

**D**E Gramine vulgari & multis graminum generibus diximus alibi, nunc de pluribus aliis hîc tractabimus cum palustribus & aquaticis plantis. Primum de gramine aquatico, cui radix nigra, longa, geniculata, huc illuc sese diffundens per cœnosum solum, multum fibrata: folia arundinis, angusta, quæ ex caule sesquipedali per interualla prodeunt, cyperi similia: flos in paniculis nigris pendulus, cyperi modo, gustu insipido. In locis palustribus, & riuorum marginibus crescit. Gramen aculeatum, id fortassè cuius meminit Plinius, radice nititur exili, breui, candicante, capillamentis fibrata: folia

In Ag. c. 19.

Forma.

Locus.

Li. 24. c. 19.

## GRAMEN Aquaticum.

## GRAMEN Aculeatum.



PP 4



fert graminis similia, angustiora, tenuiora, propè radicem multa, in caule paucis dodrantalis est, teres, in cacumine quatuor aut quinque echinos producens, oliuæ parua non dissimiles, aut potius xanthij fructibus: quos conuolutos olim naribus inferebant & extrahebant sanguinis ciendi gratia. In riguis nascitur inter arundines, typhos, & alias id genus aquaticas plantas. Gramen arundinaceum radice est

*GRAMEN Arundinaceum.*



*GRAMEN Nigrum.*



foris nigra, intus alba, geniculata, in obliquum serpente, supernè modicè fibrata, subdulci: foliis arundinis, non adeò latis, ad radicem multis, in caule sesquipedali paucis: flore nigro, spicato, aspero, & si præmas digitos pungente. Equis & bubus noxium esse aiunt. In humidis scaturiginibus fontium & riuorū per pingua loca decurrentium prouenit. Gramen nigrum radículas emittit multas candicantes: folia graminis longiora, circa radicem numerosa, pauca in caulibus duobus tribusve, dodrante altioribus. Flos spicatus niger, vnde huic planta cognomen, & in summo caulium eminet, & ex eorūdem medio prodit variis in locis inter ipsos cauliculos & foliolū, quod ex eorūdem latere exurgit. Ad riuulorum fluentia, & fontium scaturigines profilit. Gramen triangulū radicem profert nigram, crassam, multum fibratam, cœnum olentem: folia multa, longa, vnde cūque aspicias angulos tres ostendentia, qua de causa triangulū cognominarunt, florem spicatum, subnigrum, flosculos candi-

*GRAMEN Triangulum.*



cantes



cantes è spicarum rimis prominentem cum deflorere incipit. In pigris & stagnan-  
tibus aquis crescit. Plantam proximè appictam à similitudine quæ ei est cum gra-  
mine quod à Græcis ἀργεῖς ἐν τῷ παρνασίῳ dicitur, à Latinis Gramen Parnasium,  
Dodonæus à quibusdam Gramen Parnasi nominatum fuisse tradit. Foliola mittit

Lib. 4. c. 35.

## GRAMEN Parnasi, Dod.



rotunda, hederæ aut asari foliis haud multum  
figura dissimilia, sed multo minora, & virore  
magis diluto, inter quæ duo tresve cauliculi  
eminent, graciles, pedales, in imo rufescentes, in  
summo decoris floribus ornatos, candidis, qui-  
bus dissipatis succedunt capitula rotunda, quæ  
semen rubescens concludunt: radix est crassius-  
cula, multum fibrata. Semen desiccatur & subtili-  
us est partium. Graminis huius decoctum, auctore  
eodem Dodonæo, potu venter humidum  
& imbecillum roborat, aluunt sistit, nauseam  
prohibet. Eiusdem in vino aut aqua decoctum  
vrinas ciet, maximè eius semen: neque solum  
vrinas ciet, sed etiam calculos è renibus pellit.  
Folia virentia trita & impolita vulneribus re-  
centibus, sanguinem sistunt, & ea glutinant. Ex

Vires.

Ibidem.

herbæ succo collyrium paratur quod visum acuit, & oculorum caliginem discu-  
rit, si tantundem vini & myrrhæ dimidium permiscueris cum piperis & thuris mo-  
mento, quod ut diu integris viribus conservari possit, area pyxide reponendum  
est. Prorsus idè in vdis Brabantini agri locis sponte oriri tradit Lobellius, sola flo-  
rum duplicatione speciosa varium. Potest & gramen Parnasi nuncupari quod hîc  
depictum est, radicibus plurimis, longis, capillaceis, mollibus, candidis, caulibus

GRAMEN Parnasi duplicato  
flore, Lobellij.ALIVD GRAMEN  
Parnasi.

numerosis



numerofis fruticosum, dodrantalibus: foliis hederæ facie fimilibus, denfis, fed non tam crafsis, nunc prorfus rotundis, nunc tanquam in anguli acumen definëtibus: flore copiofo, violæ fimili, luteo. Flos folium, fruticofa caulium congeries hiftoriæ Diofcoridis respondent, minimè tamen radicum crafsities, numerus, fapor prædulcis. Sed quia herbarij Gramen Parnafi vocauerunt, mutare nomen non libuit.

Cap. 18. De alio Gramine Parnafi, ex Matthiolo in agro diximus.

## CALAMAGROSTIS.

## CAP. VII.


Nomina

Forma.

**K**ΑΛΑΜΑΓΡΩΣΤΙΣ Græcis, Latinis dicitur Gramen arundinaceum, quod mediæ fit inter Gramen & arundinem naturæ & figuræ. Cuius hîc genera aliquot exhibentur. Prima Calamagrostis leucanthemos, à candidis floribus meritò nominatur, caules proferens longos, rotundos, læues, minimè geniculatos, in quorum verticibus elegantes & candidi flosculi emicant, forma cucurbitæ flores referentes, omni odore destituti. In vliginofis locis nascitur. Altera Calamagrostis foliis vestitur acutis, longis, in medio anguloso neruo diftinctis, ideòque triangularibus, herbacei coloris. Ex horum medio læues prodeunt & teretes caules, in quorum fastigiis veluti pilulæ prominent, exiguis & candidis fibris vel paniculis florentes: quæ pilulæ Iulio mēse

## CALAMAGROSTIS

I. &amp; II.



## CALAMAGROSTIS

III. &amp; IIII.



cum defloruerint, in echinata quædam capitula nucem myristicam magnitudinæ æquantia desinunt, quæ nihil aliud sunt quàm multorum seminum aculeatorum aceruus. Radix intra humum multis fibris & adnatis radiculis serpendo longè lateq; se diffundit. In vliginofis tractibus, & humectis pratis crescit. Hanc plantam Tragus sparganiū Diofcoridis esse iudicat. Duo alia Calamagrosteos genera, quod ad caules & folia acuminata attinet, prioribus similia sunt, sed multò minora & floribus distantia, gustu admodum ingrato, quæq; in pratis minimè cōmendantur.

CAREX.

Locus.  
Lib. 2. c. 37.





**C**AREX Latinis ex qua mollissi-  
ma texuntur cathedræ vliginosa  
& palustri loco plurima, foliis fe-  
rè est arundinis, longis, acumina-  
tis, latiusculis, circa radicem numerosissimis,  
ex quorum medio exurgunt caules tenues, in  
summo paniculas ferentes. Radix crassiuscula  
est, & fibrata. Caricem veram hîc appictam  
Tragus nomine graminis vulgò cogniti de-  
pinxit, Gras à Germanis dicti.

Forma.

Lib. 2. c. 37.

POTAMOGETON. CAP. IX.

**L**ATINIS Potamogeton & fonta-  
lis, Græcis ποταμογενων, & φη-  
χυνος, Gallis *Espe d'eau*, Germanis  
*Saurkraut*. Potamogetoni nomen  
inditum est, quòd in palustribus & aquosis lo-  
cis nascatur, auctore Dioscoride, nomen enim  
id fluminibus vicinam significat. Stachyites  
verò dicta quasi spicata, ob caulem quem ex se

Nomina

Li. 4. c. 96.

mittit floribus & semine spicatum. Potamogeton, inquit Dioscorides, folium  
habet betæ simile *δασυ*, densum, non, vt verterunt, hirsutum, paululum super-  
eminens extra aquam. Ex qua breui delineatione satis intelligi potest, herbam  
cuius picturam hîc damus, esse Potamogetona. Caulem namque rotundum ha-  
bet, geniculis intersectum, è quibus pediculi exeunt, foliis betæ aut plantaginis  
vestiti, paulum supra aquam eminentibus. Flores etiam spicatos plantaginis in-  
star profert, ac subinde semen. Radix flexuoso anfractu excurrit, è geniculis mul-

Forma.

Ibidem.

POTAMOGETON I.



tis propagans fibras,  
fundo aquæ immer-  
sas, è quo alimentum  
fugit. Consentunt &  
natales: nascitur e-  
nim in lacustribus &  
aquosis locis. Refri-  
gerat & astringit, vt  
tradit Dioscorides,  
pruritibus, vlceribuf-  
que, vetustis, & iis  
quæ pascendo ser-  
punt confert. Astringit  
& refrigerat si-

Temper.

& Vires

Ibidem.

militer polygono, ait Galenus, sed essentia eius crassior quàm polygoni est. Pli-  
nius de eadem hæc scripsit. Potamogeton ex vino dysentericis etiam & cæliacis,  
similis betæ foliis, minoribus tantum, hirsutioribusq; , paulatim supereminens  
extra aquam. Peculiariter refrigerat, spissat. Vfus in foliis: cruribus vitiosis vtilia,  
& contra vlcerum nomas, cum melle, vel aceto. Verus Cornarij codex ha-  
bet: extra aquam. Vfus in foliis: refrigerant, spissant, peculiariter cruribus  
vitiosis, &c. Subiicit Plinius. Castor hanc aliter nouerat, tenui folio velut  
equinis

Li. 3. simpl.

Lib. 2. c. 3.

Embl. 86.

Li. 4. Diosc.





equinis fetis, thyrsis longo & læui, in aquo-  
sis nascentem. Radice sanabat strumas &  
duritias. Potamogeton aduersatur & croco-  
dilis: itaque secum habent eam qui venantur  
illos. Nouit & alteram Potamogetona Da-  
lechampus, quæ in lacubus & stagnis Sequa-  
norum gignitur, caulibus per aquam spar-  
sis, angulosis, geniculatis, radículas exiles &  
albas è geniculis mittentibus, quibus ob-  
uium in ripis cœnum solumve apprehendit:  
ex singulis quoque articulis singula folia  
prodeunt, longo pediculo nixa, longiora  
quàm in priore Potamogetone, crassiora,  
& ( quæ certissima nota est hanc ab illa di-  
stinguendi ) transuersis lineis virgata, cum  
prioris folia lineis in longum ductis discrimi-  
nentur. Flos spicatus rubet, longo hærens  
petiolo: semen copiosum, durum, follicu-  
lis inclusum.

## NYMPHÆA.

## CAP. X.

## Nomina




YMPHÆA Latinis, sicuti Græcis Νυμφαία vocatur, Arabibus Nilo-  
far, Ninofar, & Nilufar, Officinis Nenufar, Gallis Blanc d'eau, & Lis  
d'estang, Germanis Gelb, vneifz schebluomen, Hispanis Escudetes del rio, &  
Higos del rio. Aquæ, lymphæ seu nymphæ antiquitus vocatæ nomen

## NYMPHÆA Maior alba.

Li. 3. ca. 132.  
Genera.  
Ca. 132. li. 3.

Forma.  
Li. 3. ca. 132.



& natales dederunt Nymphææ: aquosum enim  
amat locum, inquit Dioscorides: vel id nomen  
sibi vendicauit, ut ex veteribus aliqui fabulati  
sunt, à Nympha quæ zelotypia Herculis inta-  
buit, & mortua in palustrem hanc plantam  
mutata est. Dioscorides duo ponit Nymphææ  
genera: vnâ flore albo, radice nigra: alterâ flo-  
re luteo, radice alba: quibus tertiam addit Mat-  
thiolus Nymphæam paruam, quæ in quibus-  
dam Bohemiæ lacubus prouenit: quam alibi  
quàm in Bohemia sese vidisse negat. Primam  
igitur Nymphæam albam maiorem nomina-  
re licebit: postremam hanc Nymphæam albâ  
minorem. Sunt herbarij qui Nymphæam  
quandam luteam minorem reperiri, sed ra-  
rius, idq; in Septentrionalibus regionibus as-  
serunt, à superiore illa quoque discernendam,  
ut hæc minor, illa maior lutea sit nuncupanda.  
Nymphæam albam maiorem dixit Dioscorides  
foliis esse fabæ Egyptiæ, minoribus, & lon-  
gioribus, aliis in summa aqua, aliis demersis,  
pluribus ex radice eadem prodeuntibus: flore  
lilio





lilio simili, albo, me-  
 dium croceum ha-  
 bente : cū deflo-  
 ruerit, vt rotundum  
 malum, aut papau-  
 ris caput extuberat,  
 nigro, amaro seme-  
 ne, dēfo & lato, len-  
 ti gustus. Caulis est  
 levis, niger, minimē  
 crassus, Aegyptiæ fa-  
 bæ cauli similis : ra-  
 dix nigra, scabra,

clauæ similis, quæ Autumno secatur. Hæ omnes notæ nostro Nenufari optimē  
 quadrant. Folio enim conspicitur orbiculato, læui, herbaceo, amplo, in stagnanti-  
 bus aquis supernatante: flore candido lilio simili, cuius medium croceum est, &  
 cū defloruerit, capite papaueris, in quo semen amarum, latum, pingue. Caulis  
 gracilis est & læuis: radix nigra & ampla, dulcis, nodosa, clauæ formam referens.  
 Nymphaea altera Dioscoridis foliis est ante dictæ, radice alba, scabra : flore luteo,  
 nitente, rosæ simili. Quæ itidem notæ in vniuersum omnes alteri Nenufari, quæ  
 luteis est floribus, respondent. Vtramq; sic depinxit Plinius partim ex Theophra-  
 sti & aliorum, partim ex Dioscoridis, vel Crateuæ sententia. Nymphaea nata trā-  
 ditur Nympha zelotypia erga Herculem mortua. Quare Heraclion vocant ali-  
 qui, alij rhopalon, à radice clauæ simili. Ideoq; eos qui biberint eam, duodecim  
 diebus coitu genituraq; priuari. Laudatissima in Orchomeno & Marathone.  
 Bæoti Madon vocant, qui & semen edunt. Nascitur in aquosis, foliis magnis, in

Lib. 3. c. 7.

*NYMPHAEA Lutea*  
*Minor.*



*NYMPHAEA Altera*  
*Lutea Minor.*



ee



Lib. 9. hist.  
cap. 13.

summa aqua, & aliis ex radice prodeuntibus, flore lilio simili, & cum defloruit, capite papaveris, tenui caule. Secatur Autumnus. Et mox. Est & alia Nymphaea in Thessalia amne Penco, radice alba, capite luteo, rose magnitudine. Theophrastus de radicum differentia agens, ita de Nymphaea scribit. Γλυκύτις, ἢ τε νομισθεῖσα χαλαρμένη. Φύει δὲ ἐν τοῖς λίμναις, καὶ ἐν τοῖς ἐλάδεσιν, οἷον ἐν τῇ ὀρχομένῃ καὶ μαραθῶνι, & περὶ κρήνην. Καλεῖται δὲ αὖτις οἱ βοιωτοὶ μαδωναῖν, ὅτι τὸν καρπὸν ἐσθίουσιν. ἔχει δὲ φύλλον μέγα ἐπὶ τῷ ὕδατι, εἶναι δὲ φασὶν ἰχθυοῖν, ἐὰν τελέσῃ τις ἐπὶ τὴν πάλιν ἐπὶ τῇ, χρησίμη δὲ καὶ πρὸς τὰς δυσεντερίας νοσημένη. Id est, Dulcis Nymphaeae radix, quae nascitur in lacu-

## NYMPHAEA MINOR ALBA.



bus & palustribus, vt in Orchomenia & Marathone, & in Creta. Bæoti Madonain vocāt, eiusque fructu vescuntur. Habet folia magna super aquam. Trita & plagæ imposita sanguinē sistere dicuntur: & posita ad dysenterias utilis est. Nymphaea minor alba, Morfus

ranæ Herbariorum: folio quidem Nymphaeæ, sed brassicæ marinæ paulò maiore: flore candido, capitibus exiguis vt in cappari: semine intus papaveris magnitudine. Nymphaea lutea minor radiculis multis vliginoso cæno affixa est, capillaceis, è caulium nodis prodeuntibus: foliis multis, longo, rotundisq; pediculo nixis, gustu amaris, aquæ innatantibus, densis: caulibus teretibus, geniculatis: floribus luteis, flori cucurbitæ perquā similibus, quinque tantum foliolis constantibus, non, vt in lutea maiore, numerofo stipatu congestis, aut multos apices intus gignentibus, per ambitum venustissimè fimbriatis: cauliculo oblongo, lato & compresso, seminibus pleno oblongis, latis, in ambitu pilosis, triplicis ferè modo, gustus quoque amari. Nymphaea alba maior & lutea in paludibus & stagnantibus aquis nascuntur. Nymphaea minor alba & lutea aquarum etiam sunt alumnæ: verum regionū maximè Septentrionalium. Lutea minor in Sebusianorū parte, quam vulgò Brefsiam vocant, plurimis stagnis ac viuariis innatat, quare omnibus illic nota ac celebris est. Præterea in Sequanæ ripis ad Mantam oppidum gignitur. Græcis fortassis incognita. Septentrionales, apud quos sæpius prouenit, Morfum ranæ vocitant, cum Nymphaea parua veriùs appellanda sit: magis enim ad Nymphaeas, quàm ad potamogetona, aut quamuis aliam palustrem herbam accedit, tum figura, tum natalibus. Alba minor alia radice est plurimis fibris simul coaceruatis villosa,

NYMPHAEA Alia  
minor alba.

villosa,



villosa, cubitalibus, quæ herbæ viticulas longè lateq; dissectas alunt in luto adeò profundè demersas, vt nisi validè sub cœnum brachium adigas, vix vi eruere possis, villos multos per aquam spargente, ramorum geniculis affixos, tenerrimos, qui facilè rumpuntur cum herba vellitur: id quod multos decepit credentes nullam aliam radicem esse præter exiles eas fibras: folia multa Nymphææ modo è nodosis ramorum per aquam fluctantium geniculis prodeunt, longo pediculo hærentia, aquis innatantia, minori chelidonio aut asaro simillima: quorum auersæ parti ferè semper mucosi vermiculi, ex aqua recens compacti, velut agglutinati hæret & in ea fouentur: rami per summam aquam huc illuc diffunduntur. Flos est violæ, niueus, longiusculo capite & herbaceo inclusus priusquam dehiscat, longa virgula subiecta nuda, nec ramosa, nec foliosa, vt in chelidonio minore. Floret Augusti mensis principio. Flos noctu comprimitur & sub aqua latet, inter diu patescit, & aquis sese exerit. Euulsa herba & rursus in aquam iniecta viriditatem diu retinet, & quamuis radicibus careat, reuiuiscit tamen, nouamq; sobolem gignit. Sapor idem qui & lenticulæ palustris. Vis refrigerandi & humectandi. Miretur aliquis & iure quidem, Theophrastum quo loco palustres plantas, præsertim in Orchomenio lacu frequentes, tam diligenter enumerauit & descripsit, Nymphææ lacuum & paludum ferè omnium aquis innascentis nullo modo meminisse, sed eo tantum loco quo de radicum differentia tractat, quem supra citauimus. At qui plantas Orchomenio lacui familiares à Theophrasto descriptas diligentius perpenderit, cõperiet, Dalechampij sententia, Sida nomine tum Nymphæam ipsam, tum ipsius semen intelligi, quod eius lacus accolæ Nymphæam Sidam nominent. Theophrasti verba hæc sunt. Πρῶτον οὖν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ περὶ Ὀρχομενοῦ τὸ δι' ἐστὶ, τὰ φυόμενα δένδρα, καὶ ὑλήματα. ἰτέα, ἐλφιάγνος, σίδη, γάλαμος, ὅ, τε αὐλίσσιος καὶ ἕτερος, κύπερος, φλέω, τύφη. ἐτι γὰρ μὴν κινιάνθες, ἱκμή, Ἐχάλυμνον ὑπνον. ὃ καὶ προβαγορύσει λεῖμμα, τὸ τοῦ παλαιοῦ καὶ ὑδατος ἐστὶ. Id est, Primum in lacu Orchomeno arbores & materiæ humiles proueniunt, salix, Elæagnus, Sida, Calamus tibialis & alter, Cyperus, Phleum, typha, meniantes, icma, ypnium. Quod enim Lemma vocatur, altius mergitur in aqua. ἡ δὲ σίδη τὴν μὲν μορφήν ἐστιν ὁμοία τῇ μήκωνι, καὶ καὶ τὸ ἄνω κυλινδρῶδες (Gaza καδιδῶδες vel κυλινδρῶδες legit) τοῖς τὸν ἑχά, πολλὴν μείζον, ὥς καὶ ἄλγος, μεγέθῃ δὲ ὅλος ὁ ὄγκος ἡλικὸν μῆλον. ἐστὶ δὲ ἡ γυμνὸν, ἀλλ' ὑμένες περὶ αὐτὴν λευκοί, καὶ ἐπὶ τοῖς ἐξωθεν φύλλοις, πῶδῃ, παραπλήσια τοῖς τῶν ῥόδων, ὅταν ἐν γάλαξιν ᾧσι, τέτταρα τὸν ἀεὶ μὲν. ἀνοιχθῇ δὲ τὸς κόκκους ἐρυθρὸς μὲν ἑχά, τῷ γήματι δὲ ἑχ' ὁμοίως ταῖς ῥίζαις. (Gaza legit, τοῖς μήκωνος, siue τῇ μήκωνι, vel potius ταῖς ῥίζαις ex cõtextu & Athenæo, apud quem corruptè legitur διδῆ pro σίδῃ) ἀλλὰ περὶ φερῆς, μικρὸς δὲ, καὶ ἡ πολλὰ μείζους κέρχας. τὸν δὲ χύλον ὑδατῶδῃ τινα, καὶ θάπερ ὁ τῶν πυρῶν. ἀδρῶν δὲ τῶν ἑρῶς, μίχον ὃ ἑχά μικρὸν. ὃ δὲ ἄνθος ὅμοιον ῥόδῳ καὶ λυκί, μείζον ὃ καὶ χεδὸν διπλάσιον τῷ μεγέθῃ. τὸ τοῦ μὲν οὖν καὶ ὃ φύλλον ἐπὶ τῷ ὑδατος. μετὰ δὲ ταῦτα ὅταν ἀπανθήσῃ καὶ συστῇ ὃ καὶ ἀκάρπιον, καὶ ἀκλινεῖται φασὶν εἶς ὃ ὑδωρ μέλλον. τέλος δὲ σιωπῇ ἐπὶ τῇ γῇ, καὶ τὸν καρπὸν ἐκχεῖν. Id est, Sida specie papaueri similis est: caput enim cytini formam habet, vel vt legit & conuertit Gaza, tale etenim caput gerit, nisi quod amplius ad portionem, magnitudo mali tota amplitudo, est autem non nudum, sed candidis membranis intectum, hisq; foris folia herbacei coloris similia rosis, quæ adhuc sunt in calice, quaterna se applicant: apertum grana rubra ostendit, figura non papaueris (sic legit Gaza, sed legendum, vt diximus, malo punico dissimile, vt totum caput malo simile sit, grana verò intus conclusa mali punici granis dissimilia, cum minora sint) sed orbiculata, exigua, nec multò milio maiora. Saporem quemdam dilutum habet vt tritici: crassatur æstate, pediculo paruo adnectitur: flos calici rosæ similis, sed maior, & ferè duplex magnitudine. Huic & folium super aquam extare affirmant, postea cum defloruerit, fructusque compactus fuerit, magis in aquam declinare: tandem

Tempus.

Lib. 4. hist.  
cap. 11.



terram contingere, fructumq; fundere. Hæc tam accurata Sidæ historia Nymphæam hoc nomine intelligi perspicuè demonstrat. Nymphæa enim nusquam alibi quàm in lacubus & paludibus reperitur, nec alibi flores eius foliaq; decerpuntur, quàm summa aqua: flos præsertim luteæ rosæ calicibus similis. Fructus, quem peculiariter etiam Sidam vocant, membranosis & candidis foliolis obtegitur, papaveris caput figura æmulatur, tamen grandior & amplior, nempe mali ferè magnitudine. Æstate crassescit, & cum perfectus est paulatim aquam subit, donec terram attingat, tum demum fructum fundit. Semen aperta Sida rubrum spectatur, malo punico dissimile, ut quod rotundum sit, minutum, milio non multò maius, saporis aquosi. Hæc, inquam, omnia in Nymphæa spectantur, nisi quis dicat à Theophrasto Sidæ semen rubrum, Nymphææ nigrum à Dioscoride dici. Cui facile responderetur Nymphææ semen maturescens rubescere, siue rufescere, maturum nigricare. Præterea inter lacustres siue palustres plantas Nymphæam valde celebrem, nusquam alibi Theophrastus aut describit, aut recenset, cum tamen in Orchomeno lacu plurima nasceretur, eodem Theophrasto teste, cum ait, Dulcis est Nymphææ radix. In lacustribus nasci solet, ut in Orchomenia, Marathone, & in Creta. Hanc Bœoti vocant Madonain, fructumque mandunt: quod postremum itidem de Sidæ semine dixit Theophrastus. Cibo idonea ex nascentibus in lacu Sida, & ipsa, & folia ouibus, germen suibus, fructus hominibus. Pena plantam aliam raram & perelegantem maluaceam, & Althææ congenerem, non

Lib.9. hist.  
ca.13.

Lib.4. hist.  
cap.11.

*ALTHÆA Palustris, Pena.*



Lib.3. c.131.

abs re à quibusdam doctissimis Sidam Theophrasti existimari scribit, cui quidem, ut si quæ alia, optimè quadrat. Nam *σιδη* Græcis dicta fuit, inquit, à flore eiusdem cum balauftio coloris, nec absimili, qualem venustum imprimis ostendit hæc planta, florere solita in locis riguis, lacustribus agri Ferrariensis inter Patauium & Eridanum flumen. Radix hortensis maluæ, caulibus cubitorum duorum, folia Althææ, sed oblongiora, laciniis acutioribus, flos purpureus, saturatus, præoniæ aut maluæ fatiæ, aut cytini. Iuxta & in summis caulibus visuntur tempore vindemiarum vtriculi rotundi, oblongi, pullo colore, Aristolochiæ effigie, prægnantes, semine smyrnij, aut milij colore & magnitudine. Dicitur & Althæa palustris. Radix Nymphææ sicca cum vino pota, inquit Dioscorides, cœliacis dysentericisq; auxiliatur. Eadem stomachi ac vesicæ doloribus illinitur: vitiliginis ex aqua emendat: imposita cū pice alopecij medetur. Eadem contra veneris insomnia bibitur, siquidè ea prorsus adimit: pota assiduè aliquot diebus genitali infirmat. Idem semen potum efficit. Nymphææ luteæ semen & radix contra scæminarum profluvia efficaciter ex vino nigro bibuntur. Plinius de Nymphææ in medicina usu sparsim hæc tradit. Radix nigra in sole siccatur, aduersaturque aluinis: quod corruptè legi affirmat Cornarius suppositum à quodam, qui cum obliteratam lectionem assequi non posset, aduersaturque aluinis substituit ex Dioscoridis verbis *κοιλιακὸς ὀφελὲς*, idest, cœliacis prodest: aluinos dictos putans cœliacos: cum tamen hac voce usus Plinius non comperiatur. Nam quod alibi

Lib.26. c.7.

Embl. 134.  
lib.3.

Lib.21. ca.27.

de Vin



de Vincaperuinca legitur, Aluinis imposita multum prodesse dicitur: hoc in vetere habetur, In aluta imposita, &c. Verus itaque Cornarij codex habet, ac versatur, & pro aluinis alternis, vocis tam certa vestigia, ut non sit alia verior lectio exquirenda, cum & sententia ipsa ita plena reddatur. Idem Plinius vires Nymphææ ita tradit. Venerem in totum adimit, ut diximus, Nymphæa Heraclia, eadem semel pota isti quadraginta dies. Insomnia quoque veneris à ieiuno pota, & in cibo sumpta. Illita quoque radix genitalibus, inhibet non solum venerem, sed & effluentiam genituræ (ita *ὀνδρωγμὸν*, idest, seminis in somno effusionem reddidit: vulgati codices habent affluentiam) ob id corpus alere, vocemque dicitur. Et alopecias emendat Nymphææ & cicute radix, si vna trita illinantur. Et, Nymphææ Heraclie semen cum vino potum dysentericis prodest. Tenebmo radix Nymphææ Heraclie è vino bibitur. Et, Aluum leuiter soluit & Nymphæa in vino austero. Nymphææ Heraclie radix è vino pota, & ipsa consumit lienem. Et, dolores vesicæ sedat ex vino Nymphææ Heraclie radix. Et, Nymphæa trita plagis imponitur (ad sanguinem sistendum.) Et, Vlcera manantia Nymphææ Heraclie radix sanat. Galenus verò optimè de hac re statuit his verbis. Nymphææ tum radix, tum semen desiccandi vim habet citra morsum. Itaque ventris profluvia cohibet, semenque siue per insomnia, siue alio pacto immodicè profluens retinet. Iuuat porro etiam dysentericos. Cæterum Nymphæa quæ candidam habet radicem potentioris est facultatis, ut & muliebri medeatur profluvio. Verum & hæc & ea quoque quæ nigram habet radicem ex vino nigro austero bibitur. Porro nonnullam habent quoque & abstergerendi potentiam. Itaque & alphas sanant & alopecias. Cæterum ad alphas macerantur aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad hæc aptior est ea cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba. Arabes non solum Nymphæarum semine & radice vtendum præcipiunt, cum refrigerare & exsiccare sit opus, sed & floribus, cum refrigerandum & humectandum sit, de quibus Græci nihil scripserunt. Nymphææ flos, inquit Auicenna, est frigidus & humidus in secundo. Serapio. Albafari, Nenufar est frigidum in tertio gradu, humidum in secundo, subtilium partium, penetratiuum, aufert vigilias euenientes à caliditate. Rhasis. Nenufar est frigidum, inducit somnum, sedat dolores: quod de floribus intelligendum est, & certa experientia compertum. Nam syrupus ex iis calorem immodicum valde extinguit, oleum & aqua ex iis stillatitia somnum alliciunt, dolores capitis sedant à bile excitatos. Quod si hæc Græcorum inuentis addiderint, non modò non culpandi, sed laudandi sunt potius: neque propterea existimandum eos de alia quàm de Græcorum nymphæa loqui, cui cum refrigerandi & humectandi vim tribuunt, de floribus intelligunt, sicuti Græci atque Arabes de semine & radice, cum vim refrigerandi & exsiccandi illis inesse tradunt. Sed inde maiores rixæ & conuitia neotericorū in Arabes, qui Nymphæam quandam calidæ naturæ esse tradiderunt, & tenuium partium. Serapio. Est alia species Nenufarum, in qua est acuitas, caliditas & subtilitas, ita quod quando volumus calefacere in ægri tudinibus frigidis, administramus eam, & inuenimus iuuamentum. Verum quid miri est cum Nymphæa inde dicta sit, quod lymphis nymphisve sit conuictrix & accola, Serapionem & ipso antiquiores palustrem aliquam plantam consimilem, calidā, tenuantemque nymphæarum generibus adscripsisse: nimirum illam fortassè quam Belgæ *Dotterbloemen* nominant, periti quidam herbarij Caltham palustrem: quippe cuius natales, folia, flores Nymphæam luteam proximè referunt, atque adeò ut hanc illi quidam substituerint. Radix acris gustu est.

Li. 26. c. 10.

Li. 25. ca. 11.

Lib. 26. c. 8.

Ibidem.

Li. 26. ca. 13.

Ibid. ca. 14.

Li. 8. simpl.

Lib. 2. c. 315.

Lib. simpl.

cap. 144.

Lib. simpl.

cap. 144.

Petr. Pe. in


Ad.



Lib. 4. hist.  
ca. 11.

Nomen.

Forma.



**N**TER Lacus Orchomeni plantas Theophrastus Lemna recensuit, non Lemna, ut in vulgatis codicibus legitur, de qua, nisi quantum coniectura probabili assequi possumus, nihil certi possumus iudicare. Lemna quidam dictum volunt quasi λεπίδα, id est, squamam, corticem, membranam à verbo λεπέω quod significat λεπέω, desquamare. Id Lemna esse cuius pictura hic damus verisimile est. In lacubus stagnisque agri Segusiani limpidum aliquem riuulum excipientibus nascitur, longissimis & tenuissimis veluti filis ex profundo aquæ in summum emergentibus, in quorum fastigiis quaterna spectantur foliola, squamis piscium simillima, instar lenticulæ aquæ innatantia, carnosâ, virgata: flos est candidus, gustus fatui. Nominis igitur etymologia, natales Lemmati satis conueniunt.

## LENS PALVSTRIS.

## CAP. XII.

Nomina

Forma.

Matth. in  
ca. 83, lib. 4.


Locus.

Lib. 4. c. 83.

Vires.

**L**ENS seu Lenticula palustris Græcis vocatur φακός ὁ ἐπὶ τῶν τελευτῶν, Arabibus Tahaleb, seu Thalib, Gailis Lentille d'eau, Italis Lente de paludi, Germanis Uaasser linsen, Hispanis Lenteyas dellagoa, Officinis Lenticularia seu Lenticula aquæ. Folio est rotundo, minuto, lenticulæ simili, paruo tenuiq; inhærens capillamento. Hæc si (quod nonnunquam accidit) aquarum inundationibus à pigris aquis influentes transferatur, cum litoribus inhæserit, mirum in modum propagatur: nam subnatis quibusdā capillamentis, quæ radicum vice esse videntur, sese terræ alligat, atque ita adolescens tandem crescit in plantam aquatico sisymbrio haud ab similem. Id quod natura operum indagatores non sine admiratione obseruarunt. Lens palustris reperitur in sta-

## LENS PALVSTRIS, Matth.



Li. 25. c. 22.

Li. 8. simpl.

Temper.

Vires.

Vires.

etiam in pueris hernias intestinorum. Sic Plinius Lentem palustrem totidem ferè verbis describit. Est & palustris Lens nascens in aqua non fluente, refrigeratoriæ naturæ: propter quod collectionibus illinitur, & maxime podagris, & per se, & cum polenta: glutinat & interanea procidentia. Et Galenus, Lens palustris, inquit, humidæ frigidaq; temperaturæ est, vtrimq; ex secundo quodammodo ordine. Magnificiunt quidam, ut tradit Matthiolus, pumilæ huiusce plantulæ stillatitiam aquam



## LENS PALVSRIS

Altera, Matth.



aquam ad internas viscerum inflammationes, & ad pestilentes febres. Quinetiam eandem præferunt ad oculorum ruborem, & palpebrarum phlegmonas, & ad mamarum & testiculorum collectiones antequam augeantur: nam illita non obscure fluentes humores repellit. Herba ipsa recens ex aquis allata & fronti adhibita, capitis dolores mulcet, qui à calore pro- uenerint. Vescuntur ea anseres & anates magna voluptate, etiam gallinæ, cum aquis exempta fursuribus permiscetur. Sunt qui putant Ipnium plantam Orchomeni lacus à Theophrasto pos- sitam, lentem palustrem esse, & à Theophrasto siue à Bœotis sic nuncupatam quod fauillis è camino furnove euolantibus similis sit: nam *lentos* caminum furnumve significat, cōiectura, ut aiunt, eò probabiliore, quod nusquam alibi huius lenticulæ herbæ frequentissimæ notissi- mæq; meminerit Theophrastus. Alia planta in paludibus quoque nascitur, inquit Matthiolus, quam à seminis figura lentem palustrem appel- lat, Caulem habet angulosum per aquā repen- tem, à quo per interualla multa simul oriuntur

Lib. 4. hist.  
Cap. II.

folia longis ac tenuibus pediculis nitentia, quæ quaterna crucis figura sese pan- dunt, rotundo cacumine. Semen fert racemi modo in ipso caule inter foliorum pe- diculos lentium ferè effigie, non tamen adeò compressum, subnigrum, longiuscu- lis pediculis appensum, densum, durum. Hanc à Cortuso accepit.

## PHLEOS. CAP. XIII.

**P**HLEOS quoque lacustris est planta, & Theophrasto Orchomeni la- cus incola, eaque, inquit, duplex, mas & fœmina, mas fructum fert, fœmina sterilis est, ad nexus vtilis, mas inutilis. An verò à diligentibus herbariis tandiu quæsitâ nuspiam lacuum, paludum, aliarumve stagnantium aquarum comparebit phleos siue stœbe: eandem enim plantam esse vulgò putant. Nam phleos mas Theophrasti fuerit ea quæ hîc primo loco depicta est: Radice breui, plurimis fibris huc illuc dispersis capillata, foliorum pediculis cu- bitalibus, angulosis, teneris, fungosis: folio triangulari, tribus cuspidibus mucrona- to, virgato, è viridi subluteo, valde inciso, ut in tres cuspides & earum mucrones fi- niat, super aquas eminente: caule laui, cubito altiore: flore violæ in terna foliola distincto, ex albo subpunicea, extante in medio caruleorum apicum veluti glomo: fructu lato, subrubro, vel subrufo (*ὑπόπυρρον* enim legendū in Theophrasto, nō ut vulgati codices habent *ἐπιπυρον*) placentæ simili (*πλακοῦσι* enim lege, non ut in vulgatis *πλακύντες*) præter quem globosa & echinata profert capitula. Euul- sa hæc planta, & aquis destituta statim flaccescit & arefcit, ut non nisi in aquis possit viuere, quod de phleo Theophrastus tradit, licet autem eam in sicco emar- cuisse putes, tamen aquis reddita statim exhilaratur ac reuirescit. Gignitur frequen- tius in cœno aquarum non pigrarum quidem aut stagnantium, sed limpidarum & assidue fluentium. Sunt quibus videatur planta secundo loco hîc apposita etiam phleos esse, ut sit vtræque mas, superior phleos angustifolia, hæc phleos latifolia,

Lib. 4. hist.  
cap. II.

Genera

Forma



*PHLEOS Mas, siue*  
*Stæbe Theoph. Angustifolia.*

Matth. in  
 c. 96. lib. 4.



quam herbarij sagittam, vel sagittal em, alij Pli  
 nij Sagittariam aquaticam, siue Pistanam Ma-  
 gonis, quidam linguam serpentis vulgò vo-  
 cant. Huius folium sagittæ tricuspide figuram  
 proximè refert, supernè in vnam cuspidem, in-  
 fernè in duas desinens: pediculo nititur trian-  
 gulari, intus cauo, sesquicubitali, quandòque  
 maiore pro aquarum profunditate in quibus  
 viuit: caulem habet rectum, leuem, rotundum  
 supernè in ramulos diuisum, quibus flores insi-  
 dent albi, ternis foliolis constantes, hærentque  
 petiolis pari exortu à caule prodeuntibus. Ex  
 his tandem capitula nascuntur subpurpurea,  
 nucis ponticæ magnitudine, in quibus minu-  
 tum semen concluditur, radicem habet albam,  
 multifidam, fibratam. Temperamento est fri-  
 gido & humido, & iisdem cum plantagine  
 aquatiqua viribus. Phleo fœminæ folia sunt  
 longa, angusta, vtrinque velut acie manum con-  
 trectantium casum sauciantia, sic prominente  
 & elato dorso, vt triangula videantur. Caulis  
 ex mediis foliis prodit, tres aut quatuor pedes

altus, globosis & echinatis capitulis circa fastigium surrectis, vt in phleo mare,  
 nullo fructu: radice priori simili. Gignitur ferè in amnium ripis. Huius foliis te-  
 getes & storeas olim rustici texebant, quod ex maris foliis tenerioribus & fungosis  
 fieri nequit. Priori phleo mari & phleo fœminæ cum tribulo (terrestri & aquatico)

*PHLEOS Mas latifolia.*  
*Sagitta maior, Matth.*



*SAGITTA Minor,*  
*Matthioli.*



ac ono



PHLEOS *Femina.*

ac ononide cōmune id est, auctore Theophrasto, quòd licet spinosum folium non habeant, Lib. 6. hist. Cap. 1.

aculeatum tamen quippiam proferunt præter folium, nempe capitulum echinatum, vt tribulus terrestris spinosum feminis cōcepraculum, aquaticus corniculatam nucem, aculeis rigentem, ononis caulem aculeatum, licet nullius folium spinis armatum sit, vel, vt vulgata habent exemplaria, præter aculeos aliud folium gerunt, id est, nec in totum, nec foliis aculeata sunt. Præterea nostræ de phleo sententiæ adstipulantur, quæ sparsim de ea scripsit Theophrastus. Phleo folio esse carnosio, multipliciter inciso, numerosis radicibus, non tamen altè descendantibus, ononidis & tribuli modo alibi quàm in folio aculeos habere, vt diximus, germinare circa Vergilias, quo primùm tempore terram arant, in aquis vt Sidam & Butomum fructificare: fructum mollem esse, placentem similem, subrufum, quem ἀνθήλινον vocant (quo nomine etiam typhæ flo-

Lib. 6. hist. Cap. 5.

Lib. 3. c. 116.

est, mandi à pueris, radice pecudes pasci, fœminam sterilem esse, sed commodè neceti, marem fructiferum, sed ad nexus ineptum. Hæc priori phleo mari, & phleo fœmine satis benè conueniunt. Ex quibus illud mirum videri possit, quisnam fructus phlei vsus ad lixiuia esse potuerit, vt fortassè corrupti Græci codices Theophrasti videri possint, in iisq; legendum non πρὸς τὰς κοινίας, id est, ad lixiuia, sed πρὸς τὰ κοινία, id est, ad muros calce illinendos, siue tectorio opere inducendos: conuolutis enim phlei ramis fructu non detracto, muri calce diluta facillè illini possent. Quidam in lixiuiis vtilem fuisse interpretantur, quòd eius caulibus subasperis lintea sordida fricarentur ac detergerentur. Iam verò dicet aliquis, phleon foliis esse spinosis, Plinio ita scribente. Aliqua & secundum spinam habent folium, vt tribulus & ononis. Quædam in folio habent & in caule vt phleos, quod aliqui stœben appellant. At hæc perperam à Plinio ex Theophrasto conuersa esse perspicuum est ex ipsomet Theophrasto: sic enim scribit. τὰ ὅτι καὶ παρὰ τὴν ἀχανθαν, ἔστι φύλλον, ὡς περὶ τὸν ὄνιν, ἃ ὁ τριβύλος, καὶ ὁ φλεὼς, ὁ δὲ τινες καλεῖσι τριβύλον. Id est, quædam præter aculeos aliud habet folium, vt ononis, tribulus, phleos, quam nonnulli stœben appellant. Ad hæc Theophrastus paulò post negat folium phlei spinosum esse, cum enim dixisset capparin aculeos & in foliis & in caule habere, subiungit, nō quem-

Lib. 4. hist. Cap. 11.

Lib. 21. c. 15.

Lib. 6. hist. Cap. 1.

Cap. 5. lib. 6. hist.

admodum phleos & hippophaes, quorum folia spinis carent. Et, τῆς ὅτι ἀκανθικῆς, ἐπὶ τὸν γὰρ τοῦτο εἰπέν, ἐπεὶ διὰ τὴν ἀκανθικῆς, ὁ μὲν ἀκανθῶδες ὄλεως, ὁ δὲ φυλλοῦ ἀκανθῶν, ὑπερὶ ἐκείνου χωρὶς λεκτέον. καὶ τὸ δὲ ὅτι παρὰ τὴν ἀχανθαν ἔχοντος φύλλον, ὡς περὶ ὁ φλεὼς, ὁ δὲ τριβύλος ἃ ὁ κάππαρος ἴδιον ἔχει, ὁ δὲ μόνον τὴν ἐκ τῶν καυλῶν ἀχανθαν ἔχει, ἀλλὰ τὸ φύλλον ἐπακάνθισον. vel ὡς περὶ ὁ φλεὼς, ἃ ὁ τριβύλος. ἢ διὰ τὸ κάππαρος ἴδιον ἔχει, &c. Sic enim emendandos esse vulgatos codices tum locus proximè citatus, tum spinosarum plantarum diuissio alibi ab eodem auctore posita, & hîc repetita demonstrant. Sed quoniam aculeatas (id enim consequitur) distinximus in eas quæ totæ spinosæ sunt, & eas quæ spinosa habent folia, de vtrisque seorsum dicendum, & de tertio illo genere, quòd præter aculeum folium habet, vt phleos: tribulus enim & capparis id peculiare habent, vt non solum caulem aculeatum habeant, sed etiam folium,



- folium: vel, vt phleos & tribulus: capparis enim id peculiare habet, &c. At ne quis miretur tribulo & cappari modo aculeos in caule solum tribui, vt ononidi, phleo, myacanthæ, hippophai modo, præter aculeos illos spinas etiam in foliis, intelligat eundem Theophrastum duo tribuli genera posuisse, vnum folio ciceris, minimè aculeato, alterum folio aculeato. Similiter capparis nostras foliis est minimè pungentibus, sed spinosis ramis infesta, quæ verò in Ægypto, & multis Græciæ locis gignitur, & ramis & foliis aculeatis riget. Sed si Theophrasti phleum hîc exhibuimus an propterea Dioscoridis stœben inuenimus? In ea sanè sunt sententia plerique herbarij, moti cōiectura ex Theophrasto sumpta, qui loco suprà à nobis citato scribit Phleon à quibusdam stœben appellari. Sed leuis est hæc coniectura, & parui admodum momenti ad probandum phleon & stœben eandem esse. Idem enim nomen contrariæ etiam naturæ plantis à diuersis auctoribus sæpè inditum est, quod in hac maximè perspicuum est, vel Galeno teste, qui in Antidotis stœbes meminit, acris valde & calidæ facultatis, qua doliis aggesta pater imbecilla vina conseruabat. Verba eius hæc sunt. Nascitur apud nos herba quædam fructicosa, admodum calida & acris, & quæ aromaticum quippiam habet. Vocant autem ipsam indigenæ Colymbada, quidam verò stœben, ad vina conseruanda maximè idoneam. Componunt itaque in hac herba vasa vinaria. Et alioqui per foramina calorem ex magna domo in cellarium admittunt, vt hoc tum ex adueniente calore, tum ex stœbe calefactum omne vinum conseruet, ne vnquam ace scat. Alius verò stœbes meminit in lib. simpl. cuius fructus & folia adstringendi vim habet, mordacitatis expertem. Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine incipiente, quæ eadem planè est quæ Dioscoridis stœbe, cuius semen & folia adstringunt, quapropter decoctum dysentericis infunditur, auribus quoque purulentis instillatur. Illita folia, oculis ab ictu cruentis profunt, & erumpentis sanguinis impetus cohibent. Hîc adnotandum, plantam quam pro phleo fœmina exhibemus à Dodonæo pro Butomo depingi & describi, quod folia angusta & longa habeat, vtrinque acie sua manus atrectantium vulnerantia, dorso ita eminente, vt triquetra videantur, quodque locis palustribus exeat, vt de Butomo scripsit Theophrastus. Alij acorum palustrem, Butomum Theophrasti esse volunt, vt diximus cap. de Acoro, permulti Dodonæi Butomum Sparganium Dioscoridis faciunt, de quo mox.

## SPARGANIVM.

## CAP. XIIII.

## Nomina

Lib. 4. c. 21.

## Forma.

Lib. 2. c. 38.

Cap. 115.

Lib. 4. c. 56.

Cap. 116.



SPARGANIVM & Xiphidion dicitur Latinis, vt Græcis Σπάργανιον & Ξιφιδιον, Arabibus *Sasarheramon*. Sparganium, auctore Dioscoride, folia habet gladioli, sed arctiora, & magis inclinata, in summo caule veluti pilulæ sunt, in quibus semen. Dodonæus in Histor. stirpium, pro sparganio pingit & describit plātam, quam Belgæ *Vuatterlisch* appellāt, ipse in frument. Historia, Gladiolum palustrem, siue aquaticum: plerique Scirpum, alij Iuncum floridum. Pena & Lobellius, atque permulti herbarij sparganium Dioscoridis, & Theophrasti Butomum esse volunt, eam quam coniecturis quibusdam adducti pro Phlæo fœmina haberi posse superiori capite indicauimus, nominis argumento id docente, inquit Pena, qui *βούτομον* interpretatur admodum scindens. Præterea plāta hæc in paludosis & riuis provenit, foliis iunci & cyperi similibus, dorso prominente & carinato triquetris, acie sua vtrinque manus arripientis fauciantibus, partim à radice graminea fibrata erectis, partim in bicubitali caule alterno situ sparsis & reflexis, in alarum cauo globulos echinatos saturatè, virentes, duros, firmos, platani pares habente, gustu subadstringente, sicciore, & insipido. Dodonæus in Hist. stirp. pro Butomo descripsit, in frument. Historia, Platanariam à fructuum cum platani pilulis similitudine nuncupat, à quibusdam Belgis *Rietgras* dici ait, id est,



## SPARGANIVM

Alterum, Lobellij.



id est, gramen arundinaceum. Sparganium esse Vires. negat, quod vel solus, inquit, pilularum situs ostendit, quæ non ἐπ' ἀκροῦ τοῦ κωνιδίου, id est, in summo caule modo, sed & infra eius summum multo, & alibi quoque exoriuntur. Matthiolus dubitat an eadem plāta genuinum sit Dioscoridis sparganium, quia folia habet xiphio latiora, non arctiora, sursum spectantia, non humi procumbentia. At vaga illa latioris angustiorisque folij nota, inquit Pena, sæpè non certa, sæpissimè in contrarium accipienda in Dioscoride ostēditur alibi: & ubi dicit ἐπικλινότερα, magis quàm gladioli inclinata, apertè indicat esse magis disparata & sparsa (ut sanè sunt) quàm sint gladioli, quæ plurimum recta, & proximè caule parallela assurgunt. Alterum Sparganiū pinxit Lobellius, radice & foliis priori similibus, caule simpliciori, alis viduo, minore, per intervalla verticillis distincto, à quo florū globuli oriuntur molliores, minúsque spinosi & echinati. Datur, inquit Dioscorides, radix & fructus cum vino commortis à feris, sic enim Gracè legitur, ῥίζα καὶ καρπὸς συνδύναται.

Lib. 4. c. 21.

ἐν ἐκδοτικῇ. Ruellius Plinium secutus vertit, contra serpentis venena radix cum vino datur. Sic enim Plinius habet. Aduersus serpentes bibitur & eius radix quæ sparganium vocatur ex vino albo. Galenus. Sparganium & ipsum desiccantis est facultatis. Matthiolus plantam istam iuncis adiunxit, & iuncum floridum appellauit, eoque nomine depinxit. Nascitur, inquit, in Bohemia iuncus circa aquas, quem à floribus speciosis quos edit, iuncum floridum vocare voluimus, eiusdem cum aliis facultatis.

Lib. 2. c. 9.

Li. 8. simpl.

In cap. 47.

lib. 4.

## MENYANTHES PALVSTRE Theophr. CAP. XV.

**T**HEOPHRASTVS inter Orchomeni lacus plantas Menyanthes re- tulit cum Icmā & Ipno. Gaza mensifloram conuertit. At quoniam triphyllum asphaltodes à veteribus menyantes, auctoribus Dioscoride & Plinio, vocatum fuit, hæc verò planta triphylli modo in longis pediculis folia gerit, eam Menyanthes palustre Theophrasti esse herbarij iudicant. Sed *μηνιάστος* ex Gazæ translatione in Theophrasto quidam legunt pro planta lacustri, apud alios auctores *μηνιάστος* pro triphylo asphaltite. Radice est longa, candida, densis geniculis tuborum modo in sese factis, modicè fibrata: foliis latis, laui- bus, crassis, fabæ similibus, ternis simul longo pediculo insidentibus: caule sesqui- pedali, laui, gracili, virente, à cuius medio sursum versus flores erumpunt, priusquam dehiscant candidi; nonnumquam subrubentes ac rotundi: cum reclusi in quina folia diuisi, oblonga, tenuissimis & candidis filis veluti lanugine siue pube quadam elegantissima crispata, folliculi inde parui, rotundi, siue rotunda capitula, in quibus semen ex fusco flauescens, amari gustus. Nascitur in aquis & cœnosa vli- gine aquis vicina, earumque affluxu semper madescente, extra aquam citissimè flac- tescent. Hanc hîc graphice pictam damus. Dodonæus in plantarum historia pro Isopyro descripsit ac depinxit, & à Belgis à foliorum similitudine *Bocxbonen*, id est, fabam hircinam appellari scripsit. In palustrium verò historia trifolium palustre nominat,

Lib. 4. hist.

cap. 11.

Nominat

Forma.

Locus.

Lib. 4. c. 79.

Cap. 98.



nominat, & cum isopyro magnam habere similitudinem, eique esse tam simile, ut  
verum Isopyrum videtur, quod etiam phasiolum, propter similitudinem dici, Dio-  
scorides auctor est, cui foliis simillima est planta hic depicta. Sed huic Dodonai  
sententiæ tum Dioscoridis, tum Plinij auctoritas maxime refragari videtur. Scribit

Lib. 4. c. 16.  
Ibid

*MENIANTHES* Palust. Theoph.

*Iso pyramidum*, Dodon.

*MENIANTHES Palust.*

*Dalechampi.*



*ISOPYRVM, Matth.*



flu. Quod verò sequitur, τὸ δὲ φύλλον ἄνωσσι, folium quod ante, peràm additum est.



est, forma enim folium isopyri anisum referre non potest, cum phasioli folio simile sit. Aliud Isopyrum Matthiolus ostendit quod Dioscoridis Isopyrum in omnibus referre ait nulla addita descriptione. Semen Isopyri, ut asserit Diosco. contrarium & cætera pectoris vitia, ex aqua multa bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus utile. Isopyrum, inquit Gal. semen habet amarum & subacerbum. Extergit itaque & incidit humores crassos, cum hoc ut corpora contrahat & constringat, quamobrem excreationibus pectoris conducit, & iecur expurgat, & sanguinem spuentibus non est aduersum.

Vires.

Lib. 6. sim.

## ALSINE AQUATICA. CAP. XVI.



FOLIORVM similitudine Alfina aquatica nuncupata radices multas emittit candidantes, valde tenues, breues: caules numerosos, exiles ac iunceos, bene longos, aquarum impulsu dispersos & natantes: folia alsines ordine ex aduerso disposita, longiora & angustiora, gustus fatui, saporisque diluti: florem & fructum nondum vidi. In limpidorum riuulorum sabuloso fundo prorumpit. Aquis extracta quam citissime flaccescit.

Forma.

Locus.

## HEPATICA PALVSTRIS. CAP. XVII.



HERBARIIS & seplasiariis Hepatica aquatica siue palustris nominata & Ranunculus aquaticus, à Dodonæo Polyanthemum palustre, in iis etiam est plantis, quæ aquis innatant, cuius folia quæ in summo sunt pro locorum in quibus crescit varietate, varia sunt. Quæ aquis immersa est cauliculos fert graciles, folia minutim admodum incisa, vulgaris chamemeli modo. Antequam verò aquis immergatur, & cum adhuc super extat, folia fert rotunda, parum in ambitu crenata. Quæ non in aquis, sed in aggeribus & marginibus fossarum nascitur, nulla alia habet folia, quam crebris incisuris laciniata. Quæ verò propter aquas nascitur, & interdum earum incrementis & inundationibus alluitur, foliola quidem habet in summis cauliculis rotunda, sed multo magis crenata, quam folia eius quæ penitus sub aquis latet: flores sunt candidi, odorati, in medio lutei, ranunculi aut fragariæ similes, quibus succedunt capitula aspera, & semen ut in ranunculo. A qua florum & seminis similitudine, videri potest hæc planta ranunculi aut polyanthemi species, inquit Dodonæus, ut polyanthemum palustre vel aquaticum iure dici possit. Quidam Callitrichen Plinij esse coniunctant, lenticulæ foliis, caulibus iunceis, tenuissimis, radice minima, gustatu feruentem, nascentem in opacis & humidis. Alij potius Callitrichen esse putant Nasturtium pratense minimum, alibi descriptum.

Nomen.

Dodon.  
lib. 1. c. 69.HEPATICA Aquatica,  
siue Palustris.

Forma.

coniectant, lenticulæ foliis, caulibus iunceis, tenuissimis, radice minima, gustatu feruentem, nascentem in opacis & humidis. Alij potius Callitrichen esse putant Nasturtium pratense minimum, alibi descriptum.



Nomina  
Dodo. lib.  
cap. 69.



LANTAM hanc herbarij quidam millefolij speciem esse putant, Lobellius Myriophyllum Equisetifolium vocat: alij Violam aquaticam siue palustrem, Gallicè *Gyroslee d'eau*. Attentiores iudicioque præstantiores Castoris potamogæstona memoratum à Plinio esse putant tenui folio, velut equinis fetis, thyrso longo & læui, in aquosis nascentem Caules

## VIOLA PALVSTRIS,



profert longos, tenues, rectos, teneros: folia item oblonga, minutim incisa, sub aquis latè dispersa, semper quina, senave ex aduerso opposita, vt in rubia & galio, horum vnumquodque thanaceti aut millefolij vulgaris folio simile est nisi minus esset thanaceti, maius & amplius millefolij folio. In caulibus extra aquas eminentibus flores emittit semper ternos quaternosve, inter sese oppositos, rotæ parua, in quinquedios diuisa, aut leucoij, aut buglosi vulgaris floribus similes, candidos & in medio luteos, odoratos. Radices nihil aliud sunt quàm fibræ longæ, graciles, nigrae, nisi quòd parte extrema, qua in terram defiguntur, candidæ sunt, & crystalli aut alabastri modo splendentes. Tota herba ante caulis prouentum sub aquis conditur, atque tunc eis innatans nouella videtur abies, caulis verò cum excreuerit, vnà cum floribus superficiem superat, & supra aquas eminent. Gaudet lacubus & aquis stagnantibus, facultatem frigidam videtur habere & siccam, nullius tamen est in medicina vsus.

Locus.

Vires.

## CONFERRA TRICHODES.

## CAP. XIX.

Lib. 27. c. 8.

Nomina



SIMILITVDINE Conferuæ Plinij à conferruminando dictæ, planta hæc aquatica conferua trichodes ab herbarijs peritis nominata est, ab alijs Trichomanes aquaticum. Adhæret crassiore sui parte taxis aqua perpetuò madidis, & in ea demersis, nulla radice, sed suis statim filis: inde per aquam villos dispergit, longitudine cubiti, nullis folijs ornata cincta, sed exilibus pilis comata, viridibus, & cum aruerint, rufis, qua de causa trichoden nominarunt, gustus fatui. In gelidis purisque fontibus præcipuè nascitur. Conferua Plinij Lobellio creditur esse hæc, spongiosis, flexuosis, sesquicubitalibus & longioribus quasi ellychniis ex fusco virentibus staminibus villorum circis lene fluentibus aquis fluitans, scitè Plinij Spongiæ aquarum dulcium veriùs quàm Muscus, aut herba, villosa densitatis. In Lacu maiore Mediolanensis agri reperitur. De Conferua hæc Plinius. Curatum ea scio omnibus ferè ossibus confRACTIS prolapsum ex arbore alta putatorem, circumdata vniuerso corpori, aquam suam

Forma.




PALVSTRIVM,  
CONFERTA Trichodes, sine  
Trichomanes Aquaticum.



LIB. IX.  
CONFERTA Plinij,  
& Lobelij.

1023



suam inspergentibus quoties inaresceret, raroque nec nisi deficiente herba mutationis causa resolventibus conualuisse, vix credibili celeritate.

FOENICULUS AQUATICVS.

CAP. XX.



**F**OENICVLVS aquaticus radices *Forma.* producit multas, seu fibras potius tenues, quæ ob tenuitatem facile rumpuntur, subrufas, luto infixas: caulem vna longiorem, rotundum, geniculatum, mollem, tenerum ac fragilem, aquis innatantem ac iactatum. Ad singulos geniculorum articulos folia prodeunt longa, fœniculo similia, quam ob causam fœniculum aquaticum nominarunt herbarij. In geniculis fastigium versus tendentibus, & in summo plantæ vertice flores singulares emicant, longo & gracili nixi pediculo, in medio lutei, in ambitu candidis foliolis coronati, quibus decussis capitulum suboritur, vt in ranunculo tuberosum, gustus subacris. *Locus.* In alto vado fluminum cœnorum, & pigre labentium, qualis est Arar, prouenit: vnde extracta herba celerimè flaccescit.



**Nomina**

Lib. 20. c. 8.

Lib. 2. Ali.

Lib. 4. c. 16.

**Forma.****Locus.**

Lib. 21. c. 8.



Vox Græci λεμόνιον, Latini similiter Limonium vocant, inde dictum quod in palustribus pratis nascatur, quasi pratensem herbam dicas. Plinius, betam sylvestrem nominari tradit. Galenus tamen se nullam betam sylvestrem vnquam nouisse ait, nisi quis pro ea lapathum accipiat. Limonium scribit Dioscorides folia habere betæ similia, tenuiora & longiora, decem aut plura: caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, seminibus rubris refertum, gustu adstringentibus. Nascitur in pratis & palustribus. A' Dioscoride paulum dissidet Plinius. Est & beta sylvestris, inquit, quam limonium vocant, alij neuroides, multo minoribus, tenuioribusque ac densioribus foliis, vnde cum sæpè caulium. Minora folia dixit, Dioscorides μικρότερα, id est, longiora, postrema verò verba corrupta sunt. Legendum enim vnde cum sæpè, caule lilij ex Dioscoride, vt voces vnde cum sæpè, ad folia præcedentia pertineant, & caulium

LIMONIVM,  
Matthioli.LIMONIVM Alterum,  
Matthioli.In cap. 16.  
lib. 4.

Ibidem.

vox, ex caule lilij corrupta sit. Nascitur in pratis & palustribus. Quam plantam sepalsiæ falsò Behen rubrum vocant, eam Matthiolus Dioscoridis limonium esse putat. Si quis enim, inquit, diligenter expenderit, eam inueniet notis omnibus limonium referre, cogeturque fateri verum esse limonium, aut eius genus. Est enim herba foliis betæ tenuioribus & longioribus, decem & sæpè pluribus: caulibus tenuibus, in quibus semen rubrum, quod gustatum adstringit. Præterea in pratis præsertim vliginosis & palustribus prouenit. Iam verò experientia compertum est Behen hoc adulterinum iis præditum esse facultatibus ac viribus, quas Limonio tribuerunt Dioscorides & Galenus. Idem Matthiolus alterum depinxit limonium, sed non distinxit; nec monuit vtrum verius Dioscoridis limonium representer, vt eius verba declarant, quæ sunt huiusmodi. Non temerè me facturum putavi, si pro vero limonio hæc eas plantas depictas exhiberem, quæ in Officinis



ficinis Behen rubri nomē perperam acceperunt, quod iam mihi persuasum sit eas planè Behen illud ementiri, de quo à Mauritanis mentio facta est. Non inscite, inquit Pena, pratenſi & maritimo recepto, ſcilicet primo nomen & notio Limonij conuenit. Folia enim eius ſunt betæ nigræ magis affinia, ſemen copioſum, oblongum, ex cæruleo ruſcens, flores purpurei, caules tenues radixque rubefcunt, magnitudine lapathi acuti, ad quod tota hæc planta accedit, & guſtu ſubaſtringit, vnde pharmacopœi Behen rubrum nuncuparunt. Huic alterum prorſus ſimile idem Pena depinxit, ſed multò minus, quod inter ſalebrola litora & rupes montis Cetij, & alibi Narbonæ & Galloprovincia ſaxoſis oritur frequens, & empetro ſeu fœniculo marino lubens ſe associat, foliis minoribus oleæ, aut myrti paribus, radici proximis, per humum ſparſis: circum pedales caules & cauliculos graciles inflexos muſcoſis & cæruleis floribus ſuperioris non diſſimilibus onuſtos, folia longè minora, fœniculum marinum ſiue Empetrum ſatis expri-

LIMONIVM, Narbonenſe  
Paruum.



LIMONIVM,  
Aliud.



munt. Aliud limonium herbarij alij proponunt hîc etiam depictum, quod foliis betam referat, & in riguis nascatur. Gignitur in locis riuulorum illapſu madentibus, natura tamen lapidoſis & aridis: radice ſuperiore craſſa, nigra, ſenſim gracileſcente, fibrata: foliis decem aut duodecim, betæ ſimilibus, longioribus, coſta per medium excurrente, craſſis, carnoſis, venoſis, è viridi pallentibus: caule cubitali, læui, nudo, recto: flore in vertice copioſo, luteo, ſenecioni ſimili, in pappos abeunte. Limonij ſemen tritum, inquit Dioſcorides, & ex vino acetabuli menſura potum, dyſentericis, cæliacisq; prodeſt: rubra ſceminarum profluuia Viſes. Ibid. Li. 7. ſimpl. Eadem planè Galenus tradit. Limonij fructum vtpotè acerbum, in vino exhibent cæliacis & dyſentericis, hæmoptoicisq; ſiue ſanguinem ſpuentibus, iuuat & profluuium muliebre. Satis eſt oxybaphi menſura. Plinius quædam alia habet. Lib. 20. c. 8. Limonij folia ambuſtis vtilia, guſtantia adſtringunt. Semen acetabuli menſura dyſentericis prodeſt. Aqua & è radice cocta maculas veſtium elui dicunt, item membranarum.



Nomina

Lib. 1. c. 40.

Forma.

Locus.



**E**RBARIJ plantam hanc linum pratense, seu lanam pratensem nominant, Germani *Mattenflachs*. Tragus Dioscoridis Gnaphalium esse indicat. Caule est terete & enodi, inq; cacumine molli, tenero & candido tomento, gossipio ipso tenuiore & molliore emicante. Atq; hic est huius plantæ flos, hoc eius semen & fructus. Huius plantæ sanè elegans lanugo si in magna haberetur copia, textorio operi non inepta foret. In humectis pratis, & viliginosis vallibus prouenit.

TETRAPHYLLVM.  
CAP. XXIII.

**T**ETRAPHYLLVM, Latine Quadri-  
folium, hanc plantam vocant her-  
barij, quòd quatuor tantum folia,  
nec plura habeat. Radice est parua  
& breui, subnigra, fibrata: caule quatuor digitos

alto, rotundo, solido & duro: foliis quatuor helxinæ similibus, læuibus, venosis,  
prioribus duobus quæ maiora sunt & latiora, cauli proximè adhærentibus alarum  
modo: reliquis quæ minora sunt & angustiora, à caule veluti brachiato & bifido  
distantibus, longiusculo pediculo nixis, inter quæ nigrum tuberculum conspicitur,  
pediculos veluti determinans. Gignitur in pratis montosis, viliginosis, & in

## TETRAPHYLLVM.

QUADRIFOLIVM, Phæum  
Pena & Lobelij.

quibus



quibus aqua stagnans & pigra residet. Prodit Iulio mense. Gustu planta ista valde astringit. Aliud Quadrifolium monstrant Pena & Lobellius, quod Phæum cognominant. E pratensium est genere, inquit Pena, quaternis, interdum quinis, adeoque septenis foliis Oxy Plinianæ non disparibus donata cernitur, sed colore Phæo, vel liuido, rubentes flores trifolij pratensis, candidi, reliquaq; non diuersa.

## RANUNCVLVS.

## CAP. XXI. III.

**B**ATPAXION Græcis, Batrachium & Ranunculus Latinis dicitur. *Nomina*  
 Apuleius Herbam sceleratam, vulgus herbariorum Pedem corui, & Pedem galli perperam vocat, Galli *Grenouillette* & *Basinet*, Germani *Hanensuoß*, Itali *Ranunculo*, & *Piccoruino*, Hispani *Hierua belida*. Dicitur autem Batrachium siue Ranunculus, quod limitibus humidis, opacisque marginibus ranarum more latetur, aut quod aquis vbi ranæ degunt, potissimum gaudeat, aut quia inter eius frutices ranæ frequenter inueniuntur. Eadem de causa *Grenouillette* à Gallis nominatur: *Basinet* vero à floribus, quod vasis æneis constrictarum, in quibus barbas emolliunt, similes videantur colore ac figura. Hi ob pulchritudinem iam in coronamenta venere, & à multis florum causa coluntur, efficitque cultura, vt qui in limitibus simplici foliorum compage flores oriantur, structili quodam densoq; foliorum stipatu nunc in hortis collucescant. Herba scelerata, eò quod comesta noxia sit: vel, quod magis arridet, quia validi sceleratq; mendicantes sibi crura ac lacertos dilaniant, quò possint impudentius stipem extorquere, atque hac impostura pecuniolam aucupari. Nostri herbarij, inquit Plinius, Strumeam vocant, quoniam medetur strumis & panis: vel ideo forsitan, quod strumosa conspiciatur radice. Sunt qui vocent Agreste apium, seu apiastrum, quod folio apium æmuletur: quamquam plures apiastrum pro mellystophyllo vsurparunt. Dioscorides quatuor Ranunculi genera descripsit: sed diligentes herbarij plures notarunt differentias & varietates. Primum genus, inquit Dioscorides, coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule non crasso, cubitu alto: radice alba, parua, amara, multis capillamentis, ellebori modo fibrata. Nascitur iuxta fluentia. Secundum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plurimum in Sardinia nascens, quam acerrimum, quod siluestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lactei coloris. Galenus quoque quatuor Batrachij differentias agnoscit. Plinius in totidem genera Batrachium distinxit, vt ex Dioscoride transcripsisse videatur. Ranunculum, inquit, vocamus quem Græci Batrachium. Genera eius quatuor: Vnum pinguioribus quam coriandri foliis, & ad latitudinem malæ accedentibus, colore liuido, caule alto (vulgata exemplaria habent albo) gracili, & radice alba. Nascitur in limitibus humidis & opacis. Alterum foliosius (Dioscorides habet lanuginosius, Oribasius *γωαδός* *γωαδός*, idest, magis geniculatum) pluribus foliorum incisuris, altis caulibus. Tertium minimum

Fuchsc.

Lib. 20. c. 11.

*Genera.*  
 Lib. 2. c. 171.  
 Ibidem.

## RANUNCVLVS,

## I. Matthioli.



dis, coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis, pinguibus: flore luteo, interdum purpureo: caule non crasso, cubitu alto: radice alba, parua, amara, multis capillamentis, ellebori modo fibrata. Nascitur iuxta fluentia. Secundum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plurimum in Sardinia nascens, quam acerrimum, quod siluestre apium appellant. Tertium minimum, odore graui, flore aureo. Quartum huic simile, flore lactei coloris. Galenus quoque quatuor Batrachij differentias agnoscit. Plinius in totidem genera Batrachium distinxit, vt ex Dioscoride transcripsisse videatur. Ranunculum, inquit, vocamus quem Græci Batrachium. Genera eius quatuor: Vnum pinguioribus quam coriandri foliis, & ad latitudinem malæ accedentibus, colore liuido, caule alto (vulgata exemplaria habent albo) gracili, & radice alba. Nascitur in limitibus humidis & opacis. Alterum foliosius (Dioscorides habet lanuginosius, Oribasius *γωαδός* *γωαδός*, idest, magis geniculatum) pluribus foliorum incisuris, altis caulibus. Tertium minimum

Li. 6. simpl.

Li. 26. ca. 11.

*Forma.*



est, graui odore, flore aureo. Quartum simile huic, flore luteo: sic enim legimus in vulgatis codicibus. Emendati, Dioscorides, Oribasius habent lacteo. Cæterum id Ranunculi genus quod copiosissimum in Sardinia nascitur, ob id Sardoa herba in Thyrsi. dicta, vnde Vergilius:

## RANUNCVLVS

I I. Matthioli.

Li. 6. c. 14.

In hist. pl.  
cap. 47.

## RANUNCVLVS

I I I. Matthioli.

Lib. 3. c. 72.

Ibid. ca. 57.

Ibidem.



Imo ego Sardois videar tibi amarior herbis.

A plerisque apium risus nominatur, quod qui ipsam ederint tanquam præ lætitia ridentes intereant. Sed res aliter habet: hæc enim herba nervos contrahit eorum qui ipsa vescuntur, rictuque ora diducit, ut cum moriuntur, veluti ridentium specie pereant, quod Salustius confirmat his verbis. In Sardinia quædam herba nascitur, quæ Sardoa dicitur, agresti apio similis. Hæc ora hominum & rictus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. Dioscorides etiam alibi Sardoniæ Ranunculi genus esse scribit, quæ vescentibus mentem adimit, & quædam nervorum distentione labia in rictu contrahit, ut risus speciem præbeant à qua quidem affectione de Sardonio risu adagium in vulgus infausto omine manavit. His quintum Ranunculi genus addidit Matthiolus, quod foliis quidem primo Ranunculo proximis provenit, sed inter permultas quibus nititur radices, vnam habet tuberosam, nucis iuglandis magnitudine, rapi modo albicantem, acrem & exulcerantem, quæ per hyemem arescentibus iam foliis vtuntur quidam cum partem aliquam exulcerare volunt. Fuchsius quatuor iidem Ranunculi genera assignat, sed aliter distinguit. Primum genus duplex est: huius enim generis Ranunculus quidam silvestris est, cuius iterum duæ sunt differentiæ. Vnus enim luteos flores profert, hic depictus. Alter purpureos. Prior ille Ranunculus est Auricomus Dodonæi, cui folia tribuit fere rotunda, multum incisa, in fusco viridia, maculis in medio latiusculis, nigricantibus notata: flores aureo & perpulchro colore nitentes. In pratis & vlginis agris crescit. Quidam hortensis, qui nisi cultura accedat provenire haud solet. Hic itidem duplex est: Vnus qui simplici florum textura constat. Alter multiplicem foliorum in floribus compagem habet, hic quoque appictus, & Ranunculus albus prior siue echinatus à Dodonæo dictus: caulibus est candicantibus, leuibus, in quibus folia itidem candicantia, profundius incisa, præcipue quæ circa caulium fastigia sunt, coriandri foliis haud dissimilia: flores in luteo pallidi, deinde femina ferè rotunda, cōpressa, echinata:



echinata: radix fibrata. Iisdem in locis quibus Ranunculus Auricomus provenit. Secundum Ranunculi genus est Fuchſio, quod à foliorum ſimilitudine, quam cum apij foliis obtinet, à nonnullis *σέλινον άγριον*, id est, apium ſilueſtre, ſive apium riſus nominatur. Tertium genus exiguum, quod Dodonæus Barrachium Apulei vocat. Lib. 3. ca. 73.

RANUNCVLVS IIII. Matth.

RANUNCVLVS VI.  
Matthioli.

RANUNCVLVS V. Matth.

RANUNCVLVS I. Silueſtris,  
Fuchſ. Auricomus, Dodon.

Palmi



*Ranunculus hortensis* J. Fuchf. *Albus*  
prior, siue *Echinatus*, Dod.

Lib. 3. c. 72.



Palmi vnus aut duorum altitudine crescit: crebris foliorum incisuris: floribus luteis, venustis: semine in rotundis capitulis: radice alba, rotunda, paruo napo simili, interdum nucis iuglandis magnitudine, infernè fibrata. Quartum genus Fuchsi etiam minimum est, duum generum: vnum quidem lacteo flore, id quod à Dioscoride pingitur: alterum luteo. Prius genus folia profert tria incisa, cæterorum Ranunculorum modo, inter quæ flores eminent pallidi, aut lactei coloris: radix est gracilis, obliqua, infernè fibras producens, quibus in terram defigitur. Alterum genus floribus luteis differt. Vtrūque Ranunculum paruum siue nemorensem vocat Dodonæus. Crescunt in nemoribus, fosis, locisque vmbrosis & humidis. Sunt & alia Ranunculorum genera à Dalechamptio obseruata. Ranunculus scilicet montanus albus, radicibus quamplurimis, teneris, carnosiss, albicantibus: foliis longo pediculo innixis, Batrachio vulgari similibus, sed minimè hirsutis: caulibus multis, propemodum cubitalibus, cauis: flore lacteo, emicantibus ex medio croceis apicibus: fructu

asparago nascenti simili, in quo semen. In riuis frigidorum montium prouenit. Ranunculus alius purpureus cognominatus radicem habet innumeris fibris capillatam: folium oblongum, latum, crassum, apij, coriandrive modo, in summo diuisum, quale cernitur in Sardonia herba, aut in eo Ranunculo, quem à Dodonæo

*Ranunculus*, IIII. Fuchf. *lacteus*.  
*Ranunc. albus nemorensis*, Dod.



*Ranunculus*, IIII. Fuchf. *luteus*.  
*Ranunc. luteus nemorensis*, Dod.



Echinatum



## RANUNCVLVS

*Montanus albus.*

Echinatum vocari diximus: caule est cubitali, rotundo, paucis ramis furculoso: flore purpureo, aspectu pulcherrimo, non foliolis quinque tantum constante ceterorum Ranunculorum modo, sed numerosis, oblongo floris priusquam aperiatur, & fastigiato quali alabastro. In cœnosis & vliginosis locis nascitur: raraque est hæc planta, nec multis adhuc visa aut cognita. Item aliud genus latifolium nuncupatum foliorum peculiarem figuram hanc habet, quod aliorum modo ea incisa non sunt, nec laciniata, nec sinuosa, sed subrotunda marginibus tantum dissectis. Ceterum idem florum color, iidem natales, eadem vis quæ aliis Ranunculis. Postremus eiusdem Ranunculus est, qui hederaceus cognominatur, cauliculis multis, humi in cœtibus & serpentibus, rotundis, radículas exiles & prætenues, è nodulis quibusdam emittentibus, foliis multis, parvulis, hederæ similibus: quamobrem hederaceum vocarunt, atra macula notatis, pediculis brevissimis, ad quorum exortum floris conceptus emergit, granulis tuberosus, oblongus: flore luteo, Ranunculis aliis simili.

Sapore acer est & feruidus. Nascitur in rivulis, & fluentis fonticulorum, locis sabulosis & macris. Dodonæus libro de deleteriis Ranunculorum genera aliter distinxit & descripsit. Ranunculus, inquit, alius est hortensis, alij silvestres. Horum nonnulli sunt vulgares, alij externi. Ranunculos hortenses duos pinxit, vnum

Cap. I.

RANUNCVLVS *Hederaceus,*  
*Dalechampij.*



RANUNCVLVS *Hortensis*  
*prior, Dodonæi.*



duntaxat



duntaxat descripsit his ferè verbis. Ranunculus hortensis folia promit in particulas aliquot dissecta, sæpius specie trifolij, nonnunquam quinquefolij, per margines rariùs crenata, saturatè virentia, in quibus quandoque maculæ quædã inalbicant: caules rotundi, leniter hirsuti parùm reclinantur, radículas emittentes quibus humi sese affigant. Ij ad dodrantalem aut paulò ampliorem assurgunt altitudinem, ferentes in fastigiis flosculos quinquefolij, luteo auri colore splendentes, staminibus aliquot exiguis, eiusdem coloris, medium septem tribus orbiculum, qui auctior factus semina in globum confarcta continet, ex quibus componitur: radices tenues, fibratæ candicant. Is ad quartum Matthioli videtur accedere. Locis umbrosis, & nonnihil humentibus, non prorsus aridis, secus vias, & in locis hortorum incultis sponte exit. In pratis quoque & non rarò iuxta agrorum margines occurrit. Nec enim quòd in hortis tantum gignatur, hortensis dicitur, sed quod ferè præ cæteris hortis sit familiarior, atque in his creberrimè gramine permixtus reperiatur, ubi & eius flosculi quandoque multiplicatis visuntur foliis. Maio deinde feriùs multò vigent flores. Ranunculi silvestris primi caules sunt, rotundi, læues, crassi, interius vacui, in alas diuisi, folia in longis, crassis, pinguibus pediculis, lata, læuia, marginibus incisa: flosculi in cacuminibus lutei, pallidiores & minores quàm hortensis, atque inde capitula primùm erumpentis myacanthæ asparagi cacumen æmulantia: radices candidæ, multis fibris capillatæ. Tota stirps dilutè virenti resplendet colore. In palustribus & iuxta riuulos, non rarò in scrobibus ac fossis aquas habentibus, aliisq; similibus locis exoritur. Ranunculi palustris nomine Dodonæus in Historia stirp. depinxit. Est Apiù risus Fuchsi, secundum genus Ranunculi silvestris, Ranunculus palustris rotundiore folio Lobellij. Vel idem est, vel proximè ad tertiũ Matthioli Ranunculum accedit. Silvestris secundus caulibus ac foliis est non perinde læuib, obscuriùs omninò virentibus, & nò rarò ex puniceo colore nigricantibus, nonnihil quoque hirsutis ac lanuginosis, sed læuissimè: folia in quinque instar pentaphylli, sed tamen dissimiles, latiores easque laciniolas partes profundioribus sectionibus diuiduntur: cauliculi omnes ad cubitalem vel etiam ampliorem accrescunt altitudinem: flores auri colore elegantes, forma & magnitudine hortensis, semen ferentia capitula vti hortensis: radices fibratæ, è quarum capitibus nerui subinde obliqui quibus propagatur. In pratis

*RANUNCVLVS Hortensis*  
alter, *Dodonæi.*



*RANUNCVLVS Illyricus.*

Lib. 3. c. 72.





pratis reperitur, locis paulò ab ipsis scrobibus aut fossis remotis, nequaquam tamen aridis aut irriguis. Hortensis est primus Fuchsi, flore multiplici, polyanthemus, idest, multiflorus à Lobellio dictus. Tertio Ranunculo siluestri, quem Aruensem nominant, minora ac teneriora sunt folia, sed magis ac variè dissecta, diluti

**RANUNCVLVS**  
*Lusitanicus.*



**RANUNCVLVS**  
*Flor. globo.*



viroris: cauliculi recti, rotundi: flores parui, lutei, pallentes, quibus subnascitur non asparagi cacumini similis orbiculus, sed latum, asperum & pungens capitulum, ex aliquot cōgestum seminibus maiusculis, planis, acuminatis & breuibus, minimè tamen innocentibus spinis obstitis: radix candidis quoque & capillaceis fibris constat. In aruis plerumq; locis aliofossis, vbi humidius solum, gignitur. In Historia stirpium Dodonæus Ranunculum album siue Echinatū vocauit, quem modò depinximus. Fuchsio est hortensis primus, simplici flore. Externorū Ranunculorum vnus est Illyricus cognominatus, qui cauliculos fert tenues, teretes, mediocris longitudinis: folia verò oblonga, plurimis fissa incisuris, vt vtraque subcandida, & quadam tenui lanugine vestita: flores luteolos, pallidiores quàm Auricomi Ranunculi, semina verò vti illius: radices multis paruis tuberibus veluti granis, aut oblongiusculis & paruis bulbis coherentes. Ex Illyrico primum in Italiam, atque inde in Belgium illatus fertur: cum aliis, flores seminaq; producit. Hunc Ranūculum cum secundi Dioscoridis descriptione conuenire censet. Est enim χρωδέτερος, idest, lanuginosior, & μακροχυλότερος, idest, longiore caule, & ἐντομὰς ἔχων πλάττης τῶν φύλλων, idest, foliorum incisuras complures, plerumq; in Sardinia nascens. Verisimile enim est, nō modò in Illyrico, verum in Sardinia quoque reperiri: vtraque enim regio Mediterranei maris vndis alluitur. Secundus Ranunculus externus à Dodonæo non pictus, folia habet oblonga, angusta, nequaquā fissa, sed graminis aut tritici æmula, è diluto & albicante cæruleo colore virentia: cauliculi breuiores palmum aut sesquipedem tantum alti: folia seminaq; vti Illyrici, sed radices multis tenuibus confibratæ. Circa Narbonam in pratis reperiri fertur, inquit Dodonæus, fortasse veteribus incognitus. Ranunculus gramineus dici potest. Tertius externus Ranunculus est Lusitanicus, reliquis humilior, foliis exit latis, venosis, lauibis, relucētibus, minimè diuisis, margine tantum aliquantulum incis, pediculis ab ipsis radicibus palmaribus absque adnatis, in quorum singulis flos vnus, luteo auri colore resplen-



dens, odoratus, maior & foliosior quàm aliorum, staminibus in medio concoloribus, inter quæ capitulum emicat: pro radicibus multa quasi granula veluti Illyrico Ranūculo, quæ tamen pictura non ostendit. Nihil habet, inquit Lobellius, cum Ranunculis commune, præter semina racemosa & luteos flores. In Lusitania &

**RANUNCVLVS**

*Tuberosus.*



**RANUNCVLVS**

*Constantinopolitanus, Clus.*



Lib. stirp.  
Hispanic.

Beticæ Hispaniæ montibus viret, florêque hybernis mensibus, ac non rarò ipsa bruma. Ranunculum externum quartum numero, nō pictura, albo flore simplici posuit Dodonæus, quē pro Aconito albo describemus libro de Venenatis. Quintus Ranunculus externus globosi floris, foliis, caulibus, radicibus latis secundum siluestrium refert, flos quoque eius aurei coloris, verum maior, plurimūque foliorum, qui nō totus panditur, sed in globuli odoris valde iucundi formam collectus, nascenti quodammodo similis viget. Proferunt hunc Heluetiorum montes, præsertim is quem fractū vocant. Gesnerus ait Trollium florem vulgò dici. Lobellij Ranunculus montanus Alpinus glomeratus, Ostensis vallis, Mindenensium, Aruernia, Germaniæ & Heluetiorum montium amans. Ranunculus tuberosus Apuleij Batrachium dicitur, quod Apuleius ab aliis separauit, & peculiariter Batrachium appellauit. Vulgò Rapum D. Antonij appellant. Variè dissectis, latis, ac virentibus est foliis: cauliculis palmū aut duos palmos altis, flosculis auri colore splendentibus, semine in capitulis aspero, horrilem fatis refert, sed radix instar rotundi globuli, paruo exiguoq; rapo similis, ex qua tenues, gracilesq; dependent fibræ. Prouenit in incultis & aridis Germaniæ ac Belgij nonnullis locis. Nascitur in Anglia maior, vbi rapum in maiorem excrescit quantitatem. Non minùs autem huius acris, quàm aliorum vis & facultas. Vfus est præcipuè rapi, quod pleriq; pestilenti bubone correptis cum sale contusum statim initio aut femori aut brachio infra videlicet affectum locum admovent, ita virus & morbi malignitatem ad partem ignobiliorem attrahentes. Exulcerat enim & vesicas mox excitar, cuiusq; corporis parti fuerit applicatū. Apuleius, si lunatico in ceruice, inquit, ligeretur lino rubro luna decrecente, cum erit signum Tauri vel Scorpionis parte prima, mox sanabitur. Itē, herbam Batrachii tussam cum sua radice mixto aceto impones his, qui habēt cicatrices nigras, exedit eas, & similem corpori reliquo reddit colorem. His adde Ranunculum Constantinopolitanū Clusij, qui pedalem habet caulem, in duos



in duos aut plures ramos diuisum, quorum extremis insident: flores magni, multiplici; foliorum glomo constantes, vt in Ranunculo vulgari tuberoso: flore multiplici, sed pulcherrimo, cocci colore rubentes, folia circa radicem quina aut sena, diluto virore nitentia, media forma inter palustris & Echinati ranunculorū folia:

**RANUNCVLVS Niueus,**  
*Polyanthes, Lobell.*



**RANUNCVLVS Flammeus**  
*Aquaticus, angustifolius, Lob.*



quæ verò per caulem sparsa sunt, minora, nec adeò incisa, nec admodum frequentia: multa illi radices simul congestæ, Lusitanici ranunculi & asphodeli radicibus persimiles, flauescentes. Huic Ranunculo Constantinopolitani cognomen dedit, quòd in quibusdam hortis Constantinopoli inueniri audierit. Sunt & alij apud Dodonæum & Lobellium Ranunculi. Ranunculus niueus Polyanthes, pulcherrima exotica elegantie planta, inquit Lobellius, quæ flores letos, multiplici fœtu & prouentu in Belgij hortis Maio mense dat. Folia & ortus Ranunculi albi aciniti facie. Flammeus Ranunculus aquaticus angustifolius, Flammula vulgi, Belgarū *Egelkoolen*, prorsus eadem videtur esse quæ Flammula aquatica infra picta & descripta, & à Dodonæo in Historia stirpium. Hoc docet eadem nomenclatura, eadem delineatio illic posita, & in Purgantium Historia: ea solùm varietate differunt, quòd postrema Dodonæi, folia non serrata, prima serrata habet, iisdem natalibus & riuulis. Ranunculus nemorosus, Ranunculus quartus Fuchsi laeteus & luteus hinc ex eodem Fuchsio appicti, à Dodonæo in Purgantiū Historia pro quinta & sexta specie anemones. Id quod etiam monuimus, in libro de iis quæ flore placent, ca. De Anemone. Frequens herba hæc est in montibus Diuæ Mariæ à Montesserrato, & circumuicinis partibus, ad montium radices, iuxta arbusta, & querceta. Herba itaque est cubitalis, vt plurimum. Radix ei subest, rotunda, bulbacea, exigua, candida, pluribus inuolucris croco similibus, contexta, ex qua aliæ radiculae albæ, crassæ aliquantulum, veluti capillamenta dependent. Folia ex radice prodeunt, longa, stricta, à longo pedunculo dependentia, læuia, fractu contumacia, neruata & in acutum tendentia, longitudine palmi vnus, latitudine verò transversa vnus digiti, palmæ folium in modo substantiæ, & contumacia fracturæ, imitantia. Caulem habet cubitalem ferè semper, tenacem, solidum, rotundum, in quo folia minora sunt. In summo caulis flores existunt ex quinque foliolis constructi, in medio muscosi, forma, figuraq; similes ranunculis. Floret Aprili, & Maio. Semen habet candidum, magnitudine milij. In radicibus sapor



*Ranunculus Phœniceus, Myconi.**Ranunculus Purpureus.*

cum multa humiditate acris est, sed in foliis maior, ut vix ranunculis cedat. Planta veteribus interdicta, inter Ranunculi tamen genera videtur collocanda, ex sapore, forma florum, & radicum. Quāquam folium diuersum esse ab aliis ranunculis appareat. Ego Ranunculū Phœniceum semper vocaui, ob similitudinem quam cum palma foliis obtinet, & ranunculi saporem. Ut vulgaribus vocetur nondum scio. Ad eadem præstare videtur, ad quæ ranunculus, minoris tamen est efficacia.

*Temper.*  
*& Vires.*

Li. 2. ca. 171.

Li. 6. simpl.



*RANUNCVLVS Latifolius.* Rara inuētu, hīc tamē frequētissima. Omnium Ranunculorū temperamentū calidū vehemēter, siccūq; est vsq; ad quartū gradū: præcipuē apiū risus omniū calidissimū. Folia, flores & cauliculi recētes, inquit Dioscorides, illitu exulcerāt, & crustas nō sine dolore gignūt: quare vngues scabros extricāt, scabiē eximūt, stigmata delent: formicātes verrucas & pensiles, alopeciaq; paulisper illita tollūt. Tepente decocto pernio-nes fouētur. Sicca radix tritaq; sternutamēta ciet naribus admota: dentium dolorē appensā leuat, ipsos tamē frāgit. Eadē Galenus tradit. Batrachia omnia vehemēter acrē qualitatē possident, adeo ut cū dolore exulcerent: hac ratione si modēratē ac cōuenienter vtare, psoras & lepras excoriāt, & vngues diuellūt, leprosis stigmata digerūt, acrochordonas & myrmecias detrahūt. Quin & alopecias iuuāt paucō tēpore admota. Nā si diutiūs inhæreāt, nō excoriatur solū ipsa cutis, sed & in crustā vritur. Atq; hæc omnia caulis & foliorū sunt opera, si imponas virētia. Porro radix arefacta sternutationē prouocat, similiter aliis quæ valētē desiccāt. Sed & dentes dolētes iuuat, ut & frāgat eos valētī, scilicet exsiccatione: & ut semel dicam, calida



calida siccaq; valde est tū radix, tum vniuersa herba. Eadē Plinius quoq; de ranū-  
culorū vſu & effectū tradidit. Omnibus vis caustica, si cruda folia imponātur, pu-  
stulasq; vt ignis, faciunt. Ideò ad lepras & pſoras eis vtūtur, & ad tollēda stigmata,  
causticisq; omnibus miscēt. Alopeciis imponūt, celeriter remouētes. Radix in do-  
lore cōmanducata diutius, rumpit dētes. Eadem sicca concisa, sternutamentū facit.  
Nostri herbarij Strumeam vocāt, quoniā medetur strumis & panis, parte in fumo  
suspensa, credūtque ea rursus fata rebellare, quē  
curauerint, vitia. Hæc Plinius.

Li. 25. ca. 13.

## LINGVA, Plinij.



## LINGVA Maior, Dalech.



## LINGVA PLINII. CAP. XXV.



D Ranunculorū genera accedere vide-  
tur plāta hīc depicta, quē Plinij Lingua  
sive Lingulaca (vtroq; enim modo apud  
eum legitur) videtur esse. Radice est nigra, crassa,  
arūdinis modo geniculata, densissimis fibris ca-  
pillata: caulibus rotūdis, cubitalibus: foliis lōgis,  
angustis, acuminatis, figura Linguam exertā re-  
ferentibus, venosis, per interualla caules amb-  
ientibus, saporis acris & amari: flore Ranun-  
culi, aureo, quinque foliolis constante: fructu  
granuloso, asparagorum capiti simili. Circa fon-  
tes cum chrysanthemo aquatico prouenit. Ra-  
dix eius combusta, inquit Plinius, & trita cum  
adipe suis (adiicitur vt nigra sit & sterilis) alope-  
cias emendat vngentium in sole. Quæ alio in  
loco repetit: Lingulaca circa fontes nascens cui-  
us radix admista combusta teritur cum adipe  
suis nigræ. Id quoque excipitur, vt eius sit suis,  
quæ nunquam peperit. Sol deinde plurimū  
confert illitæ. Planta alia Dalechamptio. Lingua  
maior vocatur, quæ propē amnium ripas nasci-  
tur, locis quidem sabulosis, sed inuecto limo ve-  
luti stercoratis & pinguibus, caule singulari, an-  
guloſo, intus cauo, sex aut septē pedes alto, craſ-  
sitia pollicis, radice vnica, veluti geniculata, in-  
terdum crassitudine cubiti, obliqua, radiculis  
multis fibrata, cādidis, teneris, per interualla na-  
scētibus, gustu subamaris, & aromaticū nō nihil,  
cū māduntur, spirantibus: foliis numerosis, falici  
vel nerio similibus, venosis, elata & media in-  
tercurrente costa diuisis, octo digitos longis,  
in ambitu crenatis, eleganter caulē torū ab imo  
ad summū thyrsi modo vestiētibus, sparsim hinc  
illinc nullo ordine, tāquā ē tuberculis quibusdā,  
prodeūtibus, saporis amari & subacris: flore in  
extremo caule copioso, luteo, senecioni, aut her-  
bæ, quā Officinæ D. Iacobi vocāt, simili, inodo-  
ro. Plāta sapor ostēdit facultatis esse abstergetis,  
& ad expediēdas obstructions efficacis. Particu-  
latim eius dotes & vires nullus herbariorum, q̄ sciam, adhuc memoriæ prodidit.

Nomina

Li. 24. ca. 19.

&amp; Li. 25. ca. 11.

Forma

Locus.

Li. 24. ca. 19.

Vires.

Li. 25. ca. 11.



Nomina

Forma.



Nomina

Li. 8. simpl.

Forma.

appellatum fuisse testis est Galenus. Latine quoque Hydropiper & Piper aquaticum, Gallicè *Poyure aquatic*, & *Cwage*, Italicè *Hydropepe*, & *Pepe aquatico*, Germanicè *Vuasserpffiffer*, & *Muckenkraut*, quasi herba muscarum quod muscæ vehementer ab ea abhorreant: neque enim id quod succo eius aspersum est attingunt. Dioscorides scribit Hydropiper caulem edere geniculatum, solidum multis alis concauum, folia menthæ, maiora, teneriora, candidiora, sapore acria, quemadmodum

## HYDROPIPER, Matth.

Cord. in 2.  
Dioscor.  
Dod. lib. 5.  
ca. 67. & li.  
de florib.  
Matthi. in  
ca. 155. lib. 2.  
Dioscor.

Locus.

Lib. 2. c. 101.



DESCRIBI etiam ranunculorum generibus potest planta hîc depicta, quæ à semine feruidissimi gustus natalibusque & foliorum figura Hydropiper Lanceolatum ab herbariis nuncupatur. Radicibus nititur multis, brevibus, candidis, tenuibus, congestis: foliis multis plantagini aquaticæ similibus, aut terrestri quam Officinæ Lanceolatâ vocant, angustioribus, brevioribus: caule quadrato, virgato, pedali, infernè rubète, in ramulos aliquot diuiso: flore Ranunculi, aureo, capitulo paruo, veluti granulis tuberoso in quo semen acerrimi gustus. Hanc plantam Pena nomine pumili Ranunculi gramineis foliis, & geniculati videtur depinxisse.

## HYDROPIPER. CAP. XXVII.



ΔΡΩΠΕΠΕΡΙ à locis in quibus nascitur, & Piperis sapore quem præ se fert, quasi dixeris Piper aquaticum, Piper, non tamen aromatici odoris: fructum acrem in surculis paruis enascentem propè folia, coherentem & racemosum: radicem parvam, nullius in medicina vsus. Hanc descriptionem in nullam plantam veriùs competere autumant omnes ferè periti herbarij, quam in eam quæ Persicaria non maculosa & Persicaria vrens vulgò nominatur, vt ab ea distinguatur cuius folia nigris maculis aspersa sunt. Illa enim foliis est menthæ confimilibus, maioribus tantum, hoc est, longioribus, tenerioribus, candidioribus, quæ meram Piperis acrimoniam resipiunt, citra vllam odoris gratiam: caule est admodum geniculato, duro, alis concauo, è cuius adnatis rufum semen prodit racematim congestum, & quadam serie coherens, acri admodum gustu, vt linguam vehementer vellicet. Accedunt natales: nam propè stagnantes aquas hæc planta virescit: his adde etiam facultates. Cordus Cratægogonum vocat. Ruellius probare nititur legitimum Hydropiper esse, quod Officinæ Eupatoriū falso nominant. At Eupatoriū istud



istud foliis est cannabinis, duris, hirsutis, amaro gustu, non acri, id est, piperis, adeò odoratis, ut eam ob causam viribus maximis prestare existimetur, cum hydropiper Dioscoridis folia ferat menthæ maiora, molliora candidiora, gustu piperis, acri, sine vlla odoris gratia. Præterea hydropiperis caulis est geniculatus, solidus, in foliorum & ramulorum exortu alis multis concavus: semine acri in ramusculis prope folia racematim coherente, Pseudo eupatorio verò quod posthac suo loco nos indicabimus caulis est procerus, minimè geniculatus, in cuius ramulis nullum iuxta folia semen racematim coheret, sed in cacumine flores fert subrubentes, qui diuisi, muscarij specie, siluestris origani modo per maturitatem in pappos evanesçunt, è quibus semen amarum totius plantæ sapore, non aere, etiam si Ruellius id asseueret. Quod si eupatorium istud iuxta residues aquas, aut tardo fluxu repentes nasci conspexerit, non propterea hydropiper fuerit, cum aliæ omnes notæ reclamant. Sunt alij herbarij qui aliud hydropiper ostendunt, id nimirum quod Chrysanthemum aquaticum quidam vocant. Dodonæus Pseudoeupatorium fœminam. Sed id duplex, vnum quod folia in tria, quinque, sex diuisa fert digitorum modo, alterum quod simplicia & minimè diuisa habet, ut ex vtriusque pictura perspicere licet. Cætera in vtroq; paria sunt, quod ad radicem, caules, foliorum figuram, florem, semen attinet. Sunt etenim radice parua & breui, geniculata, fibrata, nigricante, inutili: *Forma.* caulibus multis, cubitalibus, geniculatis, subhirsutis, solidis, non cauis, quadratis,

*HYDROPIPER Alterum,  
Dalechampij.*



*HYDROPIPER Pseudo-  
eupatorium fœmina, Dodo.*



virgatis, in alas multas sese explicantibus: foliis menthæ, maioribus, tactu mollioribus, pallidiùs virentibus, aromaticum nihil olentibus, gustu piperis, acri, fructu quoque acri, corymbo simili, aut chamæmeli capitulo, luteo, surculis paruis eucto, qui ex alarum sinu prope folia eriguntur, foliolis insidente stellatim radiatis asteris modo: semen oblongum est, angulosum, quatuor præfixis pilis, villosum, asperis & tenacibus, contrectantium manui, & mandentium palato inhaerentibus, mordaci scabritie. Gignitur vtrumque prope aquas vel in aquis ipsis stagnan- *Locus.*



HYDROPIPER Aliud,  
Dalechampi.

tibus, vel in riuis leniter fluentibus. Sed historiæ Dioscoridis quædam supradictorum repugnare videntur, quod propè caulis folia fructus earum plantarum, quas hîc pinximus, non nascatur, quod racemosus non sit, quod piperis acrimonia linguam non vellicet. Sed sunt qui in Dioscoride legant, χαρπὸν δὲ ἔχει ἐπὶ κλωναῖων μικρῶν ἐκφυομένων παρὰ τὰ φύλλα, non ἐκφυόμενον, vt hæc vox ad furculos siue ramulos fructum sustinentes non ad fructum ipsum referatur. Præterea an furculorum, an caulis folia hîc intelligantur, Dioscorides non expressit, fructus quidem iuxta sua siue furculorum folia orbiculatim ipsum ambientia prodit. Quantum ad racemosum fructum attinet, respōdent in Dioscoride βοτρυχῶδη legendum, pro βοτρύωδη, facillimèque fuisse hunc lapsum, in magna nominum similitudine, βοτρυχας autem siue βότρυχας dixerunt veteres cincinnos, seu comptam cæsarîem & capillos mulierum, quos representant pili illi exiles qui in seminum hydropiperis vertice eminent, cui notæ exprimendæ βοτρυχῶδης vox maximè conueniat. Sed si

quis hanc emendationem non approbet, ne ea quidem se egere aiunt, cum vtriusque hydropiperis fructus maturus inæqualibus pilorum ordinibus in figuram racemi oblōgam fastigietur, & desinat. Iam verò fructum hunc acrem esse, saporisq; piperi similis, nemo qui gustauerit inficiabitur. Sed nec parem piperis acrimoniā in eo Dioscorides requirit, nec Galenus, qui nō tam calidum esse quàm piper aperte dicit. At si vtrique hæc planta postremò descripta eorum iudicio verum sit hydropiper, quænam fuerit veteribus persicaria illa non maculosa? Cratæogonum illi esse arbitrantur. Qua de re non est hîc dicendi locus. Nunc de hydropiperis viribus tractandum. Folia cum fructu illita, auctore Dioscoride, tumores veteresque duritias discutiendi, & sugillata delendi vim habent. Siccata eadem & contusa pro pipere sali & obsoniis admiscuntur. Galenus eadem tradit. Hydropiper non vsque adeò calidum est quàm piper, attamen ipsa herba viridis cataplasmatibus modo imposita, sugillata & tumores induratos digerit. Persicaria non maculosa multorum hydropiper, recens & viridis, inquit Matthiolus, sternitur commodè in thalamis pulicibus necandis, & postero die eiicitur. Suillæ carnes salæ circumducta herba præseruantur à vermibus. Ideoque succus eius ad vermiculosas aures maxime facit. Plinius hydropiperis herbæ non meminit: nam alia est apud ipsum herba piperitis siue filiquastrum, de qua suo loco diximus.

Vires.

Lib. 2. c. 155.

Lib. 8. sim.

In cap. 155.  
lib. 2.

Lib. 20. c. 17

## PERSICARIA.

## CAP. XXVIII.

Nomina

Forma



RECENTIORIBVS herbariis persicaria dicitur à persicæ foliorum similitudine, Gallicè *Persicaire*, Germanicè *Persichkraut*. Caulibus, foliis, floribus, semine hydropiperi, id est, persicariæ non maculosæ simillima est. Caules enim habet rotundos, geniculatos, folia persicæ aut salicis, sed sæpè latiora & nigriora quàm hydropiperis, macula in medio nigra, qua nota apertissimè ab hydropipere dignoscitur: flores similiter racemosi, candidi, frequentius



PERSICARIA *Pusilla*

Matthioli.

Lobellij.



frequentius purpurascens : semen nigrum, radix fibrata. Reperitur similibus, & sepe iisdem quibus hydropiper locis, floretq; eodem tempore Sapore acris nō est, sed subacidum quippiam respicit, quare frigido siccoq; est temperamento. Ob id inflammationibus incipientibus, & recentibus vulneribus fertur prodesse imposita. Sunt qui velint hanc persicariam Plinij plumbaginem esse, propter eas quae in foliis conspiciuntur plumbei coloris notas. Sed Plinius plumbaginem non a colore, sed ab effectu nomē habere vult, quod videlicet plumbo oculorum affectui medeatur. Nascitur, inquit, vulgò molybdæna, id est, plumbago, etiam in aruo, folio latipathi, crassa radice, hispida. Hac commanducata si oculus subinde illinatur, plumbum, quod est genus vitij, ex oculo tollitur. Huc adducemus ex Lobellio Persicariā aliam pusillam repentem, quam ait Antuerpiani agri glareosis sabulosisq; vdis quadruplò minorem humi repere, flosculis aliàs candidis, aliàs purpurantibus, reliqua facie similem.

Locus.

Temper.

&amp; Vires

Lib. 25. c. 13.

## FLAMMVLA AQUATICA.

## CAP. XXXIX.

**A** HERBARIIS flammula appellata est, quod flammæ, siue ignis modo vrat, Gallicè *flammule aquatique*, vel, *Herbe de feu*, Germanicè *Egel kolen*, quod oues eam depastæ, inflammatione & vlceratione hepatis vexantur, quam Germani *Egel* vocant. A Lobellio Ranunculus aquaticus, angustifolius ferratus dicitur. Caules habet rubescētes, cauos, frequenter geniculatos, in quibus folia angusta, salicis foliis ferè similia, tamen longiora, & in ambitu parùm crenata, præsertim ea quæ in inferiore caulium parte sunt : flores luteos siue aureos, in medio subhirsutos, figura & colore ranunculi auricomi floribus prorsus similes : capitula item similia, radicem fibratam. In pratis locisque aliis

Nomina

Dodo. lib.

3. cap. 75.

Forma.

Locus.

aliis



*FLAMMULA*  
*Aquatica.*

*Viros.*

*Lib. 3. c. 17.*

*Nomina*

*Genera*

*Forma.*



aliis vliginosis, & in aquis stagnantibus prouenit. Maio mense floret, nec ita multò pòst semen profert, vrit & vlcerat, temperiéque calida & sicca est ad tertium vsque gradum, hominibus, ceterisque animantibus noxia. Describitur huic eadem aut valde affinis Cap. de Ranunculis, flammula vulgi Ranunculus flammeus aquatilis angustifolius.

*PHV SILVESTRE.*

*CAP. XXX.*

**P**HV SILVESTRE à Dodonæo & cæteris herbariis dicitur, vt differat à Phu hortensi, de quo in Libro De Odoratis, Latine valeriana siluestris. Cuius duo sunt genera. Valeriana siluestris maior, *Grande Valeriane sauuage*, Germanicè *Vuldbaldrian*. Phu paruum Matthioli. Valeriana siluestri sminor, Gallicè *petite Valeriane sauuage*. Phu minimum Matthioli. Illa Phu hortensi haud absimilis, caules habet rotundos, cauos, geniculatos: folia alis expansis familia constant foliolis multis aduerso situ oppositis, similibus Valerianæ hortensis foliis, in caulis fastigio enascentibus, maioribus & magis incisfis flores hortensi Valerianæ similes, purpurascences: radicem teneram quæ huc & illuc serpit. Valeriana siluestris minor Valerianam hortensem proximè refert, nisi quod omnibus suis partibus minor est, folia eius prima & infima plantaginis foliolis proxima sunt, quæ circa caulem nascuntur, altius sunt incisa, Valerianæ proximè dictæ similima: caules rotundi, geniculati, palmum alti: flores supradictæ similes, radices graciles, quæ per terram serpunt. Locis humidis & pratis aquosis

*VALERIANA Siluestris maior,*  
*Dodon. Phu paruum, Matth.*



*VALERIANA Siluestris minor,*  
*Phu minimum, Dodon.*



*utraque*





utraque provenit. Dodonæus & cæteri herbarij his addunt Phu Græcum, sive Valerianam Græcam vel peregrinam, quæ quid valerianæ habeat fortè nesciunt ij, qui nomen id ei indiderunt, præter quandam cum Valerianæ foliis similitudinem, eamque exiguam. Caules duos trësve profert, in quibus folia expanduntur Valerianæ siluestris ferè similia, longiora angustiora & magis incisa: foliis viciæ siluestris proxima, nisi maiora essent: flores in summo caulium fastigio conferti, ex candido purpurei, quinque foliolis discreti, è medio brevia staminula emittentes, punctis aureis aspersa: post quos semen æstate media nigrum, pusillum, in siliquula rotunda, oblonga: radix creberrimis filamentis donata. In hortis Galliar, Belgij, Angliæ colitur.

Ibid.

CONYZA.

CAP. XXXI.

**K**ONYZA Græcè, Latine etiam Conyza nominatur, à Gaza pulicaria à pulicibus necandis. Dioscorides tria eius genera assignat. Conyzam maiorem, minorem, & mediam. Galenus totidem. Plinius in duo, maiorem scilicet & fœminam distinxit. Recetiores herbarij quartam adiciunt, nempe Conyzam minimam. Conyza, inquit Dioscorides, duo genera. Quæ parva vocatur, odore præstantior est: maior verò frutice altior, & foliis latioribus, gravi odore. Vtriusq; folia oleæ similia, hirsuta, pinguis. In maiore caulis attollitur binum cubitorum altitudine, in minore pedem æquat: flos fragilis, lutei coloris, qui in pappum evanescit: radices inutiles. Est & tertium Conyza genus, caule crassiore ac molliore: foliis mediæ inter maiorem & minorem amplitudinis, non pinguis, multò grauioris odoris & iucundioris, sed inefficacior. Plinius ita describit & distinguit. Et Conyza duo genera in coronamentis, mas & fœmina. Differentia in folio. Tenuius fœminæ & constrictius, angustiusq; imbricatum maris & ramosius. Flos quoque magis splendet eius. Serotinus virique post ærcturum. Mas odore grauior, fœmina acrior. Et ideo contra bestiarum morsus aptior, folia fœminæ mellis odorem

Nomina

Lib. 3. c. 119

Genera.

Lib. 7. sim.

Lib. 21. c. 110

Ibid.

Forma.

Lib. 21. c. 110





Lib. 6. hist.  
Cap. 2.

odorem habent. Masculæ radix à quibusdam libanotis appellatur, de qua diximus. Qui locus ex Theophrasto transcriptus est, qui ita habet, κονίζης τὸ μὲν ἄρρεν, τὸ δὲ θήλυ. Διαφοράς ὃ ἔχει καὶ τὰ περὶ τῶν ἄλλων, ὅτι οὕτω διακρίμενα, τὸ μὲν γὰρ θήλυ λεπτοφυλλότερον καὶ ξυνεστεικὸς μᾶλλον, καὶ ὃ ὅλον ἔλαττον, τὸ δὲ ἄρρεν, μετρίον ὃ καὶ παχυφυλλότερον καὶ πολυκλωνότερον, καὶ τὸ φύλλον μετρίον ἔστι λιπαρώτερον ἔχον, ἐπὶ ὃ τὸ αἶθος λεπρότερον. καὶ ἀρποφόρα δὲ ἀμφω, τὸ ὅλον ὁφθαλμοειδὲς καὶ ὁφθαλμοειδὲς περὶ ἀρκιούρον, καὶ μετὰ ἀρκιούρον βλαστάνει (non λαμβάνει, ut in vulgatis perperam legitur) βαρεῖα δὲ ἡ ὁσμὴ τῶν ἄρρενος, ἢ δὲ τῆς θηλέας λεμνιτέρα διὰ καὶ πρὸς τὴν θηλείαν χρησίμη. Id est, Giza interprete. Pulicaria mascula & foemina constat. Distant quemadmodum caetera, quæ sic discerni desiderant, foemina enim tenuiore folio, & compressior est, atque in totum minor, mas amplior crassiorique caule, atq; ramosior, & folium amplius, pinguiusque habens, nec non flore splendidior est. Ambo fructiferæ sunt, in totum serotina germine floréque, quippe cum circa arcturum & post arcturum germinent. Mari grauior odor, foeminæ acrior, ideoque contra bestiarum morsus utilis. Plinius alibi tertium genus cunilæ, quæ à Græcis mascula, à nostris cunilago vocatur, odoris foedi, radice lignosæ, folio aspero est, inquit. Et ibidem alteram thuris, quam libanotidem appellant, proponit, quarum utraque medetur contra serpentes ex vino vel aceto. Pulices etiam contritæ cum aqua sparsæ necant. Quæ cum in Conyzam competant, ut ipsemet indicat, locum hunc citans aliquantò post, Masculæ radix à quibusdam libanotis appellatur, de qua diximus, perspicuum est eum Conyzam cum cunila confundere. Plantæ tres quæ hic exhibentur, Conyza sunt Matthioli, nullis prorsus reclamantibus notis, inquit, quæ singulis earum à Dioscoride tribuuntur. Sed sunt qui maiorem præsertim Conyzam Matthioli, Conyzam Dioscoridis esse negent, omnibus ei aduersantibus notis. Spirat enim eius radix odorem non tetræ, sed aromaticum, caryophyllorum, caule & foliis verbasci aut blattariæ, non oleæ, glutinis nihil penitus habentibus. Flores ex luteo purpurascunt. Cætera etiam planè dissimilia, multò magis viribus. Non esse igitur hanc Conyzam, sed Baccharim

Lib. 20. c. 16

Lib. 21. c. 70

In cap. 119.  
lib 3.



CONYZA MEDIA, *Math.*

CONYZA ODORATA.



charim Monspeliensium aiunt, Pena & Lobellius odore & flore insignem. Matthioli verò Baccharim verbasco odorati specie esse vt in Libro de Odoratis ostendimus. Item Dodonæus alias Conyzas descripsit & depinxit Nec desunt qui istis Conyzam odoratam adiungant, radice candida, breui, fibrata: caule cubi- Lib. I, c. 23.

CONYZA Minima,  
*Lobellij.*



tali, ad radicem rubente, furculoso: foliis circa radicem belidi ferè similibus, per humum sparsis, in caule longioribus & angustioribus, imparibus spatiis caulem vestientibus: flore Corymbaceo, ex capitulis herbaceis extante, foliis purpureis radiato, in pappos citò euanescente, saporis acris, odoris validi, nec iniucundi. Dentellariam alij vocarunt ab effectu, quòd eius decocto, si os colluatur, dentium dolores mitigantur. Dodonæus pro tertio genere Senecionis pinxit. Conyza maior in agrorum marginibus, aruisque humidis crescit, reliquæ in locis lacustribus, & aliis vliginosis. Odorata in sabuletis Rhodani Lugduno propinquis. Pena quadruplicem Conyzæ differentiam ponit, quarum media & minima vbiuis Gallia, Germania, Angliæ lacustribus locis & humentibus aruis multa. Minima in fossis, inquit, altero à Londino lapide fructicat inter chamæmelum Romanum & pulegium regale. Sesquipalmum caulibus superat multis alis donatis, hirsutis, pullis vel cinereis, rotundis, rigidiusculis, quos folia ambiunt ab imo crebra, incana, gnaphalij vul-

Lib. 5. c. 17.

Locus.

Vires.

TT



garis paria, quod habitu & colore tota refert, sed maiora multò & obscuriore obfo-  
letioreve lanugine: flores rotundi, bullis agerati vel tanaceti, sed minùs vegeto  
colore & compressi, quibus elapsis semen subest anthemidis, acerosum, minuum,  
radix lignosa, exigua. Minimè omnium hæc glutinosa, minùsque quàm media fœ-  
rida. Eam ex Lobellio hîc pinximus. Eodem Angliæ loco secus regiam viam, at-  
que humentes scrobes mediâ superiori prorsum similis, sed duplò maioribus fo-  
liis, crassis, densis, virentibus, asperis, rigidis, squallidis, caulem bicubitalem, & alas  
multas ambientibus, ima falcata. basi glasti dentellariæve modo radiati flores,  
lutei, bupthalmi, semen haud dissimile: radix pusilla, halitum virosum, & quid-  
dam Cimicum, aut fœridæ cotulæ efflat. Parum aut minùs multò quàm maior &

CONYZA Magna, Pena.



CONYZA Minor vera, Pena.



minor glutinosa. Ea est quam Matthiolus Media nomine depinxit. Conyza ma-  
ior verà lepidiore austrinòque cœlo & aëre maritimo delectatur, cuiusmodi est  
Herruria inter Florentiam, Aquaspendulas, & Romam: atque in Nitrobrigum  
maritimis & Venetis, & aruorum marginibus Lunellæ & Mompelij. Binum tri-  
nùmve cubitorum frutex multis propagatur virgultis, rectis, rigidis, rotundis, fo-  
liis multis coherentibus, densis, ex viridi pallentibus, crassis, pinguibus, oleæ simi-  
libus. Extremi caules multis ornantur secundum longitudinem floribus luteis,  
rotundis, hieracij aut Senecionis, in pappos euolantibus: semen exiguum vt hie-  
racij: radix lignosa, fibrata. Hæc multò ceteris præstantior, cum odore vehemen-  
ter suavi, tum viribus, nec minus cisto ledo glutinosa tangenti, cuius odorem, sed  
nonnihil cum media confusum imitatur. Huic præ ceteris assimiliatur natalibus,  
viribus, odore & facie, minor Dioscoridis hîc picta, quam veram Dioscoridis Pe-  
na asserit. Et prorsus eadem foret, nisi proceritate & caulium luxuria vinceretur.  
Sæpius vnico est caule gracili, cubitali & sesquicubitali, paucioribus, minoribusq;  
foliis cisti ledi angustifolij: color, odor, modus, semen tum illis, tum floribus haud  
diuersa: radix exigua. De Conyza viribus nunc dicendum. Suffitu subtraetique  
frutex totus venenatas bestias fugat, culices abigit, & pulices necat, folia conue-  
nienter

Pires.




nienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis ac vulneribus. Flores & folia cum vino ad menses partusque eiciendos abutuntur: item contra vrinae stillicidia, arquatam morbum & tormina: comitiales pota ex aceto adiuuant, decoctum in defensionibus medetur vulvae malis, impositus succus abortum facit, herba ex oleo efficaciter horroribus oblinitur. Capitis dolores tenuis illita sanat. Galenus easdem vires sic declarat. Conyza maior & minor similis sunt tum temperaturæ, tum facultatis, gustui amaræ, & acres. Excalfaciunt admodum luculenter, siue quis folia læuigata cum teneris ramulis (est enim fruticosa planta) parti cuiuspiam illinat, siue ubi in oleo coxerit, eo utatur, siquidem concussiones, siue rigores per circuitum redeuntis tale oleum sanare videtur, flores quoque earum similis sunt facultatis. Itaque quidam & ipsos cum foliis tritos in vino bibendos exhibent ad menses fortiter ducendos, ciendumque fœtum. Est & tertium Conyzae genus, in locis humidioribus proueniens, utrisque illis tum graueolentius, tum imbecillius. Sed primæ memoratæ tertij sunt ordinis in excalfaciendo & exsiccando.

Li. 7. simpl.

## OPHIOGLOSSVM. CAP. XXXII.



RAECIS οφιόγλωσσον, Latine Lingua serpentis dicitur, quibusdam Nomina herbariis Lancea Christi, aliis Lucciola, aliis Argentina, Gallis *Langue de serpent*, Germanis *Natterzanglin*. Quidam Ceratiam Plinij esse volunt, vnico tantum folio assurgentem: alij sic Lunariam minorem potius nominandam censent. Sed neutri radix magna & nodosa. Sunt qui Lin-

OPHIOGLOSSVM,  
Matthioli.

guam Plinij siue Lingulacam esse putent, de qua iam diximus. Quidam inter dracunculi species recensent. Planta est admirandæ naturæ, folium profert digiti longitudine, pingue, plantagini aquaticæ haud absimile, ex cuius inferiore sinu petiolus siue cauliculus exit, lingulam sustinens longam & angustam, linguæ serpentis similem, vnde ophioglossi nomen inuenit. In pratis humidis & pinguibus prouenit. Aprili & Maio mensibus reperitur, Iunio ocysimè deperit. Exsiccat tertio gradu citra insignem caliditatem. Præstat maximè ad recentia vulnera glutinanda, quare quidam ad enterocelas mirificè extollunt. Maceratur in oleo quo utuntur Chirurghi ad prædicta fœlici, ut aiunt, successu. Datur potanda ex stillatitia aqua equiseti ad intestinorum & thoracis vulnera, & cæterarum internarum corporis partium. Quamobrem sanguinem reiicientibus prodest, bibitur aduersus alba fœminarum profluvia ex stillatitia aqua foliorum quercus. Vinum austerum in quo tota planta incocta fuerit, si eo abluantur oculi, lacrymas cohibet. Illinitur recens siccæ ad vulnerum inflammationes ex gallinaceo adipe. Omphacinum oleum in quo multa folia diu maduerint, insolatæque fuerint addita abiegna lacryma, aptissimum est medicamentum recentibus vulneribus glutinandis.

Forma.

Locus.

Matth. in  
Cap. 161.  
lib. 2.Temper.  
& Vires



Nomina



ΕΛΙΔΩΝΙΟΝ *μικρον*, Latine Chelidonium minus, & hirundinaria minor, Officinis Celidonia minor, eadem de causa qua Chelidonium maius nomen accepit. Gallice *Petite Esclaire*, Germanice *Figunatzen*, *Blankerkrout*, *Pfaffenboedlin*, & *Meienkrout*, Italice *Celidonia minore*, & *fassocello*, quod fabarum modo folia subpinguia habeat. Sunt qui Scrophulariam minorem appellant, à radicum similitudine, quæ multis quasi tritici granulis veluti strumis, quæ Græcorum imitatione scrophulæ vocantur, coaluisse videntur. Alij sic dictam putant, quod strumis siue scrophulis imposita medeatur. Plantam hîc depictam permulti docti herbarij pro chelidonio minore vsurpant. Quæ Vere duntaxat vliginoso solo & in fossarum scrobiumq; marginibus frequens gignitur, foliis hederæ, minoribus, rotundioribus, subpinguioribus, sine caule: flore luteo, tenui pediculo appenso, radicibus nritur multis, ex eodem callo prodeuntibus, pusillis, granorum tritici modo aceruatim congestis, quarum nonnullæ in longitudinem protenduntur. Quæ omnia Dioscoridis historiæ bellissimè congruunt, sic scribentis. Chelidonium minus, quod triticum siluestre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: foliis hederæ, multò rotundioribus, teneris & subpinguibus, radices habet ex eodem callo complures, pusillas in granorum tritici modum aceruatim congestas: quarum tres aut

CHELIDONIUM,  
Minus.

Locus.

Forma.



Lib. 2. c. 177

Vires.

Ibidem.

Lib. 8. sim.

In lib. 2.

Dioscor.

Lib. 4.

Georg.

quatuor in longitudinem exeunt. Iuxta aquas & lacus nascitur. Hæc omnia ad-  
amulsi conueniunt, solæ qualitates & temperatura repugnant. Vis enim ei  
acris, inquit Dioscorides, & anemones modo summam cutem exulcerat, pforas  
& scabros vngues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput nari-  
bus infunditur, decoctum eius ex melle gargarizatum magnificè id præstat, &  
omnia pectoris vitia extrahit. Galenus easdem planè vires ei assignat, & quarti  
ordinis excalfacientium incipientis esse ait, cum maius Chelidonium tertij tan-  
tum sit ordinis. At eius plantæ hîc proponitur, nec folia, nec radix vlla gu-  
stum acrimonia afficiunt. Non tamen ob ignauam acrimoniam istud minus  
Chelidonium reiiciendum, cum cæteræ omnes notæ apprimè descriptioni suf-  
fragentur, & multarum plantarum acrior aut mitior sapor, agri sequatur condi-  
tionem. Valerius Cordus Chelidonium minus, florem amellum à Vergilio dili-  
genter descriptum esse putat.

CALTHA



## CALTHA PALVSTRIS.

## CAP. XXXIIII.

**S**UPERIORI perquam similis est, quæ Germanicè & Belgicè *Dotterbloemen* vocatur. Quidam chamæleucen Plinij faciunt. Chamæleucen, inquit, apud nos farranum siue farfugium vocant. Nascitur secundum fluuios folio populi, sed ampliore. Radix eius imponitur carbonibus cupressi, atque is nidor per infundibulum imbibitur in vetere tusi. Sed

## CALTHA PALVSTRIS.

*Tusilago siue farfugium,  
Matthioli.*



idem Plinius alio in loco Bechion eandem cum chamæleuce facit. Quidam, inquit, eandem esse bechion, & alio nomine chamæleucen putant. Huius aridæ cum radice fumus per arundinem haustus & deuoratus, veterem sanare tussim dicitur. Quæ de chameleuce Dioscoridis intelligi posse non videntur. Chamæleuce, inquit, lumborum doloribus propitia est, herba virens incuruis foliis, surculisque, flore rosaceo. Alij chamæpucen legunt non chamæleucen, quoniam apud Plinium habetur, chamæpeuce laricis folio similis, lumborum & spinæ doloribus propitia est, quem usum Dioscorides Chamæleuce attribuit. Sunt etiam qui breuè apud Dioscoridem descriptionem in totum reiiciendam censent, & sola hæc verba legunt. Chamæleuce facit ad lumborum dolores in aqua trita pota. Galenus chamæleucen scribit calidæ esse facultatis tertio quodammodo ordine, & siccæ primo, vt diuersa à bechio censenda sit. Ex his conicere quis possit *Dotterblæmen* chamæleucen non esse. Alij ex Geoponicis Malacocissum maiorem faciunt, Matthiolus Tusilaginis speciem siue farfugium, vt capite De Tusilagine dicemus. Recentiores alij Gesnerus, Penna, Lobellius & alij Caltham palustrem appellant. Folia ei sunt bene viridia, rotunda, violæ martiæ aut populi similia, maiora, in ambitu parùm crenata: caulis rotundus in ramulos sese diffundens, qui flores sustinent luteos, chelidonium minoris, aut ranunculi similes, sed grandiores & aspectu pulchriores, minimè papposos, sed qui diu durant, nascuntur deinde siliquulæ, in quibus exiguum semen, luteum, radix crassa, capillamentis fibrata, acris gustu, sed moderatè, nondum tamen vsu exploratæ facultates. Locis lacustribus & vdis cre-

Nomina

Lib. 24. c. 15

Chamæleu  
ce.

Lib. 16. c. 6.

Lib. 8. sim.

Dodo lib.

1. cap. 20.

Forma.

Locus.



## VERONICA FOEMINA. CAP. XXXV.

Nomina  
Forma.



ERBARI plantam istam Veronicam foeminam appellant, Galli *Veronique femelle*, Germani *Erenbreisz vneiblin*. Caule exit lanuginoso, foliis rotundioribus, minimè crenatis, subpinguibus, magis viridibus, minimè hirsutis: flores profert in luteo purpurascens: semen in va-

Locus. sculis rotundis conclusum: radicem tenuem & fibratam. Locis vliginosis & la-

VERONICA Femina,  
Dodonei.

VERONICA Femina,  
Mathioli.



Vires. custribus gaudet. Iunio & Iulio mensibus floret. Gustu adstringens & amara est. Vnde colligere licet eam esse tum exalfaciendi, tum siccandi vi præditam, eademque præstare quæ Veronica maior, sed inefficaciùs.

## TVSSILAGO.

## CAP. XXXVI.

Nomina



NOTISSIMA vtilitate, quam præstat orthopnoicis, & tussi vexatis, dicitur *Βήχιον* Græcis, sicut *Tussilago* Latinis, Officinis *farfara* & *Vngula caballina*, Gallis *Pas de cheual*, & *Pas d'asne*, Italis *farfara*, *farfarella*, & *ungbia di cavallo*, Germanis *Rosshuob*, & *Brantlattich*. Theophrastus, ut quidam censuerunt, *Tiphium* appellat, quæ ante foliorum & caulium ortum floret. Plinius duo tussilaginis genera facit. Vnam siluestrem, alteram quæ à quibusdam *Salvia* dicitur, similis verbasco. Dioscorides vnico genere contentus fuit, idq; esse quod hîc proponitur, tum vires & effectus longa experientia comprobati, tum ipsa descriptio perspicuè demonstrant. Eius enim folia, ut ille ait, maiuscula sunt quàm hedere, sex aut septem à radice, supernis partibus alba, infernis viridia (sic enim Græcè legitur, ἐκ μὲν τῶν πρὸς τὰ ἀνω λευκὰ, ἐκ δὲ τῶν πρὸς τὰ κατω χλωρὰ) in plures angulos exeuntia. Caulis palmum altus, flos luteus Vere prodit, quo vnà cum caule confestim exiit. Inde nonnulli his vacare existimarunt, radix tenuis est (perperam legitur in excusis *ρίζα λεπτή, ἀχρηστός*, radix tenuis, inutilis. Qui enim

Lib. 7. hist.

cap. 12.

Lib. 26. c. 6.

Genera.

Forma.



TVSSILAGO, *Matth.*

inutilis dici potest, cuius vsum mox præscribit. Quare vox  $\alpha\chi\epsilon\upsilon\tau\omicron\varsigma$  in contextum irrepsit, quæ nec in Oribasio, nec in Plinio legitur, vel pro  $\alpha\chi\epsilon\upsilon\tau\omicron\varsigma$  legendū  $\beta\chi\epsilon\upsilon\tau\omicron\varsigma$ , idest, ad vsum com-  
moda. Nascitur circa riuos & aquosa loca. Similiter quæ hic pingitur, folia promit ab imo in pediculis sesquipalmum altis, rotunda, sed lateribus fenis septenisve angulos acutos claudentia, venosa, equinum pedem referentia, altera parte candicantia, & quadamtenus cinerea: altera viridia, carnosa: caulis albus, lanuginosus, in quo flores aurei, dentis leonis æmuli, celerrimè in pappos abeūtes: radix cædida, longa humi sparsa. Plinius ita distinguit & describit. Tussim sedat bechiū, quæ & Tussilago dicitur. Duo eius genera. Siluestris vbi nascitur, subesse aquas credunt: & hoc habent signum aquileges. Folia sunt maiuscula quàm hedera, quinque aut septem, subalbida à terra, supernè pallida: sine caule, sine flore, sine semine, radice tenui. In hoc bechio Plinius à Dioscoride diffentit: habet enim quinque aut septem folia,

Lib. 26. c. 6.

ille sex aut septem, & supernè alba, infernè virentia. Plinius contra, subalbida à terra, supernè pallida. Præterea, Plinius ex eorū est numero, quos Dioscorides reprehendit tum hic, tum in totius operis præfatione, quod putarint bechium sine caule, sine flore, sine semine esse. Sed quantum ad foliorum colorem spectat, hic dissimulandum non est, quamuis Dioscorides ea dicat esse,  $\epsilon\mu\mu\delta\omicron\tau\omicron\upsilon\varsigma\ \tau\omicron\varsigma\ \alpha\lambda\beta\alpha\ \chi\lambda\omega\rho\alpha$ , tamen omnes quos legere mihi contigit, tum eius auctoris interpretes, tum herbarios de Tussilagine scribentes, pingere folia aduersa parte tomentosa, incana, aduersa virentia, siue inferius alba, superius virentia. Initio Martij mensis & Aprilis caulem profert lanuginosum sine foliis, & in eo florem luteum: mox à radice prodeunt folia: tunc confestim caulis & flores depereunt, ita vt rarissimè flores & folia in hac planta simul reperias. Quod flores sint fugacissimi, iisq; enatis breui vigor vitæq; duret, longissimæq; mora triduū, aut quatriduū, post quod tempus illicò flaccescunt in pappos euanescent, & caduci marcent, ita vt non nisi vere sese ferant obuiam, quod qui non animaduertunt sine caule & flore nasci eam existimarunt. Folia ex melle trita, inquit Dioscorides, igni sacro & omnibus inflammationibus illitu medentur. Arida suffitu, ita vt fumus per infundibulum hianti ore capiatur, hos sanat qui sicca tussi, atque orthopnoea infestantur: pectoris vomicas rumpunt. Eūdem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite & pota mortuos partus eiicit. Et Galenus, Bechium, inquit, sic nuncupatum est quod  $\beta\chi\epsilon\upsilon\tau\omicron\varsigma$  hoc est tusses, & orthopnoeas iuuare creditum sit, si quis videlicet folia arida fumēs, aut radicem in prunis accēdens, ascendentem inde fumum inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, vt sine molestia noxave omnes thoracis obsessas, illitu extrinsecus adiuuant, propter aquæ partes cruda inflammatione obsessas, illitu extrinsecus adiuuant, propter aquæ humiditatis admistionem, qua omnia viridia, teneraq; participant, alia plus, alia minus. Nam sicca Bechij folia acriora sunt, quàm vt partibus inflammatione laborantibus conueniant. Nascitur in Tussilaginibus radice, inquit Matthiolus, subalbida quædam lanugo, quæ à radicem particulis prius repurgata, deinde linteolis

Tempus.

Ibidem.  
Vires.

Li. 6. simpl.

Ca 109. li. 3.



inuoluta, & in lixiuo parùm decocta, addito salis nitri aliquantulo, demũ sole siccata, omnium optimus est fomes ad ignem ex filice excussum excipiendum. Est enim adeò ignis rapax, vt statim primo chalybis concussu accendatur. Matthiolus Thussilagini verã duas alias species addidit: vnã quã vera est petasides, vt dicitur. Alteram Germanorum & Belgarum *Dotterbloemen*, nonnullorũ *Chamaeleucẽ*, & Malacocissum maiorẽ, aliorum *Caltham palustrem*, de qua diximus. Hęc multò

*TVSSILAGO Alpina, siue Montana, Dalechampij.*



*TVSSILAGO Altera Alpina, Clusij.*



*TVSSILAGO Montana Minima, Lobel.*



magis Chelidonium minus ipso toto vultu præfert, nisi quod vniuersa maior. Flores non papposi admodum & particularim exeunt, aurei ranunculi modo, aut chelidoniij minoris, folia nõ ortu, vt in Tussilagine, anteuertũt, & Nymphaeæ luteæ colore, aut chelidoniij minoris nitore fulgent. Folia non subter incana, nõ angulosa, non caulis tomentosus, sed potiùs atro virore polito, vti asarum & nymphaea. Radix fibrata capillamentis, acris gustu, sed moderatè. Alij herbarij duo alia genera Tussilaginis faciunt, & à natalibus Tussilagines Alpinas vocant. Vnam radice longiuscula, nodosa, valde fibrata, nigricante: foliis è radice prodeuntibus, rotundis, tenui & longo pediculo appensis, venosis per ambitum infectis: caule parum alto, lanuginoso, foliola duo vel summum tria proferente: flore aureo, in vtraque planta singulari, Tussilagini nostræ simili, non sic fugaci verum in planta sua diu nitente ac perdurante, sed qui tandem in pappos abeat



abear. Alterum radice crassiore, magis fibrata: foliis maioribus, in circuitu magis incis, venosioribus, acuminatis hederæ modo: caule sesquipedali, striato: flore in eius cacumine copioso, senecioni simili, luteo, in pappos auolante. In Alpium riu, fontium scaturiginibus, & ad torrentium margines prouenit. Habet præterea Lobellius Tusilaginem montanæ minimam, quæ radicum & foliorum figura nihil, sed magnitudine tantum differt, estque illi facie proxima. Foliola habet in pediculis binum & ternum digitorum, Soldanellæ Alpina paria, similibusque lateribus, & pariter auersa, incana, tormentosa, & carnosa.

PETASITES.

CAP. XXXVII.

**G**RAECIS Πεσσίτης, & Latinè Petasites dicitur à Petaso, idest, Galero, quòd folium eius tam grande sit, vt capiti impositum à solis æstu Galeri vice possit defendere, Gallicè *Herbe aux tigneux*, Germanicè *Petilentz wurtz*, Italicè *Cappellazi*, Hispanicè *Sombrereta*. Hunc breuiter sic descripsit Dioscorides. Petasites pediculus est cubito maior, digiti magni crassitudine, in quo folium instar Galeri magnum, incumbens veluti fungus. Ex qua breui historia, insignem tamen notam continente, maior herbariorū pars à Matthiolo dissentiens, perspicuè effici existimat Petasiten esse cuius hīc pīctura datur.

*PETASITES Magnus. Per-*  
*peram Tusilago Maior. Matth.*



Hæc enim planta, inquit Pena, Vere crescit, & nondum foliis ortis caulem erigit tenerum, carnosum, concauum, sesquipalmum altum, floribus in summo densis, pusillis, multis, mucosis, racemosis, oleæ, in purpureum conum compactis, spectatu amœnum, nullo semine prægnantem, sed flore marcescente & defluente spem etiam seminis perdentem. Folia pediculo cubitali, crasso, carnosio, quasi appendamædio sui centro, penduli instar Perafi inuersi videntur, maximam personatam superantia, sed rotunda, subter parum incana, singulis singulis pediculis medio fermè totius puncto hærentia, vbi sinus definit profundus vsque ad folij centrum actus, quæ si prorsus clauseris, fungi penduli modo fulciri dixeris. Radix valde crassa, foris pulla, intus candida. Grauis est & prorsus ingrati odoris, gustanti perquam amara & ingrata: desiccatur item magnopere, quapropter morbis Epidemicis vtilissima habetur, & comperta medicis Germanis, etiamq; plebi, quæ eam ob dotem *Pestilentz wurtz*, idest, pestis radicem, appellat. Quæ facultas tanquam nota

certior, cum Thussilagini non insit (neque enim est odore graui, neque ingrato) Matthiolum à sententia deducere debuisset. Sunt aliæ eius rationes inualidæ, & leuiusculæ, quibus probare vult plantam hîc depictam Thussilaginem esse, nimirum quod proneniat in humectis & vliginosis locis, præsertim propè riuos aquarum perinde ac Tussilago, quod caulè edat ante folia in ipso Veris initio, in cacumine flores spicatos, ex purpura albicantes, qui cum caule paulò post flaccescentes contabescunt. Nam idem contingit trifolio hederaceo, croco siluestri, ephemero, & aliis. Petasites noster nascitur copiosissimè in pratis humidis, & iuxta riuulos sitis. Initio mensis Martij floribus suis ornata hæc herba conspicitur, qui Aprili imminente

Li. 4. c. 103.  
*Forma.*

*Locus.*



**Vires.** phagedænas & vlcera maligna efficaciter illinitur, auctore Dioscoride. Galenus addit esse ex tertio ordine desiccantium quamobrem ad maligna & phagedænica vlcera adhibent. **Fachf. cap. 248.** Experientia comprobatum est, vt diximus, eius radicem mirificè conferre pestilentibus febribus, quòd sudorem vehementer moueat, si in puluerem redacta cum vino fumatur. Radices complures cortice exutas & exenteratas aceto indunt, quoad viribus imbutum fuerit, & ex illo cum rutæ succo & theriaca propinant, præsidiumque nulli secundum affirmant. Magna efficacia bibitur, à mulieribus, quas tormina vteri & præfocationes vexant: valet etiam vnicè ad enecandos lumbricos. Succurrit quoque iis, qui spiritus difficultate laborant. Ducit vrinam & menses. Efficax est ad vulnera præhumida, & ad reliquas cutis fœditates. Est alter Petasites ab herbariis odoratus appellatus, in vmbrosis vallibus Alpium, ad torrentium ripas nascens, radice crassa, longa, nodosa, serpente, subrubra, acris & odorata, folio ampliore quàm tusilago, cætera propemodùm simili, cum teritur iucundū quippiam exhalante. Veris principio ante foliorum exortum thyrsus emicat digiti minimi crassitudine, ferè pedem altus, foliolis quibusdam myrto similibus, ex interuallis alarum modo ipsum amplexantibus: flore in vertice copioso, candido, & suauiter olente, ex longo vasculo prodeunte, in apices multos diuiso, tabescente & emoriente cum folia subnascuntur. Caulis & florum ante foliorum ortum effigies hîc picta est.

**PETASITAE** Odorati, flos.

**Locus.**  
**Forma.**



**PERSONATA.**

**CAP. XXXVIII.**

**Nomina**



**ARCEION** Græcis, *προσωπίον* & *προσωπῆς* dicitur, Latinis Arcium, Personata, & Personata, Apuleio Dardana, Officinis Bardana & Lappa maior, Germanis *Grosßkletten*, Italis *Lappola maggiore*, Gallis *Grand Gloutteron*, & *Gletteron*, *Grande Bardane*. Galenus non arcium, sed alterū

**Li 6 simpl.**  
**Pena in**  
**Aduers.**

arction vocat. Vtroque nomine dicta planta, propter similitudinem quam cum villosis hirtisq; vrforum capitibus conglomerata echinataq; Lappæ habent. Personata autem, quòd hac quòdam ad personas utebantur, quoties in theatris aliisq; locis, qui cognosci à populo nollent egisse quidpiam volebant. Est enim foliorum

**In cap. 102.**  
**lib. 4.**

**Genera.**


**Forma.**

**Li. 4. c. 102.**

**Lib. 25. c. 9.**

eius tanta anplitudo, vt tota humana facies iis tegi possit. Matthiolus duo obseruauit Personatæ genera, echinatorum tantum capitum facie differentia: quæ in altero maiora, duriora, rigidioribus asperioribusq; aculeis armata: in altero minora, molliora, mitioribus aculeis rigidiuscula, alba quadam lanugine obductis. Prius genus scribit Dioscorides folia habere cucurbitæ, maiora tamen, hirsuta, nigriora & crispiora: caulem albicantem: quamquam interdum sine caule reperitur, radice intus candida, foris nigra. Plinius, Quidam arcion, inquit, Personatam vocant, cuius folio nullum est latius, grandes lappas ferentem. Ex quibus nemo non intelligit Personatam esse eam, quam Bardanam & lappam maiorem vulgus vocat, quæ folio constat maximo, cucurbitæ æmulo, altera parte albicante, altera in viridi nigricante:



*PERSONATA, Sive Lappa  
maior, Matthioli.**PERSONATA, Seu Lappa  
maior altera, Matth.*

potui datus, omne morsus serpentium misce sanatur: eiusdem foliis cinges febri-  
citantem, & statim febrem mitigat, & calorem sanat. Vulnus etiam, si cancer erit,  
cum aqua decoctionis foliorum eius foueto: deinde ipsam cum nitro & axungia cum  
aceto tere, & in panno inducito, & imposito. Ad canum rabidorum morsus radix  
cum

nigricante: caule rotundo, cauo, in purpureo  
albicante, ex lateribus ramulos multos emitten-  
te, in quibus folia parua, grandibus lappis siue  
echinis pratereruntium vestes & canes mordaci  
hasu corripientibus, tandem dehiscitibus, &  
florem purpureum edentibus, hirsutum: radice  
grandi, carnosa, foris nigra, intus candida, ama-  
ra. Alteram Personatam Matthiolus eam esse  
credit, quam Plinius Persolatam vocat, his ver-  
bis: Persolata quam nemo ignorat, Græci Ar-  
cion vocant, folia habet maiora etiam cucurbi-  
tis, & hirsutiora, nigriora, & crassiora: radicem  
albam & grandem. Ex quibus colligit Matthio-  
lus Plinium hic secundum Personatæ genus de-  
scripsisse: quod, cum de priore Personata scrip-  
set eodem capite & libro (quem locum citavi-  
mus) cuius folio nullum est amplius, grandes  
Lappas ferente, aliquantulum post de altera Perso-  
nata scribat, quæ minores Lappas fert, & Perso-  
latam vocat. Cornarius tamen censet postero-  
re Plinij loco vulgata exemplaria falso Persola-  
ta habere pro Personata. Vt cumq; sit Plinius  
Persolatam, ut sæpe facit, cum Personata sua aut  
Dioscoridis, confudisse videtur, id quod descri-  
ptiones dilucidè ostendunt. Caterum Persolata  
à magnitudine: & usu foliorum, quemadmo-  
dum Personata & Petasites, nomen accepisse  
videtur, quia galeri vice folis astitum à capite ar-  
ceret. Quare hæc plantæ inter sese similes serie  
coniungendæ fuerunt. Sed ad Personatam no-  
stram reuertamur. Ea secus vias & pomeria, in  
marginibus agrorum incultorum & pratorum,  
& scrobibus exsiccatis progenit. Iulio & Augu-  
sto Lappas & flores fert. Pondere drachmæ  
vnius pota, inquit Dioscorides, cum pineis nu-  
cibus, puralenta & cruenta extusientibus auxi-  
liatur. Folia trita dolores à contorsionibus ar-  
tuum contractos, illitu sedant: vtiliter antiquis  
vulneribus illinuntur. Quare de re sic Galenus:  
Alterum arction quod prosopida vocant, cuiusq;  
folia cucurbitæ simillima sunt, nisi quod  
tum maiora, tum duriora, discutit simul, & de-  
ficcat, sed & adstringit mediocriter: quamobrem  
folia eius veteribus vulneribus mederi possunt.  
Apuleius multo plura & maiora de eadem tra-  
dit. Personatæ herbæ succus cum vino vetere

Ibidem.  
Lib. 25. c. 9.

Embl. 91.  
lib. 4.

Locus.

Vires.  
Lib. 4. c. 101.

Lib. 6. simpl.

Lib. de vi-  
rib. herb.



cum modico sale trita imponitur morſui, & ſtatim ager liberabitur. Succus foliorum eius cum melle potui datus, vrinam prouocat, & veſicæ dolorem tollit: puluis ſeminis eius cum vino optimo 40. dies potui datus, iſchiadicos mirabiliter ſanatur. Folia trita cum albumine oui & impoſita, ambuſta mirificè curant. Columella. Venena viperæ depellit ſuper ſcarificationem ferrofactam herba, quam vocant Perſonatam, trita & cum ſale impoſita. Plus etiam eiufdem radix contuſa prodeſt. Radix conditur ſaccharo, & cum grata, tum vtiliſſima ad calculū & dyſenteriam habetur: Venerē etiam excitat. Idem ſemen pollet, ſed multò efficacius calculoſis.

Lib. 6. c. 17.

Pet. Pen. in  
Ad.

## XANTHIUM.

## CAP. XXXIX.

Nomina



ΑΝΘΙΟΝ vel φάργανον vel φαργάνιον Græcè, Latinè Xanthium, Officinis Lappa minor, Lappa inuerſa, Bardana minor, quibuſdam Strumaria: unde Aetius Chæradolethron, ideſt, Struminecem nominari ſcribit, & Philanthropon. Galli vocant *Petit Gloutteron*. Itali *Lappola minore*, Germani *Bertiersluſz*, ideſt, mendicorum pediculos, & *Spitzkletten*, Gallicè *Gloutteron aigu*. Xanthium autem à colore dicitur, quòd χαυθὰς *reixas*, ideſt,

## XANTHIUM, Matth.

Lib. 4. c. 133.

Forma.



Locus.

Li. 4. ca. 133.

Vires.

Li. 8. ſimpl.

Pet. Pen. in  
Ad.

quòd flauos faciat capillos. Xanthium deſcribit Dioſcorides caule eſſe cubitali, anguloſo, pingui, prodeuntibus ex eo alis multis: foliis Atriplicis, infectis, naſturtium odore imitantibus: fructu grandis oliuæ modo, rotundo, & vt platanipilula ſpiñoſo, qui contactu veſtibus adheſceſcit. Ex qua quidem deliniatione facile eſt intelligere Lappam minorem omnibus ferè æquè notam quàm eſt Lappa maior, ſed non tam frequentem, Xanthium eſſe. Folia habet atriplicis, crenata, quadatenus cinerea, naſturtium olentia: caulem ſeſquipedalem, anguloſum, pinguem, nigris notis conſperſum, crebras fundentem alas: fructum echinatū lappoſumq; oliuæ aut corni modo oblongum, contactu veſtes apprehendentem: radix non profunda, fibrata rubeſcit. Naſcitur læto & pingui ſolo & lacubus exſiccatis. Fructus ante collectus quā perfectè ſicceſcat, inquit Dioſcorides, tunditur & fictili vaſe reconditur. Flauos facit capillos, ſi acetabuli inſtar repida aqua madeſcat, mox caput, nitro antè perfrictum, illinatur. Alij in vino tundunt, & ita aſſeruant. Semen aptiſſimè tumoribus imponitur. Galenus breuiter dixit Xanthium phaſganium etiam vocari: fructum diſcutiendi vim habere. Aetius, decoctum corticis radicis, inquit, potum lienes conſumit: dentes motos firmat eiufdem decoctum ex vino collutum. Radix & ſemen laudantur ad tumorum ſtrumarumq; pertinaciam delendam frequenti admotu.

## PLANTAGO AQUATICA.

## CAP. XL.

Nomina

Dodo. lib.  
plant. aqu.

OSTRÆ ætatis herbarij plantam hanc plantaginem aquaticam nominarūt, Gallicè *Plantain d'eau*, Italicè *Piantagine aquatica*, Germanicè *Unaffer vnegrich*. Folia habet in prælongis, craſſis pediculis longa, lata, in mucronem deſinentia, Plantaginis maioris foliis longiora, & acuminatiora. Caules inter ea exeunt longi, triangulares, intus fungoſi, in plures ramulos



## PLANTAGO Aquatica.



ramulos diuisi, in quibus flores candidi parui, tribus constantes foliolis: fructus deinde parui, triangulares, virentes: radices subsunt fibratae. Nascitur in humilioribus & aquaticis locis, in fossis, in lacuum & riuiolorum marginibus. Iulio & Augusto mensibus floret. Facultatis aiunt frigida esse ac sicca. Sunt periti herbarij qui affirmant plantaginem istam aquaticam verum esse Dioscoridis Damasonium seu Alisma: eiq; Damasonij delineationem virisq; prorsus conuenire. At cum Galenus qui legisset radices eius acres esse, eoq; oedemata discutere, non nihil Dioscoridi aduersetur, in ceteris autem assentiat, sic illi de radice verum esse experimento & ipsi asserunt.

Locus.

Vires.

Lib. 3. cap. 1.

## DAMASONIVM. CAP. XLI.

**D**AMASONIVM. Vm Matthiolus reiecit aliorum sententiis plantaginem aquaticam Dioscoridis Alisma aut Damasonium non esse sese probasse putasset, aliud substituit, sed id depinxit tantum, non

descripsit. Sunt qui aliam Damasonij speciem exhibent, quae radicularum fibris multis nititur candidis, breuibus: cauliculos multos edit dodrantaes, laues, nudos, nodosos: folia Damasonio seu plantagini aquatica similia, sed parua, longis pediculis appensa, fructum stellae figura, sex rigidis pungentibusq; cuspidibus radiatum,

Forma.

## DAMASONIVM, seu Alisma, Matthioli.



speciosa elegantiq; structura. Vnde stellatum cognominat. Humidis & aquosis locis gaudet. Idem prorsus est Alisma pusillum angustifolium muricatum Lobellij, seu Plantago aquatica minor, minutis quinqueneruiis plantaginis angustioribus foliolis, deorsum versus reflexis: cauliculo gracili, sesquipalmari, e fibrosa radice sparsa speciosa coma, referta numerosis, muricatis, exilibus capitulis tribuli ritu. Item aliud Damasonium Alpinum Montanum herbarij vocant, quidam Clymenum, folio plantaginis minoris, folliculis iridi similibus, fructu oblongo, cirris polyporum non dissimili. Sed cur Damasonij nomen huic plantae indiderint, nescio. Quare liberum cuiq; fuerit aut id retinere, aut aliud verius sufficere. Ceterum radice est nigra, modice fibrata, altius descendente: foliis oblongis, angustis, neruosis, lanceolatae siue plantagini minori similibus, aliquanto longioribus: acuminatis: caulibus pedalibus: flore luteo: seminibus oblongis, angulosis, quaternis simul sic coniunctis, ut hiantes medio spatio fenestrata quaedam meta appareat, apice nigro supereminente, eleganti sane figura, laterum quae nondum cornu

Locus





chartháve obducta est clausaq; simili, & huic plantæ peculiari. In Alpium umbrosis conuallibus gignitur.

## LYSIMACHIA,

## CAP. XLII.

**Nomina**  
Lias. ca. 7.

Ibidem.

Lib. 4. ca. 3.  
**Forma.**

**Locus.**

Dod. lib. 1.  
cap. 50.

**Q**UAE GRÆCÈ λυσιμάχιον & λυσιμάχιος dicitur, Latine etiam *Lyfimachia* à *Lyfimacho* rege inuentore, teste *Plinio*: vel à pugna dirimenda: id enim est λῦει τὴν μάχην, idest, certamen dirimere. Est enim ea plantæ vis, ut etiam belluarum animos feroces, & mutuos hostiles congressus placare possit: ita scribente, atque breuiter eam describente *Plinio*. Inuenit *Lyfimachus* herbam *Lyfimachiam*, quæ ab eo nomen retinet, celebrata *Erasistrato*. Folia habet salicis viridia, florem purpureum: fruticosa est ramulis erectis, odore graui: gignitur in aquosis. Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita asperitatem cohibeat. *Dioscorides* paulò fusiùs eam descripsit. *Lyfimachia*, inquit, quam aliqui *Lytron* appellant, caules emittit cubitales, altioresve, fruticosos, tenues, circa quorum genicula enascuntur folia similia foliis salicis, gustu adstringentia: flos est fuluus aut auricolor. Nascitur in palustribus locis & circa aquas. *Matthioli* veram esse *Lyfimachiam*, quæ hîc picta est, asserit. Aliam quorundam *Lyfimachiam*, quæ quadrato exit caule, foliis salicis, flore in purpura rubescente, etsi *Lyfimachiam* *Dioscoridis* non referat, tamen *Lyfimachiam* alteram appellat. *Dodonæus* *Lyfimachiam* notissimam vsuq; frequentiore veram *Lyfimachiam* esse putat, quæ vulgò *Salicaria* nominatur à salicis foliis, Gallicè *Cornicelle*, *Soussi d'eau*, *Perceboffe*, *Pelleboffe*, idest, Pestifuga, Germanicè *Geelweidrich*. Eadem est quæ *Matthioli* *Lyfimachia* prima. Huic caulis est cubitalis, interdum bicubitalis, parû angulosus, geniculatus: folia longiuscula & angusta, frondis saligneæ aut perficariæ, pallentia, minimè crenata, terna quaternave sibi ex aduerso circa caulem sita: flores in ramulis elegantes, lutei, inodori, multi & conferti: semen rotundum coriandri: radix longa, gracilis, latius sparsa, quæ teneram edit sobolem purpurascenscentium



LYSIMACHIA, Matth.

LYSIMACHIA Altera, Matth.



scientium initio turionum. Locis vdis & marginibus fossarum ripisque riulorum  
prouenit: facultate est frigida, sicca, adstringente. Officinæ multū ad gargarismata  
& parulides, exesalq; oris inflammationes vsurpant. Herbariorum sedulitas alias  
Lysimachia species adinuenit. Lysimachiam purpuream priorem, suprà indica-

## LYSIMACHIA

Purpurea, I. Dodon.



ram à Matthiolo, & secundo loco pictam specie à  
lutea diuersam à Plinio memoratam, quippe qui  
flore purpureo & odore graui eas discreuisse vide-  
tur. Caules edit geniculatos subpurpureo, quadra-  
tos, folia lutea similia, aut salicis angustifolia, ex in-  
teruallo bina, subpurpurea: flores spicatos, purpu-  
reos, palmum & sesquipalmum longos: semen in  
paruulis capitulis veluti coronis prouenit, vnde flo-  
res sunt dilapsi. Radix maior est quàm lutea, simi-  
liter turiones quotannis teneros edens, lignosa, ni-  
gricans, non tamen odore terro. Quamquam non  
magnirefert, sit ne hæc Plinij an Dioscoridis Lysimachia. Tamē Plinius videri potest non aliam quā  
Dioscoridis Lysimachia explicasse, sed *ωύρρον*, florē  
purpureū vertisse, aut *ωβρρουν* legisse, & graui odo-  
re esse dixisse, quod quando adoletur verū esse Dio-  
scorides asserit. Lysimachiū est purpureū alterum  
Dodonæi. Aliud est Lysimachium purpureum sili-  
quatum, vulgatum, à siliquato fructu præcoci, qui  
auctū & incremento florum eruptioni anteuertit,  
quasi proles parente prior, filius ante patrem ideo  
vocatata. Caulibus & foliis lutea similis est, nisi  
quod ea angustiora & leuiter crenata sunt. Flores  
promit quaternis foliolis constantes, purpureos,

Lib. 25. c. 7.

Dod. lib. 1.  
cap. 10.Dod. ibid.  
Pet. Pen. in  
Ad.



*LYSIMACHIA Siliquosa*  
*alia, Lobellij.*

Lib. 3. c. 49.

patulos, geranij columbini, aut vulgaris malue filuestris: sub quibus nascuntur, antequam flos aperiatur, siliquula, siue cornicula rotunda, exilia, longiuscula, quæ semine valde minuto maturo in tres quatuorve particulas fissa, vna cum papposis inuolucris perduntur. Radix est gracilis, fibrata. Non aliis hæc natalibus quam alia prouenit. Huius varietas duplex obseruatur. Frequentior est omnino folio, siliqua, caule iisdem, sed magnitudine inferior, & tenera adeo, vt vix siliquam floremq; sustinere queat: flos propius caryophylleam Tunicam dictam, paulo minor. Altera varietas cernitur in floribus pallidioribus, quadripartitis, angustioribus foliis decussatim sitis, in pari siliqua: cetera similia sunt. Hæc sic expressit Lobellius, & esse ait Chamænerion Gesneri, Delphinium buccinum Dioscoridis. Herbarij quidam, inquit Ruellius, putant Delphinium esse, quam filium ante patrem diximus appellari, quod siliquam & intus semen ante floris exitum ostendat: rectius si partus ante conceptum ab eis appellaretur. Est & Lysimachia cerulea quibuldam

Veronica recta, aut maior, filio ante patrem non absimilis caule & folio, sed longiore, crassiore, & tota minor, ramulos habet in summo spicatos floribus ceruleis, lauandula longioribus, multos, exiguos & rotundos folliculos, in quibus minutum semen. Exigua & fibrata nititur radice. Rarior hæc est, & in hortis ab herbarijs

*LYSIMACHIA*  
*Cerulea.**LYSIMACHIA*  
*Galericulata, Lobellij.*

colitur



colitur. Iunio & Iulio mensibus florent, Augusto semen maturefcit. Huic adiungit Lobellius *Lyfimachiam* aliâ *Galericulatam*, quæ riuulorum & fluminum ripas, & depressos agrorum margines Londinensis & Antuerpiani agri sectatur. Multos emittit quadratos, sesquipedales & bicubitales geniculatos pediculos, in quibus folia *Lyfimachiae* purpureæ similia, scordij æmulatione ex atro virentia, ex geniculis gemina, è quibus instar *Galericuli* flores ex caruleo punicantes. Radice variè diuaticata repit, vt à nullo hætenus descripta aut picta, sic vsu neglecta aut incognita. Hæc Lobellius. Purpureæ & caruleæ *Lyfimachiae* vsus adhuc incognitus. Sed *Lyfimachiae* *Dioscoridis* foliorum succus adstringente sua vi sanguinis reiectionem supprimit: disentericis potui datur, aut infunditur: fluxû muliebrem sistit in pello: sanguinis profluvio subuenit, si herba nares obturentur. Vulneraria est, & sanguinem cohibet. Acerrimum nidorem suffita reddit, qua de causâ serpentes fugat, & muscos interficit. Plinius diuersis locis eòdem *Lyfimachiae* vsus tradidit. *Lyfimachiae* odorem angues fugiunt. Et, Si ore sanguis reiiciatur, siue è naribus, siue aluo fluat, siue sceminarum vtero, *Lyfimachia* pota, vel illita, vel naribus indita. Rursus, *Lyfimachia* recentibus plagis medetur. Et rursus, Capillum *Lyfimachia* flauum facit. Galenus de eiusdem viribus ita disserit. *Lyfimachios* superantem habet qualitatem adstrictoriam, per quam & vulnera glutinat, erumpe, tèmque è naribus sanguinem, emplastri modo illita cõpescit: quin & reliquas sanguinis eruptiones sistere potest cum ipsa, tum eius succus multò magis. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones ac muliebri profluvium sanat.

Vires.


Lib. 25. c. 8.  
Li. 26. c. 12.Ibid. ca. 14  
Li. 25. c. 15.  
Li. 7. ampl.

## STRATIOTES AQUATICVS,

## CAP. XLIII.

**V** IDETUR hæc potiùs quàm Matthioli planta esse *στρατιώτης ἐνυδρος*, *Nomina* siue *ὁ ἐπὶ τῶν ὑδάτων φυόμενος*, quem & *πολύφυλλον* nuncupant. Nam reperitur in stagnantium aquarum lacubus & fossis, vel pigrè fluentibus aquis, maxima foliorum parte vnâ cum floribus aquas superante, *Locus.* reliquis ipsius stirpis partibus sub aquis conditis, vnde cognomentum inditum.

## STRATIOTES Aquaticus.



Lobellio & Penæ *Stratiotes*, siue *Militaris Aizoides*, *Sedum* aquatile de frum. dicitur. Folia habet *Aizoo* maiori similia, sed maiora multò, mucronata, angusta, per ambitum duiis quibusdam & breuibis aculeis spinosa, lanceolata plantaginis, longioribus, siue aloës herba, sed breuioribus & minoribus. Ex quorum medio & ad latera pediculis non longis insident flores ternûm foliorum, candidi, quadamtenus ranunculi albi, medio lutei, & pilis hirsuti, ex vagina siue forcipula canceri marini trifida emergentes. Subest pro radice breuissimum, vt ita dicam, caput, foliorum sessilis & latior basis, infernè valde gracilis & tenera. Inde fibræ longæ, tenues, candidæ, lyrarum fidibus, siue longis lumbricis per similes demittuntur, aquæ fundum petentes, quæ si radices non sunt, sine radice viuunt. Has fibras scelerati agyræ in aquæ plena phiala, quo maiores appareant, mulierculis ostentatas impudente mentuntur vermes esse, quos medicamentis suis ex intestinis eduxerint, teste Dodon. Facultatem

Dodon. l. b.  
i. c. 99 & in  
plant. aqu.

Lib. ii. c. 99



*Vires.* vulnerariam habet refrigerandi & siccandi. Quæ omnia Dioscoridis historia  
 Lib. 4. c. 99. consentiunt. Stratiotes in aquis nascens, inquit, iisdem supernarat, vnde cogno-  
 mentum traxit, & sine radice viuit. Herba semperuiuo similis, ni maiora haberet  
 folia, quæ refrigerant, sanguinem qui defluit à renibus pota sistunt, vulnera quæ  
 inflammationem minantur intumescere non sinunt: ignibus sacris, & tumoribus  
 Li. 4. c. 98. illinuntur. Eadem Plinius tradit. Sed eam in Ægypto tantum nasci, quod non  
 credendum, cum Dioscorides indefinitè dicat aquis innatare. Celebratur, inquit,  
 & à Græcis Stratiotes, sed ea in Ægypto tantum, & inundatione Nili nascitur,  
 Aizoo similis, ni maiora haberet folia. Refrigerat mirè, & vulnera sanat ex aceto  
 illita. Item ignes sacros ac suppurationes. Sanguinem quoque qui defluit à reni-  
 Li. 8. simpl. bus, pota cum thure masculo mirificè sistit. Stratiotes aquaticus, inquit Galenus,  
 humida & frigida facultate est, terrestris verò nonnihil habet adstrictionis:  
 proinde sanè & vulnera glutinare potest, & vlcibus esse utilis. Sunt qui eo & ad  
 sanguinis eruptiones vtuntur, & ad fistulas.

## NUMMULARIA. CAP. XLIIII.

*Nomina*

**N**ummularia, hic herbe, vt aliis multis, nomina ab herbariis imposita, quibus ho-  
 die quoque vulgò appellantur, immutenda non censeo. Dicta est  
 Nummularia, à foliorum circinnata rotunditate, nummi speciem re-  
 ferente, Gallicè *Monnoyer*. Centimorbia, à mirifica vi & facultate,  
*Herb. à cent maladies.* Hirudinaria, quod passim terræ hirudinis instar affixa sit.  
 Serpentaria, quia compertum sit serpentes hac herba, si vulnerentur, sibi mederi.  
 Germanicè *Egelkraut*, aut *Pfer nigkraut*. Quidā à Plinio, cap. 28. lib. 28. Nummulum vo-  
 catam putant, falsoq; in nostris exemplaribus pro Nummulo legi Mimmulū. Cauli-

*Forma.*

## NUMMULARIA.

*Locus.**Tempus.**Vires.*

Lib. 9. hist.  
 cap. 14.

tur esse. Το δὲ ἐρεϋθηδανον, inquit, καὶ φύλλον ὁμοιον κριθῶ πλὴν τροχιδέτερον  
 φύεται δὲ ἐπὶ γῆς ὡς ἀγρωσις. φιλὰς δὲ καὶ τὰ παλίσκια χωρεῖα. Ereutheda-  
 num folium habet hederæ simile, sed rotundius, repit humi graminis modo,  
 umbrosus



umbrosis locis gaudet. Sed vires haud conveniunt. ἔργον δὲ, διὸ καὶ χρῆται  
 πρὸς τὰ τῆς ὀφρύος ἀλγήματα, καὶ πρὸς τὰ τῆς ἰχθύος. Cit vrinam, qua de causa ad  
 lumborum & coxendicis dolores viuntur.

## EUPATORIVM VVLGARE,

## CAP. XLV.

**S**VNT permulti, imò omnes ferè pharmacopœi, qui agrimonie siue  
 vero Dioscoridis Eupatorio, hanc plâtam substituunt, quod nonnul-  
 li non rei ignorance faciunt, sed maiorum virum obseruatione, &  
 experientia ducti, quas etiam ipsa aspectu insignis planta, foliorum  
 amaritudine & odoris præstantia, satis præ se fert. Igitur propter amicas hepatis

EUPATORIVM,  
Vulgar.

vires, fortè & ob folia Eupatorium vocauerunt, verius pseudoeupatorium dicendum, alij Eupatorium aquaticum, alij canabinam aquaticam, alij Eupatorium Auicennæ. Ruellius, quod supra nos declarauimus, hydropiper esse, haud rectè asseruit. Pseudoeupatorium rotundo, subpurpureo caule, intus medulla alba referto exit, duos interdum tres cubitos æquante, aliquantum hirsuto: foliis longis, nigricantibus, asperis, parùm hirsutis, crenatis, ad canabina ortu & situ adeò accedentibus, vt permulti Eupatorium Auicennæ canabinis foliis præditum esse credant, amaris. In summo flores emergunt permulti, congesti, villosi, in purpura albicantes, qui flaccescentes orto semine, papposi in auras abeunt, radix latè fibras spargit, amari gustus, odoris non minùs suauis quàm betonica vel agrimonia. Locis vliginosis, scrobium marginibus, & in riualis tardius fluentibus provenit. Pseudoeupatorium calido siccoque est temperamento: calfacit, tenuat, abstergit, incidit, aperit. Ex recentibus foliis contusis succus exprimitur, & insolatus cogitur in pastillos, quorum frequens in medicamentis vsus. Confert maximè eiusdem decoctum, aut epotus succus iocinoris doloribus, & aliis eiusdem affectibus ab obstructione ortis. Quare vtiliter propinatur hydropicis, cachexia, ictero, vasorum infarctu, splenis tumoribus, & obstructionibus vexatis. Datur quoque succus ad ventriculi apostemata à frigidityte nata, quibus etiam prodest herba exterius illita. Foliorum decoctum auxiliatur diuturnis, præsertim pituitosis febribus ab obstructione provenientibus. Idem vrinam & menses pellit: scabiem pruritumque sanat cum fumaria decoctum ex caprino fero: sed succus validior est, qui potus elephantiasin incipienti medetur. Flores illiti vulnera recentia & vlcera sanant. Fugantur venenata animalia herbe sicce suffitu. Aiunt à venatoribus obseruatum esse ceruos telis vulneratos hac planta proculdubio sanari. Datur eadem vtiliter pecoribus tussientibus, & anhelosis equis, quorum etiam dolores finit. Succus binum obolorum pondere in catapotiiis deuoratus intestinorum vermes necat. Idem recens expressus illinitur commodè ex aceto & sale aduersus scabiem.

Nomina

Li. 2. c. 244.  
Dod. lib. 1.  
cap. 39.

Locus.

Temper.

Vires.



## POTENTILLA, CAP. XLVI.

Nomina



SEVDOEVPATORIO seu potius Agrimonix adeò hæc affinis est, vt vulgus siluestrem agrimoniam vocet. Potentillæ huic nomen ab eximiis viribus quibus pollet, argentinæ verò à foliorum argenteo splendore. Galli *Argentine*, Germani *Genferich* vocant, id est, Anferinam quòd hac herba anferes delectentur in cibo. Quidam Stephano melidem

## POTENTILLA.

Forma.

Dod. lib. 1.  
cap. 58.  
Pena in  
Ad.  
Marth. in  
cap. 37. lib.  
Diosco.

Locus.

Tempus.  
& Vires.



Plinij esse coniectantur, cap. 13. lib. 26. vtilem ex aqua sanguini fluëti per nares, sic dictam quòd coronis melinus eius flos innectatur. Potentilla viticulorum reptatù ab agrimonia discernitur, fragariæ & pentaphyllo assimilatur: teneriora hæc sunt, graciliâque in quibus folia longa, incisa & crenata, agrimonix simillima, superne virentia, aversa parte argenteo nitore splendentia, vnde argentinæ nomen. Flores in singulis pediculis pentaphylli similes, lutei: radix fibrata, exterius purpurascens, inferius candicans. Nascitur locis vliginosis & propè semitas, quarum vdarum nulla amantior, frequentiorque alumna. Iunio & Iulio mensibus floret. Adstrictoria & exsiccatoria vi pollet, quare mulierum profluuia, dysenterias, & cæteras alui fluxiones cohibet. Id quod præstare dicitur, si recens in calceis nudis pedibus subponatur. Datur vtiliter potui sanguinem reiicientibus. Herbarum decoctum ex yino ad intestinorum tormina, & dorsi dolores potu facit. Siccæ farina ex sua ipsius stillatitia aqua pota albas vteri fluxiones sistit, sed valentiùs addito corallo & eboris ramentis. Sunt qui ad enterocelas præferunt tum in cibis, tum in potionibus. Etenim vulnera glutinat, & vlcera sanat, præsertim pudendorum, & quæ oris partes erodunt, firmat commotos dentes, & laxas gingiuas, si in aceto decoquatur, & os sæpè colluatur. Dentium dolores mulcet, prolapsam columellam restituit addito aluminis momento. Mirum quòd plantis pedum, manuùmque volis admota, febrium quarumcunque calores remittit, ad frangendum calculum efficax est, multumque sanguinem grumosum potu dissoluit.

## MARRUBIVM AQUATICVM, CAP. XLVII.

Nomina



MARRUBII potius species aut Verbenæ hæc planta fuerit, quàm fide ritis prima, vt existimat Matthiolus, cui huius natales, folia maiora, caules cubitales, nec asperi, multaque alia refragantur. Vulgo igitur Marrubium pallustre siue aquaticum vocarunt, Gallicè *Marrube d'eau*, Germanicè *Vuasserandorn*. Quidam Rhodoram Gallicam Plinij esse volunt, cap. 19. 24. iuxta Rumbotinum viduam vite nascentem, caule geniculato, virgæ ficulneæ modo, foliis vrticæ in medio exalbidis, quæ procedente tempore tota rubent, flore argenteo, præcipuam contra tumores, feruores, collectiones cum axungia veteri tusam, ita vt ferro non attingatur, & qui perunctus est despuat ad suam dexteram ter, efficaciori quoque, vt aiunt, remedio, si tres quoque trium nationum

In cap. 29.  
lib. 4.

Trag. lib. 1.  
cap. 2.  
Dod. lib. 2.  
cap. 69.



## MARRUBIVM

Aquaticum.



nationum homines perungant dextrorsus. Plāta hac Marrubio nigro tam caulibus & folliculis asperis, quā foliis & floribus satis similis est. Folia quidem ex fusco viridia sunt, sed maiora profundius incisa, non admodum hirsuta, propè complicata, instar foliorum betulae recens erumpentium: flores albi & minores Marrubiorum floribus, caulē ambientes sicut in melissa. Iuxta scrobes & riuulos nascitur, locisque aliis vlginosis. Siccandi facultate sine manifesto calore præditum esse aiunt, nondum tamen in vsum medicum receptum.

Locus.

## SCABIOSA. CAP. XLVIII.



ON SINE causa herbarij plantis multis similibus facie & viribus, scabiosæ nomen indiderunt. Sed nunc de ea agimus, cuius frequentior est vñus: eius enim Græcum nomen adhuc ignoratur quamquam non desint qui Aetij Ploram esse putent. Sed cū nusquam extet

Nomina

apud eum, aut alios auctores eius descriptio, sed nomen tantum, nihil certi hac de re statui potest. Quidam Mañon Plinij esse coniectantur in facie tineas auferentem. Dicta autem est scabiosa à scabro herbæ habitu, vel quòd scabiei medeatur, vnde etiam pforæ nomen traxisse videri potest. Gallicè *Scabieuse*, Germanicè *Apostelenkraut*. Matthiolus duas habet species, maiorem, & minorem. Maior primū folia profert longa, non laciniata: quæ verò his succedunt, plu minoris modo dissecta cernuntur, quæ verò in caule & ramis, minora & magis laciniata. Caules habet æstate sesquicubitales, teretes, striatos, incanos, circa cacumen in ramos diuisos in quorum fastigiis capitula oriuntur in acutum desinētia, compartiti squamarum ordine contexta cyani ritu, è quibus flores prodeunt ferè etiam similes, sed rufescentes: sequitur semen paruum, subnigrum, lychnidis coronariæ simile. Radix est pollicari crassitudine, brachiata, sapore subdulci. Nascitur inter fruges, & in agris incultis, argilloso præsertim solo. Annotat Pena non esse hanc vulgarem Scabiosam, sed Iaceam nigram, maiorem, laciniatam. Minor folia circa radicem fundit in ambitu laciniata, in terram repanda & recumbentia, subalbicantia, siue cinerea, subhirsuta, in caule frequentioribus, tenuioribusque incisuris crenata. Caulem mittit rectum, tenuem, subhirsutum, in quo ramuli. Flores habet foliosos, congestos, cyani purpuram imitantes, siue carulei coloris, qui tandem deflorescentes capitulum relinquunt subuiride, rotundis ocellis refertum, colore pauonum caudas imitante, magno sanè naturæ artificio, & magna contemplantium admiratione: Radix est palmaris, fibrata, subcādicans. In pratis humidis potissimū & herbidis locis degit. Iunio & Iulio mensibus floret. Vtraque excalfacit, siccatur, extenuatur, abstergit. Quare ad expurgandos pulmones & pectus à crassis & pituitosis excrementis, multum præstāt, cū herba ipsa in puluere pota, tum succus cū melle delinctus, tum eius decoctū diebus aliquot haustum. Valet quoque mirum in modum aduersus scabiē, non modò eius decocto quotidie potui dato, sed & herbæ ipsius succo per se, aut vnguentis addito ad scabiosæ corpora illinenda. Prodest omnibus pectoris vitiis,

Forma.

Locus.

Vires.



SCABIOSA *Matthioli*,  
*Maior.*SCABIOSA *Matthioli*,  
*Minor.*

ris vitiis, & respirationi inferuentibus organis: quippe quæ & eorum purulentas inflammationes disiciat, & omnia pectoris vitia expurget. Anthracibus siue carbunculis pestiferis vtiliter illinitur, adeò vt illita has letales abscessus trium horarum spatio prorsus abolere existimetur. Datur vtiliter eiusdem succus quatuor vnciarum pondere cum theriacæ drachma, pestilentia affectis prima statim die, verùm sudorem in lecto prouocare oportet, & iterum atque iterum medicamentum repetere. Idem plurimùm confert ad serpentum morsus, quemadmodùm herba ipsa contusa recensque imposita. Illitus succus cum chrysocolle puluere & caphuræ momento, lentigines, alphas, impetigines, varos, & cætera cutis vitia abstergit: oculorum albugines tollit. Peculiariter valent huius maioris scabiosæ radices ad lichenas, etiam si à Neapolitano morbo prouenerint. Earum enim decoctum quadraginta diebus potum præstantissimum expertissimùmque est ad id mali medicamentum. Idem præstat earundem radicum puluis quotidie drachmę pondere ex fero haustus.

## SVCCISA.

## CAP. XLIX.

## Nomina



## Forma.

Penain  
Ad.  
Matth.in  
cap. 174.  
lib. 2.  
Dodo. lib.  
cap. 72.

**Q**uo nomine veteres aut posteriores Græci plantam hanc nuncuparint, & an eam cognouerint, nondum nobis compertum est. Latino & conueniente huic herbæ nomine, quidam Succisam vocant, quòd eius radices circumrosæ sint. Vulgus Morsum diaboli vocat. Galli *Mors de diable*, Germani *Teuffells abbisz*, nomine ex superstitione indito, quasi verò Cacodæmon quidam tantæ efficacæ radicem inuideat hominibus, atque ob id vbi succreuerit, statim eam dentibus succidat atque circumrodât. Ex scabiosis videtur esse, caulibus rotundis, cubitalibus, aliquando bicubitalibus: foliis scabiosæ vulgaris, sed rigidioribus, nigrioribus, hirsutioribus in imo caule, in summo autem aliquantum serratis, non altius incisus vt scabiosæ: floribus item scabiosæ, sed purpura



## MORSVS, Diaboli.



purpura fusca, tristiore aspectu: semine in auras abeunte: radice nigra, dura, breui, spissa, multas crassas fibras spargente, quare praecisa apparet qua crassiores fibrae plures coeunt, quasi praemorsa foret à quopiam cacodamone, vnde ei morsus diaboli nomen, quamquam alij malunt sic dictam herbam à caustica vi, qua mordicat bubones & carbunculos pestilentes, quibus magno leuamento admouetur ea viridis cruda, tritaque, aut vinum in quo decocta fuerit epotum. Radix per se estur, aut eius decocti vinum vtiliter bibitur non modo ad vteri dolores, sed etiam ad pestilentem auram arcendam. Gustu admodum amara est, ex quo perspicuum est calidam esse siccamque facultatis scabiosae modo. Siccatae puluerem praebent plerique ad alui tineas necandas, ac eadem sugillata illitu emendant. Locis incultis provenit, saltibus, dumetis, ac etiam in pratis & viis quibulliber. Augusto potissimum mense florer, tum notior, alias scabiosae tam similis, ut plerumque pro eadem accipiatur. Quidam Niginam Plinij esse putant, foliis longis, intybaceis, quae illita

Vires.

Locus.

cicatrices ad colorem reducit. Verum hoc obstat, quod suae Niginae tantum folia tria Plinius tribuit.

## IACEA, CAP. L.



CABIOSIS Iaceae adeo similes sunt, ut Matthiolus has ab illis non discreuerit, quare scabiosae Iaceae sunt subiungendae. Iaceas autem forte aliquis recentiorum Graecorum ἀνδρῶν vocavit, quod ianthino sint florum colore, non quod humi iaceant, ut quidam putant, tamen et Barbaris practicis duntaxat nota fuisse videntur. Iacea nigra Dodonaei scabiosis similis est, sesquipedem aut pedes duos alta, foliis longis, angustis, scabiosae maioris, aut succisae aliquando crenatis, & in ambitu insectis: caulibus rotundis in quorum summitatibus capitula sunt rotunda, squamosa, cyanorum capitulis similia, sed maiora: ex quorum medio capillacei flores purpurei exeunt, radix crassa, brevis, incurva, fibrata. Dicitur etiam à Pena & Lobellio Iacea nigra vulgaris, Hyosiris Plinij Anguillare, Medium Dioscor. Mutono, folio seridis siluestris, flore purpureo, rotundo, semine cnici minuto, radice dodrantali, crassitudine baculi, gustu acerbo. Aliis vero scabiosa maior, siue capitata, siue echinata, diuersa à Iacea nigra vulgari Officinarum, ubi vis, frequentissima, quam Hyosirin Plinij esse volunt. In vdis pratis & herbidis locis provenit. In Iacea subdulcis est adstrictio, siccitas effica admodum, calor propè nullus. Recentiores nihil praestantius ad hernias inuenisse Iacea nigra narrant. Eius decoctum, si eo saepe os colluatur, recentes oris & gutturis abscessus repellit & absumit, inueteratas ad suppurationem perducit & rumpit. Alia dicitur ab herbariis Iacea rubra maior in pratis quoque degens, radicibus multis, nigris, longis, huc illuc dissectis: caule cubitali, recto, adnatis multis furculoso, folio longo, obscurius virente, per ambitum profundissime dissecto, tactu aspero, leniter pungentibus iis, quae per ambitum eminent foliorum laciniis: flore

Nomina

Forma  
Lib. I. c. 71.

Locus.

Temper.

Vires





flore è puniceo purpurascète, aspectu pulchro, in oblongis capitulis albo nigroq; reticulatim & elegantissimè distinctis, gustu amaris. Iacea aliam nigram quidam agnoscunt, in humidis ubiq; prodeuntem, & in Officinis passim eo nomine vocatam, radice breui, lignosa, furculosa, foliis paucis, hirsutis ac ideò subasperis, in tubo similibus, minoribus, capitulis paruis, in quibus flos subruher emicat, gustus valde adstringentis, eamq; hyosiridem Plinij esse arbitrantur.

## ODONTITIS LVTEA.

## CAP. LI.

Lib. 1. c. 134.  
Dod. lib. 2.  
Cap. 7.

Lib. 27. c. 12.  
Nomina

Forma.



QVAM Tragus florè cuculi, Dodonæus Vetonicam siluestrem vocat, herbarij cōsentiunt eam esse, quæ à Plinio Odontitis purpurea nominatur, de qua diximus, lib. de iis quæ flore placet. Quæ hîc proponitur propter magnam cum illa afinitatem, Odontitis lutea à nobis nominata est à florum colore. Radice est breui, fibris capillata: caulibus multis, angulosis, geniculatis: folio polygoni, longiore, ad singula genicula gemino: flore pusillo, luteo, è stellulis herbaceis emicante. Locis humidis gaudet. Eius decocto si quis os colluat, dentium cruciatus sedatur.

EQVI



## EQUISETVM,

## CAP. LII.



Vae Græcis *ἰσῆς* dicitur, Latine Equisetum, Equiseta, Equiselis, Equinalis, Officinis Cauda equina ob foliorum similitudinem. Est enim, inquit Plinius, pilus terræ equinæ setæ similis. Et, scenifecis inuisa & equiselis est, à similitudine equinæ setæ. Arabibus *Dhenben alchail*, *Dembalchil*, siue *Danebalchil*. Italis *Coda di cavallo*, & *Asperella*, Hispanis *Coda di mula*, & *Rabo de mula*, Germanis *Rosßschuuantz*, Gallis *Quene de cheual*, & *Prelle*. Dicitur etiam quâuis siccissima ephedron, quod vdis & mendentibus locis gaudeat. Item *ἰσῆς* auctore Plinio, quod arbores scandat. Huius genera duo describit Dioscorides. Vnum cauliculis inanibus, geniculatis, in sese farctis, subrubris, subasperis, duris: iuncis circa eos foliis crebris, exilibus. In sublime attollitur, vicinos arborum caudices scandens, obuolutumq; dependet comis multis, nigris, vt equorum cauda, radix lignosa, dura. In riguis & scrobibus nascitur. Alterum Equisetum caulis est rectus, cubito maior, inanis, comis per intervalla brevioribus, candidioribus & mollioribus. Plinius totidem eademque genera facit. Equisetum hippuris à Græcis dicta, & pratis vituperata nobis. Est autem pilus terræ, equinæ setæ similis. Et mox, Alij hippurin, alij Ephedron vt in supposititiis nomenclaturis Dioscoridis legitur, (non ephedron, neque ephedran, vt in vulgatis legitur) alij anabasin vocant, traduntque iuxta arbores nasci, & scandentem eas

Nomina

Lib. 26 c. 13.

Lib. 18 c. 28

## EQUISETVM. I.



Ibid.

Genera.

Lib. 4 c. 42

Forma.

Locus.

Lib. 26 c. 13.

## EQUISETI. I.

Asparagus, Dod.



dependere comis iuncis, multis, nigris, vt est equorum cauda, geniculatis ramulis, folia habere pauca, tenuia, exigua. Semen rotundum, simile coriandro, radice lignosa. Et paulò post, faciunt & aliam hippurim brevioribus & mollioribus comis, candidioribusque. Rursus, Caucon, quæ, & ephedron, ab aliis anabasis vocata, nascitur ventoso ferè tractu, scandens arborem, & ex ramis dependens, folio multo, cirris numerosa, qui sunt iunci geniculati: radice pallida. Matthiolus quatuor obseruauit genera, primum illud notius tum Dioscoridis, tum cæterorum, quod hic pictum est. Cum primum è terra erumpit, profert culmos arundineos, iuncea, cauos, nudos, geniculatos asperos: ob id detergendæ suppellectili à mulierculis, & opificibus pectinum, fistularum, atque aliarum huiusmodi rerum ad materiam læuigandam expetitos, clauis seu capitibus in summo racemosos, recenti asparago, aut iuglandium iulo similibus, vt pictura hîc exprimit, tempore caules isti nigricant aut rubescunt, ex quorum geniculis quasi articulorum commissuris prodeunt multiplices exilium, tenerorum, geniculatorum foliorum quasi setæ asperiusculæ, prolixiores. Altiùs accrescens dependetibus comis caudam equinam satis ementitur. Radix est candida, geniculata caulium modo. Equisetum minus, Hippuris fontalis, Equisetum alterum Matthioli,

Lib. 26 c. 7.

In cap. 22,

lib 4.

Dod. lib. 1.

cap. 66.

P. na in

Ad.

XX





superiori haud abfimile, initio caules veluti asparagos teneros edit, nudos, rotundos, cauos, geniculatos, in summo non clauatos, sed spicatos, floribus albis refertos, qui statim pereunt. Deinde ex eadem radice succrescunt ramuli aliis articulis, siue geniculis crebris intercepti, circa quæ iuncea folia geniculata, rotunda, vt in maiore Equiseto, sed neque tam prolixa, neque tam aspera: quare & ad poliendum inepta. Radix tenera est, gracilis, nigra. Locis decliuibus, vmbrosis, humidis prouenit. Est & Hippuris minor alia, congener cum maiore Equiseto, tertium Matthioli, Equisetum iunceum vocat Tragus, quod nudo calamo, omnique folio carente instar iunci profilit. Sub initia mensis Maij nigros fert asparagos, in quibus flos plantæ, radix nigra, lignosa planè insipida. Quartum Equiseti genus addidit Matthiolus. Hoc videtur esse vna marina vulgaris Clusij. Ad hominis proceritatem vsque fruticat spartij modo, stipite brachialis crassitudinis, oblongis ramis, nigricantibus, qui deinde multas virgulas pedales ferunt, tenues, multis geniculis distinctas Equiseti ferè modo propendentes, sine foliis, gustu admodum adstringente: florem circum internodia confertum, minutum & muscosum, flori cornus non abfimilem, pallidum: deinde fructum exiguis moris similem, rubentem, succulentum, acidum, in quo vnum aut alterum granum milio ferè simile inest, foris nigrum, intus album: radix dura, lignosa. Clusio videtur Polygono quarto Plinij quadrare. Est & quintum genus, minimum, aquis cœnosis innatans, vel sub iis occultum semper, breuissimis & asperis foliis, ac caulibus, lutosum virus olentibus. Lugdunenses vocant *chara* quasi Cheredranon, quo nomine Equisetum vocari in supposititiis nomenclaturis Dioscoridis legimus, ea quæ lances escarias, & reliquam eiusmodi supellectilem abstergunt, vt & primo genere, quod vocant *Prelle*, quasi *φαιδρα*. Nam & sic appellari loco proximè citato traditur. Equiseto vis spissare, inquit Dioscorides, quare sanguinem naribus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in vino potum, vrinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur tritis foliis & illitis. Radix cum sua herba tussim, orthopnœam ruptaq; adiuuat,


*Vires.*



adiuvat. Foliis in aqua potis, dissectiones vesicæ & intestinorum, enterocelæq; in vnum coalescere cogique feruntur. Equisetum alterum cum aceto tritum vulneribus remedio est, & eandem vim habet. Eadem Galenus tradit. Hippuris adstringentem cum amaritudine facultatem habet, ac proinde valenter citra mordacita-

Lib. 6. sim.


*EQUISETVM luncum,*  
*Tragi.*



*EQUISETVM Tertium,*  
*Matthioli.*



*EQUISETVM Quartum,*  
*Matthioli.*



tem exiccantem. Itaque vulnera maxima cataplasmate imposita glutinat, etiam si præfectos esse nervos contingat, præterea enterocelas glutinat. Cæterum ad sanguinis reiectionem, ad profluuium muliebri, potissimum rubrum, ad dysenterias, & alios ventris fluxus generosum est remedium herba ipsa aut ex aqua aut ex vino pota. Sunt qui scripserunt nonnunquam etiam vel vesicæ ac tenuium intestinorum vulnera succo ipso sanata fuisse. Prodest etiam profluio sanguinis è naribus, tum fluxui obnoxii in ventre affectibus ex austero vino potus, ac si febris sit, ex aqua. Plinius eadem planè quæ Dioscorides habet, sed & alia quædam. Equisetum, inquit, hippuris à Græcis dicta, lienem cursorum extinguit decocta fictili nouo ad tertias, quantum vas capiat, & per triduum heminis pota. Vis eius spissare corpora. Succus sanguinem è naribus fluentem inclusus sistit, item aluum. Medetur dysentericis in vino dulci potus cyathis tribus vrinam ciet: tussim orthopnoeam sanat: item rupta & quæ serpunt. Inte-

Lib. 26. c. 13



stinis & vesicæ folia bibuntur. Enterocelen cohibet, faciunt & aliam hippurim breuioribus & mollioribus comis, candidioribusque perquam vtilem ischiadicis, & vulneribus ex aceto impositam, propter sanguinem sistendum. Equiseti recentem asparagum, inquit Matthiolus, Hetrusci *Patrusalo* vocant, eduntque: prius enim elixant, farinâque conspersum oleo in sartagine frigunt, quo cibo alius adeo sistitur, vt inde coli cruciatus facile excitetur. Sunt qui eundem asparagum siccum annum asseruant, quo æstate vtuntur ad dysenterias: nam aqua calida nocte maceratum coquunt, quo modo dictum est, & in cibum magno successu exhibent.

## POLYGONUM FŒMINA,

## CAP. LIII.

Nomina

**P**OLYGONUM multa sint Polygoni genera, de fœmina tantum hîc agimus, quæ Græcis πολυγονον θήλυ, Latine Polygonum, Sanguinaria & Sanguinalis fœmina, Gallicè *Renouee femelle*. Ac cum dictum sit Polygonum propter multas geniculorum commissuras, quasi dicas multinodiam, tamen species hæc natalibus & tota facie equisetis similior est quam Polygono

Forma.

**POLYGONUM** Fœmina,  
Matthioli.

Locus.

Lib. 4. c. 4.

Lib. 27. c. 12

Ibidem.  
Vires.



apud Plinium legendum censent vreum (ὄνραϊον) à caudæ figura, quam suo caule minutis foliis vestito perinde refert, vt & Hippuris. Polygonum fœmina, inquit Dioscorides, vim habet adstringentem, refrigerantem, quæ ad eadem valet ad quæ Polygonum mas, sed minore efficacia.

NIDVS





**N**ERBARIJ quidam Nidum avis plantam hanc vocitant, quod eius radiculæ ita inter sese implicatæ sint, vt Nidum avis constituere videantur. Caulem producit nudum, & sine vllis foliis: florem in summo spicatum. Caulis cum flore colore est fusco, orobanche haud absimilis, tenerior tamen, & tenuior, radices nihil aliud sunt quàm fibræ mutuo implexæ, vt diximus. Locis vdis & siluosis profilit. Quibusdam Coagulum terræ Plinij, cap. 8. lib. 27. videtur. Tragus nonum satyrij genus facit in vliginosis & umbrosis siluis nascens Maio mense, flore & folio viduum. Est enim nihil aliud quàm pinguis & rectus asparagus, forma vulgare satyrium, colore lignum, vel fungos siluis familiares referens. Radicem habet multo capillitio contortam & implicatam: estque hoc satyrij genus vitium potius quoddam ex putrilagine enatum, quàm planta censendum.

**Nomina**  
Dodo. lib.  
2. cap. 47.

**Forma**

Lib. 2. c. 82.

CRISTA GALLINACEA, CAP. LV.

**P**LINIUS alektorolophon scribit, quæ apud Romanos Crista dicitur, folia habere similia Gallinæ Cristæ, plura, caulem tenuem, semen nigrum in siliquis, quibus verbis moti herbarij nostri plantam istam ob florum congeriem multiplicis & densæ Gallinæ Cristæ modo fastigiatam, ob folia multò magis ad simplicis Cristæ figuram accedentia, alektorolophon, siue Cristam Gallinaceam, siue Galli appellarunt: Belgæ *Geel ratelen*, Germani *Geel rodel*. Caule est tenui, recto, pedali, interdum sesquipedali, in quo folia bina ex aduerso per ambitum diuisuris prorsum cristatis, sensim à medio latiore in angustius desinentia cristæ ritu: floribus in summo luteis aut candidis: semine in folliculis foliaceis, vel siliquosis teneriusculis fusco, compresso, rotundo: radice tenui, parua. Nascitur in pratis & aruis, vtrouque vitiosa & inutilis. Plinius vtilem scribit esse alektorolophon tussientibus coctum cum faba fresca, melle addito, & caligini oculorum. Solidum semen coniici in oculum, nec turbare, sed in se caliginem contrahere, quod de crista galli nulli adhuc experimento compertum est. Frigidam siccamque esse Dodonaus tradit. Videtur aliis esse Mimulus

Lib. 27. c. 5.

**Nomina**  
Pena in  
Ad.  
Dod. lib. 4.  
cap. 57.

CRISTA Gallinacea,  
Dodonæi.



**F**ormæ *Geel ratelen*, Germani *Geel rodel*. Caule est tenui, recto, pedali, interdum sesquipedali, in quo folia bina ex aduerso per ambitum diuisuris prorsum cristatis, sensim à medio latiore in angustius desinentia cristæ ritu: floribus in summo luteis aut candidis: semine in folliculis foliaceis, vel siliquosis teneriusculis fusco, compresso, rotundo: radice tenui, parua. Nascitur in pratis & aruis, vtrouque vitiosa & inutilis. Plinius vtilem scribit esse alektorolophon tussientibus coctum cum faba fresca, melle addito, & caligini oculorum. Solidum semen coniici in oculum, nec turbare, sed in se caliginem contrahere, quod de crista galli nulli adhuc experimento compertum est. Frigidam siccamque esse Dodonaus tradit. Videtur aliis esse Mimulus

**Forma**

**Locus.**

**Vires.**

Lib. 4. c. 57.

Lib. 18. c. 18



CRISTA Galli altera, seu  
phthirion.

Trag. lib. i.  
cap. 23.  
Dod. in hi  
flor. aqua.

Forma.

Locus.

Temper.  
& Vires



quæ & fistularia dicitur, q̄ ad fistulas & sinuo-  
sa vlcera sit utilis, & Phthirion seu Pedicularis,  
seu Pedicularia, ab effectu, quod pecori ac iumē-  
tis, quæ in pratis vbi hæc provenit pascuntur, pe-  
diculorū copiā gignit. Germani *Braunrodel*, folia  
parua habet crebris incisuris crispa: caules breues  
tenuis, alios per terrā sparsos, alios erectos, circa  
quos flores vt Cristæ Gallinacæ, sed minores &  
rubentes: siliquæ deinde haud ab similes, parua,  
in quibus semen latum & nigricans: radix tenuis  
& fibrata. Nascitur in vlginosis pratis, ipsis infe-  
sta. Maio ac Iunio mensibus cum flore ac valuu-  
lis reperitur, frigida siccaque & adstringens est  
veluti superior. Creditur, inquit Dodon. fistu-  
lis & sinuosis vlceribus valde prodesse, nec non  
mensēs & aliundē profluentem sanguinem in  
vino austero decocta potaque sistere.

## SYMPHYTVM MAGNVM,

## CAP. LVI.

Nomina



ΥΜΦΥΤΟΝ vel συμφύτον μέγα, Latinè Symphytum magnum, Alum seu  
Alus, Solidago, Officinis Consolida maior, Gallicè *Consyre*, *Grande Conso-*  
*lide*, *Oreille d'asne*, Italicè *Cōsolida maggiore*, Germanicè *Vuallwurcz*, *Schmerwurcz*,

Forma.

Nomen illi apud Græcos Latinōsque efficax constringendi conglutinandique vis  
fecit. Caules edit hirsutos, cauos, angulosos, folia aspera, borraginis, sed maiora, lon-  
giora, nigriora: flores rotundos, cauos, candidos, interdum purpureos. Quæ appo-

SYMPHYTVM Magnum,  
*Matthioli.*

SYMPHYTVM Tuberosum,  
*Lobellij.*



sitissimè



suissimè Dioscoridis symphyto conueniunt: quod, inquit, caulem emittit bicubi-  
talem aut maiorem, crassum, leuem, angulosum, vt sonchi inanem, circa quem bre-  
ui interuacante spatio folia exeunt angusta, buglosso proxima, oblonga, hirsuta:  
caule secundum angulos quosdam striato: foliis tenuibus ex alarum sinu prodeun-  
tibus, in quibus flores lutei, & circa caulem velut verbasci semina emicant. Tam  
caulis quam folia aspera lanugine horrent, tactuque pruritum concitant. Radices  
demittuntur foris nigrae, intus candidae, viscoae, quarum est vsus. Quae omnes notae  
nostrae maiori Consolidae adamussim cōpetunt, dempto florum colore, qui in no-  
stra purpurei, interdum albi conspiciuntur: sed, vt diximus, etiam quae floribus lu-  
teis sit reperitur. Sunt & qui consolidam purpureis floribus marem appellent,  
eamque efficaciorē, quae verò albidis floribus, fœminam. A superiore non ita di-  
uersum ortu & facie, sed speciosius, quod ex Italia delatum in Belgij hortis colitur  
sola tuberosa radice disidens, floribus ex luteo pallentibus, caule item & foliis nō  
disparibus, vulgare Symphytum æmulantibus. Locis riguis & circa scrobes reperi-  
tur. Temperatura est secundo gradu calida siccaq;. Tota folio & radice vulnera-  
ria est, buglosi gustu & mucagine, sed maiore & efficaciore ad glutinanda vulne-  
ra: vnde Cōsolida maior vocatur. Radices trita, inquit Dioscorides, & potae cruen-  
tis excreationibus ruptisq; proficiunt: recentia vulnera illitu conglutinant, carnes  
quoque si concoquantur cogunt additae: inflammationibus praesertim sedis cum  
senecionis foliis vtiliter illinuntur.

Lib. 4. ca. 9.

Locus.

Temper.

&amp; Vires.

Ibidem.

## BUGLA,

## CAP. LVII.



ONSOLIDAM mediam siue Symphytum & solidaginem mediam  
plantam hanc vocarunt medici & Chirurgi, quod ab aliis Symphytis  
discernatur. Vulgo Bugla & Bugula dicitur, Gallicè *Bugle*, quibus-  
dam Prunella, propter effigiem & vires haud dissimiles. Est tamen

Nomina

Dod. lib. 1.

cap. 88.

Pena in  
Aduers.

BUGLA, siue Consolidam  
media, Matthioli,



alia Consolidam, Prunella dicta, cauliculis con-  
stat gracilibus, teneris, per terram reptantibus,  
& alicubi depactis, vnde oriuntur alij surculi  
quadrati, recti, hirsuti, palmum & sesqui pal-  
mum alti, quibus folia oblonga, rotunda, cras-  
sa, mollia, leuiter ferrata, auersa parte purpu-  
rea. Flores inter foliola caulem a medio ferè  
ad summum vsque quasi verticillatim am-  
biunt elegantes, & saepius caerulei, interdum  
niueo candore: radix fibrata, tenera. Vdis pra-  
tis & siluis prouenit. Colitur etiam in hortis:  
Aprili mense floret. Quidam Anonymon Pli-  
nij, cap. 4. 22. esse volun, laudatam Aristogito-  
ni, in vulneribus praecalam, ex aqua tusam, &  
impositam: potam verò mammis, & praeco-  
rdiis percussis: item sanguinem excreantibus,  
putauerunt & bibendam vulneratis. Bugla fa-  
cultate sicca est, modiceq; calida. Potu sangui-  
nis grumos in ventriculo vel alia parte con-  
cretos dissicit. Folia vel eorum succus vlcibus  
omnibus in ore manantibus exedentibusq;, ac  
etiam testium pudendorumq; viriliū & mulie-  
brium efficacissimè illinuntur. Eius mira vis  
est cum sanicula potionibus vulnerariis.

Locus.

Temper.

&amp; Vires





ter per se trita, aut cum Maluæ femine, cum vino passô, aduersus vesicæ dolores.


LOTVS AEGYPTIA Ex Cod. Casareo.

CAP. LIX.



OTVS quæ in campis Aegypti aqua inundatis provenit, caulis est, vt Dioscorides refert, Aegyptiæ fabæ asimilis: florem habet paruum, candidum, Liliis similem: quem ferunt oriente Sole explicari, occidente verò occludi: totoq; capite sub aquis condi, & rursus oriente

LOTVS Aegyptia, Dodon.



DIOSCORIDES trium Lotorum, excepta tamen Loto arbore, mentionem facit: Satiuæ videlicet, siluestris, & Aegyptiæ: has tres Auienna vno capite, videlicet 341. sub Handocchæ nomine complexus est. Siluestrem Lotum Dioscorides caule esse ait bicubitali, & maiore, multas alas habente: folia similia Trifolij pratensis: semen veluti Fœnogræci, minus paulò, gustu medicato. Plurimum hanc in Libya nasci, idem auctor est, & Trifolium minus appellari. Huiusmodi autem siluestris Lotus hætenus incognita later: In vetusto autem Bibliothecæ Casareæ Codice, Loti siluestris huius imago reperitur. Depingitur autē caule recto, foliis Trifolij, & è sinu horum, pediculis flores, deinde siliquas, proferentibus, quæ tenues sunt, & quàm Fœnogræci minores, vt imago ostendit. Vim autem calfacientem & leuiter adstringentem habet: vitia cutis in facie, & ephelidas cum melle peruncta expurgat: bibitur & vtiliter

Sole emergere, simile caput eius est Papaueris maximo calyci, in quo semen milij quantitate, quod resiccatum Aegyptij in panificium recipiunt: radicem cotoneo malo similem habet. Eadem de hac Loto Theophrastus refert paulò tamen latius hanc describēs: Florem siquidem ait candidū, Liliis angustia foliorū proximū, multos verò ac densos promiscuè exire, Sole occidente sese contrahere caputq; integere, ad ortum verò aperiri, & supra aquam assurgere: idq; facere dum caput perficiatur, florēque defluant: capitis autem magnitudinem quantum Papaueris maximi: radicem rotundā mali cotonei amplitudine, cortice nigro, quali Nux castanea tegitur, corpus verò internum candidum esse. Extat in antiquo illo Bibliothecæ Casareæ Codice, Aegyptiæ Loti icon, sed quæ non nisi folia & radicem exprimat. Folia autē depinguntur tria, lata, singula longis ac crassis pediculis insidētia, ac è radicibus exeūtia: radix verò rotunda, mali instar. Aegyptia Lotus dicitur, quod in Aegypto gignatur. Radicē huius

Corsum



Corfium appellari Theophrastus ait: Strabo autem Geographiæ, lib. 17. Corfium fructum esse tradit piperi similem. Radicem crudam & coctam edi, Dioscorides scribit: Theophrastus elixam assamq; in speciem albuminis verti memoriæ prædixit, & cibis gratam: mandi etiam crudam, sed gratiorem decoctam, seu aqua, seu pruna. Qui huius radicibus victitant Lotophagos dici, Strabo auctor est. Theophrastus autem ex Loti arboris fructu, qui dulcis ac suavis est, viuentes, Lotophagos appellat.

LOTOS AEGYPTIA Theophrasti, CAP. LX.

**E**ST etiam in palustrium sue aquatilium genere herba, quæ Λωδὸς αἰγυπλίος Græcis dicitur, Latine Lotus Ægyptia, potest & Lotus Nilotica, & Euphratica dici, Arabicè *Handachoca*, quam Theophrastus fuisse fortasè quàm veriùs descripsisse videtur, ea tradens quæ ab aliis audiuntur, non quæ vidisset. ὁ δὲ λωδὸς (inquit) χαλκίμυρος φύει μὴ δὲ πλεῖστος ἐν τοῖς πεδίοις, ὅταν ἡ χώρα χαλκιμουσθῇ. τῆς δὲ ἡ μὴ τῆς χαλκίς φύσις ὁμοία τῇ τῆς κυάμης, καὶ οἱ παλαιοὶ δεῶσαίως πολλὴν ἐλάττις καὶ λεπιότεροι. ἐπιφύει δὲ ὁμοίως ὁ λωδὸς τῷ τῆς κυάμης, τὸ αὐτὸς αἰεὶ λαβὼν, ἐμφέρει τῇ σενότῃ τῶν φύλλων τοῖς τῶν κερῶν, πολλὰ δὲ καὶ πυκνὰ ἐπαλλήλως (sic enim legendum ex Plinio, non ἐπαλλήλως, vt vulgati codices habet) ταῦτα δὲ ὅταν μὴ δὲ ἥλιος δύνῃαι (vox δύνῃαι hic reponenda ex Plinio, quæ deest in vulgatis). συμμύει δὲ συγκαλυπὴ τὴν κωδιάν. αἴμα δὲ τῇ ἀναλόῃ θιούγει, καὶ ὑπερ τῆς ὕδατος γίνετ. τῷτο δὲ ὅταν εἰ μέγας ἀνὴρ κωδιὰ ἐκτελέθῃ, καὶ τὰ αὐτὴ παερύρῃ. τῆς δὲ κωδιᾶς τὸ μέγεθος ἡλικὸν μῆκωνος τῆς μεγίστης, καὶ διέμελλε ταῖς χαλκίμοις, τὸν αἰὼν τρόπον τῇ μῆκωνι. πολλὴν πυκνότερος ἐν ταύταις ὁ χαρπὸς. εἴτι δὲ παρόμοιος τῇ κέγγρῳ. ἐν δὲ τῷ ἀφραδί, τὴν κωδιάν φασὶ καὶ τὰ αὐτὴ θιούγει καὶ ὑποκαταβαίνει τῆς ὥρας διφάνης (postremam vocem addit Plinius) μέγας μέσων νυκτῶν, καὶ τῷ βάθει πόρῳ: ὅδε καὶ καθιέναι τὴν χεῖρα λαβεῖν εἶναι. μετὰ δὲ ταῦτα ὅταν ὀρθος ἦ, πάλιν ἐπανέναι, καὶ πρὸς ἡμεραν εἴτι μᾶλλον αἴμα τῷ ἡλίῳ φανερὰν ὑπερ τῆς ὕδατος, καὶ ἀνοίγει τὸ αὐθός. ἀνοικθέντος δὲ εἴτι ἀναβαίνει. συχὸν δὲ ὅτι ὑπεραίρον εἶναι τὸ ὕδωρ. τὰς δὲ κωδιᾶς ταύτας οἱ αἰγυπτοὶ σιωθέντες εἰς τὸ αἰὼν, σὺν πύσσω. ἐπὶ δὲ σπαῖν κέλυφος, ἐν τῷ σπαίῳ κλύοντες, ἐξάφρουν τὸν χαρπὸν. ξηράναντες δὲ καὶ ὀπλήζοντες αἶρας ποιεῖσι. καὶ τῷ τῷ χροῖῳ σπῖῳ. ἡ δὲ ῥίζα τῆς λωδὸς χαλκίς μὴ δὲ κόρσιον. εἴτι δὲ σρογύλη, δὲ μέγεθος ἡλικὸς μῆκων κωδιῶν. φλοιὸς δὲ παερύρῃ παερύρῃ μείλας, ἐμφέρει τῷ χαττανικῷ χαρπύ. τὸ δὲ ἐκ τῶν λαβῶν. ἐφόρῳ δὲ καὶ ὀπλοῖμον γίνετ. λευκὸς δὲ. ἡ δὲ δὲ ἐν τῇ ποροφορᾷ. ἐσθίετ δὲ καὶ ὠδὸν ἀρήσῃ δὲ ἐν τοῖς ὕδασι ἐφθῇ, καὶ ὀπλῇ ἐπ' ἀνθρακίᾳ. Nam sic legendum ex Plinio, non vt corruptè legitur in excusis, ἀρήσῃ δὲ ἐν τοῖς ὕδασι αἰεὶ ὠδῇ. Totum hunc locum sic transtulit Plinius. Est autem eodem nomine herba, & in Ægypto caulis in palustriū genere. Recedētibz enim aquis Nili riguis provenit: similis fabæ (Ægyptiæ suba.) caule, foliisq; densa congerie stipatis, breuioribus tamen gracilioribusq; cui fructus in capite Papaueri similis, incisuris omniq; alio modo, intus grana ceu milium. Incolæ capita in acerbis putrefaciunt, mox separant lauando, & siccata tundunt, eoq; pane vtuntur. Mirum est quod præter hæc traditur: Sole occidente papauera ea comprimi, & integri foliis, ad ortum autem aperiri donec maturescāt, siccata qui est candidus decidat. Hoc amplius in Euphrate tradunt, & scarum ipsum & florem vespera mergi vsque in medias noctes, totūque abire in altum, vt ne demissa quidem manu possint inueniri. Verti deinde paulatimq; subrigi, & ad exortum solis emergere, vt planè ab aqua absit altè. Radicem Lotos hæc habet mali cotonei magnitudine, operta nigro cortice, qualis & castaneas regit. Interius candidum corpus, gratum cibis, sed crudo gratius videretur, Lotometram vocās, Plinius rursus de eadem Loto, sed satiua locutus fuisse videtur, Lotometram quæ sit si tamen vox hæc rectè legatur. Nam Loton hemeron, siue Loton hemeram le gendum esse suspicatur Cornarius, id est, satiuaum Loton. Est & Lotometra quæ sit

*Nomina*

Lib. 4. hist.  
cap. 10.

Forma.

Lib. 13. c. 17.

Li.22.ca.2%

Embl. 97.  
lib. 4.

ex Loto



Li. 4. c. 109.

Cap. 106. &  
107. l. b. 4.  
Matth. in  
ca. 109. li. 4.

Vires.

Li. 7. simpl.

ex Loto sata, ex cuius semine simili milio fiunt panes in Ægypto à pastoribus, maxime aqua vel lacte subacto. Quidam tamen apud Plinium sic legunt. Est & Lotus silvestris foliis sativæ, & Ægyptia, ex cuius semine, &c. Ex eodem Theophrasto Dioscorides quoque sua exscripsit. Est & in Ægypto Lotus quæ in campis flumine inundatis provenit, caule fabæ: flore parvo, candido, lilio simili, quem tradunt occidete sole comprimi occludique, ad ortum autem aperiri: adduntque caput ipsum vespera aquis condi, & ad exortum solis emergere. Caput quale papaveris, maximum: & intus grana ceu milij, quæ Ægyptij exsiccant, & in panes cogunt. Radicem Lotos hæc habet mali cotonei similitudine, quæ cruda coctaque manditur: decocta que lutei oui qualitatem exhibet. Loto hanc & alias à Dioscoride traditas Loto species Serapio sua lingua Haudachocham sine discrimine nuncupat, ex cuius semine oleum exprimitur Mauritanis ad articulorum dolores expetitur. Neque fit haudachochæ oleum ex trifolij vulgaris semine, ut quidam non sine errore existimant, sed ex omnium Lotorum semine, & ex trifolio asphaltite tantum. Galenus nihil aliud de Loto dixit, quam quod ex semine ipsius panes fiunt.

## BARBA HIRCI,

## CAP. LXI.

Nomina

Li. 2. c. 137.

Forma.

Lib. 7. hist.

cap. 7.



ΠΑΓΟΠΩΓΩΝ & κόμη, Latine Hirci barba & Come, Italicè Barba di becco, Gallicè Barbe de bouc, Germanicè Bocksbart, & Gamhbbrott. Herba est, inquit Dioscorides, breui caule, foliis croci, radice longa, dulci, magno super caulem calice, è cuius summo semen nigrum dependet, unde nomen inditum est. Herba esui apta est. Theophrastus de oleribus scribens eadem tradit. ἐν οἷς ἡ τραγοπώγωνα χαλδῶσιν, ὃ τὴν ῥίζαν ἐχέει μακρὴν καὶ γλυκίστην, τὰ δὲ φύλλα τῶν κρόκων ὁμοία, πολλὴν μακρότερα, τὸν καρπὸν δὲ βραχὺν ἐφ' ᾧ τὴν χαλκήν μεγάλην. Ἐξ ἑκαστῆς μέγαν τὸν παρῆλον πῶλον, ἀφ' οὗ χαλκίσται τραγοπώγων. Id est, in quibus est quam Hirci barbam vocant, cui radix longa & dulcis, folia croco similia, nisi quod longiora, caulis brevis, super quem calyx amplus, de cuius summo vertice Barba proluxa incana dependet, unde nomen accepit. Similiter à Plinio inter vulgare in cibis herbarum nomina recensetur. Idem ex Theophrasto transcripsit hæc. Est & Tragopogon, quem alij Comen vocant, caule parvo, foliis croci, radice longa, dulci, super caulem calice lato, nigro. Hic depicta planta, caule est rotundo, recto, geniculato, foliis vestita longis, angustis, allio haud absimilibus, flore aureo, rostro porcino simili, sed maiore, qui calice continetur. Is sereno cælo fatiscit, nubiloso verò contrahitur, occluditurque calice echini chamæleonis more. Dilapso flore in ipso calice semen provenit longum, in summo villosum, quo maturo aperitur, & in globum villosum vertitur, veluti in rostro porcino, qui in auras evanescit. Radix est dulcis, digitū longa. Alterū Tragopogoni genus habet Matthiolus, quod à foliorū colore purpureū vocat. Foliis est alteri similibus, sed à radice numerosioribus, viridioribus, latioribus, firmioribusque: caule quoque simili, geniculato,

BARBA Hirci, Tragopogon,  
Matthioli.

Lib. 21. c. 15.

Li. 27. ca. 13.

Dod. lib. 2.

ca. 17.

Matth. in

ca. 137. li. 2.





**TRAGOPOGON** *Alterum,*  
*Matth. sine Barba Hirci.*



culato, conspicuis propè genicula alis, è quibus ramuli prodeunt. Flores edit in cacumine purpureos, sed minores, radiantibus circūquaque calicis apicibus, stellæ ferè modo: radice est longiore, grandiore, duriore, & lacteo succo repleta, non dulci ut in altera, sed adstringente & amariuscule. Prius genus in pratis humidis calidarum & frigidarum regionum reperitur, feritur etiam in hortis. Maio & Iunio mensibus floret. Humiditate caliditateque temperata est. Glutinat recentia vulnera si foliorum succus, vel stillatitia eius aqua splenis aut attritis lintheolis superponatur. Tragopogoni similis est Italarum Salsifica, quam peculiari nomine quidam Gerontopogona vocant, quasi Barbam senis, ut à Tragopogone distinguat. Radix, foliū, caulis Tragopogona referūt, flos dissidet, non colore tantum, qui ex cæruleo subnigricat, ac minimè aureo colore fulget, ut in Tragopogone, sed etiam quod breuior est, ac in se magis contractus, nec arescens tam prolixos villos explicat. Radix gustu dulcis & iucunda frequenter hyeme estur in acetariis. Caterum in hor-

tis altis crescit pastinato solo, aliūque subactō, radice longa, crassitie digiti, in profundum subeunte: foliis croci, latiusculis, glabris & laevigatis, virentibus, intercurrente media costa, niuei candoris, caule recto, tereti, nodoso, calice grandi, flore purpureo, apicibus multis luteo colore micantibus, barbulis pensilibus & canis, in

**GERONTOPOGON**  
*sive Salsifica Italarum.*



**TRAGOPOGON**  
*Spicatus.*



auras



auras evanescentibus: semine oblongo, summa parte villoso. Herba tota cum capitur lacte manat. Ad hoc genus pertinet herba quam hic ostendimus, & nomine Herbariis familiari Tragopogona non spicatum vocamus: radice, foliis, caule geniculato, similis est reliquis generibus, nisi quod gracilior caulis est, radix tenuior, folium angustius, flos autem luteus figura maximè discrepat, ut qui spicatum coaceruatus sit, cum in alio genere flos aureus ac multiplex Helenij modo explicetur ac distendatur.

## BARBA CAPRÆ,

## CAP. LXII.

Dod. lib. 1.  
cap. 29.  
Pen in Ad.  
Nomina

Forma.

Locus.



PIGAMVM, Dodon.

Nomina  
Dod. lib. 1.  
cap. 29.

Forma.

Locus.  
Vires.



VM vetustum huius herbæ nomen hæcenus ignotum sit, recentiores herbarij interim Barbam caprinam, & Reginam præti nuncuparunt, propter ramulos florum densa cogerie vestitos, in prælongas barbulas effigiatos, aruncos caprarum imitantes. Gallis *Barbe de Chieure*, Germanis *Reynette* dicitur. Caulis est angulosus, cauus, rubescens, cubitalis, aliquando multò maior, ita ut ad hominis proceritatem attingat: folia castaneæ, aut corylo similia, serrata, dura, aspera, & superficie rugata: flores in summo caule candidi, racemosi, longi, visu & odoratu periucundi, instar Barbæ canæ dependentes, deinde parva semina tortuosa, terna, quaternave simul, instar verruculæ: radix longa, foris nigra, intus purpurascens, acri odore, gustu adstringente glandium modo. In pratis vdis, vmbrosis, & inter sepes nascitur. Siccat admodum & constringit. Quidam Melandriion esse Plinij suspicantur.

## PIGAMVM, CAP. LXIII.



FFICINAE Pigamum herbam hanc vocant, nonnulli (inquit Dodonæus) Rhabarbarum spurium ob ruborem. Idem in Purg. Historia Thaliétru magnū. Folia ei sunt multū incisa, & in alia foliola diuisa, antèrius duabus incisuris denticulata: caulis quadratus, rubescens, cubitalis, & sesquicubitalis, in quo flosculi villosi, coaceruati, Barbā canā referētes: deinde folliculi parui, veluti siliquæ parvæ, quaternæ quinquæve, in quibus semen teres: radix lutea, multum fibrata, latèque serpens. In pratis vdis & riguis oritur. Pigamum siccat, sed non tam adstringit quàm Barba capræ. Docti quidam scribunt Pigami odorem epilepticis perutilem esse, & si in nares immisum aliquandiu retineant, statim à paroxysmo liberari.

HYPE





Lib. I. c. 29.  
*Forma.*

Gale.lib.8.  
simpl.

*Vires.*  
Diosc.li.4.  
cap.63.

VL MARIA,

C A P. L X V.



Nomina

Forma:

*Locus.*

*Vires.*

BRITANICA, CAP. LXVI.



Nomina

Lib 4. c.2.

*Forma.*

Lib. 25, c. 3.

quit, siluestris lapathi, sed nigriora, & pilosiora, gustu adstringentia: radicem tenuem & breuem: caulem paruum emittit. De eadem hæc Plinius. In Germania trans Rhenum castris à Germanico Casare promotis, maritimo tractu, fons erat aquæ dulcis solus, quæ pota intra biennium dentes deciderent, compagesque in genibus soluerentur. Stomacacen medici vocabant, & Sceletyrben ea mala. Reperta auxilio est herba, quæ vocatur Britanica, non neruis modo & oris malis salutaris, sed contra anginas quoque & serpentes. Folia habet oblonga, nigra, radicem nigram. Succus eius exprimitur & ex radice. Florem Vibones

YY

YY



vocant, qui collectus priusquam tonitrua audiantur, & deuoratus securos in totum reddit. Frisij, quæ castra erant nostris demonstrauere illam, mirorq; nominis causam, nisi fortè confines Oceano Britannia velut propinqua dicauere. Non enim inde appellatam eam, quoniam ibi plurima nasceretur, certum est, etiamnum Britannia libera. Britanica Officinis & herbariis multis ignota est: quamquam non desint qui eam esse putant, quam vulgus Bistortam appellat, quos facile refellit Matthiolus, quod bistortæ folia nigra non sunt, neque pilosa, imò leuia, superne rufescentia, & à terra quadamtenus cæsia: item quod Britanica radix tenuis sit & breuis, bistortæ verò crassa, serpentis iacentis modo contracta & intorta. A Dalechambio verò Britanica vera censetur ea esse, quæ hic picta est, radice gracili, fibrata, prætenuibus villis in vicina reptante, nigrescente: caulibus pedalis, multis, nodosis: foliis oblongis, angustis, hirsutis, præsertim inferne quæ terram spectant, minime crenatis, lapathum siluestri in aquosis & cœnosis gigni solito valde similibus, nigrioribus, quod inuenta Britanica iudicatu facile est: nam in propinquo ferè semper lapathum siluestre occurrit, cum quo illius folia compares. Flos in summis caulibus aureus, calendulae similis, in pappos abit. In humidis & riguis nascitur, solo tamen non admodum pingui. Sapor aulterus huic & subamarus. Austerus qualitate adstringit, & fluxiones sistit, amariuscule tergit vlcera, & ad cicatricem perducit, maximè quæ in humidis sunt corporis partibus, vt tonsillis & faucibus. Nam vtraque desiccatur. Hæc sane consentiunt viribus quæ illi à Dioscoride & Galeno sunt tributa. Vim habet adstringentem, inquit ille, priuatim depascentibus oris & tonsillarum vlcibus accommodatam. Valet etiam ad reliqua ad quæ adstrictione opus est. Hic verò, Britanica folia adstringentia sunt, & vlcus glutinatoria, similia foliis siluestrium lapathorum, nisi quod atriora sunt, magisque hirta. Sed

*BRITANICA Vera,*  
*Dalechamp.*

*Locus.*  
*Vires.*

*Lib. 4. ca. 2.*  
*Li. 6. simpl.*



& expressus ex illis succus perinde adstringere potest. Itaque coctum quidam reponunt tanquam inter stomatica medicamenta efficacissimum. Videtur enim sanare iam etiam putrescentia. Dalechampus hanc Britannicam veram esse ex notis & viribus consentientibus, ac magis inde iudicauit, quod in vetustissimo Dioscoridis fragmento in membranis manuscripto hanc Britannicæ figuram pictam reperit, licet rudiùs, quæ floribus specie, colore luteo, & foliorum figura, hanc nostram designaret. Dodonæus suam Cocleariam Britanicam esse vult, ac vtilem esse inquit, putridis ac sordidis, oris vlcibus, quæ Plinius stomacem, Marcellus oscedinem, Holandi & Phrisij Souerbuyck vocant.

TRIBVLVS AQVATICVS, CAP. LXVII.

*Nomina*



ΤΡΙΒΥΛΟΣ ἑνυδρος Græcè, Latine Tribulus aquaticus, siue aquatilis, & Tribulus lacustris, Officinis Tribulus marinus. Gallicè *Char-don aquatic*, *Maccres*, *Chastaigne d'eau*, & *Treffle d'eau*, Hispanicè *Abroyos*, & *Abrollhos*, Germanicè *Vuassernusz* Tribuli genus aquis familiare, inquit Dioscorides, quod in fluminibus natum comam exerit, aculeos cõdens: foliis latis,



## TRIBVLVS Aquaticus.



latis, & pediculo longo, caule parte summa *Forma.*  
quàm ima crassiori: ad sunt ei & capillamenta  
quædam spicacea: semen durum ab altero Tri- *Li. 21. c. 16.*  
bulo non abhorrens, Plinius, Tribulus non  
nisi in palustribus nascitur, dira res alibi, iuxta  
Nilum & Strymonem amnes excipitur in ci-  
bis, inclinatus in vadum, folio ad effigiem vl-  
mi, pediculo longo. Hunc herbarij omnes sic  
depingunt. Caules habet longos, inferiore &  
ea quæ sub aquis est parte graciliores adhæ-  
rentibus quibusdam locis tenuibus fibris, ve-  
luti capillamentis, præsertim infimæ parti,  
quibus in fundo figitur, iuxta aquæ superfi-  
ciem crassiores & foliosos. Folia pediculis lon-  
gis crassis insident, lata, populneis. aut vlmeis  
similia, semiotunda, crassa, aduersâ parte ma-  
culosa nervosaq; , serrata, inter quæ flosculi  
exunt, deinde fructus nigricantes, castaneæ  
magnitudine triquetri, ternis aut quaternis  
mucronibus armati, unde illi nomen: cortice  
membranoso, nucleis intus candidis, castaneæ  
sapore, quibus recentibus plebecula lubens ve-

scitur, castaneasq; aquaticas vocat, & arefactos, molaq; attritos in panes cogit. Sunt  
etiam qui eosdem fructus sub cineribus assatos pro bellariis edant. In Plinij codice  
ex vetustorum exemplarium fide quidam legunt: Tribulus non nisi in palustribus  
nascitur: dira res alicubi. Iuxta Nilum & Strymonem amnes recipitur in cibos.  
Inclinatur in vadum, &c. Adnotandum & insuper, Dioscoridem scripsisse hanc *Locus.*  
plantam esse lato folio, non vlmi, ut Plinius *Wileas* legisse videatur, pro *Wileas*. *Vires.*  
In fossis, & pigris fluentis, & lutosis lacubus reperitur, aliquando in stagnantibus,  
puris & fontanis aquis, & plerisq; Italiæ fluminibus, atque etiam in mari. Vis ei re-  
frigerans & inspissans.

## LICHEN,


## CAP. LXVIII.



EPATICAM hodie vocant quæ Græcis λήχην & βρύον dicitur, Latine *Nomina*  
Lichen, Arabicè *Azez*, *Alsachel*, Gallis *Hepatique*, Germanis *Brunnen-*  
*lechtekraut*. Lichen quidem ea dicitur, quæ Lichenas serpentis morbi ge-  
nus imposita sistat & sanet, Bryon quod petris adhæreat, ut muscus.

Paucis his verbis hanc plantam perstrinxit Dioscorides. Lichen qui faxis est fami- *Li. 4. c. 48.*  
liaris, aliquibus Bryon appellatur Asperginosis petris adhæret ut muscus. Plinius *Forma.*  
duo Lichenis prodidit genera: sed de Dioscoridis Lichene tantum hîc agimus. Est *Li. 26. ca. 4.*  
aliud genus Lichenis, inquit, petris tantum adhærens ut muscus, qui & ipse illini-  
tur. Lichen seu hepatica nostra vel per humum spargitur, vel parietibus aquarum  
aspergine madidis insternitur. Folia habet alia aliis incumbencia, supernè viridia,  
infernè fusca, subpinguia, propè radicem angusta, in latum se pandentia, triplici  
vel quadruplici lacinia intersecta. E radice inter folia prodeunt pediculi, siue cau-  
liculi tenues, quorum verticibus insunt capitula stellularum effigie. Radices nihil  
aliud sunt quàm fibræ & capillamenta sub foliis quibus in terram, & in saxa defi-  
gitur, quibus succum felicit fugitq;. Rorulentis & umbrosis provenit locis, nudis *Locus.*  
petris adhærens musci modo. Iunio & Iulio mensibus stellulas suas edit. Duas alias *Tempus.*





Li. 4. ca. 49  
Vires.

Hepaticas, siue Lichenas minores ex Lobellio hîc proponimus. Lichen illitus sanguinis profluvia sistit, auctore Dioscoride: inflammationes arcet, Lichenibus siue impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos cum melle illitus: oris & linguæ defluxiones inhibet. Sic enim Græca conuertenda. ὡφελεῖ δὲ καὶ τὸς ἐκτετακτοῖς μετὰ μέλιτος διαχρησόμενον: τὸ βάλανος δὲ καὶ τῆς γλώττης ῥευματισμοῖς παραστέται. Quæ Cornario suspecta videntur, imo potius corrupta. Cum enim Plinius videatur Dioscoridis verba transtulisse. Hic & sanguinem sistit vulneribus instillatus, & collectiones illitus. Morbum quoque regium cum melle sanatur ore illito & lingua, videtur legisse in Dioscoride, ὡφελεῖ καὶ τὸς ἐκτετακτοῖς μετὰ μέλιτος, διαχρησόμενος τὸ βάλανος, καὶ τῆς γλώττης. Id est, Prodest & regio morbo correptis, si cum melle oblinantur ex ipso os & lingua, ut vox ῥευματισμοῖς ascititia sit, & παραστέται ex præcedente versu repetita. Sed de eiusdem viribus paulò aliter Galenus. Lichen qui in petris nascitur, est veluti muscus quidam, sed rectè ex plantarum genere censerî potest. Sic autem nominatus videtur, quòd Lichenas seu impetigines curret. Extergentem ac modicè refrigerantem facultatem habet, vtramque verò, abstergentem quidem atque resiccantem à petra obtinet, refrigerantem verò ab humore aqueo: nascitur enim in humidis & grauiter olentibus saxis. Porò quòd ex talibus substantiis componitur, aduersum esse inflammationi nihil mirum est. Cæterum an sanguinis profluvia sistat, ut refert Dioscorides, id neuticam dicere queo.

Li. 7. simpl.

GRAT



## GRATIOLA, Matth.

## CAP. LXIX.



ECENTIORVM Gratiola, quo nomine apud veteres appellaretur, adhuc incertum est. Vocatur etiam nunc Gratia Dei, Gallicè *Grace de Dieu*, Italicè *Stranca cavallo*, quod equi eius pabulo mirè defatigentur, Papauer spumeum Dioscoridis Anguillaræ. Herba est humilis dodrantalem altitudinem vix excedens: caulibus quadrangularibus, foliis hyssopi, latioribus & longioribus. Florem fert in purpura albicantem, inter folia erumpentem quæ caulem ambiunt: radix summo spargitur cespite. Tota herba amari & ingratisimi gustus, quadamtenus adstringens. Tam recens quàm sicca sumpta vim habet vehementer purgandi, tam supernè, quàm infernè, bilem pituitamque trahit. Vulneribus celeriter medetur trita & imposita. Nascitur in locis humidis, præcipuè in pratis vliginosis.

**Nomina**  
Dod. lib. 2.  
cap. 42.  
Matth. in  
ca. 26. lib. 3.

**Forma.**

**Vires.**

**Locus.**

## SCROPHULARIA Maior, Matth.

## CAP. LXX.



RADICE strumosa & effectu Scrophularia maior dicitur, & Millemorbia, Castrangula, ferraria, ficaria, Gallis *Grande Scrophulaire*, Germanis *Braunwurtz*. Galeopsis Fuchij, Cordi & Dodonæi. Caulem emittit quadratum, nigricantem, cauum: folia longiuscula, lata, in ambitu crenata, betonicæ similia: flores in caulium verticibus tenues, purpurascens, cauos: semen minutum in globulis: radicem magnam, albam, solidam, tuberculis seu strumis asperam. In scrobium marginibus, in riguis & vliginosis locis nascitur, aliquando in siluis & nemoribus vdis, umbrosis, montosis. Vlcerebus strumosis, cauernosis, carcinomatis atque depascentibus summo perè utilis. Præterea tuberculis ab humore frigido concretis, aut scirris carcinomata minantibus opitulatur. Strumas & hæmorrhoidas sanat. Radix Autumno effoditur, purgata tunditur cum recenti butyro, operculatoq; fictili in vliginoso loco reponitur, relinquiturq; quindecim dies. Deinde lento igne butyrum id liquefit, & percolatum asseruatur, quo supradicti morbi vitilissime illinuntur. Quidam herbam Chrysippeam Plinij esse putant quæ cum ficis strumis medetur. Scrophularia minor suprâ descripta est, cap. 33.

**Nomina**

**Forma.**

**Locus.**

Pena in  
Aduers.

**Vires.**



Nomina



Vae Græcè dicitur *ἔρινος*, Latine etiam Erinus, Plinio Erineos, sic dicta ob lacteam succum quo plurimo turget. Est enim Erinus siue Erineos Latine Caprificus, hucus precox lacte turgens primo aut exacto iam vere, quam secutus gentilitatem Plinius proxime caprificum de ea subiunxit, quæ mox dicemus. Sunt qui Ocimum aquaticum vocant, Gallicè *Basilic d'eau*. Galenus non Erinum, sed Echium vocat, & ita de ea scribit, ut non de alia quàm de Erino Dioscorid s egiſſe videatur. Erinus, inquit Dioscorides, nascitur apud fontes & fluuios, foliis ocimi, sed minoribus, parte summa diuisis, surculis quinis, senisve dodratalibus: flore candido, semine nigro & acerbo: folia & caules lacteo succo turgent. Quæ tamen postrema aliter in vulgatis codicibus Græcis leguntur. *ἔρινος ἡ μετὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἔχει τὸν ὄστρον*, idest, caulis & folia succo referta sunt. Sed priorem lectionem magis probandam esse declarant, tum nominis etymum à nobis iam redditum, tum Plinius, qui de Erino partim ex Diole, partim ex Nicandro, partim ex Dioscoride hæc transcripsit. Herba quam Græci Erineon vocant, reddenda est in hoc loco propter gentilitatem. Palmum alta est, cauliculis quinis ferè, ocimi similitudine: flos candidus, semen nigrum, paruum. Tritum cum melle Attico oculorū epiphoris medetur: manat lacte multo & dulci, quæ postrema verba minime apud Dioscoridem leguntur. Herba vtilis aurium dolori natri exiguo addito: folia resistunt venenis. Quæ vulgarium Plinij codicum lectio est, veteris autem melior, & magis cum Dioscoride consentiens. Tritum cum melle Attico oculorum epiphoris medetur, duabus drachmis cum cyathis mellis Attici quatuor. Cumulatum decerpta manat lacte multo & dulci: herba perquam vtilis aurium dolore, &c. Pro Erino plantam cuius effigies hic expressa est representauit Matthiolus. Dalechampius aliam exhibet, quam prope Lugdunum collegit in riuo subterfluente extremos suburbium versus pontis fornices, quo Rhodanus

Lib. 6. simpl.

Locus.

Lib. 4. c. 27.

Forma.

Lib. 13. c. 7.

Ca. 27. lib. 4.  
Dioscor. 4.  
edit.

ERINVS, Matthioli.



ERINVS, Dalechampij.



iungitur



iungitur, radice in multas fibras diuisa, caulibus multis, palmum altis, angulosis, furculosis, cum franguntur lacte manantibus, gustu valde acerbis, cana lanugine prope verticem obductis: foliis ocimi, minoribus tamen quam in primo genere, quod ocimum citratum Serapio vocat, in ambitu minimè incis, nec crenatis, iuxta caulium fastigia *ἐν τῶν ἀνωθεν μερῶν ἐπεχισμῶν*, inquit Dioscorides, in longum & angustum veluti fisis penè instar pinastris. Semen Erini, auctore Dioscoride, drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus cum sulphure & nitro instillatus, aurium dolores sedat. Similiter Galenus echini herbæ semen acerbum esse ait, ac proinde repellentis ac exsiccatoriae facultatis esse: eoque vtendum ad oculorum & aurium fluxiones.

Lib. 4. c. 27.

Vires.

Li. 6. simpl.

## PIMPINELLA, CAP. LXXII.



ETERIBVS indictæ existimantur Pimpinellæ nominatæ à recentioribus, & Bipinellæ, à foliorum binis ordinibus pennatim siue plumatim digestis: Vocantur etiam Bipenullæ & Pampinellæ. Duo notantur eius genera: maior, quæ & Sanguisorba maior, siue siluestris, Gallitè *Pimpinelle sauvage*: minor, quæ & Sanguisorba minor, Solbastrella, & hortensis, *Pimpinelle cultiue*. Alij contra hortensem maiorem cultu fieri arbitrantur. Illa caulibus est longis, rotundis, duos trèsvè pedes altis, in quibus folia longiuscula, crenata, in pediculis longis ex aduerso sita, alarum modo expansa: in summis caulibus capitula sunt rotunda, ex quibus flosculi ex fusco rubescentes, deinde semen triangulare: radix longa, crassa. Herbidis & montosis lubens oritur, pratis etià & pascuis. Pimpinella minor, siue hortensis superiori prorsus similis est, nisi quòd omnibus suis partibus minor, & gratiore tum sapore, tum odore. Cauliculi eius sunt teneri & molles, pedem alti, aut paulò altiores, rubelli, teneriuscula lanugine villosi: folia superiori similia, multò minora, auersa parte quadamtenus carulea,

Nomina

Genera.

Forma.

Ded lib. 1. cap. 94.

Locus.

Forma.

PIMPINELLA, Siue Sanguisorba maior, Matth.



PIMPINELLA Minor, Matthioli.





*PIMPINELLA*, *Succ*  
*Sanguisorba maior*, *Fuchsij*.

*Locus.*  
*Vires &*  
*Temper.*



aduersa viridia: flores non fusci sed purpurei, luteis capillamentis ex medio dependentibus: radix item similis, sed multò minor. In hortis prouenit. Pimpinella tertio gradu siccatur, secundo refrigeratur, adstringiturque. Eius decoctum dysenteriam sanat, muliebri profluvio & quolibet sanguinis & alui fluxus cohibet, biliosas vomitiones reprimat. Idem præstat herba & seminis pulvis in aqua chalybata potus. Herba ipsa vulneribus & ulceribus medetur, misceturque vnguentis quæ tum ad capitis vulnera, tum carcinomata parantur. Sunt qui contagiosis pestilentibusque febribus maximè commendent, ut cuius succo abigantur huiusmodi febres. Vino mersa gratiam conciliat sapore & odore aromatico & vinoso, quodammodo melonis, nec minùs in acetariis expetita, utilisima visceribus, hepatis, cordi, & præsertim spiritibus. E Pimpinellæ radicibus grana quædam colligi notum est, tingendis rubro colore sericeis vestibus exquisitissima.

*GALIVM*,

*CAP. LXXIII.*

*Nomina*  
*Lib. 4. c. 91.*  
*Ibidem.*  
*Forma.*



*RACI γάλιον*, Latini similiter Galivm vocant, Galli *Petit muguet*, Germani *Vualstao*. Dicitur autem teste Dioscoride γάλιον, ἀπὸ τοῦ γάλατος γινώσκειν ἀντὶ τοῦ ὡς αὐτὸ, id est, quod in coagulando lacte coaguli vicem impleat. Ramulum foliūque habet, eodem auctore, Aparine simil-

*GALIVM Luteum, Matth.*



*Mollugo, Galivm album quorundam.*



*limum*



limum, rectum, florem in cacumine luteum, tenuem, densum, copiosum, odoratum. Nascitur in palustribus. Quae omnia huic nostrae plantae conveniunt, cauliculus enim profert tenuis, rotundos, laeves, circa quos folia angusta, stellatim disposita. Denique aparine simile est, minus tamen & teneriusculum, nec vlllo modo asperum, at vbiq̃ue laeve, & odore suavi: flores in summis caulibus racemosi: radix tenera & fibrata. Huius altera reperitur differentia, floribus candidis, ob id Galium Locus.  
 album nuncupata, quibusdam Mollugo vulgarior Herbariorum, caulibus multis, angulosis, geniculatis, viticulosis, cubitum & sesquicubitum longis, humi sparsis, in quibus folia laevia, & Maio mense flosculi candidi, copiosi, Aparines minores: radix lignosior, fibrata cinerea. Huic Galio albo tota sui parte similis est altera Pet. Pen  
in Ad.

*MOLLUGO vulgarior  
herbariorum.*



*MOLLUGO Altera montana,  
Dodonaei.*



Mollugo montana Dodonaei, praeterquam complurium florum exilium speciosa fœtura, in caule cubitali & bicubitali surrecto, folia molliora. Radix nigricat. In collibus incultis, asperis & montosis nascuntur. Flos, inquit Dioscorides, Lib. 4. c. 91.  
 igni ambustis illinitur, & sanguinis profluvia sistit. Cerato rosaceo galium ad- Vires.  
 miscetur, insolutum vsque dum albescat, & sic lassitudines reficit, radix venerem Lib. 6. l. 11.  
 concitat. Galenus, Galium nomen inde sortitum est, quod lac coagulet. Simile autem est aparine, facultatem obtinens exsiccatoriam & subacrem: flos eius sanguinis profluvius competere videtur, & combustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.



Nomina

Dod. c. 36.

lib. 5.

Forma.

Locus.

Vires.

Lib. 5. c. 21.  
cap. 276.

Forma.

Vires.

**R**APHANVS siue radícula palustris, Gallicè *Reisort d'eau*, hortensi Raphano foliis similis est, minoribus tamen, & magis incis, caulis est pedem altus, nonnumquam altior, in quo flores copiosi lutei, deinde siliculæ in quibus semen minutum: radix digiti crassitudine, gustu recentis Raphani acriore. Circa scrobes & in pigris aquis, ac fluentis prouenit. Acriore est hortensi, & iisdem viribus, sed vehementioribus, maximè ad ciendas vrinas.

ANAGALLIS AQUATICA,  
CAP. LXXV.

**R**ECENTIORES herbarij Anagallidè aquaticam hanc vocant, vt cuius folia & vires non parùm imitetur, nec non natales eodem sectetur, siue *Berabungam* nomine Germanico, quo *Bachpunghe* appellatur. Dodonæus non rectè Cepæam, Fuchsius Sium. Quidam Samolum Plinij esse volunt, herbam in aquosis nascentem, multum à

Druidibus celebratam. Tragus Sium non odoratum vocat: fruticosus est ramulis, teneris, carnosus, rotundis, foliis leuiter in ambitu crenatis, carnosus, nigricantibus: summis caulibus & ramulis copiosa florum cæruleorum anagallidis similium congerie stipatis: radix albicat, multis diffusa fibris. Tota herba gustu est acriore nasturtij, inquit Pena, odore non ingrato. Quare calida est, & ad calculum & vrinæ diffi-

ANAGALLIS Aquatica,  
Dodonæi.veronica aquatica,  
Berabungam.ANAGALLIS Aquatica  
altera, Lobellij.

cultatam



cultatem pēnitis. Experimento cognitum illam tritam & brachiorum carpis ad-  
motam, oculorum inflammationes sedare, ac epiphoras mirificè sistere. *Locus.* Locis vdis  
vt scrobium & stagnorum marginibus gaudet. Aliquando in ipsa riuulorum aqua  
reperitur. Ad Germaniæ maritimæ indigenam morbum, quem Scorbutum appel-  
lant, utilis est, eodem quo nasturtium aquaticum sumpta modo. Scribit Tragus  
cum aceto & butyro tostam, & calidam impositam, ac subinde renouatam tumo-  
ribus quibuscumque & sacris ignibus prodesse: apud veterinarios magno esse in vsu in  
discutiendis tumoribus & sananda equorum scabie, aliisque id genus affectibus:  
acerariis commanducatam calculos rumpere, vrinas ciere, fœtus mortuos & men-  
ses pellere. Lobellius Anagallidem aquaticam alteram pinxit, fortassè Sium non  
odoratum alterum Tragi, folio pulegij regalis. Vdorum, fontium, fluentiorumque  
amantior hæc, sed rarior: cuius folia Valerianæ minimæ æmula sunt, & eiusdem  
coloris: cauliculus dodrantalis, summo diuisus, è pusilla filamentis compacta radi-  
ce, flosculi albi & pericarpia Anagallidis, sed exiliora multò, per maturitatem fer-  
ruginea. Secus ripas & margines riuulorum Austruyel paguli, altero ab vrbe An-  
tuerpiana lapide, occurrit. Hæc Lobellius.

## COTYLEDON AQUATICA, CAP. LXXVI.



BEAM quæ huic est cum Cotyledone siue vero vmbilico veneris si- *Nomina*  
militudinem, & ob natales, herbarij Cotyledonem aquaticam nomi-  
narunt. Officinæ Vmbilicum veneris & Scatum cœli, quamquam vmb-  
ilicus veneris non sit, nec eius loco vtendum, fibras exiguas, multas, *Dod. lib. 2.*  
cauliculósque teneros, reptantes, & per humum sparfos habet: folia circinato am- *cap. 25.*  
bitu leuiter inciso, obtusa incisura, stellato *Pet. Pe. in*  
medio cœtro, parùm depresso, pediculis sub- *Ad.*  
tus ei adfixis, vmbelicum verum imitantia,  
sed minora, teneriora, magis nigricantia: flo-  
sculi candidi, penduli subter folia. Iulio flo-  
ret. Gustus acris & linguam vellicans cali-  
dam esse demonstrat. Quare non sine magno  
errore pharmacopœi quidam Cotyledonis  
penuria vngueto populeo indunt. Sunt qui- *Lib. 25. c. 11.*  
bus hæc Callitriche Plinij videtur esse, fit &  
ex Callitriche sternutamentum, inquit, folia  
sunt lenticulæ similia, caules iuncis tenuissi-  
mis, radice minima. Nascitur in opacis & hu- *Locus.*

## COTYLEDON, Aquatica.



midis, gustatu feruens. Alij Callitrichê potiùs esse volunt herbam descriptam cap.  
17. de qua suprâ tractauimus. In regionibus septentrionalibus frequens admodùm  
riguis depresso; pratorum cōuallibus & scrobibus, vbi torpuerunt per hyemem  
resides aquæ. Gustu acris est.

## SIVM, CAP. LXXVII.



VO D Græcis σίον, Latinis Siū & Lauer dicitur, Mauritanis *Rorcatthal-* *Nomina*  
*mi,* & *Inhamelhauella*, seu *Hamehauella*, Italis *Gorgolestro*, Germanis *Vusser*  
*eppfich*, id est, Apium palustre, Hispanis *Rabacas*, Gallis *Berle*. Siu m autē  
nomen sibi adsciuit *ἀνδρὶς σίον*, id est, à concutiendo, quia quatitur,  
vacillandoque perpetuo succutitur præterlabentibus vndis, atque semper alluenti-  
bus. Vnde etiam Laueris nomen Latinis, nisi quis malit ab vrinis calculisq; ciendis *Lib. 2. c. 120*  
& excutiendis dictum. Sium, vt tradit Diosco. in aquis inuenitur, frutice pingui, *Forma.*  
recto,



recto, foliis latis, olusatro similibus, sed minoribus & odoratis. Sium verò Crateuæ, vt idem Diosco. refert, herba est fruticosa, exigua, multa folia habens, rotunda, maiora quàm menthæ, nigra, & ad erucam accedentia. Matthiolus id verum Sium esse arbitratur quod hîc exhibemus, quòd nullis prorsus notis à Dioscoridis Sio

*SIVM VERVM,*

*Matthioli.*

*Berle.*



dissideat. Prouenit, inquit Lobellius, in riguis & riulis vbi cardamine, foliis ad nasturtium hortense & cardaminen accedentibus. Cauliculi pedales & interdum cubitales: flores albi & cornicula Sij Crateuæ, gustanti acria, frequens hæc Taurinis Pedemōtanis in collium & montium riulis. Dioscoridis sium esse Gallorum *Berle*, quam herbarij pastinacam aquaticam vocant ab odore & foliorum effigie, perspicuum est ex descriptione, eique sententiæ plerique omnes adstipulantur. At tamen Fuchsius hanc nomine eleoselini seu apij palustris depinxit. Dodonæus in stirpium historia Sium Crateuæ maius facit plantam hîc pictâ: sed perperâ, cum non Crateuæ, sed Dioscoridis sit verum Sium. Id quod & agnouit in Historia Aquatil. vbi multò accuratius depinxit & descripsit hoc modo. Sium longis, tricubitalibus aut amplioribus, crassis, striatis & inanibus assurgit caulibus, qui superius attenuati in alas diuiduntur: folia in eis oblonga, ex pluribus aliis composita, quorum singula, pingua, glabra & per ambitum serræ modo incisa, particularibus hipposelini foliis minora:

*nasturtium.  
craton Dodon.*

*SIVM Vulgare,*  
*Matthioli.*



*SIVM Crateuæ, maius  
Dodonæi.*



flores




flores in umbellis candidi. Radices tenues, nigrae & capillatae veluti fibrae sunt, quae non modo sub sunt, sed & caulium geniculis adnascuntur, iis quibus aquis conduntur, aut limo insiguntur partibus. Apio aut etiam Hippofelino tota herba odoratior est, petrolei vulgò dicti ferè odore. Nascitur in perennibus riuulis, rariùs in refedibus aquis. Iulio & Augusto floret. Idem Dodonaeus in Historia stirpium Sium siue Lauer minus pinxit, sed in Histo. Aquatilium multò feliciùs. Sio, inquit, siue Laueri odore & facultate proximum est, alterum quoddam veluti Sij genus, multò tamen & minus & tenuius. Cauliculi sunt tenues, rotundi, laeves, obscurè geniculati, inanes, iuncis quodammodo similes, ex quibus tenues oriuntur, & inanes quoque pediculi siue costae, in quibus parua aliquot & angusta foliola, flores in exiguis umbellis, scabiosae angustioribus & minoribus, candidi, simul compressi exeunt: semen aniso maius, subcandidum, superiori parte latius. Radices tenuissimae & nigrae fibrae sunt, caulibus inferiùs adherentes: emittit verò & ex imo caulis, fibras obliquoè serpentes, quae alicubi terrae aut limo haerentes, radices faciunt, & cauliculos promunt, seipsam hoc modo multiplicante stirpe, quae tamè & semine feri potest. Lobellius Oenanthen aquaticam vocat. Reperitur in perennibus riuulis, aut aliis aquis frequentius, ac sapissimè ubi Sium gignitur: non rarò etiam in palustribus & riguis, iuxta riuulos & fossas: crescit etiam in hortis aut alibi, loco non perinde humido satum, quod tamen minus attollitur & breuius est, foliaque habet terrae proxima, carefolio similia, sed tenuiora: reliqua verò, uti eius quod in aquis exit: radices autem crassae, paruis siluestribus napsi similes, verum minores ac breuiiores, à quibus & transuersae quaedam serpentes exeunt fibrae, quibus seipsum multiplicat. Ita non rarò in alium locum translatae, stirpes, formam effigiemque aliqua parte commutant, floret aestiuis temporibus: Augusto semen in hortis quidem ad maturitatem peruenit. Matthiolus huius generis illud, quod in hortis aut alibi loco non palustri natum, formam commutauit, inter oenantes à se depictas quartam fecit, ab oenanthae tamen multum differentem Dodonaei sententia. Quidam minus illud

Cap. 43.

## PHELLANDRIVM,

Plinij.



Sium Dodonaei Silaum esse putant à Plinio memoratum, cap. 8. lib. 26. nascetem in glareosis & perennibus riuus, cubitalem, apij similitudine, qui ut olusatrum magna utilitate vesicae coquitur. Est & tertium Sio odore & facultate cognatum genus ab eodem Dodonaeo positum, Cicutaria palustris Lobellio. Caulem habet crassum, inanem, geniculatum, supra aquas bicubitalem aut longiorem; in multas alas diuisum, primum viridem, deinde cum semen maturum esse coeperit, in luteum languescentem, folia hortensis apij, tenuiora: flores in umbellis non magnis parui sunt & candidi: semen odoratum, subnigricans, aniso maius: radices fibratae sunt, veluti sij nigrae, ad inferiorem caulis partem geniculis ipsis adherentes. Exit iisdem ac similibus quibus sium locis, & simul cum eo saepe reperitur. Aestate floret, Augusto semen maturum est. Plinij Phellandrium videtur esse, quod scribit nasci in palustribus, folio apij, cuius semen bibitur propter calculos & vesicae incommoda. Alij apium siluestre Dodonaei Phellandrium esse putauerunt, alij Angelicam minorem,

Lib. 26. c. 12.

Lib. 4. c. 46.

Sium



*Sium Alterum Eruca folio.*

Lib. 2. c. 120

Lib. 8. firm.

cultates hæc tradit Dioscorides. Eius folia cruda coctaque si edantur, calculos con-  
fringunt & expellunt. Vrinæ item mouent, fœtus & menses ducunt. Et Galenus,  
Sium, inquit, quantum gustu odoratum est, tantum etiam calfacientis facultatis est  
particeps. Sed & digerit, & urinas mouet, & calculos renū frangit, & menses euocat.

*ERISITHALES,**CAP. LXXVIII.*

Lib. 26. c. 13.



Nomen.

Forma.

Lib. 4. c. 19.

Lib. 27. c. 9.

**E**RISITHALES, vt scribit Plinius,  
est flore luteo, foliis acanthi, bibi-  
tur ex vino. Huic breui historiæ  
non in scitè aptari potest planta hîc  
depicta, radice longa, crassa, contorta, surculosa,  
foliis ex ea multis, pedem ferè altis acantho si-  
milibus, sed nonnihil per latera pungentibus:  
caule sesquicubitali, striato, foliis paucis, mino-  
ribus & breuioribus comante: flore aureo in  
capitulis oblongis, qui in pappos tandem dila-  
bitur. In aquis semper, maxime pratis riguis  
reperitur.

*EPIMEDIUM, CAP. LXXIX.*

**E**ΠΙΜΗΔΙΟΝ Græcis, & Lati-  
nis Epimedium dicitur. Caulis est  
non magnus, inquit Dioscorides,  
hederæ foliis denis aut duodenis,  
neque florem, neque fructum ferens, radice te-  
nui, nigra, graui odore, gustu fatuo. Nascitur in humidis. Plinius hæc ex Dioscoride  
descripsisse videtur Epimediū, inquit, caulis est nō magnus, sed hederæ foliis denis  
aut



EPIMEDIUM *M. Dolonci.*

aut duodenis, nunquam florens, radice tenui, nigra, graui odore. Nascitur in humidis. Quamnam hæc sit planta difficile est admodum statuere. Matthiolus ignotam sibi faretur, eumque reprehendit, qui Epimedium eam plantam esse censet, quæ à triquetra foliorum figura à recentioribus Herba trinitatis appellatur. Pena raram quandam & nuspiam à se præterquam in Italia visam plantam pro Epimedio pinxit & descripsit, suffragante etiam Itolorum Herbariorum iudicio, Lobellius Epimedium Anguillaræ vocat. Dodonæus integram plantam representauit, atque his ferè verbis delineauit, folia eius ampla, numerosa, & creberrimè ter trina, rarò plura, ab vno terete tenuique dependent pediculo, sunt autem ea hederæ foliorum figura, lata, acuminata, duriuscula, & per ambitum veluti ferrata. Assurgit inter hæc tenellus & teres dodrantalis cauliculus, valde elegantes ferens flosculos, forma quadrangulares: quorum margines rubent, interiora lutea, medij verò vident apices: rubet & exteriore ac auersa parte flosculus, sed discurrentibus rectis candidisque striis variegatus. Radix multas in obliquum propagines emittit, inferius fibrosa. Legitimum esse Dioscoridis Epimedium non est facile affirmare, id enim scribit neque florem neque fructum ferre: nisi dicamus huic idem vsuuenire quod Bechio, Dictamno, Onosmati, fortassè & Cynoglossò, quibus florem, caulem, fructum demunt, cum tamen iis ornentur. Hodie in Belgicis hortis viret. Scribit Diosco. Epimedij folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, non sinere mammas increfcere: radicem conceptum adimere, folia trita quinis drachmis, per menstruas purgationes, quinque diebus in vino potu, præstare mulieribus ne concipiant. Eadem ferè Plinius, Huic, inquit, spissandi refrigerandique natura, fœminis cauenda, folia in vino trita virginum mammas cohibent. Quibus assentitur Galenus, Epimedij vis, inquit, est moderatè refrigeratoria cum aquea humiditate: quare nullam habet insignem qualitatem, mammas cataplasmate impositum retas seruare potest. Aiunt epotum concipiendi spem adimere.

Lib. 6. fm.



FINIS PRIMÆ PARTIS.



102

1702



